





Inventum 1744

Med
Ther gen
~~Herules~~
ok

HERCVLIS SAXONIÆ

PATAVINI,

IN PATRIO GYMNASIO MEDICINAE
Practicæ quondam Professoris celeberrimi,

OPERA PRACTICA.

Quibus hac nouissima editione præter alia accesserunt

EIVSDEM AVCTORIS
TRACTATUS

DE MORBIS MULIERVM,



DE TVLSIBVS, AC VRINIS.


Omnia quàm antè cura emendatiore.



PATAVII, CIO IDC XXXIX.

APVD FRANCISCVM BOLZETTAM
Bibliopolam Patauinum. SUPERIORVM PERMISSV.

HERCULES
SAXONIAE
PATAVINAE
IN PATRIO GYMNASIO MEDICINAE
Practicae quondam Prosectoris celeberrimi



OPUS
EIVSDEM AUCTORIS
TRACTATUS
DE MORBIS ACUTIS
DE TUBERCULIS AC PNEUMONIA
Omnia quatuor ab eo cura emendatioribus



PATAVIO MDCCCXXXIX
APUD FRANCISCUM BOLZETAM
Bibliopolam Patavinum. Staroborsky Pirmisze

Amplissimo, & Excellentiss. Viro D.D.
BENEDICTO SILVATICO
PATRICIO PATAVINO,
D. MARCI EQVITI,
 Et in Patria VNIVERSITATE Præcos Professori Primario.



ERCVLIS SAXONIAE victura sæculis monumenta in
 Amplissimo Nomine tuo publicam olim lucem aspexere,
 nunc recusa denuò doctorum oculos subitura ab eodem
 nomine sibi commendationem parauerunt. Quod enim
 aliud illustrius optare, fronti; præfigere poterant, quam
 cuius fama strenuè orbem peruagata, cum plurima prædi-
 cavit minor tamen vero est? Hac vitæ breuitate, quæ vix

in lucem editos letho applicat, & natalibus funera coniungit, nulla pænè dies
 est qua salutem agris mortalibus dando angustas æui moras non extendas, &
 contra fatorum imperium depositos iam, ac conclamatos ab extrema meta
 reuoces; quodq; maius est id alios doces quod pænè solus præstare potes.

Itaq; vt olim Epidaurum, sic ad te hodiè ex vniuerso Orbe concurrunt
 nemoq; iam Æsculapio aut Ioui, sed tibi incubat, vt saluti non per somnum
 reddatur. Exteri quoq; Reges, ac Prinipes ad te preces flexerunt quoties ob-
 sequij indociles morbi puluina scandentes sceptris, ac purpuræ non peper-
 cerant: spemq; Regni ac populorum vota tuæ fidei commendarunt quæ vsq;
 in inuidiam felix fuit. Ne hîc interim ignobilia capita tangam, quorum
 censum quotidie libitinâ auertis.

Quæ non inde Europæ Academia te amplissimis præmijs euocauit, decusq;
 hoc magnum Imperio Veneto Vrbiq; nostræ non inuidit? At postquam
 Reip. Augustissimæ, ac patriæ priuata commoda antehabuiſti, Germani, Belgæ,
 Angli, Sarmatæ, ignotæ quoq; gentes Oceano, iugisq; Alpium secluse hoc
 in Italia Oraculum quæſituere, frequentantq; quotidie mirabili concursu non
 secus, ac olim ad popularem tuum Liuium visendum ab extremo Orbe con-
 uentum est. Adeo siue hanc artem seruandi homines doceas, siue exerceas
 in vtroq; summus es, vbiq; admirandus, nusquam tui dissimilis. Nec vlli ma-
 gis rei hanc Patauini Gymnasij florentissimam externæ iuuentutis frequentiam
 quam nominis tui celebritati debemus, sicuti innumeri mortales tibi spiritum
 debent ac lucem. Sic te Diua potens salus respiciat, quæ nos ope tua semper
 respexit, in quo patriæ huius ac celeberrimi Gymnasij spes sita, & collocatas
 videmus. Vale, vt nos quoq; valeamus. Patauij à die V. Sept. M.DC.XXXIIX.

Amplissimo, & Excellentissimo Nomini tuo.

Addictissimus Client
Franciscus Bolzetta.

Et in Patris Universitate Praeceptorum Professori Primario.

in iudiciis suis. Neque enim in iudiciis capitis regum, quorum


[illegible]

1871

INDEX CAPITVM.

SEV MATERIERVM,

Quæ in hisce Prælectionibus Practicis continentur.



SECTIONIS PRIMÆ,

In qua agitur de Affectibus Sensuum Internorum, & Externorum, ac Partium Respirationi dicatarum.

Cap. I.	R efatio, de Morte Mas- saria. pag. 1 De Capitis quocunq; Do- lore. Ibid.	
II.	De Vertigine, & Scotomia.	13
III.	De Phrenitide.	17
IV.	De Lethargo.	23
V.	De Somno in genere.	26
VI.	De Comate.	27
VII.	De Caro.	28
VIII.	De Differentijs Lethargi, eiusq; causis immediatis.	29
IX.	De Lesione Memoriae.	31
X.	De Memoria Viriata.	33
XI.	De Vigiljs præter naturam.	36
XII.	De Apoplexia.	37
XIII.	De Catalepsi.	40
XIV.	De Paralyfi, Stupore, & Torpore.	44
XV.	De Convulsione.	51
XVI.	De Epilepsia, seu Morbo Comi- tiali.	59
XVII.	De Incubo.	67
XVIII.	De Tremore.	68
XIX.	De Catarrho.	70
XX.	De Angina.	78
XXI.	De Morbis, Symptomatibusq; Ocu- lor.	81
XXII.	De Affectibus Aurium.	92
XXIII.	De Affectibus Narium.	94
XXIV.	De Hemorrhagia. I. Profluuiio San- guinis e Naribus.	96

xxv.	De Sputo Sanguinis.	97
xxvi.	De Phthisi, seu Tabe.	99
xxvii.	De Tussi, & Respirandi Difficul- tate.	103
xxviii.	De Pleuritide.	109
xxix.	De Peripneumonia.	118
xxx.	De Empyemate.	120

SECTIONIS SECVNDÆ.

De Cordis, & Infimi Ventris Affec-
tionibus.

I.	D e Cordis Palpitatione.	125
II.	De Syncope.	137
III.	De Affectibus Partium Natura- lium.	142
IV.	De Vitijs Gule.	Ibid.
V.	De Vitijs Oris Ventriculi.	144
VI.	De Dolore Oris Ventricul.	Ibid.
VII.	De Dolore Ventriculi specialiter sum- pto.	146
VIII.	De Curatione Inflammat. Ventri- culi.	149
IX.	De Bulimo ex Galen. sententia.	151
X.	De Pica, & Malacia.	152
XI.	De Imminuta & Ablata Appeten- tia.	154
XII.	De Singultu.	156
XIII.	De Supinitate, Subuersione, Vomitu, & Nausca.	158
XIV.	De Cholera.	162
XV.	De Lesa Concoctione.	163
XVI.	De deprauata Concoctione.	167
XVII.	De Alui Fluxibus, & primò de Lienteria.	169
XVIII.	De Diarrhœa.	171

De

xxix.	De Dysenteria, & Tenesmo.	176
xx.	De Fluxu Hepatico.	181
xxi.	De cæteris Fluxus Hepatici speciebus.	184
xxii.	De Fluxibus, quos Calida Iecoris procreat Intemperies.	186
xxiii.	De Fluxu Alui Ulceroso, aut Virulento.	188
xxiv.	De Fluxu Venenato.	194
xxv.	De Icteria.	195
xxvi.	De Scirrho Iecoris.	Ibid.
xxvii.	De Cachexia & Hydrope.	199
xxviii.	De Scirrho Lienis.	206
xxix.	De Morbis Intestinatorum, ac primum de Voluulo.	208
xxx.	De Dolore Colico.	212
xxxi.	De Lumbricis.	215
xxxii.	De Procidentia Ani.	218
xxxiii.	De Hemorrhoidibus.	219
xxxiv.	De Renū, & Vesicæ Affectibus.	222
xxxv.	De Diabete.	223
xxxvi.	De Purulenta, & Cruenta Mictione.	226
xxxvii.	De Arenulis, & Calculo.	229
xxxviii.	De Stranguria, Dysuria, & Ischuria.	235
xxxix.	De Inflammatione Renum, & Vesicæ.	237

SECTIONIS TERTIÆ,

Quæ complectitur Affectus Muliebres.

I.	De Vitæ Conceptionis.	239
II.	De Sterilitate.	Ibid.
III.	De Morbis, ob quos semen Virile in Vterum non recipitur.	240
IV.	De Phimosi.	241

v.	De Rhagadibus, & Condylomatibus.	Ibid.
vi.	De Verrucis.	242
vii.	De Nympha, & Cauda.	Ibid.
viii.	De Coalescentia.	Ibid.
ix.	De Tumore Duro.	243
x.	De Nimia Pinguedine.	
xi.	De Mala Vteri Situatione.	Ibid.
xii.	De Frigida, & Humida Vteri Intemperie, deq; eius Hydrope, & Inflatione.	Ibid.
xiii.	De Morbis, ob quos Semen non retinetur in Vtero, & primum de Lapide Vteri.	246
xiv.	De Lumbricis Vteri.	247
xv.	De Procidentia Vteri.	Ibid.
xvi.	De Inflammatione Vteri.	248
xvii.	De Scirrho Vteri.	250
xviii.	De Abscessu Vteri.	251
xix.	De Ulceribus Vteri.	Ibid.
xx.	De Cancro Vteri.	253
xxi.	De Albis Mensibus.	254
xxii.	De Gonorrhœa.	256
xxiii.	De Immodico Menstruorum Fluxu.	257
xxiv.	De Viriis, quæ ad Depravatam Alteratricem pertinent, & primum de Furore Vterino.	259
xxv.	De Saryriasi, seu Pruritu Vteri.	261
xxvi.	De Defectu Mensium, & eorundem Stillicidio.	Ibid.
xxvii.	De Præfocatione Vteri.	266
xxviii.	De Superfætatione, & Prole Numerosa.	270
xxix.	De Monstris.	271
xxx.	De Mola.	272

FINIS.

HERCVLIS SAXONIÆ

Professoris Patauini, ac Medici præclarissimi

PRÆLECTIONVM PRACTICARVM

PARS PRIMA

QUÆ CONTINET AFFECTVVM, QVI IN SENSVM EXTERNORVM
& internorum, ac respirationis instrumenta incidunt, explicationem.

PRAEFATIO, IN QUA MORTEM MASSARIAE DEPLORAT,
suumque munus cum Herculis onere, & Caput humanum cum cælo comparat.



HERCVLI Poetæ olim fabulati sunt, cum sub onere quod humeris susceperat, cuique amplius ferendo non erat, gemeret, tremet; q; subsidio venisse Atlantem, inque suas devoluisse ceruices vastam illam corporum cælestium machinam. Ego, cui non minus, atque olim Herculi, cæli moles hoc semestri hyemali incumbere videtur, vix ac ne vix quidem inuenio fulcimentum, quod, qui pro eo, quo plurimum excellebat, animi robore, maximam huius oneris partem integro octennio sustinuit, ante paucos dies subitâ (proh dolor) & inopinata morte ad æternam patriam migravit: Massarias, inquam, Antagonista meus, vir eloquio grauis, genio, ingenio illustris, arte Medica docenda dexter, in facienda felix: etiam labascere capî, ac metuere, ne, quod premit, onus, opprimat Cælum portauit Hercules, siderum moras, aliaq; D mysteria cælestia indagando, & mortalibus patefaciendo; Ego capitis, partis principis, morborum explicationem suscipiendo, argumentum sanè difficile, quodque ingenij mei vires, quas exiguas esse ingenue fateor, longè excedere, & superare videtur.

Vi autem cælum ex septem compactum est orbibus apta cohaesione contiguis, inuicem sese complectentibus: ita in circulari capitis ambitu septem inuicem se circumuoluentia inuenire licet. Primum est, Dura mater. 2. Pia mater. 3. Os Caluarie 4. Membrana ossi obducta 5. Panniculus carnosus. 6. Cutis. 7. Epidermis.

Septenatio planetarum numero 7. neruorum ex cerebro oriens paria respondent: Vtique cælestia hæc inferiora lumine collustrant; ita humor crystalloides lucentes, & recipit, & dispergit radios: Vt corpus illud cæleste sedes est mentis æternæ, omniumque angelorum, & beatorum, ita cerebrum est domicilium in quo (veluti in arce, editiori loco exstructa Rex) residet, præsidetq; toti corpori diuiniore animæ nostræ pars rationalis: Denique vt corporum cælestium influxu, ac

vi quadam occulta, ac salutari inferiora hæc oriuntur, gubernantur, sustentantur; ita spiritu per neruos, seu vehicula huic vsui destinata, in omne corpus diffuso partes vegetiores redduntur, & aptæ obeundis, quibus natura ipsas præesse voluit, muneris functionibus.

Cap. 1. De capitis quocunque dolore.

IN affectum capitis explicatione cum Rhafen veluti ducem sequamur, primum obuium se præbet Capitis dolor, de cuius natura, differentiis signis, curatione, &c. acturis, opere pretium erit, Doloris essentiam aliquanto exactius examinare.

De Doloris genere.

ACriter de genere doloris inter se decertant Medici, an, si ille morbus sit accensendus, an verò symptomatibus; Morbum esse Dolorem Petrus de Abbano & ratione probare nititur, & auctoritate. Ratio sic se habet: Dolor est passio per se manens, ergo morbus: Huic concinit Galeni auctoritas, passim dolorem in morborum catalogum referentis. Quidam, vt expediret se istiusmodi tritis, talem commentus est distinctionem. Dolor considerari potest dupliciter; formaliter, siue causaliter, id est, quatenus à causa aliqua dependet, & effectiue; posteriori modo non est morbus effectus, enim huius est, priori modo est morbus; à morbo enim proficitur: Sed videtur iste principium petere, dumq; Charybdim evitare vult, in Scyllam incidit: æquè enim dubium, variisq; instantijs obnoxium est, quod asserit ille, Dolorem morbum veluti causam agnoscere. Dolor enim cum sit semper quippiam in fieri hincq; in sola generatione ejus consistat essentia, non potest à morbo tanquam à causa oriri, hic enim genitum quid, & absque etiam causa persistit: vnde passim dicebat Gal. cessante doloris causa dolorem simul euanescere: ita dum continuum dissoluitur, dolor exoritur; soluto verò iam continuo, remittit. Quod verò ipsis etiam morbis dolorem interdum assistere videamus, id fit propter humorem, vel acrem, vel multum, qui vel credendo, vel distendendo partes, nouum subinde dolorem producit.

Vi ergo respondere possit Petro de Abbano, cui Conciliatoris nomen tributum est, notandum, du

A

plci

pliori modo permanentem rem quampiam dici pos-
se. Primum quia est essentia persistens per remo-
tionem etiam causae efficientis: hac ratione mor-
bus est passio permanens, quia est res, quae ablata
causa persistit. Secundo, quod consistit, sed quia
causam habet fouentem, & continuè producen-
tem, quia ablata amplius non apparet: Ita dolor
potest esse permanens, & diuturnus ratione crui-
sae fouentis, & excitantis; quia tamen ablata, abole-
tur simul ipse, ergo dolor non est morbus.

**Defini-
tio.** Definitur à nonnullis, quod sit passio: Genus
autem hoc cum remotius sit rectius sensisse asse-
rimus Galenum dicendo: Dolorum esse opera-
tionem tactoriam prauam: & alibi, esse tristem sen-
sum, siue tristitiam in sensu: Per sensum autem
intelligit Gal. non ipsam potentiam sensificam;
sed ab hac prodeuntem actum, siue operationem.

Hic Argentarius, & qui eum sequuntur, insur-
gunt contra Galenum, negantque dolorem esse
operationem. Primo. Distinguit Gal. dolorem à
signis quae ab operationibus depromuntur, ergo
dolor non est operatio. 2. Negant esse prauam:
Tunc enim praua sensorij dicitur operatio, cum
errare illud contingit in proprii obiecti apprehen-
sione, v.g. si quae simplia, paruaque sunt, dupla ma-
ioraque visui representantur, sed tactus percipien-
do dolorem non aberrat: sed illum, ut reuera est
percipit: Ergo illa operatio non potest dici praua.

Respondeo ad primum. Duplex est operatio
sensorij: una primaria, principalis, propria, qua
scilicet obiecta sua percipiunt, & illa perceptione
perficiuntur, & reficiuntur, altera est, qua præci-
piunt obiecta quidem, & ipsa: sed quando insu-
per illis iniucunditatem adhaerentem; propterea
quod naturæ modum, limitesve excedant, nec, qua-
liter oportebat, disposita sint. Excellens enim sensi-
bile corrumpit sensorium: Galenus ergo cum de
signis agat loco citato, ab actionibus desumptis,
seu depromptis, non potuit ibi mentionem face-
re doloris, cum per actiones intelligeret proprias
principales, &c.

Secundum, quod adferunt, argumentum simi-
liter locum habet in actione primaria.

De subiecto Doloris.

Queritur, an dolor solius tactus organo im-
primatur, & inhæreat tanquam proprio sub-
iecto: an verò & reliquorum sensuum instrumén-
tis? Galenus multis in locis omnibus sensibus do-
lorem attribuit; ita visum dolere videmus, si ni-
mio feriat radiorum solarium fulgore; aures
obtundi nimio fragore, ac sonitu: sed solus tactus
esse organum dolores percipiendi, & Gal. testimo-
nio & veritate ipsa comprobatur. Quod verò Gal.
à reliquis etiam sensibus percipi affirmat, id nul-
la alia ratione facit, quam quatenus ille dolor à
proprio ipsorum obiecto excitatur: Ita dolorem,
quia visibili splendido nimis excitatur in oculis,
visui attribuit; qui tamen oculo non perciperet-
ur, nisi tactoria illi inesset facultas.

Cum autem dupliciter accipiat tactus vo-
cabulum (primo pro sensu externo) secundo
pro sensu externo cum interno, id est à commu-
ni copulato, subiectum tactus non vnicum esse

videtur: si priori modo tactum consideremus sub-
iectum erit pars corporis viuientis nervosa, aut
saltem nervea membrana vestita; si posteriori, ce-
rebrum ipsum. Sufficiat hæc dixisse de genere
& subiecto.

De proxima, & immediata causa Doloris.

Accedamus nunc ad causam proximam, &
immediatam: quæ varia à varijs statuitur.

Primo. Auer. 3. Collig. 31. Solam intemperie
doloris effectricem causam agnoscit. Sed refuta-
tur primo, quod absque vlla intemperie dolores
excitantur à causa contundente, incidente, &c.
2. Intemperies, qua talis, quid genitum est, seu
permanens, & morbus, Dolor autem cum in ge-
neratione eius constituta sit natura, & essentia, à
causa dependet similiter in fieri existente. 3.
Ergo omnis intemperies dolorem produceret:
at nec intemperies equalis, nec inaequalis paulu-
tum agens, nec humida dolorem producit.

2. Auic. duas proponit causas 2. p. doct. 2. c.
19 & alibi: Intemperiem scilicet & vnitatis solutio-
nem. Vbi imitari videtur Galenum idem docen-
tem art. med. 82. acut. 1. lib. de inæq. intemp. c. 3.
11 meth. ca. 7. 3. loc. aff. 1. Sed sententia hæc non
admittitur ob rationes supra adductas. Præte-
rea, vnius rei vnica est causa proxima: Quando
verò dolor excitatur à qualitatibus primis, siue
solis, siue mistis, certe intemperiei non est as-
cribendus: sed solutioni vnitatis, quam causant
illæ fundendo, contrahendo, &c.

3. Nec multum, imo nihil differt ab Auic. Val-
lesij sententia lib. 5. controu. c. 5. Illud tamen mi-
ror, cur vit ille eximius causam primo & rectè
posuerit immediatam, continui solutionem, &
postea addiderit, quandoque intemperiem cum
ipsa vnitatis solutione causam habere.

4. Professor Patavinus violentiam tangibilis
obiecti, secutus scilicet Plat. in Timæo Gal. de diff.
symp. tanquam propriam proximamque Doloris
causam asstruere est ausus.

Sed quaeritur: An violentiam illam absolutè,
& in abstracto intelligat, an verò in concreto,
id est, quæ in actu posita alterationem in tactus
organo producit. Priori modo acceptam non esse
causam doloris nemo inficias ibi facile; Poste-
riori modo intellecta & si causa sit doloris, est
saltem remota soluendo enim vnitatem ipsius
partis dolentis dolorem ingenerat, ut ita dolor
proximè solutionem insequatur, non violentiam.

Sed oppugnat assertionem hanc Auer. ita con-
cludens. Dolor est ab obiecto: Solutio non est o-
biectum ergo. Responderetur: Solutio est obiectum
tactus commune; quia motus, &c.

2. Auic. Membrum dolens non est diuisum:
Ergo. Solutio est duplex: Vna, quæ fit à causis
manifeste incidentibus, ut ferro, gladio, & con-
tudentibus; Altera, quæ fit à causis internis, quæ
etiam soluant, quod continuum erat: tamen illa so-
lutio non est sensibus obuia. Quæ alteram possi-
simum in doloris generatione locum habere di-
cebat.

Tandem ad contrarietatem, quam Galeni-
nica præ se ferre videntur scripta. In lib. enim de
fract.

fract. ex. 34. 2. comq. luc. cap. 7. 4. simpl. c. 2. de in-
xqual. intemper. 6. docet vnicuique esse doloris caus-
sam, solutionem scilicet unitatis 1. 2. verò meth. c.
7. duas proponit causas solutionem scilicet & in-
temperiem. Respondeo: Doloris nomine primo-
intelligenda venit quaecumque molestia, etiā si nul-
lius sit momenti, & exigua hinc de differentiis
symp. pruritus inter dolores numeratur; primo,
de symp. cas. 6 de inxqual. intemp. 6. fames, sius;
secunda Insignis molestia, & tristitia priori signi-
ficatione acceptus dolor oritur absque continui
solutione, & morbis etiā attribuitur; ita in fe-
bre totius corporis percipitur languor, & mode-
stia ab intemperie corpus molestante; posteriore
nequaquam.

Obiectio. Verum obijciat aliquis Solutio continuitatis
est causa doloris, ergo, non est morbus neque e-
nim dolor à morbo proficiscitur, cum sit quippiā
in fieri. Sed Respondeo. Per solutionem conti-
nuitatis quandoque intelligere Galenum solutā
unitatem; quandoque energiam quandam, siue
operationem agentis in partem corporis, eiusque
continuitatem soluentis.

Solutio. *Definitio doloris.*
Dolor est sensus tristis, siue tristitia in sensu,
vel operatio prava tactoria à continuitatis
solutione.

Mediatæ causæ.

Mediatæ doloris causæ sunt obiecta violent-
ter agentia, & distrahentia sensorium à
suo naturali statu.

Quæstio I.

AN dolor oriatur tantum, quando recedit
pars à naturali suo statu; an vero etiam, **D**
quando ad eundem reuertitur? Galenus sibi ipsi
videtur contrarius: Nam 1. de caus. symp. 6. ait,
Vbi corpus ad naturalem habitum redit, idque
assaut, voluptas oboritur. Plato in Timæo. Quā-
do & recessus, & reditus paulatim sit, neque do-
lor, neque delectatio sequitur; Sed 12. method.
cap. 7. iterum Platonem secutus in Philebo scri-
bit, dolorem etiam fieri in reditu confertim facto
ad naturalem statum: Exemplo declarat eorum
qui per niues refrigerati repente calefiunt.

Francisc. Vallesol. 3. Enarr. Medic. enarrat. 2. **E**
multa facit hac de re verba; tandem tamen con-
ciliationem horum locorum paucis complectitur
In reditu ad naturalem statum confertim facto,
aut qualitas præter naturam resistit qualitati na-
turali, quæ introduci debeat, aut non resistit: Si
resistit, dolor exoritur; sed non ex reditu, quate-
nus est reditus; sed ex illa pugnancia, quam hu-
morum excipit commotio, hinc solutio continui-
tatis: Qui impensè friget, si subito incalescat, fri-
gus fugiens calidum per antiperistasin concen-
tratur, bellumque indicit calori, & reluctatur: **F**
Vnde dolor; Si nulla aduersetur qualitati intro-
ducendæ qualitas, delectatio sequitur.

Quæstio alia:

AN humida intemperies dolorem excitare
possit? Gal. 1. de symp. caus. 6. 2. de comp.
loc. cap. 1. negat per se posse; Libello de inxqual.

A intemp. c. 3. contrarium asserit. Respondeo Gal-
hic loqui de dolore generatim accepto pro qua-
cunque molestia: Aut dicendum potius, humi-
dam in temperiem per se, & solam nunquam ef-
ficere dolorem; posse tamen cum materia 1. de
natur. hum. t. 26. Ibi expresse; Quatuor qualitates
doloris sunt effectrices causæ; humida absque
materiæ multitudine nunquam 1. de symp. caus.
6. Humida absque qualitatibus actiuis dolorem
non facit: Hactenus de dolore in genere.

De dolore capitis in particulari.

Dolor capitis est tristis sensatio capitis, & par-
tium eius ex continuitatis solutione. No-
mine partium intelligimus cutem, musculos, pe-
tricanium, diploma, duplicaturam ossis, & me-
ningas, venas, arterias, nervos. Excipimus dolo-
res sensuum, de quibus separata erit tractatio.
Capitis igitur nomine intelligenda veniunt, vel
vna vel omnes, vel pleraque istarum partium:
anteriores, posteriores: internæ, externæ: dextræ,
C sinistra, vnde varix differentiæ.

Causæ.

Causæ in duplici sunt differentiæ: Externæ,
& Internæ. Externæ aut sunt Mediatæ,
aut Immediate; Immediate aut immateriales,
aut cum materia. Imateriales, nimis calor ca-
piti occurrens ex igne, insolatu, laconico, vel me-
dicamento calido, acrique: frigus ex niue, glacie,
Boreali statu, frigido medicamento appposito; sic-
citas ex igne, inedia, vigiliis, nimio motu, inani-
tione, Venere, medicamentis exsiccanantibus. Ma-
teriales; vapor ex largiore vini potu, potissimum
in ijs, qui inebriantur ex vino generoso, odor a-
romatum, siue ex suffitu, vel alia ratione fiat, o-
dor assæ scæudæ, myrrha, castorei, croci, moschi,
ambriæ: Item omnia fœtida, ex cloacis, odor ve-
nætorum, vt cinnabaris, &c. deinde omnia, quæ
pungunt, erodunt, incidunt, grauanti, contundunt,
distendunt: suntque omnes istæ causæ externæ
immediate: Mediatæ vero sunt illæ, quæ possunt
huiusmodi qualitates primas producere, aut fo-
uere, ipsosque vapores, aut prauos odores generare.

Internarum aliæ sunt essentielles, aliæ per cō-
sensum. Essentiales vel Mediatæ sunt, vel Im-
mediate. Immediate; caliditas, frigiditas, siccitas;
sunt vapores, status, estque vnaqueque materia;
bilis, pituita, melancholia, sanguis, & ichor, siue
tumores comitentur, siue huiusmodi materiæ nō
faciant tumorem; Et huiusmodi materiæ habet
pro causis mediatis, aut intemperies capitis vi-
tiosas tum naturales, tum ascitinas, aut confor-
mationem prauam, aut morbos in mala compo-
sitione, vt tumores, obstructions, aut in solutione
continui, vt ossium caries.

Cephalæ causæ.

Sed quia datur capitis dolor antiquus, & con-
tumax, diuturnus, qui subinde reuertitur so-

Δ α mel

mel sedatus, qui propterea proprium nomen est A
sortus, & dicitur à Gale. 2. de comp. loc. cap. 2.
Cephalæa, Arabibus Passio Galeata, seu Galea di
cta, hinc causæ indagandæ huius doloris, quæ nõ
videntur cum enumeratis eadem.

Sunt autem, vel Mediatæ, vel Immediatæ: Im-
mediatæ materia pituitosa, melancholica, mista
ex utraque, abscessus iam factus, inflammatio cõ
firmata, lapis, vel vermis in cerebro: Ista sũt caus-
sæ immediatæ dolorum contumacium: Et quia
de materia, vel pituitosa, vel melancholica, & de
inflammatione indurata nemo dubitat, reliquũ B
est, ut ostendam dolores fieri ex abscessu cerebri,
ex lapide, & vermibus.

Fieri ex Abscessibus primũ docuit abundè
Fernel. in tract. de Lue Vene. c. 5. Consimilem vi-
di ego in quadam muliere iuvene, quæ post lotio
nes capitis laborantis tinea, sublata tinea, com-
prehensa doloribus mortua est.

Vermes etiam esse in causa doloris capitis di-
xit Auicenn. 1. 3. t. 2. cap. 3. Sed non scribit se hoc
vidisse, sed ex relatione Rhasis primo continent.
10. qui & ipse hoc se expertum proficitur. Trin-
cauel. lib. 9. cap. 11. scribit se in Nobili quodam
Veneto antiquo capitis dolore laborante, naribus
eiectionem vermem cum pedibus mucos, & cruore
obstruam vidisse, quo reiecto omnem subito eu-
anuisse dolorem. Holl. de morb. inter. in schol. ad
c. 34. scribit consimiliter se vidisse mulierem ei-
cientem vermem ex naribus. Sic Anton. Beniuẽ.
de admirandis. c. 100. Idem Holler. cap. 1. de in-
tern. scribit factum esse vermem, ubi assignat
causam doloris.

De lapide in capite scribit Holler. in schol. ad D
cap. 45. Nam profecto si in capite continetur ip-
sa materia viscida, & crassa, quæ etiam ad Renes
& Vesicam decumbit, si calor viget in ea parte,
quæ est ratio, cur non possit materia exsiccata in
lapidem conuertere.

Erat sermo de causis doloris antiqui, quem
Cephalæam dicunt. Proposui immediatas, idcirco
nunc succedunt mediatæ: Sunt autem hæ, vel ab
ipso statim ortu contractæ, vel a scituæ: Dicemus
primo, de naturalibus, deinde verò de aduentitijs
vel a scitujs.

Inter naturales est intemperies calidior, &
humidior, ut quæ (ut docet Gale. art. Med. cap.
19.) est in causa, ut facillime caput ipsum reple-
atur, & dolorem ex multitudine experiat. In-
temperies etiam calida, & sicca doloribus est ob-
noxia, propter sensum exquisitum, nimiamque
sensibilitatem. nam in calida & sicca intemperie
sensus sunt adeo exquisiti, ut ex leuissima causa
etiam & minima doleant, ex Gal. lib. art. Med. c. 8
Magnitudo etiam, & paruitas capitis vitiosa etiã
causa est, cur sepius incidat, & saepe reuertatur do-
lor: Nam ut dicebat Hippocr. 4. de morb. magnũ F
caput facile impletur, At ex Galen. 2. art. Med.
cap. 11. paruum non facile expurgatur. Magnam
etiam partem habet ad dolores inferendos anti-
quos vitiosa capitis figura, potissimum acuta,
Hippocr. 1. in 6. lipid. text. 3. Caput acutum ha-
bentes sunt in eadem parte dolentes; Sunt tamẽ

hac in parte ea obseruanda omnia, quorũ memi-
nit Gal. in præfatio com. ut scilicet acuties sit val-
de deformis, ut habeat cervicem improporciona-
tam, oblongam scilicet, & angustam; thoracem
paruum, & angustum, compressum; palatum val-
dè concavum; dentes superiores inferioribus nõ
bene coaptatos; in hac enim vitiosa figura sapius
reperunt dolores. Caput etiam sine futuris omnium
maximè doloribus est obnoxium. Causa est, quod
fuliginosa, & vaporosa excrementa non expur-
gentur. Robert. Constant. in adversar. ad Cel-
sum. Caput, ait, sine futuris ad morbos procli-
uius esse, quam cum futuris; Contrarium asserit
Celsus lib. 8. cap. 1. Sed posunt auctores inter se
conciliari, ut fecit Fallop. in comment. lib. Gal. de
ossibus, & Columb. lib. 1. anat. cap. 5. Conciliatio
est: Caput sine futuris firmitus esse ratione exter-
narum causarum, quarum facillè iniurijs resistit;
Ratione internarum esse debilius. Hæ sunt me-
diatæ naturales.

Aduentitiæ mediatæ sunt intemperies consi-
militer calida & humida, calida & sicca; morbi
instrumentales, tumores varij, & obstructions,
& compressiones partium cerebri, vel partium
capitis, est quoque morbus ex soluta unitate, qui
omnium maximè locum habet in Cephalæa pro-
ducenda, præcipue cranij; corruptio ossis quando-
q; est externa, nonnunquam interna interdum
in media ossis parte illa diploimate dicta. Hactẽ-
nus de causis essentialibus (præter quas sunt
per consensum) & non tantum locum habent
in Cephalæa, sed etiam in Hemisphaeria, imò Gal. Hemi-
craniam per consensum; aliquando tamen per
essentialiam, expurgante se cerebro per venas &
arterias. Sed in hac parte pulcherrimum occur-
rit quæsitum: Cur scilicet dolor, qui sit causis es-
sentialibus magis in vna, quam in altera parte
oriatur? Quando enim afficitur caput per sym-
pathiam, idest, per consensum, non est difficile
causam novisse: quandoquidem prout pars, à qua
fit consensus, fuerit dextra, vel sinistra, dolor etiã
magis hanc, vel illam occupabit capitis par-
tem; sed ubi essentialis materia in capite repe-
ritur, quæ est ratio, cur vnica semper pars patia-
tur, non quandoque vna, quandoque alia? Si con-
tingat vnã ex istis partem factam esse imbecil-
liorem causa est in promptu, sed nulla præces-
sit imbecillitatis causa. Puto, plerumque hoc fi-
eri expurgantẽ se ipsum cerebro per consueta e-
munctoria per vnã tantum capitis partem, per
aliã minimè, ita ut illa pars, quæ excrementa
educit, ab hemisphaeria sit immunis; altera vero
dolorem sentiat: Ita mulierem vidi, quæ conti-
nuè dextri lateris hemisphaeria diu, & acerbissi-
mè affligebatur, tandem defunctæ cranio dete-
cto, inuentum fuit cerebrum in sinistro latere
corruptum, ichore, & sanie refertum; quæ tamen
in parte nullum ipsa deprehenderat doloris
sensum.

Hemi-
craniam
caus.

Quæsitum

Solutio.

Causa per consensum ditorum affectum.

Sed ad re redeunt causae per consensum sunt aut humores, aut vapores, aut flatus, & isti aut benigni, aut maligni, & venenati; Humores autem sunt vniuscuiusque speciei. Mittuntur autem humores, siue vapores, ex ore ventriculi, ex fundo, membranis omnibus, ex mesaraicis venis, ex intestinis, liene, iecore, utero, renibus, & vesica, vel his omnibus; quandoque ab ipsa cute non amplius ex purgante humorem, qui ante eo detrudi consueverat, siue fuerit in cute vlcus, siue scabies aut lepra, aut alius effectus cutaneus, seu externus. Mittunt autem hae partes humores, vapores vel in caput vel retentis consuetis euacuationibus vel supra modum auctis ob morbum aliquem, intemperiem: Instrumentarium, & communem. Et iam dictis colligitur fieri dolores mistos ex essentiali causa, & secundaria, siue per consensum.

Obiectio.

Reliquum est ut dubium quoddam solvamus, quod posset vos torquere. Dictum est, dolores fieri ex variis morbis, ex intemperie, tumporibus, & ex catie, ex Lumbricis, & Calculo: At vero hi omnes sunt morbi, & tamen ab initio diximus doloris causam nunquam esse morbum.

Responsio.

Quod pertinet ad intemperiem, cum scribit Galenus, intemperiem esse causam doloris semper nos docet esse intemperiem inaequalem: Et propterea ait libr. de ineq. temp. Inequalis intemperies semper fit, semper augetur, itaque dolor non oritur ab intemperie, ut iam factus, sed ex ea, quae adhuc fit, & augetur; Quatenus autem fit, non est morbus.

Quod pertinet ad Tumores, in tumoribus potest dupliciter considerari materia: vel ut iam quiescit, vel ut iam adhuc mouetur, siue moueatur motu locali, siue motu alterationis. Dolor non fit ex Tumoribus, quatenus habent materiam quiescentem, sed quatenus habent illam cum motu ex Galeno & Hipp. Galenus 2. acut. 1. dum proponit causam doloris in pleuride, dicit causas doloris esse duas: aut redundantiam, propter quam oportet vniuersum corpus euacuare, quasi dicat, ne fiat noua confluxio: Alia causa est generatio spiritus flatus in inflammatione, qui spiritus partem extendit. Hipp. etiam 2. aph. 47. dum scribit in generatione putris dolores fieri, facto autem pure eos quiescere, quid aliud docuit, quam dolores fieri ex motu materiae, non ex materia replente, quatenus repleuit, sed ex eadem, quatenus mouetur. Idem dico de soluta vnitatem ex Gale. 1. de sympt. caus. 6. qui dicit ex soluta vnitatem dolores non fieri, nisi ex accedenti, quatenus confluit humor.

Sed de Lapide, & Vermibus est pulchra conside ratio. Gale. lib. de diff. morb. 8. inter morbos reponit Vermes, & Lapidem. Itaque si dolor fit ex Vermibus, & Lapide. Ergo dolor erit ex morbo.

Ego tamen inueni solutionem quam considerate: Lapis iste, & aliud quid vis tale potest actionem impedire aut cum motu, & transmutatione, aut per simplicem emanationem: Est distinctio Logica: Omnia accidentia ita se habent; Hac stante distinctione, dico: Si lapis, vel aliud

A tale actionem vitietur motu, & transmutatione, vere morbus dici non potest, sed Causa: quia id, quod est in motu, quatenus tale, non habet essentiam, sed generationem: Propterea etiam causa, a qua producit, non habet essentiam, sed motum. Itaque si v.g. calculus extendit vasa urinaria, aut erodit, laedit actionem, sed cum motu, vocatur tunc causa: si obstruat meatum urinarium, huiusmodi impedimentum non fit per motum, vel transmutationem, sed per simplicem emanationem: quia cum primum calculus impedit viam urinae, statim etiam urina supprimitur. In hoc sensu Gale. docet quidem esse morbum, non quatenus dolorem inferat.

Differentia.

EX dictis patent differentiae doloris. A forma: Alius est intensior, alius remissior. A subiecto: Alius est externus, alius internus: Internus, qui affligit partes vel omnes, vel plerasque oblidet, vel alterutram tantum id est vel dexteram, vel sinistram, qui speciale nomen sortitus hemicrania vocatur.

C A causis; Nam alius a causis, quae facile remoueri possunt, ortum trahit, estque curata facilius, alius chronicus vel diuturnus, qui Cephalga dicitur; isque vicissim aut omnino non admittit curationem, quando scilicet producit ab ipso statim ortu contractus, aut difficulter. Deinde alius est essentialis, alius per consensum, alius partim essentialis, partim per sympathiam. Tertio calidum hunc nuacupamus; illum frigidum; sic cum hunc, humidum istum, respectu, scilicet causarum effectricium: Sic alius est acris, erodens, mordens, punctionis a bile, s. sanguine feruidiore, pituita salsa, vapore acri, biliolo, qualitate maligna &c, alius grauans, distendens a vapore flatu lento, a copia humorum vel omnium, vel alicuius tantum, alius pulsantis a spiritu, & sanguine tenuiore arteriarum, vel quantitate, vel qualitate naturae limites excedente.

Signa.

Versabor hodie (Auditores) in proponendis signis diagnosticiis, distinctiuis, ac prognosticis dolorum capitis, quae accipiam partim ex Gal. 2. de cop. l. 1. 2. 3. partim 3. loc. aff. 9. partim 1. ad Glau. 1. 5. Auicem. quae Gal. sparsim tradiderat, omnia in vnum collegit prima 3. tr. 2. c. 7. Et quia ut Gale. docet 2. de comp. loc. c. 1. Locorum distinctio est valde difficilis a signis loci affecti distinctiuis exordiemur: deinde ad signa causarum transibimus; mox loquemur de prognosticis. Ecce quia Locus affectus vel est internus vel externus externum locum affectum esse cognoscemus, si capilli agitati doleant, si cutis pressa digitis dolorem exciet, si in hac appareat: Quamquam superficialis dolor non est usque adeo superficialis; fortius tamen compressione facile deprehenditur, & dolor pericranei ad oculum pertingit ratione coniuncti, quae a pericranio producit.

Si dolor fuerit internus, erit magis profundus & ut Gal. ait, pertinget ad oculorum radices. Proprie scribit Gal. ad radices, quasi dicat ad rhagoidem tunicam, ad corneam, ad araneam, ad nervum

opacitum, quæ omnia ex internis partibus producuntur, ad differentiam coniunctiua, quæ à pericranio producitur. Verum quia dolorum internorum alii sunt per consensum, alii essentialis: & in illis, qui sunt per consensum, secundum Galenum non adhibeantur remedia capitis, idcirco nostrum erit distinguere essentialis dolores à secundariis, seu iis, qui sunt per consensum.

Signa doloris per consensum. Qui igitur per consensum sunt, habent inter alia per consensum non solum modo horarum, sed dierum, & mensium, in quibus non modo caput dolore vacat, sed etiam ab omni alia labe: sublato enim dolore, nihil superest mali. Accedit quod in doloribus per consensum, semper aderunt signa, & partis & causæ consentientis.

Nam si fuerit ventriculus, aderit nausea, sitis, inappetentia, singultus, vitiosa concoctio, frequens eructatio, vomitus, quamquam vomitus, ut Aui-cenna; loc. cit. ostendit, fieri etiam possit à dolore caput essentialiter afficiente; membranis enim cerebri affectis, os ventriculi facile in consensum trahitur; unde & vomitus, & alia id genus symptomata succedunt.

Distinguetis hæc symptomata fieri primario ex ventriculo ab illis, quæ sunt ex capite, quia ubi affectio primaria est in ventriculo, nausea, & vomitus, & alia iam dicta præcedunt ipsam cephalalgiam: ubi affectio est essentialis in capite, dolor capitis præcedit vomitum, nauseam, & cetera ad ventriculum spectantia: Si dolor per consensum fiat à cruditate ventriculi, exacerbatur post cibum: Si ex affluxu bilis in ventriculum, post inediam exacerbatur, & recrudescit.

Quando consensus fit ex lecore, dextra petifissimum pars infestatur. Si ex Liene, sinistra. Si ex Renibus, dolet occipet.

Si ex utero, Hipp. 1. in 6. Epid. 2. scribit, dolere sinaput, nihilominus tamen experientia comprobavit, in mulieribus ex utero laborantibus varios esse capitis locos dolentes, prout affectio uteri fuerit vel anterior vel posterior.

Si fiat dolor ex vniuerso corpore, ut in febribus contingit, augetur, & diminuitur dolor pro incremento, & decremento febris. Quod si fiat ex suppressis excretionibus, aut antiquis morbis cutaneis abique causa sublatis, id ex relatione facile potestis comparare. Hæc de causis per consensum.

per essentialiam. Quod si dolor est essentialis, aut est continuus aut saltem dum intermitit, ex leui quacunque causa reuertitur, neque hoc tantum symptoma caput affligit, sed alia plurima: Nam aliquando tinnitus aurium, aut furditas adest, aut vitium in olfactu, vel in visuali sensuum organo, aut aliis deinceps in actionibus ad motum, vel ad principes facultates spectantibus concurrat.

Oportet etiam distinguere singulares locos, quamuis hæc distinctio non multum iuuat curationem: Nam si nervus afficiatur, dolor aderit convulsorius, vel stupor, vel torpor, aut sublata actione partis, quæ sensum ex illo nervo suscipit, & motum; Si dolor in membranis, est punctorius, & extensivus, si in carne, grauius, si in venis & arteriis, videtur quasi cingulum totum caput circumdare, & fluctuat hic dolor, moue-

turque velut vnda, modo accedens, modo recedens. Hæc de loco.

Quod ad causas spectat, si fuerint extrinsecæ, ex agri relatione innotescere possunt: Illos interrogabitis utrum ex insolatione, & ex aere frigido an ex ebrietate, ex odore alii, an alijs odoribus, aut causis in dolorem inciderint, præterquam quod si Calor fuerit doloris causa, cutem etiam calidam relinquit, cum rubore, maxime circa oculos, frigus pariter frigidi tatem relinquit.

Vapores, autem, siue odores, siue grati, siue avapominabiles & fatidi, extensionem potius quamdam reperiunt, & ideo dolor extensivus absque gravitate, signum est doloris facti vel ex vapore, vel ex flatu, præcipue autem si dolor sit mobilis, facile accedat, & recedat, &c.

Si materia fuerit corpulenta, omnis quidē gravitatis sensum infert, hæc tamē magis, illa minus pro copia, & qualitate. Nam sanguinea materia gravitatem facit, & dolorem grauium cum rubore, calore, extensione venarum, cum propensione ad somnum: Somnia autem plena sunt spectris, ac imaginibus, & quæ versantur circa sanguinem, quæ expernuntur à partibus cruenta sunt, & his omnibus consentit temperamentum, vitæ ratio, suppressæ sanguinis euacuationes, quæ hanc ipsam causam ostendunt.

Si bilis doloris causæ existit erit mordacior cum calore acri, colore citrino vigiliis, deliriis, propensione ad iram, cum pruritu narium, inappetentia, oris amaritudine, accedente, & ætate iuuenili vitæ ratione temperamento bilioso, anni tempore.

Dolor à pituita ostendit insignis gravitas capitis, color pallidus, somni profundi, purgatio per nares copiosa partim aqua, partim mucis crassioris, frequens spuitio, sensum omnium hebetudo, segnitudo, quibus ad proportionem respondebit ætas, temperamentum, vitæ ratio, anni tempus, &c.

Denique melancholiam cognoscimus ex dolore grauium cum colore faciei liuido, plumbeo, sine somno, cum tinuitu, aut id imaginationibus melancholicis, siquæ hic dolor plerumque aut post sublatus sine causa canceri, aut lepræ, aut scabiem sedam, vel lichenes, vel hæmorrhoides suppressas, aliave vlcera, & cauteria istum humorem expurgantia.

Absoluta tractatu de signis inceptum, ad indicationes deinde me convertem; denique ad curationem.

Ex causis autem immediatis dux adhuc supersunt, quatuor signa sunt inquirenda, Vermis & Lapis.

Vermium quidem signa accuratè proponuntur ab Anton. Beniuen. de adm. c. 100. Sunt autem vertigo, delirium, vigilia, pruritus nasi, quandoque convulsio, atque extremorum refrigeratio.

Lapidis signa valde obscura sunt, sic tamen poterunt apprehendi; Si dolor sit fixus, non acutus sine febre, cum capitis gravitate, cum sopore, imò verò cum detentione principum facultatum, quæ earum æmulatur, seu coma soporiferum.

Mediatae causas quoadmodum fuerint sensibus conspicue, non est opus signis distinguere: Talis autem est capitis magnitudo, parvitas, vitiosa figura. Defectum futurarum poteritis cognoscere ex defectu sordium, ex capillis paucis, brevibus, tenuibus, raris, & mollibus. Dicebat. Gal. 9. de v. par. c. 1, suturas

futuras ideo fuisse constructas, ut crasso, & fuligine nolo excremento viam præberent; Vbi autem desunt futuræ, non expurgatur hoc excrementum, quod alioqui est pili materia, &c.

Signa intemperaturarum cerebri siue sint naturales, siue præter naturam, nunc non proponemus, quia partim colliguntur ex iis, quæ de materia aut calida aut frigida dicta sunt, partim vobis et comparari poterunt ab Excellentissimis Theoricis ordinariis, qui hoc anno legunt artē Medicā.

Neque, hoc in loco proponemus signa Tumorū: Nam suo loco erit sermo de phrenitide, de Comate, & Lethargo, tunc autem proponentur signa tumorum.

Caries ossis.

Quod pertinet ad Carie ossis, ea primo cognoscitur, si præcesserit contusio perpetua curata, in qua scilicet curis non fuerit incisa, sed sanies in loco contuso fuerit relicta: Item si præcesserit, & adsit Lues Venerea antiqua, si in parte aliqua dolor, adsit cum tumore molli, cum colore partis livido, si sub digitis inæqualitas, vel asperitas appareat, certius erit corruptionis ossis argumentum.

Prognostica.

Venio ad prognostica, quæ aut significant futurum dolorem, aut longitudinem, & brevitatem, aut mortem, seu insigne periculum, aut salutem, & facilem exitum: Ex significantibus futurum dolorem primum quidem est temporis constitutio. Dicebat Hipp. 3. aph. 13, In æstate admodum feruida, autumno aut pluuioso, hyeme dolores capitis expectandos. Idem. 4. aph. 7. de vrinis sub iugilibus, inquit, quibus vrinx, quales iumentorum &c.

Quod ad Longitudinem & Breuitatem spectat, certum est omnes dolores, qui ex humoribus frigidis nascuntur, ex inflammationibus induratis, ex abscessibus, ex lapide, ex carie ossis, naturalibus capitis affectionibus, ex confirmatis; denique partium intemperantis sanatu difficiles, ac contumaces esse; Ceteros autem breuiiores, &c.

Quod pertinet ad periculum, tamen si Gal. 2. de comp. per. loc. c. 1. scripserit ex dolore capitis neminem unquam interisse, hæc tamē sententia sano modo est intelligenda, de doloribus scilicet simplicibus, nulli prauo symptomati, nulli periculoso morbo commistis: Nam vbi dolor ex aliqua graui affectione cerebri, & praua ortum duxerit, praua alia symptomata, vel mortem quoque minatur. Propterea Gal. 3. progn. 13. illos scribit auris dolores periculosos esse, qui ex cerebro, & neruo auditorio ortum ducunt; Isti enim interficiunt. Et propterea tremini, me aliquando vidisse Reuerendū

Hist. dolorū capitis lethalium.

P. Grucigerorum, cui post vehementem capitis dolorem momento temporis ambo oculi ex orbita exiere, qui paulo post interfectus est. Alium quoque vidi puerum, cui post contusionem ex lapide factam, neque curatam, dolor successit 6. mensium cum febre continua, qui tandem illum exstinxit. Casus fuit rarissimus in cœnobio S. Iustine monachi cuiusdam, qui annos plus, quam 12. dolore intolerabili vexatus tandem in paralyfin, & coma incidens, pariter exstinctus est. Idcirco dicebat Hipp. 6. aph. 13. eos, qui sani sunt, si repente

A in capitis dolorem incidant, & muti fiant, ante septimam interire, nisi febris superueniat. Itaque cum ij omnes sint dolores perniciosi, contra salutares sunt illi, qui crisin futuram significant, atque ideo tanquam viles & salutares nullis auxiliis sunt tractandi: Alioquin si curentur, futura ipsa crisis impeditur, &c.

Questionis explicatio.

Quod si queratis: Quanam ratione dolor hic criticus à symptomatico distinguatur? Modum distinguendi potestis colligere ex Galeno ad Glauc. 15. primum quidem, si dolor debeat esse Criticus, oportet, ut fiat in morbo sua natura calido, magno, & velocis motus: Crises enim non sunt in morbis frigidis, neque paruis, aut tardi motus. Secundo oportet, ut hic morbus habeat signa benignitatis, & salutis: Malignus enim morbus, & qui ad perniciem tendit, non potest habere dolorem capitis Criticum. Tertia conditio, ut fiat cum signis concoctionis. Quarta, & vltima ut vel appareat, vel exacerbetur in die critico. Sic dicebat Hipp. 3. illo progn. 3. 1. dolorem capitis prima die apparentem in quarta augeri, in septima solui: Quod si appareat in tertia die, in septima augetur, in nona sit solutio: si appareat in quinta die, erit signum crisis futuræ in quarta.

Alia Questio.

Vtrum autem Crisis sit futura per fluxum sanguinis narium, an per vomitum, abunde docuit Hip. 3. progn. 32. 33. & Gal. 1. ad Glauc. 15.

Signum quoque crisis bonæ est excretio aliqua facta ex capitis partibus cum iuuamento. Propterea scribit Hipp. 6. aph. 10. Caput dolenti aut circum dolenti, si sanies, &c.

Indicationes.

Transseo modo ad Indicationes: Quæ parim sumuntur ab ipso dolore, partim a causis. A Doloris quidem. Nam cum tristis sit sensatio, requirit auxilia, quæ tristitiam auferant: Nō potest auferri tristitia permanente obiecto tristi, ac sensu rion sentiendi facultate prædito. Idcirco necessarium est ut medicamentis sensum stupefacientibus. Et hæc sunt propria doloris, ut est tristis sensatio: A causa vero multiplex desumitur indicatio: Vna quidem à causa proxima, quæ est solutio continuitatis, & hæc requirit medicamenta anodyna, quæ cum sint humida, & èplastica, crassioris substantiæ, implent poros, & meatus, adæquāt omnes humores, ut propterea motum illum violentum, qui solutio continui dicitur, impediunt. A causis verò remotis variæ sumuntur indicationes. Nam si materia fuerit vaporosa, vel flatulenta, hanc prout est iam in capite, oportet digerere, si fluat, illā oportet reprimere, & reuellere: Si generetur in capite, oportet occurrere causis generantibus, euacuando scilicet minieram flatum, & vaporem, & corrigendo intemperiem, à qua status generatur. Quod si fuerit humor, & peccet multitudine, est euacuandus: si mordacitate, & acrimonia, contemperandus, si motu pariter repellendus, & reuellendus. Morbi autem, à quibus huiusmodi causæ generantur & augentur, similiter habent proprias suas indicationes, de quibus suo loco.

Curatio doloris capitis à causis externis.

PAUCIS perstringam dolorem capitis à causis externis excitatum, plura dicturus de curatione eiusdē in causis internis versante. Et quia ex causis externis tres sunt præcipue. Calor, frigiditas, & ebrietas, de his tantum tria verba faciam. Quia verò cum dicimus, curandam esse causam externam, intelligimus intemperiem in externis capitis partibus inductam absq; vlla materia, idcirco solis alterantibus, curatur.

Calor, seu calida intemperies quidem aut per fusione olei rosacei misti cum aceto, aut lotione capitis ex aqua frigida, præcipue æstiuo tempore, aut succo portulacæ, vel polygoni, vel rosarum, mistis cum aq. rosac. & pro penetratione cum aliqua portione succi aut limonum, aut citrangelorum, vel acetii. Pars tamen capitis posterior minus est refrigeranda duplicem ob causam à Galeno allatam, 2. de comp. per loc. c. 1. quia scilicet hæc pars tanquam durior minus patitur exustionem à causa calida, quàm faciat anterior: Secundo quia cum sit principium neruorum spinalis medulla, ea nimium refrigerata, stuporis, & paralytis imminet periculum.

Quod si dolor fiat à Refrigeratione, curabitur oleo rutacco, lilior. albor. chamomel. aut fomentis factis ex decocto saluiz, maioranæ, stæchados, zurz, chamom. aut emplastro adhibito ex fatina stænuigræci, seminum lini, excepta prædictis oleis aut decoctis.

Si fuerit sicca intemperies, humectantia conuenient, oleum vicl. mucilago semin. malu. vel althea oleo commista, lac ipsum, ius castrati.

Quod si fuerit dolor ex ebrietate, curatio à Vomitu auspicienda est: Si vomitus non succedat, Purgatione vtendum, aut Clystere acris reuellendi etiam sunt vapores non tantum frictionibus, ligaturis, cucurbitulis, verum etiam in maxima corporis plenitudine secta vena.

Repellendi sunt vapores ab initio oleis, & succis frigidis, de quibus supra.

Post initium roborandus ventriculus, reprimendi vapores à ventriculo ad caput ascendentes, & discutiendi, qui capite continentur.

Ad roborandum ventriculū faciet potio ex ab synthio, coma absynthij infusa in aqua, vt saccharo rosac. cum speciebus triumphantal. Post cibum conueniunt fructus adstrictorij, vt pyra, citonia, mespila, & in ipsomet cibo brassica, & lens: Sit tamen cibus tenuis, abstineant a vino: Dent corpus quieti, & somno: & post hæc si dolor adhuc permanferit, discussorij vtantur, leui capitis frictione, pectione, lotione ex decocto hederæ, chamomeli sisimbriæ, aliorumq; id genus.

Curatio doloris capitis à causis internis.

Sed iam veniamus ad causas internas. Quæ cum sint & per essentiam, & per consensum, expediemus primo illas, quæ sunt per consensum: In his tractandis opus est reuulsionem, deriuationem euacuationem, ac medicamentis corrigentibus vitia parui mientis, atq; et ipsius capitis suscipientis.

Ad reuulsionem, vt antea dixi, faciunt Clysteres, qui si fuerint acres, in doloribus per consensum à Ventrículo, & lecore factis summopere prosunt. Scribit enim Gal. 2. de comp. per loc. c. 1. acres Clysteres non modo ab intestinis, sed & à mensenterio, & sima iecoris parte trahere. Ceteræ etiam reuulsionem, siue sint frictiones, siue balnea aque calidæ pedibus adhibita, aut cucurbitulæ, aut scarificationes, vt Gal. lib. de scarificatione, moderatos, dolores sanasset. Hæc omnia profunt. Non postulat hic locus curationem omnium affectuum, qui male habent suas partes affectas.

Hoc tantum moneo in doloribus, qui sunt per consensum à ventriculo crassis humoribus repleto conuenire inedia, & frequentes quasdam euacuationes, quæ fiant per pilulas stomachicas vocatas, siue sint mastichinæ, siue alephanginæ vocatæ, siue de hiera cum agarico, quarum pilul. dr. j. exhiberi possunt hora vna ante cœnam.

Vbi autem dolor, qui fit ex Ventrículo, ortum ducat ex humoribus biliosis, inedia non conuenit. Propterea iure Gale, in Archigenem inuehitur, qui in discriminatim in doloribus capitis per consensum à ventriculo inedia imperabat. In his tamen casibus ego felicissime vii soleo cassia admitti cum pulpa thamarind. hora j. post cœnam, & præbeo semi vnciam cassiæ, & drachmam vnam. vel duas pulp. thamarin. Est materia auxiliij, quæ ego felicissimè in his casibus vtor.

Interim reprimendi sunt Vapores, aut refrigerantibus iam propositis, si materia sit calida, aut mistis cum calido aliquo medicamēto, vt hederæ, & sisimbriæ, aut chamemelo, præcipue verò in corporibus mollioribus, vt puerorum, mulierum, eunuchorum, quorum corpora nunquam impense sunt refrigeranda.

Si autem materia per essentiam peccauerit, primum considerare oportet. Virum fuerit sanguis, an alia materia à sanguine diuersa.

Nam si fuerit sanguis, ante omnia secunda est vena, neque in plethoricis semel tantum, sed bis ex utroque cubito. Quantitas vero respondeat ætati, temperamento, & ceteris conditionibus. Et si plethora ex suppressis mensibus, aut hæmorrhoidibus ortum duxerit, aperiantur hæmorrhoides, secantur venæ inferiores admoueantur imbecillioribus cucurbitulæ scarificatæ: Et factis euacuationibus, ac reuulsionibus sanguis etiā ex aliqua capitis parte euacuetur, aut apertis venis narium seris equinis, aut scalpello, non tamen hirudinibus. Mitti etiam potest sanguis secta frontis vena, præcipue si posterior doleat pars: sic scribit Hippocrat. 5. aphorism. 68. Dolente parte capitis posteriore, in fronte secta vena, &c.

Si anterior pars doleat, nihil melius cucurbita magna scarificata occipiti adhibita.

Dolentibus secundum dextram, vel sinistram partem cōferunt hirudines, appositæ gratia reuulsionis venis temporum partis oppositæ: Sed aliquando etiam vtiliter adhibentur parti dolenti.

Cum dolor sit ex sanguine in arterijs contento nihil melius est sectione arteriarum: Quando tamen repleat sint arteriæ externæ: Nam si fuerint internæ, sectio nihil prodest, vt Gal. ait. 3. de loc. aff. cap. 8.

affica. 8. Ceterum hæc operatio cum duobus modis fiat, auctore Gal. 1. 3. meth. vlt. aut quia ipsa arteria secetur tota per transuersum, quando scilicet fuerit maior, aut quando frustulum ipsius arterie integrum abscindatur: Vtraque operatio potest iuuari; sed nostris temporibus non administratur. Idcirco ad alia confugiemus auxilia, de quibus suis locis, &c.

Quod si materia fuerit pituitosa absque sanguinis mixture nulla sanguinis missio conuenit neque Rhases huius meminit, neque Gal. Sed quia potest quidem cum materia frigida ratione doloris attrahi etiam sanguis: propterea si corpus vobis videatur plethoricum, etiam si plethora sit spuria, aut secetis venam, aut cucurbitulam adhibeatis: In principio quidem partibus infernis, perseverante dolore etiam scapulis, & occipiti: Materiam vero pituitosam purgabitur, quando dolor urgeat, pilulis cochis à Rase descriptis. Dosis erit à drachm. j. ad drach. ij. habita ratione roboris virium, & annexorum, &c.

Neque vos perturbet quorundam opinio Recentiorum, qui preparantia, & lenientia purgantibus anteponunt. Nam tamen in febribus, & in dolore non admodum intenso, Ego quoque hoc consula; nihilominus in materia hac frigida quam supponimus esse sine febre, & dolor urgeat, non est opus preparatione. Et sanè si Gale. 2. de comp. loc. cap. 1. in materia biliosa videtur statim pilulis purgantibus ex aloë, & scammonio, cum tamen biliosus humor lenientibus cedat multo facilius quam frigidus, licebit etiam in frigida materia statim ab initio vii pilulis purgantibus.

Si tamen dolor det inducias utamini hoc leniente:

Recipe Mell. ros. sol. vnc. iij.

Mann. elect. vnc. ij.

Aq. beton. q. s. M. & f. pot.

Si voluerint bolum.

Recipe Elect. lenit. vnc. i.

Mann. elect. drach. iij.

Spec. hier. drach. ij.

M. & sine sacc. & bol.

Deinde sic preparabis humores.

Recipe Oxytel. simp.

Syrup. de beton. an. drach. vi.

Decoct. beton.

Starchad.

Maiores. vnc. iij. M. p. syr.

Deinde purgabitur pilulis cochis, ut dictum est, si biliosus succus dolorem inferat absque febre, atque admodum urgeat, statim poterit his pilulis purgari.

Recipe pilul. aur. drach. i.

de trib. cum rhubarb. drach. sem.

Cum aqu. endiu. f. pilule de aureat.

Si dolor non urgeat, satius erit vii primum Leniente, ac Preparantibus, mox Purgantibus.

Leniens in bolo sit talis:

Recipe Flor. cass. nou. extr. drach. x.

pulp. thamar. drach. iij.

M. & cum sacc. f. bol.

In potione

Recipe Syr. ros. sol. vnc. iij.

Decoct. Endiu.

Cichor.

cum drach. ij. pulp. thamar. q. s.

M. & fiat pot.

Prior accipiatur secunda hora ante cibum, & secunda quatuor horis.

Preparatio sic fiet:

Recipe Syrup. viol. simpl.

de cichor. simp. an. drach. vij.

(Et si materia fluat ex iccore, poterit etiam imponere syrup. de granat. semi vnc. aut de ribes aut de agresta.)

Decoct. endiu. cichor.

sonch. vnc. ij.

M. pro syrup.

Purgatio fiet, ut dixi, per pilulas iam propositas. In materia melancholica quando ipsa quoque urgeat, statim ab initio præbebitur

pil. cochiar. cum elleb. drach. i.

pil. de fum. terr. drach. sem.

Vbi det inducias, Leniatur alius hunc in modum.

Recipe Syr. de polypo. vnc. vi.

Decoct. cord. q. s.

M. & f. pot.

Si voluerint bolum.

Recipe Elec. lenit. drach. x.

Spec. hier. drach. ij.

M. & cum succ. f. bol.

Preparentur humores hoc syrupo.

Recipe Syrup. de pom. simp.

de fumo ter. simp.

de succ. borrag. an. vnc. sem.

Decoct. fumar.

borrag.

bugloss.

meliss.

Cortic. citr. vnc. iij.

M. pro syrup.

Purgatio fiet per pilul. iam propositas.

Facta vniuersali corporis purgatione Caput quoque sigillatim est expurgandum: Et quia Evacuatio potest fieri aut medicamentis, aut auxilijs chirurgicis; Quod pertinet ad medicamenta, dicebat Gal. 1. (8.) simp. 5. quod etiam repetit. 1. 3. meth. cap. 8. & 9. omne quod est impletum, euacuat; aut frigidis, ut quæ repellunt humorem ad alias partes, aut calidis, quæ eundem discutunt, aut siccis, quæ ipsum absument; & hæc in capite locum habent, & propterea tamen materia per essentiam peccet in capite, cum tamen possit subministrari a partibus infernis, idcirco frigidis utendum, ut repellatur ad inferiores partes. Hæc vero frigida & repellentia non sunt administranda, vbi caput valde fuerit repletum, neque vbi fauces, aut thoracis parte fuerint debiles; Nam præcipue descendet materia in hæc loca, & anginam, aut pleuritidē, vel alium similem affectum excitaret; Ideo præmittenda est proposita vniuersi corporis purgatio, & evacuatio, deinde vero seruatis legibus propositis, Reprimenda adhibeantur; quæ cum possint esse aut succi, aut decocta, aquæ, vel olea, monet

Auicenna.

Auicenna: prima 3. tr. 2. c. 10. ne in dolore capitis A cum destillatione olea capiti adinoveantur: nam destillationem augent.

Illud etiam animaduertendū, nō debere hęc medicamenta repellentia sincere administrari, neq; actu frigida, quia etiam si foueatur materia a partibus infernis, abundat tamē etiam in capite. Itaq; tepida sunt administranda, & quibusdam discussorijs admittā, E.g. si vtamini decocto, potestis accipere chamomelum, plantaginē, rosas, si succis, accipietis aut succum rosarum mistum cum succo aut hederæ, aut pulegij: si aquis.

Recipe aqu. plantag. aneth. chamomeli.

Post reprimētia conueniunt ea, quæ tanquā calida vim habēt digerendi: Hæc verō sunt in duplici differentia: Quædam sunt calida, & humida: Quædam calida, & siccā, acia, & tenium partium, quæ in profundas partes corporis penetrāt, & propterea *μετασυκρυστα*, id est, ex alto trahētia vocantur: Primum genus medicamentorum in omni materia siue calida siue frigida, nemine dissentiente administrantur, dummodo materia sit fluxa, non autem amplius confluat.

Præceptum est commune dicebat Galen. 2. ad Glauc. 2 & 2. de comp. loc. 1. 2. & 13. meth. c. 8. & 9. materiā etiam calidā inflammationis, vbi iam est fluxa, calidis, & digerentibus esse tractandā: Propter hāc causā Gal. in materia etiam calida vtitur discussorijs: decocto chamomel. si symbr. pulegij, vt potestis legere & primo ad Glauc. 17. & secundo de comp. loc. 1. 1. & 3. cap.

Sed de medicamentis acris alia videtur ratio: Nam Gal. in illo secundo de comp. loc. 1. 2. & 3. verba faciens de medicamentis istis metasyncreticis ex alto trahentibus, inquit, fuisse antiquorum institutum indifferenter illis vti, se tamē non admittere eorum vsu in intemperie calida: neq; materia calida, & propterea concors sibi ipsi 6. de men. val. c. 9. & 13. meth. c. vii. scribit in capite calido medicamentum ex thapsia, & fimo columbino minimē conuenire

Ceterum tamen si Galenus tam aperte profiteatur hæc medicamenta in calido capite & calida materia non conuenire: aut tamen seruatis quibusdam conditionibus, puto hæc tuto administrari posse, quod etiam comprobati experientia.

Prima regula est, vt humor sit calidus, sed in capite existat potius per affluxum, quā genitus ibi propter intemperiem capitis calidam.

Secunda regula est, vt humor iam fluxus non sit amplius in fluxione.

Tertia, vt sit in partibus capitis profundis infra cranium.

Quarta, vt iam in capite sit confirmatus, neq; aliis cesserit remedijs.

His seruatis, puto Galenū quoq; facillē admittiturum acia hæc remedia capiti adhibita. Siquidem ipse Calenus in phrenitide, vbi iam est fluxa materia, vtitur illis ipsis calidis, & acris remedijs, quibus etiam vtitur in Lethargo 13. meth. 21. Nam ait hos lethargicos & phreniticos, in eandē venite curationem per acia. Idem Gal. vi dixi, inquit in omni inflammatione, vbi materia iam est fluxa, & 2. ad Glauc. 2. & 13. meth. cap. 8. &

9. vtitur calidis auxilijs materiā ibi contentam dissipantibus; ideo libro artis med. cap. 85. (95.) scribit Galenus hæc medicamenta acia, & quæ ex alto materiā educunt, non tantū conuenire, quando materia sit frigida, sed quando fuerit in locis profundis extra vasa, ita vt alia ratione comodē non possit purgari. Hoc voluit Gal. etiā materiā inflammationis, quæ iam est extra venas, posse calidis, & acris medicamentis purgari: Et propterea ipse quoque c. 13. & 14. meth. vtitur hoc medicamento ex Thapsia, & sinapi, & fimo columbino in capite calido cum destillatione salsa, acris & calida. Ceterū qui vul plura, legat librum nostrum primum de Phrenigm. Itaq; hæc medicamenta acia, his seruatis legibus, possunt administrari aut post aures, qui locus omnium est conuenientissimus, aut abrasis capillis in synipite, aut in quacunq; parte magis dolente hæc remedia multum profunt.

Quod si caput labore intemperie calida, saltē deriuationis gratia adhibebitis hæc medicamenta ceruici, & scapulis; Hoc modo sustuli Ego dolores antiquissimos.

Dantur quoq; Purgantia caput per os & nates, & per os sunt Gargarismata, Masticatoria, Illitiones palati, & calida medicamenta in ore detenta.

Gargarismata componuntur pro frigidis humoribus hunc in modum.

Recipe decoct. puleg.

Stachad.

Maianan.

Salvia

Rorismar. vnc. viij.

Oxymel. scil. vnc. ij. M.

In materia calidiore

Recipe decoct. herd. Malu.

Passul. Caris. vnc. viij.

Cum syr. acet. simp. vnc. ij. f. garg.

Masticatoria sunt aut ex simplici materiā, vt est Charta, Mastix, Cera flaua, aut ex calidioribus, vt

Recipe Staphidis agria gr. v.

Cubeb. drach. sem.

Cera flau. drach. i.

Mastic drach. ij.

Zuccar. par. M.

Sed quia masticatoria plerūq; administrari non possunt propter vitia dentium, vel propter affectus faucium & thoracis, in his casibus loco masticatorij vtamini illitionibus palati, aut medicamentis acris ore detentis

Illitio palati.

Recipe Theria. aut. Mithrid. drach. i.

Oxymel. scil. parum.

Deinde illinatur penna hoc medicamento & ore aperto tangantur partes superiores palati capite inclinato.

Sic optime purgatur caput, neq; periculum fluxionis thoraci imminet.

In ore detinentur medicamenta, quæ idē faciunt, aut radix pyrethri, aut acori, aut galangæ, aut zedoariæ. Possunt & fieri pulueres, & ligari in syndone rara, & confici globuli, qui in ore detenti caput expurgant.

Recipe

Recipe Sinap.

Piper.

Pyreth.

Galang.

Acori an drach.i.

Puluer. M. & f. Globuli.

Et si masticoria ad purgandam pituitam sint inuenta, attamen pro bile crassiore expurganda leuiora quidam masticatoria componuntur ex cera, rhabarbato puluerizato, passulis contusis, & caricis.

Ceterum vterq; humor per nates commodè purgari potest: & purgatio sit aut succis, vel aquis vel pulueribus, vel radicibus, & herbis, vel formulis quibusdam in modum suppositorij.

Succi purgantes per nates in materia calida e-runt succus malux, succus betæ, in qua etiam causa continet aqua hordei mista cum melle, vel saccharo, lac ipsum, cui admisceantur gr.v. aut vi. diatridij.

In pituitoso humore conuenit succus cucumeris syluestris, maiorana beton. puleg. Ex his possunt etiam fieri decoctiones in nates attrahende.

Valent quoque radices, præcipue verò radix cyclaminis recens incisa, & naribus imposita.

Tabacus etiam, siue herba regina ad purgandum caput summopere valet, siue folia, siue succus admoueantur.

Ex pulueribus præcipui sunt puluis nigellæ, piperis, pyrethij, sinap: elleb. nigri. Et si quispiam voluerit fortius medicamentum, hos infundat pulueres in aq. vitæ, siccatos deinde, & pulueriz. in nates infundat. Isti pulueres oxymelite excepti, aut cera subacti in forma pessarij naribus indantur: Purgant enim hæc omnia egregiè caput.

Tria tamen circa hæc remedia sunt obseruanda: Primum, ne oculi insigniter laborent. Alterum ne vlcus, aut tumor nates, siue alias nasi partes occupet. Tertium, vt post vsum calidorum aliqua temperata in nates trahantur, siue sit lac, siue aqua hordei, aut quid simile &c. Hæc igitur conueniunt siue pituita, aut melancholia, aut biliosus succus caput impleat. Nam vbi sanguis abundat, caput validis nasariis non est concutiendum: Periculum enim apoplexiæ imminet. Sed quia scio aliquos cupere descriptionem nostræ aquæ ad purgandum caput per nates confectæ, idcirco huius descriptionem subiiciam.

Recipe rad. ciclam. P. i.

Tabac.

Elleb. nig.

Nigell. an. M. j.

Pulp. Colocynth. vnc. sem.

Sinap.

Piper.

Pyreth. an. drach. ij.

Bulliant in lq. aq. vsq; ad consumpt. mediet. & si expressio.

Attrahitur drach. i. vel drach. ii. huius aquæ impositæ aut in aliquo infundibulo stanneo, vel æneo, aut in vola manus. Et hæcenus de purgantibus caput, quæ pertinent ad fontem pharmaceu-ticum.

Sunt modo & Chirurgica in doloribus anti-

A quis vt Cephalæa, & Hemicrania, minimè prætermittenda. Et primum Cauteria: De his diu dubitatum est: An conueniant capiti affixa, nec ne: Quidam enim à Medicis præfidijs prorsus reieciunt, qui dicunt hæc neque in causa calida, neq; in frigida, nec in occipite, nec in sincipite conuenire.

Non in calida dicunt, quia calidior exustione reddetur: Non in frigida quia frigida materia tanquam grauis petit deorsum, tanquam crassa, & viscida tenues suturas non permeabit.

Non in occipite: quia est principium spinalis medullæ: Tracti vero humores in hanc partem paralytici faciunt: Addunt rationem, de qua dixi in supertot. b. ex Galeno 2. comp. loc. 1. quod scilicet occiput sit pars, quæ vltionem non patitur.

Non in sincipite: quia ex Hipp. inquit lib. de vulnerib. capitis c. 1. omnia vulnera, quæ vsq; ad os perungunt, lethalia sunt. Hæc vero cauteria eo redduntur periculosiora, quò sunt super suturis, quæ in parte pericranium per suspensoria preest suam communicare affectionem internis membranis.

His tamen non obstantibus, Consulo, in doloribus antiquis cauteria omnino esse insignenda vel occipiti, vel sincipiti. Et sane magnus Hipp. quarto de morbo non vnicum in his casibus infixit cauterium, sed octo, duo in occipite, duo in sincipite, duo circa tempora, & duo circa angulos oculorum: Neq; vllus est ex Græcis, qui hæc remedia non proponat, neq; ex Arabibus.

Ad rationes: Trahitur materia ad spinalem medullam, falsa consequentia: Cauterium est extra os, & trahit humorem ad seipsum: Medulla est intra os. Igitur potius deriuabit à medulla, quàm attrahat ad medullam.

Ad Gal. locum nihil dico: quia in superioribus hoc ostendi (responsum est)

Ad obiectiones de sincipite dico, Hipp. sententiam fuisse, vulnera capitis non modo ad os vsq; sed etiam magis superficialia periculosa esse non ex propria natura, sed ex imperitia tractantis. Neque valet, posse communicari affectionem membranis: Nam si pericranium inflammaretur, posset sanè aliquid internis communicari membranis, sed prudens Medicus non permittet locum inflammari.

Et ideo cū subiungunt, non conuenire in materia calida: Dico vim Cauterij esse vsq; adeo breuem, vt internos humores non possit vterius calafacere. Eo minus calafaciet, si quispiam circūstantes partes refrigerantibus inuina linteis impositis aceto, oleo rosæ, succo lactucæ, aut solatri imbutis, quod ipsum ad maiorem cautelam fieri poterit triduo, & quatrduo post ipsam vltionem.

Quod etiam dicunt, frigidos humores tanquàm crassos, & graues non posse purgari, ridiculum est. Non enim sunt isti humores in corpore exanimi sed in corpore viuente, cuius facultates, & calor natus perpetuò agit in materiam, & illa etiam si crassam attenuat, & in vapores digerit, vt cū viæ pateant, crassis etiam humoribus, sed attenuatis, transitus sit facilis. Conueniunt igitur Cauteria.

Neq; minus conueniunt Cucurbitulæ scarificatæ aut occipiti, aut sincipiti appositæ: Laudan-

Cauteria

Cucurbitula.

tur tamen magis in sintipire, eo quod sanguis ex A
iens in hac parte nullum inferat hac in parte re-
frigerationis periculum.

*sectio Ar
teriarum*

Præter hæc est Arteriotomia, siue arteriarum
sectio. Non loquor in præsentia de illa arteriarum
sectione, de qua in superioribus memini lectioni-
bus, quæ est integra excisio per transversum, aut
abscissio partis arteriæ, de qua meminit Gal. 13.
meth. cap. vltim. & Paul. lib. 7. c. 5. qui acceperunt
ab Hip. 2. de morbis; Sed per arteriotomiam intel-
ligo apertionem per phlebotomum factam in ar-
teria capitis, quæ magis pulset, quàm ceteræ. Hæc B
operationem non esse periculosa n aut difficilem
propria experientia testatur Paræus lib. 1. 5. suæ
Chirurg. c. 14. 15. qui etiam scribit se felicissimè
hæc sectione aliquos curasse dolores, præcipue
hemicranios: Mittitur enim sanguis ex arteria
partis dolentis.

*sectio ar
teria.*

Quod si operatio ministris nõ sit facilis in an-
tiquis doloribus licebit illam vrere arteriam, quæ
cæteris & tumidior, & magis pulsans apparuerit:
Deniq; si quis abhorreat à ferro, & ab igne,
excogitata sunt remedia valde adstrictoria his ar-
terijs ad mota, quæ fluxionem cohibent. Paratur sic.

Recipe Terra argilla vnc. vi.

Succ. moror. immatur.

Succi rosar. an. vnc. i.

Album. ou. n. ij.

Acet. q. s. M.

Aliud fortissimum.

Recipe Sang. Dracon.

Bol. Armen. an. vnc. sem.

Terr. sigill. drach. ij.

Succi hypotist. vno. sem.

Album. ou. n. ij. M.

Fortissimum quoq; erit medicamentum hoc:

Recipe Gyps. vnc. ij.

Tragaganth.

Gum. Arab. an. vnc. sem.

Rasur. chart. pergamen. drach. ij.

Succi aut mor. immat. aut agrest. vn. ij

Album. ou. n. ij. M.

Hæc omnia, & alia huiusmodi arterijs apponũ
tur, per quas fit fluxio, & hac ratione dolor mi-
nuitur.

Ex proxime dictis etiam si colligantur ratio co-
randi dolores ex flauibus, & vaporibus, nihilomi-
nus placet subiungere familiaria quedam reme-
dia, quæ sigillatim ad flatus discutiendos fuerunt
inuenta. Sunt autè suffumigia, aut suffumimenta quæ
dā odorata ex cypere, carioph. styrace, ligno aloes

Nonnulli summa non felicitate vtuntur suffu-
migio ex gummi Indico, quod Caragnam vocat:

Alij etiam habent in vsu suffumigium ex al-
lio, ex gummi pariter Indico, quod vocant Copal
& Alibe.

Abiq; suffumigo pilæ odoratz ex Laudano,
ambra, & mosco, styrace, & ligno aloes idem præ-
stare possunt.

Vitanda sunt omnia odorata, quæ caput replēt,
vt myrrha, & crocus.

Extrinsecus quoq; vtiliter vniuerso capiti ad-
mouentur sacculi repleti chamomelo, pulegio,
milio, & sale, calefactis in sartagine.

Possunt in eundem vltum fomenta fieri ex de-
coctione chamomeli, pulegij, anisi, fenic. cymini.

De Vermibus.

Quod si Vermes adsint, expurgari poterunt
decoctionibus in nares attractis, quæ recipiæt
dictamnium album, scordium, chalamentum,
ab synth. marin. & commissuræ coronali poterūt
quoq; Cerata, vel Linimenta imponi ex aloë, myr-
rha, & croco mistis cum felle taurino, & aceto a-
cerrimo.

Hactenus de auxilijs ad expurgandam mate-
riam, sequitur tractatio de remedijs superantibus
morbos, & primum intemperiem frigidam, &
calidam, siue cum, siue sine obstructionibus.

Curatio intemperie frigida.

In intemperie, & materia frigida conueniunt
magnæ antidoti Theriaca, & Mithridat: à
drach. sem. vsq; ad drach. 1. quatuor horis ante ci-
bũ, conserua anthos, siue florum rosismar. beto-
nicæ, aut sola, aut Theriacæ, & Mithridato permista
hoc ipsum præstare potest. Ligni, salsa, ac corticis
decoctum si capitalibus herbis præparetur, effica-
cissimum est auxilium. Erunt a herbæ Capitales:
Maiorana, stæchas, betonica, pulegium, sisymbri-
um, vel calamentum. Non placet a illorum consi-
lium, qui vinum huic decoctioni ad miscent: Nā
vinum tot calidis medicamentis admistum erit
humorum, qui in toto corpore continentur, ad
caput vehiculum.

Extrinsecus conueniunt pariter olea, fomenta
lotiones, stillicidia exsiccantia & calefacientia:
& vbi obstructio adest, sint quoq; attenuantia, &
digerentia: Ideo inter Olea probatur valde lau-
rinum, rutaceum, illudq; medicamentum, quod
Paul. lib. 3. c. 5. tanquam efficacissimum proponit
à muliere tamen acceptum, cuius meminit etiam
Auic. prima 3. tr. 2. cap. 10. & Holler. 1. capit. de
morb. internis. Medicamentum est radix cucum-
sylvestris in tabellas incisa, & cocta in oleo, & aq.
Si quis accipiat oleũ rutac. aut laurin. fortius erit
medicamentum: post decoctionem oleo caput in-
ungatur: Ex ipsa vero radice contusa fit Empla-
strum, quod capiti imponitur. Puto idem præstitu-
rum oleũ, quod Patauii familiare est, resoluũũ
vocatũ: Recipit a. radices Bryoniz: & propterea
si loco radices cucumeris sylvest. fiat emplastr. ex
radice bryon. easdem habet vires attenuandi hu-
mores crassos, consequenter liberandi caput ab
obstructione. Et sane oportet Med. cum esse dili-
gentem in superandis obstructionibus: Et ideo si
in his casibus frequentes etiam fiant Capitis lo-
tiones, etiam si patiens lotionibus non sit assue-
tus, ex lotione iuuabitur, præcipue si alteretur li-
xiuium bacchar. agarico, colocynthide, maiorana,
stæchade, calamentho.

Si fiant etiam Peccinationes frequentes, & fri-
ctiones aut pannis asperis, aut sacculis imbutis
pulueribus absterforis, vt pulu. lupinor. amygd.
amarar. elleb. nigri, sinapis.

Stillicidia quoq; in his casibus sint ex aquis
sulphur. aluminos. nitros. & salis.

Cura.

Curatio intemperiei calida.

A

Recipe Mucilag sem. malu.

alib. an. vnc. ij.

Vitell. ouor. n. iij.

Ol. ros. compl.

Pinguet. gallin.

an. vnc. i.

anatis.

M.

Quod si intemperies sit calida, intrinsecus probantur aquae naturales refrigerantes, acida, ac ferrata, serum caprinum, conserua violatum, rosarum, nymphaez.

Extrinsecus vero probantur Lotiones alteratae rosae, foliis vitis, salicis, lactuca, & aliis huiusmodi refrigerantibus.

Et si obstructio adsit, eligenda sunt absterioria frigida, ut esset pulvis ex Lapide pumice, ex testis, cochleis. Sullicidia patiter sint ex aquis refrigerantibus.

Curatio Cariei.

Sed si adsit ossis corruptio, quid agendum? Si corruptio sit externa, facta cutis incisione, aut vitione, siue per ignem, siue per causticum super parte affecta, non erit difficile os ipsum raspatorio instrumento usque ad locum sanum ab omni carie expurgare.

Sed si sanies fuerit in diplomate, seu meditulio ossis, aut in parte interna. Aretz. lib. 1. diuturni curand. c. 2. periculosam profert esse operationem, quae fit per cauterium usque ad locum affectum; quod & nos ipsi confitemur.

Sed quid agendum? Si corruptio quam primum non emendetur, semper vltius serpit, itaque salius est anceps experiri remedium, quam certae morti egrotantem relinquere. Itaque ubi vitium sit in diplomate, cauterium debet peruenire eo usque, id est ad diploma; Si in parte fuerit interna, facienda est integra totius cranii trepanatio. Hanc proposuit Hipp. 2. de morbo. Hac ipsa vtuntur familiariter Chirurghi hoc tempore in vulneribus capitis cum suspitione sanguinis, aut putris supra membranam.

Victus ratio in diuersis affectibus.

His accedat victus ratio, ita vt in causa frigida aer sit calidus; corpus exerceatur; cibus sit tenuis, & attenuans: fugiantque Venerem; alius lubrica seruetur, & vinum quidem bibans sed tenue: fugiantque allium, cepas, porrum, petroselinum, omnia vaporosa.

In causa calida aer sit frigidus, dent corpus quieti, & somno, nec vtantur tenui admodum victu; accipiant autem fructus adstrictorios, citonia, melospila, pyra, &c. Haec sunt remedia aduersus causas & affectiones, quae dolorem excitant; pauca dicam de auxiliis, quae diriduntur aduersus dolorem.

Curatio doloris per se vt est symptoma.

Dolor itaque ubi fuerit ingens, curatur & anodinis, & narcoticis. Anodina sunt oleum ex vitell. ouotum, ol. ros. vitell. ouor. permixtum, frituliacx ouis cum oleo ros. confecta, Omenta animalium, & pulmones calentes extracti, & capiti appositi.

Hoc quoque Linimentum erit anodinum.

Fomenta quin etiam ex decoctis malui, alth. chamaem. aneth. melilot. formigr. per spongas adhibita habent vim anodynam.

His non conferentibus sunt deniceps Narcotica Extrinseca, & Intrinseca. Extrinsecus admixtrentur succus lactuca, nymphaez, hyoscyami, papauer. albi, mandrag. quibus non conferentibus additur opium, siue ipsis succis, siue ol. viol. oenoph. vnguento popul. Sint autem opi. gra. iij. in singula olei, aut vnguenti vncia.

Tandem his non conferentibus, quando dolor est ex causa calida, & vigilia vires deiciunt, cum periculum phrenitidis imminet, intrinsecus quoque opiata conueniunt aut

drach. sem. Sher. recent. aut Philon. Rom.

aut Requi Nic. ol. aut Pilul. de Cynogloss.

Sed in horum vsu cautos oportet esse. Medicos quia sensus, & mentem obtundunt: atque ideo stuporis, Paralysis, Comatis, atque Apoplexiæ suspicionem inferunt.

Idecirco post horum usum & extrinsecus, & intrinsecus aliqua subiiciantur calida, quae prauam opii qualitatem possunt corrigere.

Cap. II. De vertigine & scotomia.

Rhasen secuti post tractatum de dolore capitis, de vertigine verba faciunt: Est autem duplex Vertigo: Vna quidem simpliciter dicta vertigo; altera vero tenebrosa vocatur. Primam Graeci dicunt *δύω*, secundam *σκοτία*, vt est apud Gal. 4. acut. 42. Arabes Scotomiam vocant, quo nomine tenebrosam explicant.

Est vertigo simpliciter accepta vitium imaginationis deprauata simul cum auditu, & visu deprauato ob spirituum animalium motum.

Tenebrosa autem vertigo, seu Scotomia est patitur imaginatio deprauata cum sensu visus abolito; aliquando etiam cum motu abolito ex spirituum animalium, & motione, & impedimento transitus ad propria loca.

Vtraque vertigo habet imaginationem deprauatam: Non autem adest perditio sensus, visus, vt quidam arbitrantur; Nam fit vertigo in tenebris, quando obiecta exteriora non videntur: Putant praeterea vertiginosi proprium caput circumagi: At vero caput proprium non est obiectum proprii visus; Accedit, quod in tenebrosa vertigine imaginatio illa circumrotationis rerum persistit, & tamen visus non adest. Propterea iure ex Galeno colligimus 4. aphor. 17. vertiginem esse vitium imaginationis.

Simplex vertigo dicitur habere prauum auditum, & visum: quia adest sibilus, & tinnitus aurium, & ante oculos videtur quasi nebula, vel tela quaedam imponi.

Causa

Causa coniuncta.

Diximus autem causam huius vertiginis simpliciter acceptam esse motum spirituum: Per motum intelligimus primo quidem circulem; aliquando etiam non circulem.

Datur quædam vertigo non tenebrosa, improprie tamen dicta, in qua oculi offuscantur, aures exsibilant, & patientes motum quandam in cerebro sentiunt, quem Titubationem vocant: Hic affectus est species vertiginis impropria, quæ præcedit veram vertiginem, de qua Aet. in prin. B. cap. 7. lib. tetrab. 2. Avic. 1. 3. tr. 5. vocavit hunc affectum Almo, seu Palpitationem, ut exposuit Gentil. in com. super illud caput. Et propterea Rhases 1. contin. ca. 3. sub nomine vertiginis hunc ipsum comprehendit affectum, quem Avic. describit loc cit.

Nomine spiritus intelligo primo, & per se spiritus animales; Isti enim sunt præcipuum facultatis & principis & motuæ, & sensitiuæ instrumentum.

Causa autem Scotomix, in qua, ut dixi, tenebræ circa oculos apparent, & aliquando patientes in terram cadunt, semper tamen imaginantur res circumuolui vel proprium caput, causa, inquam, est motus circularis spirituum animalium, quatenus scilicet faciunt imaginationem depravatam. Sed causa, propter quam tollit ut visus, & motus, proponetur infra.

Causa immediate efficientes vertiginem.

Nunc autem ad causas descendentes, illas distribuemus in 3. classes, In prima erit sermo de causis inordinati motus spirituum animalium; In 2. de causis motuum circularium; In 3. loquemur de causis aboliti sensus, visus, & motus.

Causæ igitur, propter quas spiritus animales inordinate moventur, sunt vel Externæ, vel Internæ; Et Externæ quidem proponuntur a Galen. 3. de loc. aff. c. 8. Ab Avic. 1. 3. tr. 5. ca. 1. Sunt autem sol, balneum calidum, frictio, & concussio omnis capitis: Propterea casus ex alto, percussio, contusio, motus omnis corporis inordinatus, & immoderatus, ut cursus, plurima equitatio, natiuitas, saltus, & chorea, præcipue verò motus in circulum, nimia venus, inspectio eorum corporum, quæ in circulum celeriter moventur, ut rotæ, aquarum vortices, &c. potius vini generosi, vsusq; acrium, & eorum omnium, quæ caput replent, inter quæ petroselinum, & hydroselinum vocatum primas habent partes.

Sunt quoque Internæ causæ immediatæ, & præcipue imaginatio in illis, qui facile vertiginem incurrunt; Imaginationes sunt multæ, quæ in circulum spiritus movent, & vertiginem excitant.

Id ipsum faciunt vapores, status frigidi, spiritus vitalis repente, in caput confluens.

De spiritu vitali exemplum habetis apud Galen. 3. de loc. aff. ca. 8. qui spiritum calidum per arterias carotides ad caput ascendentem vertiginis causam esse affirmat.

A De vapore calido in febribus à toto corpore elevato idem docent Hippocr. & Gal. 4. acut. 4. 2.

De flatuosa materia nemo est, qui dubitat; Imò omnes Medicinæ scriptores vsque adeo hac in re conveniunt, statum esse causam huius motus inordinati, ut quidam putauerint solum flatum esse vertiginis causam.

Causa mediata.

Causæ mediatae sunt materiales. De materia, ut nunc dicebam, constans fere omniū est opinio, illam esse frigidam. Hinc Hipp. 3. aph. 17. in constitutione Australi: & 23. in Hyeme, &c. & 3. in senibus vertigines fieri docet: Quæ omnia succum frigidum abundare denotant, atque ideo ex cruditatibus, ex cibis crassi succi, leguminibus, præcipue caseo, placentis, piscibus, aliisque id genus frigidis & humidis, vertigo excitari solet: Hanc causam nos quoque admittimus; sed sola non est.

Plerumque causa materialis est Bilis: Propterea dicebat Hipp. & Galen. 4. aph. 7. Inappetentiâ, morsum oris ventriculi, & vertiginem tenebrosam indicare, euacuandum esse per superiores: quia ut Galen. docet, bilis, quæ petit os ventriculi, est causa horum symptomatum, & facile per vomitum educitur. Idem Galen. ut ante dictum, ex calido spiritu per arterias ascendente vertigines fieri dicit. At calidus spiritus non fit absque sanguine, & bile. Et propterea 4. illo acut. 4. 2. ubi mentio fit vertiginis in febribus factæ, in quibus propter caliditatem natura tentat humores digerere, sed cum hoc præstare nequeat, mittit in caput, Idcirco Aretæus 1. de caus. diuturn. c. 3. scribit, vertiginem esse præsagium futuræ epilepsiæ. Et propterea in hac fieri vomitiones bilis, & atræ bilis. Et idem Aret. 1. diu. curandor. cap. 3. scribit, vertiginem fieri post suppressum sanguinem hæmorrhoidalem, & narium, aut mensium. Id enim colligitur ex Hipp. lib. de morb. virg. qui virginibus inquit fieri vertigines ex vietæ.

Rhases autem noster non modo in hoc 9. ad Almanfor. sed etiam 1. continent. c. 3. quem sequitur Avicenna & alii, materiam vaporis, qui facit vertiginem, volunt esse bilem, sanguinem, melancholiam, & pituitam.

Efficiens causa istius vaporis semper est calor. Neque enim frigus potest vaporem aut flatum ex aliqua materia gignere. Hinc Galen. 4. 2. 4. 2. acutor. Vertiginem, ait, esse medium quid inter praua, & bona signa: Nam non est omnino prauum, quia quando adest corporis refrigeratio, tum nihil vaporis gignitur, In vertigine tantus est calor, qui potest vaporem ex materia eleuare.

Et quia materia, ex qua vapor, aut status generatur, potest esse & in cerebro, & extra cerebrum quando in cerebro fuerit pituitosa & frigida materia, tunc dicitur fieri vertigo ex inæquali intemperie, quia materia habet temperiem frigidam, caput calidum, ex quibus generatur hic vapor, vel status. Idcirco Gale. 3. de loc. aff. 8. scribit fieri vertiginem ex inæquali intemperie.

Arabes,

Arabes, qui aliquando subtiliores sunt, quam cōuenit, fieri volunt ex in aquali intemperie absq; materia: sed hoc est figmentum eorum.

His sic explicatis, si materia sit per consensum, potest esse in ventriculo, iecore, liene, utero, in venis totius corporis; quandoq; etiam in parte aliqua determinata, & ignobili. Nam ex illo ipso vapore venenato, ex quo fit Epilepsia, potest fieri vertigo: At epilepsia fit aliquando ex digito pedis. Ergo & vertigo ex eodem loco fieri potest.

Explicabo, Auditores, causam motus circularis spirituum animalium: soluam problemata ad vertiginem spectantia; proponam causam aboliti visus, & motus; transibo deinceps ad signa.

Causam circularis motus non possumus assequi, nisi intelligamus motum circularem in capite duplicem esse; Vnum naturalem, alterum præter naturam, Naturalis motus ille est, qui incipit in arterijs carotidibus, deinde tendit ad plexum reiformem, seu priores cerebri ventriculos, a prioribus in medios, à medijs ad postremos, à postremis deinde spiritus impartiuntur nervis. Motus præter naturam contra se habet.

Problematis explicatio.

Problema primum erat, propter quam causam vertiginosi putent proprium caput circumagi, aut circumrotari? Causa nulla est alia, quam agitatio facta in membranis venarum, & arteriarum, & in membranis cerebri. Nā hic motus violentus mouet et partes continentes: Imò in motu naturali spirituum partes continentes, non agitantur, aut concutuntur, sed in hoc motu violento partes ipsæ continentes concutuntur. Illis agitati putant ægri caput proprium circumrotari.

Problematis alterius dilucidatio:

Quæritur secundo, Propter quam causam putent vertiginosi obiecta exteriora circumrotari? Ratio est manifesta. Nam cum spiritus animales habeant in se species omnium sensibilium, quæ imaginationi offeruntur, idcirco sicuti mouentur istæ imagines obiectorum externorum ita existimant patientes moueri obiecta externa, Nam, ut dicit Auicenna, idem est, siue moueatur id, quod videtur, siue id, quo videmus. Id quo videmus, est species visibilis reueruata in spiritu, ergo ubi hæc species mouetur, ibi externa obiecta quoque moueri videntur.

Causa sublatis visus, & motus.

Venio ad causas sublatis visus & motus. Causam maiorem Meicorum pars existimat esse solam ventriculorum cerebri obstructionem. Sed, ut summam agamus, omnis angustia ventriculorum cerebri prohibet transitum spiritus, & ita in causa est sublatis motus & visus. Omnis ergo angustia est in causa obstructionis, vel impedimenti, siue sit obstructio, siue subsidencia, siue compressio, siue densitas.

Notatio.

Obstructio, quidem fit non ex humoribus crassis; Nam vertigo est affectus cito accedens, & cito recedens, propterea causam habet obstruentem vaporem potius crassum, aut spiritum copiosum, quam humores.

Compressio fit ex Tumoribus circa membranas & cerebrum, fit etiam ex contusione, & consequenter fractura cranei.

Subsidentia fit aut ex veneno, aut morsu propter acrimoniam humoris vellicantis ventriculos cerebri.

Densitas fit ex nimia refrigeratione, Quæcumque ex his causis angustiam faciat, prohibet transitum spiritus ad nervos.

Sed præter has causas est quoque alia, de qua nemo scriptorum meminit, & ferè est frequentior alijs. Dictum est, spiritus animales à ventriculis cerebri ad nervos moueri recta linea; Vbi motus circularis horum spirituum est nimis violentus, idem spiritus non potest & recta linea, & circulariter moueri; Hoc patet exemplo aquæ, quæ continetur in vase vitreo perforato, Exagitemus aquam in circulum velociter, etiam si vas sit perforatum, nihilominus aqua non exiit ex foramine per concitatum motum circularem; Sic fit in spiritibus ubi admodum velociter mouentur. Ut tandem finiam, hic motus circularis est in causa abolitionis motus visus, & sensus.

Signa.

Signa vertiginis sunt varia pro varietate differentiarum, causarum, & locorum affectuum.

Differentiarum quidem: Nam illa, quæ Auicenna vocat Palpitationem, nos Titubationem, fit cum pandiculatione totius corporis, oscitatione frequenti, cum motu etiam frequenti palpebrarum, manuum contrectatione, cum rubore faciei; cum tinnitu aurium, oscuratione oculorum, & in hac patientes non opinantur obiecta circumrotari; sed vix pedibus stare possunt, propterea manus mouent, ut sustentacula apprehendant.

Vertigo simplex facile cognoscitur ex imaginatione circularis motus, vel proprii capitis, vel rerum externarum, vel cum deprauato visu, & auditu.

Tenebricosa vertigo in hoc differt à ceteris: quia præter imaginationem motus circularis amittunt visum, & cadunt in terram. Distinguitur autem ab Epilepticis: quia in his nec spuma, nec conuulsio adest, & functiones principes manent illæ.

Quod pertinet ad distinctionem causarum, non sunt querenda signa causarum externarum: Quia partim sunt exposita in tract. de dolore capitis, partim habentur ex relatione ægri.

At si causa intrinseca fuerit spiritus calidus, facile cognoscitur ex temperamento, totius corporis calido, ex tumore, & pulsatione arteriarum circa iugulum, qui etiam aliquando, ut docet Auicenna, dolorem infert. Præterea hæc vertigo facile accedit, & recedit: Est cum rubore, & calore faciei,

ciei, & oculorum, cum vigilijs, delirio, plerumque sequitur febres, aut iram vehementem, aut vsu calidorum, & iuuatur à frigidis, nocumentum percipit à calidis.

Si status fuerit frigidus, crassus, qui vertiginē faciat, praecedit sibilus aurium, omnia sunt perturbata: Somniant autem se volare, adest capitis dolor extensus, facies pallida. Et si status generetur in capite, aderit capitis grauitas, sopor, stupor sensuum, torpor in motu:

Si ex ventriculo sit flatibus referto, adfunt rugitus, singultus, extensiones, inflationes, sputa frequentia.

Si vero fiat ex morfu oris ventriculi, adest nauſea, inappetentia, sitis, amaritudo oris.

Si fiat ex veneno, vel venenata aura, hæc mouetur momento temporis, nullo apparente manifesto indicio alicuius magni morbi, vel in capite, vel subiectis locis. Solet autem præcipuè eleuari ex vterò, siue propter suppressos menses, vel propter retentum semen.

Prognosis.

Huiusmodi affectus quamuis ex se non videatur lethalis; nihilominus quandoque sequitur lethales affectus, nempe conuulsiones, capitis inflammationes, solet etiam definere in graues affectus: quandoque in Maniam, & Melancholiam. Aret. 1. de caus. chronicor. c. 3. Aliquando definit in Epilepsiam, & Apoplexiam, vt docet Galen. 3. aph. 17. Igitur hic affectus mala minatur: Itaq; cum hic affectus periodicus sit, vno modo tractandus est in accessione, altero modo extra accessionem.

Curatio vertiginis in accessione.

Intra accessionem primo reuellimus ligaturis, frictione, cucurbitulis, vesicatorijs, supposito-rijs &c. per clysteres acres. Dubium est de sectione venæ, vtrum conueniat in accessione? Vnus Gentilis ex tot Medicinæ scriptoribus, quos ego vidi, mentionem facit venæ sectionis in accessione. Et sane quanquam hic vnus sit, mihi videtur seruatis quibusdam conditionibus habere rationem adeo efficacem, vt non modo vtiliter, sed necessariò venæ secanda sit.

Supponamus vertiginem ex sanguine multo, & vaporoso fieri, confertim ascendente per arterias ad cerebrum: Si quàm primò hic sanguis non reuellatur, & euacuetur, nonne imminet periculum apoplexiæ, ex Gale. lib. de cur. rat. per S. M. c. 5. Si igitur minatur Apoplexiam, & ex sectione venæ potest tolli periculum, sectio erit vtilis, & necessaria.

Dubium

Sed dices: Tempore accessionis vires sunt suffocatae, ergo non permittunt, vt hoc tempore fiat venæ sectio.

Solutio.

Respondeo in suffocatione virium non prohiberi venæ sectionem: Idcirco Celsus & Aetius secant venam in ipsamet accessione apoplexiæ,

A in qua tamen maior est virium suffocatio, quàm in vertigine.

Accedit testimonium Hipp. 4. acut. 23. Et Galen. in comment. in quo inquit per venarum interceptiones quasdam intelligi suffocationes ex sanguine; in quibus tamen subiungit in tex. 24. secandam esse venam in cubito.

Ideo potest etiam in vertigine sanguinea secari vena tempore accessionis:

Licet etiam vi Reprimentibus externis, & vomitorijs ex sententia Aretzi in accessione, quâdo fiat ex ventriculo.

Expedit paucis, quæ de vertigine dicenda sunt & statim phrenitidis tractationē aggrediat.

Erat sermode vertigine, cuius curationem in ipso accessionis tempore institueramus; Et si vertigo ex calidis humoribus fiat, aut spiritu vaporoso per arterias ascendente, statim hæc potio conuenit.

Recipe Vin. granat. aut citon. ꝑnc. ij.

Aq. plantag. ꝑnc. iij.

M. f. potio.

C Reprimit hæc potio vapores ascendentes, & inordinatum spirituum motum. Conueniunt quoque cætera reprimentia capiti adhibenda.

Curatio extra accessionem.

Extra accessionem vnicuique materiæ ita prospiciendum est, vt diximus intra tractatu de dolore capitis. Itaque si vertigo ex sanguine feruendo, & spirituosio oriatur, secanda est vena. Neque vnica tantum, sed multiplex. Ideo tempore interualli licet in primis inferiores secare venas, præcipuè verò in suppressis mensibus & hæmorrhoidibus; Secandæ deinde sunt superiores, dextra vel sinistra, prout impetus sanguinis, vel ex iecore, vel ex liene ortum duxerit: Secandæ etiã sunt venæ postiores, dum tamè fluxio per exteriores fiat; non autem per interiores: quanquam existimo, missionem sanguinis in fluxione etiam interna multum prodesse.

Quod pertinet ad purgantia, sunt talia in quacunque materia, qualia descripsimus supra.

Hoc tamen moneo, In vertigine facta per consensum à ventriculo cruditatibus pleno præter incidentia conuenire pilulas de hiera, alexphanginas, sicuti quando humor fuerit calidus, & ad ventriculi os impetum faciat, conuenit vomitus, ex Hippoc. 4. adhor. 17. In his casibus iuuat vsus huius electuarij, quo patientes vtantur hor. j. ante prand.

Recipe Mirob. citrin. ꝑnc. ij.

Pasul. lib. i.

Rosar.) an. M. i.

Violar.)

F Bull. in l. q. Aq. Endiu. deinde f. express.

Recipe Prun. Damasc. lib. i.

Bull. in prædicto decocto, & extractis nucleis pulpa transmissa per setaceum.

Iterum bulliat in prædicto decocto.

Addat Pulp. thamarin. ꝑnc. ij.

Flor. cass. ꝑnc. i. & sem.

Specier. triasantal. ꝑnc. sem.

*Mastiche:**Spica an. drach. ij.**Rhabarb. elect. pulueriz. drach. iij.**Saccar. q. s. f. Elect.*

In vertigine ex humoribus, & vaporibus calidis hoc electuarius multum iuuabit. Dosis à drach. vj. vsque ad drach. x.

Cæterum conuenit quoque vsus cuiusdā pulueris in vertigine ex flauibus, & humoribus frigidis in ventriculo, qui potest accipi summo mane ad drach. j. hor. 4. ante cibum aut in vino, aut in iure: Potest ferculis etiam admisceri. Puluis B est talis

<i>Recipe Cardamom.</i>	<i>Anis.</i>
<i>Ameos</i>	<i>Cymen.</i>
<i>Hyssop.</i>	<i>Beton.</i>
<i>Puleg.</i>	<i>Calament.</i>
<i>Piper.</i>	<i>Maioran. an. drach. i.</i>
	<i>M. f. puluis.</i>

In vertigine per essentiam facta conueniunt ea omnia caput purgantia & sensibiliter, & insensibiliter, de quibus supra; exceptis tamen sternutatoriis validis, quæ propter nimiam agitationem vertiginem excitant. Existimant nonnulli vermem sericinum exsiccatum, & puluerizatum, & inspersum suturæ coronali iuuare vertiginosos. Carolum V. hoc puluere vsu esse frequen-

Diffus ratio:

AD vietus rationem quod attinet, cum ea talis esse debeat, ut pro varietate causarum vario modo instruat, non est opus singula repetere. Sufficiat intellexisse in omni vertigine ea esse vitanda, quæ caput replent, ut allium, cepaportum, vinum generosum, anisum, & cætera id genus.

DE PHRENITIDE*Cap. III.*

HIC affectus Hæcæis οφρητις: Latinis Alienatio mentis; ab Arabibus nunc Carabitus, nunc Sitsen calidum, modò Phrenesis, vel Phrenitis dicitur.

De fini- Nihil autem aliud est, quàm desipientia continua potissimum cum febre continua ex inflammatione cerebri.

210. Desipientiam intelligo vitium facultatis ratiocinatricis, & discursus deprauatum in quo distinguitur Phrenitis ab amentia seu stoliditate, & Morosi, ut docuit Galen. lib. de diff. sympt. cap. 3. Nam in amentia discursus rollitur: in Morosi diminuitur; in Phrenide deprauatur.

Continuam dixi ad differentiam pseudodelirii, quod sit ex consensu febrium, siue sint ex venis communibus, siue ex determinatis locis patientibus Galen. 2. loc. aff. 4. Ex consensu quoque pulmonum, iecoris, & oris, ventriculi deliria fieri posse, quæ tamen continua non sunt, ex 2. de caus. symp. c. 7. colligitur.

Potissimum dixi, ut significarem non modò discursum, sed & imaginationem, & memoriam lædî. De memoria docet Gal. 5. loc. aff. 4. qui scri-

A bit phrenidicis irrationabilem succedere memorie defectum, ut illi qui matulam poposcerat, & illius oblitus fuit.

De imaginatione id ipsum colligitur ex Gale. de diff. sympt. c. 3. & 4. de loc. aff. 2.

Sed læduntur & aliæ functiones sensitiuæ sensus communis potissimum, ut propterea adsint vigilie immoderate, ut colligitur. 1. in. 1. proph. (Epid.) 6. aliquando autem ubi Phrenitis est spuria, adest etiam Coma, & de hoc in Phrenide meminit Hipp. & Gal. 3. in 3. Epidem. com. 45.

Cum febre continua, ad differentiam & melancholice, quæ est sine febre, & pseudodelirii, quod in tertianis intermittentibus circa vigorem plerumque contingit.

Ex inflammatione cerebri, ad differentiam delirii continui cum febre, quod sit ex inflammatione diaphragmatis. Docet enim Gal. 5. de loc. aff. 4. tantam esse similitudinem delirii facti ex septo transuerso cum eo, quod sit ex cerebro, ut antiquiores ob hanc causam diaphragma *enarras* vocauerint. Hæc est rudis delineatio definitio- nis Phrenidis, quæ exactius est proponenda.

Differentia.

Cum dicimus Phrenitidem esse Desipientiam, & delirium, hæc habet quatuor differentias aliquando est cum furore, aliquando cum risu, nonnunquam cum studio non raro cum melancholia. Has differentias partim colligere potestis 6. aph. 5. 3. partim verò toto fere proph. lib. Ee quia desipientia cum furore, & risu omnibus est conspicua, explicanda est differentia cum studio, quæ est obscura: In hac ægri aptè admodum videntur de rebus difficilibus disputare de philosophicis, si Philosophi; de propriis artibus ad propositum loquuntur, si artifices: Desipere tamen dicuntur, quatenus de his disputant non seruata conditione temporis, loci, modi, & personarum, apud quas loquuntur.

E Delirium melancholicum etsi existimeretur sine febre consistere, quod etiam nos certissimum affirmamus; nihilominus aliquando in phrenide sit, ut ipse quæ spuria tum temporis existat, tumq; humoris melancholici tum admixtum habeat. Huius exemplum habetis apud Hippoc. 3. in 3. Epid. ægroto penult. in casu vxoris Dealcis, quæ laborauit Phrenide melancholica.

Hinc Holler. in hac parte non est reprobandus, qui aliquando melancholicos constituit cum febre continua, ad has melancholias respiciens, quæ Phrenitidem sequuntur.

Obseruandum illud quoque hoc in loco, non quocumque tempore Phrenitidem esse discursum deprauatum; sed quandoque abolitum, quando scilicet facta sit æqualis intemperies in vniuersa cerebri substantia, omnesque illius partes humore sint æqualiter imbutæ: Tunc sit Phrenitis illa à Gal. Hectica vocata, 1. in 1. proph. 3. 2. In qua ægri amplius non delirant; sed quieti, atque immobiles iacent potius extincta rationatrice facultate, quam deprauata.

B

Sed

Sed quia dixerat in Phrenitide laedi etiam memoriam. cum tamen certum sit phreniticis, iam sanitati restitutos, recordari eorum, quae illis contingere, & ipso quoque morbi tempore usum memoriae retinere: Idecirco sciendum phreniticos non amittere memoriam eorum, quae illis contingere ante aduentum morbi: horum enim optimè recordantur; sed eorum tamen memoriam habere non possunt, quae dum actu sunt phrenitici, sensibus eorum occurrunt: & ratio est quia dum sunt phrenitici, spiritus animales habent semper agitatores, & motos, idcirco species sensibilibus, receptas in sensibus, non possunt isti spiritus ita retinere, ut memoriae offerantur, Quod absque quiete fieri non potest, ut potestis colligere ex Arist. lib. de memor. & reminesc. 2. & ex Gal. lib. de mor. muscul. ca. 6.

Inscantia.
Solutio.

Quod si quis dicat: Quomodo ergo recordantur eorum, quae illis contigerunt tempore morbi? Dicendum, quod hoc tempore phreniticis multa offerantur obiecta non recepta sensibus externis, sed spiritibus impressa propter fuligines vapores multos, cerebri ipsum replentes. Isti vapores varia singula spectant, varias imagines, quae valde imprimuntur in animis phreniticorum; harum imaginum recordantur post morbum; non recordantur obiectorum, quae recipiuntur in sensibus externis propter causam iam dictam.

Phrenitidem non discursus tantum, sed etiam imaginationis vitium esse docuit Gal. 2. de caus. sympt. 7. cum scribit, Phrenitim vitium esse rectricis facultatis: Rectricem autem facultatem ipsemet Gal. lib. de diff. sympt. 3. in tres distinxerat differentias: Imaginationem, Discursum, & Memoriam.

Obiectiones.

Ceterum haec sententia aliquam habet difficultatem. Nam Gal. de diff. sympt. 3. & 4. de loc. aff. c. 2. triplicem facit delirii differentiam: Vnam, in qua sola imaginatio laeditur, seruat discursu, cuius exemplum proponitur a Galeno sub Theophili nomine, qui imaginabatur tibicines ad esse in angulo conclauis, iubebatque illos expelli: Exemplum est, inquit Gal. deprauata imaginatio; seruati tamen discursus. Quandeque seruatur imaginatio, deprauatur discursus. Exemplum proponit Galen. cuiusdam qui singula quaedam uasa proprijs nominibus appellabat; illa tamen tanquam amens sine discursu proiciebat ex fenestra. Aliquando uero, & imaginatio, & discursus tollitur. Haec, ut dicebam, pariunt difficultatem.

Solutiones.

Quod pertinet ad primum, dari delirium cum laesa imaginatione, seruat discursu, hoc dico non fieri in uera Phrenitide; sed in delirio communiter accepto: Delirium autem esse quid leuius desipientia phreniticorum, colligitur ex Galen. 7. aph. 9. & ex cod. 2. de caus. sympt. 7. qui propterea inquit fieri delirium, & per consensum à toto corpore, & ex intemperie cerebri cum materia absque inflammatione; aliquando uero ex inflammatione, & tunc est uera phrenitis. Itaque potest quispiam delirare absque discursu laeso, sola imagina-

uone laesa: non tamen erit phreniticus: Hinc Gal. 3. in 3. Epid. 4. 5. Phrenitidem nulla ratione dicit ab insania differre, nisi febre, quia haec sit sine, illa cum febre, at insania semper est vitium discursus ergo & phrenitis: At hoc ex uobis ipsis colligere potestis legendo c. 2. 4. loc. aff.

Ad secundum obiectum, dari scilicet Phrenitidem seruata imaginatione, laeso tamen discursu. Dico, imaginationem esse duplicem unam sensitiuam alteram deliberatiuam, quam Auerro, cogitatiuam vocat quae distinctio est Arist. 3. de an. l. 57. In 6. phreniticis deprauatur imaginatio deliberatiua; non necessario sensitiua, Sensitiua imaginatio est quaedam perceptio speciei sensibilis receptae in sensu communi, & oblatae imaginationi separatae à materia. Deliberatiua est illa, quae in specie iam recepta format conceptum amicitiae, aut inimicitiae, boni aut mali, fugiendi, aut prosequendi. Potest itaque fieri, ut phrenitici non decipiantur circa speciem obiecti receptam (Medicum cognoscant, ut Medicum) Socratem, ut Socratem; Sed formant deinde conceptum omnino deprauatum: Nam Medicum putant inimicum, & consequenter fugiendum, ergo in his deliberatiua semper est laesa.

Audistis quomodo in Phrenitide actiones, & functiones principales laedantur, videamus modo quomodo & sensitiua laedantur.

Et primo quod pertinet ad sensum commune in quo ex Gal. sententia fit somnus, & vigilia, hic in Phrenitide summopere deprauatur: deprauatur autem, quia succedunt vigilae intensae: Istae autem sunt duorum generum: Al quando uocatur *ταπεινός*, seu vigilae turbulentic, sic vocat illas Gal. 1. in 1. proth. 6. eo quod sint cum perpetuo quodam delirio, & cum rixis aliquando uero dicuntur *ὀνείδης*, 1. somnolentiae, ex quibus constituntur illae species phrenitidis, quae Hipp. & Gal. lib. de Cemat. c. 2. & st. vocant Coma vigil; Arabes dicunt Subet haras estque species Phrenitidis, ut optimè Galen. 1. in 1. Proth. 1. animaduertit, in qua adest quidem delirium, sed non usque adeo manifestum. Isti enim magna ex parte oculis conuident, etiamsi non dormiant, & cum primum uocantur, statim in delirium incidunt. Est, ut dixi species phrenitidis, quae media est inter exquisitam phrenitidem, & exquisitum lethargum: Idcirco Galen. 1. in 1. Prothet. 2. hunc affectum medium *Τυφμανία*, vocat: Sed quia Typhomaniae nomine complectitur etiam Coma somniferum, quod magis pertinet ad lethargum, de hoc dicemus loco.

Nunc autem illud accipiendum, Coma vigil Comae differentiam esse phrenitidis; quinimo, ut omnia uigilest habeatis, quae pertinent ad hanc partem, Coma differentia hoc vigil duas habet differentias: Vnam dicitur Coma vigil pigrum, seu Cataphora, de quo meminit Gal. imo ipse Hipp. 3. in 3. Epid. 45. Aliud est nit. non pigrum, & ut utroque meminit Gal. lib. de Comate ca. 3. uocaturque alio nomine cum eodem uigil du Hippocr. Cataphora uigil pigra, & Cataphora uigil non pigra.

Deprauantur quoque alii sensus, & praecipue Visus: Nam phreniticis phantasmata apparent.

Imaginatio duplex.

present, quemadmodum suffusus, putantque se videre pulices, pilos, floccos, quos assidue carpunt, vel carpere tentant, ut docuit Galen. 1. prognost. 23. Hæc igitur actionum læsio fit cum febre continua.

Et quamvis Rhases intelligat per febrem continuam continentem, seu conclusam, attamen notat, ne decipiamini, pleiunque febres phreniticorum habere accessiones. Ratio desumitur ex Galen. 2. de differen. febr. cap. vii. 9. meth. cap. 5. Omnes febres, inquit Galen. quæ ortum ducunt ex locis determinatis patientibus, habent circuitus, & accessiones Phrenitis ortum ducit ex determinato loco patiente, nempe cerebro ergo debet habere accessiones. Hinc Galen. 1. aphor. 1. 1. febres phreniticorum, inquit, habere accessiones de 3. in. 3.

Rhases
defenditur.

Illud quidem pro tuendo Rhase nostro dicere possumus, phrenitum iam factam, continuam, continentemque febrem habere: Nam ideo fiunt accessiones, quod novum fiat inflammationis incrementum, ubi nullum sit amplius inflammationis incrementum, febris potest esse continua. Hæc continens febris, & illa, quæ quidem continua est sed cum accessionibus, & exacerbationibus fit, ortum ducit ex inflammatione cerebri.

Causa immediata.

Per inflammationem intelligimus intemperiem cum tumore, qui potest varius esse, sanguineus, biliosus, siue bilis sit pallida, siue flava, potest esse atrabularius, vel ex bile vsta, vel melancholia vsta; potest esse melancholicus, & pituitosus, ut propter hanc causam oriuntur tot Phrenitidis differentie à nobis propositæ; aliæ cum risu, quæ sunt ex sanguine aliæ cum rixa, quæ sunt ex bile potissimum vsta; aliæ cum studio, quæ sunt ex melancholia; aliæ cum comate vigili, quæ sunt ex bile pituita commista, ut Gal. 1. in 1. proth. 1. docet.

Quamquam illud non sit prætereundum, quod Galenus eodem loco scribit, fieri aliquando affectum somniculosum cum vigiliis ex sanguine copioso cerebrum gravante; sed bili permisso. Dico, non esse præmittendum, quia multum differt curatio huius ab aliis supradictis ex bile cum pituita.

Locus affectus.

Nomine Cerebri Avicē. hæc in parte secutus Aetium, & Paulū, putat intelligi membranas potissimum, ex consequenti vero etiā Cerebrum imò Egina lib. 6. cap. 2. ut putat Cerebrum inflammari non posse, sed affici tantum calida in temperie per consensum à membranis inflāmatis.

Sed huius sententiæ video non fuisse Gal. qui in primo prophet. 1. & 18. aperte docet Phrenitidem esse cerebri inflammationem: docet quidem 4. de præfag. ex puls. 8. cerebri inflammationem communicari membranæ, & vice versa; nunquā tamen asserit in Phrenitide cerebrum non inflāmari: quod si 2. in 1. Epid. 19. scribit, in Phrenitide partes cerebri calefieri, non propterea affirmat

earum calefieri absque tumore: & sanè ipse quoque Avicē. 1. 3. tr. 4. c. 1. docet, cerebrum posse inflāmari; id quod facillimè fieri posse non tantum propter piciniam membranarum, quantum propter rivulos, & lacunam sanguinis, quæ in dura membrana continetur, Gale. 9. de vl. part. c. 9. aperte ostendit sanguis igitur in lacuna contentus primariò potest cerebrum inflāmare; tamen si non inficit illud quandoque inflāmari post inflāmatam membranam, præcipue tenuem, quæ cerebro est propinquior.

Causa Mediana.

Non conteram tempus in recensendis causis mediatis: quandoquidem illæ omnes causæ, quas diximus dolorem capitis inferre, possunt quoque Phrenitidem excitare.

Signa.

Ad signa igitur transeo. Distribuum tractationem de signis in quinque partes. In 1. agetur de signis incipientis Phrenitidis. In 2. de signis factæ. In 3. ponentur signa distinctiva causarum & locorum. In 4. verlabimur in signis distinctivis Phrenitidis ab affectibus similibus. In 5. de prognosticis erit sermo.

Prima Signorum Pars.

Ad primam partem quod attinet, in qua estote attenti: quia laudabilius est præferre patientes à Phrenitide, quàm curare. Signa incipientis Phrenitidis ad tria potissimum capita rediguntur: Quædam pertinent ad actiones læsas. Aliæ ad excrementa: Tertia ad qualitates mutatas.

Signa ab actionibus læsis desumpta ad 6. rediguntur capita. Primum continet signa desumpta ab actionibus principibus. II. quæ desumuntur à sensu communi. III. à sensibus exteignis. IIII. ex motu animali. V. à facultate irascibili, seu vitali. VI. & ultimum continet signa deprompta à facultate naturali.

In primo fonte tria sunt signa præcipua. Primum, obliuio circa principium accessionis: dico circa principium, quia cū obliuio est continua, est signum phrenitidis factæ, non incipientis. II. de sumitur à discursu deprauato, à delirio, s. quod circa incrementa, & vigores tantum apparet, ad differentiam Phrenitidis factæ, in qua delirium est perpetuum. III. est multiplicitas imaginationum, quæ patientibus occurrunt, & præcipue sunt imagines rerum, quæ sunt in motu, ita ego audiui plurimos dicentes, arbores moveri, & similia differunt autem a Phreniticis eo, quod cognoscant imagines illas esse falsas.

Quod ad secundum fontem, sensum scilicet communem, attinet, tria quoque hauriuntur signa: 1. Vigiliæ, quæ magna ex parte sunt continuæ. 2. Si quis est somnus, ille admodum perturbatus, & inquietus est, ut propterea post modicum tempus surgant, clament, eo quod, ut Hippocr. 1.

in 1. prophet. 5. air. & interpretatur Galen ibidem A
somnia ipsis sunt conspicua, id est, videantur vsq;
ideo vera, quæ ipsis offeruntur in somnijs, ut sta-
tim expergefant, perinde atque si ab obiecto ex-
trinseco in eos irruente excitarentur. 3. Signum
est, si ægri, nuper à somno excitati, familiares nō
cognoscant.

Ex tertio fonte signorum tot desumuntur si-
gna, quot sensu externi: idcirco aut surditas, aut
tinnitus aurium futuræ Phrenitidis est signum:
Id ipsum ostendunt lacrymæ circa oculos, splen-
dore, vitiosæ & depravatæ visiones geminæ, aut B
trigeminæ, vel etiam phantasmata ante oculos ob-
versantia, quasi pulices, flocci, pili, &c. Lingua ni-
gra, & arida est inconstans, quasi balbutiens, tre-
mula, amarus sapor, vel alius similiter. fetidus
apparet. Circa nares similiter pravi odores versā-
tur. Caput vniuersum, & præcipuè occiput, insi-
gni & continuo dolore versatur.

Ad quartum fontem referuntur omnes motus
animales importunè facti, depravati, iusto fortio-
res, aut imbecilliores. In his notauit Hipp. ampli-
ficationem supercilij motum oculi frequentem, C
& velocem, multam locutionem. frequentē screa-
tum, sæpe cooperiri, aut projicere tegumenta, sæ-
pe decubitus mutare, modò in pedes, modò in
caput modò in latus dextrum, modò in sinistrū,
crura habere in modò diducta, modò contracta,
manus frequenter contrectare, quasi aliquid car-
pere velint, quinimo ante oculos manus pone-
re, quasi muscam, aut quid tale exturbent. Hæc
omnia sunt signa futuræ Phrenitidis.

In quinto fonte, tria sunt signa: primum est fa-
cilitas ad iram, & præcipuè in muliere, aut viro
honesto, & modesto. Sic scribit Hipp. 2. prog. 6.
(proth. 9.) Ex composito, modestoque homine fe-
rox responsio malum: Febris acuta secundum
est signum, pulsus frequentes, & celeros, magnā
ex parte duri, & conuulsiui, quando membranæ
ipsæ sunt inflammatae. 4. de causis puls. 14. Nam
ubi cerebrum potius est inflammatum, quàm
membranæ, pulsus molliores sunt, ex Galen. 4. de
prælag. ex pul. 8. & 9.

In sexto fonte sunt primum Vrinæ, quæ si ex
crassis, & turbatis fiant tenues, & pellucidæ, futu-
ram portendunt Phrenitidem: Propterea dicebat
Hippocr. 4. aphor. 70. Quibus urinx in febribus
perturbatæ sunt, quales iumentorum, ijs dolores
capitis, &c., & ibidem aphor. 72. Subiungit: Qui-
bus urinx pellucidæ, & albæ sunt, malæ, maximè
verò ubi in phreniticis apparent.

Eadem urinx ratione suspensi habent aliquā
vim prædicendi Phrenitidem, ut colligitur ex
eod Hipp. 1. proth. 5. 3. 1. & v. proth. 1. licet non sit
certum signum.

Quod dixi de Vrinis, dico de Excrementis alui. F
Alui excrementa admodū biliosa, si deinde al-
ba euadant, sunt certa Phrenitidis signa, dummo-
do alia accedat, de quibus diximus. Hinc Hipp.
1. prophet. 2. rubram ventris colluuiem in phre-
niticis malam esse scribit, de qua idem auctor in
tex. 23. scribit eandem albam esse malam: vtrum
que autem est verum: nam si debet fieri Phreni-
tis, oportet iecur multam generare bilem, quæ ex

rubra ventris colluuiē cognoscitur: sed si eadem
caput petat, excrementa alui redduntur alba, &
sine colore.

Ad hunc fontem pertinent Vomitus quoque
æruuginosi, quos Phrenitidem futuram indicare
docuit Hipp. 1. prophet. 10.

Ad qualitates mutatas pertinet Color Faciei,
qui aliquando valde rubicundus est, quandoque
verò nimium pallet, & ad citrinum tendit:

Denique quoad excrementa ex naribus stillæ
sanguinis erumpunt, quæ ipsæ futuram quoque
prælagiunt Phrenitidem:

Secunda pars Signorum.

FActam Phrenitidem non aliunde petere opor-
tet, quam ex fontibus propositis: sed diuersa
quadam ratione. Nam si sermo fiat de faculta-
tibus rectoribus, Obluio in Phrenitide facta est
perpetua, ut propterea neque recordentur min-
gere, neque deuicere, neque ossam, quam in ore
habent, deglutire, neque linguam extractam in-
tromittere.

Quoad discursum delirium non est circa vigo-
res tantum, sed tot febris tempore: & propterea,
ut dicebat Gal. 5. de loc. aff. 4. non inuadit subito
sed paulatim fit, & ad incrementum tendit.

Imaginatio vsque adeo læditur, ut falsas illas
imagines, quas vapor putridus imprimit, putent
omnino verissimas, & quod magis est familiares
medicos, & cibos concipiant tanquam hostes, &
venenum.

Pariter quod ad sensum communem attinet,
præter vigilias & turbatos somnos illud accedit,
quod somnus delirium augeat.

Quoad sensus externos, circa oculos lacrymæ
apparent acres, & erodentes, quia propter inflam-
mationem humor ipse acrimoniam contrahit,
coniunctiua tunica, quæ adnata dicitur, inflam-
matur, & totus oculus fuscum contrahit colorem,
quasi, ut dicebat Hippo. 1. prophet. 17. concretum
habeat puluerem, & propterea nitor amittitur o-
culorum, & visus hebetatur, & tamen ante ocu-
los phantasmata apparent.

Quod spectat ad sensum tactus iam non am-
plius de dolore capitis, aut alterius partis conque-
runtur, sed neque de linguæ ariditate, aut siccita-
te.

Motus animales sunt deprauati: ut iam intel-
lixistis.

Sed his omnibus accedit Respiratio magna, &
rara, ut docuit Hipp. 1. orogn. 24. & confirmauit
Galenus eodem loco, & 3. de diffic. respir. cap. 2:
Est magna respiratio, quia vsus est auctus, & in-
strumenta non dolent: est rara propter obliuio-
nem respirandi.

De facultate vitali, & naturali plura non sunt
dicenda, quàm antea dixerimus.

Cicā qualitates mutatas vnum notat Hippo-
1. proth. 17. & 19. Vocem scilicet clangosam, quæ
sit exsiccata larynge propter inflammationem ce-
rebri:

Hæc omnia signa possunt colligi partim ex Hippocrate 1. prothet. 2. 4. 5. 6. 10. 13. 16. 17. 19. 31. & 2. prothet. 1. 3. 6. & ex Galeno 5. de loc. aff. 4. 4. 4. præteream 1. prognos. de quo. facta est mediis.

Signa Phrenitidis hæcicæ habetis apud Gale. 1. in 1. prothet. 33.

Tertia pars signorum.

Versabimur in proponendis signis distincti-
uis caussarum & locorum; deinde verò in alijs.

Itaq; si Phrenitis fiat ex sincero sanguine, delirium est cum risu, & iucunditate, imaginationes & spectra, quæ versantur circa oculos, sunt obiecturum ruborum, facies, & oculi insigni rubore suffusi sunt, venæ tument, arteriæ insigniter pulsant, & febris est continua continens.

Quod si fuerit Phrenitis ex sanguine biliioso, est cum ira, cum vigilijs perpetuis, facie squalida, citius oculis exsiccatis, concavis, pulsus sunt duriore, & febris exacerbatur de tertio in tertium.

Si Phrenitis fuerit melancholica, nullum est delirium ex iucunditate & mæstitia; modo ridet modo plorat, & cum delirant, cum studio delirare videntur; nam singuli artifices, eleganter de suis artibus, & ad propositum discurrunt; sed paulo post, ut dicebat Gal. 1. in 1. prothet. 27. auripia loquuntur, & obsecra seipsos permiscunt.

Quod si pituitosa sit Phrenitis, facile cognoscitur, quia est connexa cum Comate vigili: Habent enim magna ex parte oculos clausos, eam si non dormiant. Et quia hoc Coma est duplex: pigrum, & non pigrum; in pigro, si vocentur phrenitici, vix oculos aperiant, & cum semel aperuerint, nihil respondentes eos iterum paulo post claudunt; in non pigro vocati oculos attollunt, irascuntur, dira loquuntur, & paulo post iterum quasi dormituri oculos claudunt.

Sed quia diximus ex Hippo. & Gal. 1. poth. 1. hoc coma vigil fieri etiam ex sanguine biliioso, distinguens hoc, quod sit ex pituita bili permixta, ab eo quod sit ex sanguine, hoc modo, quod in pituitoso, facies est pallida, oculi non rubeant, sed pituita affluunt; nares similiter humidiores sunt, & pituitam expurgant.

Venio ad distinctiua loci. Hæc diligenter notate: quia plerunque Phrenitis incipit ab inflammatione cerebri; quandoque ab inflammatione membranarum. Prima autem difficile cognoscitur, & fallit Medicos: Si igitur ab Phrenitis fiat affectus, primò membranis dolor insignis præcedit.

Si ex cerebro incipit, nullus præcedit, aut subsequitur dolor non præcedit, quia cerebrum est doloris expertum non subsequitur, quia tamen inflammatione communicetur membranis, antea facta est in cerebro: & propterea ex delirio præexistente dolorem non sentiunt.

Propterea inflammatis primò membranis, non statim memoria amittitur, & delirium est valde inæquale, imaginationes sunt plures, & magis conspicuæ, ac vigiliæ magis intensæ, quam ubi inflammatio primò cerebrum occupat: Ratio est: Nam

ubi membranz primò inflammantur, cerebrum primò contra hæc intemperiem calidam, & siccam & fuliginosos vapores, quam substantia: At ex intemperie calida, & sicca intensæ sunt vigiliæ; Ex multis vaporibus multæ sunt imaginationes, & imagines: Et quia inæqualiter communicantur istis vapores, modò plures modò pauciores, hinc etiam inæquale delirium.

At ubi Cerebrum primò repletur, vigiliæ non sunt usque adeo intensæ propter præcensuam materiam imagines non sunt multæ, quia vapores eleuati ex materia in cerebro existente potius percutiunt membranas, quam cerebrum, præterquam, quod à multitudine materiz eorum motus impeditur: est quoque delirium æquale, quia materia æqualiter ipsum cerebrum occupat.

Accedit, quod in Phrenitide membranis incipientes, pulsus sunt duri, vibrati, conuulsiui.

In ea, quæ incipit à cerebro, pulsus sunt molles ex Gal. 4. de prælag. ex puls. ca. 8. & 9.

Ad hæc affectus membranis, oculi redduntur concavi: nam inflammationis membranis cerebri, contrahuntur etiam membranz oculorum, quibus contractis, oculus minor redditur.

Inflammata autem substantia oculi sunt prominentiores, duri, tumidi: nam ad repletionem substantiæ cerebri, sequitur etiam repletio in humoribus oculorum: Hippoc. 1. progn. 10. inter praua signa ex oculis desumpta, & concavos, & tumidos refert.

Deniq; ubi membranz afficiuntur, affectus est sibi similis, neque multum variant symptomata.

In inflammatione cerebri frequentes sunt permutationes, ut propterea aliquando magis ledatur visus, quandoque magis auditus, quam alter; nonnunquam vnius partis motus, ut oculi; aliquando alterius, ut linguz & mandibulæ. Mutantur quoque symptomata facultatum principum, ut quandoque sequatur insignis obliuio, imaginatio autem sit sana, quandoque vero memoria iterum recuperetur, & imaginatio deperdatur. Hæc inquit Galen. 1. in 1. prothet. 27. fieri permutata materia ab vno loco in alium locum cerebri: ex quo loco multi desumunt auctoritatem ad probandum, facultates principes esse loco distinctas. Sic igitur distinguens Locos inter se.

Quarta pars signorum.

Distinguens etiam Phrenitidem ab effectibus similibus non difficili negotio.

Ab Infantia quidem, sola febre: Nam infans eodem modo de litant, quo phrenitici, sed absque febre.

Apseudo delitio distinguitur Phrenitis ex continuitate delirij.

Distinguitur etiam à Delirio ex Septo Transuerso; quia in Phrenitide spiratio est magna, & rara, in Delirio ex Septo Transuerso est celer, & frequens. Præterea cum delirium sit ex septo transuerso, adest dolor, circa eam partem, & hypochondrii tensio, ut scribunt Hipp. & Gal. 1. progn. 28. & repetit Gal. 5. loc. aff. 4.

*Quinta pars signorum, quae continet
Prognostica.*

Prognostica sunt salutis, aut moris; longitudo, aut breuitatis; permutauonis, aut resolutionis.

Et perniciosam quidem Phrenitidem explicauit Hippoc. 2. prorrh. 3. 7. 3. 8. 3. 9. contextum scribit Nigra euomentes, inappetentes, quorum oculus est clausus, & feror: vertiginosos, decolores, imbecilles, refrigeratos minimè esse medendos, &c. Ceterum nō tantum nigra euomentes, sed etiam ruginem, perniciosè habere ex 1. in 1. prorrh. 10. 3. in 3. Epid. 7. ostenditur, exemplo cuiusdam Phrenitici qui obiit quarta die cum vomitu virulentos: Vno verbo, Omnia ea signa praua, quae ex facie, & oculis, ex decubitu, ex manuum gestulatione, ex dentium stridore proposuit Hippoc. inclusit à 10. prognostico ad 25. vsque lib. 1. Omnia inquit sunt prognostica certa futuri mali euentus in phreniticis, sicuti contra omnia opposita bonum pollicentur exitum.

N.B. Tria obseruari signa salutaria: Primum, oculi si liaciem nunquam fuisse ablatam, Secundum, illos semper bene habuisse ad omnia oblata, siue essent cibi, siue medicamenta, Tertium vires vitales firmas existisse. Habui deploratissimum Phreniticum, qui fuit à me sanatus Venetijs.

Signa longitudinis, aut breuitatis capiuntur ab ipsa forma Phrenitidis: Nam quae est legitima ex sanguine bilioso, aut sanguine puro, plerumque non pertinet septimam. Spuria potest attingere 14. docente Gal. 3. de dieb. decret. ca. ult. quoniam si fuerit melancholica potest perungere 20 ut patet in casu vxoris Dealcis 3. in 3. Epidem 83 (86.)

Permutatur verò Phrenitis interdum in Lethargum, quod facile cognoscitur, quando delirium desinit, & pro vigilia sopor succedit.

Permutatur ad Abicellum, quod cognoscitur si aut in septima, aut 14. febris augeatur superueniente rigore, aut horrore; deinde si inaequalis color totam occupet faciem, ut modo impenit sit rubra, modo pallida, atque eodem tempore alia omnia symptomata exacerbentur.

Quod si tendat ad Resolutionem, paulatim omnia mirescunt symptomata.

*Therapia Phrenitidis. & primum quidem
in principio.*

VT Phrenitidis curatio rectè procedat, in quatuor illam distribuam partes, prout 4. sunt inflammationum tempora: Initium, seu Principium, Augmentum, Status, & Declinatio.

Et quia per Principium Galen. lib. de temporibus morb. cap. 3. intelligit totum illud tempus, in quo humor confluit, per Augmentum, in quo fluxus humor putrescit, per statum tempus, in quo humor in pus conuertitur, aut digeritur, per declinationem tempus, vel euacuationis puris, vel digestionis: Nos principij nomine hoc tempore

A duo intelligimus, Primum totum illud tempus, in quo fit fluxio, Secundum illud tantum tempus, in quo incipit fluxio. Quantum necessaria sit illa distinctio, colligitur ex curatione. Hæc secunda acceptio Principij colligitur ex Galeno de inaq. interp. c. 3. ita ut ex illo loco possimus colligere, Principium distingui in quatuor alia tempora, quorum primum est illud, quo materia confluens replet vasa partium maiora, arterias, & venas; Secundum tempus Principij, quod potest vocari incrementum, est illud, in quo replentur vasa non solum maiora, sed etiam minora vtiq; ad minima. Tertium Principij tempus, quod potest dici status, est, in quo materia transfunditur extra vasa, replet omnia spatia inania, & imbuit membranas carnes, ligamenta. Quarta declinatio vocabitur, cum hæc materia euacuari, aut digeri incipit.

His sic constitutis nomine Principij intelligo primam principij partem, in qua arteriæ maiores, & venæ replentur. Hoc tempore necessaria est foris Euacuatio, Reuulsio, Repercussio, Interceptio.

Euacuatio primum fit sanguinis missione per sectam venam, dummodo vires consentiant, omnium consensu: Sed de Tempore est aliqua difficultas, & ambiguitas, dum Act. ex vna parte, & alij cum eo post quartum diem minimè consulunt sectionem venæ: Aretæ. 1. curan. acut. c. 2. cum videret Phrenitidem aliquando quarto die incipientem concedit secari venam vsque ad sextum, sed si in 6. aut 7. inquit, delirium inchoet, est delirium criticum, venaq; non est secanda.

Falsa tamen hæc est sententia: Incipit aliquando phrenitis post septimam ex transmutatione vnius inflammationis in aliam. Ego vidi Venetijs in nobili muliere pleuritidem in septima die in Phrenitidem permutatam, quæ etiam obiit Phrenitica. Hinc Diocles apud Cælium Aurelian, vires ipsas respiciens firmas, etiam octauo venam secat, & sanè si Hippoc. Anaxioni venam secuit octauo die in pleuritide, cur non poterit secari in Phrenitide constantibus viribus? Itaque dummodo vires consentiant, etiam si Phrenitis incipiat, post septimam licei venam secare.

De loco magna est ambiguitas, primum propter ægri inobedientiam: nam delirantes brachia non porrigunt, imò contrahunt; vnde Alex. Trall. & Paul. Aeg. quos Recentiores sequuntur, in tali casu secant venam in fronte: quod tamen in Principio mali mihi nequaquam probatur, In Principio opus est reuulsione, vna à frontis euacuat ex loco affecto; præterquam quod non inuenio quomodo ille phreniticus, qui brachium chirurgus nō porrigit, lubens, ac volens venam frontis aperiri fiant.

Si dicant, ligandus est: potest etiam ligari ad secandam venam in cubito,

Quod si hoc fieri non possit satius est præcipuè in obesis, & mollioribus corporibus, cucurbitulas adhibere scarificatas extremis tantum partibus, & distantibus à capite,

Suppress. Sed oritur dubitatio utrū suppressis mensibus **A** iterum sanguinem mitto, vel per sectam venam, vel per cucurbitulas, aut hirudines.
hemor- & hæmorrhoidibus superiores, an inferiores ve-
rhoid. nens. & næ secundæ sint, Recentiores censent superiores
 tanquam capiti proximæ, quod minime probatur, duas ob causas; Primo, quia Gal. lib. de cur
 per sangu. miss. c. 19. in omni mensium suppressio
 ne inferiores venas secandas esse consulis: Secun-
 do, quia cū in præsentia sermo sit de principio;
 de reuulsione scilicet tempore, dicebat Galenus ibi-
 dem pro reuulsione humorem longè à parte af-
 fecta esse retrahendum; Itaq; si superiores secen-
 tur, sanguis, qui fluere debebat ad iterum, retra-
 heretur ad venam cauiam ex qua sit totus sangui-
 nis motus in caput: Satiùs igitur erit primùm ve-
 nas inferiores aperire, & si delirium augeatur,
 mox etiam superiores, utpote, quæ & reuellere, &
 deriuare possunt.

Si autem quærimus: Vtrum secanda sit Ceph-
 lica, an Media, au Interior, videndum est virum
 iam caput aliqua ex parte si repletum, nec ne vbi
 enim repletum fuerit, Cephalica est secanda, Ga-
 leno auctore 4. de loc. aff. 10; Si non sit repletum,
 aperiri potest media, aut basilica: In assuetis ad
 euacuationes hæmorrhoidum, tantundem valet
 hæmorrhoidum apertio, quantum venæ sectio, 4.
 Tuen. Val. 4.

Quòd si in sanguinis abundantia, atq; impe-
 tu in caput post sectam venam, aut cucurbitulæ
 affigantur, aut hæmorrhoides euacuentur, absq;
 etiam consuetudine præcedente, æger iuuabitur.

Quanti- De quantitate et si Galenus 1. aph. 23. voluit **D**
tas san- in maximis inflammationibus, ac doloribus, &
guinis. febribus ardentissimis, quæ tria inveniuntur in
 Phrenitide, mittendum sanguinem vsq; ad deli-
 quium animi nihilominus conueniunt omnes
 Medici id minime agendum. vires enim facili
 concidunt, & propter vigilias, & propter immo-
 dios motus, & quòd plerunque cibum renuant,

Itaq; in sanguinea mittatur sanguis vsq; ad lib
 j. vel ad vnc. xvj. si corpus sit plethoricum.

In aliis spuris mittatur ab. vnc. vj. vsq; ad x. E
 plus minus, pro varietate patientis. Hæc de san-
 guinis missione.

Abstina- Quod a Medicamenta; Conueniunt Recentio-
cia. res nonnulli cum Auicenna statim ab initio pur-
 gatione vitendum, eo quod materia turgat, & a-
 cutus sit morbus: In acutis autem morbis eadem
 die medicari 4. aph. 10. præcipit Hipp.

Sed tamen mihi minùs placet hoc consilium:
 Primo, quia medicamentum electiue purgans, si **F**
 exhibeatur in magna copia, vires deiecit, & cor-
 pus reddit calidius, si in mediocritate ut non mo-
 ueat, transit in naturam humoris in corpore exi-
 stentis, ut docuit Gal. 3. simp. 24.
 Ideo ego hæc medendi ratione uti consueui, quæ
 optimè successit. Vt leniente, sed alternis die-
 bus repetito, vsq; quo fluxionis signa appareant,
 in die intermedio vtor clystere; & si opus fuerit,

iterum sanguinem mitto, vel per sectam venam,
 vel per cucurbitulas, aut hirudines.

Leniens, autem quo vtor est

Syr. ros. sol. ad vnc. iij. cum

seri Capr. lib. iij.

Aut Cassie drach. x. cum

Pulp. thamarin drach. iij.

deinde superscribant seri lib. j. vel ij.

Clyster, qui imponitur, non debet esse acris,
 sed mollis ex iure, aut decocto hordei, & viol. sac.
 caro, oleo viol. & vbi alius sit durior, possunt ad-
 hiberi

Cassie extr. drach. vi.

Sic quotieie procedo, vsq; quo fluxionis notæ ap-
 patent. Nec quis obiciat, perturbari concoctio-
 nem: dum enim humor influit, concoqui non
 potest, sed tantum inflammationem auget, & pro-
 pterea hoc ipso tempore ego alius non vtor syru-
 pis, sed solo sero, dum modo illud haberi queat:
 quòd si non habeatur cadinum, accipio vaccini
 destillatum; in defectu viridisq; vior syrupis refri-
 gerantibus, qui humorem biliosum in caput con-
 fluentem prohibeant & interceptant.

Recipe syr. de nymph.

de papauer.

Violari simp. an. vnc. sem,

Aquar. violar.

Nymph.

Plantag. an. vnc. i.

Vel si magna sit visus an. vnc. iij.

M. pro syrup.

Placet etiam syrupus de granatis, rhob. de ri-
 bes. Eodem tempore Reprimentia administran-
 tur, quæ simul somnum concilient, in quo maxi-
 mè sperandum; ideo in hunc usum veniunt de-
 cocta, quæ sunt ex viol. nymph. folijs, vires hyos-
 cyami, mandragoræ: hæc decocta rasis capillis
 capiti admoventur, aut per modum lotionis
 & perfusionis, quod summopere laudat Rhases
 noiter, aut per modum fomenti spongiis, aut
 pannis.

Potest etiam fieri Linimentum, quod linteis co-
 imbutis capiti admoventur. Erit autem tale.

Recipe Mucilag. psyll

femin. oycon. an. vnc. i

Ol. viol.

rosat. compl. an. vnc. i & sem.

succ. La. Luc. vnc. i.

Succ. citr. aut limon. vnc. i. M.

Hæc in principio, etiam si admoueantur actu
 frigida æstiuo tempore, nihil obstat, præcipue si
 Phrenitis sit exquisita; Sed vbi iam aliquid humo-
 ris influxit, vel Phrenitis est spuria, nunquam a-
 ctu frigida sunt hæc adhibenda. nam ut dicebat
 Aet. membranæ iam inflammata frigida non su-
 stinent; propterea ex sententia Aretæi, & eiusdem
 Aetii conuenit misceri in Phrenitide spuria, & in
 materia fluxa, serpillum, sisymbrium, & ut voluit
 Rondeletius etiam chamæmel; anethi; meliret.
 Rhases viebatur hoc tempore oleo ros. cum lacte
 Et hæcenus de curatione Phrenitidis circa in-
 tia.

Dieta in principio.

Distincta ratio curandi Phrenitidem multas soluit contradictiones, quae passim apud Scrip-
tores versantur, non modò circa instrumenta
Chirurgica & pharmaceutica, verum etiam circa
Dietam: has omnes in vnum collectas videre
est apud Gentilem. in comment. quos habet in
Auic. super hoc capite de Phrenitidis curatione:
Nos vero longas illas pratermittentes quaestiones
sola distinctione curationis Phrenitidis per sua
tempora omnes soluimus ambiguitates: & primo, B
cum circa viuendi rationem quaeratur, vtrum aer
debeat eligi frigidus, vel calidus, vtrum potus
debeat esse frigidus, vel ne: Resolutio est, Circa
Phrenitidis initium aerem frigidum esse eligen-
dum, & etiam potum: in augmento & statu vtrū-
que potius ad caliditatem vergentem: in princi-
pio autem tenuis sit victus, sola pituitosa, aut pa-
natella cum emuls. semin. melon: Amygdalatum
prorsus prohibeo, quanquam tussis adit, eo quod
caput repleat. Potus sit aqua orderi, aut destilla-
ta ex eichorio, aut endivia, cum vino granator: C
Et haec de Phrenitide circa initia.

Curatio in augmento:

Vbi iam, vsque adeo facta sit fluxio, vt spatia
quoque inania sint repleta, opus est euacua-
tione materiae iam in capite collectae: non tamen
pratermittenda sunt reuellentia, neque modera-
te reprimentia.

Sang.
missio.

Pro euacuatione materiae in capite existentis
conuenit sectio venae frontalis, aut si materia ad na-
res inclinet, aperienda sunt venae narium aut
scalpello, aut seris equinis, non sanguisugis, vt a-
lias docui, periculum enim est, ne sanguisuga as-
cendat, haemorrhagiamque excitet, quae nullo
modo supprimi possit. Conueniunt quoque hiru-
dines venis temporum, & post aures applicitae.
Aer. vtitur magna cucurbitula scarificata, qua
libri. sanguinis detrahit.

Reprimentia debent esse digerentibus mista:
idecirco oleum rosae, chamomel. misceatur: aut fo-
mentis propol. ex viol. rosae, hyoscyamo addatur
chamomelum, puleg. silimbrum. E

Reuulsione frequentes esse debent per frictio-
nes, ligaturas, balnea aquae calentis, & tandem per
Vesicantia, quae etsi non careant difficultate, mi-
hi tamen probantur, & rationem potestis legere
in meo 1. libr. de phoenig. Neque hoc tempore
omittenda est illa euacuandi ratio, de qua antea
dixi, per clysteres, & medicamenta lenientia be-
nigniora. Etenim quanquam materia fluxa sit,
tamen, quando iam incipit putrescere, & incipit
augmentum vniuersale, in quo propter putredi- F
nem & ebullitionem semper noua fit materiae ac-
cessio, noua semper debet esse reuulsio hanc e-
nim ratione poteritis prohibere conuersionem in
flammanonem in abscessum, quod aliequin perni-
ciosissimum est.

Hoc ipso tempore prohibenda est larga frigi-
de potio. Dicebat enim Galen. 9. meth. c. 1. frigi-
da potuinem suspectam esse, cum aliquod praeci-

puum membrum inflammatione laborat: nam
ex frigida inflammatio induratur & in scirrhum
transit. Itaque, etiam si in coena, & prandio non de-
beat prohiberi vinum, vel alterum cyathum frigi-
dum, larga tamen potio est prohibenda.

Curatio in statu.

Accedente statu localib. medicamentis agē-
dum est, quae potius digerant, quam reprimant:
Dico (potius digerant, quam reprimant).
quia relaxantia, & digerentia, vt pote quae praeci-
bent fluxui occasionem, sola nunquam sunt ad-
mouenda. Antiquiores Graeci, & Arabes nulla no-
uerunt alia medicamenta, quam olea, aut empla-
stra, vel fomenta, & cerata, de quibus memini in
tractatu de dolore capitis, sed Latini Recentiores
vt Gilbertus Anglicus, quem sequuntur Nicol.
Florent. Gentilis, Matth. de Grad. &c. inuenerunt
aliud digerendi modum per omenta animalium,
aut pulmones, aut per ipsa animalia exenterata, si-
ue sint canes, siue pulli colubini. Accipiunt enim
haec animalia secundum spinam, seu dorsum se-
cta, & sic calida capiti apponunt, & vt habeant
aliquam vim somni conciliandi, & nouam pro-
hibendi fluxionem, inspergunt vnc. 3. aut vnc. 1.
& sem. pulueris hyoscyami.

Pariter pulmones calentes capiti imponunt, si-
cuti & omenta, addentes ad repercussionem, aut
op. rosae, vel calefacientes hos puluitones in deco-
cto ros. viol. chamomel. puleg. atque aliorum id genus.
Hanc operationem vnus Q. Seren. Sammonius
ex antiquis Medicis nouit, neque enim apud vllū
Graecorum, aut Arabum huius remedii factam
esse mentionem inuenietis. Q. Seren. sic scribit.

Conueniet calidis pecudum pulmonibus apte
Tempora languentis medica redemere corona.

Debent autem huiusmodi pulmones, siue omē-
ta, aut exenterata animalia iugiter Symplicii ad-
ministrari, ita vt haec pars ne momentum quidē
sit absque hoc praesidio.

Hoc temore Alex. Trall. Vinum concedit, nec
absque causa, dum fuerit oligophoron, tenue: nam
vires confirmat, & digestionē humoris adiuuat.

Symptomatum quorundam curatio.

CAeterum quibusdam symptomatis occuren-
dum, quae plerumque ipsum patientem iugu-
lant. Primum est vrinæ suppressio obliuiscuntur
enim vrinam reddere, cui prospiciendum est fre-
quenti compressione circa pubem facta manu cali-
da, aut oleo de capraribus, aut chamamelino in-
uncta: Conuenit etiam spongiam calentem deco-
cto pulegii, ononidis, & parietariae imbutam huic
loco apponere.

Nota) Ad reddendam vrinam oleum de scor-
pionibus est praestantissimum.

Occurrendum est somno etiam, quem concili-
are oportet: Conciliatur autem intrinsecus exhi-
bita post cenam

Syr. de papau. vnc. i. vel. vnc. i. & sem.

Cum Aq. viol. & nymph. vnc. ii. vel. iij.

Idem praestat emulsio extracta ex semin. papa-
ueris alb. ad vnc. sem. aut drach. vi.

Et

in ing sup
pressio.

Vigilia

Et cum vigilis, ac furor sit ingens, ad opiatu A est deueniendū. Dentur itaq; aut drach. sem. Requies Nicol. aut serup. j. Philon. Rom. vel pilul. de Cyp. gl. f. Tentanda tamen prius sunt extrinseca. Potest fieri linimentum ex croco, opio, vino odorato, & aqua viol. quo nates mungantur, & lineto eo imbuto, fions, & utraq; tempora cingenda sunt, & cum sonitus iam profundus accessisset videatur, lauanda erit pars vino odorato, in quo capillorum ebullierit ad corrigendum opij vitium.

Gentilis inter cetera somnifera Ranas proposuit, quandoq; viuas temporibus appositas, aliquā B do autem sectas; quo consilio ductus, prorsus ignorante, quia putauit Ranas habere facultatem Torpedinis, quod scil. vt viua torpedo sonitum concitat, ita & ranæ, quod sint animalia frigida. Hæc agenda cum phrenitis ad resolutionē tendit.

De suppuratione.

Sed si ad suppurationem tendat, quamuis huiusmodi permutatio magna ex parte interliciat, vt ego ipse obseruaui, tamen aliquando factus abscessus, & disruptio, natura inuenit viam purgandi sanis per aures, oculos, nates. Sic scribit Hipp. 6. aph. 10. Caput dolenti & circumdolenti si fames, aut aqua, aut &c. Ego quoq; vidi Venetijs inuenem inueneratum Phreniticum, cui subito abscessu purgata est sanies per loca iam proposita & conualuit. Itaque cum eo tempore, quo Phrenitis deberet mutescere, incipit exasperari, vigor accedit delirium, & febris augetur, suspicandum est de suppuratione; propterea adiuuanda est suppuratio hoc Emplastro.

Recipe radia. albi coctar. & per cribr.

transmiss. vnc. ij.

Mucilag. sem. maluæ.

radic. alb. an. vnc. i. & sem.

Farin. sem. lin. vnc. vi.

Ol. camomelini

de sem. lini an. vnc. ij.

Decoct. malu.

alb.

semin. lin. q. s.

M. f. Emplast.

Calidum caput imponatur, & semper ibi detineatur. Vt vero disruptus abscessus, vtendum sit mutamento, & illis quidem validis ex pipere, & vitæ, melle, el. h. b. ang. pulueriz. & in nates suffratis, & cum ad resolutionem mouentur, vt factus ruptus abscessus, claudenda sunt nates, nam impedire remanimento, maior fiet motus in abscessu.

Disrupto abscessu, permittendum est opus nature ipsa enim vias inuenit ad purgationem.

Et post disruptos abscessus solet relinquere F melancholicas fatuitates, & aliæ de quibus suo loco

Quando Phrenitici fuerint furiosi, iubete eos ligari, & caute ne accedatis, quia aliquando interficiunt Medicos: Et Venetijs noui quendam Phreniticum, qui duos sacerdotes interfecit; Accedite, quod ex huiusmodi ligamētis sit diuersio materię a capite, & eo tempore, quo Phrenitici habent ligaturas, ferè nunquam delirant; & habui

Venetis Iuuenem ferocissimum qui dum erat ligatus, non delirabat, & me, cum eum visitassem, rogauit, vt liberari iuberem, & solui vinculis; qui me decepit: Putabam enim, cum me nomine vocaret, iam sanum rediturum sed solutus subito Phreniticus iterum factus est; & rursus ligatus comedit crumenam cum numis, quæ erat sub puluinari, atq; totum puluinat: idcirco cauti accedatis ad tales delirantes, & faciatis, vt Phrenitici prius ligentur, antequam eos visiteris.

DE LETARGO

Cap. IV.

Post phrenitidem sequitur Lethargus, qui est affectus ipsi oppositus: Latins dicitur Veterinus, Auicennæ Sirsen Frigidum; tamen Rhases in hoc 9. ad Almanf. huius mentionem non fecerit, placet tamen hoc in loco huius naturam, causas, signa, ac curationem proponere. Est itaque Lethargus symptoma potissimum facultatis memoratricis, sed subinde operationum omnium animalium diminutatum cum febre continua ex pituita putrescente cerebrum replente. Definitio.

Dicitur symptoma potissimum facultatis memoratricis: quandoquidem nulla est facultas, quæ in Lethargo magis lædatur; atq; ideo ἀβάρω Græcis dicitur, quod inertem, seu otiosam significat obliuionem.

Differt autem à læsa memoria propterea, quod alix omnes animales actiones imminuantur, &c. Idcirco Gal. lib. de diff. symp. c. 3. Lethargum inquit esse vitium imaginationis imminutæ: Et 4. de præfag. ex puls. c. 8. dicebat in Lethargo præter alias actiones læsas, esse potissimum sensum communem: propter quod Lethargus est affectus somnulosus. Propterea Gal. 4. de præfag. 8. Intemperiem inquit frigidam & humidam comatosum facere affectu, cui si putredo accesserit, lethargus fit.

Læditur etiam discursus simul cum memoria, vt colligitur ex 3. de loc. aff. c. 5.

Causa immediata seu coniuncta.

DE causa Lethargi magnam inuenio dubitationem, cum ex vna parte Paulus, Act. Alex. & plurimi Recentiorum nullam aliam putant lethargi causam præter intemperiem frigidam, humidam cum materia pituitosa, sed putrescente. Hoc colligunt ex Gal. 3. aph. 30. 1. in prophet. 1. 4. de caus. puls. c. 13. 13. meth. 2. 1. 4. de præfag. ex puls. 8. quibus in locis nihil aliud. velle videtur Galen. quàm Lethargum sine tumore, & inflammatione consistere, & ex intemperie cum materia proficisci.

Ex alia tamen parte, Auic. inquit Lethargum apostema esse frigidum qui habet pro se rationes auctoritatem, experientiam.

Rauonesii. Nam si Lethargus est perinde acutus morbus, atq; Phrenitis, vt colligitur ex Hip. 1. acut. 1. 8. 2. de morb. vbi scribit, Lethargum 7. die finem suum habere, qui potest fieri, vt morbus ex intemperie & materia frigida sit vsq; adeo acutus si inflammatio non adsit 2. Adde quod Lethargus magna ex parte per statordes iudicatur. At

N.B.
Torem
p. spiritus
et ligam
et du
fluit ob
tensum.

parotides, ut docuit Galen. 3. comp. loc. 1. (8.) sunt de genere inflammationum, ergo non possunt iudicare, & soluere intemperiem frigidam cum materia frigida 3. Adde quod Phrenitis permutatur in Lethargum, consumptis tantum partibus tumoris calidioribus, ut colligitur ex 6. in 6. Epid. 8 & 3. in 3. Epid. 45. sed sic est, quod Phrenitis est tumor ergo & Lethargus 4. Accedit, quod hic affectus plerumque sanguinis missione curatur, & reprimuntur medicamentis, quæ non conveniunt in materia frigida: Curari autem ira docuit Galen. 13. meth. 21. §. Denique hic affectus non contingit senioribus, sed ætate consistentibus, auctore eodem Hip. & Gal 3. aph. 30. ergo non potest fieri ex simplici pituita, sed sanguine pituita permixto, ac propterea ex inflammatione, sed spuria.

Auctoritates: Confirmantur hæc omnia Hip. & Gal. testimonio. Galen. quidem lib. de caus. morb. cap. 3. Veternum inquit, fieri ex densitate cerebri; ac densitas, ut ipsemet docet, fit vel obstructione, vel vasorum suffocatione: Quocumque modo, causa lethargi in solam intemperiem cum materia potius morbo instrumentali, & inflammatorio referri non potest.

Idem 7. aph. 76 Lethargum explicatissimis verbis inquit esse abscessum factum in puppi. i. posteriori parte cerebri: nonnulli transulerunt vocem abscessus in apostema: utique res se habet, tumor per hæc verba explicatur.

Et propterea Hip. 3. de morb. & in Coacis prætionem. Lethargum, inquit, desinere ad suppurationem, præcipue ad suppurationem pulmonum.

Experimenta: Hoc ipsum confirmatur duplici experimento: Alium proponitur à Dodoneo in obitu Med. c. 7. qui scribit, mulieri Letargicæ post mortem sublato craniò abscessum esse inuentum in anteriori cerebri parte. Alium experimentum vidi ipse in mea vxore, quæ incidit in lethargum deploratissimum; dum erat iam propinqua morti, superueniente tussi, incipit ad seredire, & postea pus exiit ex ore, & alijs partibus: & antea laborauerat febre hectica: & erat tanquam pelvis & ossa, & nunc est sana.

Itaque ex his colligimus, Lethargum non tantum fieri ex intemperie cum materia frigida & humida, quantum ex inflammatione, sed spuria ex sanguine scilicet crasso admodum, & pituoso.

Non inficior tamen, posse aliquando reperiri formam lethargi spuriam. Nam sicuti docuit Galen. de caus. symp. 7. dari deliria per consensum, & per essentiam, ita potest aliquando dari Lethargus, spurius tamen per consensum, in quo nullus aderit tumor cuius meminjt Galen. 17. de V su part. 2. cum scribit, Lethargum fieri, aut per consensum aut per essentiam: & de eodem Lethargo meminit Aetius ex sententia Pussidouij, cum inquit, Lethargum fieri aut per essentiam, aut per consensum à septo transuerso, vel ab alijs visceribus. quinimo sicuti constituit Galen. in 2. de caus. symp. 7. deliria ex intemperie calida cum materia calida, cerebrum replente absque inflammatione, ita quoque licet constituere lethargum spurium ex intemperie cum materia absque inflammatione.

Cum autem verus & legitimus Letargus fiat

A ex inflammatione cerebri spuria, per Cerebrum ipsammet intelligimus substantiam, subinde autem membranas. Replentur autem & spatia inania, & ipsamet substantia, ita ut pro magnitudine tumoris aliquando ipsi etiam cerebri ventriculi, comprimantur, sicuti minore existente tumore non comprimuntur, ut etiam in phrenitide, contingit, & potissimum hectica phrenitide, in qua tamen cerebrum sit tumore affectum, non tamen ventriculi comprimuntur, ut caros vel apoplexia sequatur. Et hoc dictum sit, ut resoluator obiectio quoddam, qui presente tumore in cerebro statim concludunt debere fieri ventriculorum compressionem, quod quidem, ut dixi, falsum est.

His sic declaratis, ne superficialiter tantum Lethargi naturam intelligatis, & ut simul naturam habeatis somni, comas, & cari, de quibus affectionibus singulatim tractant Græci; idcirco hoc in loco decreui horum naturam aperire, ut deinde sciatis, qualis sit hic somnus profundus, qui cum Lethargo connectitur, & hoc etiam facio, ut fugiamus longitudinem, cum vnica sit lethargi, & harum affectionum curatio.

DE SOMNO INGENERE

Cap. V.

Somnus igitur vniuersaliter nihil aliud est, auctore Galen. 1. de caus. symp. 8. quam requies sensuum, seu, ut dicebat Arist. lib. de som. & vigil cap. 1. est vinculum sensuum: Non est tamen vique adeo requies & vinculum, quin in somno naturali aliquid etiam si debiliter sentiant.

Fit autem hæc sensuum oisitas spiritibus animalibus calore, & sanguine ad suum principium reductis, ex sententia Gal. v. aph. 1. ut propterea Hipp. 4. in 6. Ep. 6. 14. iure scripserit, Dormientes intus calidiores, extra frigidiores esse, & propterea statim etiam vnusquisque intelligat nomine spiritus intelligi & animale, & viralem, & naturalem, si quis est: nam dubitat Gal. 2. meth. c. 5. Vnus ergo est somnus in genere.

De speciebus seu differentijs somni, & primum de Naturali.

Am ad species venio, quæ diuersificantur ex diuersitate causarum. Nam spiritus retrahuntur vel ob causam naturalem, vel non naturalem vel præter naturalem.

Causa naturalis est triplex: Prima, Regeneratio spiritus animalis, qui aliqua ex parte in vigilia & motu consumptus est: Hac ratione Auerr. 2. collect. spiritus in somno ad centrum reductos militibus comparabat contractis, qui ad Ducem, vel ad signa reducuntur, ut resectis, ad pugnam fortiores redeant. Secunda causa est concoctio: Nam in somno calor retractus fortiolem facit concoctionem, celeriolemque. Tertia causa est humectatio instrumentorum sensuum: Nam cum in vigilia, & actione exsiccentur, retractis spiritibus, & calore humectantur. Hac ratione fit somnus verè naturalis.

Non naturalis somnus, qui tamen non est ad huc præter naturam, fit aut ex caussis nimium siccantibus, & spiritus digerentibus, aut ex nimium humectantibus: illæ cogunt spiritus retrahi, ut reficiantur; hæ verò prohibent, ne iam refecti possint ad sensoria confluere.

Causæ nimium exsiccantes sunt aer æstivus, balneum calidus, nimius motus, vigiliæ diuturnæ, nimia Venus, inedia, evacuationes modum excedentes, ira, mæror, cura: Nimium humectantes, aer ipse humidus constitutio humida, cibis copiosus, potus vini mesacioris, onium, excrementorum retentio, usus humectantium, ut balnei, amygdalarum, &c. id genus: Hæ omnes causæ possunt quidem somnum facere longiorem, & profundiores, sed qui neq; ad lethargum, neq; ad alium præter naturam affectum pertinet: Quandoquidem isti si vocentur, aut concutiantur, statim excitantur, & excitati integrè valent.

De somno præter naturam.

Hactenus de somno naturali, & non naturali, nunc autem de somno præter naturam dicendum est. *ἡ ἀναστροφή* vocatur hic affectus Græcis, Latinis sopor, Arabibus subeth, vel subecia. Distinguitur autem à Gal. 2. in 1. prophet. 2. 5. in tres differentias, quarum primam simpliciter somnum appellat, secundam proprie dicit *ἡ ἀναστροφή* tertiam vocat *κατάφρα*. Distinguntur hæ differentie inter se forma, & caussis: Forma: Nam Somnus absolute acceptus aut modum excedit naturam in sola prolixitate, ut notavit Gal. 2. aph. 3. aut excedit in longitudine, & profunditate ita tamen, ut vocati & agitati excitentur tandem, & consueta sensuum officia exercent. Hoc colligitur ex 2. in 1. prophet. 2. 9.

Coma autem dicitur, cum somnus non modò est longus, & profundus, verum etiam usque adeo est profundus, ut agri vocati, excitati, & concussi, puncti, & vellicati vix respondant, & cum primùm oculos aperiunt, vel aliquid loquuntur, iterum in somnum relabuntur.

Caros autem dicitur, quando agri etiam vellicati, & puncti nullo modo excitantur, aut loquuntur, aut oculos aperiunt.

His tribus somni differentiis propositis, videndum est, qualisnam lethargo conveniat, quod si, si causæ singulorum explicentur.

Causæ somni præter naturam, & singulorum eius specierum.

Somnus igitur in prima significatione habet pro causa aut solam humiditatem excellentem, quæ prohibet transitum spirituum ad instrumenta sensuum, ut docuit Gal. 2. aph. 3. 4. acut. 4. ubi hunc somnum vocat Cataphoram 1. in 3. Epid. 7. ubi eundem vocat Coma, aliquando fit ex humiditate frigiditati connexa, ut 2. in 1. prophet. 2. 9. Sed frigiditas non est signis, nec momenti magni: nam intensa frigiditas facit Coma, & Carum.

Hæc humiditas aliquando est primaria in cerebro, nonnunquam transmittitur ab infernis partibus, ut à ventriculo dulci pituita repleto, quam inferre somnum docuit Galenus lib. de myliis. cap. 11. & præcipuè cum circa os ventriculi abundaverit, Gal. teste lib. de caus. sympt. cap. 7. Multitur quoque vapor humidus ab intestinis, pituita repletis, potissimum quando vermes adfunt; idcirco pueri aliquando in somnos longos ex hac causa incidunt: denique ascendit ex viero, & toto corpore, præcipuè circa accessionum febrilium initia. Galen. 2. aph. 1. Et hætenus de somno præter naturam, qui tamen nihil commune habet cum Lethargo: etenim neq; continuus est, neque usque adeo ægre excitabilis patiens in hoc somno, sicuti in lethargo.

DE COMATE

Cap. VI.

Itaque transeo ad Coma: Hoc coma ex Gal. 1. in 1. prophet. 1. & lib. de com. c. 2. & 3. duplex est unum Vigil, alterum Somnolentum: Vigil. Græci vocant *ἡ ἀναστροφή*, Arabes Sahara, Subecia Somnolentum verò *ἡ ἀναστροφή*, Arabes Subefara: Acutius has comatis differentias explicavit sub nomine Catoches, quod etiam fecit Paul. in principio illius capituli, sed Catoches est alius affectus.

Cuma seu Cataphora vigilans est, in qua patientes oculis conuiet, ut videantur somnum capere, cum tamen non dormiant; sed vocati oculos aperiant, ac statim delirent, & paulò post iterum, quasi dormituri iacent immobiles, & quieti.

Causa comatis vigilis.

Causa huius affectus est intemperies inæqualis, aut ipsiusmet Cerebri, vel humoris in cerebro contenti, quod colligitur ex Gal. 3. de loc. aff. 5. Est intemperies inæqualis cerebri calida, & frigida simul, quando scilicet febris ardens, inflammatio cerebri usque adeo vehemens, ut calidum nativum adsumat, tunc adest calor extraneus, cuius ratione coguntur vigilare: Adest defectus spirituum animalium, & caloris nativi, cuius ratione coguntur vigilare: adest defectus spirituum animalium, & caloris nativi, cuius ratione proni videntur in somnum, nec tamen dormiunt huius causæ meminit Gal. 3. in 1. Epid. 7. in casu Hermocratis.

Fit quoque hæc passio ex causa venefica potissimum calida, de qua meminit Gal. 4. de loc. aff. 2.

Eadem passio fit ex intemperie inæquali materię existentis in cerebro, & hoc dupliciter, aut quando simul adest materia sicca, & humida, ut est sanguis, & bilis, aut cum adest frigida, & calida, ut pituita, & sanguis, seu bilis: utroque modo fit coma vigil, auctore Gal. 1. in 1. pror. 1. & neq; hoc coma habet aliquid affinitatis cum Lethargo.

De Comate Somnolento.

Remanet Coma somnolentum, quod quidem esse Lethargi proprium docuit Gal. 2. aph. 3. & lib. de Comate, c. 2. & 2. in 1. prophet. 2. 9.

Caus.

Causæ.

Sed videndum est, quænam huius Comatis causæ sint, ut videamus, nunquid cum causis Lethargi conveniant. Gal. 1. de caus. symp. 8. 2. de loc. aff. vii. 3. loc. aff. c. 5. 4. loc. aff. c. 2. nullam aliā visus est nullæ comatis somniferi causam, quā insignem refrigerationem vel humectationem cerebri, siue hæc refrigeratio & humectatio sit in temperies sine materia, siue cum materia, sed si ipsa se res habet, hoc coma non poterit esse idem cum Lethargo, quem affectum ostendimus ex omnium sententia esse cum intemperie calida, si verum est, ut est verissimum, materiam Lethargi esse putrescentem, & omnis putredo caliditatem habeat annexam. Accedit ostendisse nos in Lethargo inflammationem adesse, quamvis spuriam. Quod si adest inflammatio, non potest consistere frigida intemperies: reliquum igitur est, ut deus Coma, soporiferum ex inflammatione fiat, & sanè si Gal. ipse Coma vigil. & soporiferum mediam constituit affectionem inter Phrenitidem, & Lethargum, eo quod sit particeps utriusque, qui fieri potest Phrenitidem, & Lethargum esse inflammationes, Comata autem, inter hos affectus media, esse sine inflammatione. Hoc maxime colligitur ex Hip. & Gal. qui 3. in 3. Epid. 45. 62. 63. ubi sequuntur de huiusmodi Comate, semper de eo loquuntur tanquam de affectu inflammationis, & propterea Aet. qui vocavit hunc affectum (ut dixi κατὰ τὴν, illum inquit esse Lethargo periculosiorem, at si est periculosior Lethargo, non potest esse affectus ex sola intemperie frigida & humida, aut materia consimili sine inflammatione, aut tumore, quæ longas constituunt affectus.

Obiectio. Sed dicetis: Qui fieri potest, ut Coma inflammationem sequatur? Nam si Coma est profundus somnus, & somnus profundus, teste Galen. 3. loc. aff. 5. & loc. cit. semper sit ex intemp. frigida, quomodo fiet hic affectus ex inflammatione.

Solutio. Facilis tamen est responsio: Somni causa, ut intellexistis, quamvis specie sit multiplex, genere tamen est tantum duplex, videlicet spiritus non tendentes ad sensoria, vel quia sunt consumpti (resoluti), & hæc est una causa, vel quia impeditur, & hæc est secunda. Impedimentum specie est multiplex; nam siue intente refrigeratum sit cerebrum, siue impense humectatum, vel insigniter obstructum, aut compressum, siue compressio fiat ex tumore siue ex cranio contuso, aut squama ossis, aut alia simili causa, semper somnus sequetur, hoc confirmo Gal. auctoritate (hæc intelliguntur de somno præter naturam.)

Quod somnus fiat ex obstructione, & densitate cerebri, colligitur ex libr. de morb. causis. 3. dum scribit, Veterum fieri ex densitate, siue densitas sequatur plenitudinem suffocantem, siue obstructionem. Idem Gal. 1. de art. 1. 22. v. 2. secutus Hip

A pocratis sententiam, qui dicebat, ex luxatione mandibularum, affectis musculis temporalibus, Soporem sequi dixit Soporem fieri ex inflammatione cerebro propter communicationem inflammationis factæ in musculis temporalibus. Idem Gal. 4. de loc. aff. 2. ex compressione cerebri facta inter cerebrandum, aut ex squama ossis alium dicit sequi Soporem.

Neque est quod quis dicat, posse quidem legi, qui Soporem ex compressione cerebri, quando nimirum cerebrum comprimit ventriculos, siueq; fieri. Caro, non Coma, ex cerebri autem compressione sola, absq; ventriculorum compressione Somnum fieri non posse.

C Obiectio enim nullius est momenti, quando quidem dummodo spiritus animalis aliquo modo prohibeatur, ne transeat ad instrumenta sensoria, necessario somnus sequitur, sed potest impediri non solum obstructis ventriculis, aut oppressis, sed etiam ipsa cerebri substantia; imò (quod magis est) artetis etiam carotidibus impeditis, ergo nihil refert siue impedimentum sit in una, siue in alia parte. Antecedens probō. Spiritus, ut transeat ad instrumenta sensoria, necesse est primum preparantur in plexu cerotide, ad quem mittuntur spiritus vitales, si spiritus vitales non mittantur ad hunc plexum, aut missi non perveniunt postea ad ventriculos, nonne frustrabuntur sensoria propria propriis spiritibus? Hoc est certissimum: nam propterea Gal. 16. de vl. part. ca. 1. 2. inquit, musculis temporalibus affectis soporem fieri, eo quod propter connexum, quem habent cum arteriis soporiferis, arteriæ ipsæ comprimuntur, & ideo scribit Hipp. de aer. au. & loc. Scythas incisissimis venis post aures, quæ sunt arteriæ, soporolos fieri, hæc ipsum dico de cerebri, antequam enim sensoria spiritus recipiant, necesse est transeant à ventriculis ad cerebri substantiam, quæ si fuerit compressa ex inflammatione, transitum non admittit, hinc fit sopor etiam in affectu inflammatorio.

D E C A R O

Cap. VII.

Tertia vitiosi Somni species Grecis κατὰ νότον cupata, ea est, in qua agri somno vix adeo profundi sepulti sunt, ut neque clamores, neque punctiones, aut vellicationes sentiant, idcirco hic affectus Gal. 3. aph. 5. totius corporis insensibilitas, & immobilitas dicitur, & propterea idem Gal. ut ostenderet in Caro imaginationem propriam tolli, de sympt. diff. 3. inquit, Carum esse paralyticam imaginationis, & idem 2. de artic. 2. inquit in Caro non modo tollitur sensus, & motus, sed & imaginatio, & discursus, & memoria: itaque vno verbo 4. de loc. aff. 2. inquit, Carum esse vitium omnium facultatum animalium sola spiratio non relicta integra.

Carus, duplex,

Illud tamen est notandum, in Caris aliquam A esse diuersitatem secundum magis, & minus, vt vnus exquisitus, alter spurius propterea dici possit. Exquisitus quidem descriptus est nuper time.

Spurius, in quo aliqua ex propositis conditio de est: sic scribit Fernel. lib. 5. pathol. cap. 2. aliquando in Caris memoriam seruari: sic etiam quidam reperiuntur Caris affecti, qui punctiones sentiunt & propterea membra retrahunt puncta, quo argumento coniectus sensum tactus in ea parte seruari: & ego (Auditores) noui virginem nobi B lem, quæ singulis diebus incidit in Carum, & in eo permanet duas horas; sentit tamen ligaturas, frictiones, cucurbitulas, & tamen moueri non potest.

Causa.

Causæ ipsius Caris partim sunt diuersæ à causis Comatis, & Lethargi, partim eadem, sed fortiores: Diuersæ sunt; nam in omni Caris ob C structio, aut desitas, aut subsidencia ventriculorum cerebri adest; priorum quidem, ac medii, non autem postremi, vt docuit Galen. 4. loc. aff. 2. Hæc obstructio aliquando fit ex materia crassa, & pituitosa, quæ per nares externi consuevit, in ventriculis retenta, Gal. lib. de instr. odor, circ. fin. teste (Et hic libet non est finitus). Aliquando autem huiusmodi obstructio fit à vaporibus ascendentibus aut à ventriculo aut ab intestinis, vel ab vtero, sicut in ea virgine, de qua antea dixi, aut à toto corpore, potissimum circa accessuum initia, vt pro D pterea illæ causæ, quæ faciunt Coma, si intenduntur, faciant & Carum; Intenduntur autem vel ratione copię, vel ratione qualitatis: ratione copię cum vsq; adeo abundant, vt ipsos obstruant ventriculos: ratione qualitatis, quando frigiditas intensior est, quàm frigiditas Comatis, ideo, quæ Carum facit, pituita erit vitrea, acida, sicut quæ Coma facit, dulcis erit.

Distinguitur etiam Carus à Comate ex causis comprimantibus, siue sit terebratio cranei importuna, siue ossis depressio ex contusione, siue squama ossis ex vulnere: istæ omnes compressiones sunt vsq; adeo valide vt ventriculos comprimant: hinc loco Comatis Carus sequitur.

Subsidencia quoque facta ex causa dolorifica, aut veneno, fortior est in Caris, quàm in Comate: ideo dicebat aliquando Hip. 7. aph. 5. eos, quibus concussus est cerebrum, mutos fieri, eo quod, vt Gale. in com. explicat, spiritus animales propter concussionis vehementiam contrahuntur, quibus contractis partes subsident, his igitur existentibus causis ipsius Caris, quæ partim conueniunt, partim discrepant à causis Comatis, nulla ex istis habet affinitatem cum Lethargo: ideo si aliquando Carus cum Lethargo connectitur, oportet, vt fiat ex inflammatione: & sanè Gal. & Hip. 2. de artic. 22. & 21. docent, Carum fieri inflammato cerebro per consensum muscu-

lorum temporalium, & neruorum inflammatorum: itaque Carus ex inflammatione potest aliquando cum Lethargo connecti.

Neq; est quod quis dicat, Gal. 13. meth. 21. ad differentiam Lethargi: Nam (vt intellexistis) Caris non est vnica causa, sed multiplex, & cum magna ex parte Carus sit vel sine febre, vel fiat tantum circa febrilium accessuum initia, iure Gal ad hoc respiciens dixit, Carum fieri ex materia non putrescente, quatenus scilicet plerumq; oritur ducit ex humoribus, aut vaporibus frigidis, & humidis tantum, & si non sint putridi, non tamen sequitur, quin possit etiam fieri ex inflammatione, & ideo cum Lethargo coniungi.

Nec obijciat aliquis: In Lethargo patientes sensum, & motum quandam retinere. In Caris autem nequaquam: Etenim, vt Carus auctus ita fit Apoplexiam, ita lethargus consummatus ex Comatoso affectu suscipit Carum, hoc dico, quia ego propria experientia vidi Lethargicos, qui in principio habebant sensum & motum, in processu vero temporis illos amisere: Videatis Galenum 5. de loc. aff. 1. qui scribit in Caris respirationem ledi, & tamen 4. loc. aff. 2. explicatissimis docuerat verbis, Carum in hoc tantum differre ab Apoplexia, quod in Caris spiratio integra seruetur. Hæc contradictio aliter conciliari non potest, nisi dicamus loqui Galenum 5. loc. aff. de Caris spurio transeunte in apoplexiam, vt pari ratione liceat quoque nobis dicere, Carum connecti aliquando cum lethargo.

Cap. VIII. Differentia lethargi, & causæ mediata.

His declaratis tam parent cuiq; differentia, & causæ Lethargi mediatæ. Differentia quidem nam Lethargus vel est proprius, vel improprius: Improprius est, qui à materia pituitosa putrescente, sed absq; inflammatione, oritur: Proprius vero, qui fit ab inflammatione spuria, qui trifariam diuidi potest. nam vel fit à sanguine pituitoso, mixto cum aliqua bilis portione, prævalente tamen pituita, & hic dicitur Coma somniferum; aut fit ex inflammatione pituitosa, syncera, sed inæqualiter cerebri occupante, & est Lethargus propriè acceptus, cui annectitur Coma; aut deniq; fit ex materia equaliter totum corpus cerebri occupante, ita vt dici possit Lethargus hecticus, sicut datur etiam Phrenitis hectica 1. in 1. prothel. 33. & huic Lethargo iungitur Carus, non Coma.

Mediatæ causæ facile colliguntur ex dictis: nam illæ omnes, propter quas sanguis pituitosus in cerebro coaceruatur siue sint excretionum suppressiones, siue intermissio exercitij, siue usus eorum, quæ augent pituitam, & replent caput, vt corpora, de quibus satis,

obiectio.

Solutio.

alio obiectio.

Solutio.

Signa diſſorum affectuum.

Signa alia ſunt Lethargi Incipientis, alia facti. Incipientis Lethargi ſigna ſunt, febris lenta, propenſio in ſomnum, ſomnus ſine ſomniis, vel quæ non poſſunt referri à patientibus, facies pallida, plumbea; mucus, & pituita ex naribus, & ore ſponte deſluunt; obliuiſio circa exacerbationes febrilium contingit: Capitis dolor grauis, & extenſi- uus; aurium ſonitus; oculorum hebetudo, tremor; vrina craſſa, ac cruda.

Factum Lethargum oſtendunt ſigna ab Hip. propoſita in prænot. Coac. his verbis: Lethargici ſunt æmuli, ſomniculoſi, tumidi, decolores; oculis omnino ſunt conuiuentibus; palpebras habet tumidas, facies circa vigorem febris rubicunda apparet, vena inflammantur; ore manent aperto; ſi quis cibum porrigat obliuiſcuntur illum deglutire. Cumq; Lethargus iam conſummatus ſit vel proprius vel improprius; Improprii quidem ſigna erunt febris lenta, continua, pallor faciei, oculi tumidi, ſomnus profundus, à quo dum excitantur, non delirant; pulſus parui, celeres, non admodum frequenſes, neque inæquales inæqualitate ſyſtematica, ſiue collectiua, vrina cruda, craſſa lingua alhicans, ſine ſini; mucus ex naribus, & ſalua ex ore continuo deſluunt. Proprius, qui ſit ex inflammatione, cum triplex ſit, habet quoq; ſigna varia diſtinctiua ſecundum varias ſpecies. Nā in Comate Soporifero, quæ eſt prima ſpecies Lethargi ſputa, quamuis in ſomnum ſunt propenſi, facilius tamen excitantur, excitati ſtatim delirant, vocem habent tremulam, linguam balbutientē, & cum dormiunt, ſi excitentur, irascuntur, linguam habent ſiccam, albicantem, genæ ſunt rubæ lacrymæ ex oculis erumpunt eorumq; vena tumidiore, & rubicundiore ſunt.

In exquiſito autem Lethargo ſomnus eſt profundior, ut vix etiam vellicati & puncti reſpondeant, & ſi reſpondeant, pauca loquuntur, neq; ad rem, & ſi quis cibum porrigat, non claudunt, offam non deglutunt, cadit caput ad pedes, & ſi pariter quis aut matulam porrigat, aut quid tale obliuiſcuntur, & matula, & emittendæ vrinae, atque omnium excrementorum,

In Lethargo Heſtico non amplius excitari poſſunt, quamuis validiſſimis etiam vtamur ad eos excitandos medicamentis, reſpiratio ſit difficilis cum ſtertore aliquo, mandibula ita conſtringuntur, ut non niſi violenter aperiri poſſint, & ſi ſunt aperta, occludi non poſſunt.

Signa diſtinctiua Ex his notis facile diſtinguitur Lethargus per eſſentiam factus ab illo, qui eſt per conſenſum, præcipue à diaphragmate; Nam in illo dolor circa præcordia præceſſit, reſpiratio crebra, & celeris & hypochondrii diſtenſio.

Differt & à Comate & à Catofactis abſq; inflammatione, & abſque putredine, quia in his febris non adeſt.

Differt ab iſdem affectibus, qui ſequuntur febres partium infernarum, quia ſopor in illis non eſt continuus, ſed tantum circa acceſſionum initia.

Vtū aut Carus ſit factus ex contuſione cranii,

A aut terebratione importuna, & ſquama offis, comprimente, poteritis conſequi ex contuſione, aut fractura offis vel capitis, & relatione aſtantium; ex quibus etiam poteritis intelligere, utrum patientes ex aſſumpto opio, aut mandragora vel hyo ſciamus in hunc incidere affectum.

Diſtinguitur Lethargus à læſa memoria, quia in illa ceteræ principes facultates, ſenſus & motus ſeruantur.

Differt quoque ab Apoplexia, reſpiratione, & febre: Nam deprauata eſt ſpiratio, & nulla eſt febris in Apoplexia.

A Syncone etiam, & vteri præſocatione diſtinguitur quia in his affectibus, & reſpiratio, & pulſus tolluntur.

Prognoflica.

Eſt Lethargus, ex inflammatione factus valde periculofus affectus, utpote qui, ſicut ſcribebat Hip. in Coacis & 3. de morb. deſinat in ſup- purationem pectoris, & vix ſeptimam tranſeat: periculofior autem eſt, ſi Phrenitidem ſequatur: Sic ſcribit Hip. 6. in 6. Ep. 8. Phrenitim vertis in Lethargum malum. ratio eſt clara: nam vires ex phrenitide iam debiles alium non ſuſtinebunt acutum morbum: periculofus etiam eſt, in quo tremor adeſt, 7. aph. 76. eo quod tanta ſit inflammationis magnitudo, ut iam ad neruos perſtingat eo periculofior etiam eſt Lethargus, quo minor ſit ſenſus, quo diutius ſomno iaceant ſepulti, inexcitabiles. Hipp. 5. aphor. 5. Si citius repente obmutuſcat, conuulſus moritur, niſi febre ſuperueniente vox reſtituatur: malum quoque ſignum eſt in Lethargicis deiectio liquida, ſæuida, potiſſimum ſine ſenſu excreta, ex 3. de morbis.

Idcirco prudentes oportet eſſe Medicos, & valde accuratos in huius affectus curatione.

Curatio.

Curatio autem diſtinguitur in duas partes: Nam in prima curabimus Lethargum ab inflammatione, conſequenter Coma, & Carum, ubi ex his prodeunt cauſis; in ſecunda erit ſermo de Lethargo improprio ex ſola pituita abſque inflammatione facto, quæ curatio erit quoque communis Comati, & Caro ſine inflammatione.

Prima adhuc diuiditur in duas partes, prout duplex eſt Lethargus, Incipiens, & Factus.

In Incipiente, ſi vires conſent, ſecunda eſt vena, ex Actu, Paul. Alex. Auic. & Galen. ſententia. 13. met. 21. quod ſi Meſue, atque alii cum eo, vena ſectionem prætermittunt, ad improprium reſpexerunt Lethargum, qui ſine inflammatione fuerit.

De loco, & tempore nihil dico: Regulas habuiſtis intraſſe, de Phrenitide, ad illas conſugiat.

Quantitas debet eſſe pauca non excedatis in corporibus plenioribus vnc. viij. in minùs plenis iij. & ſi vires non conſent, hirudinibus, cucurbitulis res eſt tranſigenda; in his tamen parca quoque ſit ſanguinis eductio. Scribit Gordon. ſe viduiſſe Lethargicum quendam conſtitutum ex copioſo

Vena ſe-
ctio.

Ploso sanguine per hemorrhoides educto: Hoc A
ipso tempore, cum adhuc mente constanter patientes, licet illis pharmacum dare electiue purgans, et odore non expectata. Alexand. idcirco, cuius sententiam accepit Auic. Rhaz. i. continent, Aretaeus, & alii, praebent diagrid. cum castor. Mihi magis probatur vsus trochisc. albandal. siue ex colocynthide. V. g.

Recipe troch. alband. gran. vij.

Castor. scrap. ij. M. & cum oxymel scyll.

Spil. 3. quas accipiant summo mane.

Quidam ex recentioribus probant pill. coctias, B
quae mihi non omnino improbandae sunt, et si Arabes putauerunt in lethargo Aloes vsu esse suspectum, eo, quod sit soporarium medicamentum, & propterea hiora quoque in his casibus est suspecta: eodem tempore frictiones adhibeantur, ligaturae, suppositoria acra, clysteres acres, & si feces fuerint induratae, praemitatur clyster mollis; eductis autem fecibus imponatur hic accis.

Re. pulp. colocynt. in petia ligata drach. i. sem.

Puleg. Cala ment.

Orig. Thym. an. M. i.

Vtriusq. Centaur. an. M. sem.

Sem. Cartham. vnc. sem.

S. decoct. f. a.

Recipe huius decoct. lib. i:

Hier. Pachii drach. ij.

Eiaphanie. vnc. sem.

Mell. ros.

Ok. camomel. an. vnc. ij.

Hae forma clysteris debet esse in vsu saltem alternis diebus, toto tempore permanentis lethargi: alii autem diebus, & horis, si non semper, saltem frequentissime debent Lethargici detinere hanc suppositorii formam.

Recipe Trochif. Alband. scrap. i.

Diagrid. gran. vij. Sal. gem. gran. xij.

Hier. Diacolocyns. drach. ij.

Mell. q. s.

M. & f. Supposit. longitudinis digiti minimi cum filo.

Et si status valde vrgeant, addendum est Cymicum: nihil enim magis laedit lethargicos, quam status.

Interim vtendum quoque reprimentibus ex Gal. 1. 3. method. 2. 1. Auic probauit ol. rosac. cum acet. in qua re etiam improbetur a nonnullis, quod in materia frigida non conueniat hoc reprimens frigidum; sequitur tamen Gal. 2. de comp. per. 1. do. ca. 1. qui in lethargo viuit in principio acet. cum oleo rosaceo, sequitur etiam rationem: nunc enim est sermo de Lethargo incipiente, in quo materia non est fluxa.

Hoc tempore victus debet esse tenuissimus per biduum, aut triduum, cuiusmodi sunt aut sola F
mulla, aut ptisana cum mulla.

In Lethargo iam facto praeter reuulsoria iam dicta, & vesicantia externis partibus, scilicet brachiis affixa, singulatum a capite euacuandum est. Primum quidem secta frontis vena, aut apertis narium venis, vel illis, quae sunt post aures aut fixa magna cucurbitula occipiti.

Quae si non possint, digerentibus quoque vtendum, praecipue siccioribus, vt fomentis, seu faculis, repleus pipere, castorio, inde, pulegio, maiorana, stoechade: nam vinctuosa, & humida somnum faciunt adhibeantur autem & syncipiti, & occipiti, sicuti reprimentia soli syncipiti sunt admodum.

Purgetur etiam caput, ceribinis seu sternutamentis validis, dummodo sopor sit valde profundus; mitioribus, autem, si minus profundus fuerit idcirco castoreum ceteris omnibus anteponitur, aut puluerizatum, & insuspiratum, aut mistum cum succo maioranae, aut betae: & quia masticatoriis, aut gargarismatibus vti non licet (neque enim acri obtemperant cum non habent sensum) in his casibus conueniunt illitiones palati ex Theriaca, ex diasinapi misto cum pulu. colocynth. aut a. gandi, quae a proprietate pituitam educunt.

Et qui valde proni sunt in somnum, Quarta Verum omni ingenio sint excitandi? Nam Cael. Aurel. 2. acut. 4. & Tharriis apud Celsi lib. 3. cap. 20. improbant hos frequentes Lethargicorum clamores, punctiones, vellicationes, quae virtutem fatigant ex altera parte antiquiores Latini Gentil. Gordon. Valer. Matih. de gradib. volunt excitari Lethargicos adductis in conclaue porcellis, fortiter clamanibus, & malleis percutientibus vasa aenea, & campanas, quae omnia tamen operosa mihi videntur, ac ridicula: itaque sicuti excitandos omnino censeo, quod somnus inflammatione augeat, 2. aph. 1. ita elegantioribus potius, vtendum esse auxiliis puto.

Probatum mihi Linimentum factum expilis humanis ipsius acri crematis, & puluerizatis, tuta, & aceto, quo illinatur frons & tempora. Ex suffumigiis quanquam multa probentur, vt galbanum, assa foetida, & alia id genus, placet mihi, vt accipiat acetum, in quo ebullierit Castorium, ruta, pulegium; inde hoc aceto aspergantur laminae ardentes, vt acri fumum naribus excipiant intermiciendi sunt acri squilla aceto commissa, ac verberandae huiusmodi partes vrucis, & repetendae saepius frictiones, & percussiones: mustum est cubile, & cenclauis: agitatio enim corporis inuaciuat quoque, vt sentit Trallianus, illos in balneum immergere, excepto capite. Et haec decuratione Lethargi, siue Soporis cum inflammatione dicta sufficiant.

Curatio Lethargi improprij sine inflammatione.

QVod ad Lethargum sine inflammatione attinet, nulla est diuersitas in curatione, nisi in missione sanguinis, & in reprimentibus, neque enim in hoc casu conuenit sanguinis missio, neque reprimentia illa frigida. In ceteris ita agendum, vt diximus in Lethargo cum inflammatione.

DE LAESIONE MEMORIAE

Cap. 1. de.

MEMORIA, quam Plato in Theaeteto matrem vocauit Musarum; alij dicunt Iouis amantissimam.

siam, imaginationis conceptaculum, scientiæ thesaurum, & lumen, & cuiusque ingenii ornamentum, non modò in Phrenitide, Lethargo, Comate, & Cato, de quibus ià egimus, Apoplexia, Epilepsia, Furor, & Amentia, de quibus infra, viuari consuevit, sed etiam ipsa per se sola, ut propterea nostræ sint partes de Memoria læsione, aut Memoria læsa nunc verba facere, tametsi partem hæc prætermiserit Rhases: quia verò non possumus intelligere, quid nomine læsæ Memoriae hic intelligamus, quid ve sit hæc læsa Memoria, quæ ipsius differentia, & causæ, nisi primum sciamus, quid intelligamus per Memoriam naturaliter se habentem, idcirco ante omnia de hac differendum.

De Memoria Naturali.

Definitio Memoriae Naturalis.

Memoriæ nomine in præsentia Reminiscen-
tiam quoque complector, & quod ad memori-
am pertinet, tripliciter accipitur: pro potentia,
pro Habitu, pro Actu.

Memoria accepta pro potentia nihil aliud est, quàm facultas animæ potissimum sentientis, subinde intelligentis, apta ad recipiendas, ac conseruandas species sensibiles, & insensibiles, cum conditionibus indiuiduantibus per se intelligibiles per accidens, cum factum fuerit tempus, ex moderata temperie, ac conformatione posterioris cerebri partis.

Dicitur *potentia animi sentiens*, quia cum sit etiam in brutis, cane, elephante, equo, &c. non potest dici animæ intelligentis, nisi per accidens, quatenus scilicet species etiam intelligibiles mediantibus istis phantasmatibus, quæ pertinent ad Memoriam sententiam, ipsæ quoque reseruantur.

Dixi *aptam ad conseruandas &c.* Per sensibiles intelligimus imagines omnium obiectorum externorum, quæ prius offeruntur sensibus externis recipiuntur in sensu communi, & deinde communicantur imaginationi.

Per *insensibiles* intelligimus illas imagines, quæ aut extrahuntur ex sensibilibus, ut voluit Auerr. Auic. Albert. & alij cum his, aut necessario concomitantur, ut Græci omnes proponunt, ut Arist. ipsa sensibilia. Hoc dico propter Tyrones, quia Arabes ponebant estimatiuam, quæ extraheret species intelligibiles ex sensibilibus; Græci verò necessario intelligibiles species comitari sensibiles; Sed quicquid sit, nihil ad nos.

Diximus, conseruare Memoriam has species cum conditionibus indiuidualibus, ad differentiam intellectus. Nam hic nunquam versatur circa huiusmodi imagines cum conditionibus indiuidualibus loci, personæ, situs, habitus, & temporis.

Diximus etiam, cum factum fuerit tempus, ut distingueremus Potentiā Memoratricem ab Imaginatrice. Cum enim Imago suscipit species obiectorum à sensu communi, versatur circa illas cum conditionibus indiuidualibus, absente etiā obiecto, & diu potest in illis versari, & quamdiu versatur, non dicitur Memoria, sed Imago: ubi autem semel Imago intermiserit huiusmodi operationem, illa facultas, quæ habet reassumendi vim, vel retinendi illas imagines, quæ atea

fuerant in imaginatione, dicitur Memoria propterea iure Arist. de memor. c. 1. dicitur Memoria esse facti, & præteriti, non rei præsentis.

Diximus etiam hanc facultatem per accidens conseruare species intelligibiles, quia non potest illas conseruare absque conditionibus indiuidualibus, quæ pertinent ad sensum communem, atque imaginationem.

Denique diximus, fieri hanc Facultatem mediante temperie, & moderata conformatione. Nam & nimia caliditas, & nimia frigiditas, humiditas & siccitas, Memoriae sunt contrariæ. Calida, quia non permittit species sensibiles imprimi in ipso cerebro: sunt enim in continuo motu propter calorem spirituum. Frigiditas, quia species in spiritibus frigidioribus, ac cerebro frigidior non imprimuntur, sicuti nec in siccior. In humidior autem possunt quidem imprimi, sed statim euanescent non minùs, ac impressiones figurarum in aqua, aut alio corpore fluido.

Denique dictum est in posteriore cerebri parte: quandoquidem hæc pars, tanquam ceteris durior melius potest species retinere. Accedit, quòd sicuti anterior est propter receptionem specierum in continuo motu, posterior est condita illis tantum conseruandis: propterea hic locus quietus Memoriae consecratus est. Hinc fit, ut qui amplo sunt occipite, valeant Memoria, Hinc etiā fit, ut percussi in ea parte amittant Memoriam, & medicamenta ibi applicita ipsam iuuent: eadem ratione fit, ut nonnulli simul, & Memoria, & Ingenio valeant.

Hanc sententiam de principium facultatū distinctione per sedes, & loca non modo habuere Arabes, Auerr. 2. coll. 2. & Auic. 6. natural: & inter Latinos Albert. 2. de anima inter Græcos Act. 2. tetra. c. 2. verum etiam colligitur ex Gale. 1. in 1. proth. 27. 4. de loc. aff. 2. neque tamen pugnat hæc sententia cum illa, quam habet lib. art. medic. ut modo subiungam. Hæc de Memoria, ut est facultas & potentia.

Memoria, ut Habitus (nomine habitus potest etiam accipere dispositionem) nihil aliud est, quàm impressio imaginis sensatæ, & non sensatæ, cum conditionibus indiuidualibus, cum factum fuerit tempus ex cerebri moderata temperie, & conformatione.

Nihil differt hæc definitio à prima, nisi quòd in illa accipimus aptitudinem & potestatem ad recipiendas species, & conseruandas; in hac explicamus actum primum, impressionem speciei in anima, mediante temperie, & conformatione cerebri moderata.

Denique memoria accepta pro Actu secundo, pro operatione, nihil aliud est, quàm conuersio animæ ad imagines reseruatas, cum factum fuerit tempus: siue quòd idem est reassumptio obiectorum sine sensu, quæ antea fuerant in sensu: Est definitio Platonis in Philebo.

Cum dicimus, esse conuersionem animæ ad imagines, non credatis per imagines nos intelligere animam actu memorantem contemplantem speciem sensibilem iam receptam, & in imagine conseruatam: (nam sic Memoria esset non obiecti ex-

di externi, sed imaginis tantum.) Itaque ut recte docet Philosophus lib. de memor. ca. 1. Actus Memorandi est copula quædam imaginis in anima existentis cum obiecto externo : nam concipimus illam imaginem non ut res absoluta, sed in relatione ad illud, cuius est imago : & propterea uno, & eodem tempore Actus Memorandi versatur circa imaginem interiorem, & circa obiectum externum, cuius est imago. Hinc dicit Arist. loc. cit. eos, qui versantur circa imagines, non ut sunt representatiæ alterius ; sed ut quoddam absolutum, scilicet in pati, ut contigit Antipheton, Isti enim non conferunt imaginem ad id, cuius est imago, & putant illam esse realem, & arbitrantur, id quod non est ; & propterea delirant.

Denique diximus (cum factum fuerit tempus,) quia etiam in actu Memorandi oportet, ut ille, qui memoratur, cognoscat, se versari circa imaginem, quæ antea fuerit in imaginatione ; sed exciderit, ita, ut inter illud actu imaginationis ; sed exciderit, ita, ut inter illum actum imaginationis, & hunc secundum cadat tempus medium, in quo nulla facta sit actio. Propterea ut dicebam iure Plato dixit, Memoriam esse reasumptionem obiectorum.

De Reminiscencia.

EX his pater : quid sit Reminiscencia : Nam in nihilo differt hæc à memoria, nisi quia memoria reasumit has species cum facilitate ; Reminiscencia vero reasumit easdem cum difficultate, & syllogismo. Neque enim quispiam potest reminisci, qui non utatur demonstratione vel à priori, vel à posteriori : Et quia nemo potest uti demonstratione, qui non habet principium demonstrandi, hinc fit, ut Reminiscencia seruetur aliquod principium, ex quo paulatim educitur ad inuentionem illius, quod iam exciderat Propterea Arist. lib. de memoria, & reminiscencia cap. 2 inquit, Reminiscenciam neque esse de nouo addiscere, neque de nouo inuenire : Ratio est : quia qui de nouo addiscit, aut de nouo inuenit, querit principia, & conclusiones ; In Reminiscencia, quæ runtur tantum conclusiones, & principia adsunt. Hæc de Memoria naturali.

Conclusiones IV.

EX proxime dictis quatuor elicio conclusiones. Prima est : Reminiscencia ratione, & re ipsa à discursu non distingui ; sed tantum modo. Non ratione : quia ambo procedunt à noto ad ignotum per necessariam consequentiam : Non re, aut subiecto : quia ambo fiunt in media cerebri parte.

Distinguuntur modo : quia discursu querit conclusiones ignotas de nouo ; Reminiscencia querit illas quæ antea fuerunt notæ, sed exciderunt.

Secunda conclusio pendet ex dicta prima : Reminiscenciam scilicet cerebri temperiem requirere calidam & substantiam mollem : nam subtilitas argumentandi, quæ est necessaria in Reminiscencia, cum duritie austringitatem perficere potest.

Tertia conclusio. Actum memorandi neque ratione, neque re ipsa distingui ab imaginatione ;

sed modo tantum. Non ratione : quia ambo versantur circa idem obiectum sensibile & insensibile : quov pro suo arbitratu componit, & diuidit : considerat conditiones indiuiduales, & propterea fiunt etiam in eodem subiecto. Hinc Gale. 2 de motu muscul. 6. facultatem memoratricem eandem imaginatrice docuit esse.

Distinguuntur modo : quia imaginatio proprie accepta petit sua obiecta sensibilia ab externis sensibus, & a communi sensu. Imaginatio accepta pro actu memorandi recipit obiecta reserua ta in memoria.

Idcirco sequitur ex his quarta conclusio Actus Memorandi requirere robur caloris innanti, & substantiam cerebri anteriorem neque admodum duram, neque admodum mollem : (Et sic solue mus objectionem locorum Galen,) Requiritur robur caloris, quia calidum innatum est præcipuum instrumentum principum facultatum 3. de loc. aff. 7. Requiritur moderata substantia partis anterioris, quia sicuti posterior cerebri pars, in qua residet facultas memoratrix, id est, conseruatix imaginum, est minus apta ad retinendas, & suscipiendas imagines propter mollitiem aut duritiem, ita & pars anterior, ubi debet fieri Actus Memorandi. Et extrahuntur imagines ex parte posteriore, quasi ex arca. Istæ imagines non facile recipiuntur in duriori substantia, aut retinentur, in molliore.

Ex quibus dictis poteritis colligere, cur Memoria tribuatur parti posteriori, & cur parti anteriori : Nam facultas, ut habitus Memorandi pertinet ad cerebri partem posteriorem ; Actus Memorandi pertinet ad anteriorem, Hinc sequitur posse aliquos valere & ingenio ; & Memoria, quod pars posterior quamquam durior, sed intra limites sanitatis possit imagines retinere ; anterior tanquam moderata possit illas suscipere, atque circa illas versari. Quod si contingat hanc partem anteriorem ex nimio calore sicciorem, ac duriorrem reddi, sunt quidem isti ingeniosi, & possunt habere potentiam, & Habitum Memorandi ; sed non facile habent Actum Memorandi propter causam propositam.

De memoria vitata. Cap. V.

Sed iam venio ad Memoriam p. n. se habentem. Memoriam vitatam nomine intelligo Memoriam, & Reminiscenciam. Leditur vitæ aut abolita, aut imminuta Operatione Memorandi, & Reminiscendi. Abolitam intelligo Memoriam, cum quispiam nullus rei recordatur, neque etiam proprii nominis, Quod in peste factum esse docuit Gal. 2. de symp. caus. 7. ex sententia Thucidi 2. historiarum.

Imminuitur dupliciter. aut quia quorundam tantum fiat obliuio ; aut quia omnium quidem sit obliuio, sed non integra. Omnium ægre recordantur ægri ; Cum quispiam quorundam tantum obliuiscitur, eorum obliuiscitur potissimum, quæ minus sunt sensata. Idcirco scribunt, Franciscum Barbarum in extremo senio Græcarum literarum prorsus fuisse oblitum : Georg. Trepezunt, omnium literarum factum esse inmemorem. Anton. Ben-

niu. cap. 47 de admir. Senensem inquit se vidisse, A
qui post morbum, omnium, etiam proprii nomi-
nis erat oblitus: Christoph. à Vega 3. de art. med.
c. 10. scribit etiam de quodam, qui ex morbo li-
terarum omnium plane oblitus erat.

Causæ.

Causæ Memoriz, ac Reminiscentię siue abo-
lutz, siue diminutz, aliz sunt ex accidenti,
aliz per se.

Ex accidenti, sunt illz omnes, quz aut prohi- B
bent obiecta sensibilia recipi in sensu communi
& imaginatione: hac ratione in omni soporis
differentia, siue sit Lethargus, Coma, Carus, siue
apoplexia, Epilepsia, leditur Memoria, nō suscepta
obiectis sensibilibus; aut quādo suscepta obiecta
sunt in nimio motu, agitatū spiritibus, vel pro-
pter delirium, aut phrenitum, aut ebrietatem, vel
aliā similem causā.

Causæ per se sunt duplices. Alię enim perti-
nent ad facultatem, & partem recipientem, &
conseruantem imagines sensibilibus, quam dixi-
mus esse posticā cerebri partem: aut sunt caus- C
sz, quz pertinent ad partem, & facultatem, in
qua sit Actus Memorandi: priores causz, si de
immediatis sit sermo, pertinent omnes ad substā-
tię mediocritatem, & puritatem; minimē verō
ad intemperiem.

Ratio est: quia Facultas Memoratrix prout cō-
seruat, nihil agit, sed est quasi locus, quasi cera, in
qua sigili imago imprimitur, & propterea sicut
ad impressionem imaginis sigilli in cera non cō-
currit mediate, aut immediate temperies, vel in- D
temperies, sed necesse est, vt cera illa neque sit
nimium fluida, neque nimis dura, neque nimis
pauca, neque impura: ita quoque substantia ce-
rebri, prout est, receptaculum imaginum, neque
nimis mollis, neque nimis dura esse debet. Arist.
de memor. cap. 1. neque nimis parua, quōd con-
tingit in angusto capite, præcipuē cum defectu
occipiti: neque coinquinata, alienove humore
imbuta hinc Plat. in Theæteto, cui consentit
Auer. in com. vlt. lib. de mem. puitam, & melan-
choliā inquit esse defectus Memoriz causā. E
propter eandem causā Gal. 2. de causis sympt.
7. eos quibus in pestilentia, facti sunt abscessus
in Cerebro, factos dicit esse immemores, trans-
missa humorum colluie in hunc locum: idcirco
non modo pituita, & melancholia, sed vnusquis-
que humor, qui cerebrum inficere potest, Memo-
riam vitiat. Hinc scribit Beniuen. loc. cit. Senē
sem illum, qui perdidit Memoriam, superue-
niente alui fluore bilioso, pituitoso, sanguineo,
pristinā recuperasse Memoriam.

De Causis Mediatiz.

Mediate causz huius molliūci nimie sunt
etas puerilis, quz tamen propter rerum
novitatem, & admirationem in quibusdam Me-
moriam valeat; propter nimiam tamen molliūci-
em hac in parte plerunque deficit: augent autem
molliūciem intemperies humida, siue fiat ex con-

stitutione, & regione humida, siue ex pluuijs ca-
put madeficientibus, præcipuē verō circa occiput
aut inunctionibus humidis, otio, vlu olerum hu-
meſtantium, potu aqua, &c. sicuti durities auge-
tur ex intemperie sicca, quz sequitur etatem se-
nilem, in qua tamen adfit Memoria quorundā,
quę in iuuentute contigerant, deficit tamen circa
obiecta, quz de nouo assumuntur, quia non pos-
sunt imprimi.

Causz denique, propter quas, Actus Memorā-
di imminuitur, aut tollitur, pertinent ad intempe-
riem frigidā, quz destruit robur calidi innati,
& spirituum animalium cerebri. Hipp. de sacr.
mor. scribit, Memoriam ladi ex intemperie frigi-
dā, & humida. Gale. 3. de loc. aff. 5. inquit, lēdi sē-
per ex frigida quandoque ex humida, quandoq;
ex sicca, frigida connexis; & ratio est, quia calidū
hoc innatum potest ladi, aut propter spirituum
euacuationem, inanitionemque, vt propter vsum
Veneris immodicū, post vigilias, & nimia studia.
Scribit Gal. 3. de loc. aff. 5. quendam ex nimis stu-
diis factum esse obliuiosum omnium: Addit Gal.
nimium exercitium obliuionem parere, quod cō-
ngit cuidam vinitori: Aliquando calor hic suffo-
catur, & ideo omnis nimia repletio, siue cibi, siue
potus, euacuationum suppressio, otium, nimius
somnia, calorem cerebri exstinguūt, memoriāq;
hebetant. Quandoque refrigeratur hic calor ex
opii, mandragorę, hyoscyami, papaueris frequen-
ti vſu, & lactuca: Ex nimio umore refert: Cael.
Auzel. 1. tard. pass. c. 5. Artemidorum Grammatiz
cum viso ex improviso in arena crocodilo statim
ex timore omnium literarum factum esse imme-
morem. Denique ex causā venenica, ex assumpto
veneno, confertim solet obliuio sequi, quod inquit
factum in Bamba Gothorum Rege, qui hau-
sto veneno obliuiosus statim factus est. Postre-
mō ex causis externis, percussione circa occipiti-
um, multi facti sunt immemores. Plin. lib. 7.
cap. 24. Ferncl. lib. 1. cap. 1.

Signa.

Non diu laborabo in referendis signis caus-
zarum Læsionis Memoriz: etenim ex dictis
superius in tractatu de Doloze Capitis, atq; alijs
affectionibus hæc signa facile colligi possunt. Ita-
q; si ledatur Memoria ob defectum caloris innati,
simul cum læsione Memoriz, & Imaginatio, &
Discursus, vel pereunt, vel minuantur: sensuum
stupor, & motus animalis torpor succedit: & si
frigiditati connexa sit siccitas, adsunt vigiliz, fa-
tuitas, amentia, carentia excrementorum, etas
senilis præcesserunt causz sicchantes, & euacuatio-
nes insignes.

Quōd si adsit humiditas, somni sunt profundi,
& vt scribit Auicen. melius recordantur eorum,
quz de nouo offerentur, quā eorum, quz iam
diu præcesserunt; contra quam in intemperie eue-
niat sicca, in qua, quo memorabilia sunt antiquio-
ra, eo facilius reducuntur in Actum Memorandi,
recentiora minis recordantur.

Ex his signis, quz demonstrant intemperiem,
vel siccam, vel humidam, potestis etiam colligere
molliūciem, & duritiem cerebri,

Quōd

Quod si adsit excrementi copia, siue sit pituita, siue melancholia, siue sanguis, aut pus, horum signa petenda sunt ex superioibus tractatibus.

Prognosis.

Memoria iam in senibus collapsa amplius restitui non potest; cum vero repente amittitur potest quidem restitui, sed magnum aliquod imminatur malum. Aetio, cui subscribit Aui. minatur, Apoplexiam, Epilepsiam, Paralylin, aut quid tale.

Ratio Curandi.

Intentiones curandi variae sunt procausarum varietate. Nam in defectu caloris cum intemperie frigida, & sicca agendum est humectantibus internis, & externis. Internis, frequentius usu lacticiniorum, praecipue buryi: commendantur cerebella animalium, sed praecipue turturis, & perdicis, oua sorbilia, vinum moderatum somnus longus.

Extrinsecus balnea conueniunt aqua dulcis, lotio capitis ex lacte, iure castrati, in quo bulliant malua, althaea, chamomeli: his succedit inunctio ex oleo amygd. chamomeli. mistis cum piuguedine anatis, anseris, & medulla cruris bouis.

Ex medicamentis conueniunt confert. borag. buglossi, & confectiones omnes ex amygd. & saccharo confectae.

Quod si intemperies sit humida absque materia, agendum siccantibus, & caloricis internis & externis: Interna multa quidem sunt, ut Theriac. Mitrid. Castor. Sed praecipuum obtinet locum Anacardina confectio, cuius dosis est drachm. j. 4. hor. ante cibum, postque assumatur aut vno sem. aqua ardentis, in qua si magna sit intemperies, infundatur piper longum, castoreum, pyretum, zinziber.

Si magnus non sit excessus, seu lapsus, exhibeatur vinum odoratum. Ego ubi magna non sit frigiditas, vtor his rotulis.

Recipe Nuc. mosc. num. ij.

Caryoph. num. viij.

Cinnamo drach. sem.

Sacc. dissolut. in aq. maiora. q. s.

M. f. confect. in rotul.

Alii vtuntur hoc puluere.

Recipe Acor. Cyper.

Oliban. Thur.

Myrrb. Galang.

Pip. long.

Pyret. an. drach. i.

Polu. deur drach. i. ex vino.

In intemperie nimis frigida vtile, & iucundum erit remedium ipse Acorus conditus melle, aut zinziber, aut radix eryngij, aut pyretum, praecipue vero si condiantur melle.

Quod si humiditati conestatur aliquis calor in eo casu accipienda est Aetii sententia, qui probat usum eboris, & cornu ceruini vtilis utrumque remedium datur in puluere a drachm. i. usque ad drach. ij. in intemperie calida humida.

Extrinsecus, occipiti poussimum admouenda

A sunt remedia, ubi laesa sit Facultas, & Habitus Memorandi: toti autem capiti, ubi Aetus Memorandi: Sint haec quoque siccantia, ut oleum chamomeli, cum castoreo, & synapi, aut lotio ex decocto sisimbrii, torismar. lauend. cyperi, saluaz, herbae paralytis, origani, calamenthi, &c. id genus calidis siccis.

In magna frigiditate aqua asdens, aut simplex aut aromatibus alterata poterit huic parti adhiberi: Omitto dropaces, sinapismos, de quibus antea dixi.

B ubi adsit materia, & ea quidem pituitosa, do cui haecenus, quomodo ea sit purganda; dicam tamen & nunc singularia quaedam.

In laesa memoria cum pituitae praesentia laudat Aet. ut quamprimum viamur Hera Ruffi, & albo elleb. Non defuere ex recentioribus nonnulli, qui Aetii sententiam vituperant, quod hiera Ruffi nimis violenter agat, & quod paulatim & sensim a leuioribus ad grauiora transeundum, sit. Sed quod ad primum pertinet, hiera Ruffi, sicut, & Pachii, & Logadii, quanquam grauiora recipiant medicamenta, ut colocynthidem, sunt tamen vsque adeo correctae, ut in fortioribus corporibus absque noxa administrentur: & sane possunt quamprimum succum peccatorem educere, & humidam intemperiem siccare: neque expectanda est praeparatio: nam si humor in cerebro consistens diu haeserit, aut indurabitur, aut consimili intemperie solidas afficiet partes, ut malum deinceps corrigi nequeat. Detur igitur

Hiera Paucij ad drach. ij.

Aetius proponit vno sem. Ego solis drachm. ii. maximas vidi purgationes, quoniam eadem hiera, in eadem quantitate exhibita, habet vim corrigendi humidam totius corporis, & cerebri intemperiem, vnde Aetius singulis, & vna portunculam exhibet ad magnitudinem labi, ut erit scriptum.

Si cui haec minus placeat, deat confectio anacardina.

Elleborum album mihi quidem probatur, sed ubi poussimum laetetur Memoriam ex melancholia. Sed de isto medicamento in tract. de Melanch.

E Praeparanda erit materia oxymel, scilicet, syrup. de beton. compot. de stachade

Et vixlim purganda non modo a toto, sed a capite per gargarismata, masticatoria, & nasaria, de quibus diximus alias, hoc tantum dicam, in praesentia, in laesa memoria sanguinis missionem non conueniunt, quia de facilius sit aliquis abscessus, aliquis decubitus a corpore toto, aut parte determinata in ipsum cerebrum, abundanter in corpore succo sanguineo. In hoc casu etiam Ch. st. ph. a Vega 3 de art. medica. nasarium non solum proponit, sed etiam ex medicinis scriptoribus, quos ego vidi, nullus alius.

Idem proponit Nasarium ex variis nasariis confectum siccantibus, quod potest sibi legere apud illud

In eundem usum faciunt suffumigia quaedam ex styrace, olibano, iure, myrrha, ligno aloes, ad dito etiam mosco.

His addatur victus ratio, quae habeat vim siccandi: propterea sit tenuis, & sit frugalis: exerceat corpus, fugiat Venerem: sonus sit moderatus

Regula studiosis obseruanda, vt retineant memoriam, eamque augeant.

ET qui voluerit Memoria indulgere, vt in studiis valeat, hae pcepta memoriae comendat, vt

1. Studium sit vnius rei simplicis.
2. Vt non sit admodum prolixum.
3. Vt maxima adhibeatur diligentia, & attentio in studiis. Gal. 2. de motu musc. ca. 6. timidos & ebrios ait non recordari eorum, quae egerunt; quia attentè ea non fecerunt, aut dixerunt.

4. Oportet super ea re, cui incumbimus, multoties meditari. Gale. 1. de anat. admin. cap. 2. frequentem hanc meditationem Memoriae summo pere conferre docet, quod etiam docet Aristo. de memor. c. 1. in fine.

5. Oportet aliquando intermittere huiusmodi frequentiam meditationis, & somno indulgere: nam post meditationes plus facit somnus & quies, quam frequentata meditatio.

6. In studiis oportet ordinem adesse: nam Memoria sine ordine cadit.

7. Obseruentur conditiones quaedam indiuiduales, quibus res ipsa possit faciliè in Memoria reuocari.

8. Res, quibus incumbimus, ad breuitatem redigantur, & sic Memoria valebitis.

DE VIGILIIS PRAETER NATURAM. Cap. XI.

ATtingam paucis tamen, nonnulla de Vigiliis transibo deinceps ad Apeplexiam. Dicitur hic affectus Latinis Vigilia Morbosa Graecis *dyppria*, Arabibus *Sahara*, & nihil aliud est, quam sensuum exercitatio ex nimio motu animalium spirituum.

Per exercitationem intelligo aut continuum, in qua nullus sit somnus, aut valde diuturnam, in qua sit admodum brevis: intelligo praeterea & Vigiliam dierum ac noctium, ac praeterea mensium, & annorum.

Sunt enim quidam absque somno degentes integros menses: Patrem habeo adhuc superstitem, qui cum esset melancholicus passus est vigiliis septem mensium.

Causa continens, & efficientes.

CAussa, vt dixi, Vigiliarum est nimius spirituum motus. Mouentur autem spiritus ad instrumenta sensuum, vel quia deficit alimentum, vel propter alias causas extrinsecas. Deficit alimentum, aut ex sola intemperie sicca, aut calida & sicca, vt notauit Gal. 3. de loc. aff. c. 6. & 7. & 2. aphor. 3. Aliquando hae intemperies est cum materia, aut melancholica, aut biliosa, aut pituita falsa, quae materia aut per essentiam in capite continetur, aut capiti communicatur ex ore ventriculi, vel venis totius corporis, vt in febribus, vel alia parte determinata.

Causa Mediate.

Mediatz verò exsiccationis causae sunt tibi & potiones exsiccantes, vt salsamenta om-

nja, acrida, & aromata, vinum vetus generosum, nimia exercitatio, sol, ignis, balneum, medicamenta, siue foris sint posita, siue assumpta, praecipue quae copiosius iusto euacuant.

Exsiccant etiam dolor, moror, timor. Ex causis Vigiliarum extrinsecis est Amor.

Signa distinctiua.

Distinguantur causae Vigiliarum inter se hoc modo: Si intemperies sit sicca absque materia, facies est squalida, oculi concaui, sicci, & pallidi.

Si calor accedat, facies & oculi rubent, & aliquid ferocitatis vestigium adest.

Si materia cum intemperie copuletur, & ea sit melancholia, simul adest delirium melancholicum.

Si bilis, delirium cum rixa furiosum:

Si pituita falsa, falsum excrementum aut ex naribus, aut ex ore excernitur, praeterquam quod aliqua est capitis grauitas, & ex lotio aliisque excrementis humorum distinctio haberi potest.

Vbi causa fuerit aut Timor, aut Moror, aut Dolor, aut Amor, ipsimet egri hoc referre possunt.

Prognostica.

Somnus & Vigilia si modum excesserint, malum. Hipp. 2. aph. 3. idcirco 7. aph. 18. a Vigilia conuulsio, & desipientia malum: est enim signum maxime siccitatis cerebri, & neruorum. In pueris potissimum hoc symptoma lethale est.

Curatio.

Curatio in intemperie sicca fit humectantibus externis, & internis. Externis, lotione capitis ex lacte, ex iure castae, alteratio cum malua, althaea, semine lini. Inunctiones etiam ex oleo amygdalino misto cum butyro, cum anasis, & anseris adipe, cum mucilagine sem maluae, & alibet id idsum praestare possunt. Intrinsecus pariter conueniunt omnes cibi humectantes, lacticia omnia oryza cocta cum lacte, amygdalatum praecipue cum farina amyli, lactuca cocta, aliaque id genus humectantia, de quibus alia.

Quod si caliditas adsit, refrigerantia eligantur oleum violae, de nymphaea, oleum ex ranis, oleum ex cucurbita, ex cucumere: Succus quinetiam citrulli, cucumeris, cucurbitae, plantaginis, & portulacae, vel soli vel commisti cum oleis praedictis, in temperiem corrigunt calidam.

Intrinsecus pariter conueniunt frigida, confectura, violae, nymphaeae, rosae, syrupus de papau. emulsio, seminum papaueris albi.

Quod si cum intemperie humor connectatur, ille primum est euacuandus, postea intemperies est corrigenda. Qua autem ratione vnusquisque humor purgari debeat, docui alia, docebo, & infra.

Facta purgatione, si Vigiliae propositis auxiliis non cesserint, transfundendum est ad opiata, quando vires iam concidunt, extrinsecus primum admoveantur, vbi si nihil effecerint, intrinsecus quoque praebantur: Extrinsecus faciunt lotiones capitis ex hyoscyamo, papauere, maderagora lactuca,

lactuca, nymphaea, folijs salicis: Facit & hoc Linimentum frontis, & temporibus illitum.

Recipe Philon. Rom.

Req. Nicol. an. drach. i.

Succi lactuc. vnc. ij.

Succi limon. vnc. i. M.

Conuenit praeterea naribus ixcipere fumum illius decocti, quod iam proposui pro louone capitis. quinimo & portunculam linimenti dicti in maximo calore: licet quoque in nates attrahere oleum viol. aut de nymph. aut lactucæ succum aut decocti soporiferi praescripti portionem. In-
B. trinsecus alias dixi in tract. de phrenitid. conuenire scrup. j. aut drach. sem. opii medicamenti, siue sit Philon. siue requirs, aut recens Theriaca (intelligo que non transeat. & menses) aut pilula de cynogloss. ut praeterrittam aquas soporiferas, quæ aliquando sunt mors ægri. Hæc medicamenta simul cum victus ratione vigilias arce-
re possunt.

In opiatu tamen hæc sunt obf. rursus, ut den-
tar quidem post carnâ, sed saltem 5. horis ab ac-
cepto cibo: & cæna sit parca, ne opium, quod re-
plet caput, impensè concurrente cibi vapore co-
pioso, Apoplexiam inferat, & propterea opiata in
capite, pituita referto, propter hanc suspicionem
semper sunt fugienda: Itaque post illorum usum
subiungantur calidifica, quæ opi. vim, & perni-
tiam erigant.

DE APOPLEXIA.

Cap. XII.

AΠΟΠΛΕΞΙΑ Græcis, Sideratio Latini dicitur, siue Attonitus Morbus, eo quod, qui hoc morbo capiuntur, quasi fulmine percussis sine sen-
su, & motu iacent: aut qui autem fulmen sidus esse putabât Celsi tēpore, ut ipse refert lib. 3. ca. 27
D. Paralysis dicebatur; hinc Gale. lib. de sympt. diff. c. 3. sic definiuit Apoplexiam: Est Paralysis totius corporis cum aboliuone principium facultatum.

Et per Paralyin totius corporis, ut ipsemet se-
ipsum explicat 3. de loc. aff. 7. (secuti cum sunt
Alex. Aet. & Paul.) nil aliud intelligit, quàm su-
blatum sensum, & motum totius corporis.

Neque quispiam obieciat ex eod. Gall. spiratio
nem seruati. Etenim neque vita absq; spiratione
neque spiratio absque vita stare potest, auctore
eodem Gal. 5. de loc. aff. 1. & 6. de locis affectis 4
Nemo, inquam, hoc obieciat: Quandoquidem da-
tur Apoplexiæ species, in qua spiratio saltem ad,
sensum tollitur, nullusq; apparet thoracis motus
auctore Gale. 3. de loc. aff. 10. 2. aph. 42. quod si
aliquando seruatur spiratio, ille non est propriè
motus factus ex imperio voluntatis, sed motus
quidam coactus propter vltimū auctum: etenim
spiratio, ut docuit Gal. in introduct. & 2. de mor.
muse. 6. est motus mixtus ex animali, & naturali
F. Est motus animalis, quatenus nerui & musculi
mouentur per electionem, ita ut propter hanc
causam possit quispiam spiritu cohibito seipsum
interficere.

Exemplum est apud Galen. serui illius barbari
dict. loc. (2. de not. mus. 6.) qui hac ratione seip-
sum suffocauit. Est naturalis, quatenus aucto ca-

lore in parubus thoracis impellitur à natura fa-
cultas animalis ad motum thoracis.

Itaque etiam si in Apoplexia musculi thoracis
non moueantur ex imperio voluntatis, seruatur
tamen motus illis irritatis, & impulsis ab usu au-
cto, à calore suffocante; & quia in respiratione
naturaliter se habente solus septi transuersi mo-
tus ad respirationem sufficit; ita in Apoplexia cū
facultas mouens admodum languida confluat,
neque solum septum transuersum, neque soli
musculi inferiores, sed omnes simul ad motum
impelluntur, ut propterea Gal. 4. de loc. aff. 7. hæc
respiratio non Magna, sed Sublimis vocatur: Ma-
gna enim dicitur, quādo vsus quidem est auctus
& omnes musculi thoracis mouentur, sed valida
in omnibus existente facultate: ubi verò, sicut
in Apoplexia, languida concurrit facultas, omnes
musculi ferunt suppetias, & adiuuant motum, &
sic vocatur Sublimis, non Magna spiratio.

Est verò hæc spiratio in Apoplexia triplex; vna
cum stertore; duæ sine stertore, quarum prima
est cum ingualitate, difficultate, & intermissio-
ne; altera est inæqualis, sed nec difficilis, nec inter-
cepta. Itaque Apoplexia legitima & exquisita
est sensus, & motus aboliuitur omnium partium.

Dico legitimam, quia in spuria potest esse aliquis
motus; & ego habeo nunc ægram Apoplecticam
quæ hac nocte morietur, quæ tamen mouet mo-
dò crus, modò concutitur, & habet sensum: idcir-
co datur Apoplexia cum motu, ut dixi. Addidi
cum Gale. in Apoplexia reperiuntur principes facul-
tates aboliuitas, quod maximè proprium est: neque
enim aut imaginatione, aut discursu, aut memo-
ria quidquam valent Apoplectici.

Causa continens & modus generationis apoplexiæ

Causa horum symptomatum sunt spiritus
animales non transientes ad instrumenta
functionum dictarum, ut potestis ex Gale. 1. aph.
42. colligere. Non transiunt spiritus aut impedi-
ti, aut in seipsos reducti.

Impediuntur aut obstructione, aut compres-
sione, aut insubidentia. Et quia obstructio, & com-
pressio, ac subsidentia fiunt in quibusdam locis,
& ex quibusdam causis, videndum, quæ sint lo-
ca, quæ causæ.

Locus affectus.

De loco scio maximam esse apud Auctores
difficultatem, quam sic breuiter diluo. In
Apoplexia locum affectum immediatum esse vni-
cum; mediatos plures.

Locus immediatus (quicquid sentiat Alima-
rus, & alii) est substantia cerebri. Cerebrum, ut
alias dixi, ex sententia Gal. 3. de loc. aff. 7 est sedes
praecipua omnium functionum animalium, &
ventriculi cerebri non pro obeundis functionib;
sunt instituti; sed vel ut prepatent, sicut antero-
res, vel ut concoquant, ut medii, vel ut perficiant
spiritum animale, ut postremi. Hic spiritus
elaboratus deinde in cerebrum mittitur, cuius
portio perficit facultates principes, alia portio
(siue substantia siue illustratione hoc non dis-
puto) mittitur ad neruos, sensifcos, & motiuos
ad perficiendum sensum, & motum; itaque lo-

*Soluitur
difficul-
tates de
loc. aff.*

*Ventri-
culi cere-
bri ad
quid sine
instituti*

cus immediatus, ex quo leduntur principes, sensusque, & motrices functiones, est ipsum Cerebrum: itaque Gale. 4. de loc. aff. 2. in Epilepsia inquit ladi ventres magis; in Apoplexia corpus Cerebri magis.

Mediati loci sunt ipsimet ventriculi, ut docuit Gal. 2. de caus. symp. 7. & colligitur ex 2. aph. 4. cum scribit, Epilepsia & Apoplexia esse vnum, & eundem locum, & causam.

Fit quoque ex plexu choroide, & ex arterijs cotidibus, ut colligitur ex Gal. & Hipp. 4. acut. 2. 3. ubi Gal. per interceptiones venarum interpretatur etiam Apoplexiam. Hinc Auicena constituit Apoplexiam fieri ex cerebro, ex ventriculis, ex venis, & arterijs, atque illam distinguit egregie dum inquit Apoplexiam fieri, aut non transmissio spiritu animali ad propria instrumenta, aut non transmissio vitali, qui est materia spiritus animalis.

Etenim non transmittitur spiritus animalis vitio Cerebri, & ventriculorum; Non transmittitur spiritus vitalis, vitio plexus choroidis, & arteriarum carotidum: & quia huiusmodi impedimentum spiritus vitalis, non ita subito, nec tam magnam infert Apoplexiam, idcirco licet Gal. 2. de placit. Hipp. & Plat. ca. 6. videatur negare Apoplexiam fieri ex istis arterijs soporarijs, & plexu retiformi, hoc tantum voluit intelligere, non fieri immediate nam etiam si spiritus vitalis non confluat ad ventriculos, semper tamen aliqua portio elaborata in ipsis ventriculis reperitur, quae beneficio aeris inspirati potest per aliquot horas ipsum animal absque Apoplexia seruare.

Sed tamen quod ex arterijs soporarijs fiat Apoplexia, confirmavit Fernol. experimento in quadam patiente mortua secta, in qua repertus est sanguis plurimus ipsum plexum coroidem comprimens, ut potestis videre 2. de abdit. rer. caus. c. 1. hanc eandem sententiam recipit Iul. Alexandrin. 24. salub. c. 2. & Levin. Lemn. 1. de occult. c. 11.

Causa immediata efficientes.

Causae immediatae, quae agunt obstruendo, sunt primo quidem materia pituitosa, non tamen aquea, ut potestis colligere ex Vesalio lib. de fabric. human. cap. 5. exemplo cuiusdam Puellae Augustanae, in qua totum Cerebrum erat aqua repletum; nec tamen patiebatur Apoplexiam. Est itaque crassa pituita, ut experientia probauit Real, Columb. lib. 1. 5. multiplici corporum Apoplecticorum sectione: idcirco Galenus saepius repetit hanc sententiam, fieri Apoplexiam ex pituitoso, & crasso succo 3. aphor. 16. 23. 31. & 2. de caus. sympt. 7. & 4. de loc. aff. 7.

Fit quoque ex succo melancholico; non tamen frequenter, quicquid sentiat hac in parte Cardanus, qui exponens comm. 56. part. 6. ubi docet Hippoc. à 40. anno ad 60. fieri Apoplexias & Gal. 1. ibi asserit in hac aetate fieri eas ex melancholia, ipse videtur voluisse magna ex parte fieri ex succo melancholico. Quae sententia est tantum intelligenda de hac aetate à quadagesimo ad sexagesimum annum.

Sed & sanguis est causa Apoplexiae, Gale lib. de rat. cur. per sang. miss. cap. 5. Irruente sanguine in cerebrum Apoplexias fieri, & propterea lib. 1.

de ven. sect. aduersus Erasist. cap. 6. propter menses suppressos scribit fieri Apoplexiam: quinimo in praegnantibus circa primos menses, & quae modum docet, Holler. lib. 1. de morb. inter. cap. 6. tempore, quo anima corpori accedit, Apoplexiae succedunt, propter sanguinis motionem.

Id ipsum facit ipse status, ex Hipp. lib. de flatibus. Vapores quin etiam crassi, & lenti ex variis corporis partibus eleuari, praecipue ex ventriculo, intestinis, vtero; quinimo fumus etiam, siue sit carbonum, siue alicuius medicamenti deleterii, ut cinnabaris, potest Apoplexiam inferre, dummodo non tantum spiritales laedantur partes, sed etiam Cerebrum. Aliud est suffocari, aliud apoplexiam pati; ex his fumis potest quis etiam suffocari sine Apoplexia, impedito anhelitu, aut propter faucium angustiam, aut laryngis, & arteriae, aut pulmonum: hi omnes dicuntur strangulati ex Gal. 4. ap. 34. sed ubi fumus etiam in Cerebrum inuat, & obstruat, tunc fit Apoplexia.

Impediri consuevit transitus spirituum ad instrumenta ex compressione etiam non minus quam ex obstructione: Fit vero compressio ex affectibus cerebri inflammatorijs, Gal. 2. aph. 42.

Per affectum inflammatorium intelligo non modò in inflammationem legitimam ex sanguine factam, sed & erysipelatodem, & pituitosam, & in abscessum conuersam, ut docuit quandoque Galen. 2. de loc. aff. 9. idcirco, ut antea dixi, post Phrenitidem, & Letargum Apoplexia fieri consuevit.

Denique non transeunt spiritus ad instrumenta sensuum, aut ex subsidencia ventriculorum, quae fit propter causam veneticam, ut contingit plerumque in hysterice affectionibus, siue praefocationibus vteri, aut retractis spiritibus propter terrorem ad suum principium. Sic Gale. 7. aph. 58. exponens Hipp. aphor. ubi dicit: *Concussio cerebro multos fieri*, Galen. inquit ex forti concussione spiritus, quasi perterritos, seipsos colligere, tuncque corpus sensu, & motu priuari. Haecenus de causis immediatis.

Causa mediata, & magis remota.

Aliae causae mediatae, & remotae, aut generant, aut mouent hominem iam collectum in corpore: sic pituita augeri consuevit in constitutione humida, 3. aphor. 16. in tempore anni frigido, hyeme, 2. aph. 23. in aetate senili, 3. aph. 31. Hinc in tali constitutione tempore, & aetate familiares sunt Apoplexiae.

Augetur quoque ex cibis crassi succi, crapula, otio, iungiore somno, & suppressis excretionibus praecipue vero oris, & narium.

Melancholia vero augetur ab anno quadagesimo usque ad sexagesimum: propterea scribit Hipp. 6. aph. 57. in hac aetate Apoplexias fieri: augetur quin etiam ex morore, timore, curis, & sollicitudinibus, usu salitorum, leguminum, praecipue lentium, & brassicarum, atque ex suppressione haemorrhoidalis sanguinis, & sanatis importune antiqua scabie, cancro, lepra, ulceribus phagedenicis, siue depascentibus.

Mouent:

Galen.
locus di-
lucidatus.

Mouent materiam in corpore collectam omnia califica, balneum, sol, ignis, præcipue si à cibo, præsertim copioso, quis dormiat prope ignem. Mouetur ex omni causa cerebrum agitante, ut Venere post cibum, tonitruo & fulmine. Sic scribit Aretæus. Lutat. cent. 3. cur. 23. quædam ex istis fulminis, sonitu, tonitruo, statim Apoplecticum factum esse. Id ipsum vidi aliquando factum esse ex Apople- alapa, dum Medicinam Venetis facerem. Vidi Aliens fa Procuratorem caussarum percussum à Nobili a- lapa statim Apoplecticum cecidisse, & mortuū esse. Alexander Bened. de morb. lib. 1. cap. 33. scribit Apoplecticos fieri, si dormiat sub radiis Lunæ. Macrob. 7. saturn. 16. (17.) inquit tales fieri Amētes, non Apoplecticos. Vinum denique quantum possit ad impellendos humores in caput quotidiana experientia docet, cum plures videamus ebrios fieri Apoplecticos. De his scribit Hipp. 5. aphor. 5. si ebrius repente obmutuerit, convulsus moritur. Ratio huius rei est, quia fieri de repente mutum, significat multam humorum copiam.

Signa prænuntiantia.

Signa huius affectus sunt vel prænuntiatiua futuri, vel demonstratiua præsentis, vel distinctiua caussarum. Futuram prænuntiant Apoplexiam dolor capitis continuus, aurium tinnitus, somni profunditas, memoriæ iactura, excrementorum consuetorum retentio, palpitatio circa palpebras, atque alias faciei partes, lingua tremula, stupor, & corporis quidam, vel circa manus, vel circa crura, vertigo, & faciei color mutatus vel ad pallidum, vel ad insignem quandam ruborem.

Diagnostica.

Præsentem Apoplexiam facile cognoscitur cum omnes functiones animales sunt abolitæ, vel si seruetur respiratio, illa difficilis admodum, inordinata, intercepta, & cum stertore sit: propterea quatenus difficilis est spiratio, distinguimur a Carco, quatenus abolita à Syncope, quia in Syncope facies est cadauerosa, & pulsus abolitus in Apoplexia facies est plena: pulsus inæquales quidem sunt, seruantur tamen. Differt à Lethargo etiam febre: nam Apoplexia ex propria natura est sine febre. Galen. 2. aphor. 19. 5. aphor. 30. Differt à Suffocatione Vteri ea ratione, quia distinguuntur à Syncope.

Prognostica.

Quod pertinet ad Prædictionem futuri euentus boni, aut mali, habetis communem illam Hippocratis sententiam 2. apho 42. Apoplexiam Fortem soluere impossibile, &c. Ceterum in hoc loco explicare oportet, qualisnam sit Fortis Apoplexia, qualisque Debilis. Gale. ad vnicam respirationem vult esse confugiendum: nam Fortis videtur Apoplexia, quando respiratio est insigniter læsa; Debilis, in qua mediocriter læsa verò est insigniter, ut idem docuit loc. cit. cum prorsus abolita est, & hic vocatur primus Apoplexiæ gradus

omnium lethalissimus: Secundus est, in quo respiratio est cum stertore. Tertius, in quo spiratio est sine stertore, intercipitur tamen, & est valde inæqualis, & iste omnes inter Fortes Apoplexias connumerantur, quanquam hæc tertia vltima habeat aliquam lautudinem, propter quam ad Debiles referri possit, sicuti & illa quarta loco posita, in qua respiratio non intercipitur. Ceterum quamuis Apoplexia, in qua tollitur spiratio, & in qua sit stertor, Fortes dicantur, & idcirco ex Hippocr. sententia curari non possint, nihilominus ex his alique etiam curantur sunt.

Fuere Apoplectici, qui iam oculis impositi, imò & sepulti, reuixerunt: propterea consulunt Medici, ne isti ante 72. horas ab initio abditæ respirationis, sepeliantur. Ratio est, quia dicunt in fine 72. horarum absolutam esse periodum omnium humorum, & ubi consumpta humorum periodo, non reuixit ager, conclamatum est: noster pituitæ motum esse venius dici, bilis duarum, melancholicæ utrumque absoluta hac periodo, nulla amplius spes est. Si quærat: quomodo tamdiu absque spiratione possint viuere: Dico, hoc illis tantum contingere, qui temperamento cordis, & totius corporis sunt frigidiores: isti enim, cum magnum non habeant calorem, satis superque eueniantur, & distillant per transpirationem totius corporis præterquam quod aliqua sit etiam spiratio, sed ad sensum ignota. Pariter, quod pertinet ad Apoplexiam cum stertore idem Hippo. 6. aph. 1. inquit, quod sani, qui repente in dolorem capitis incidunt, nisi sunt, ac stertunt, in septem diebus interunt, nisi febris superueniat: ex quo aphorismo colligimus, accedente etiam aliorum experientia, Apoplexiam cum stertore esse sanabilem.

Putant nonnulli, fortius signum futuræ mortis esse spumam circa os apparentem, eo quod scripserit Hippo. 2. aph. 43. Qui strangulantur, aut resoluuntur, necdum tamen animam efflarunt, non restituuntur, quibus os spuma oblitum est, & lequuntur de Apoplecticis. Ceterum experientia docuit, illos quoque, in quibus spuma apparet, nonnunquam sanatos. Ratio est: quia spuma fit ex duplici causa effectiua, & ex duplici etiam materiali; nonnunquam fit ex solo statu agitante materiam crassam, & viscidam: quandoque fit ex impenso calore colliquante solidam pulmonum substantiam, in qua colliquatione spiritus quidam vitalis calidus inclusus spumam facit, prior spuma fit in Apoplecticis, qui catarrho abundant, & non est lethalis: secunda spuma fit etiam sine catarrho, & hæc mortem certissimam minatur.

Deterrimum quoque est signum, si album oculorum appareat, & aliud siue sponte, siue medicamento irritata multa excrementa expurgat absque tamen subleuatione Hip. 6. aph. 1. Apoplexia quin etiam, quæ sequitur Phrenitium, & lethargum est omnino insanabilis.

Putant nonnulli Apoplexiam insanabilem esse in senibus, ego tamen, præter aliorum experientiam, vidi viros, & mulieres septuagenarios ab Apoplexia fuisse liberatos; & illa Monialis, de qua heri dixi, cum septuagenaria esset, incidit

in Apoplexiam notam, à qua tandè à me fuit liberata: nunc etiam vivit. Desinit in paralyfin, vt docuit Gal. lib. 4. de loc. aff. 2. & Nicol. Pifo; sed non semper: hæc enim mouet brachium totum, & oculos, & tamè nò sentit, nec alias partes mouet.

Sanabilis est Apoplexia in robustis viribus, in qua respiratio sit quidem inordinata, sed non intercepta, & consuevit solui febre superueniente, vt docuit Hip. 6. aph. § 1. Quandoq; soluitur breui horatum spatio, nonnunquam durat vnam vel alteram diem, imò vero vsq; ad septimam, si Hip. credimus loc. cit.

Curandi via.

*Ass.
sang.*

Cum Apoplexiz curatio conueniat cum curatione Caris, idcirco paucis illam vobis proponam, & ad Catalepsin deinde me conuertam. Perficitur hæc curatio primo quidem sanguinis missione, de qua Cels. lib. 3. ca. 27. dicebat, aut citò curare, aut citò interficere: illud tantum hac in parte est querendum, vt omnibus Apoplecticis conueniat: ex qua vena sanguis mittendus sit & in qua quantitate Græci, vt Aet. Paul. &c. Celsus inter Latinos videntur in omni Apoplexia sanguinem mittere cum tamen, si de pituitosa sit sermo, nulla ratio persuadeat sectionem venæ posse prodesse: itaq; credendum, istos scriptores venæ sectionem proposuisse in omni Apoplexia, dummodo tamen adsit plethora vel legitima, vel spuria: fieri enim potest caput reddi humidius, & pituita plenum ex constitutione temporis, auro humido, ex cibis copiosis, crassi succi, & tamen sanguine etiam abunde, in his casibus conuenit venæ sectio.

Quod si corpus caco chymicum fuerit, nunquā secunda est vena, sed alijs reuulsionibus agendū, clysteribus acerbis, suppositorijs, frictionibus, & ligaturis, sinapismis & vesicantibus, de quibus omnibus dictum est in tract. de Caro.

Vomitum etiam in his casibus est promouendus.

Sed vbi sanguis abundat cum plenitudine legitima mittendus est ad lib. i. vel lib. i. & sem. pro varia corporis plenitudine: In plenitudine nota satis erit vnc. vi. vel vij. sanguinis vacuare.

Locus.

Locus mittendi sanguinis, nisi suppressi sint mentes, aut hæmorrhoides, sint venæ cubiti, & vtrique etiam secari potest eadem die, cum maxima est plenitudo. Rhases noster secat venas iugulares: Hæc operatio tunc locum habet, cum sit Apoplexia impedito transitu sanguinis, & spiritus vitalis ad plexum, vel extra plexum choroidem; tunc enim venæ iugulares mirum in modum tumen hoc dico propter Gatinariam, qui dicit non posse secari, sed, vt dixi, secantur absque ligatura, Sed quia periculum est profusionis sanguinis, quæ F suppressi non possit, idcirco foramen debet esse angustissimū, & ad compescendum sanguinē, parari debet Linimentum ex aloë, thure, pilis leporinis cōbustis, & albumine oui, deinde superponantur asseres ad verumque os iuguli, & ad aures, & à sterno vsque ad mentum: sic enim fit ligatura, quæ sanguinem suppressit, & anhelitus difficultatem non facit. Cum iugulares venæ secari nō pos-

sunt, post factas cubiti venas, aperiatur vena frontis aut apponantur hirudines venis temporum, & post aures, vel aperiuntur venæ natiui.

Sed vbi suppressus sit sanguis, vel hæmorrhoidum, vel menstruus, antequam superiores venæ aperiuntur, secetur primo inferiores, aut mittatur sanguis per venas sedales.

Virtute non permittente venæ sectionem, agendum est cucuribit, scarificatis, quæ apponentur plures, duæ cruribus, duæ coxis, totidem natibus, totidem etiam lumbis: Scarificentur profundè, & si non redeat patiens, magna etiam cucurbita occipiti apponatur: Thoraci non sunt apponendæ, quia augent spirandi difficultatem: Valefc. de Tarrant. vtebatur in his casibus in suo Philon. hirudinibus appositus pluribus partibus corporis, & proficitur se cum fructu hoc fecisse.

Præter has reuulsionem, conuenit euacuatio à Capite per erethina, & sternutamenta, de quibus in tract. de Caro: conferunt illitiones palati ex oxymel ite scyllit. cum confectioe anacardina misto, cum sinapi, & trochiscis alhard: nam si aliqua portio huius materiz in ventriculum descendat potest aut vomitum, aut aluum mouere.

Denique his non conferentibus conuenit vsio actualis in occipite, in syncipite, & tandè Arabes proponunt sartagine ignitam Capiti esse appropinquandam vsque quo capilli deurantur. Detasis etiam Capillis si quis Vesicatorium capiti ad mouerit, cum fructu hoc faciet.

DE CATALEPSI.

Cap. XIII.

Affectus omnium rarissimus, & cognitione difficillimus ille est, quem Græci modò κατὰ ληψιν, modò κατὰ ληψιν dicunt, Arabes So Kos, Latini Congelationem, & Detentionem: Qualis nam sit hic affectus, quæ illius natura, & causa, & locus affectus, maxime controuersum inuenio.

Primum quidem video, antiquiores Græcos, imò verò & Latinos huius affectus naturam non cognoisse. Nam apud Cael. Aurel. 2. de acut. 10. vñ, error cum fiat mentio Catoches ex antiquorum, & Græcorum, & Latinorum sententia, non describitur aff.

ECatoche, de qua hic loquimur, sed Coma vel Vigil vel Soporiferum, & propterea in eo effectu patientes sentiunt, si pūgantur, deglutiunt, seipsos mouent, & quamuis oculos habeant apertos, habent eos tamen apertos voluntariè; nam aliquando claudunt eos.

Huius affectus sub nomine Catoches meminit etiam Aet. 2. tetrah. 2. c. 6. Meminit Paul. lib. 3. ca. 10. in capitis princ. & c. 4. in fine; sed nihil aliud descripserunt isti sub nomine Catoches, quàm Coma, aut Vigil, aut Soporiferum. Quinimo Hippoc. etiam 2. prorrh. § 6. cum dicit cum Catoche delirantes, ostendit se explicare Coma Vigil, aut Soporiferum, nam in nostra Catoche, de qua loquimur, nullum potest esse delirij signum quia vox intercipitur.

Sed quid dixerit Gal. in illo com. vt Hippoc. rueretur, scio. Veruntamen cum videam Paul. Aet. Aurelianum existimasse, Catochen antiquorū nihil aliud fuisse, quàm Coma Vigil, aut Soporiferum,

*Recentio-
rum non-
nulli igno-
rant Ca-
tochen.*

*Amatus
lusi de-
ceptus.*

inferum, puto istos ex hac Hip. auctoritate ductos A
esse ad credendum: Hæc fuit causa, cur Auctor.
Finit. Medicarum Coma Vigil, & Soporiferū vo-
carit Catochen, Hæc etiam fuit causa, quod Io.
Goræus in finit. Medic. & Rondelet. & alii Re-
cent plarimi decepti sint, qui nullam cognouerūt
Catochen aliā præter Coma Vigil, aut Soporiferū,
Cæterum Amat. Lusit. in schol. 15. 2. lib. cen-
turiarum, secutus hac in parte Paul. Aeginetam
lib. 3. ca. 10. in fine distinguit Catochen à Catale-
psi, & inquit, Catochen nihil aliud esse, quàm Co-
ma, Catalepsi esse Congelationem totius corpo- B
ris, & propterea Fuchsiū improbat, qui existima-
uit Catochen, & Catalepsi esse eundem affectū.
Cæterum hac in parte decipitur Lusit. quoniam
neq; apud Paul. neq; apud Gal. inueniēmus. Ca-
tochen esse quid distinctum a Catalepsi, sunt syno-
nima, & vnum eundemq; affectū significant, hoc
potestis videre apud ipsum Paul. loc. cit. apud Ga-
lenum 4. loc. aff. 2. qui propterea hunc affectum 4
de caus. puls. 16. vtroque nomine nuncupari, &
idem significare docuit.

*De Catoches seu Catalepsios natura
vera sententia.*

DOui hætenus, quid non sit Catoche, doce-
bo in præsentia quid sit hic affectus, quæ
causæ, signa, & quæ curatio.

definitio

Est hic affectus immobilitas totius corporis cū
deprauatione, & insensibilitas ex induratione fe-
re omnium musculorum & nervorum.

Dicitur *immobilitas*, quia in hac affectione
nullus est motus, exceptis musculis thoracis: serua-
tur enim spiratio, sicut Apoplexia, atq; in Cato-
pro conseruatione vitæ. Dicitur *immobilitas cum
deprauatione*, ad differentiam immobilitatis Apo-
plexiæ, & Carii, atque etiam Paralysis, nam in his
affectibus omnes quidem musculi oriantur, sed
manentes in suo naturali statu: In Catalepsi oriū-
tur quidem, sed extra naturalem statum: quando-
quidem ita manēt musculi, sicut reperiuntur status
corporis, quo tempore affectio inuadit, vt si inua-
dat scribentem, ita maneat corpus, atque si scriberet,
si comedentem, aut stantem, aut disputantē, E
in eo statu manet, in quo agentes reperiuntur,
propterea *κατάληψις*, siue Apprehensio dicitur
hic affectus.

Dicitur *insensibilitas*, quia sensus tactus om-
nino est abolitus, puncti nequaquam sentiunt,
quandoque tamen seruat visus, & auditus au-
dore Gal. 2. prorrh. 56. quod si auditus, & visus,
ergo & sensus communis, huius ratione visus co-
gnoscit se videre, auditus se audire, & distingui
tur obiectum visus, seu visibile ab audibili, at si
seruat visus communis, etiam imaginatio ser-
uatur, ad quam pertinet cognoscere bonum, &
malū, & alias species insensiles in obiecto sensili,
propterea Gal. loc. cit. scribit illum suum discipu-
lum, qui capius est hoc affectu, vidisse, audiuisse
& imaginationem seruasse; aliquando tamen
vsque adeo grauis est, vt omnes sensus, & exter-
nos, & internos tollat. hinc Gal. 3. de differ. sym-
ptom. cap. 3. Catochen inquit esse Paralyfin ima-
ginationis.

Non seruat tamen motus mandibularū, vt
quidam putant moti Hippocrati auctoritate 2.
sect. Epid. vbi profert casum Eumenis; nam, vt
dixi in externa lectione. Catoche apud Hippo-
cratem est Coma, non vera Catalepsi; & propte-
rea cum apud Fernel. lib. 5. duo proferantur Ca-
toches exempla, primum quidem est exemplum
veræ Catoches, secundum, in quo scribit seruata
fuisse deglutitionem, est exemplum Comatis So-
poriferi, non Catalepsi: in Catalepsi nullus est
motus, nisi respirationis.

Causa continens.

CAussa proxima est induratio omnium mu-
sculorum, & nervorum. Per omnes muscu-
los intelligo omnes, exceptis musculis thoracis.
Per nervos similiter intelligo omnes, exceptis au-
ditoris & optici, cū aliquando auditus, & vi-
sus seruentur. Cæterum hæc faciliora sunt.

*De Modo, quo fit induratio, Aliorum
opinionēs.*

G

DE causa affectionis, imò & de loco affecto
maxima est ambiguitas. Trincauel. vt ab hoc
exordiat. v. de internis cap. 4. duplicem proponit
causam: Intemperiem frigidam, & siccam absq;
materia, & materiam melancholicam. Quod intē-
peries frigida, & sicca absq; materia hunc pariat
affectum, docet experientia, persuaadet Galeni au-
toritas, nam qui iter faciunt in niuosis montib.
equo insidentes, plerumque congelati reperiuntur
indurati oculis apertis, viuis similes, & tamē sunt
extincti. Gal. quoq; 2. prorrh. 56. & 2. aph. 3. ex in-
temperie frigida & sicca inquit fieri hunc affectū.

Falsa tamen est hæc sententia. Primò, quia fri-
gnis internum nunquam vsque adeo vehemens es-
se potest, viuentē adhuc homine, quæ est extē-
num: at verò Catoche ex causa intrinseca facta
multoties curatur.

Accedit, quod hic affectus momento temporis
accedit, & recedit: Intemperies frigida & sicca
neq; citò finēq; citò desinit.

Quod etiam pertinet ad materiam melanco-
licā, nisi aliud addat Trincauel. non exponit causam,
cur ex hac melancholia potius fiat Catalepsi
quam Melancholia, aut Epilepsia, aut Læsa Me-
moria.

Rondeletius primo de intern. ca. 2. secutus Ae-
tium 2. retrabib. 2. ca. 4. duplicem inquit esse causam:
sanguinem, aut melancholiam, qui humores,
inquit, dum replent venas, & arterias, quæ
sunt in membranis cerebri, ex hac repletionē ten-
duntur nerui, & fit Catalepsi, seu Catoche.

Hæc quoque opinio falsissima est: Primo quia
in Phrenitide venæ & arteriæ membranarum ce-
rebri sunt admodum repletæ, & tamen non adest
Catoche. Secundo quia ex hac repletionē si fieret
tensio nervorum, deberet fieri potius Convulsio,
quàm Catalepsi. Accedit, quod hæc causa non
ostendit, quomodo in Catalepsi amittatur sensus,
& functiones principes.

Erastus part. 4. suarum disput. cont. Paracel-
sum

sum inquit, causam esse distentionem ventriculorum cerebri, factam à copioso flatu, qui (inquit ipse) facit semiangustiam, ita ut spiritus animales transmittantur quidem extra ventriculos, sed imperfectè.

*Erasii
opinio ne-
glecta.*

Hæc quoque opinio nihil dicit: Nam si pauci spiritus exeunt, debet fieri imminuta operatio, Stupor, Torpor, Semiparalyssinon Rigiditas, & priuatio sensus in toto corpore.

*Amatus
Lusitan.
explodi-
tur.*

Amat, Lusitan. cent. 2. cur. 14. inquit, hoc fieri ex spirituum animalium congelatione propter in-temperiem frigidam & siccam cerebri.

Quod sanè mihi videtur prorsus à ratione alienum, spiritus animales in corpore viuente vsque adeo congelari, ut ad motum sint inhabiles: præterquam quod si ita res esset, nunquam sensus, visus, vel auditus, neque imaginatio seruantur: neque hæc opinio assignat causam indurationis musculorum,

Propria sententia.

Omissis igitur aliorum sententijs rei veritatè indagabimus ex his, quæ sensui sunt conspicua, & ex anatome manifestiora sunt redditæ: hoc affectu adest, ut intellexistis, Induratio musculorum totius corporis, hæc Induratio potest fieri ex triplici causa, siccitate, refrigeratione, & repletione. Siccitas & Refrigeratio locum non habent, nisi sit causa extrinseca, ut iam intellexistis: ergo oportet esse Repletionem, hæc Repletio potest fieri aut in solo nervorum principio, aut per totam nervorum substantiam: si in solo principio, sit aut Paralyssis totius corporis, quia repleatur substantia medullaris, aut sit conuulsio totius corporis, quia repleatur substantia membranosa, quæ est extrinseca.

Oportet igitur, ut in hoc affectu non solum nervorum principium, sed tota substantia nervorum, qui in omnes corporis partes disseminantur, secundum sui substantiam membranosa repleatur, & consequenter induretur.

Hæc substantia non potest esse corpulenta, quia si esset corpulenta, fieret magna conuulsio: nam dilatata substantia breuior foret: oportet ergo substantiam esse vaporosam, aut flatulentam, quæ momento temporis in membranas omnium nervorum interatur; hinc fit Rigiditas.

Sed præter hanc Rigiditatem tollitur sensus, nec solum tactus, sed etiam sensus gustus, & motus linguae, quæ recipit nervos à cerebro, propterea aliam oportet inuenire priuationis sensus causam.

Causa est non obstructio ventriculorum cerebri, quia in hac obstructione tolleretur omnis sensus; at pietus quæ non tollitur: quid igitur sit? Cerebellum unum habet ventriculum, in quo spiritus animalis continetur, qui deinde per meatum quendam postoriorem, qui conseruatur apertus à processu quodam cerebelli (vermiformis vocatur) per hunc inquam meatum spiritus animalis transmittitur ad nervos omnes motorios: habet & meatum anteriorem, qui pariter defert animalem spiritum à postremo ventriculo in medium,

ut sensum tribuat nervis, quæ sunt in parte cerebri anteriore.

His sic stantibus, dum cerebelli pars posterior aut comprimitur, aut obstruitur, ita ut spiritus ad medullam spinalem non possit confluere, tollitur sensus vniuersi corporis, sed manet apertus meatu anteriore, spiritus potest confluere ad nervos oculos, & auditivos. Potest quoque imaginationis inservire, ita ut aliquando in Catalepsi cum amissione sensus totius corporis, seruetur tamen visus, auditus, & imaginatio: quod si integra fuerit vel compressio, vel obstructio vtriusque meatus, tunc in Catalepsi tollitur etiam sensus & motus, & totius corporis, atque omnium etiam nervorum sensitiuorum operatio.

His sic stantibus dico resolutè: Omnem materiam, quæ in cerebro continetur, quæ ve in cerebrum potest confluere, dummodo transmittatur ad cerebellum, siue comprimendo, siue obstruendo meatum posteriorem, posse hunc affectum producere.

Ostendi hæcenus, in Catalepsi, nervos & musculos indurari ex vaporosa, & flatulenta substantia ipsos replente, præcipuè secundum partem membranosa; sensum verò tactus abolitum reddi, & facultatem motu cem, meatu posteriore cerebelli aut compresso, aut obstructo; sensum visus & auditus, ac imaginationem aliquando seruari, quando anterior eiusdem cerebelli meatus fuerit apertus; has omnes tolli, cum hic quoque fuerit occlusus; reliquum est, ut causas explicemus, quæ ad compressionem, aut obstructionem faciunt, & substantiam illam vaporosam gignunt, vel flatulentam.

Causæ efficientes dictam generationis Catoches modum.

Hæc substantia non est vnica, sed multiplex, magna tamen ex parte est melancholica. Hic enim humor & sua duritie, & frigiditate, & siccitate aptissimus est ad compressionem, astrictionem, & obstructionem inducendum. Is quoque spiritum generat crassum, qui per nervos distributus indurationem efficit; propterea Gal. 1. in. primum proth. 16 & 2. apho. 3. cum scribit, ex intemperie frigida & sicca Catalepsin gigni, intelligendus est de intemperie frigida & sicca in materia melancholica humoralis existente, non in parte solida: Nouit enim Gale. Catalepsin subito fieri, & breui temporis spatio recedere, quod minime conuenit affectibus ex intemperie partium solidarum excitatis: etenim ipse 3. de loc. aff. 7. propterea negat Apoplexiam, & Epilepsiam fieri ex intemperie, eo quod subito accedat, & recedat. In hanc sententiam, ut dixi, magna pars Recentiorum consentit.

Est quoque pituita: hoc colligitur ex Gal. 1. 3. meth. 2. 1. 4. de loc. aff. 2. his duobus in locis recenset Gal. affectiones, quæ sunt ex succo pituitoso, & inquit, has esse Coma, Carum, Catalepsin, Epilepsiam, & Apoplexiam: idcirco Dodonæus in annot. ad cap. 46. lib. Ant. Beniuen. de admirad. vbi Anton. proponit casum cuiusdam Carochici,

qui

qui delit in Epilepticum, inquit Dodon hic affectus factus fuit ex pituita, & propterea Holler. Et in com. 2. ad aphor. 8. lib. de coactis prænot. inquit, aliquando hos affectus mutuo se excepisse, Coma Cataleptin, Epilepsiam, Convulsionem; at certum est, Coma fieri ex pituitoso succo; ergo & alij mutuo succedentes facti sunt ex eodem succo.

De materia biliosa hoc idem videtur affirmandum, posteaquam scribit ipse Holler. in comm. ad aph. 13. lib. 5. de Coactis prænot. post delirium factam esse Catochen. Ego (Auditores) referam hic Catoches historiam, quam Vidi Venetiis, quæ per suadet, ex bile potuisse hunc affectum fieri.

*Historia
catalept.
ex Bile.*

Camillus Balionus annum suæ ætatis agens 24. temperamenti biliosissimi, incidit in febrem ardentem, ab initio cum vigilis, & dolore capitis intentissimo, quarta die Phreniticus euadit cum rixa, & furore, cum vigilis perpetuis, nullis conferentibus auxilijs; 14. die delirio existente maximo, subito corripitur Cataleptis: Frigidus manet, supino ventre apertis oculis & inconniuentibus, aperto ore 6. horis continujs; post 6. horas rediit sensus, & cum eo delirium, sequenti die eadem hora rediit Cataleptis, perduravit symptoma 12. horis, sublato symptomate rediit ad vigilias, & delirium; tertia die eadem hora rediit cataleptis: perduravit 18. horis, sequenti die reuertente accessione eadem obiit.

In hoc casu posset quispiam iure optimo arbitrari, in tanto delirio Cataleptin factam esse ex materia Biliosa, quamvis, ut ingenuè dicam, mihi tunc venit in mentem potuisse disrumpi abscessum ex magna inflammatione obortum, & abscessus materiam fuisse Catoches causam.

Videtur quoque esse posse Sanguis, non quod hoc scripserit Aet. 3. tetrab. 2. c. 4. atque id ipsum acceperit Rondel. 1. de inter. c. 10. nam ambo loquuntur de Comate, non vera Cataleptis sed quia Hollerius 1. de inter. in schol. ad c. 9. in fit, scribit, cuidam Secretario, ex Catoche mortuo, inuentam esse copiam sanguinis crassi in vena illa, quæ parte posteriore ad anteriorem tendit.

Ceterum quoniam ipse Holler. partem cerebelli in hoc ægro dicat plenam fuisse quodam sero rufo, mihi persuadeo Catochen factam esse potius ex illo sero, quam ex sanguine in vena contento.

Neque est præter rationem arbitrari illud serum rufum transmissum esse ab illa vena, in qua sanguis crassus, & retortidus continebatur: quandoquidem si ex vaporibus potest fieri aliquando Cataleptis, ut colligitur ex Galeno 1. de caus. symp. 7. ubi scribit, ex ore ventriculi fieri posse, & Melancholias, & Comata, & Cataleptis, multo magis fieri potest ex ichore, & potissimum prauo.

Itaque ex his constat, non unam sed multiplicem esse materiam, quæ Catochen facit; & quamvis solum sanguinem non putem id posse efficere, eo quod, si extra venas fuerit, statim corrumpitur, atque putrescit, atque insanabilem reddit affectum; intra venas autem non potest usque adeo abundare in ipso cerebello, ut non abundet etiam alijs cerebri partibus: hinc fiet potius Phrenitis, aut Apoplexia ex sanguine.

Non inficior tamen sanguinem pituitæ com-

mistum id efficere posse, ut colligitur ex historia relata à Dodonæo in suis obseru. c. 4. & in annotat. ad idem cap.

Refutatio falsæ sententiæ.

EX quo (Auditores) potestis colligere vanam esse illorum sententiam, qui putant ex imaginatione hoc tantum fieri: etenim cum hic affectus fiat & in sanis & ægris, & in febribus intermittentibus, & continujs, & per consensum, & per essentiam, & cum inflammatione cerebri, & sine inflammatione, & ex humore melancholico & alijs: apprehendat quoque ægros nihil cogitantes, neque imaginantes, & præterea reddat corpus non tantum immobile, sed cum deprauata figura, & rigidum, impotens ad motum & sine sensu, ut neque puncti quicquam sentiat, quod vidimus ipsi, falsissimum est asserere hæc fieri ex imaginatione tantum. Vidimus autem in illo Balione.

Signa.

Signa huius affectus ex dictis sunt plana: cum enim quispiam de repente Rigidus manet in eo corporis statu, in quo reperitur agens, aut loquens oculis apertis, inconniuentibus, quasi caput Medusæ vidisset, hic affectus dicitur Cataleptis, seu Congelatio: pulsus sunt duri: alui excrementa & vrina supprimuntur: sola spiratio seruatur sublato sensu tactus, ac quandoque ceteris omnibus, nonnunquam seruatio visu & auditu.

Prognostica.

Hic affectus ex sententia Dodonæi in suis obseruat. Med. c. 4. si bis repetat, est insanabilis, & propterea illum affectum, de quo meminit Beniuen. de admirand. c. 102. puto non fuisse Cataleptin, sed stuporem aut torporem cum forti aliqua imaginatione deprauata, qui est ille affectus, quem dicunt fieri ex sola imaginatione, & non hic, de quo nunc loquimur in præsentia.

Curatio.

Cum hic affectus fiat ex illis causis varijs, ut dixi, ita etiam vario modo curatur. Curatur hic morbus eodem modo extra accessionem, quo etiam curatur aut Coma, quando fiat ex humore pituitoso, aut Læsa Memoria, aut Melancholia, quando ex humore melancholico, aut Phrenitis, cum ex bile, aut ex sanguine.

Sed in accessione obseruandum, vtrum conueniat aliquid operari: paucis sic rem decerno, in Catoche cum plenitudine sanguinis etiam tempore accessionis venam secare oportet: si non sit ex sanguine, clysteres iniciantur, cucurbitula scarificata, & non scarificata adhibeantur capiti, & præcipue occipiti deasis capillis, fiat perfusio ex oleo sambucino, in quo imponatur pettio aut castorei, aut euphorbii, & in defectu olei sambucini, idem præstabit costinum, aut rutaceum admissa theriaca. Competit autem totam quoque spinam

Ipsum eodem oleo irrigare. In eundem usum veniunt fomēta ex decoctis chamomel. puleg. silimb. calamenth. orig. aut in vino si intemperies sit frigida, aut in aqua.

Sinapism quoque & Vesicantia occipiti imposita proderunt. Quidam Recentiores, inter quos est Amatus. Lusi cent. 2. cur. 14. cum videant Gale. 2. (3.) simplic. 20 in refrigeratis, siue ex usu opii, siue ex alia causa, summopere probare vinum Lesbium, siue aliud quod vis antiquum, & generosum quale est Creticum, ipsi quoque proponunt illud in Catache; sed distinguenda sunt causae: nam hoc vinum conuenit tantum in materia frigida, & praemissa corporis, & capitis euacuatione; alioquin ex Catalepsi incident in Convulsionē, aut Epilepsiā.

Sublata accessione purgetur corpus pro varia humorum natura, & corroborantia similiter pro intemperaturae varietate administrantur. Haec de Catene dicta sufficiant.

DE PARALYSI, STUPORE, ET TORPORE. Cap. XIV.

Coniangam (auditores) tractatum de Stupore, & Torpore, cum tractatu de Paralyti: quandoquidem, ut dicebat Gal. 2. de caus. symp. 1 Stupor est leuis quædam Paralytis, conueniuntque in causis, & curatione.

Πάρεσις ergo, & Πάρησις & Παράληξις Graecis dicitur, ut potestis videre apud Gal. 2. in p. epid. 59. & 60. 4. acut. 26. & 2. in 1. prothet. 50. Latine dicitur Resolutio, & Mollificatio.

Est motus & sensus abolitus partium humani corporis ex defectu animalis facultatis.

Per motum intelligo animalem, minimè naturalem: hoc dico propter Gal. qui 3. de caus. symp. 2 attractores facultatis ventriculi lesionē vocat Paralytin, & Hip. qui 3. in 6. Ep. 1. Coctionem ventriculi sublatam, aut diminutam vocat Torporē: Per sensum intelligo omnem sensum externū & internū, visus, auditus, tactus, ad differentiam sensuum interiorum, & facultatum principum, quæ sunt lesionēs lib. de diff. sympt. 3. Galenus quoque vocauit Paralytin.

Non putetis verò, cum dicimus Paralytin esse vitium motus, & sensus, semper utrumque vitium simul connecti: nam aliquando motus tantum nonnunquam motus & sensus, quandoque sensus tantum lesionem patitur.

Et ubi motus tantum, aut sensus & motus videntur, vera est, ac propria Paralytis: sensu tantum sublatio, impropria est. Gal. auctore 3. loc. aff. c. 10. Diximus esse motum & sensum abolitum, ad differentiam Stuporis, & Torporis.

Nam Stupor est sensus imminutus, 1. de caus. symp. 5. (1)

Torpor est motus imminutus, de art. medicin. 8. cap. 8.

Praeterea dicitur motus abolitus, ad differentiam Convulsionis Epilepticae, & Catalepticae, in quibus deprauantur motiones.

Addidit partium corporis, ad differentiam Apoplexiae, & Catu, in quibus totum corpus sensu, & motu priuatur, inspiratione excepta, per partes, 1. corporis non tantum intelligo oculum, aut lin-

guam, manum, & pedem, brachium, & crus, vesicam, intestinum, pudendum, verum etiam aliquando totam dimidiam partē corporis, quæ ἡμιπληγία vocatur; quandoque nomine partis intelligo totum corpus capite excepto; aliquando simul cum toto corpore coactam etiam linguam, & buccas: dummodo non omnes sensus simul cum motu animali non tollantur, potest dici pars tantum affecta.

Illud, hoc in loco est obseruandum; ubi afficitur totum corpus infra caput, aliquando afficitur aequaliter, ita ut nulla pars moneatur, aut sentiat; quandoque inaequaliter, & hoc pluribus modis; aliquando contingit, ut brachium sinistrum, & crus dextrum sint resoluta; quandoque in vnica manu resoluuntur, duo, aut tres digiti, ceteris illis. Quod magis est, resolutis brachiis, aut cruribus motu priuatis; sensus tamen admodum inaequalis ad mortem usque; quandoque in his partibus reperitur, ut v. g. pars exterior corae sensum retinet, interior est sine sensu: pars exterior cruris est sine sensu, interior cum sensu, hoc vididicam infra causas.

Causa continens, & modus generationis.

Causa generalis vniuscuiusque Paralytis est defectus facultatis animalis. Deficit hæc facultas, aut dissoluta propter maximas cerebri intemperantias, præcipue propter frigidam: sic scribit Gal. in 13. com. 1. proth. extincto calore natuo totius corporis signum sequi ex superpurgantibus etiam potestatem spiritus animalis deficere, ut notauit idem Gal. in com. 9. 7. aph. part. cum scribit Hip. de sanguinis profusio desipientia, &c. & Brasauel. in com. eiusd. aph. scribit, se quendam vidisse à sanguinis narium copiosa profusione Paralyticum factum.

Deficit etiam facultas animalis, quando spiritus animalis totus diuertitur ab ipsis nervis, siue propter aliquam insignem inflammationem capitis attrahentem ad se sanguinem & spiritus, septima aph. 1. 4. Ab ictu capitis obstruptione malis, siue retractis spiritibus propter terrorem, quæ ratione scribit Gal. com. 57. septimæ partie in concussione cerebri immobilitatem totius corporis subsequi.

Magna tamen ex parte facultas deficit impedita.

Impeditur autem aut nervo inciso vel rupto, vel exsiccato vel compresso, vel obstructo.

Ruptio & incisio fit ex vlneri aut ex casu.

Exsiccatur aut ex inedia, curis, & vigiliis, motu Venere, aliisque euacuationibus, sic scribit Trallia. lib. 1. c. 16. ex siccitate factam Paralytin. Denitas fit ex refrigeratione siue aeris, siue aquæ: sic Gal. 3. (4.) de loc. aff. 4. scribit Paralytin curasse in Piscatore, factam ex frigidioris aqua. Compressio quandoque fit ex calculo renalis: sic 1. in 6. Ep. 6. in calculo stupor cruris; si maior esset compressio, posset etiam fieri Paralytis: Ex inflammationibus & tumoribus, teste Gal. 4. de loc. aff. 4. Denique fit compressio ex luxatione vertebrarum, aut cervicalium, aut dogli, non item lumborum, neque ex omni luxatio-

Historia

Quidam cum laborasset sphaacelo in seroto & testibus, exiliosphaacelo cecidere testes, & serotum & sic effudit simul sanguinem, quo effuso statim incidit in Paralytin aqua fuit liberatus

luxatione: non enim ex illa, quæ fit ab initio ad interiora, aut ad extrosum, nisi vsq; adeo violent fiat, vt nervos dirumpat, sed fit Paralysis ex luxatione ad dextrum, aut sinistrum latus, vt docuerunt Hip. 2. Epid. sect. 2. Gal. 4. loc. aff. 3.

Eniq; fit Paralysis ex Obstructione, & quamvis magna ex parte Obstructio fiat ex crassis, ac pituitosis humoribus, potest tamen eam fieri ex melancholicis, nam si Paralysis sequitur Apoplexiam, vt docuit Gal. 4. de locis aff. 2. & Apoplexia fit ex humore melancholico, vt docuit idem Gal. 6. aph. 56. & 57. ergo hæc Paralysis fiet ex humore melancholico.

Idipsum dico de sanguine: nam si datur apoplexia sanguinea, ex Gal. lib. cur. per sang. miss. 5. ergo & Paralysis, quæ sequitur hæc Apoplexiâ erit ex sanguine. Valeriol. 2. obseruat. obs. 8. scribit, in quodam Paralytico, qui ictus fuerat in capite, post mortem inuentam esse saniem, Paralysis causam: Et Gal. 4. de loc. aff. 4. ex Petipneumonia inquit fieri Paralytin.

Historia

D. Ber-

ner. Tre-

nisanus,

focer Ex-

cellentif-

simi Au-

storia la-

borant

abscessu,

& comu-

nicata

materia,

seu sanie

vertebris

factus est

Paralyti-

cus.

Historia

Paralyf.

ex mate-

ria Bilio-

sa.

Rondelet.

arg. re-

solv.

De Bile est aliqua controuersia. Nam Gale. 1. prother. 13. causam Segnitici, & Paralysis refert in solos crassos, viscidos, & pituitosos humores; bilem minimè posse hos affectus inferre, quam sententiam Rondel. accepit; propterea in Fernel. inuehitur 5. pathol. 3. dicentem, dari Paralytin ex materia biliosa, sub finem febrium biliosarum ad nervos transmissa.

Ceterum (Auditores) non est tantum Fernelij hæc sententia, sed Paul. Aeg. lib. 3. cap. 43; qui cum scribat, suo tempore facta esse Colicam, quæ desinebat aut in Conuulsionem, aut in Paralytin, inquit, hanc nulla alia ratione fuisse curatam, quàm à temerario quodam medico, qui frigidis oleribus, aqua, potu, cibisque incrassantibus huic malo opem tulit: ex quo possumus coniecere, calidum & biliosum fuisse humorem.

Ego quoque superioribus annis vidi Episcop. Illustrissimum, qui cū ex Colica in Paralytin brachiorum incidisset, frustra diu curatus medicamentis calidis, tandem, cum ipsemet vreretur longo temporis spatio, non vt seipsum curaret, sed religionis ergo; oleribus frigidis, aqua, potu, &c. spore à Paralytis est curatus: idcirco iure optimo potest fieri Paralysis ex materia biliosa obstruente.

Inter ceteras Paralysis causas proponebatur quoque materia biliosa, cuius meminit non modo Fernel. vt dicebam, sed etiam Paul. lib. 3. c. 43. cum tamen refellatur hæc sententia à Rondelet. lib. de internis cap. 32. liceat quoque paucis illius argumenta reuocare.

Quorum omnium præcipuum est: biliosam materiam Conuulsionem potius, quàm Paralytin facere in nervis impactam, hoc argumentum nullius est roboris: quandoquidè non distinguuntur Paralysis, & Conuulsio ratione materiæ, sed ratione loci affecti: etenim eadem materia siue biliosa, siue pituitosa, siue melancholica, ipso quoque continente Rondeleio, Conuulsionem, & Paralytin inducit. Distinctio igitur petenda est à loco affecto: nam in Paralyti substantia medullaris nervi præcipuè afficitur; in Conuulsione autem substantia membranosa, & fibrosa. Dice-

bat Gal. 1. de loc. aff. 6. omnem substantiam nervi communi quodam inuolucro circumuolui, membranoso scil. & propterea 1. de mot. Mosc. 1. substantiam interiorē nervi, quæ ex cerebro ortū ducit, comparat medullæ ipsius arboris, quod etiam confirmat. 7. de decret. 3. vbi docet, nervum constare ex substantia medullari, cuius origo est ex cerebro, & ex membranosa, quæ ducit originē ex membranis cerebri, itaque vbi interiur substantia vel densetur, vel obstruatur, vel exsicce- tur, vel comprimatur, Paralytin facit, quæcunque tandem fuerit causa: vbi membrana ipsa patitur, Conuulsio succedit. Sed de hac plura dicemus infra, vbi de Conuulsione tractabimus.

Refutatio Ioberti.

Hactenus de causis Paralysis immediatis, quæ communiter ab omnibus fere recipiuntur; præter quas Iobertus Delphin. in suo de Paralyti tractatu aliam commentus est, quam solam putauit esse Paralysis causam.

Fit inquit Iobert. ipsa Paralysis mollificata neruorum substantia: sunt enim nervi, quasi loca in habenis, itaque vbi propter molliem proprium robur amittunt, motui sunt inepti, molliores autem sunt ex intemperie humida, siue cum affluxu substantiæ pituitosæ, vel citra affluxum materiæ.

Huic sententiæ quamvis subscripserit quoque Rondel. atamen non putauit ipse solam hanc esse Paralysis causam, sed & obstructionem & densitatem, & alias admisit, qui propterea est magis excusandus.

Non tamen Ioberti illa ex parte assentendum est, quandoquidem si sola mollietis ad Paralytin neruorum efficiendam esset sufficiens, nulla esset Paralysis, in qua sublato motu tolleretur sensus. Ratio est clara: nam mollificatio nervi tollit quidem robur facultatis motricis, non tollit fluxum facultatis; igitur poterit vitari motus, seruari tamen sensus: sed sic est, quod datur Paralysis in qua tollitur & motus, & sensus, datur Paralysis, solius sensus, non motus; ergo causa in molliem nervi non est referenda.

Adde quod, vbi nervi sunt vsq; adeo intemperati, aut pituitoso succo referti, & proprium amittant robur, necessariò prohibent quoque fluxum facultatis animalis, propter densitatem, vel obstructionem, vt tandem causa Paralysis non in solâ mollietate, sed magis in defectum facultatis animalis referenda, Hactenus de causis immediatis.

Causæ mediata.

Mediatarum causarum plurimæ quidem sunt, atq; illæ omnes, quæ vel pituitam, vel melancholiam, aut alium humorem, qui Paralytin facit augment, inter has sunt referendæ. has prætermittit tam, quia occasione aliarum affectionum alias fuerit propositæ: aliqua tamē dicam de causis moventibus humores in capite contentos ab vno loco in alium, ita vt ex permutatione materiæ Paralysis sequatur,

Inter

Ictus, & percussio

Inter externas causas est ictus vehemens, percussio, aut casus, ex quo aut materia trahitur in locum percussum, aut protruditur ab illo in locum oppositum.

Inunctio hydrarg.

Inunctio Hydrargyri est vna ex causis extrinsecis Paralysis: Hydrargyrum enim mouet materias praecipue pituitosas à loco ad locum, ad substantiam potissimum neruolam, ex qua fit Paralysis.

Vinū & nezos.

Vinum praeterea generosum copiose epotum, & omnia calida, siue acrida, & aromatica, attenuandi facultate praedita, impuro corpori administrata Paralylin mouent, hoc scribit se Rondel. obseruasse isti muliere, cui importunè administrata medicamenta attenuantia Paralylin induxere.

Permutatur quoque materia aut ex Apoplexia in Paralylin, aut quandoque ex Epilepsia, ut patet apud Gal. 4. acut. 27. permutatur & ex Peripneumonia, ut potestis colligere ex 4. de loc. aff. 4. permutatur ex affectibus Vteri, ut ego bis obseruavi in duabus Virginibus, quarum vna ex praefocatione vteri incidit in Paralylin coxarum, & tibiarum, Altera ex distorsione vteri in latus sinistrum, incidit in Paralylin brachij, & cruris sinistri.

Permutatur quoque materia ab intestinis à dolore Colico in Paralylin: Paulus lib. 3. c. 18. & 43. Notantur praeterea alij plurimi Recentiores, & Ego ipse, qui propterea modum inquirunt, quo materia doloris Colici in neruos transferatur. Nō ero in hac disputatione longior, qui plura de hac re volueris legere, legat Erasit. part. 4. disp. contra Paracels. Videat quoque Andr. Laurent. lib. 4. c. 8.

quomodo ex Dol. Colico si at Paralytis.

Mea est sententia. Nō vnum esse modum, aut viam per quam fiat hæc mutatio; aliquando materia, quæ ex capacitate intestinorum recepta est in mesaraicas, transmittitur ad venam cauam, & per illam ad musculos partis, quæ Paralyti laborat; quandoque in membranis intestinorum recepta per membranam peritonæi communicatur propaginibus peruorū, quæ ex vertebribus aut dorsis, aut lumborum ortum ducunt; nonnunquam in vapores conuersa materia replet caput, à capite in subiectas descendit partes; aliquando fit cum materia doloris colici ex ipso capite descendit, ut propterea mutato loco ex Colica, aut Arthriticum, aut Paralylin inferat.

Problematum solutio.

Cur ista vna parte capit sequatur in opposita.
Sed hoc loco pulcherrima quædam problema: ita veniunt diluenda. Primum est. Cur ex ictu facto in vna parte capitis plerumque Paralyti contingat in opposita. Quidam putarunt, causam non esse aliam, quàm defectum spiritus animalis dicunt. n. ad partem ictam, vulneratam ve illico spiritum animale totū concurrere, qui propterea Paralytim oppositam deferit partem. Sed decipiuntur duplicem ob causam: primo quia spiritus animalis oppositam partem non deserit, nisi magna aliqua inflammatio, & maximus dolor succedat; at verò in ipso actu vulnerandi neque magna inflammatio, neque magnus adest dolor, ergo neque fluxio spiritus ad illum locum. Accedit, quod si hæc esset causa, sequeretur Paralylin tum primum cess-

A saturā, cum primū desineret inflammatio, aut dolor; docet tamē experientia Paralytis id genus non modò consistere, sublato dolore, & inflammatione, verū etiam curate ipso vulnere. Ego plures tales vulneratos vidi, qui laborarunt per annum Paralyti ex tali vulnere. Causa igitur vera, & legitima huius paralytis, non est alia, quàm causa contrahitur, vel contrahitur. Vbi quispiam vulneratur, exempli gratia, in parte capitis dextra, opposita pars cranei ea est, quæ disrumpitur, illa pars ossis vulnerata. Hoc obseruauit Celsus li. 8. cap. 4. & confirmarunt variis exemplis. Valleriola, Vesal. Fallop. & alii Anatomici. Causa nulla est alia, quàm impetus aeris, & spiritus propulsi à parte icta in partem oppositam: hic itaque spiritus, & flatus secum ducit humores in partem oppositam, qui propterea in neruos impiunguntur & Paralytim faciunt.

Secundum problema.

C Secundum problema ad Paralytim pertinens illud est: Cur affecta vna parte, v.g. vel dextra vel sinistra in facie, laxisio appareat in parte sana, minimè verò in ægra. Ratio est conspicua. Nam muscoli faciei sunt veluti duæ habent; vbi itaque vna pars laxatur, eo quod sit Paralytica, opposita necessariò intenditur, & intensa retrahitur, hinc apparet conuulsa: pars autem ægra absque labe videtur.

Cur affecta facie laxisio appareat in parte sana.

Tertium problema.

D Tertio quaeritur: Cur in Paralyti aliquando motus tantum quandoque sensus tantum, nonnunquam vero uterque & sensus, & motus amittatur. Et primo si quaeramus, cur aliquando tantum motus amittatur, seruat sensus, triplex profertur ratio: Prima, quia cum ad motum plus requiratur facultatis, quàm ad sensum, fieri potest, ut facultas sit vsq; adeo infirma, ut non sufficiat ad efficiendum motum, sufficiat verò ad sensum. Secunda, quam protulit Arculanus, & confirmauit Iouert. quod motus requirat instrumenti aliquam duriem, & firmitatem, sensus verò molliem. Itaque si instrumentum iusto mollius sit redditum, seruat quidem sensum, amittit verò motum, contra vbi duriusculum sit factum valet ad motum, non item ad sensum. Tertia profertur à Gal. simul cum priore 1. de sympt. caus. c. 5. 1. de loc. aff. c. 6. 4. loc. aff. 4. Causa est diuersitas neruorum, quorum alij ad motum, alij ad sensum destinati sunt: exempli gratia. Oculus recipit sensum visus à neruo optico, quod est primū par neruorum, recipit motum à secundo pari: similiter lingua motum recipit à septima neruorū coniunguone, sensum gustus à tertia, & quarta potest itaque amitti sensus & non motus, aut motus, & non sensus pro diuersitate nerui affecti. Quod si vel ambo nerui vno & eodem tempore pauiantur, aut vnus, qui & motum & sensum præbeat, insigniter sit affectus, tunc Paralytis sequitur & motus, & sensus.

Cur in Paralyti modo motus, modo sensus tantum modo uterque amittatur.

Quartum problemā.

Cur in
Paralys.
vesic. &
intest. ali
quādoq;
involūt.
excernā-
tur excre-
ta aliquan-
do excer-
ni nō pos-
sint.

Quarto, & vltimò quaeritur. Cū in paralysi vesicæ, & intestini excrementa aliquando inuoluntariè excernantur quandoq; vix, ac nē vix quidem excerni possint. Huius solutio problema- tis pendet ex cognitione pariter diuersorū neruorū. Nā nerui, qui in his partes inseruntur, vel inferuntur in musculū, sphincterem, seu cōstrictorū vocatū, aut inseruntur in corpus vel vesicæ, vel in testini. Cū resoluitur neruus musculi cōstrictorū, excrementa inuoluntariè excunt: Cū resoluitur neruus, qui in substantiam vesicæ, vel intestini inferitur retinentur excrementa. Ratio est clara: nam facultas expultrix sopita iacet, neq; ad expulsionem mouetur.

De causis Stuporis & Torporis,

His sic declaratis ad signa iam me conuerto. Quæ enim hæcenus de causis Paralysi dicta sunt, ad Stuporem & Torporem, etiam transferi possunt: ille enim ipsæ causæ, sed leuiorē, quæ Resolutionem faciunt, Stuporem & Torporem inferre possunt, vt potestis colligere ex Galen. 1. de caus. sympt. cap. 5.

Signa.

In tradendis signis Paralysos, diagnostica affectus non sunt proponenda: sensibus ipsis atq; relatione agrotantis constat, nunquid vel totum corpus, vel pars aliqua sensum, & motum amiserit: itaq; versari oportet in distinctiuis aliorum affectuum consimilium, in distinctiuis causarum, & locorum, atq; prognosticis.

Habet similitudinem Paralysos faciei cū Spasmo Cynico: distinguuntur autem, quia in Paralysi pars, quæ videtur sana, est frigidior, mollior, subhumida, & ex ea parte oris pituita inuoluntariè extillat neq; secundum eam partem exsufflare aut exsibilare valent.

Habet quoq; similitudinem Paralysos capitis, & corporis ad anteriora vergentis propter affectionem 1. musculorum posteriorum cum Conuulsione *in parte dēta* vocata, sed facili inter se distinguuntur: nam vbi incuruatum est corpus ad anteriora propter Conuulsionem, caput erigi nullo modo potest, etiam si violenter manibus quispiam illud studeat erigere, in Paralysi verò etiam si cadat caput ad anteriora, facili tamen erigitur ab externa manu, sed vbi erectum fuerit, statim iterum in priorem locum concidit.

Causæ externæ leui negotio cognosci possunt: E. g. incisio nerui per transuersum, vstro, putrefactio, densitas ex insigni refrigeratione, siue propter moram in aqua vel in niue; luxatio quoque vertebrarum; hæc omnia partim propriis oculis, partim ex relatione agrotantis comparari possunt similiter exsiccatio partis nerui cognoscitur ex atrophia partis.

Tumores & inflammationes quoque partim oculis conspiciuntur, partim innotescunt ex causis

illis prægressis, casu, aut ictu; deprehenduntur etiam ex dolore, calore, tubore, quando fuerint inflammatorii.

Nerui repletio cū fiat, vt intellexistis, à variis causis, possunt ipsæ causæ variis signis distinguī: primò quidem ex affectibus, qui Paralysin præcedunt, nam si gratia exempli Apoplexia præcedat pituitosa, Paralysin oportet fieri expituita: Si præcedit melancholica, aut sanguinea, credendū quoque Paralysin vel sanguineam, vel melancholicam esse, quod si sequatur abscessum, erit Paralysis ex sanie; si sequatur febrem ardentem, vel sit biliosa, vt Fernel. docet, erit Paralysis ex bile.

Sed signa horum humorum possunt quoque comparari ex temperamento, ætate, sexu, anni tempore, constitutione, regione, ac vitæ ratione.

Accurata locorum affectuum distinctio,

Diu ac multum versari oportet in distinguendis Locis Paralysos, nam ex locorum diuersitate maximam quoque videbitis esse curandi diuersitatem. Primum itaque distinguendum, Vtrum Paralysis fiat ex cerebro, an ex partibus infra cerebrum; & cū ex cerebro, vtrum eo affecto in propria substantia, an potius transmittente materiam ad neruos, aut neruorum propagines.

Cognoscetis ipsum cerebrum in propria substantia affectum, quando plures sensus vno & eodem tempore Paralysi adiciuntur, exempli gratia si oculi, aures, & nares, foris etiam lingua, vno & eodem tempore afficiuntur, certum est argumentum cerebri in propria substantia affecti; quini- mo si vnicus etiam sensus sit læsus, sed cum eo omnes alie partes infra spinalem medullam, aut media corporis pars, siue dextra siue sinistra, hoc etiam est signum cerebri affecti, vt videre est 3. de loc. aff. cap. 10.

Quod si aliquādo plures quidem in capite partes atticiantur, sed quæ tamen omnes sensum, & motum ab vnico neruorum pari recipiant, tunc cerebrum in propria substantia non est affectum, sed tantum circa originem istius neruorum partis. V. g. Tertium par neruorum inferitur in cutem frontis, in palpebras, in labra, in pinnas narium, in musculos temporales, & māsorios, & in membranam, quæ linguam circumuestit: itaque læso huiusmodi neruo circa sui exortum omnes hæc partes patiuntur, neque tamen cerebrum laborat. Quod si vnica faciei particula sit affecta, siue cutis frontis, siue palpebra vna, siue altera, siue lectus est in ea propagine nerui, vel in eo musculo, non in cerebro, neque in primo nerui exortu.

Quod dixi de cerebro, idem dicendum volo de partibus infra cerebrum,

Vbi afficitur principium spinalis medullæ circa vertebra cervicis, non modò sensus, & motus partium infernarum, atque etiam spirationis tollitur, sed læditur quoque cutis capitis, mors lingua, & fit Conuulsio Canina, sit tortura oris. Ratio est; quia ab huiusmodi vertebra cervicis oriuntur nerui, qui inferuntur in cutem capitis, oriuntur nerui, qui inferuntur in musculum laryngem,

tum, qui tendit ad buccas, denique oriuntur nervi septimæ coniugationis, qui præbent motum linguæ:

Quod si seruetur spiratio neq; lingua, aut partes capitis afficiantur, omnes tamen ceteræ partes sint resolutæ, tunc oportet esse læsionem in principio quidē spinalis medullæ, sed circa vertebrae dorsæ, & post primam: alioquin spiratio non posset seruari.

Vbi vero media tantum pars fuerit affecta medietas quoque spinalis medullæ afficitur: illud sed scitu dignissimum, est cur affecta spinali medulla circa primas dorsæ vertebrae adeo inæqualis fiat in subiectis partibus paralytis, ita, ut V.g. brachium dextrum sit resolutum, & crus sinistrum sed (quod est maius) sensus partis externæ circa femur (& hoc observavi in praxi) sit sublatus: in parte internâ seruetur? Cōtra in ipsa tibia sensus seruetur in parte externa, & amittatur in parte interna. Causam huius inæqualitatis nō esset difficile assignare, quando suppositum nobis non esset, totius mali originem esse in principio spinalis medullæ, nam posset quis dicere, hæc ideo fieri,

quia ille determinatus nervus in eam partem inferus est resolutus, ille autem non. Sed (ut dixi) nos supponimus, primam mali originem esse in spinali medulla circa dorsæ vertebrae, & tamē fit læsio inæqualis. Solutio est apud Galenum 1. de loc. affect. c. 6 quam tamen dilucidavit Andreas Laurent. lib. 4. c. 14. & controuersia 8. eiusd. lib. Nervi ipsi in spinali medulla tanquam cōmuni quodā inuolucro contenti unus tantum videntur in ipso autē statim exortu, quasi pili in cauda equina sunt inter se distincti, & ad singulas partes tã supernas, quã infernas pro motu perficiendo destinati. Itaque in ea etiã origine, prout varia hæc filamenta vel obstruuntur, vel densantur, variaz quoque fiunt Paralytis differentiaz.

De voce & sermone.

Inter ceteras actiones, quæ ob Paralytin destruuntur, est etiam vox & sermo. Locus autem affectus agere admodum cognosci potest, cū ex multiplici prodeat parte, atque instrumento. Idcirco in præsentia vobis proponam signa distinctiua vniuscuiusque partis, ex qua vox & sermocinatio læditur.

Sermocinatio, & vox habent pro instrumento nervos sextæ coniugationis, & musculos linguæ mouentes: hi faciunt ad sermonem. Vox virtut pro instrumento musculus laryngis internis, & externis, nervis sextæ coniugationis, musculis thoracis constrictorijs, musculis faucium, ac musculis intercostalibus. præter hæc os hyodes, siue ypsioides cum suis musculis; quia est basis linguæ, confert ad sermocinationem. Propterea cum læcantur istæ actiones, & læsi musculi linguæ, & nervi septimæ coniugationis, & musculis ossis hyodis, & musculis laryngis, & faucium, & thoracis constrictorijs, & intercostalibus, & nervi sextæ coniugationis, singula hæc loca distinguere oportet, ut vnicuique propria accommodentur remedia.

Itaque si musculi ac nervi septimæ coniugationis, lædantur, sonus vocis seruetur, sicuti in brutis animantibus; sed nulla est vocis articulatio: nulla dictionis pronuntiatio.

Vbi affecti sunt musculi ossis hyodis, pronuntiatio quidem restat, sed tremula, atque imbecilla.

Et si musculi, V.g. partis dextræ, sint affecti, dum inuertitur collum in sinistram partem, melius sit pronuntiatio; in partem affectam deterius.

B Si affecti sint musculi laryngis, siue interni, siue externi, amittitur sonus ipse vocis, seruantur tamen efflatio vehemens cum sonitu, nam illud oportet vos intelligere, à musculis laryngis constringentibus & dilatantibus fieri vocis sonum, à musculis faucium fieri exsufflationem vehementem cū sonitu, quibus affectis, tonitur talis exsufflatio, & impeditur deglutitio; nam isti musculi faciunt etiam ad deglutitionem.

Vbi vero afficiuntur musculi intercostales, leditur exsufflatio vehemens, sed sine sonitu.

Deniq; affectis musculis thoracis constrictorijs, impeditur exspiratio, & quia vbi impeditur exspiratio, impeditur etiam hæc exsufflatio cum sonitu & vox ipsa. Præterea ex hoc solo principio affecto omnia alia succedētia corrumpuntur: contra vero non est necesse, ut læsa sermocinatione, aut vocis sono, læsa sit exsufflatio cum strepitu, cum sonitu & sufflatio vehemens, atque exspiratio, hoc proteritis legere apud Gal. 4. de loc. aff. 6.

Quod si nervi 6. coniugationis sint affecti, simul cum voce abolita, solet etiam vitari appetentia oris ventriculi, & viscera stupida reddi consueverunt, nam idem nervus inferitur in os ventriculi, & in membranas viscerum. Diebus superioribus accessit ad me quidam patiens læsionem vocis ex illo oris ventriculi nervo læso, qui habebat hæc signa demonstrantia, de qua re admonui tunc meos Auditores.

Prognostica.

Paralytis ex antiqua luxatione, ex scirrho, ex intemperie frigida, & humida in ætate senili ex atrophia partis confirmata, est prorsus insana-bilis. Putant omnes, Paralytin ex nervo præciso, aut combusto, vel alia ratione seiuncto factā restitui non posse vlllo modo: Cuius oppositum. Ego observavi superioribus annis in Illustrissimo Comite Hercule Beuilaqua Ferrariensi, qui a tormentario pulvere in Belgio combustus secundū utrumque erus separatis nervis cruris, post paralytin 5. vel 6. annorum usu nostrarum aquarum thermalium, & lutorum Parauinorum est restitutus.

Ceteræ Paralytis differentiz curationem patiuntur, sed omnes quidem egro.

At Paralytis, quæ Apoplexiam sequitur, plerūque in eandem Apoplexiam definit. Hæc solet fieri in hyeme, ætate senili,

*Cur affe-
ctio prin-
cipio spi-
medul si-
at ina-
qual. in
subiectis
possi. Pa-
ralysis.*

*Paraly-
tis ex nervo
præciso
sanabilis.*

Historia

Curatio.

Huius affectus varia est curatio pro causarum varietate. Idcirco cum Medicinæ scriptores in proponendis Paralyfis auxiliis pituitosam plerumque materiam respiciant; vobis tamen aliter insidendum, atque incedendum est, qui iam nostis dari Paralylin ex siccitate, ex inflammatione, ex sanguinis plenitudine, ex materia biliosa, melancholica, pro causæ varietate vario modo incedendum.

Supponatur igitur Paralyfis ex Siccitate, huic prospiciendum solis humectantibus, & reuultantibus. Accommodata humectantia sunt non modo olea siue communia, siue amygdalinum, chamomelinum, anethinum, non modò pinguedines anatis, anseris, vrsi, leonis, sed etiam medullæ bouis, aut vituli, mucilagines psylli, sem. malu. altheæ, cydon. ventres animalium calentes, omentum, & pulmones, catuli exenterati, id est, nuper aperti, atque alia id genus animalia, æsypum, seu vnguēt, quod sit ex pinguedine lanarum, de coctū ex capite castraticum malua, althæa, bisinalua, semine lini, aqua, in qua abluuntur lanæ, luta emollientia, ut est apud nos lutum S. Bartholomæi. Hæc conueniunt in Paralyfi ex Atrophia, vbi refrigeratio insignis non adsit. Sed vbi pars iusto frigidior fuerit, emollientibus caloricis, & attrahentia sunt addenda; attrahunt verò balneum aquæ calentis, siue simplicis, siue thermalis. Admittatur verò aqua calens ad ruborem, & tumorem vsque partis: nā tumida & rubente iam parte, administranda sunt, quæ humectant, & reuertiunt, de quibus iam dixi: id ipsum præstant dropax, frictio, atq; inunctio calida, balneum ipsum: qui voluerit modum horum omnium in telligere, legat Galenum. 3. de officina Medica. c. 3. 2. & 34. 6. de tunc. valet. c. 8. 14. method. 16. Ex hæc omnia fusius inuenietis in primo nostro lib. de phœnig. seu vesicat. ca. 10.

Si Paralyfis fiat ex Inflammatione, inflammatio, quantum ad reuulsiones pertinet, eodem modo tractatur, quo reliquæ, per sanguinis missionem, frictiones, cucurbitulas, purgationes: de medicamentis localibus in principio administrandis videtur aliqua dubitatio; nam inflammatio circa initia requirit adstrictoria & reprimētia, quæ si in Paralyfi administrantur, poterunt materiam indurare, & Paralyfin reddere insanabilem, atq; ideo in his casibus duo suadeo peragenda; alterum est ut locis circumstantibus repereussione adhibeantur medicamenta; alterum, ut ipsimet loco inflammato circa initia adhibeantur quidem adstrictoria quædam, sed quæ cum adstrictione digerant: in hoc genere sunt cortices rheubarb. puluerizati, est thus, cyperus, squinanthum, mastix, oleum ros. complex his omnib. simul cum farina hordeaceæ poterit componi emplastrum quod iud adhibetur parti inflammatae, fluxum prohibet, fluxumq; materiam digerit.

In Paralyfi ex Luxatione nulla est alia ratio curandi, quā testituro luxatæ vertebræ in suū locū.

Sed vbi sit Paralyfis ex Repletionem, humor repletus est euacuandus; & si fuerit sanguis, audacter est euacuandus, hoc dico, quia aliqui ueniunt san-

Aguinem educere, quoniam putant semper Paralyfin fieri ex pituita. Venetis noui mulierem, cui cū secta fuisset vena sanguisq; missus ad vnc. vi euacuato sanguine nō sanabatur, sed misso ad libras est sanata; de qua tanta sanguinis copia alij Medici timebant; & alios duos noui, quibus sanguine misso in multa quantitate, & pluribus vicibus, sanitati sunt restituti; itaque in Paralyfi sanguinea, audacter est sanguis mittendus, neq; semel tantum, sed pluries; non ex vno loco sed pluribus. Illud tamen est obseruandum, ut si Paralyfis occupet omnes corporis partes, capite excepto, mittatur sanguis ex venis hæmorrhoidalibus. si vna pars sit immunis, ex illa mittatur, sed si non fuerit paralyfis legitimè sanguinea, sed sit spuria plenitudo, educendus sanguis, sed parce, ut voluerunt Aet. Phil. Alex. & ante hos elegantissimus noster Celsus, qui scribit lib. 3. ca. 27. Paralyticis aut sectam venam prodesse, aut alium subductam. In hoc casu parce mittendus sanguis ad vnc. vi. sicuti in tachochymia legitima in Paralyfi ex syncera pituita à quacunque sanguinis euacuationis vena in Paralyfi non fecit mentionem.

Quicumq; admittunt fieri Paralyfin ex Succo Biliolo, coguntur etiam eandem curare medicamentis bilem purgantibus. Rara est hæc curatio, cuius inter antiquos scriptores meminit tantum Paul. lib. 3. c. 43. ita ut licet Rondel. religiosè admodum præcipiat, ne in Paralyfi cassia administreretur, habita tamen ratione Paralyfis ex bile, conueniunt Cassia, Thamarindi, syrupus ros. solut; ex Purgantibus Rhabarb. Diacathol. Electuar. ros. Melu. Electuar. de succo ros. & pil. aureæ; Ex Preparantibus vero, syrapi omnes refrigeratorii, de cichoriendi, viol. & id genus alia, nec dissimili ratione gustus refrigerans, & humectans est instituendus, ut propterea & frigida olera, ut lactuca, endiua, betæ; & fructus horarii, ut melones & alia id genus tuto in hac Paralyfi assumantur.

Quod si fiat ex Melancholia, audiens in proprio tract. de Melancholia, qua ratione humor iste præparandus, ac purgandus sit.

Venio itaque ad Paralyfin ex Pituita, qui humor omnium maximè produci hanc affectionem primo quidem aliqua videtur esse controuersia de vsu purgandi ab initio inter Rhases, & Auic. nam Auic. ante vsum purgantium præparantia, & leuiora proponit medicamenta; Rhases statim ab initio vni coctis pil. & consequenter validis purgantibus. Ego controuersiam sic compono: si Paralyfis recens fuerit, & facta fuerit Rhases, propter insigne capitis vitium, ut post Apoplexiā, & Auic. vel Epilepsiā accipio Rhases sententiam, ut statim purgantia adhibeantur. Ratio est clara, nam imminet periculum reditus, Apoplexiæ, vel Epilepsiæ, cui statim occurrendum, instituto medicamento purgante; sed si Paralyfis antiqua sit in membro determinato absque cerebri læsione, accipienda Auic. sententia, ut primo leniatur aluus melle ros. solut. præparentur humores syrupo de beton. mel. ros. simp.

Neq; improbo simul cū illis oxymel, quamuis acētum neruis sit noxium, est. n. acētum neruis noxium, quatenus sunt membra, & partes

Historia

Observatio circa sang. missionem.

Ex Bile

Ex Melancholia

Ex Pituita

Curat Paralyfis ex atrophis. & siccitate.

Ex Frigiditate.

Ex inflammatione.

Ex luxatione.

Ex repletionem.

siccæ, sed quando fuerint succo pituitoso imbuti ac pleni, acetum non est noxium, præcipue verò melle dilutum, & aliis Syrupis permixtum; idcirco in pituita crassiore non solum oxymel simplex; sed etiam compos. & scyllit. est exhibendum: Syrupis addantur decoctiones accommodatæ ex calendula, herba paralyti, iua, chamædri, maiorana, hyssopo, salvia, stœchade, atque aliis similibus attenuantibus.

Vbi materia, sicut dictum est, peccauerit in cerebro, post singulos 3. Syrupos repetendæ sunt purgantes pilulæ, quarum dosis erit scrup. iij. vel drach. i. sem. aut dandæ erunt drach. ii. hietæ diacoloynth. In robustioribus non improbo grana 5. aut 6: antimonii: accipio etiam in his calibus. vsum 4. vel 5. granorum præcipitati optimi. Extremis morbis extrema conueniunt remedia ex Hip. 1. aph. 6: Repetendæ sunt hæc purgationes post singulos tres Syrupos, vbi cerebrum sit affectum.

In Paralyti determinata abiq; vitus cerebri, & leuiora eligantur, vt diaphœnicæ ad vnc. sem. cum drach. i. spec. hier. simp. & per longiora internalla administrentur.

Purgato corpore, caput singulatim euacuandû per os gargarismatibus, masticatoriis, illitionibus palati; per nares autem sternutamentis & nasariis liquidis, & solidis: materię alias sunt propositæ, illas non repero. Pari ratione euacuanda est materia per sinapismos, vesicantia, cucurbit. scarificatas, ac cauteria capiti infixa. Adhibentur autem Cauteria, vt voluit Actius, in loco multiplici, in occipite, in lycopite, circa tempora.

Cauteria

Neque (Auditores) vereri oportet Cauteriû occipiti admodum, vt nonnulli putant, paralyti augmentum facturum, eo quod trahat materiam ad principium spinalis medullæ, nam, vt nostis, spinalis medulla est intra vertebra; cauterium est extrinsecum; igitur non ducit materias ad locum affectum, sed à profundis ad exteriora.

Euacuato & toto, & capite, incumbendum medicamentis, quæ intrinsecus quidem roborent membra præcipua, cerebrum, & nervos exsiccet, & calefaciant, materiam impactam digerant, quod exterioribus etiam auxiliis tentandum. Longus essem, si materias auxiliorum tam exteriores, quàm interiores vobis recenserem, quæ apud Practicantes reperiuntur: referam vobis aliqua potiora, quæ mihi magis placent.

Inter intrinseca commendatur summopere vsus confectiois anacardina, cuius dosis est à drach. i. ad drach. ii. sed drach. ii. si in frequenti habeantur vsu febrem excitare possunt.

trū in

Est autem res apud Medicos controuersa: Vtrum in Paralyti febrem ex itate conueniat: Agi-febrē ex tautit hanc quæstionem Vallæ. lib. 8. contr. cap. citare cō 18. (10.)

ueniat.

Paucis rem decernens dico: In corpore caco-chymico non licere vii medicamentis vsque adeo calidis, quæ consulto febrem excitent. Ratio est, quia talia medicamenta prauos corrumpunt

humores, febrem putridam generabunt, quæ Paralyti erit grauior: at verò si corpus iam fuerit exacte purgatum, medicamenta calida, si febrem promouent, ephemeram cient, hæc nullius est periculi, & tamen nervos æquè calefacit, & materiã digerit: idcirco cum dicit Hip. 2. aph. 26. *melius esse febrem conuulsiōi, quàm conuulsiōem febri superuenire*, intelligendus est de hac ephemera febre nullius periculi.

Hippocrates explicatur.

Præter confectioem anacardina, laudo etiam vsum Castorei, si febris non sit excitanda à drach. i. ad drach. ii. vbi verò scopus sit febrem promouere datur vnc. sem.

Elegantissimæ sunt pilulæ hæc:

Recipe Styras. calamit.

Belzoïn.

Assæ fetid.

Castor. Myrrh.

Oppopon.

Thuris an drach. i.

Puluerizetur & cum Oxym. squillit. in Catapotia redigantur.

Dosis erit drach. ij. plus minus.

Ego aliquando in his casibus vsus sum Theribinth. Veneta perflucida ad vnc. ij. dissoluta in decocto, chamædryos, iux, hyssopi, iuniperi, herbæ paralyti, calendula, diſamni, salvia, stœchados, & rorismarini ad prouocandum sudorem.

Commune est apud omnes vii decocto ex ligno guaiaco, ex salsa, sassafras cū herbis iam propositis: laudo hoc decoctum, ita, vt non intermitatur tamen castoreum, aut confectio anacar. aut aliud ex medicamentis præscriptis, sicut etiam placeat vsus theriacæ, & confectiois Mitridatica.

Extrinsecus dicam quæ communiter sunt in vsu, postea dicam meum peculiare medendi modum, & genus. Communiter sunt in vsu aquæ theriacales, quibus corpus vniuersû, vel pars vniuersa immergitur, stillicidia, foueæ naturales, sudorificæ, illutationes, saburrations, id est, immersiones corporis in arenâ, insolatus, lotiones, inunctiones variæ ex oleo vulpino, costino, de piperibus, quibus administretur, aqua ardens, theriaca, mithridarium. Sunt quoque in vsu Dropaces, quales sunt.

Recipe Ammoniac.

Oppopon.

Serapin. an. drach. ij.

Piperis, Sinapi an. drach. i. sem.

Euphorb. drach. i.

Cerae, Resin. q. s.

M. f. Cerat.

Illud obseruandum, ne medicamentum apponatur parti resolutæ, vt nonnulli faciunt, qui hac ratione putant se partis calorem, ac sensum reuocare, si flammæis medicamentis partem mutant, qui nihil agunt sed possunt in partem gangrænam inferre.

Sunt apponenda medicamenta origini ipsius mali, vt docuit Gal. 1. de loc. aff. 6. & 4. de loc. aff. 4. non ipsi parti patienti. Hactenus de remediis communibus, vnc de meis.

Modus curandi Auctoris.

Inun-
ctio
hydarg.
in Para-
lysi.

Vsus sum (Auditores) in Paralyfi inun-
ctione ex hydrargyro, qua sanauit Paralyticum
confirmatum, qui adhuc viuiculus Sutor. Hic
ab Apoplexia, & Lue Gallica antiquissima incidit
in Paralyfin totius lateris dextri: vsus sum inun-
ctione hydrargyri in hunc modum.

Recepte Hydrarg. vnc. vi.

Axung. Sull. lib. i.

Pingued. gallin.

anat. an. vnc. ii.

Serapin.

Cypopon. Castor.

Aff. fetid. an. drach. i.

Sinap. Piper.

Pyreth. Euphor. an. drach. i. & sem.

Iue arbit. vnc. sem.

Olei ex Therebinth. vnc. iij.

Mutbr. Theriac. an. drach. iij.

M. f. Liniment.

Hoc medicamento inunxi potissimum laesam
partem, & non praetermittens alias, & succeden-
te spatio, sicut in aliis consuevit, patiens hac ra-
tione euasit liber.

Consulo tamē, vt partes roborantur aut decocto
ex ligno, aut aliqua alia ex antidotis propositis.

Possent in praesentia singulis partibus resolutis
propria accommodare remedia, sed quia materię
medicamentorum, quę vniciq; parti accommo-
dantur, non differunt à propolis in praeced. lect.
ideo hac in parte longior non ero. Si quis singula
rem hunc curandi modum cupiat, legat Aet. &
post ipsum Rondel. qui singulatum loquitur de
modo tractandi Paralyfin cuius frontis, palpebra-
rum, linguae, ossis hyodis, musculorum thoracis,
vesicae, recti intestini, pudendi, aliarumque id ge-
nus partium.

Vitus
Ratio.

In vnum superest dicendum, quod ad Vitus
Rationem pertinet, vitum scil. tenuem esse de-
bere, & attenuantem: id circo purgato corpore,
conueniunt salsa omnia, acris, aromatica, mouen-
tia vrinas, & sudores.

Dico purgato corpore: nam si fuerit impurum
quę attenuant, mouentque vrinas, & sudores, Pa-
lysin augent, dum materiam in neruos indu-
cunt. Potius ab inuio sit mulla hyssopo, aut salvia
aut roremarino alterata.

Probē iam euacuato corpore Vinum non im-
probat, nam sicut sanat aliquando Conuulsio-
nem, vt videbitur suo loco, ita potest etiam sanare
Paralyfin.

DE CONVULSIONE.

Cap. XV.

Conuulsio Latine Distensio etiam vocatur, F
Cquamuis ex Gal. 5. aph. 57. Distensio proprie
Tetano conueniat, Graecis Σπασμα dicitur: il-
lud autem vos ignorare nolo, multum differre
spasma a spalmo.

Nam Σπασμα est morbus nerui in soluta con-
tinuitate; Σπασμὸς non est morbus, sed sympto-
ma: propterea Galenus 2. method. 2: docet Spas-
ma idem significare, quod conuulsus, vt ostendit.

A dat aliud esse diuisionem factam, aliud verò solu-
tionem, quę sit: nam Spasma est neruus iam so-
lutus; Spasmos est motus nerui, qui solutus, pro-
pterea idem Gal. 3. & 4. meth. 1. inter morbus so-
lutę vnitatis connumerat spasma, tanquam mor-
bum solutę vnitatis nerui, & lib. de morb. differe-
ren. c. 11. inquit, fieri spasma in neruis, cum fibrę
illorum distrahuntur, & clarius lib. de const. artus
inquit, spasma esse affectum nerui, quando dis-
rumpitur, vt propterea in hac disruptione pars
amittat sensum & motum, non tamen sit indu-
rata: nam si gratia exempli neruus interior disru-
ptus sit, membrum extendi non potest, si exterior
sit ruptus, flecti non valet ex imperio voluntatis;

B Si quis autem illam partem propriis manibus
aut flectere, aut extendere voluerit, facillē illud
consequetur: hoc docet Galen. 1. de motu mu-
scul. ca. 6.

Spasmus autem est motus voluntarius depra-
uatus, seu animalis motus deprauatus ex affectio-
ne substantię neruosa. definitio

C Per motum intelligo & vniuersalem, & deter-
minatam.

Differentia.

Differentia vniuersalis triplex est: nam vel mo-
tus sit ad Posteriora, & dicitur *σπασμός*, Motus
vel ad Anteriora, & dicitur *εμπροσθέν*, Tonicus
vel est Motus Tonicus, in quo totum corpus rigit, vt ne-
que ad anteriora, neque ad posteriora flecti possit
& dicitur *τέτανος*, vt potestis videre apud Gale.
5. aph. 57. lib. de pils. conuulsi. & tremor. cap. 8. &
2. de caus. symp. 2.

In parte determinata tot sunt motus conuulsi
ui, quot sunt musculi. Idcirco in illis partibus, in
quibus sit Paralytis, vt in cute frontis, palpebris,
oculis, pinnis narium, labris, lingua, musculis tho-
racis, aliisque omnibus sit conuulsio; & cum sit
in oculo, habet peculiare nomen; dicitur enim
στραβισμός: in dentibus dicitur *τετanos*: in pu-
dendo dicitur *σατυρίασις*: musculis thoracis qui
inseruiunt ad inspirationem, dicitur Duplex in-
toreuocatio; in musculis, qui inseruiunt ad exspi-
rationem, dicitur spiritus extra offendens.

Hic motus dicitur prauus, primo quia modum
naturę excedit, Extensio, & Flexio, quę sit pro-
pter Conuulsionem, est multo maior, quā flexio
aut extensio voluntaria. Scribit Iacchin. in com.
13. in 9. Rhaz. fuisse aliquando Opisthotonon, in
quo caput tangebatur calcaneum, dicitur etiam
prauus, quia est dolorificus, propterea dicebat Ga-
len. 2. proth. 20. Conuulsionem esse affectum do-
lorosum; & 2. aph. 6. connumerat Conuulsionem
inter ceteros affectus dolorificos.

Nota Cō
uulsionē
admiran-
dam.

Diximus fieri hunc motum prauum ex neruosa
substantię lesione. Per neruosam substantiam cum
Gal. 5. aph. 1. intelligo Neruum, Musculum,
Tendinem, Ligamentum. Sed Ligamentum
non est subiectum Conuulsionis, nisi quatenus est
pars tendinis; tendo enim constat ex neruo,
& ligamento; idcirco nisi ligamentum replea-
tur in propria substantia, ad cuius repletionem
tendo contrahatur, Conuulsio non fit, hinc
Galenus 6. aph. 49. scribit, neminem dolore
articulati laborantem Conuulsione tentari;

quatinus afficiatur ligamentum: etenim in doloribus articulis materia non replet substantiam ligamenti, ex qua fit tendo, sed illam tantum comprimit, aut extendit.

Tendo pariter est subiectum Conuulsionis, quatenus est pars nervi, & inseritur in musculum,

Nervus est subiectum Conuulsionis, ut inseritur in musculum diuiditur in fibras, & fibrae nervi uniuntur cum fibris muscoli, deinde desinunt in tendonem, & usque quo persistit haec unio, affecti una parte necessario afficiuntur & alia, ubi se iungitur haec unio, cessat Conuulsio: idcirco consulant Medici in nervis punctis, & vulneratis, ut totus nervus per transversum scindatur: nam se iuncta hac partium connexionem, cessat Conuulsio. Hanc ob causam Gal. videtur admodum varius, qui aliquando ipsi nervo tribuit principiam motus originem, ut lib. de plen. c. 5. Aliquando ipsi musculo, ut l. 1. (16.) de diff. resp. 18. aliquando ipsi tendoni, ut 12. de usu par. c. 3. lib. art. Med. c. 82. & 4. meth. c. 6.

Gal. loca
concili-
antur.

Qui omnes loci sic conciliantur, ut scilicet nulla ex istis partibus per se ipsam apta sit ad motum; sed omnes simul coniungantur.

Itaque siue incipiat affectio à tendone, siue à nervo, siue à musculo, una affecta alia omnes semper coafficiuntur. Hoc docuit Gal. lib. de morb. diff. cap. 11.

De Loco satis,

Disputatio de causa Conuulsionis efficiente.

Quod pertinet ad causam Conuulsionis, Gal. cum videret. Hip. 6. aph. 39. dicentem, Conuulsionem fieri, aut ex Inanitione, aut ex Repletionem, sicut & singulum ipsum, partim hoc loco, partim etiam de p. alp. & c. c. 8. & 3. de loc. aff. 6. & 8. de comp. per lo. c. 3. inquit veram Conuulsionis causam ab Hipp. fuisse his verbis expressam, qui docet eodem modo extendi, nervos ad Conuulsionem faciendam, quae loquens, lides, aut chorda, aut lili. ex nimia humiditate replente, aut ex nimia siccitate; sic, inquit Gal. nonnulli ipsi, quasi fides, dum replentur, extenduntur, bi ciores fiunt, & consequenter trahunt membrum, propter voluntatem ad principium nervi, ut sequatur Conuulsio.

Haec sententia Gal. (Auditorum) quae communiter ab omnibus recipitur, mihi videtur ita vniuersaliter accepta, contra omnem rationem, & contra ipsum Hipp.

Primo si de Inanitione fiat mentio, scribit Gal. loc. cit. fieri Conuulsionem ex Inanitione, aut in febribus exsiccantibus nervorum humiditates, aut in superpurgantibus, siue sanguinis, siue alterius generis humoris, ut post usum ellebori, albi, de quo meminit 1. aph. 1. Sed sic est: quod in febribus ardentibus rarissime fiunt Conuulsiones, & quod magis est in febribus ardentibus, quae tendunt ad rabem, non fiunt Conuulsiones; ergo falsum est Conuulsionem, quae fit in febribus ardentibus, fieri propter siccitatem nervi.

Pariter, quod pertinet ad superpurgationes vel

A sanguinis, vel aliorum humorum, Conuulsio subito fit, sed intemperies sicca nervorum non potest subito fieri.

Accedit etiam, quod si venae inaniantur, & sequatur Conuulsio, attamen corpus momento temporis non colliquescit, aut tabescit. Persuadet autem ratio, ut si fit Conuulsio propter siccitatem, primo exsiccentur partes molliores, quam duriores; molliores sunt pinguedo, & caro; duriores sunt nervi. Quae igitur ratio, ut momento temporis exsiccentur nervi, non consumatur caro, aut pinguedo?

Præterquam quod si propter evacuationes, aut febres ardentes exsiccentur nervi, ut Conuulsio fieret, omnis haec Conuulsio esset cum paralyti; nam extirpatis omnibus nervis, facultas non transiret.

Denique omnis Conuulsio ex inanitione statim interficeret. Quis enim potest animo concipere in corpore vivente nervos omnes exsiccatos? Et tamen ego ipse Conuulsiones vidi factas ex inanitione, quae sunt sanatae.

Ostendi hætenus Conuulsionem non fieri ex siccatis nervis, super est ut ostendam eandem fieri non posse ex Repletionem, siue sit vniuersalis siue determinata Conuulsio.

Quod non Vniuersalis, facile probatur: Nam vniuersalis Conuulsio fit vel ex cerebro, vel principio spinalis medullae; itaque oportet ex sententia Gal. ut in Conuulsione Vniuersali ita repelatur cerebrum, & principium spinalis medullae, ut aucta latitudine, abbrevietur longitudo. Sed hoc in cerebro fieri non potest, quia cerebrum replet totam crani capacitatem, itaque dilatare non potest.

Præterea Conuulsio fit repleta membrana, non repleta substantia medullati nervi; propterea quatinus cerebrum repleatur, non tamen facit extensionem, quia membranosum non est: hinc in Leihargo, & Caro, etiam si cerebrum sit repletum Conuulsio non fit: id ipsum dico de spinali medulla, quae est intra vertebrae, idcirco dilatari non potest.

Adde, quod si repleatur aliqua materia sine inflammatione, haec materia erit pauca, aut multa; si pauca, non facit extensionem; si multa, facit obstructionem, & loco Conuulsionis erit Paralysis.

Præterquam, quod nulla est alia ratio, cur materia magis repleat principium spinalis medullae, atque illud distendat, quam ut discurrat per totam medullae longitudinem, quod etiam Auerroisegonum fecit, 3. collect. 3.

Adde quod ex cerebro, aut principio spinalis medullae affecto, fieret Conuulsio nunquam audita, aut visa: oporteret enim vno & eodem tempore omnes nervos, & musculos flecti & extendi, anteriores & posteriores, dextros & sinistros, superiores & inferiores, vno verbo, omnes. Tetanus, quae est Conuulsio omnium maxime vniuersalis non comprehendit omnes musculos & nervos, sed tantum anteriores, & posteriores simul: In hac verò, si daretur, ex spinali medulla omnes nervi vno, & eodem tempore conuellerentur.

Adde

Adde, quòd Repletio circa principium spinalis medullæ, ex qua possunt nervi abbreviari, debet esse cum tumore, aut inflammatione, aut scirrhus, aut alio; sed, ut dixi, locus non permittit tumore, quia est intra vertebra; & si daretur, faceret Paralyfin, & Convulsio ex Repletionem esset æque infanabilis, ac Convulsio ex Inanitione.

Nam quis quæso posset sanare scirrhum in spinali medulla existentem?

His rationibus ductus mihi persuadeo, Convulsionem non fieri, ut docuit Gal. ex nervi siccitate, aut repletionem eiusdem circa suum initium; eadem enim esset ratio peculiaris nervi, quæ etiam spinalis medullæ, videlicet principium nervi exiles, & molle ex modica repletionem, quæ non faciat Paralyfin, non posse usque adeo extendi, ut totum membrum ad se contrahat.

Ceterum hæc sententia non mihi videtur convenire cum Hipp. licet Galenus illam ex Hippocrate desumpserit.

Hipp. in illa 6. aph. 3. nihil aliud docet, quàm Convulsionem fieri ex repletionem, & inanitione eodem modo, quo fit singultus. Videamus ergo, quomodo fiat singultus, & tunc cognoscemus, qualis sit sententia Hipp. de causâ Convulsionis.

Quomodo fiat singultus.

Singultus igitur Gal. auctore 2. de caus. sympt. 1. & 2. & 3. de loc. aff. 7. & in com. præscripti aphor. 39. 6. partic. est. motus facultatis naturalis oris ventriculi irritatæ ab aliqua causâ noxia, quæ causâ quandoque est cum Repletionem ventriculi quandoque vero sequitur nimias Evacuationes.

Def. singult.

Sed siue adhit Repletio, siue Evacuatio, non propterea fit Singultus, quod os ventriculi, aut illius tunice repleantur, vel siccantur, sed quia semper vellicantur vel à copia, vel acrimonia, vel sedine, amaritudine, vel ab aciditate, vel à venenosa humorum, aut medicamentorum qualitate; itaque si Convulsio fit eodem modo, ipsa quoque erit motus facultatis irritatæ, ab aliqua ex causis noxiis iam enumeratis.

Hoc confirmatur ex Gal. 7. aph. 3. qui Convulsionem talem inquit esse passionem in nervis, qualis est Singultus, in ventriculo Idem 3. de loc. aff. 7. cum docuisset, Singultum fieri irritato ore ventriculi à causâ morbificâ, subdit, eodem modo fieri Convulsionem Epilepticam, atque omnes Convulsionem, irritata facultate partis ad expulsiorem noxiæ; & propterea Auerr. 3. coll. 33. videt hanc Galeni sententiam de Convulsionem factâ ex Repletionem, & Inanitionem, & inquit hanc sententiam magis convenire Musicis, quàm Medicis.

Auerr. videt Galeni.

Et sane si consideremus locos Hippocratis, in quibus loquitur de Convulsionem ex Inanitionem, non inveniunt illum Inanitionis nomine intelligere nervorum exsiccationem. Videamus aphor. 66. par. 4. ubi scribit: In febribus acutis Convulsionem, & circa viscera fortes dolores, malum, Gal. hanc sententiam interpretatur de Convulsionem factâ per siccationem nervorum à febre acuta; sed si hoc voluisset Hipp. non dixisset malum, sed lethale; nam videtur vocum proprietate, & ubi dicit, ma-

lum, non necessario intelligit lethale. Præterea ex ea ipsa causâ, & loco vult Hipp. fieri Convulsionem, ex quo fit dolor; at verò inquit dolorem fieri circa viscera, ergo Convulsio erit ex visceribus ergo non ex nervorum exsiccationem, sed potius per compatiendi societatem, nam viscera habent membranam, quæ recipit nervos sextæ conjugationis, & propterea, ubi dolent viscera, afficitur nervus 6. conjugationis, & per compatiendi societatem coafficitur cerebrum, aut principium spinalis medullæ; non tamen est Convulsio ex siccitate nervorum. Idem Hipp. 5. aph. 3. & 4. dum scribit convulsionem factam ex sanguinis evacuationem & omni purgationem, malam esse, non lethalem scribit.

Lethalem scribit esse illam, quæ fit ex accepto elleboro 5. aph. 1. cum tamen idem Gal. doceat, hanc Convulsionem quoque non necessario fieri ex nervorum siccitate, sed potius aut ex humorum acrimonia, qui mordent os ventriculi, aut ex ipsiusmet medicamenti venenata qualitate nervis infusa, & infusa, ut propterea nobis liceat arbitrari convulsionem istam, quæ sunt post purgationem, fieri ex nimia nervorum refrigerationem. nam in superpurgationibus, præcipue sanguinis, totum corpus frigescit, maxime autem nervi, viresque exlangues, & frigidiores; frigidum autem quantum possit ad convulsionem faciendas, docuit Hipp. 5. aph. 17. 20. & 3. prog. 34.

Possimus etiam dicere in huiusmodi febribus, acutis aut superpurgationibus vapores gigni acres, inordinatè motos, qui aut principium spinalis medullæ, aut determinatos irritant nervos, ut propterea tandem videatur concludendum, has causas à Galeno propositas de Inanitionem nervorum & Repletionem non esse absolute accipiendas.

Cum Gal. docuerit 2. de caus. sympt. c. 2. Spasmodum esse opus solius causæ morbificæ, & propterea fieri à sola Inanitionem & Repletionem, non concurrente facultate, ideo in præsentia videndum, qua ratione locus iste, & alii similes explicari possint, non obstantibus argumentis contra hanc sententiam adductis.

Itaque sciendum, Spasmodum duplicem esse (omitto in præsentia significationes Spasmodi, quod significat rupturam nervi; nam de hoc in præsentia non loquor, sed dico Spasmodum duobus modis adhuc accipi) Uno modo accipitur pro motu fieri, qui tamen semper desinit in viatam membrorum figuram, in convulsionem factam; sic enim videtis plerumque nonnullis contractum esse brachium, ut non possit extendi; aliis ita extensum, ut non possit flecti: quod dico de brachio, dico de crure, aliisque partibus, & toto corpore (hic Spasmodus dicitur ad materiam proportionatus).

Alter vero Spasmodus datur tantum in fieri, qui nunquam desinit in membri malam figuram & situationem; sed tamdiu persistit, quamdiu persistit motus; de sinente motu, desinit omnis affectio: hic Spasmodus dicitur improportionatus ad materiam.

His stantibus, dico primum genus Spasmi ex Repletionem, & Inanitionem fieri; & ratio est clara: nam si hic Spasmodus desinit in morbum, in situ,

D 3 in figu-

in figura, necessarium est, ut neruola substantia morbum in se contineat, quæ sit causa huius vitæ figuræ, nam actio laesa in facto esse, necessario sequitur morbum in facto esse, itaque hic Spasmus fit ex Inanitione vel Repletione. Ceterum hæc Repletio non est in cerebro, neque in principio spinalis medullæ, neque in exortu ipsius nerui, propter causas quas adduximus in præced. lect. Repletur itaque primo & per se aut substantia musculosa, aut tendinosa, aut utraque, ad cuius dilationem neruus abbreviatur, & sic contrahitur ad suum principium.

Hoc modo diluuntur omnes Obiectiones.

Primum enim ex repleto musculo, & tendone fiet Conuulsio, non Paralysis, sicuti necessatio fuit si neruus primario repleatur, deinde multo probabilius est, ut musculus, & tendo, quæ sunt partes satis amplæ, dum replentur, & dilatantur, contractionem faciant, quam si repleatur origo nerui, qui est exilis, & mollior. Idcirco Galenum, cum dicit Conuulsionem fieri ex Repletione & Inanitione neruorum, oportet nomine nerui intelligere totam neruosam substantiam; sic in com. 70. part. c. 5. scribit, ex repleta neruosa substantia, Conuulsiones fieri: per neruosam autem substantiam ex eod. Gal. 5. aph. 1. oportet accipere neruum, musculum, tendonem, ligamentum; neque hæc separata, sed simul connexa; idcirco idem Gal. 4. de prælag. expuls. c. 19. Conuulsiones inquit fieri ex inflammatione musculorum, præcipue vero prope tendones, & 4. aph. 65. inquit ex repletione tendonis, qui est in parte anteriore genu, fieri Conuulsiones, & 1. de morbo musculorum c. 6. causam huius Conuulsionis totam refert in musculi repletionem.

Causa replens musculum.

Causa, quæ musculum, aut tendonem replet varia est pro varietate Conuulsionis: nam Conuulsio ex Repletionem quandoque est Vniuersalis, nonnunquam est Determinata. Vniuersalem intelligo illam triplicem: Opisthotonon, Emprosthotonon, Tetanon. Determinatam intelligo illam, quæ fit in oculis, palpebris, in labijs, in brachijs.

Vniuersalis Conuulsio ex Repletionem fit dupliciter, aut primario repletis musculis, & tendonibus, aut per compatiendi societatem.

Replentur musculi & tendones vel à spiritu flatuoso discurrente, aut per omnes musculos posteriores, in quo casu fit Opisthotonos, aut replente anteriores, & fit Emprosthotonos; aut eodem replente & anteriores & posteriores, & fit Tetanos; huius causæ flatulentæ meminit Gal. 2. de symp. caus. 2. Fernel. lib. 5. c. 3. Paul. Aegin. lib. 3. c. 20. qui scribit, hanc substantiam vaporosam contrahi aliquando ex dormitione, humi facta.

Replentur quoque ex vaporibus vni, ut docuit Gal. 5. aph. 5.

Ex aliis quoque vaporibus humoris crudi, & substantiæ crassioris: hac ratione in pueris lacta-

tibus, præcipue obæstioni bus sub tempus defitionis Conuulsiones fiunt, 3. aph. 25. 3. prognost. 34.

Replentur etiam huiusmodi partes substantia pituitosa, ut docuit Gal. 5. aph. 70.

Possunt quoque repleri melancholico humore hoc colligitur ex Hipp. 6. aph. 56. Morbis ex melancholia ortis male & periculose ad hæc membra fit metastasis, unde fit apoplexia corporis, vel Spasmus, vel mania, aut ecetitas.

B Possunt quoque fieri ex sanguine: nam si ex sanguinis copia fit lassitudo phlegmonodes, ubi hæc augeatur, poterit quoque Conuulsionem excitare: hinc Galen. lib. de venæ sectione aduers. Erasist. c. 5. docet, Conuulsionem venæ sectione curari.

Fit verò Conuulsio Vniuersalis etiam per consensum, quando scilicet, vna pars aliqua determinata ex ingenti aliqua inflammatione conuulsionem patitur dolorificam, cuius ratione nerui omnes in consensum trahuntur.

C Aliquando tamen sola pars determinata Conuulsionem patitur, eo quod ille tantum musculus, aut tendo sit repletus; sic scribit Galen. 1. de mot. muscul. 6. ex inflammatione, aut scirrho occupante musculos interiores impediri extensionem membri, sicut repletis externis impeditur flexio.

Quomodo generetur Spasmus ex Inanitione.

Quod vero pertinet ad Spasmus ex Inanitione, censeo Vniuersalem Spasmodum ex Inanitione nunquam fieri, neque animo possum concipere ullam ex causis, quas Gal. ad Inanitionem refert, siue sit febris ardens, siue profusum sanguinis, siue superpurpuratio, aut vomitus, posse omnes neruos ad hanc arefactionem deducere, ut Conuulsio fiat. Hoc quidem obseruatur in partibus determinatis, quæ vruntur, & atrophiam patiuntur: quibus simul cum Conuulsione connectitur Paralysis: his causis Conuulsionis alias duas puto esse subiungendas.

Alia causæ Spasmi.

Aliæ causæ Spasmi sunt Refrigeratio, seu Congelatio, & Cicatrix: nam ex his duabus causis fit hoc genus Spasmi; & tamen propriè non rediguntur neque ad Repletionem, neque ad Inanitionem.

Scio non defuisse, qui dixerunt Refrigerationem redigi ad Inanitionem, eo quia frigus exprimit humiditates neruorum.

Sed hoc ex eo conuincitur esse falsum, quod qui intereunt congelati, & conuulsi, tantum abest, ut sint sicciores, ut sint summo quodam modo re. cetti. Hoc docuit Bellon. in suo libello de medicato, unere.

Quod etiam dicunt nonnulli, Refrigerationem redigi ad Repletionem, eo quod Congelatio compingat humores in neruos, hoc quoque est falsum, quandoquidem etsi humiditas naturalis neruorum ex congelatione ibi constringatur, non propterea

pterea tamen dilatat ipsam partem, ut facta dilatatione, breuior reddatur, propterea Gal. 5. simp. c. 4. tres proponit Indurationis partium causas: Repletionem, Siccitatem, & præter has Refrigerationem, idcirco etiam Hip. 5. aph. 17 & 21. & Gal. 3. progn. 34. proponunt, Refrigerationem tantquam Conuulsionis causam diuersam à cæteris.

Idipsum dico de Cicatrice, quæ est causa Conuulsionis, auctore Galen. 1. de motu musculorum capit 6.

De Spasmo Improportionato ad Materiam.

HActenus de causis Spasmi, qui dicitur Proportionatus ad Materiam; nunc vero agendum de Improportionato ad Materiam, qui est *definitio motus prauus facultatis expultricis cerebri & nervorum, irritata à causa morbifica.* Hic motus paruus differt à priore; primo, quia nunquam definit in conuulsionem factam, 2. quia vno & eodem tempore fit ad varias differentias, ita ut, quando fit vniuersalis, vicissim fiat Opisthotonos & Emprosthotonos, quandoque Tetanos, nonnunquam Conuulsio ad vtrumque latus; si fuerit in parte, consimiliter pars illa modo retrahitur, modo extenditur.

Differt tamen à Rigore, quia in Rigore coctiuntur quidem membra, sed non admodum co-trahuntur, aut extenduntur.

Hic motus est facultatis expultricis irritatæ primo & per se, quanquam ad irritamentum facultatis expultricis, sequatur motus animalis, qui tamen non potest dici voluntarius, quia non mouetur ab imaginatione; sed consequitur ad irritationem facultatis expultricis.

Pars, in qua est hæc facultas irritata, est quandoque cerebrum, quandoque principium spinalis medullæ, aliquando origo vniuscuiusque nervi determinati.

De Conuulsione ex cerebro irritato à causa noxia dicam in tract. de Epilepsia.

Quod autem pertinet ad spinalem medullam & nervos, irritantur hæc partes vel à materia lassa, vel acra, & amara, vel acida, vel venenosa, siue eleuetur vapor, siue ipsamet materia copulenta nervos afficiat.

diff. Spasmi Proportionati & Improport. ad Materiam. Propterea statim licet colligere, quantum differat hic Spasmus à priore; nam diximus in præcedenti subiectum Spasmi Proportionati immediatum esse aut musciculum, aut tendonem, aut vtrumque, non nervum, non spinalem medullam; in hoc Spasmo Improportionato opposito modo res se habet; nam principium spinalis medullæ, & cuiusque nervi determinati irritati à causa noxia, siue sit interna, ut iam diximus, siue externa, ut vulnus, punctura, morsus venenatus, refrigeratio, in nervosa & vulnerata parte, conuulsionem patiunt.

Itaque si vniuersalis fuerit hæc Conuulsio, fit principio spinalis medullæ affecto, aut per essentiam, aut per consensum.

Et si per essentiam, aut materia primario hanc partem afficiente, aut transmissa ab alio loco; e. g. utero, sic enim docet Gal. 6. de loc. aff. 5. ex sup-

pressis mensibus, ac semine in mulieribus Conuulsiones fieri.

Per consensum autem fit Conuulsio vniuersalis, ubi alia pars determinata maximo cum dolore conuellitur, aut etiam non conuulsa dolore afficitur; sic scribit Galen. 5. aph. 1. & 6. de tuen. valet. 10. & 5. de loc. aff. 6. ex ore ventriculi mordicationem patiente, Conuulsiones fieri; idipsum docet Gal de dolore viscerum 4. aph. 66. de passione Ileii 7. aph. 10. de punctura nervi, 3. meth. 6. de inflammatione nervi, 5. aph. 2. & vniuersaliter 12. meth. c. 8. & 3. de loc. aff. 7. docet Galen. Conuulsionem fieri ex causa mordente, atque ipsos nervos irritante.

Ex his potest colligere causas Spasmi Determinati; neque enim differunt à propositis: potestis etiam naturam & causas Spasmi colligere, qui fit circa faciem: de quo cum sigillatim loquatur Rhases, ego quoque dicam duo verba.

De Spasmo Cynico.

Dicitur Græcis Σπασμός Κυνικός Latinis Conuulsio Canina; quidam appellant Risum Sardonicum; Arabes Oris Torturam. Fit dupliciter: aut resolutis, aut conuulsis partibus; de resolutione iam diximus.

Conuulsio adhuc fit dupliciter, aut in muscularibus temporalibus, molaribus, cutis frontis, palpebrarum, & labiorum, & hoc modo afficiuntur nervi tertie coniugationis: aliquando distorquentur tantum labia, & potissimum inferius labium. & tunc afficitur musculus latus, qui est sub cute cervicis & recipit nervos ab ipsis cervicis vertebriis, ut docuit Galen. 1. de diff. muscul. 1. (5.) & 4. de loc. aff. 2.

Signa Spasmi à Repletione, &c.

Proponenda primo sunt signa distinctiva, & primo distinctiva specierum Spasmi; nam qui fit ex Repletione, fit in corpore pleno ferè statim à primo morbo, & definit in Spasmodium Factum contra qui ex Inanitione, sequitur morbos calidos, & siccos, copiosas excretiones.

Qui fit ex Morbo, potest quidem fieri ab initio ut diximus, & definit in Spasmodium Factum, & habet varias motus differentias; quinimo aliquando commiscetur Conuulsio cum rigore, & frequenter accidit, & recedat hæc passio.

Oportet deinde distinguere Conuulsionem factam ex Repletionem à Luxato articulo, & tumore eiusdem partis duro.

Differunt autem, quia in Luxatione primo præcessit casus, aut alia causa externa, quæ potuit luxationem facere, aut præcessit dolor articularis ex materia multa humida, loca articulationum replente. Accedit, quod ipse articulus luxatus manu deprehenditur; & denique in luxatione fit aliquis motus flexionis & extensionis, sed perfici non potest: in Spasmo autem motus, qui est impeditus, siue flexionis, siue extensionis, neque inchoari quidem potest.

Si ad sit tumor circa articulum, faciliè depre-

henditur, quia articulus ille erit maior altero, & digitis durities in articulo percipitur; contra vero tumor in musculo, aut tendone, qui motum prohibeat, unicuique erit perspicuus.

Si Repletio sit ex flatu, sit subito, & necessario adest rugitus ventris inflatio, aurium sonitus, vertigo, suffusio, & hanc Convulsionem, si vniuersalis fuerit, praecedere solet illa Determinata in furis facta Convulsio, quam vocant Germani Kräpffileali vulgo Granso.

Si sit ex Vapore crasso siue lactis, siue alterius edulij, crassioris, hoc habebitis ex relatione, ex causis praegressis, ex aetate potissimum puerili, & habitu crassiore, ac humidior.

Si fuerit pituita, aut melancholia, vel sanguis, alias propolui signa horum humorum redundantium.

Quod si fiat ex Inanitione praeter causas praegressas exsiccantes, & inanientes corpus, partem quoque oportet reddi tabidam, nec solum Convulsionem, sed etiam Paralyti tentari.

Quod si fuerit ex Morsu, & morsus fuerit materiae acrioris, & biliosae, Convulsio est cum maximo dolore, & vehementissima cum delirio: sitque potissimum haec in corporibus biliosis, quibus supprimuntur consuetae euacuationes haemorrhoidum, mensium, aut seminis.

Si fuerit materia acida, Convulsioni succedit plerumque rigor aut tremor, cum refrigeratione totius corporis, cum pallore, propensione in somnum, urinis crudis, atque abundantia sputi. Duas tales Virgines curavi, quae laborabant & Opisthotonos, & Emprosthotonos propter abundantiam pituitae acidae.

Si pituita salsa, habet illa propria signa, sitim, & sputum salsum.

Si fuerit Convulsio ex parte determinata, facile hanc cognoscetis, si intelligatis quam pars aut doleat, aut convulsa sit.

Signa Spasmi Cynici.

Quemadmodum de natura torturae oris singularium actum est, ita & seorsum quaedam de signis sunt dicenda.

Debent autem haec signa, quae proponuntur, distinguere Spasmodum Cynicum factum propter nervosorum coniugationis, & musculos ab eis procedentes, ab eo, qui sit ex Convulsione musculi lateris.

Distinguntur autem sic. Nam in prima Convulsione tota pars dextra, aut sinistra retrahitur, cutis frontis, & supercilia, palpebrae, narium pinnae, & labia superiora: laeditur quoque masticatio illius partis.

In convulsione ex lato musculo labrum tantum inferius, & bucca illius partis distorquetur.

Quod si utraque partes afficiantur, tunc oritur illa species torturae oris, quae proprie dicitur Risus Sardonius: nam in hac patientes perpetuo risu videntur vexari.

Prognostica.

Factus ex Inanitione Spasmus ex Gal. sententia est insanabilis. 5. ap. 1. Vera est haec sem-

perentia de Spasmo Vniuersali, facta ex siccitate omnium nervorum, & musculorum. Hic est adeo insanabilis, ut momento temporis interficiat, neque sit remedio locus.

Sed in Spasmo ex Inanitione, vel Siccitate nervi determinati, datur tempus curationis, & spes aliqua servatur. Aegre admodum curabilis est etiam Spasmus ex scirrhus, & ex cicatrice, quinimo exquisitus scirrhus, & magnus, atque antiqua cicatrix nullam admittunt curationem.

Inter ceteros Spasmos ex Repletionem, Tetanus est omnium periculosissimus; propterea dicebat Hipp. 5. aph. 6. eos, qui Tetano vexantur quarta die interire, si has perireant, servari posse.

Opisthotonos & Emprosthotonos, atque alii determinati Spasmi ex Repletionem acrius, vel facilius sanantur pro materiae copia; crassius, ac visciditate; omnibus tamen, qui ex frigido sunt succo, confert febris: propterea dicebat Hipp. 5. aph. 70. quartana capios Convulsione non tentari, & 4. aph. 57. scribit, Convulsione, & Distentione nervorum correptos superueniente febre liberari. In quem sensum 2. aph. 26. docet, melius esse febrem Convulsioni, quam Convulsionem febri superuenire.

Periculosa est Convulsio ex punctura nervi, & ex inflammatione oborta; dicebat Hipp. 4. aph. 49. in febre non debili, si palpebra, aut oculus, aut labrum pervertatur, fractis iam morbo viribus, lethale esset ratio est in promptu, quia haec Convulsio ortum ducit ex cerebro male affecto, consentientibus nervis tertiae coniugationis.

Quod si fiat Convulsio Canina ex musculolatio, non est admodum periculosa, nam (ut dixi in praecedenti lectione, ex primo de sectione musculorum c. 1.) hic musculus non recipit nervos a cerebro, sed a vertebrae cervicis, propterea scribit Hipp. primo in tertium Epid. 4. Pythoni in quarta ossa fuisse distortum, & tamen sanatum fuisse.

Curatio.

Curatio autem huius affectus varia est pro causarum varietate. Si fiat ex Inanitione, docui in capite de Paralyti, quibus remediis humectantibus internis & externis possit restitui humiditas, & alimentum partibus: & ideo non repetam curationem.

In Spasmo ex Repletionem convenit aliquando Venae Sectio, cum scilicet Spasmus sit ex insigni plethora, aut ex inflammatione nervi, aut ex vulnere, & punctura, siue punctura facta sit ferro, aut morsu venenato: in his omnibus casibus, viribus constantibus, venae sectio convenit.

Sed in plethora convenit in maxima quantitate, quamvis enim Gal. 1. ad Glauc. cap. 14. precipiat in Convulsione sanguinem parce mittendum esse, eo quod vires ex illo motu laborioso dilabuntur: & quia aliqua succedit aut sudoris, aut alterius modi euacuatio.

Haec tamen sententia est intelligenda de alia Gal. 100. omni Convulsionis specie, hac excepta, quae ingentem sequitur plenitudinem: in aliis autem casibus consulo, ut parce mittatur sanguis.

Et si

Vena
sect.

Gal. 100.
explicat

Hirudi- nes. Et si vires non consent, hirudines hæmorrhoidibus applicentur, aut in illis, qui non assueverunt huic excretioni, cucurbitulæ affigantur. Locus sit varius, pro varietate partis conuulsæ.

Cucurbit. Nam in Tortura Oris cucurbitulæ occipiti & scapulis affigantur: in Opisthotono, aut Emprosthotono semper partibus infernis: in Conuulsione dextræ partis, sinistra est scarificanda: in Cōuulsione sinistra, dextra.

Cauter. Vesicant. Idispum dico de Cauterijs, ac Vesicantibus, neq; enim probo cuiusdam Viri Excellentissimi consilium, qui vult parti conuulsæ vesicatorium esse adhibendum, etenim si Conuulsio, vt docuimus, sit ex qualitate acri, & mordente parti conuulsæ Vesicatorum affigere nihil aliud est, quàm in equo currente vii calcaribus.

Quod si materia sit flatuosa, primùm quidem hoc Clyster conuenit.

Recipe Semin. carb. vnc. sem.

anisi

fenic. an. an. vnc. i.

Cymin. vnc. i.

Seseli,

Dauc. an. drach. iij.

Centaur. vtriusq; an. M. f.

f. decoct. f. art. Deind.

Recipe disti decoct. lib. i.

hieræ Pachij, aut Diacolocyn. drac. iij.

Olei rutæ.

Mell. ros. an. vnc. iij.

M. f. Clyster.

Post Clysterem conuenit hic balus:

Recipe Diaphænic. vnc. sem.

spec. hier. simp. drach. iij.

M. & cum saccharo f. boli.

Aut Recipe hier diacolocynth. drach. ij.

Elethar. lenit. drach. iij. M.

Post Bolos præbendæ sunt Rotulæ istæ mane & vesperti hor. i. ante parand. & cœnam.

Recipe Cymin. drach. i.

Trium piperum.

Cinamom. an. drach. sem.

Saccar dissolut. in aqua stillatis cinamo. q. s.

M. & f. Conf. in Rotulis.

In eundem usum administrari possunt rotulæ ex Diacymino, ex Dianisio, & Diatriopiper. aut poterant confici ex oleo anisi, ex oleo fenic.

Extrinsecus autem si Spasmus sit Determinatus, vt est ille, qui vulgo dicitur Granfo, præstantissima remedij materia (qua vsus sum pluries in meipso) est oleum sambakinum, siue factum ex florib. lasmini. Valet etiam oleum ex hyperico, rutaceo, liliaceo. Sæculi etiam repleti sale, milio, chamomelo, anetho, aniso in sartagine torrefactis vultu adhibentur.

Sed in Conuulsione Vniuersali ex Flatu, nihil melius est auxilio aliquo sudorifico, siue sit balneum naturale aquæ thermalis, aut aer calidus ex thermis (exterior) acceptus, aut stussa arte facta: Quidam volunt etiam hos patientes in furno poni.

Sudor tamen in his est promouendus, & vt scribit Aetius spongijs oleo aliquo imbutis extergen-

dum est: imbuantur autem spongiæ oleo vel chamomelino, vel anethino.

Quod si materia sit pituitosa, pauca de hac vobis sunt dicenda. nam illa omnia auxilia tam interna, quàm externa, siue purgantia totum corpus, siue purgantia caput, siue digerentia & alterantia, quæ proposuimus in Paralyti ex pituita, conueniunt quoque in Conuulsione ex pituita. In hoc tamen differunt, quod in Conuulsione quàm

Diff. cu- rat. Conuuls. & Paralysis.

Secundo illud est obseruandum, in Conuulsione iam facta ab initio præbenda esse Lenientia, deinde Præparantia, postea Purgantia: In conuulsione, quæ actu sit, statim ab initio præbeantur purgantia,

C Tertio notandum: In Conuulsione ex materia pituitosa conuenire aliquando insersionem aquæ frigidæ. Hoc docuit Hipp. 4. aph. 21. Quem secuti alij Præticantes inter quos est Valestius de Tarenta, proficiuntur se hac ratione quosdam curasse.

Modus est talis: Pateriens primo debet esse iuuenis, quadrato corpore, temperamentum natura calidi, robustis viribus: huic nudo existenti aqua frigida infunditur, incipiendo à primis ceruicis vertebrijs vsq; in vltimas corporis partes; idq; subito, nam post aquæ affusionem, statim in cubili calido sunt reponendi, extergendi, atque oleo calido confricandi, siue sit chamomelinum, siue aliud tale.

Differt quin etiam Conuulsionis curatio à Paralysis curatione, tamen si ex pituitoso prodeant succo: quia in Conuulsione cum humor sui natura sit viscidus, crassus, & lentus, & progressu temporis semper crassior reddatur, ante usum medicamentorum digerentium opus est medicamentis rarefacientibus, laxantibus, & mollientibus.

E Hic itaq; Ordo erit seruandus, siue Conuulsio sit in toto, siue in parte: Frictur primùm pars conuulsa; à frict. one in balneum imponatur: sit balneum aut ex aqua, in qua ablunntur lanæ, aut fiat decoctio ex radicibus folijs, ac floribus, si haberi possint, maluæ, bis maluæ, altheæ, ac liliorū alborum: addantur semina lini, ac fenugræci, & caput vnum, vel alterum castrati: post balneum inungatur locus emolliente medicamento, siue sit oleum vulpinum, aut ex Lumbricis, vel amygdalinum, siue sit adeps anatis, anseris vel gallinæ, siue sit medulla cruris bouis, vel vituli, siue sit vnguentum ex pinguedine lanarum confectum (xypum vocant) siue emplastrum ex dalthæa, aut hoc simile.

Recipe Mucilag. semin. malu.

radic. alb. an. vnc. iij.

Farin. sem. lin. vnc. vi.

Olei Vlpin.

lumbricorum an. vnc. ij.

Pingued. gallin.

anat. an. vnc. semis

Deco-

Decocti. maluar.

alibæ

liliorum alb.

sem. lin. sanogr. q. f.

M. & f. Emplast.

Si adfit copia luti emollientis, quale est apud Patavinos Lutum S. Bartholomæi, illud quoque valet.

Valet etiam creatum ex Ammoniaco dissolutum in aceto acerrimo: & si oleis tantum, aut pinguedinibus foueatur pars ipsa, cōsultum erit post inunctionem ponete aut omentum, aut pellem si ne vulpis, siue canis, siue catti nuper excoriati.

Post vsum emollientium conueniunt digerētia, & intrinsecus & extrinsecus, de internis nihil super est dicendum, cum multa intractata de Paralyfi sint proposita, illud tantum subiungam, mihi in hoc casu mirifice placere vsum huius aquæ stillatitiæ.

Recipe calendula

Herb. Paralyf.

Iue

chamadr.

Pulegij.

Calament.

Origani.

Præsit

Hyslop.

Thymi.

Stachad.

Maiozan.

Rorismar.

Saluæ an. M. i.

Iunip. M. ij.

Incidentur & infundantur in s. q. vin. albi generosi per 3. dies, postea destillentur, & huic aquæ destillatæ adde

Zingiber.

Pyretr.

Sinap.

Castor.

Ass. fœtid.

Styrac. calamit.

Cinamom.

Caryoph. an. drach. ii.

Infundantur per horas 24. & iterum destillentur: huius aquæ stillat. datur vnc. sem.

Extrinsecus idem seruandus est ordo, qui & in emolliutione, vt primò fricetur corpus, postea immergatur in balneū Balneū verò sit ex aqua thermali: si huius non sit copia, arte paretur, coquendo in aqua Cōmuni, aut in marina, sulphur, alumen, nitrum, saluam, & vno verbo illas herbas, de quibus memini superius pro cōficienda aqua.

Inlesio etiam corporis, vel partis affectæ in arena, vltus foueæ sudorificæ, luti digerentis, & olei pariter digerentis, quale est rutaceum, costinū irinum, ficiorum, id est, ex radice cucumeris syluestris de piperibus magnopere iuuant.

Arte quoque sic componi potest oleum digerens.

(Vulpin.)

R. Olei (Costin.) an. vnc. j.

(de Piperib.)

A

Aq. arden. vnc. iii.

Castor.)

Sinap.) an. drach. j.

Euphorb.)

Bull. simul vñq; ad consumptaq. f. expressione add. Theriac. drach. ij. M.

In officinis parati solent vnguenta quædam ad id genus accommodatissima, quale est Vnguentum Aregon, & Martiatum, vtrumque ex descriptione Nicol. Alexandrini.

Omnes ferè practicanes à Nicolao Florent. desumpserunt olei descriptionem, quæ mirifice probatur: quidam vno modo, alii alio modo illam proponunt:

Hic autem modus mihi placet.

Accipiendus est cattus pinguis in frustra incisus, & anguilla; ponuntur hæc in ventre anseris pinguis simul cū vnc. i. laridi, & drach. ij. mirrhæ, toudem assæ fœtidæ, & castor: additur quin etiā iuniperus, saluia, rosmarin. Assatur hoc animal in veru, & pinguedo recipitur in vase, quod in se acetum contineat: deinde quod reliquum est, potest elixari, & pinguedo supernatans colligi, quæ in vsum inunctionis digerentis sequatur.

Nonnulli præparant oleum vulpinum, aut ex cane, replentes ventrem canis rubis herbis digerētib; seminibus, gummi ammoniaco, bidellio, serapino, assæ fœtida & castoreo, sinapi, & pipere deinde incoquant animal in sufficiente quantitate aquæ, & aceti, & oleum supernatans colligunt Decoctio est vtilis pro balneo.

Illud hæc in parte remanet dicendum, inunctionem ex hydrargyro perinde cōferre posse, atq; in paralyfi, quam ego tamen non sum expertus: Na tu tamen videtur polle id persuadere.

Inunct. hydrargyri.

Quod si Conuulsio fiat ex Morfu, ex irritatis neruis, tria sunt agenda. Incumbendum symptomati, Conuulsioni scilicet, demulcendo dolori, & superandæ causæ mordenti.

Prospicimus Conuulsioni infundendo corpus quando biliosissimum fuerit, ac tempore æstiuo, in aqua dulci repida: vbi aliquid prohibeat, aut infundatur in oleo, aut tota spina regio foueatur spongijs, aut lana succida, ut vesicis oleo lumbricato, chamomelino, anethino imbutis, ac repletis Partes etiam conuulsæ eadem lana succida, oleo imbuta, foueantur.

Pro demulcendo dolore, quando scilicet Conuulsio fiat ex punctura, aut inflammatione, circumstantes partes muniantur aut cerato rosaceo, aut linteis imbutis in oleo ros. aut fiat linimentū ex cassia extracta, oleo ros. & vitellis ouorum. Ipsi parti affectæ si sit inflammata, apponendum est emplastrum, quod reprimat, & digerat, quale est istud.

Recipe Absinth pulu.

Cort. rhabab pulu.

Spice an drach. ii.

Farin. Hord. vnc. iii.

Ol. ros. compl. vnc. iii.

Camomel.

Aneth. an. vnc. sem. M. i.

Quod si fuerit punctura nerui, hæc omnium est

est periculosissima, quia vulnusest angustissimū, A
oportet illud aliquantulum dilatare, deinde in ie-
sum vulnus infundere oleum ex therebinth. in
modica quantitate. E. G. pro singula uncia olei
ex thereb. addatur drach. i. aq. vi.

Vbi opus sit maiori siccatione, cum scilicet
ichor & sanies fuerit purgata, poteris addere aut
sulphur, aut calcem lotam in aqua rosarum, aut
aliquid euphorbii, vel miscere ipsummet oleum
de Euphorbio cum oleo ex therebinthina, vel uti
aliquo ex istis balsamicis vocatis medicamentis.
Recipiunt enim hec medicamenta sulphur, calcē. B
turiam, hypericon, & alia id genus.

His non conferentibus, consulunt prestantissi-
mi chirurgi, ut oleum vsq; adeo calens in vulnus
infundatur, ut possit adimere sensum, quasi escha-
ram inducat.

His quoq; non conferentibus, ac perseverante
Convulsione, praecidendus est nervus per trans-
versum in parte supra puncturam, quamvis actio
illius partis amittatur.

Et si punctura sit animalis venefici, virus attra-
hendum ad locū vulneris cucurbitula scarifica-
tione, vesicatorio, impositione theriacis, tandem
absumendum est venenum cauterizatione partis.

Certum est in his omnibus casibus opus esse
revulsione, & per medicamenta, quandoq; per
venae sectionem, aliquando, si vires non consent,
per cucurbitulas.

Quod si Convulsio fiat ex ore ventriculi, aut
ex utero, vel vermibus, suis locis potius omnia
intelligere.

Videtur ratio.

IN Convulsione ex Repletione tenuissimū vi-
du vrendum, & multa pro potu, victusq; sit ut
tenuans.

In Convulsione ex morfu, aut ex punctura, vi-
dus debet quidē esse tenuis, non attenuans. Nam
attenuantia movent vapores, & humores, qui vel
magis irritant, vel ad laesam partem confluunt.

DE EPILEPSIA, SEU MORBO COMITIALI. Cap. XVI.

Mirabilis sanē, vsu horrendus, naturae recon-
ditae, & difficilissimae curationis est affectus,
quē hodie interpretadū suscipio. Graeci τρεπανία
Launis Morbus Comitialis, Sacer, Hercules,
Caducus, Puerilis, ac Lunaticus vocatus. Hd-
uis definitionem proposuit Galen. lib. de diff. sym-
pt. ca. 3. Est, inquit, convulsio totius corporis ex
detentione rectricis facultatis: siue ut dicit 3. de
loc. aff. 7. Est Convulsio cum detentione principum
facultatum.

Hae definitio eas continet differentias, quae fa-
ciunt Epilepsiam à ceteris affectibus distinctam.
Nā quatenus est convulsio differt ab Apople-
xia, & Carō; quatenus est cum detentione prin-
cipum facultatum differt à Spasmo.

Illud autem notandum, propositam definitio-
nem convenire fortī, & legitimae Epilepsiae. Datur
enim leuor, & spuria, quae tres habet differentias.

Differentia Epilepsiae Spuria.

Prima est, in qua non amittuntur sensus; neq;
omnes principes facultates, sed duntaxat me-
moriam, Convulsio autem est vehemens, cuius ex-
empla ego plurima vidi: nam in fabro quodam
ferratio ad Portellū vidi Convulsionem Epilepti-
ca cum spuma, & priuatione visus, seruatō ta-
men auditu, sensu tactus, & functionibus, princi-
bus: quandoq; hic punctus, vel ligatus, vel voca-
tus accessionis tempore respondere non poterat,
audiebat tamen, ligaturas sentiebat, & post acces-
sionem cuncta circa illam acta referebat.

Aliam vidi virginem, quae dum conuelleretur
saltabat ut canis per totum conclave ad parietes
anteriores, seruatō visu, & ceteris sensibus, laesa
tamen memoriam.

Alium vidi Venetiis, qui tempore accessionis
saltabat ad posteriora, latrabat ut canis: huic quo-
que seruabatur visus.

Secunda contra datur Epilepsia Spuria, in qua
sublatis sensibus, & principibus facultatibus le-
uissima est convulsio; neq; vniuersalis, sed quā-
doq; determinata: Sic scribit Gal. 3. de loc. aff. 7.
in Epilepsia se aliquando obseruasse parū motū
illi similem, qui fit in Singultu. Et alii quoq; Me-
dicinā scriptores asserunt, in Epilepsia fieri quā-
doque Convulsionem capitis tantum, aut oculorū,
aut labiorum, aut vnius brachii, aut digito-
rum, ut vno verbo possit esse Epilepsia absq; vni-
uersali Convulsione.

Non tamen accipiendum puto Corn. Celsi sen-
tentiam lib. 3. cap. 23: qui vult, cadere aliquando
D Epilepticos sine vlla Convulsione.

Pariter non accipio sententiā Erasmi 4. disput. Erasmi
contr. Parac. qui docet inuentas aliquando epile- sent. reio-
ptias cum Convulsione quidem, sed sine cerebri sta.
vicio.

Etenim hoc est confunderi affectus: Deten-
tio principum facultatum absque vlla Convulsio-
ne est vel Apoplexia, vel Carō. Sola Convulsio abs-
que cerebri vicio est Spasmus, non Epilepsia; nam
natura, & idea Epilepsiae in hoc est posita, ut &
ad sit Convulsio aliqua, & actiones principes ac-
sentiantur aut omnes, aut aliqua patiuntur.

Idcirco etiam datur tertia quaedam Epilepsiae
Spuria species, quae est illa, in qua patientes, dum
capitiuntur hoc affectu, solent ambulare, & quae si-
bi obuia sunt, manibus apprehendere, & ex vno
loco in alium transportare, quasi aliquid lecto a-
gant; propterea visus seruatur, post accessionem
tamen isti actorum non recordantur, si interro-
getur, quid egerint, nihil respondent. Est Epilep-
sia occulta: nam motus ille non est verē convul-
siuus, neque tamen est naturalis, & functiones
principes non sunt abolitae, sed tamen prauo mo-
do agunt.

Explicatio omnium, quae contingunt in Epilepsia.

His stantibus Epilepsiae differentis, omnium
natura est inquirenda, sed cum quadam di-
ffinitione.

In Epilepsia adest Convulsio, & casus in terram, quia magna ex parte Epileptici cadunt in terram: hæc sunt duo distincta: Convulsio est motus depravatus, Casus in terram est motus abolitus. Adest, vitium principum facultatum, & consequenter sensuum; hoc quoque propriam habet naturam, propterea distinctè de omnibus agendum, sumpto initio à Convulsione.

De Vera Convulsione in Epilepsia.

Convulsio, ut audiistis, habet affectionem, ex qua fit, locum affectum, & causam affectionis. Affectio est triplex: Inanities, Repletio, Morbus. Inanities in Epilepsia locum non habet, quia fit ex intemperie sicca, Intemperies autem neque citò accedit, neque citò recedit, ut facit Epilepsia.

Repletionem impugnantur Auer. 3. collig. 41 quem sequuti sunt Rondelet. cap. ult. de Epileps. primo lib. de morbis internis. Fern. lib. 5. patholog. ca. 3. Erastus parte. 4. disput. contr. Paracels. atque alij plures.

Hi omnes inuehuntur in Galenum, qui 2. de caus. symp. 7. & 3. de loc. aff. 7. Epilepsiam scribit ex humore crasso, & lento fieri, repletae cerebri ventriculos.

Inuehuntur isti in hanc sententiã, dicentes hæc Repletionem non posse esse Epilepsie causam, quãdoquidem repletis ventriculis cerebri ut Caros, & Apoplexia, non Epilepsia; & si quis dicat, non esse integram repletionem, aiunt; ergo semper ante Apoplexiam, & Carum fieret Epilepsia; etenim antequam ventriculi integrè repleantur, necessarium est, ut pro media tantum parte impleantur; tunc ergo fiet Epilepsia, sicut illis integrè repletis Apoplexia, aut Caros. Addit Fer. si fieret hæc repletio in Epilepsia, desineret in Paralyin, ut & Apoplexia, quod tamen negat Galen. 4. de loc. aff. c. 2.

Gal. vindicatur.

Hi omnes Medicinæ scriptores (pace illorum dixerim) decipiuntur, neque Galeni mentem consequuti sunt.

Fit Convulsio Epileptica ex Repletionem, sed non Repletionem aut substantiæ cerebri, aut ventriculorum: quandoquidem si fieret Convulsio repletis his partibus, oporteret ut ex Repletionem extenderetur, & dilataretur cerebrum, quò dilatato omnes nervi breviores redderentur; sed hoc, ut dixi, fieri non potest, ut cerebrum, quod replet totum cranium, usque adeo possit dilatari propter Repletionem, ut breviores faciat nervos.

Addo, quòd si cerebrum, vel ventriculi repleti facerent hanc Convulsionem, esset Convulsio totius corporis, Tonica vocata, quæ nullo modo inveniri potest, in qua scilicet omnes nervi vno & eodem tempore, qui inseruiunt & extensioni & reflexioni, contraherentur ad suum principium, ita ut idem membrum cogeretur moveri ad duas partes oppositas in instanti, quòd fieri non potest.

Insuper Repletio facta ex humore crasso, & pituitoso, quando facit Convulsionem, desinit in Spasmus factum: hoc docui in tractatu de Spas-

mo. Nam materia illa replens infixa facit Convulsionem in facto esse quòd non contingit in Epilepsia, neque Galenus doctissimus, & solertissimus hæc tam levis excogitasset.

Itaque Convulsio ex Repletionem in Epilepsia fit repletis tantum musculis, & nervis quibusdam determinatis, non ex crassa materia, sed ex spiritu flatulento, & vaporoso, cuius materia est quidam pituita, aut melancholia, & in cerebri ventriculis contenta, non tamen perfectam faciens angustiam, sed illa materia non est immediata Convulsionis causa, sed mediata, ex qua flatus, & vapor generatur.

Quòd si Gal. aliquando dixit locis citatis Epilepsiam ex pituitoso succo fieri, potius respexit ad sublationem principum facultatum, & ad symptomata cadendi in terram, quàm ad ipsam Convulsionem: vel si respexit ad Convulsionem, hoc tantum voluit, pituitam esse mediatam causam, ut scilicet flatus genere. hac ratione Hipp. lib. de flatibus causam Epilepsie in huiusmodi spiritu retulit flatuosum.

Convulsionem Epilepticam fieri ex repletionem nervosæ, ac musculoræ substantiæ à spiritu vaporoso, ac flatulento, non tantum ex Hipp. colligitur lib. de flatibus citato, sed etiam ex Arist. libel. de somno & vigilia, qui epilepsiam scribit à fumis ascendentibus in caput produci, ac propterea in somnis frequenter fieri eandem ob causam, post crapulam, & vinolentiam excitari.

Hæc Convulsionis causa reperitur in illa Epilepsie specie, in qua paulatim & sensim, vel vnicapitis, vel totum corpus flectitur, aut extenditur modò ad unam, modò ad aliam motus differentiam, cuius exemplum vidi in Germano.

Est vero & alia multo frequentior Convulsio, Epilepticorum causa, irritamentum scilicet, de quo meminit Galen. 3. de loc. affe. 7. 5. de loc. affe. 5. & 6. de loc. affe. 5. quam causam unicam cognoverunt aliqui Recentiores, Rondelet. cap. ultimo de Epileps. Holler in schol. 16. primi lib. de internis, & Erast in disputat. quam habet de Epileps. ac Fernel. lib. 5. patholog. c. 2. & 2. de abditis rerum caus. c. 15. quanquam nullus istorum exponat, quale sit hoc irritamentum, neque qualis sit propriè locus irritatus, præterquam quòd in ipsa causa irritamenti decepti sunt. Omnia exponam.

Irritamentum dupliciter fit; aut repleta parte sentiente, cuius facultas expultrix sit valida, quæ propterea statim insurgit ad expulsionem rei nocentis.

Huius cause, speculis tamen verbis, meminit Gal. 3. de loc. aff. 7. circa principium; nam postea quã declaravit, fieri Epilepsiam ex crasso humore, ac pituitoso, subiungit, Convulsionem fieri còcurrente seipsum cerebro, & quærente, ac moliente expulsionem rei nocentis, ut propterea significet Gal. his verbis, partem huius materie crassioris replentem, & irritantem esse causam motus Convulsivi.

Aliud irritamentum est sanisum qualitatis siue acris, & mordacis, siue venenatæ: huius meminit Gal. in cap. eod. 3. de loc. aff. circa finem capituli viri usque;

utriusque autem causae mentionem fecit Auic. 1. A
3. tract. 5. c. 9.

Primum irritamenti speciem non admittunt
Erasmus, neque Rondeletius, aut Fernel. aut Holl.
sed solam qualitatem accipiunt, qui propterea non
possunt reddere causam, cur in capite per essen-
tiam repleto aut melancholia, aut pituita, aut alijs
humoribus, frequentes fiant Convulsiones Epilep-
ticae, & illae quidem vniuersales; & quod magis
est, aliquando mutuo se excipiant Epilepsia &
Apoplexia, Epilepsia & Melancholia, Epilepsia
& Fatuitas, & Epilepsie & Phrenitis, quae omnia B
ego ipse propria experientia pluries facta com-
probaui.

Exemplum Phrenitidis cum Epilepsia vidi Ve-
netis in Clarissimo adolescente Hieronymo Mar-
cello, qui Phrenitide captus singulis diebus ac no-
ctibus plusquam trigies capiebatur Epilepsia, &
statim desinente Epilepsia, redibat Phrenitis, vi-
xit usque ad 14. cum his symptomat. & 14. obiit.

Hic Patavij vidi puerum filium Procuratoris
Monialium Bedehem, qui erat fatuus; hic quoque
frequentissimis corripiebatur Epilepsus.

Tiberius Phiaetus Philosophus, Medicus, ac
Chirurgus Excellentissimus capitur ipse quoque
Epilepsia vehementissima, vi statim succedit A-
poplexia, & sic vicissim superuenere haec duo
symptoma ab hora 18. usque ad 6. (qua obiit)
fere quadragesies.

Idipsum contigit Nobilissimae cuidam Matro-
nae utero gerenti circa nonum mensem, cui super-
uenit Epilepsia, quae etiam desuit prima vice in Pa-
ralysin oculorum, & vicissim ipsa quoque capta
est Apoplexia per integram noctem plusquam tri-
gesies, atque ipsa quoque obiit spatio 17. horarum: D
in quo exemplo praecipue notanda est mutatio
Epilepsiae in Paralysin.

Haec sunt exempla Epilepsiae, quae non potest
fieri ex repletione partium infra caput, ut dixi-
mus in priore causa: nam functiones principes,
& sensitiuae, insigniter patiuntur.

Neque potest esse sola qualitas: nam simplex
qualitas cito dissolvitur, neque alius remanet af-
fectus: in relictis autem casibus, ut patet, remanet
plenitudo in cerebro, & ventriculis, postea-
quam remanet Apoplexia, Fatuitas, Phrenitis, &
Melancholia, ut propterea, quando dicit Gal. 3. de
loc. aff. 7. ex sententia Hippocratis sect. 7. Epid.
com. vlt. Epilepticos fieri Melancholicos, & Me-
lancholicos Epilepticos, non puteris hoc fieri,
quod tota materia melancholica transmissa à
substantia ad ventres pariat Epilepsiam: nam si
hoc esset, sequeretur sublata accensione Epilepti-
ca Melancholiam aliquo saltem temporis spatio
defecturam, quod tamen non est; imò verò cum
primum desinit Epilepsia, Melancholia, & ceteri F
capitis affectus sunt in suo robore: itaque causa
tunc temporis nulla est alia, quam portio huius
materiae, quae replet partem sentientem, quam
dum natura tentat excutere, motum facit Con-
vulsivum.

Idcirco aliquando etiam Sanies, & Sanguis cor-
ruptus hoc modo Epilepsiam facit. Sic observavi
in filia cuiusdam Nob. Patavini disruptum in ca-

pite abscessum vehementissimam pepdisse Epi-
lepsiam, quae tamen est sublata expurgante natu-
ra sanient per aures, per oculos, & nares.

Sic quoque in magnis cerebri contusionibus &
vulneribus extraenato sanguine, neque exitum
habente fit Epilepsia.

De loco affecto.

Nihil aliud de loco affecto habent propositi
Medicorum scriptores, quam quod cerebrum
ipsum irritetur, sed quia cerebrum multas habet
partes, libenter intollexissem, quam putent irri-
tari.

Si dicat substantiam, hoc est falsum: nam sub-
stantia cerebri vel nullum, vel exilem habet sen-
sum, praeterquam quod in Letargo, Apoplexia,
Phrenitide hectica, alijsque eius generis affectibus
semper adesset Epilepsia: Neque sunt membranae
cerebri: nam si ex membranis irritatis fieret Co-
nulsio Epileptica in omni Phrenitide, in omni
Pseudo delirio, in omni Capitis dolore reperiretur
C
Convulsio Epileptica, Si dicant Ventres cerebri;
cavitas ventrum nullam habet vim expellendi:
Parietes, si sint ex substantia cerebri, habent ean-
dem facultatem, quam cerebrum.

Quid igitur dicendum? Id quod asserit Reald.
Columb. lib. 8. c. 7. & Archang. Piccolom. lib. 5.
suarum praefect. anatom. videlicet cerebri ventri-
culos succingi membrana quadam tenui ex tenui
meninge ortum ducente, quae est sensus exquisi-
ti, ut propterea hac irritata, aut aliqua ex parte re-
pleta, fiat & sternutamentum, quod est levis quae-
dam Epilepsia, & ipsa quoque Epilepsia; & quia
haec membrana est communis cum nervorum
omnium membranis, ideo haec contracta con-
trahuntur etiam membranae omnium periorum
ut fiat vniuersalis convulsio; & propterea non
tantum membranae anteriorum ventriculorum,
sed & medii, ac postremi lancinari possunt, ut
sint causa praesentis convulsiois.

Obiter exponam Gal. 4. de loc. aff. 2. ubi scribit
inter Soporem, & Apoplexiam Epilepsiam esse
mediam. Ex hac mea sententia hoc patet; Quia
Apoplexia habet materiam in substantia Cerebri in
ventriculis, Epilepsia in membranis, quae sunt in
medio praedictorum locorum.

De Causa irritante.

DE causa irritamenti sicuti haec in parte om-
nes isti decipi sunt, Erasmus, Rondeletius,
Hollerius, & Fernelius, qui putaverint, irritari ce-
brum ipsum non à copia, sed à sola qualitate,
ita Fernelius proprium habet errorem, qui vult
hanc qualitatem semper esse occultam, & vene-
natam, qui profecto non potest causam reddere,
cur in corporibus sanis per somnum tantum, cra-
pulam, & ebrietatem, per sonitum vehementem
per terrorem, & metum, per odorem galbani,
aut myrrhae, statim excitetur Epilepsia.

Itaque rei veritas est, qualitatem istam quando-
que esse manifestam, aliquando occultam.

Et manifesta eleuatur ex pituitoso succo, sal-
so, ac-

so acido, melancholico, ex pure, ex sanguine, siue A
concreto, siue ad huc in valis existente.

Ex bile, quanquam Hipp. hoc negauerit in lib.
de morbo sacro, sed tamen experientia docuit in
corporibus biliosis, & ingeniosissimis viris, qualis
fuit Cæsar, & Mahumet, frequentes factas esse
Epilepsias: ideo Galenus etiam 2. de loc. aff. 5. re-
fert historiam grammatici, qui cum diutius à ci-
bo abstineret, Epilepticus fiebat, nō aliam ob caus-
sam, quam bile confluyente ad os ventriculi, &
communicata cerebro qualitate: atque ideo locus
materiæ est triplex, eodē Galeno auctore 3. de B
loc. aff. 7.

Quandoque est ipsum caput, nonnunquam os
ventriculi, aliquando omnes corporis particule,
vt propterea referat Holler, sed vidisse Epilepsiam
ex Liene: Galen. 3. de loc. aff. 7. ex pollice pedis,
quod & ego obseruauī in fabro ferratio, & quadā
rustica, aliquando ex vtero ob retentum semen
& menses, ex Gal. 6. de loc. aff. 5. & Anton. Beni-
uen. de admirand. ca. 97. Nonnunquam ex sup-
pressa vrina, cuius rei historiam habeo ego singu-
larem cuiusdam monialis, cui superuenit Epilep- C
sia ob suppressionem vrinæ super renes factam,
renibus ipsis angustatis partim a calculis, partim
ab inflammatione.

Denique à toto corpore fit Epilepsia, cum re-
pente aliquis cutaneus affectus retrocedit: sic
scribit Trincauel. lib. 2. c. 6. patrem & filium sca-
bie laborantes & inunctos, recedente scabie in
Epilepsiam incurrisse.

*Distinctio variarum Conuulsionis in Epi-
lepsia differentiarum.*

EX proximè dictis colligitur causa Conuulsi-
onis Epilepticæ, quæ multū distat ab illa prio-
re propoliata, quæ fit ex flatu, aut vapore, substan-
tiam musculosam replente, hæc enim Conuulsio
ex irritatione facta est cum vehementi concus-
sione, vt videatur rigor quidam auctus, aut tre-
mor insignis: nam subito aut totum corpus, aut
vna pars eleuatur, ac deprimitur, vel ad latera fle-
ctitur, aut caput ipsum, ad varias partes concu-
titur.

Fit autem vniuersalis concussio, quando mem-
brana ventriculorum cerebri irritantur.

Fit tantum in partibus infra caput, buccis ta-
men exceptis, (nam hæ partes quoq; conuellun-
tur) vbi principium spinalis medullæ percipit ir-
ritamentum.

Fit in parte determinata, quādo nervosa istius
partis substantia irritatur: idque fit aliquando
primario, aliquando secundario: fit primario, vbi
Epilepsia incipit ab aliquo membro determinato
vel ex brachio, vel ex manu, vel ex pede: tunc e-
nim consuevit ille locus Conuulsionem pati, an-
tequam functiones principes lædantur, ascende-
te verò aura venefica in cerebrum, fit & Conuul-
sio, & læsio principum facultatum; quandoque
verò cerebrum ipsum iam affectum vaporem mit-
tit in locum determinatum, qui est Conuulsionis
causa. Et hæcenus de causis veræ Conuulsionis
in Epilepsia.

*De Spuria Conuulsionis Epilepticæ
Causa.*

Q Vòd si quis quærat causam, propter quam
Epileptici quidam saltent vel ad anteriora
vel ad posteriora ambulent, & manibus aliquid
contrectent, quasi serio agerent, seruato visu, &
auditu, & sermone: In his puto causam nullam
esse aliam, quàm prauam imaginationem, quam
suggerit spiritus animalis extraneo quodam vapo-
re infectus, qui representat obiectum imaginatio-
nis sub forma boni, aut mali, fugiendi, aut prose-
quendi, vt propterea pauentes, vt fugiant noxam
faciant illos saltus inordinatos, dum verò existi-
mant se aliquid boni agere, huc atq; illuc ambu-
lent, atque hanc vel illam rem manibus proprijs
arripiant. Ego habui ancillam, quæ correpta ac-
cipiebat colum, fusum, aliquid tale, nihil tamen
faciebat.

*Causa sublatis sensus, ac operationum
principum facultatum.*

V Enic modò ad causas sublatis sensus, & fun-
ctionum principum: In Epilepsia functio-
nes principes & sensus, vt intellexistis, quandoq;
tolluntur omnes; nonnunquam ve. d. sola memo-
ria, cæteris sensibus & functionibus principibus
seruatis; aliquando seruatur etiam memoria, sed
functiones principes sunt deprauatæ: nam deli-
rant: Cum itaque vario modo res se habeat, si
quæramus causam sublatis functionis sensitiuæ
ac principis, hæc est quadruplex: Sola obstructio,
sola subsidentia, subsidentia cum obstructione, &
Subsidentia cum Compressione: Est sola obstru-
ctio, quando fit Epilepsia ex insigni copia humo-
ris pituitosi ventriculos obstruentis, atq; vniuersū
cerebrum replentis; id quod fit, quando Epilepsia
mutuò succedit Apoplexia.

Quòd si quis quærat, cur Apoplexiæ mutuò suc-
cedat Epilepsia, si ventriculi sunt adeo obstructi,
vt functiones principes prorsus tollantur; Causā
possumus colligere ex Auicenna prima tertij tra-
ctatu 5. c. 8. Scribit Auicenna, pituitam, vbi in ven-
triculis cerebri conclusa manet, ebullitionem (pa-
ti) sustinere: sed dum fit ebullitio, flatus, & va-
por eleuatur; hic replet membranas ventriculo-
rum; membranae statim concutuntur, hincq; fit
Conuulsio Epileptica.

*Solutio Rationum Fern. Rondel. Erasii. &c.
contra Obstructionem.*

EX quo patet solutio omnium instantiarum,
quæ facit Erasius, Rondel. & Fernel. con-
tra hanc sententiam.

Dicunt enim. Si in Epilepsia adesset integra
ventriculorum obstructio: esset Apoplexia. Con-
cedo consequentiam: Est apoplexia, si vapor, aut
flatus non repleat membranosam ventriculorū
substantiam.

Cum dicunt: Si est integra obstructio, ergo nō
potest fieri motus Epilepticus; dum enim fit mo-
tus, facultas animalis communicatur omnibus
nervis;

neruis; si communicatur, ergo ventriculi non sunt obstructi. Solutio est facilis: Dum fit ventriculorum motus conuulsus, ipsi ventriculi vicissim modò aperiuntur, modò constringuntur. nam in motu concussio, prout dilatantur, & constringuntur, ita spiritibus, & facultati animali datur auditus.

Sed dicet ingeniosus: Cur ergo non restituuntur eodem tempore sensus, & functiones principes; Duplex est causa: Primo quia huiusmodi spiritus sunt vsque adeo perturbati, & agitati, ut rerum imagines non possint recipere: Secundo quia in hac tam valida Conuulsione omnia sensuum organa distracta, & conuulsa prohibent receptionem obiectorum.

Si dicant tertio: Ergo hic affectus deberet desinere in Paralyin: Dico sanè, id aliquando contingere, hoc docuit Galen. in 4. acut. in fin. comment. 2. Docuit Auic. loc. sup. cit. Obseruauit loas. Schenck obseruat. 187. Amat. Lusit. centur. 4. curat. 22. Valefc. de Tarant. in suo philonio, cap. de Epilep. præter nostram obseruationem, de qua superius, memini.

Quòd si deniq; dicant. Non posse fieri accessionem breuem, si causa sit Obstructio integra: Dico, breuem esse accessionem Epilepticam, quia non fit ex illo crasso humore replente, sed ex vapore, aut flatu, qui ex illo humore eleuatur.

Itaque læsionis functionum principum causa potest esse obstructio. Est quandoque subsidencia quando scilicet membrana ventriculorum cerebri irritamentum patiuntur à vapore, aut flatu, aut qualitate mordaci, aut venetata, non in ventriculis contenta, sed ex alio loco confluente.

Contingit tertio, vt aliqua reperiatur materia in ventriculis cerebri, quæ potest esse aut aquea, aut crassa. Si sit aquea, dummodo non sit permixta cum succo bilioso, propterea non fit coloris flauo, aut viridis, non facit Epilepsiam. Obseruauit præstantissimi Anatomici, plerisque dissecatis habuisse ventriculos cerebri aqua simplici repletos absque Epilepsia. Contra vero Epilepsia laborantes post mortem inuenti sunt habere in ventriculis aquam biliosam aut saltem succum crassum fetidum; in quo casu duplex accedit causa angustia ventriculorum, materia obstruens, & subsidencia ipsa.

Quarto & vltimo fit compressio simul cum subsidencia, quando substantia cerebri inflammationem patitur, siue legitimam, siue spuriam, vt in Lethargo, & Phrenitide, aut repletionem insignem, vt in Furitute, & in Melancholia per excessum, nam in his casibus etiam si propter eleuatos vapores ventriculi contrahantur, à copia tamè etiam comprimuntur materiæ.

Quòd si nulla ex istis causis adsit, sed tantum flatus, aut vapor animale spiritum perturbet, atque illius pars in principium spinalis medullæ, huiusue neruos insetatur, fit Epilepsia, in qua seruantur sensus, & functiones principes, sed tamen deperuuntur.

Ex quo patet, cur quidam Epileptici cadant in terram, quidam autem non: nam ubicunque ventriculi cerebri angustantur, siue ex compres-

sione, & subsidencia, siue ex obstructione, vel ex subsidencia tantum tunc necessario cadunt in terram, quòd si nulla fiat angustia, neq; etiam necessario sit casus. Habent iam causas immediatas

Causæ mediatæ.

Transco ad Mediatas causas: Sunt autem mediatæ causæ Epilepsia; aut mouentes humorem, aut generantes ex humore statum, vel vaporem, aut sunt replentes caput, vel denique augent materiam antecedentem.

Inter causas mouentes est sol, balneum, motus corporis & animi; propterea concussio omnis, ictus, & percussio facta in capite, terror, mæstitia, ira, Venus immodica sunt inter causas mouente.

Generat vaporem, aut statum materia, aut melancholica, aut pituitosa, & calor siue cum obstructione, aut tumore, siue cum sola intemperie absque obstructione, & tumore.

Repleat caput causæ externæ, & internæ. Internæ suppressio mensium, seminis, hæmorrhoidum, varicum, affectuum cutaneorum, lienis, renum, & velicæ, intestinorum, & ventriculi.

Ex causis Externis vinolentia, crapula, vsus (hydropselini) petroselini, & cuiuscumq; apii; præterea odores omnes admodum graues, & acuti, myrrhæ, galbani, styracis, bituminis, lapidis gagatis, siue adianthi, cornu capri, vngula, & hepatis capri nallati: Isti sumi generant Epilepsiam.

Generant verò materiam antecedentem eius potissimum puerilis, vt propterea, quod scribit Hipp. 3. aph. 25. de Conuulsione pueris contingente etiam de Epilepsia intelligendum sit. Quamquam autem idem Hipp. 3. aph. 29 dixerit iuuenibus fieri Conuulsiones, docet tamen Galen. commento non ratione ætatis, sed propter errores in viuendi ratione commissos id fieri.

Si quispiam querat: Cur sensibus Morbi Comitiales non fiant, cum tamen omnium maximè pituita abundant. Ratio colligitur ex dictis superius, quod scilicet facultatem habeant expultricem debilem, & sensum membranatum ventriculorum sopitum, atque hebetem, vt propterea prouentum pituitæ sustineant vsq; quo potius Apoplexia, quam Epilepsia superueniat. Ex temporibus anni Ver omnium maximè Epilepsias promouere solet, ex Hipp. 3. aph. 30. De causis mediatas satis.

Signa.

Venio ad signa Versabimur autem in signis præsertim distinctius, atq; in prognosticis. Nam ex dictis superius diagnostica Epilepsia iam fuisse exposita.

Vbi quispiam, dicebat Rhafes noster, amittit sensum, & intellectum cum Conuulsione corporis Epilepsiam patitur.

Spuma autè circa os & inuoluntarius seminis vrinx, & excrementorum alui exitus, non sunt signa Epilepsia; necessaria, sed tantum sunt signa Epilepsia; vehementius; propterea dicebat Rhafes quòd si spuma superueniat, & semē, aut vrina, aut alui excre-

excrementa egerantur, tunc passio est grauior; & A
sanè granissimam oportet esse affectionem, quan-
do hæc fiunt. nam ut docuit Gal. 2. aph. 43. spu-
ma fit ex insigni agitatione, & motu succi pitui-
tosi in cerebro existentis: Excretio seminis fit co-
uulsis uasis seminalis: Excretio urinae & alui ex-
crementorum fit resolutis musculis constrictio-
nis. Sunt itaq; hæc signa maximæ affectionis.

Causa ex-
cret. se-
min. &
excrementi

Signa differentiarum non sunt proponenda,
quia ex dictis vos ipsi poteritis cognoscere, an Ep-
ilepsia sit Exquisita, an sit Spuria, & sub qua spe-
cie spuria.

Distinguenda est Affectio, Locus, & Causa,
ubi affectio fuerit musculosa substantia, repletio
ex vapore, aut statu, totum corpus vno & eodem
tempore non conuellitur, & conuulsio est sine con-
cussione vehementi, duntaxat est contractio que-
dam, vel extensio paulatim facta.

Vbi verò ad sit irritatio, motus adest conuulsus

Et si affectio sit primaria in cerebro, totum cor-
pus, & faciei partes conuellantur, præter quam
quod præcedit, & subsequitur al qua capitis insi-
gnis noxa, Fatuitas, Melancholia, Phrenitis, vul-
nus, aut contusio, Dolor capitis antiquus, destilla-
tio vehemens, Sopor, læsiones sensuum, quando-
que, ut dixi, Apoplexia.

Quod si fuerit per consensum ab Ore Ventri-
culi, hic affectus ieiunis potissimum superuenire
consuevit, ut monuit Galen. 5. de loc. aff. 5. adest
præterea morsus, aut dolor oris, vetriculi, nausea,
amaritudo, singultus

Si ex Lienis, præter obstructionem, ac tumore
Lienis, solet ante Epilepsiam fieri Cordis Palpita-
tio, Lipothymia quandoq; Syncope.

Si ex Vtero, suppressi sunt menses.

Si ex suppressu semine, hoc cognoscetis ex æta-
te, habitu ac temperata, præterquam quod id
potissimum contingit illis, qui dum essent assueti
vui Veneris, continentes euadunt.

Alij quoq; loci affecti eodem modo cognosci
poterunt.

Quod ad Causam pertinet, pituitam cogno-
scetis ex ætate puerili, habitu carnoso, temperie
humida, excrementis narium, & oris, somno, capi-
tis grauitate, urinis crudis: In hac spuma fit ad-
modum copiosa.

Si ex Melancholia, morbum comitalem præce-
dit & subsequitur timor, & mæror: sed signa au-
diens alias.

Si fuerit Bilis, isti sunt ingeniosi, iracundi, ma-
ximè conuellantur, & aliquando in istis aliquis
sensus vel exterior, vel interior seruetur, spuma
aut non appareat, aut illa quidem modica, accessio-
nes sunt breuiores, & ex ira, aut moru, aut vici-
calidorem reuertitur accessio.

Si fuerit Sanguis præter suppressam excretio-
nem sanguineam, vel circa vterum, vel circa na-
res, vel hæmorrhoides, præter habitum plenum,

Sanguis
loco spu-
ma cie-
tus.

& temperamentum sanguinem. Hoc anno obser-
uauit ante duos menses in Muliere Epileptica ex-
cretis mensibus loco spumæ sanguinem copio-
sum sub fine accessionis fuisse eiectum; ut pro-
prerea mihi persuaserim id ipsum quoque in alijs
posse contingere, qui in Epilepsiam incidunt ex
Sanguine.

Si materia sit saniosa, necessario ad est absces-
sus in cerebro, aut saltem sanguis extra venatus
propter vulnus, aut contusionem.

Prognostica.

Q uod pertinet ad prognostica, imminentem
Epilepsiam portendere solent pauores in
somnia, salus, & tremores, somnia perturbata, do-
lor, aut grauitas capitis insueta, Incubus, aut Ver-
tigo, mæstitia, aut lætitia absque causa.

Hic affectus ubi ex ipso capite ortum duxerit
cum læsione mentis, ut voluit Celsus lib. 3. ca. 23.
est insanabilis: Idcirco siue Fatuis, siue confirma-
tis Melancholicis superueniat, desperata res est.

Multo magis desperati sunt Epileptici post
Phrenitidem atque post Apoplexiam.

Difficilimè quoque curauonis est Epilepsia à
toto corpore ortum ducens, quæ nullum habeat
determinati loci affecti argumentum.

Dicebat Hipp. 3. aph. 28. morbos pueriles iudi-
cari aut in 40. diebus aut in 7. mensibus: quod si
hos effugerint, iudicari deinde anno 7. & si tran-
scant annum septimum non liberari, nisi in æta-
te pubertatis. Gal. in eo comm. ætatem pubertatis
interpretatur annum 14. cum tamen videat Hip.
5. aph. 7. dicentem: Comitiales morbi, aut Conuul-
siones Epileptice, quibus ante pubertatem eueni-
unt, curationem recipiunt: at quibus ex eueniunt
vigesimo quinto ætatis, maximam ex parte com-
moriuntur; ubi etiam Galenus in comm. docet,
ætatem pubertatis peruenire vsq; ad 25. annum.
Hæc verò sententia intelligenda est de Epilepsia
pituitosa, cui nullum adhibeatur remedium, sed
illud totum ab ætate expectetur.

Nam in Epilepsia facta ex humore biliolo etià
post. 25. annum potest solutio exspectari: nam
refrigerato huius seruore potest hæc Epilepsia cu-
rari: Ut potest etiam curari ante pubertatem Epi-
lepsia, & post pubertatem ex humore pituitoso fa-
cta, medicamentis, & victus ratione attenuante,
& exsiccante, quod docuit Gal. in illo com. cit. 5.
aph. 7. & Hip. 2. aph. 45. Valles. lib. 8. contro c. 8.
disputat. Vtrū Epilepsia in pueris sit medicamen-
tis tractanda, & statuit quod non. Ego verò puto
Medicum posse, & debere his adhibere manum.

Therapia.

Epilepticorum medicamenta alia sunt curati-
ua; quædam verò præseruatoria: & curatiua
in ipso accessionis tempore adhibentur: præserua-
toria in accessionum intervallis, etià primum ser-
mo de curatione; mox de præseruatione.

In accessione.

I n accessione igitur reuellenda materia, disci-
tuendus est vapor, & status, & conuulsioni pro-
spiciendum.

Reuulsio perficitur frictionibus asperis, ligatu-
ris, cucurbitulis, quæ non modò tibijs, coxis, dor-
so, & scapulis, verum etiam ipsi hypochondrijs,
nonnunquam scarificatæ, aliquando sic adhi-
bentur. Reuulsorum putatur remedium, & sa-
tis

vis efficacis frictio facta cum ungula alcis circa annularem digitum manus sinistrae; Quidam superstitiosius agentes locum fricant usque ad cruentationem, deinde eo sanguine labia patientis rliniunt. hæc inclinatio superstitiosa est. Eodem tempore quoque conueniunt acria suppositoria, & ipsi clysteres, de quibus aliis memini.

Ad Conuulsionem accendam, faciunt spongiæ oleo vulpino aut chamomelino imbutæ, vel lana ipsa succida, qua membra conuulsa inuoluntur.

Interim digerendus est status, & vapor partim quidem suffumigiis ex illa ipsa materia, quæ tempore sanitatis Epilepsiam mouet: Ideo suffumigatio ex bitumine, ex pice, ex styrace, ex lapide gagate, & ex cornu, & ungula caprina Comuiales reuocant. Id ipsum facit ruta aut domestica, aut syluestris aceto macerata. Imponendi quoque sunt in nates pessaria aceto scyllitico imbuta, & inspersa pulueribus cyclaminis, nigellæ, assz sætide castorei, pyretri, nigri ellebori, ac colocynt.

Os apertum detineri debet, si non alia ratione saltem aut ligno, aut cochleari per transfuersum ori imposito.

Interim spogiola in extremitate alicuius ligni imposita pituita extergi debet, illinendumque est palatum oxymelite scyllit. misto cum theriaca, aut mithridatica confectioe, aut cum castoreo, & synapi. Instillantur etiam in aures oleum ex caryophyllis, cinamommi, aqua vitæ commistum: Si hæc non prosint, & accessio sit longior, vstione actuali vtendum.

Extra Accessionem.

In infan-
tib.

EXtra Accessionem considerandum, qualis sit ætas patientis Epilepsiam: nam si fuerit infans lactans, idque contigat ex nimia lactis ejectione, statim penna oleo illita vomitus est prauidendus. Suppositorium quoque imponendum aut ex larido, aut ex muris stercore, & curandum, vt in posterum minus lactis accipiant.

Quod si lac fuerit prauum, aut nutrix est mutanda, aut purganda, & conuenienti victu nutrienda; Si fuerit ex diuersitate lactis, vnica nutrix instituetur.

Quod si ex cerebro pituita referto morbus prodeat, nil præstantius cauterio actuali in occipite, quo Florentini in quibuscumque familiariter viuunt, estque vicius Thulcorum institutum, quod regio illa omnium maxime huic morbo subiacetur vel propter aeris tenuitatem, vel vt scribit Hip. in lib. de mor. sacr. affectus iste hereditarius sit.

Interim huic infantibus licet quoque; præbere saltem ad lingendum aliquid infusionis agatici: Accipiat. g. c. Agar. drac. ii. Infundatur per noct. in aq. pæon. vnc. vi. deinde bulliat ista aq. cum mell. aut sacc. vnca. aut permisceatur cum inlep. acetoso, deinde paulatim ad lingendum præbeat.

Grandio-
rib.

Natu grandioribus possunt etiam præberi pilule ex aloe usque; ad scrup. i. Ipse agaticus aut in infusione, aut decoctione, sed in maiori copia: Ego pueris 5. aut 6. annorum præbui agatic. ad scrup. i. in Sytupo acetoso; aliquando in placentulis, nonnunquam in orbiculis, prout pueri hoc

vel illo edulio plus delectantur.

In adultis purgatio aliter est instituenda, & *Adultis* primum, quod pertinet ad Chirurgica, Vena tunc *Vene* est secanda, cum plenitudo vel legitima, vel spu- *sest.* ria affuerit; In cacoehymia abstinendum.

De Loco Medicinæ Scriptores inter se digladiantur; Controuersia tamen facile conciliatur: In Epilepsia per consensum semper mittendus *Locus.* est sanguis ex infernis partibus: Hoc voluit Gal. lib. curat. per sangu. mist. c. 19. in Epilepticis ad partes maximè longinquas reuellendum, & retrahendum; Vbi affectus est per consensum, sed secundario progressionem temporis capiti factus sit essentialis, secunda primo venæ inferiores, deinde & superiores.

Vbi verò solum caput per idiopathiam, seu essentiam propriam laborauerit, frustra mittitur sanguis ex infernis, nisi menses, aut hæmorrhoides sint suppressæ: idcirco laborante capite per essentiam non modò cephalica vena est aperienda, sed, vt scribit Aretæus, etiam vena frontis, & vt voluit Auic. venæ sublingua.

C Quando vires venæ sectionem non sustineant, Cucurbitulis agendum: de loco idem esto iudicium, quod etiam de venæ sectione.

Cauteria quin etiam propter causas propostas variis inuruntur locis: In Epilepsia per consensum in cruribus, aut coxis: In Epilepsia per essentiam aut in brachiis, aut in occipite, aut in syn- *Cauteria* cipite: & aliquando, cum opus fuerit inurendum est cauteriū in brachio, & cauteriū, aut setaceū in occipite.

D Quod si fiat Cauterium in syn- *Terebra-* cipite, moneo illud debere penetrare saltem usque ad mediam ossis partem: quinimo in suspitione alicuius humoris putridi inter membranas & cranium opus est Terebratione.

Præter Cauteria maximam habent huius curationis partem Vesicantia. Quinimo non solum *Vesicat.* Rhafes, sed omnes Medicinæ scriptores in illa Epilepsie specie, quæ sit propter auram à digito, pede, vel alia simili parte ascendentem, nihil præstantius Vesicatorio excogitare, potuerunt.

E Apponitur illi mer parti vesicatorium, ex qua aura eleuatur: & quamuis cauterium actuale in eo loco idem præstare posset, aliquando tamen locus tendinosus cauterium non patitur, vt propterea vesicatorium sit efficacius, siue componatur ex succo Flammulæ, aut Barrachii, aut ex Catartidibus cum sinapi, euphorbio, & fermento.

Interim ad purgationes quoque confugiendum: *Purgatio* Et si affectus fuerit recens, statim ad purgationem deueniendum, nulla facta præparatione: nam cum primū incipit morbus usque; adeo grauis, habet rationem vigens, & materia habet rationem turgentis vt propterea dubium sit, ne aut iterum reuertatur Epilepsia, aut alius grauior affectus succedat. Itaque quàm primū in materia pituitosa vtendum pilulis Cochijs aut simplicibus, aut præparatis à scrup. iij. usque; ad drach. i. & sem. aut exhibenda hiera diacolocynth. ad drach. ii. Vel si pilulas, aut bolos non admittant, conficiendæ sunt rotulæ ex puluere nigri helleb. trochisc. albid. & diagydio.

Quod si morbus iam fuerit antiquus, & habeat

sua longa temporis intervalla, leniatur primò al-
 ius melle ros. solut: præparentur humores hoc
 syrupo sine diluto.

Recipe Oxymel. scill. vnc. i.

Simpl.

Syr. de beton. an. sem. vnc. M.

Dilutum non proponitur in hac prima præpa-
 ratione, nam cum debeat recipere attenuantia,
 hæc si multam inueniant materiam, illam in flatu
 & vaporem digerūt, qui est causa Epilepsie. Ideo
 satius est post illos syropos, aut pilulis, aut bolis,
 aut rotulis, aut hac infusione purgare.

Recipe agar. trochisc. scrup. iiij.

Turbic elect. drach. sem.

Infund. s. a. in oxymel simpl.

Deinde verò adde mell. ros. sol. vnc. iiij.

Aque pæon. q. s.

M. & f. potio.

Secunda humorum præparatio sic erit faciendâ

Recipe oxym. scillit.

*Syrup. de beton. comp.) an sem. vnc.
 de Stachade.)*

Decoct. radic. pæon.

maioran.

Stachad.

Rut sylvestr.

hysopi

beton. vnc. ij. (roc. iiij.

M. pro syrupo.

Post quâ præparationē licet ascendere ad pur-
 gantia validissima, vt propterea Aret. 1. de diutur.
 c. 4. proponat vsum thymelæ & chanielæ, seu
 grani Gnidij, Arabes dicunt Mezereon. Aetius
 laudat vinum colocynthidi superfusum, cui vino
 addunt Recentiores rutam, & semina pæoniar.
 Cels. lib. 3. cap. 23. cum quo sunt Alex. Trall. &
 Paul. laudauit vsum ellebori albi, neq; simplicis,
 sed cum additione colocynth.

*Paulilo
 cus resili
 tuitur.*

Moneo tamē Iuniores, in textu Pauli maximū
 esse errorem. Nam proponit ellebor. albi pro vna
 vice drach. viij. & legi debet siliquæ viij. Sicut au-
 tē viij. siliquæ grana xxx. plus minus ita vt hæc
 portio ellebori albi quæ est semidrach. simul cū
 facultate colocynthides superet drach. i. quæ tota
 vna vice est præbenda. Sed de vsu Albi Ellebor. E
 plura etiam dicemus in tractatu de Melancholia.

In eundem vsum Recentiores accipiunt. v. aut
 vj. grana Antimonij, aut totidem præcipit. ij. vel
 turbith. mineralis. Hæc omnia in Epilepsia, confir-
 mata, & contumaci sunt ex hibenda: quæ tamen si
 conueniant etiam in succo melancholico, nihilo-
 minus de huius humoris purgatione & præpara-
 tione longior ergo in tract. de Melanch.

Quod si bilis fuerit in causa Epilepsie, hic quo
 que humor propriis medicamentis purgandus le-
 nita alio cum cassia, & tamarindis, præparatis
 humoribus cum syrupo violat. de cichor. & c. fa-
 ctaque purgatione aut per infusionem rhabarb.
 aut per pilulas aureas, quarum dosis est à drach.
 i. vsq; ad drach. j. sem.

Et si ex ventriculo multis humoribus referto
 fiat Epilepsia, purgandus erit ventriculus vomitu
 aut hoc bolo:

Recipe Diaphanis. drach. iii.

Spec. hier. simp. drach. ii.

M. & cum succo f. boli.

Quod si os ventriculi potius irritetur ab acci-
 moniabilis, reprimendus est hic humor vsu fru-
 ctuum adstringentium, cytoniorum, mespilorum
 granatorum, conuenit etiam saccar. rosac. cui ad-
 misceatur aliqua portio rhabarb. cassia cum ta-
 marindis, curandumque patientes diu in ediam
 sustineant, sed opportunè nutrantur.

Non versabor (Auditores) in curationibus
 omnium affectuum aliarum partium, lienis, vte-
 ri, renum, quandoquidem hoc pertinet ad aliam
 partem, sed ad id, quod proprium est præsentis
 tractationis, me conuertam, ad vsum scilicet medi-
 camentorum alterantium, corroborantium, & a-
 gentium à tota substantia, siue intrinsecus assu-
 mantur, siue collo appendantur: Ingens sanè est
 horum medicamentorum sylua, & vt ingenuè di-
 cam, non aliam ob causam puto tam varios ac
 supersticiosos hac in parte fuisse Medicos, quàm
 ob difficultatem curationis.

Dicam primo, quid in quacunque specie Epile-
 psiam curare possit per qualitates manifestas, oc-
 culta deinde subiungam

In pituitosa materia nihil præstantius vsu mel-
 lis scillitici; quod debet præberi spatio 4. odierum
 summo mane 4. horis ante cibum ad quantitatem
 vnc. sem. Aurea Alexandria est quæque inter ce-
 tera, medicamenta omnium præstantissima. Datur
 drach. i. singulo mane, idipsum dico de Theria-
 ca antiqua, & Muhridarica confectio. Placet et-
 iā vsus Trochiscorū de squilla: dosis sit semidrach.
 cum aceto aut scillitico, aut caryophyllatosid est
 facto cū infusione caryophyllorū. Omnis tanquā
 manifesta decoctum ex igno sancto, ex salsa &
 saxatras, aquas thermales, vsum castorei, & alia,
 quæ docuimus in tract. de Paralyti.

In causa melancholica conuenit valde vsus
 mellis scillit. sed permisti cum aliqua portione
 specierum diamolch. amari, vt sit

Mell. scillit. sem. vnc.

Diamusci. semidrach. M.

In biliosa conuenit succarum rosat. violat. sed
 cum admistione margarit. prepar. corn. ceru. vsu,
 rasuræ eboris, & aliorum: quæ etiam putantur à
 tota substantia prodesse, quorū seriem nunc referā.

Igitur à tota substantia, putantur iuuare cra-
 nium humanum, præcipue ex corpore viuentis
 abscissum, idem præstat craniū asininum, vngu-
 la alcis, vngula asini, lichenes equorum, spinæ pi-
 scium exsiccatæ, & pulueriz. seu crematæ, cerebrū
 cameli pariter exsiccatum, & pulueriz. hirundines
 combultæ, & puluerizatæ, viscus quercin. (signū
 visci, non liquorem, quo capiuntur turdi, intelli-
 go) pæoniæ radices, & semina; sed nigra non ru-
 fa, pentaphyllum, imperatoria, carduus benedi-
 ctus.

Praeter quæ excogitarunt Medici alia quoque
 spurcissima, vt sterces ciconiarum, caninum, humanū
 pudendum canis marini, apri, vesicam eiusdem
 apri cum vrina exsiccatam, & puluerizatam.

Multo tolerabiliore sunt, qui propoluerunt
 iecur leoninum, mustelæ, leporis, coagulum quo
 que leporinum.

Sicut

Sicut alia quoque ex parte impios voco Medicos illos, qui etiam humanum sanguinem bibendum, & iecur edendum Epilepticis præbuerunt: Inuentum sanè Magorum & Sagarum, prorsus detestandum & execrandum.

Itaque ut tandem horum omnium medicamentorum sylvam in ordinem redigamus, ut frugi patientibus esse possint, dabo aliquas compositiones puluerum, electuorum, aquarum, quæ sunt in frequenti usu non tantum apud Medicos, sed etiam apud plerosque Nobiles viros & mulieres quibus vtuntur tanquam secretis.

Primum quidem in Pituitosa materia, atque frigida intemporie hic pulvis componi potest.

Recipe Cardamomi)

Caryophyl.) an drach. i.

Cinamom.)

Semio. rut. syluest.

cymini.

sesel. an. drach. i. sem.

Cran. huma. pulu. vnc. sem.

Semin. pæon. drach. ii.

Spin. pisc. cremat. & exsic. drach. iii.

Sacc. pulueriz. vnc. i. M.

In puerulis paruis potest dari scrup. sem. & scrup. i. In Grandiorib. drach. i. Datur cum aqua aut lauend. aut primula veris, aut pæonia, aut si haberi possit aqua panis, illa est, quæ omnium præstantissima præstat. Dosis aquæ in adultis est vnc. iii. Pro ætatis varietate vnc. i. j. & ii. exhiberi possunt.

In calidiori corpore hic pulvis erit præstantissimus, & accommodatissimus.

Recipe Rasur. ebor.

Corn. ceru. vñ.

Vngul. alces., aut si hæc haberi non possit *vngul. asin. an. drach. i.*

Cran. human. vnc. sem.

Semin. pæon. drach. ii.

Corall. rub.

Margar. præp. an. drach. i. sem.

Fragment. hyacinth.)

Smaragd.) an drach. sem.

Sapphyr.) M.

Dosis sit eadem. Præbeatur potissimum cum aqua panis, aut aliquo vino adstringente.

Si Epilepsia fiat per consensum ab infernis partibus, ex dictis vos ipsi poteritis colligere modum conficiendi rotulas accipientes pro singula drachma puluerum vnc. i. sacc. dissol. in aliqua ex aquis propositis.

Poteritis conficere conseruas miscendo pulueres aut cum conseruis beton rosar, aut etiam addendo saccharum aut mel.

Præter quæ appendantur etiam collo patientis radices pæoniae recetis, smaragdus, & sapphyrus Neque improbantur annuli ex vngula alcise confecti, dummodo vngula sit pedis sinistri posterioris ex animali adhuc viuens excisa, Sole in Leone existente.

Victus Ratio.

His addenda est victus ratio, quæ in pituitosis debet esse similis victui Paralyticorum

A ex tali causa: propterea interdicenda sunt omnia crassi succi, omnia vaporosa, omnia impenitè attenuantia, vinum præcipuè, nisi sit medicatum, alteratum scil. hyssopo, pæonia, stæchade, & betonica, & post diligentem corporis, ac capitis purgationem.

In biliosis hæc tenuis victus ratio locum non habet, imò verò, ut antea dixi, & notauit Gal. §. de loc. aff. 6. in casu illius Grammatici, qui ex ore ventriculi nimis sensiuo Epilepsiam patiuntur, si diutius à cibo abstinuerint, statim Comitiali Morbo corripiuntur; propterea oportuè sunt nutriendi.

DE INCUBO.

Cap. XVII.

Cum Apoplexia, & Epilepsia aliquam habet affinitatem affectus ille, qui modò Incubus modò Strangulator, Arabibus Alcodilen, & Alcaion vocatur: Themison auctore Cæli. Aurel. primo de trad. passionib. c. §. 2. lib. Epist. vocauit *Ἰνκὺβον*, si quidem præfocat ægrotantes.

C Est hic affectus praua quedam imaginatio per somnum facta ex impedita respiratione.

definitio

Est praua imaginatio: nam hoc affectu laborantes dum dormiunt, animo concipiunt pondus graue sub forma aut Gigantis, aut Dæmonis thoracis illorum incumbere, & aliquando ab ipso siue viris, siue mulieribus Venerem expetere.

Causa Proxima.

Causa huius prauæ imaginationis Proxima, & immediata est impedita respiratio, cum enim respiratio impeditur in somnis, statim dormientes in suffocationis periculū incurrunt, & imaginatio hoc periculum suffocationis non distinguit fieri ex impedita facultate, ut postea dicam, sed arbitratur rem grauem corpori insidere, quæ spiritum prohibeat; non est tamen res grauis; non est, ut dicebat Themison, Deus, aut Semideus, aut Cupido, sed impeditur facultas animalis, ne transeat ad nervos, & musculos, thoracem mouentes: impeditur quin etiam, ne transeat ad ceteros, & propterea qui hoc affectu capiuntur, cupiunt à se causam suffocationis excutere, nec tamen moueri possunt, nec clamare; sentiunt tamen potius impedimentum circa musculos thoracis, quàm circa alias partes, quia in somnis musculi thoracis operantur pro conseruatione vitæ. Itaque cum primum otiantur, dormiens noxam sentit.

Morbus, ex quo profluit dictum Symptoma, & Locus affectus.

Impeditur facultas ab Obstructione, præsertim postremi ventriculi cerebri, ut propterea, qui dicunt in Incubo ledi anteriores ventriculos, eo quod imaginatio sit læsa, decipiantur. nam imaginatio non est læsa à vapore aliquo spiritibus animalibus permixto, sed tantum propter hunc conceptum, quem facit Impedita respiratio.

Causa Morbi.

Hæc obstructio fit à vapore, sed crasso; propterea (ad differentiam Apoplexiæ) cito soluitur; neque in Paralyin definit. Hic vapor crassus aliquando generatur ex materia in cerebro contenta, quæ dum digeritur, (concoquitur) semper aliquos excitat (emittit) vapores, qui consueverunt per insensibiles aditus & meatus digeri. h: autem retenti, ut docet Auic. prima 3. tr. 2. c. 5. c. 5. propter aeris ambientis frigiditatem sunt in causa obstructionis; plerumque tamen vapor iste ex infernis partibus eleuatur, ventriculo, intestinis, liene, viro, toto corpore: ideo illius materia est cibus & potus copiosus & crassi succi, est pituita siue cum vermibus siue citra vermes; est melancholia; est sanguis crassus; est denique semen redundans.

Mediata causa.

Mediata causa ex iam dictis facile colligitur. Inter ceteras est dormitio resupino venter: nam sic materia facilius ad posteriorem decumbit cerebri partem: inter has causas sunt quoque retentiones consuetorum excrementorum. Hæ sunt causæ immediatæ & mediatae Incubi à Medicis propositæ.

Signa Incubi Medici.

Quantum ad Diagnostica, hæc non sunt proponenda, nam patientes post somnum referunt, quid illis contigerit, quamquam aliquando, ubi grauior sit affectus, reliquæ post somnum apparent, corporis tremor, sensuum stupor, cordis palpitatio, humiditas oris, & oculorum.

Causæ sic distinguuntur: ubi fuerit vapor pituitosus, concipiunt patientes rem illam grauem sub forma coloris albi; si sit vapor melancholicus sub colore nigro; si sanguineus sub rubro; si seminalis semper putant se requiri ad Venerem.

Prognosis.

Hic affectus si raro contingat, & ex causis extrinsecis, ut largo potu, ac cibo, aut frigido aere nullius est momenti; sed cum frequenter reuertitur absque manifesta causa, aut Apoplexiâ, aut Epilepsiâ minatur, aut Maniam, aut etiam Melancholiam; est quæ, eo periculosior, quo fuerit longior, ita ut post accessionem cordis palpitatio, & stupor perseveret.

Curatio.

Curatio Incubi primo consistit in viuendi ratione, ut vespere parum cibi, & potus assumant, & in vltima mensa aliquod astrictorium accipiant, vel pyrum coctum, vel diacytoniren: & abstineant ab omnibus vaporosis; Vigilent saltem duas horas ab accepto cibo; & qui frequen-

Ater subiiciuntur, habeant sodalem in cubili, qui aduentante accessione illos excitet. ac diuersionibus statuit per ligaturas & frictiones.

Quod si corpus fuerit plenum sanguine, mittendus sanguis eodẽ modo, & loco, quo diximus in Epilepsia. Sanguis

Vbi corpus sit cacochymum, siue pituita, siue melancholia redundet, ut docuimus in capite de Epilepsia, ita purgandum est.

Quod si ventriculus multo cibo, ac potu sit refertus, vomitum prouocare oportet: inter corroborantia medicamẽta Auicem. laudat grana piconiæ nigra. Ego vno verbo dico: ea omnia in incubo prodesse, quæ proposui in tract. de Epilepsia; siue respiciant succum pituitosum, siue melancholicum, siue biliolum. Quamquam, n. Incubus propriè non fiat ex bile; tamen, ut dixi, sit ex vaporibus eleuatis ex sanguine, & semine, in quo casu conueniunt illa medicamenta frigida & sicca, quæ proposuimus in Epilepsia biliola. Et de Incubo hæc dicta sufficiant.

DE TREMORE:

Cap. XIX.

Vnicum superest facultatis morticis symptoma, quod hodie exponam, Tremor scilicet, nomina autem Tremoris, non intelligo Rigorẽ, quæ tamen aliquando fecit Hipp. & Gal. 6. aph. 2. 6. d. inquit, in febrib. tremores superuenientes delirio solui: nam per Tremores illi Rigores intelligantur, de quibus etiam scripserat 4. ph. 5. 8. a febre ardente habita rigore superueniente solutio fit. Nominem igitur Tremoris intelligo eleuationem, & depressionem membri organici vicissim factam absque sensu punctionis, & refrigerationis: per quæ differt Tremor à Rigore: nam Rigor non est vnus tantum partis, sed totius corporis, atque fit semper vel cum sensu refrigerationis, vel cum sensu punctionis.

Hic Tremor licet ab omnibus describatur tanquam vnus tantum, est tamen duplex, non quidem forma, aut subiecto, sed causa effectiua.

Differentia prima.

Primus Tremor vnicuique cognitus explicatur à Galen. 2. de causis sympt. 2. & 1. in. 3. Epid. comm. 2. & 4. Est motus deprauatus facultatis animalis reluctantis cum grauitate membri, Est motus prauus; quia, ut antea dixi, in hoc affectu membrum p. n. eleuatur & deprimitur. Dicitur motus facultatis animalis reluctantis cum grauitate membri; quia in tali symptomate, cum primum facultas aggreditur motum animale, ut partem sursum atollat, grauitas membri attrahit deorsum: iterum verò insurgente facultate eleuatur sursum, atque iterum deprimatur. Hinc fit motus prauus pugnante, ut dixi, facultate cum membri grauitate.

Ex quo patet, hunc motum non fieri prauum nisi quando voluntas ipsum membrum moueri,

Causa differentia prima.

Causa huius pugne vel est ex parte facultatis, vel ex parte membri, ex parte facultatis dupliciter; vel quia sit resoluta, vel quia alio conuersa sit: est resoluta per omnes superpurgationes sine sanguinis, siue aliorum humorum, per inedias, dolores, vigilias, nimium motum, & Venereum, aliò conuertitur propter insignem timorem.

Ex parte membri dupliciter fit Tremor: aut quia membrum facultatem vix admittat, vel non admittat, aut quia iusto & còsuetò redditum sit grauius, non admittit facultatem propter illas omnes causas, de quibus memini in tract. de Paralytificatione, refrigeratione, obstructione, compressione, estulto ponderosius, aut propter humorum plenitudinem, vel cacochymiam, aut propter aliquem tumorem, siue inflammationem, siue alterius speciei. Et hæcenus de causis Tremoris, quem omnes norunt.

Differentia secunda.

Alius est Tremor, quem nemo præter Galē, descripsit, ac breuissimis verbis, vt propterea nullus Medicinæ scriptor huius mentionem fecerit.

Est hic quoque motus eleuationis, & depressionis membri, sed factus a sola causa morbifica, sicuti, & Conuulsio, & Palpitatio; vt propterea hic Tremor contingat pleniq, quiescentibus, & nullo modo membra agitare cupientibus. Ergo frequentes id genus obseruaui Tremore: hic affectus fit à sola causa morbifica.

Causa differentia secunda.

Hæc causa morbifica est illa, quæ facit Palpitationem in cute, flatus scil. crassus, aut spiritus vaporosus, i crassus, in musculosa substantia imbibitus, qui exitum querit, & tamen non inuenit. Qui intelligit modum, quo fit Palpitatio, faciliè consequetur modum, quo fit hic Tremor: Nam sicuti Palpitatio fit ex spiritu in subcutaneis partibus contento, exitum querente, nec tamē faciliè inueniente: ita in hoc Tremore spiritus replet musculosam substantiam, aut spatio inania, quæ sunt inter musculum & musculum, vt dum querit exitum, nec faciliè inueniat, motum eleuationis, & depressionis efficiat.

Hæc est sententia Galen. vt dixi paucis expressa in lib. de tremore, conuulsione, palpitatione, & rigore cap. 5. vbi scribit, quòd quemadmodum fit palpitatio in partibus cutaneis ex spiritu flatuoso contento, ita inquit ex eodem spiritu in musculis contento agitur membrum, vt dicatur Palpitatio totius membri, ita vt, quod ille vocat Palpitationem totius membri, nos vocemus Tremorem & propterea primo in 1. Epid. 4. inquit, motus, qui sunt citra voluntatē alios esse Conuulsionē, alios Palpitationem, & palpitationem non intelligit eam, quæ fit in cute, quia ille est motus partis similis, sed loquitur de motu partis organicæ.

A Hic spiritus flatuosus, aut vaporosus aliquando generatur in ipsamet parte laborante, cum frigidior & humidior sit reddita; quandoque transmittitur à cerebro, aut nimium refrigerato, & humectato, vel inflammatione affecto: sic in Phrenitide, & Letargo frequentes sunt in membris Tremores nò propter virium imbecillitatem, sed propter vapores ab inflammatione eleuatos, qui in musculosam inferuntur substantiā, & propterea hic Tremor fit manu quiescente, & patienti.

B Hoc modo censendum factum esse tremorē Pythionis, cuius meminit Hipp. primo in 3. Epid. 3. & 4.

Causa mediata.

Mediata causa, iam patet: nam cum causa immediata sit vel spiritus vaporosus, vel crassus flatus, vaporosus spiritus potest eleuari ex sanguine copioso melancholico, sicuti flatus crassus ex pituita, atque cibis crassi succi.

Signa.

Cognoscitur hic affectus solo ipso sensu, & distinguitur hic secundus à priore, quia prior nunquam fit, nisi muscoli per electionem operentur: hic secundus fit nobis etiam inuitis:

Causæ etiam faciliè distinguuntur: nam si Tremor fiat propter spirituum dissolutionem, (resolutionem) adest vel præcessit aliqua insignis euacuatio, aut dolor, aut aliqua alia causa proposita.

D Si sit membri grauitas, cognoscetur ex tumore membri, duritiè cum lassitudine, aut phlegmono de, aut tenuia. Signa causarum impimenti habetis in tract. de Paralyti.

Prognostica.

Hic affectus in acutis febribus mortem minatur, sine febre consuevit desinere in Paralytin; aliquando etiam in Apoplexiam; est tamen valde diuturnus, & contumax.

Curatio.

Curatio est varia pro causarum varietate: in Tremore propter spirituum dissolutionem conuenit sola victus ratio resectoria: in Tremore ex causis impredientibus spiritum animale eadem est curatio, quæ & Paralysis. vbi fit ex Grauitate membri, uel a causam grauitatis considerare oportet: nam si fuerit sanguis, secunda, est vena: hoc dico, quia antiquitus etiam nouum videbatur in Tremore sanguinem mittere: quòd existimauerit, omnē Tremorem ex frigida causa fieri. Hinc Gal. Hippocratem laudat lib. de palpit. & rigor. cad. 5. qui mulieri Tremore laboranti ex suppressione mensium audacter venam pedis secuerit, quod & ipse faciendum consulit lib. de venesect. aduers. Erasist. c. 7.

Si grauitas sit ex aliis humoribus, purgetur vniuersusque, prout aliàs docuimus.

Sed ubi spiritus vaporosus, ac flatulentus id efficiat, vno verbo eadem est curandi ratio, quæ fuit proposita in spasmo, & in epilepsia ex spiritu hoc flatulento conuulsionem faciente. Conuenit eadem corporis purgatio, & capitis inunctione balnea, fomentum, & antidou, ac medicamenta interna calorisifica, exsiccantia, & digilentia.

De Catarrho. Cap XIX.

Amplissimum, & omnium maximè necessarium de Catarrho tractatum aggredior. Est enim destillatio omnium ferè morborum mater: & nullus est morbus, ex repletione ortum ducens, qui aut non fiat, aut non augeatur à destillatione.

Vocatur hic affectus modò Rheuma, Grauedo Destillatio Catarrhus, & in varia accipitur significatione: aliquando vniuersaliter sumitur pro fluxione capitis ad qualescunq; subiectas partes, os, fauces, arteriam, pulmones, atq; adeo vniuersum thoracem, ventriculum, intestina, iecur, vterum, venas omnes, articulos, ambitum corporis, quini-
mo ad aures, oculos, & ipsas nates; aliquando accipitur arcto quodam modo pro fluxione in os tantum, vt docuit Galen. 3. de sympt. caus. cap. 4. nonnunquam medio quodam modo accipitur pro fluxione facta ad nates ad os, fauces, & arteriam in qua significatione accipimus in præsentia Catarrhum.

definitio Est hic Catarrhus materia fluxio ad subiectas partes. In hac definitione primùm explicare oportet conditiones, & naturam huius materie, quæ quidem considerari potest vel absolute, vel in relatione absolute quidem est hæc materia excrementum cerebri, sed præter naturam: duplex enim est cerebri excrementum naturale, vnum tenue, quod per suauitatem purgatur; alterum crassum, quod per infundibulum, seu peluim, & cloacam ad os, & nates descendit. Catarrhus autem, de quo nunc est sermo, alias inuenit vias cū hæc non sufficiant, & per has multo copiosius ex purgatur.

In relatione potest adhuc considerari dupliciter: vel vt est quædam substantia, vel vt habet in se motum, quantitatis, vt est substantia, habet relationem & ad causas à quibus producit, & ad effectus, quos producit: causas, à quibus producit, sunt variae pro varietate conditionis huius materie,

Nam materia aut est simplex, vel mista: & cū est simplex, aut est dulcis pituita, aut insipida, aut falsa, aut mucosa, aut amara, aut putrida, aut impurida, aut fetida, aut sine fetore. mista verò est aut bili, aut sanguini, aut melancholicæ aut pluribus simul humoribus: itaque pro horum varietate variè habet causas.

Causa Catarrhis sine eius Materia.

Versabimur primò circa causas huius substantiæ, prout multa augetur, & ea quidè

A insipida. Huius causæ aliq; generant, quædam verò attrahunt, aut suscipiunt hoc excrementum in cerebro. Generatio fit vel ex morbo, vel ex errore externo. Morbus est aut intemperies, aut morbus officialis, Intemperies est aut frigida humida aut humida tantum, in passius temperata, aut frigida sicca, quicquid in oppositum sentiat Sebastianus Paparella 1. de catarrh. c. 20. Ceterum est Gal. secundo de temperament. capite vltimo, aperit docuisse ex intemperie frigida sicca potissimum naturalis pituitosum gigni excrementum, & augeti.

B Ex morbo officiali augetur pituita, siue ad hæc obstructio, siue compressio aliqua meatuum cerebri, quia consueta excrementa retinentur, retentia verò mirum in modum augentur, & nouum corumpunt alimentum; hoc docuit Galenus, non de usu part. capite primo.

C Externus error consistit in sex rebus non naturalibus, in cibo & potu, aut nimis copioso inordinate accepto, crassioris succi, ex aere frigido humido, siue sit propter constitutionem, siue propter regionem, & tempus anni, ex pluuie, ventis Australibus, ex somno, curis, moribus, in ætate præcipue senili, & puerili: hæc sunt causæ generantes.

Attrahunt verò intemperies calida cerebri.

Impelluntur verò in cerebrum humores, & quia copiosi augentur in toto corpore, in ventriculo, aut aliis determinatis partibus, aut propter robur harum partium; & hæcenus de causis aut gentibus excrementum quatenus insipidum.

D Quod si queratur causa Destillationis, eā est falsa, Galen. 2. de differenti. feb. c. 6. duas proponit causas, putredinem, & falsæ serosæ humiditatis cum pituita mixturem. Auicē. prima primi doct. 4. c. 1. & prima 4. doct. 2. c. 4. aliam superaddidit bilis cum pituita mixturem: hæc opinio quam minus placeat Franc. Vales. vt potestis apud illum legere, 1. contr. Med. contr. 7, rationi est consentanea.

E Et vt possius soluere difficultate, Salsedinis causa nulla est alia, si de proxima & immediata loquamur, quam permixtio terreæ, sed calidioris substantiæ in humido aqueo; hoc docet Gal. 5. simpl. c. 16. colligitur ex eod Galen. 3. de Alim. fac. 3. 2. & ex Arist. 4. meteor. cap. 3. Itaque cū immediata sit talis, mediata possunt esse multe: primùm quidem potest esse putredinem in putredine pituitæ pars valde putrida, & exusta conuertitur in cinerem. hic cinis est pars terreæ, & adhuc retinet calorem: itaque dum permiscetur hic cinis substantiæ humidiori pituitæ, fit salsedo. Pariter serum fit salum eodem modo, quo fit ius, dum duræ carnes diu in eo coquantur, nam cum longa coctione pars carniū terreæ supercalefacta recipitur in iure, ita vt ipsa euadat insipida, ius verò salum; sic quoque serum, vbi fit coctio in secore, pars aliqua terreæ humorum permiscetur cum aqueo succo, & sic salsedinem facit, id ipsum dico de mixture maris cum insipido.

F Quod pertinet ad causas Catarrhi fetidi & putridi, vnica est, nempe prohibita transpiratio, ad quam sequitur putrefactio, ad putrefactionem vero fetor; imò verò ad eandem putrescentem sequi.

Salsedinis causa.

Fetoris causa.

sequitur malignitas quoque Catarrhi, nam aliqui A dicuntur benigni, aliqui verò maligni.

Venio ad causas Catarrhi considerati, ut est corpus mobile; nam in eo, ut est corpus mobile, invenire oportet causas mouentes, terminū à quo, terminum ad quem, & vias per quas mouetur.

Causæ mouentes sunt vel Naturales, vel Violentæ; Naturales sunt ipsamet Catarrhi grauitas. Violentæ sunt vel impulsio, vel attractio. Impulsio fit vel à facultate cerebri expultrice irritata, vel à frigido externo experiente, vel à calido colliquante. Attractio fit ex dolore, aut calore, & inflammatione subiectarum partium: sic inflammatis gingiuis, dentibus dolentibus, vel alia simili parte, frequentes fiunt in os Fluxiones.

Terminus à quo est ipsum Cerebrum.

Viz, per quas fluit sunt infundibulum seu Peluis, & Cloaca, Venæ, Arteriæ, Spatia inania.

Terminus ad quem est multiplex, ut antea dixi, sunt primo nares, & ubi in nares descendit proprio nomine *Κόρυζα* dicitur; Si descendat in os vocatur *Κατάρρως*: si in laryngem, & arteriam, dicitur Raucedo, Græcis *Βραγχίτις*, & hæc sunt viæ C hi sunt termini à quo, & ad quem fluit.

Reliquum est ut intelligatis, qui nam affectus sint, quos producit Catarrhus in locis propositis.

Quod si consideremus in relatione ad effectus quos producit, si descendit in os, varios morbos infert, ac symptomata. Primum quidem circa dentes infert Mobilitates Erosionem, & Dolorē, & quanquam Mobilitas sit symptona, quod committatur defectum carnis gingivæ propter senium; at tamen aliquando fit ex nimia humiditate Catarrhi, aut ex nimia acrimonia, gingivas erodente, ex qua acrimonia fit etiam orosio carnis in dentibus, sicuti Dolor fit nervos aut inflammato aut quouis modo repleto.

Eadem fluxio ad gingivas facit aut inflammationes cum carnis excrecentia, hæc Græci vocant *Περυαδισίς* aut facit abscessus, qui suppurantur, quos Græci vocant *Ερυσίδης*.

Circa fauces hic Catarrhus descendens facit vlcera, quæ cū fuerint superficialia, Græcis *Λόθα* vocantur, Arabes communi nomine vocant Alcola Benignum; sicuti cū fuerint profunda Græcis *Νόμας*. Arabibus Alcola Malignū appellantur.

Eadem fluxio, prout descendit in eam partem, quam Græci vocant *Γαργαράν* (Gargurio etiam Græcis vocatur; Latinis Columella) producit Procidentiam, siue Prolapsum, aut *Σταδύλην* quæ Latini vocant Vuam, & Niliam, estque inflammatio extremitatis partis Columellæ, quoque alias inflammationem quæ à partibus parientibus de denominationem habent, nam si tota Columella inflammetur, dicitur inflammatio Columellæ siue gurgilionis.

Si inflammantur Tonsillæ, quæ sunt glandulæ circa fauces, dux quidem vocatur *Αρτιάδης*, duæ vero *Πάριδύται*, istæ omnes pariter à parte nomen sumunt, nam vocantur inflammationes tonsillarum, & paristhmiarum.

Denique si in ipso cerebro materia hæc sedem habeat, consuevit excitare Sternutamentum, quod quidem fit irritato cerebro, aut à vapore copioso,

id quod contingit per destillationes, ad quod respiciens Hipp. 7. aph. § 1: dicebat Sternutamentū fieri calefacto cerebro, atque humectato spatio inani.

Fit etiam Sternutamentum naribus irritatis.

Excitatur quoque propter vitia pulmonis, & asperæ arteriæ: nam communicatur affectio cerebro, & propterea, ut dicebat Gale. com. cit. Sternutamentum non est symptoma solius cerebri, sed & pulmonis, & asperæ arteriæ.

Signa Catarrhi:

DE Catarrhi signis verba facturus pro consuetudine illa distinguam in Diagnostica, & Prognostica.

Per Diagnostica verò non tantum intelligo illa, quæ præsentem demonstrant affectum, sunt enim conspicua; sed intelligo potissimum Distinctiva, partim quidem materiæ fluentis, partim morborum, & causarum augmentum materiam, partim causarum, à quibus fit fluxio, & motus, partim locorum, à quibus, ad quos, & per quos fluit materia.

Quod pertinet ad primum signorum fontem, versabimur primo in signis materiæ frigida; deinde in calida 3. in tenuis 4. in crassa 5. in putrida.

Frigidam cognoscetis, si saporis expertis fuerit sine sensu titillationis, aut acrimonia; si in faucibus solum inferat Rauced. nē, sine inflammatione; aliquando tamen cum procidentia columellæ, si præterea adsit capitis grauitas, propensio in somnum, mentis stupor, memoria hebes, tinnitus aurium, & frequens spurtio, *Σιαισμός* Græci vocant, aut *Πτυελισμός*: præterea si ætas sit senilis, temperamentum frigidum; vita ante acta otiosa, crapula, acerbis crassi succi dedita; denique si aeris constitutio, & regio, & tempus anni ad frigiditatem, & humiditatem inclinent.

Calidā cognoscetis, nisi fuerit falsa, amara, acris & propterea in naribus vlcera, crustasque inferat in faucibus inflammationes, erosiones; in dentibus caries, & cum deterior fuerit, atque in pulmones descendat phthisim producit; si præterea ruborem, & calorem capitis inferat sternutamentū frequens, vigilias, aut somnos turbatos, somnia multa, verugines: si que hæc destillatio in etate florenti, temperamento calido post usum acrimæ salutorum, aromatum, vini generosi, post insolationem, aut balnea, aut denique usum medicamentorum calefacientium.

Tenuis cognoscitur Destillatio si confestim descendat, & titillationem in faucibus insignē inferat, cum periculo suffocationis subito, & quamquam seratio frequens acidat, nihil tamen, aut parum excerni potest.

Contra crassa sensim descendit, faucibus hæret, & cum excernitur, viscida, & lenta apparer.

Putridam cognoscetis ex fetore non tantum materiæ quantum oris, & narum, ac præterea ex febre, quæ plerumque succedit.

Utū sit simplex, aut mixta cognoscetis facili;

nam simplex pituita erit alba; mista autem erit A vel flaua, vel liuida, vel cruenta, pro varia humorum admistione.

Quod pertinet ad signa caussarum, & affectuū à quibus materia producitur, longior non ero: nam signa omnium intemperaturarum Cerebri partim à nobis aliàs descripta sunt, partim proponuntur à Gal. lib. art. Med.

Pariter quod pertinet ad morbos instrumenta- rios, dictum est suo loco.

Si materia augeatur ex errore externo, patientes poterunt referre, nunquid se exposuerint acri B frigido, pluuiæ, niuib, aut vñ fuerint cibis acribus, esculentis, vino copioso: sunt quidam incidentes in destillationem ex odore rosæ: hos interrogabit.

Quod spectat ad causas mouentes, si causa mouens sit expressio facta à frigido externo, hæc causa poterit sciri ex relatione: referent patientes sese exposuisse boreæ: sicut facile cognoscetis virum moueatur à causa colliquante, si præcellerit insolaris, pileum grauius, aut fuerint in balneo, aut vñ sint calido medicamento capiti applicato, vel interius medicamentis calidis sint vñ.

Venio ad signa locorum, & primū distinguere oportet, virum primario Cerebrum afficiatur, an secundario, cognoscetis primario affici, si naturali aliqua intemperie laborat, si actiones Cerebri lædantur ante ventriculi actiones, vel partium subiectarum: si præterea plurimæ sint actiones cerebri eodem tempore læsæ, & denique si materia descendens magna ex parte simplex fuerit pituita: nam vbi per consensum sit Catarrhus, antequam laboret Caput, laborat pars aliquam inferior vel ventriculus, vel iecur, vel vterus, & præterea Cerebrum nõ necessarid afficitur secundum plures actiones, & materia destillans pro partu communicauit varietate potest esse flaua, aut nigra, aut cruenta, præcipue in suppressione mensium.

Distinguens locos, per quos fluit materia hac ratione: Materia si fluat per neruos, consuevit tollere sentum odoratus, gustum lingue; quandoque impedit motum lingue, dolores facit circa dentes ingenuilli nos, imò aliquando τρισμαόν seu dentium conuulsionem. Si per venas & arterias, facit partium subiectarum inflammationes, siue Colum. llæ, siue Glandularum, siue aliarum partium.

Cum per spatia inania, & cauitates descendit, purgatur & per nares, & per os absque aliarum partium noxa.

Locus, ad quem fluit materia, patet ex excrementis, atque actionibus mutatis illius partis. Nā si fluat ad nares, præter excreta sit etiam sternutamentum, imminuitur olfactus, & vlcera, vt dixi, in naribus excitantur; Si descendat in membranam faucium, Raucedinem infert; Raucedinem etiam infert materia descendens in asperam arteriam; sed dissimili ratione: nam vbi fauces, seu membrana faucium ab humiditate excrementitia irroratur, Raucedo quidem fit, sed inequaliter, nam quandoque magis, quandoque minus sunt rauci, & quandoque facile curatur affectio; vbi verò arteria laborat, & larynx, Raucedo equa

liter affligit, difficile curatur, plerūque A trausit ex Galen. 4. de loc. aff. 5. & 4. de caus. sympt. 4.

Ceteri loci affecti ex actionibus læsis parent, & aperto ore patientis poteris videre, virum gingiuæ, columellæ, vel alia pars laboret.

Prognostica.

T Ranseo ad prognostica: Est omnis destillatio antiqua, & confirmata difficilima curationis; sed præcipue salia atque acris: hæc enim non modò difficili negotio curatur; verum etiā si in nares decumbat Polypus, aut Ozænas excitati in fauces Aphthas, seu Nomas; si in pulmones, Phthisin infert, propterea dicit Cels. minus periculosam esse Destillationem, quæ in nares, quam illa, quæ in os decumbit, quod dicit etiam Gal. 2. progn. 4. 9. vbi ait destillationem in nares, sicuti & sternutamentum esse malum per modum signi tantum, sed destillationem in os & per modum signi, & per modum causæ: nam portio materię descendens decumbit in pulmones, vt ruffim, & phthisin inferat; Scribit Hip. 2. aph. 40. Hipp. ex Branchos, & Coryzas in senibus non maturari: plicatus. Et bene dixit, non maturari, nõ quòd senes nunquam possint à Catarrhis liberati, nam est falsū, & falsitatem ostendit Leoniceus, vt refert Brasauola in com. aph. 2. part. Sed scripsit ita non maturantur, i. e. ad perfectam coctionem non perueniunt; possunt tamen paulatim solui & digeri. Videte Hip. 5. in 6. Epid. 4. 2. inquit, morbos commutatos (conuultuos) in senibus solui per rarefactionem, vel attenuationem. Scribit idem Hip. 2. in 6. Epid. 4. 2. eos, qui laborant Destillationibus non laborare affectionibus splenis: Causam proponit Gal. in com. quòd scilicet tota corporis excrementa crassiora confluunt ad locum imbecilliorum, qui est caput, quod est obnoxium Destillationis, & loquitur tantum de antiquis destillationibus, non de recentibus.

Curatio.

Primò loquar de remedijs, quæ diriguntur ad uersus materiam. 2. de illis, quæ diriguntur aduersus morbos siue sit intemperies, siue morbi instrumentarij, propter quos augetur materia: 3. curationem aggrediat morborum, quæ oriuntur ex Destillatione.

Aggressuri Catarrhi curationem, incipiemus, vt dixi, ab auxilijs, quæ diriguntur aduersus materiam; vt autem res methodo procedat, primò erit sermo de medicamentis purgantibus aduersus materiam calidam, 2. de respicientibus frigidam, & quia vtraque potest esse & tenuis, & crassa, distinctè etiam proponuntur remedia proteui & pro crassa.

Initium igitur à materia calida sumentes loquemur, primò de fonte chirurgico, in quo tametsi Græci scriptores sectionis venæ mentionem non faciant, Galeno excepto 1. meth. cap. 14. qui in salsa destillatione sectionem venæ proponit; Arabes tamen serè omnes huius auxilij mentionem

Vene sect. nem faciunt; & sanè non iniuria; nam calida Destillatio vel habet sanguinè admissum vel bilem, vel calidam habet intèperiem, a qua produ- citur, vel magnum aliquem morborum minatur inflammationem, vlcus, vt propter has omnes ca- usas venè sectio apprime sit necessaria:

Locus. Secetur itaque vena aut Capitis, quam Cepha- licam dicunt, si destillatio per essentiam, aut pri- mariò in capite generetur, secentur inferiores, vbi ascendat materia propter suppressos menses vel hemorrhoides, Aperiatur ieceraria, vel com- munis, vbi totum, aut iecur materiam commu- nicet Cerebro.

Hirudin & Cucur. Sequamini autem hac in parte Gal. consilium loco citato, vt si corpus sit cacochymum, vires de- biles, antequam secetur vena, expurgerur caco- chymia, ac conuenienti victu reficiantur vires, quòd si fuerint vsque adeo languidæ, vt sectam venam non sustineant hirudines applicentur ve- nis sedalibus, aut cucurbitulæ affigantur, præcipit Auicenn. ne dorso affigantur cucurbitulæ, sed po- tius occipiti, ne fortè materia ad thoracem traha- tur; quod si vniuersaliter esset verum, neq; lum- bis, neq; natibus, vno verbo, partibus infernis nū- quam essent affigendæ; nam dum materia edu- citur ex capite, antequam perueniat ad lumbos, vel inferiores locos, potest in thoracem deduci, itaq; hæc Auicennæ sententia tunc tantum ha- bet locū, cū catarrhus primario in capite genera- tur; nam si ascendat vel à iecore, ventriculo, lie- ne, vtero, toto corpore, tunc cucurbitulæ tunc lum- bis, & infernis locis admoueri possunt.

Vnsc. & Frieli- gat. Eadem est ratio Vesicatorij, Cauterij, fri- ctionum, & Ligaturarum; nam hæc omnia auxi- lia infernis partibus tunc, & vtiliter adhibentur, quando Catarrhus ab infernis locis Cerebro com- municatur; vbi verò tota Catarrhi sed sit Cere- brum, frustra hæc inferioribus locis adhibentur sed potius brachijs & occipiti ad reuulsionem & deriuationem conueniunt.

Quod pertinet ad ipsummet caput, disputaui aliàs in tract. de Doloze Capitis, neq; in præsentia repetam; verum in calida materia Cauteris, & Vesicantijs capiti administrari possint. Vnum di- cam de Vesicantibus, hæc in calida fluxione nun- quam conuenire pro corrigendæ calida intèperie capitis & cerebri; & hoc est, quod voluit Gal. 6. de tuen. val. ca. 9. qui cū cognosceret Catarrhos gigni etiam cū intemperie calida, inquit malè agere medicos, qui in tali intemperie calida tha- psia, & calorisficis vruntur; neq; conueniunt hæc vesicantia, vbi materia calida fluat ab infernis par- tibus in Cerebrum; nam potius nouam traherent materiam; propter quam causam Galen. 2. de comp. per loc. cap. 2. & 3. prohibet in humoribus calidis vsum medicamentorum actiuum capiti ad- hibitorum.

Conueniunt itaq; in duplici tantum casu: pri- mus est, quando materia calida primariò in capi- te genita decumbit ad pulmones, aut alias partes inferiores cū suspitione phthisis, vel alterius ma- gni morbi, in quo casu ad reuulsionem admini- strantur commissuræ coronali, vt aliquando fecit Gal; 5. meth. ca. 3. aliquando etiam eadem mate-

ria, primariò in capite genita cõrux & rebellis vsu vesicantium commodè expurgatur. Hæc de fonte chirurgico.

Quod spectat ad Pharmaciam si calida mate- ria sit tenuis, vtamini hoc leniente.

*Recipe flor. cass. nou. extr. drach. vi.
pulp. shamarin.*

Mann. elec. an. drach. iij.

Bol. Armen. drach. sem.

M. & sine sacc. f. boli.

Syrupi sint tales,

Recipe syrup. de papau.)

de yub.) an. vnc. sem.

de liquirit.)

Decoct yub. nymph.

bord. liquirit.

papaueris vnc. iij.

M. pro syrupo.

Si fuerit crassior materia, pro Leniente accipia- tis in potione;

Mell. violat. solut.

Syr. viol. sol. an. vnc. ii sem.

Decoct. pectoral. q. s.

M. f. potio.

In bolo. *Recipe flor. cass. nou. extr. drach. x.*

Mann el drach. ii.

M. & sine saccharo f. boli.

Syrupi sint tales:

Recipe Syryp. acetos. simpl.

viol. simp.

de betonic. an. vnc. sem.

Decoct viol. farfar. passul.

bord beton. vnc. iij

M. pro syrupo.

Purgatio potest esse communis per sequentia medicamenta tam in tenui, qui quàm in crassa materia: Per pilulas hoc modo

Recipe pil. aur. drach. i.

coch drach. sem.

Quando fuerit pituita lassa:

Nam si fuerit mista cum bile

Recipe pil. aur. drach. i. sem.

& cum aq. cichor. f. pil. v.

Dentur hor. 6. ante cibum.

Bolus etiam talis conuenit:

Recipe Elect. de succ. ros. drach. iij.

flor. cass. aut. diapr. sim. vnc. sem.

M. & cum sacc. f. bol.

Si quis magis cupiat potionem, paretur in hûc modum.

Recipe rhab. elec. scrup. iij.

f. infus. f. a. in aq. viol.

& f. expressione.

Adde Mell viol. solut.

Syr. violat. sol. an. vnc. ii. M.

Quòd si crassior fuerit pituita, loco mellis viol. accipitis rosaceum, & simul cum Rhabarbaro infundat is etiam Agaric. drach. i.

Hæc purgatio dum aliquod imminet vel sus- focationis vel phthisis periculum, potest etiam agrotantibus adhiberi, nulla præmissa præpara- tione, quidquid in oppositum sentiant Recentio- res quidam, inter quos est Ioan. de . . . qui verè- tur, ne hæc purgantia agitent humores, & ducât ad locum

ad locum affectum? quæ ratio nullus momenti A mihi videtur; nam hanc ob causam internis locis patientibus nunquam liceret vi purgante, ne locus patiens motam susceperet materiam, hæc purgatio non semel tantum, sed bis, & quandoque plureis pro Catarrhi diuturnitate porrigenda est.

Facta autem diligenti totius corporis purgatione, Caput quoque sigillatim euacuandum; & cum materia ad nullam inferiorem partem fluxerit, potest hæc materia educi & per os, & per nares. quod si nares infestet, ducatur ad os, si fauces & os vexet, ducatur ad nares, est Galen. consil. 13. B meth. ii.

Massicator. Illud tantum moneo, in Catarrho calido hæc omnia debere esse frigida aut temperata.

Ideirco pro masticatorio satis erit charta, mastix, passulæ.

Nasal. Pro nasario lac cū diagridio, aut cum electuario, aut aqua hordei, aut succus betæ, vel malvæ: sed de his hæcenus etiam diximus.

Illud quidem nunc, quod maioris est momenti, proponendum, videl: materię medicamento- rum, quæ ipsammet Destillationem tanquam calidam refrigerent, tanquam humidam exsiccent, & consequenter vniuersam, si fieri possit, digerāt est negotium magni momenti.

Materię igitur medicamentorum refrigerantium, & exsiccantium sunt Internæ, & Externæ: Internæ sunt omnes aquæ naturales acidæ, & minere ferratæ: nam acidæ habent minerā aris. istæ omnes refrigerant, & exsiccant: tales sunt nostræ Patavine, Tegulæ, & Virginis; tales sunt Calderianæ in agro Veronensi: tales sunt Villenses, & qui Curcellæ. Legite Baccium.

Sed in defectu aquarum nihil præstantius inuenio pulueribus frigidis & siccis, quæ facili negotio comparari possunt ex herbis, floribus, seminibus, ex terris, ex cornibus, effibus, cochis, comis, lignis, & alijs, id genus: E.g. poteris accipere puluer plantag. oxylapathi, acetos. flor. nymph. flor. anemon. sem. intybi an. &c.

Hi omnes sunt frigidi, & sicci.

Frigidæ & siccæ terræ sunt Lemnia, Samia bolus Arm. & alia id genus.

Refrigerat & exsiccant cornu ceru. præcipue al. E sum, fantali, margaritæ, & omnia gemmarum fragmenta.

Vfus medicamentorum erit talis, ut permisceantur isti pulueres cum conseruis: forma erit talis

Recipe conser. viol.

sacc. ros. an. vnc. iij

Pulu. v. g. cornu ceru. vfl.

Tgr. sigill.

sem. plantag. an. drach. i. M.

Dosis conseruæ huius sit vnc. sem. singulo mane 3. horis ante prandium.

Si quispiam voluerit accipere drach. i. huius pulueris in aqua acetosæ, aut intybi aut plantag. erit adhuc fortius medicamentum.

Possunt quoque terdigi pulueres in rotulas E. g.

Recipe Marg. præp.

sem. plantag.

Terr. sigill. an. drach. i.

sacc. dissol. in aq. plantag. q. s.

M. f. conf. in Rotul.

Non improbo in Catarrhis minus calidis etiã decoctum chinæ aul. falsæ, dummodo coniungatur hisce refrigerantibus & siccantibus propositis infus. scil. & decoctione rosar. myrtill. plantag. nymph. acetosæ & aliarum propositarum.

Gættenus de internis refrigerantibus pro supradanda Destillatione Calida, inter quæ Serum Caprinum nõ fuit propositum, etiam si Recentiores quidam medici illud proponant quia etiam si refrigeret, humidat tamen, & quod magis refert, Caput ipsum vsq; adeo replet, ut Destillationibus obnoxii ex vsu seri incurrant dolores aliculares

N. B. circa vsu seri.

Circa exteriora remedia vnum propono, quod vulgare est, & potius muliercularum proprium, quàm Medicorum, conducit tamen, & est attractio capillorum violenta in regione sincipitis, vsque quocutis, & pericranium videntur a qua ratione separari ab ipso cranio: conducit hæc operatio ad distillationem vaporis, futurę enim capitis aperiuntur.

Quod spectat ad reliqua, nonnulla administratur capiti, quædam toti corpori, aut subiectis locis De his, quæ admouentur capiti, maximam inuenietis apud Scriptores controuersiam, quidam enim, inter quos est Aetius, proponunt stillicidium ex aqua actu frigida; alii proponunt calidam saltem actu; quidam verò calidam potentia, siue actu frigida sit, siue actu calida. Nos sic re decernimus: In Catarrho Calido fluente ad partes thoracis, ea, quæ sunt potestate calida, acris, & exulcerantia, ut est thapsia, & alia id genus necessario administrari debere omnibus frigidis

Stillicidium.

omissis, ex quorũ vsu materia promptius in pulmones labereur: at verò vbi nullus est materię in pulmones defluxus, sed tantum corpus fuerit calidum, corrigere intemperiem, & reliquias materię digere opus est, lotionibus vel fomentis, & epithematibus potentia frigidis, actu verò potius calidis: Hac ratione colueuerunt Medici vti stillicidio ex aquis ferratis acidis. in huius defectu doctest componi stillicidium ex aq. dulci, in qua ebullierunt rosæ, myrtus, nuce cupressi, (cupule) Jecullæ glandium, iuniperus, sandali, flores nymphæ, folia salicis, flores, & cortices granatorum, atque alia id genus, quæ refrigerant, & exsiccant, idcirco in eundem vsum parentur, aut pulueres ex prædictis rebus, aut etiam ex conchis & chamis, & pumice, ex omnibus testaceis, ac crustaceis, possunt etiam fieri Cerata ex his pulueribus cum oleo myrthino, aut melino, siue cynthoneorũ, hunc in modum.

Recipe pumic. pulueris.

Santal rub.

Ro. rub. an. drach. i.

Ol. myrth.

de cyton. au. vnc. i. sem.

Cera. q. s.

M. f. Cerat.

Hi pulueres, & cerata adhibentur commissurę coronali, ex quibus pulueribus possunt etiam fieri sacculi, quinimo idem pulueres possunt administrari pro suffumigiis, siue inuratur, siue bulliant in aq. ros. præcipue verò santali, rosæ, nenuphar.

Balacū. phae. & alia, quæ odorem in se continent. Quod spectat ad totum corpus, disputatio est de Balneo, an in Destillatione conveniat, nec ne: hæc quoq; res sic facile componitur: in pleno corpore cum Destillatione adhuc cruda, balneum nunquam convenire, fundit enim crudos humores, quæ deinde in affectum Cerebrum statim cōflunt: hæc enim est doctrina Gal. 12. meth. c. 3. quam confirmat 8. meth. 3; ubi in cruda Destillatione semper balneum prohibet: Vbi Catarrhus sit coctus, vel quando corpus non fuerit plenum pravis excrementis, tū id balneum administratur nam habet vim reuelliendi à capite, & digerendi insensibiliter propterea Gal. 5. meth. c. 13. in Muliere illa Romana statim ab initio pro reuulsio, ne usus est balneo:

Local. Quod dico de Balneo, dico etiam de Localib. illi parti administrandis, ex qua fiat fluxio in Cerebrum: etenim ubi corpus impurum fuerit, neq; frigida conveniunt, quæ humorem indurant, neque calida, quæ fundunt, & colligunt.

Superfunt remedia proponenda in Catarrho Calido ac Tenui, descēdente ad fauces, arteriam quæ sunt incrassantia, & intercipientia; sed de his dicā in curatione illorum affectuum, quos producit hæc Destillatio. Moneo autem vos his ipsis remediis posse etiam corrigi intemperiem partium solidarum, à qua generatur, & augetur; propterea de hac re nihil dicam amplius.

Transco ad materiam Frigidam, in qua illud primo querendum, quod pertinet ad chirurgicum fontem, & ad sectam venam, sed antequam hoc faciam, dicam prius de Victu Catarrho Calido.

Ratio victus in Catarrho Calido.

IN Catarrho Calido victus ratio omnium maxime est necessaria, & primò quod pertinet ad Aerem, eadem est ratio, quæ & balnei, seu lotionis, aut stillicidii capitis, ut scilicet ubi descendit Catarrhus ad thoracem, aer frigidus, & borealis fugiatur, quæ tamen absque hac suspitione defluxus calidam Cerebri intemperiem sanat.

Somnus quicquid sentiat Salernitanorum Schola, in Catarrho Calido debet esse prolixior: primū enim somnus refrigerat, Tenuem Catarrhum incrassat, & concoquit: idcirco à fluxione prohibet exercitatio partium infernarum omnium maxime est necessaria.

Nam propter hanc causam textores, & textices minùs abundāt Catarrhis, quod pedes frequenter exerceant. Dicebat Hip. 4. in 6. Epid. 23. morbis à pituita Venerem prodesse: quæ sententia sane Catarrhis Calidis est adaptanda: quamvis enim Gale, moderatam Venerem iugis etiam catarrhis prodesse existimet, calefacto corpore à concubitu Venero: Ego tamen puto Hippocratis sententiam de Catarrhis Calidis potissimum esse intelligendam. Alius lubrica perpetuū seruetur, aut pilulis familiaribus, quales sūt pilule de tribus cū rhabarbaro, aut clysteribus actionibus, cum reuulsio est necessaria, id quod fecit Galan casu illius Romanæ 3. meth. cap. 13. propterea ridendi

A sunt quidam Recentiores, qui putant ex acerbis clysteribus materiam duci ad pulmones.

Quòd ad cibum, & potum, videntur omnes convenire, tenuem victum destillationibus omni- bus comperere: quæ tamen sententia vniuersaliter non est intelligenda: tenuis victus in principis Destillationum est quidem accommodatissimus, sed euacuato iam corpore & medicamentis & sanguinis missione, & inedia septem vel octo dierū, non modò frustra, sed & cum periculo tenuis victus iniungitur, & ratio est, quia calor naturalis ex defectu alimenti marcescit: idcirco cōditio non potest fieri, accedit aliud incommodum in Catarrhis Calidis bilem fieri magis acutam, & mobilem confluere ad ventriculum, & caput ipsum replere: & hoc est, quod aliquando Gal. scripsit lib. de venæ sect. aduers. Erasist. ca. 9. mediam caput replere, itaq; post septimam diem consistant à victu admodum tenui.

Sit autem cibus in tenui Destillatione succus prisanæ, oryza, alieæ, ferculum ex farina amyli; Conceduntur in hoc casu nuclei pinus, amygdalæ recentes, siue cū saccato, siue sine saccato: quam enim amydalæ caput repleant aliquantulum, in tenui destillatione potissimum cum saccato oleosam habent substantiam, qua incrassat. Debet autem cibus assumi copiosior in prandio, quàm in cœna, ut voluit Conciliat. differ. 121. quicquid in oppositum sentiat Matth. Curtius & Oddus de Oddis in quæst. quam facit de prandio & cœna. In fine mensæ vtantur fructibus ad strictioris aut pyro, aut pomis, aut cotoneis, aut dicyonitis, & porus sit aut aqua, hord. cum coriandris addito iulep. violato, aut vinum modicè adstringens, & pauciferum. Post cœnam verò vtantur hoc poluete ad drach. sem.

Recipe Jantal rub.

Rosar. rub.) an; drach. 3.

Corian. præ.)

Penid. pulveriz. aut

Saccar. sin. ad pond. omn. M.

Hæc est Victus ratio in Catarrho Calido.

Curatio Catarrhi Frigidi.

IN Destillatione Frigida aliquando à venæ sectione incipiendum est, quando scilicet hic humor habeat connexam plenitudinem siue communem, siue determinatam, atq; eam quidem notam, ac spuriam id verò faciendum, quando materia decumbat in pulmonem, & thoracem, ut propterea vel suffocationis, vel Peripneumonice, vel spurie pleuritidis, aut circa fauces & laryngē Anginæ suspitionem inferat In Cacoehymia semper à venæ sectione abstinendum, & variis reuulsionibus agendum, frictionibus, ligaturis cucurbitulis, sinapismis, vesicantibus, cauteriis lotionibus pedum, aqua calente, vulgus non inutiliter in his casibus plantas pedum succo alii confricasse consuevit.

Circa hæc omnia illud observandum, quod notavi etiam in Catarrho Calido, ut scilicet cum per essentiam, & primariò in capite generetur, reuulsiones, & deriuationes fiant parubus superioribus,

brachiis, occipiti, sincipiti, nam si infernae partes irriterentur, Destillatio promptius in thoracem descendit, contra verò ubi ascendit Catarrhus vel à toto, vel partibus infernis, congrua sunt reuulbiones circa crura, siue sint cucurbitula scarificata, siue non, siue cauteria, siue alia. Nō disputabo hoc in loco, quod alias disputatum est de Dolore Capitis, an in Catarrho frigido conueniant cauteria vel in sincipite, vel in occipite, Recurratis ad eum locum.

Quod pertinet ad Pharmaciā, si Frigida Destillatio sit Tenuis, alius sic leniatur.

Recipe stor. cass. nou. extr.

Mann. Elect. an. drach. vi.

sem. anis. contus. drach. sem.

M. & sine sacc. f. bol.

Si autem potum voluerint,

Recipe mann. el. ꝛnc. iij.

Inr. alterat. cum sem. anis. q. s.

M. & f. pot.

Bolus accipitur duabus, potio autem quantior horis ante cibum.

Quod si fuerit crassa materia, in Bolo

Recipe Eleo. lenit. ꝛnc. i.

Dicath. ꝛnc. sem.

spec. hier. drach. i.

M. & cum sacc. f. bo.

In potione

Recipe Mellis rosati solut.

Aut Mell. viol. sol. ꝛnc. v.

Aquar. betonice

Aut salua q. s. M.

Tenuis humor Frigidus sic preparatur;

Recipe syrup. de beton.

de menth.

de absynth. an. ꝛn sem.

Decoct. menth.

spica, Squinantb.

Acor. Cyper ꝛnc. iij. M.

Crassum vero humorem sic preparabitur:

Recipe Oxym. simpl.

syrup bizant. cum acet.

de beton. an. ꝛnc. sem.

Decoct. puleg.

Calament.

Orig. salua

Stachad ꝛnc. iij.

M. pro syrup.

Preparatos humores licebit hoc medicamentum purgare:

Recipe pil. coch. drach. i.

de agar. Mesu. drach. sem.

Cum aq. beton. reform. pil. v.

Aut hoc Bolo

Recipe diaphan. ꝛnc. sem.

Elect. lenit. drach. vi.

spec. hier. drach. i.

M. & cum sacc. f. bol.

In potione sic:

Recipe Agar. trochisc. drach. i.

infunda in oxym. sim. f. a.

Deinde adde mell. ros. sol. ꝛnc. iij.

Aq. beton. q. s.

M. & f. pot.

Repetendæ erunt tales purgationes, & preparationes pro iudicio Medici aut bis, aut tertio: Interim capitis sollicitudo est habenda, ut potissimum per nares purgetur, quando materia ad fauces, vel thoracem descendat, aut per ipsum os, si naribus malum aliquod inferat. De modo purgandi per has partes nihil dico, quia dictum est in tractatu de Dolore Capitis.

Quod pertinet ad Alterantia & humorem frigidum, & intemperiem partis solidæ, quæ debent esse calida, & sicca tã interna, quàm externa, hæc magna ex parte fuerit proposita superius, nunc itaq; aliqua proponam singularia aduersus veram quæ Destillationem siue Tenuem, siue Crassam, præsupponens nota esse alia omnia remedia, aquas scilicet thermal. decocta ligni, & salis, & chinæ & sassafras, conseruas calidas, magnos antidotos stillicida, pulueres, sinapismos, & alia id genus proposita.

In Tenui itaq; Destillatione drach. i. huius pulueris pauciori exhibita possi cœnam mixticè confecti.

Recipe Thuris

Olibani

Myrrh.

Styrac. an. drach. i.

Ireos)

Spica) an. ꝛnc. sem.

Acori)

Saccar. fin. ad pond. omn. M.

Detur aut in vino aliquo odorato, aut in iure alterato cum spica, cypero, mentha, & betonica.

Si pulvis non sit preparatus, accipite grana iij, aut iij, olibani, quæ possint esse ponderis drach. i. & integra deuorentur.

In Catarrho Crasso poterit confici talis pulvis

Recipe Pulegii

Mauran.

Stachado s. an. drach. ii.

Cinamom.

Caryoph. an. drach. i.

Sac. ad pond. omn. M.

Detur drach. i. consimiliter ex vino.

Victus Ratio.

His addenda est victus ratio, de qua pauca super sunt dicenda: possunt enim colligi ex dictis in superiori lectione, allua tantum moneo, in Catarrho Frigido tenuem victum vsque ad tertiam diem mirabiliter conferre, & compellere quasiq; ilico extinguere imminentes Destillationes, ut propterea scribat Heurnius, se dum abstinuisset tri-duo à potione, destillationem statim sanasse. Ceterum ubi in longius tempus protrahitur tenuis victus ratio, non conuenit: propterea extat Hipp. præceptum: Tenuis Victus in longis morbis semper periculosus.

Itaque quicquid alii sentiant, consulo, ut non tantum moderatus præbeatur cibus, sed etiam post incrementum potus vini concedatur: nam in principio, et dixi, abstinencia à potu maximè est vitis, in augmento mulæ potus conuenit: circa statum vinum concedatur.

*Curatio Affectuum, quos parit
Destillatio.*

Venio ad curandos, qui ex Destillatione, con-
surgunt, morbos, & affectus.

Destillatio, ut dixi, decubitat in Dentes, in Gin-
giuas, in Columellam, in Fauces, & facit Dentium
Mobilitatem Dolorem, Gingivarum, inflammatio-
nes, & abscessus, Faucium Ulcera, Columellæ Proci-
dendum. Ad hæc omnia mala sic occurrendum est.

*Ad Den-
tium Mo-
bilitatē.* Primū quidem si Dentes sint Mobiles præ
nimia gingivarum laxitate, ex humiditate, con-
uenit hæc collutio:

Recipe Salvia.

Rosmar. an. M. sem.

Cyper. Ireos an. drach. ii.

Tbur Myrrh.

Alum. scissil. an. drach. i.

Bull. in s. q. vin. nig. generos. subauster. vsq; ad
consumpt. mediet. f. expres. f. collutio.

Post collutionem in spargatur gingivæ pulve-
re facto ex eodē thure, myrrha, & alumine simul
commistis: & quia in hac laxitate, & humiditate
plerumque unus dens alios supereminet, ut inter
mandendum maximum sequatur incommodum
dens, qui supereminet, lima est atterendus, mo-
dum videatis ex Gal. 5. de comp. per loc. c. 3.

*Ad Do-
lorem Den-
tium.* Ad Dolorem Dentium ex causa calida quan-
quam multa probetur, ut decoctum semperuiui
parietar. portulac. nihil præstantius decocto folio-
rum hyoscyami, aut in acet. solo, aut in aceto mi-
sto cum aliqua portione succi semperuiui. hoc
autem perpetuo memorie mandandum, in om-
nibus Dentium Doloribus acetum convenire: **D**
Nam adiuvat medicamenti penetrationem.

Gingivis dolentibus, abstinendum ab aceto.

Si dolor fiat à causa frigida, in aceto bulliant ra-
dices pyret. & acoris, aut salvia & rosmar. radix.
etiā tithymalli cocta in cod. aceto mirifice valet.

Quod si dolor sit ex vermibus, fiat collutio ex
aceto scyllitico, aut ex aceto, in quo bullierint
scylla, scordium, dictamnus creucus. Impositu-
ra est quorundam circumforaneorum, qui acci-
piunt hyoscyamum, & ex eo suffumigium den-
tibus faciunt, ex quo suffumigium propter herbæ
huius proprietatem quasi vermiculi videntur
cadere ex ore; & tunc isti dicunt, se ex usu huius
herbæ sustulisse vermes, iuvat quidem hæc suffu-
migatio ad dolores ex fluxione calida; sed non
educit vermes.

Putant quidam, hoc genus linimenti vel cera-
ti dentibus apposti omnem dolorem sanare.

Recipe Gallar.

Alumio. an. drach. i.

picis communis q. s. M.

Ego verò in maximis Dentium Doloribus ac **F**
Gingivarum, nihil præstantius sum expertus hoc
emplastro, maxillæ apposto:

Recipe farin. bord.

Sabar. an. vnc. ij.

Ol. ros. compl.

amyg. dul. an. drach. i. sem.

succ. semperui, vnc. i. sem.

Lactis q. s. M. f. Emplast.

A Leuiiores gingivarum inflammationes leuissimo
etiam negotio superantur, quandoquidem sola
caryca inuersa inflammationi imposita aut dige-
runtur, aut suppurantur, & disrupto abscessu sola
aqua hordei mell. ros. commista promptè vlcuscu-
lum sanat: sed ubi inflammatio carnis excrese-
ntiam hauberit, quam Parulidem vocant, ægrè ad
modum curatur: & si quidem caro fuerit pau-
ca & mollis, aut fortibus siccantibus, aut causti-
cis curatur. Fortia erunt siccantia pulvis alumi-
nis, misy. aut sory: vel oleo ex calcantho, aut ex
sulphure caro illa vsq; quo sanatur & exsiccatur,
erit tangenda: ubi verò multum creuerit, si gra-
le habuerit pendiculum, siue appendicem, ligatio-
ne curatur filo ex seta concinnato paulatim con-
stricto, deinde ipsi carni inaspero puluere aut jam
proposito, aut herbæ sabinae. muniantur autem
circumstantes partes.

Ad Abscessus Gingivarum majores, quos *Ad Ab-
cessus
Gingiva-
rum.*
vocat Epulides, fortibus etiam opus est auxiliis
nam plerumq; corumpitur os, & mali origo ortū
trahit ex radice alicujus dentis, & fit fistula, quæ
mandibulam totam solet perforare: In quo casu
numquam perficitur curatio, nisi auulsione den-
tis corrosi, igni actuali foramini ipsius abscessus
adhibito. Ego quendam curavi frequenti usu
olei ex calcantho: nam tota corrupta caro gin-
giuæ huius olei usu, & lotionum, quibus vrebatur
post oleum, fuit sepeata, & os mandibulæ cor-
ruptum magnitudinis auellanae sponte exiit: erit
autem decoctio talis.

Recipe Ligni Ind. vnc. i.

Scabios. Plantag.

Pilosel. Virg. an. an. M. i.

Folior. ol. M. sem.

Alumin drach. ii.

Bull. in s. q. aqu. usque ad tertiam partem, &
f. colat. in singulis vnc. iij. adde mell. ros. simp.
vnc. sem.

Ad Ulcera linguæ Oris, & Faucium superficia-
lia, quæ vocant Aphthas, valent pulueres ros. *Ad Ul-
cera ling-
Oris, &
Fauc.*
myrrill. cortic granat. chamatum & omnium co-
charum. Exsiccant enim sine morbo: valet etiam
lino facta ex decocto hordei, plantaginis rosarū,
acaciæ myrrillorum, sed nihil præstantius hac de-
coctione, quæ est experta.

Recipe Summitat. rubi,

Antera an. drach. i.

Myrrill.

Rosar. rub. an. drach. ii.

Succ. plantag. vnc. iij.

Bull. hæc omnia in s. q. aquæ vsq; ad medietate-
tis consumpt. facta colatura viamini pro collutio-
ne oris.

Si quis voluerit addere aut diamoron, aut dia-
nucum, hoc etiam maxime confert. Illud etiam
moneo in istis vlcibus recentibus præsentaneū
esse remedium & auxilium omphaciū, siue agre-
stam, ut vulgo vocant, pro gargarismate: In No-
mis, seu in vlcibus Depascentibus statim ascē-
dendum ad ol. ex sulph. ex calcantho, ex antimo-
nio, ad aquā ex Talpa, aut ad illam qua videntur
autifabri pro separandis metallis: Sed quia hæc
aqua est fortissima, accipias huius vnc. j. aqu. pla-
tagin.

ragin. vnc. v. & locus tantum ulceratus leuiter rā- A
gatur gossypio madefacto, styloque imposito, de-
inde sequatur lous aut ex aqua butdei, aut ex se-
ro lactis, aut ex aqua plantaginis. Ego autem nil
præstantius inueni aqua vitg. aureæ, cuius miros

Ad Columellam
Precidentem

Ad Columellam Procidentem, si prociderit ex
nimia humiditate, confert aut gargarisma ex au-
stero vino, in quo bullierit spica, acorus, oliban-
mastix, & thus, aut (quod vulgo faciunt) Reci-
pite drach. i. piper. pulueriz. aut pyrettri spatulæ,
aut cochleari impositi, & Columellā hoc ipso pul-
uere pipetis, aut pyrettri atollatis: hoc enim bis,
aut ter facta, statim exsiccatur. Quod si humores
sint calidi, loco horum Recip. puluerem aut ros.
aut coit gran. Vbi vbiq; adeo sit elongata, vt de
glutitionem impediatur, præcidenda est, nisi inflam-
matio, aut nigredo insignis adfit, sed potius extre-
mitas mollis & laxa fuerit. Modum præcidendi
leg. apud Paul. lib. 6. c. 12. & ap. Ambr. Patrum
lib. 7. lux magn. chirurg. c. 7.

Ad Raucedinem

Ad Raucedinem ex multa materia humida si
ne calore nihil conducit magis diabolibano voca-
to, aut formulam talem vos ipsi componatis:

Recipe Thur. Oliban. an. drach. i.

Mast. drach. i. sem.

Succi glycyrrhizæ drach. j.

Farin. Erui, aut Orobi, aut fabar.

drach. iiii. Mell. q. s.

M. & f. formulæ, quæ desiccantur in umbra &
detineantur in ore. Valet quoq; succus glycyrrhi-
zæ, aut radix recens: sicut in Raucedine ex caus
facalida valet diatrachum frigidum, diacodii
diaperidium, Saccharum candidum, violæ, aut hæc D
compositio:

Recipe succi glycyrrin. drach. ii.

Farina Amyli, Tragacant. an. drach. i.

Penidiorum, Sacc. cand. viol. an.
drach. i. sem.

Syr. de papau. q. s. M. & f. formulæ
modo dictæ, idest, quæ exsiccantur in umbra, de-
tineantur in ore.

Postularet iam hic locus, vt vobis proponere
curationem inflammationis Columellæ, & Tonsil-
larum, sed quia hæc curatio non differt à cura-
tione Anginæ, ideo de Angina primò aliqua no-
bis sunt dicenda.

DE ANGINA.

Cap. XX.

Angina, quam Arabes Squinantiam vocant,
duplèiter apud Galenum accipitur, pro-
priè scilicet & improprie: loquemur primò de pro-
pria acceptione, deinde de impropria. Angina pro-
pria accepta est inflammatio faucium, aut gutturis.

Per inflammationem intelligo tumorem vel ex
sanguine sincero, vel ex bile, vel pituita, vel me-
lancholia: Nomine Faucium illam intelligo
partem, quam Græci φάρυγξ vocant, & superia-
cer ipsi gulæ, & gutturi: Intelligo etiam nomi-
ne Faucium musculos deglutitioni inservientes.
Nomine autem Gutturis cum Galeno 4. aph. 34.
intelligo Laryngē ipsam, caput asperæ arteriæ: In
his igitur locis dum sit inflammatio, potest fieri

aut in musculis Internis, vel Externis, & cum fue-
rit in Internis prius gutturis, facit illam Anginæ
speciem, quam propriè vocant κρυέχνη: si fue-
rit in Externis, vocant Παπαρυέχνη: vbi verò
inflammanur Interiores musculi faucium, & gu-
læ vocant Συρέχνη: vbi exteriores, Παπαρυ-
έχνη, dicunt: hanc distinctionem habetis apud
Galen. 4. aph. 34. quam accepit Trallian. lib. 4. c. 1.
& Paul. lib. 3. cap. (24.) 27.

Causæ.

Materia inflammationis aut fluit ex capite
aliquando verò vel ex iecore, vel ex vtero
vel toto corpore: propterea dicebat Gal. 2. aph.
20. aliquando naturam humorum superfluitatē
in corpore contentam aut in cutem, aut in fauces
deponere. & si quidem materia fuerit biliosa, fa-
cit potissimum inflammationem gutturis: si fue-
rit sanguis pituitosus, facit inflammationem fau-
cium (gulæ) Hoc colligit ex Hip. & Gal. 4. acut.
30. 31. & seqq. atque ideo scribit idem Galenus
in com. 20. tertiar. part. Vere fieri potissimū An-
ginas ex sanguine pituitoso, collecta pituita tē-
pore hyemis: Autumno fiunt Anginæ potius ex
sanguine bilioso, aucto tempore æstatis. Hæc de
Angina propriè accepta.

De impropria angina.

Impropria angina est impedita deglutitio, aut
respiratio cū periculo strangulationis, sed si-
ne inflammatione: fit autem aliquando ex Luxa-
tione primæ, aut secundæ vertebræ cervicis ad in-
teriora, vel ad latera, vt docuit Hipp. 2. Ep. v. & cō-
firmavit Galenus 4. de loc. aff. 3. aliquando fit ex
materia pituitosa, crassa, & viscida, imbuente tu-
nicam interiorem Laryngis: quandoque verò hoc
ipsum fit ex siccitate eiusdem tunice, aut muscu-
lorum, has causas proposuit Galen. 3. aph. 34.

Signa.

Signa huius affectus sunt satis conspicua. Nam
si quis aut deuorare cibum non possit, aut de-
uoret cum maxtma difficultate, ita vt assumpta
per nates excernantur, difficilis sit spiratio, dice-
mus hunc Angina laborare.

Sed causæ, & loci affecti distinguendi. Præte-
rea etiam Angina Propria, & Impropria.

Igitur si Interiores Musculi Laryngis sint affe-
cti, nullo appatente in faucibus tumore, aut rubo-
re, egri strangulantur, neq; respirare possunt, nisi
erecta ceruice, febris est acuta, & supis maxima, lin-
guæ ariditas. Nam hæc Angina, vt dixi, ex humo-
ribus fit biliosis, & propterea autumno potissimū
superuenit, quod si Exteriores Musculi Laryngis
sint affecti, nihil quidem apparet in faucibus, re-
spiratio est minùs difficilis, & quandoque rubor
apparet circa pectus, & gulam, propter illos qua-
tuor musculos communes, qui in Laryngem in-
seruntur.

Vbi fauces, & musculi interiores gulæ afficiū-
tur tumor, & rubor circa fauces apparet, degluti-

tio omnium maximè læditur, lingua induratur, in crassatur, inuertitur, & extra os apparet, sicut canibus, liuida, nigra, cum venis admodum tumidis & inflatis, neq; tamen extrinsecus tumor aut rubor apparet.

In Musculis autem Externis affectis tumor & rubor est circa collum, aliquando vsq; adeo magnus est hic tumor, vt trahat in consensum ligamenta vertebrarum, & illis intro tractis sit luxatio.

Causam Anginæ sic distinguētis: si fuerit biliosa, autumnō potissimum succedit in corporib. B biliosis, tumor in faucibus nullus apparet, & tamē strangulatio est vehementissima, dolor admodum intensus, sensus caliditatis maximus, febris insignis, ardentissima. Vbi sit sanguis pituitosus, apparet tumor, sit tempore hyemis, aut veris in constitutione humida, corpore pituitoso, tussis ad est, & exspitio materiæ pituitosæ. His signis cognosceris Anginam Propriam.

Nam Improperia distinguētur à Propria per febrem, nā Improperia Angina aut febre caret, aut si quæ est febris, præcedit Anginam, non subsequitur.

Præterea Angina, quæ sit ex Luxatione, sequitur aut casum, aut percussionem circa vertebrae.

Ea, quæ sit ex Crasso Catarrho, habet Respirationem cum sonitu, quasi cum stertore, & si quis vtatur medicamento incidente, statim subleuatur patiens.

Prognostica.

E Stromnis Angina non modò periculosus affectus, sed etiam peracutus, imò exactè peracutus: nam vt dicebat Hipp. 3. progn. 16. illa Angina, in qua nullus apparet circa fauces tumor, & tamen suffocationis infert. periculum, interficit prima die, quandoque secunda, aut tertia, ad summū quarta: itaque hæc omnium est lethalissima.

Post illam sequitur Angina, in qua inflammatur musculus degluttoni inservientes, qui interiores sunt: nam isti producant illam Anginam, in qua lingua induratur, in crassatur, inuertitur, & inuoluntariè extra os emittitur.

Mitius habent illi, quibus inflammatio est in musculis externis, aut quibus Tonsillæ tantum tumida sunt.

Consuevit hic morbus desinere aut per resolutionem aut per transmutationem, aut per suppurationem: & cum sit transmutatio debet fieri ad exteriora.

Propterea dicebat Hip. & 6. aph. 3. 7. & 7. aph. 49. In Angina tumore in collo apparente; aut in pectore bonum esse signum: quia materia permutat ad exteriora. Ceterum aliquando tumor & rubor extra apparet, non ex permutatione, sed ex propagatione: quia scilicet tanta est portio materię, vt impleat internos, & Externos musculos. i. de circo refert Hip. 2. Epid. sect. 2. mulierem quandam cum hoc tumore, & rubore externo quarta die obiisse.

Vbi verò suppuratur, disrupto abscessu, sanies aut diffuit per os; & hic est locus omnium conue-

nientissimus: quandoque verò potest diffuere in thoracem, quando scilicet inflammatio sit in musculis internis laryngis. nā si suppuretur, vix fieri potest, quin Pus descendat in Pulmones, & thoracem, in quo casu Hip. 5. aphor. 10. scribit, subscui Empyema, siue Collectionem Puris in Thorace: aliquando descendit in ventriculum, quando inflammatio est in musculis internis gulæ; nonnunquam colligitur sanies in illo spatio inani, quod est inter arteriam, & oesophagum, quando inflammatio est in musculis exterioribus gulæ: Casum talem vidi iam tres menses in quodam patiente, qui obiit.

Curatio.

In curatione Anginæ concordēs omnes volunt initium fieri à sectione venæ, quia in vitis nulla est difficultas de loco secandi venam. Certum est enim cum robustiores fuerint, secandam esse primò cephalicam vnus lateris, deinde eodē die cephalicam alterius; & si res vrgeat, aperienda quoque sunt venæ sub lingua: si morbus ducatur in sequenti die, sed cum inflammatio non cedit, post illas duas venarum sectiones, licet quoque reuulsionis gratia hirudines applicare venis sedalibus, & cucurbitulas affigere, ita vt non mittatur sanguis ad vncias, sed in pluribus missionibus ad libras.

Memini me Venetiis cuidam spatio duarū dierum misisse 3 o. vnc. Imminebat. n. illi periculum Suffocationis.

Sed si occurrat Mulier Anginosa, cui menses deficient, aut quæ menses propediè expectet, vel actu habeat, quid tunc agendum? Nolo vos imitari illos, qui secant superiores: in huiusmodi casu statim secanda sunt inferiores: hoc docet Trallib. 4. c. 1. docet ratio; nam ex huiusmodi missione non tantum fit reuulsio, verum etiam fit naturalis purgationiseductio, & consuetæ, quæ maximè inflammationem iuuat.

Quod si Strangulatio negotium faciat, sectis venis internis, tuto potestis aperire venas sub lingua, nam hæc missio non retrahit ab vtero, non trahit a toto corpore, sed partem inflammatam euacuat: Ita agendum circa Sanguinis missionem.

Quod pertinet ad alias reuulsiones, omnes re. tandæ sunt, frictions, ligaturæ, cucurbitulæ non scarificatæ, balneum aquæ calidæ, clysteres acres, præcipuè quando Angina ortum ducat ex sanguine pituitoso.

Quod pertinet ad Pharmaciā, dum procucuranda Angina ad pharmaciā, transeo, curationem distribuam in duas partes præcipuas. Prima enim versabitur circa Anginam Propriè acceptā: Secunda circa Improperiam, rursum autem in Angina Propriè accepta alia sunt instituenda, vbi materia fuerit biliosa, alia vbi sanguis syncerus, alia verò vbi sanguis crassus, & pituitosus.

In Biliosa Angina euacuatio tentari debet aut per syrupum violatum, aut syrupum ros. solut. aut cassiam, aut diaprunum, & cassia, ac diaprunis redigi debent in formam misturæ mollis, vel cum syr. violato, vel cū syr. de nenuphare, (nymphæa) aut de papauere, & quanquam paulatim medicamentum

Vena se-
Bio.

Hirudi-
nes cucur-
bitur.

In de-
fect. Me-
sue.

Friß. li.
gat. cu-
carbit,
c.

Pharma-
cin.

In Angin-
Bilios.

mentum acceperint, hoc non modò non oberit; **A**imò magis loco inflammato proderit: Ceterum quia aliquando locus est vsq; adeo angustus , vt neq; syrup. ros. neq; cass. ingredi possint, tunc Sero vitendum admisto diagrydio: Sint autem diagrydij gr. s. feri prap. lib. j.

Reprimē Interim internis Reprimētibz vtendū: sine
lia. reprimētia aut aqua plantaginis, aut portulacæ,
aut semperuiui, vel decoctio rubi, mali corii, ba-
laustiorum, galiarum, rosarum, antea: his aquis,
vel decoctis admisceri possunt succi aut ribes, aut
agresta, aut vinum granatorum, aut succus mori, B
aut sorborum, aut mespilorum, habetis quoque
in officinis paratas confectioes ex moris (diamo-
ron vocant) ex corticibus nucum (dianucum di-
cunt) Istę decoctis, aut aquis admisceri possunt,
detineantur in Faucibus absque gargarismate:
nam gargarisma ducit humores ad locum affe-
ctum; conuenit autem parare misturam, quam
semper in ore detineant, ad dolorem demulcen-
dum, ad acrimoniam bilis corrigendā, & fluxio-
nem cohibendam. Mistura sit talis.

Recipe mucilag. sem. citru. ꝑnc. ii.
emuls. femin. papau. alb. ꝑnc. i.
Semin. plantag.
Amyli an drach. ij.
Pulveris antberg.
rosar. rubear. an drach. i. M.

Extrinf. Extrinsecus ex communi omnium sententia Anodyna, & Laxantia continentur, ideoque aut lana luccida utendum oleo amygd.imbuta, aut hoc Linimento, quod mihi est familiare.

Recipe stor cass nou extr vnc. iij.
Ol. amygd. dule.
Buty. recent. an. vnc. i.
Mucilag. sem. malu. vnc. i. sem.
M. f. Linimentum.

Lintei hoc medicamento imbuti tepidi collo
apponantur, & sæpius mutantur.

In augmento addere oportet aliqua D gerentia; Intrinsecus passulas, liquiritiam: Extrinsecus puluerem nidi hirundinis prædicto linimento commissum.

Vbi verò iam inflammatio accedat ad statum dimittenda sunt reprimentia, & loco illorum vni-
mini decocto carycarum, siue siccum pinguium,
passularum, liquiritiæ, scœnogræci, hordei, & capill
vener.

Extrinfecus hac tempore conuenit hoc empla-
strum.

Recipe Nidi hirund. cremat. & pulv. vnc. i.
flor cass. cou. extr. vnc. ii.
Sterc. canin. alb. exsicc. & pulv. vnc. sem
Sapa q. s. M.

Quod si Angina fuerit Sanguinea, conuenit
cum curatione bilioſæ in omnibus, hoc excepto, F
quod aliquando tendit ad Suppurationem, itaq;
vbi Suppuratio prohiberi non poſſit, ſtatim eſt
tentanda.

Ad An- Ad Suppurationem nihil est præstantius hoc
emplastro.

*Recipe nidum hirundinis, & coque
in f. q. aq. f. colat.*

Recipe Pareclaria, Maluarum,

Althea an. M. ii.

Contund.& his Adde

Farin sænngræc.

sem in. len.

Ferment veter. an. vnc. iij.

Визр. recent.

Axung suill. un. etc. 71:

Pædih. decoct. q. s.

M.f. Emplast. quod apponitur Gule.

Intrinscus licet frequenter præbere hoc idem decoctum ex malua, althæa, & superius dictis.

Facta Suppuratione, disruptendus est quam *disruptio*
primùm abscessus. Disruptio fit vel medicamen- *ab secessu*
tis, vel manu chirurgica.

Medicamentum intrinsecus est decoct. facta ex nitro, sale Ammoniaco, sulphure, coctis in aqua: Extrinsecus conducit emplastrum iam propositum, cui addatur aut simus columbinus, aut ipse pulvis, seu cinis nudi hirundinum.

Si non succedat, aut digitis, aut scalpello, aut
candela cerea butyro illita abscessus est disrum-
pendus.

C Dum diffrumpitur, maneant patientes aperto ore, & capite prono, ne pus descendat in thoracem, aut ventriculum: Itaque verò os abluiatur aq. hord. cum melle, aut mulla, quibus deinde addant aliqua exsiccantia, de quibus infra dicam.

In Angina Pituitosa purgatio corporis debet fieri per medicamenta pituitam educentia; sed quæ sint parvæ molis.

Mirot eos, qui holoſ proponunt, hieram, & aliam in hiſ caſibus opus eſt Trochiſcis alhandal, accipiantur gran. v. aur. vj. trochiſcorum alhandal, & miſceantur vel cum mell. roſ. vel violato, vel cum ſapa, aut cum modica caſſia, vel in iute. Paulus in hoc caſu ſummopere laudat clyſteres acres qui mihi quoque probantur.

Non sunt audiendi qui in his casibus accipiunt seu laudant Vomitoria: nam exasperant locum Vomito affectum. Circa usum Repentumum aliqua est *ria impro* diversitas in hac cur. et conspectu Angliæ Bil- *bantur.* otæ. licet enim in hoc casu vii aceto, aut posca, in qua incoxerit palmula, mastix, hordeum, & roiz.

Non accipio Vidi Vidijsententiam, qui ad reprimendum vitur diabelasfar, seu medicamento ex ruta syluestris, cuius descriptionem habetis apud: Trall. lib.4. ca. 1. est enim medicamentum, quod potius digerit, quam reprimat cum sit compositum ex calidis medicamentis, itaque conuenit potius in augmento, & in statu, quam in principio. Ceterum si illud medicamentum adhibeatur, vos poteritis tempore status ad digerendam materiam intrinsecus vi decocto ex serpillo, radice reos, mentastro, saluia.

Rhales noster, & alii, vt Aet. & Paul. ascendūt
ad sinapim, ad piper, ad pyrettrum.

Ego experientia comprobaui, quod accepta
meis aui, & atauis, hinc puluere intrinsecus ac-
ceptum ad digerendum mirifice facit.

Recipe Sileris montani pulueriz. drach. ii.

Hic pulvis potest dari aut cum decocto iam
proposito, aut cum melle.

Ego ubi alius sit Republica, permisco potuerem
cum

cum cassia, & sic alius mouetur, & materia in-
flammationis digeritur. Insufflantur quoque pul-
ueres per canalem in os, & fauces, & cum varii
possint esse pulueres, hic mihi, & senioribus me-
s fuit probatus, qui fuit Carduo Benedicto in has
partes insufflato.

Ceterum Antiquiores valde diligētes in sordi-
dis proponendis medicamentis in stercore non
modo canino, sed etiam lupino, & humano, col-
lecto tamen ex puero, qui per triduum lupinis
nutriatur: sed hæc sordida non mihi placent: Ster-
cus caninum non improbo.

Ita agendum, ubi neque dolor multum vergeat,
neque suffocationis periculum.

In doloribus autē intensissimis instillare opor-
tet in aures oleum amygdalinū: Muniendæ sunt
fauces, & collum lanis in oleo, & lacte imbutis:
adhibendum linimentum ex mucilagine psyllii,
& malæ, vitellis ouorū, lacte, & oleo amygdalino.

Vbi Suffocatio vergeat, lupini decumbant, fre-
quētes adhibeantur cucurbitulæ in occipite. Scar-
rificationes fiant, & satis profunde in collo, pecto-
re, præcipue si tumor extrinsecus appareat, repe-
tatur venæ sectio sub lingua, aliquando conducit
ipsum quoque palatum, & fauces scarificare. His
non contentis, Asclepiades referentē Cælio
Aurel. 3. de acut. cap. de Angina deueniebat ad Se-
ctionem ipsius Tracheæ Arteriæ, quam Barbari
Medici Subcanationem vocant. Remedium est
periculosum, sed in manifesto vitæ discrimine sa-
tius est, ut dicebat Galen. 1. 6. meth. aliquid etiam
cum periculo agere, quam certæ mortis patientem
relinquere: Modū huius operationis legite apud
Paul. lib. 6. c. 3. & hæc de Angina propriè dicta.

De Angina Impropria.

Nam quantum ad Impropriam, quæ sit ex
humore pituitoso, curatur solo oxymelite
scyllitico, clysteribus acerbis, & medicamento
pituitam purgantes, siue sint pilulæ, siue boli pi-
tuitam educentes.

Anginaque sit ex Luxatione, pertine ad aliū
locum: sic quæ sit ex siccitate.

DE MORBIS, SYMPTOMATIBUSQUE; OCULORVM. Cap. XXI.

Oculorum affectus vsque adeo multiplices
sunt, ut pro illis integrè, & sigillatim petra-
standis integer annus vix lufficiat, deinceps ut om-
nes aliquo methodo percipiat, incipiam ab enu-
meratione symptomatum, a quibus methodo re-
solutoria transibo ad morbos.

Symptomata verò alia pertinet ad excremen-
ta immodice fluētia, in quo genere est Fluxus La-
crymarum, & Epiphora; Alia pertinent ad actio-
nes tactoria deprauiatas, ut est Dolor; Alia ad mo-
trices, in quo genere est Paralytis, Conuulsio, quæ
ἰσχυρισμός dicitur, & Agitatio quedam Oculi in-
uoluntaria, quam Græci ἰσχυρισμός Latini Equum
appellant, cuius affectus meminit Gal. 1. prorrh.
21. & auctor definit, Medicarum; Alia denique
pertinent ad visionem, quæ est oculi propria, siue

sit, imminuta, (immutata) siue ablata, aut deprauiata.

Ego hæc tempore (Auditores) nihil d'cam de
symptomatis actionis morticis, quandoquidem
de Paralyti & Conuulsione satis dictum est suo lo-
co, & ille affectus, quem ἰσχυρισμός appellant, sequi-
tur affectum musculorum, qui naturaliter imbe-
cilles sunt, ut docet Galen. locis citatis, & pro-
priè curatur, sicut Paralytis, & Conuulsio ex Re-
pletionē.

Symptomata verò actionis tactoria, & excre-
mentorum p.n. fluentiū redigam ad Ophthalmiā,
ut propriè tantum nobis inquirendi sint ocu-
lorum morbi ex symptomatis ad visionem spe-
ctantibus.

Huiusmodi morbi aut sunt circa facultatem,
aut circa præcipuum visionis instrumentum, aut
denique circa partes inferuentes præcipuo in-
strumento.

Morbi ad facultatē spectantes, sunt vel in ner-
uis Opticis vocatis, vel in Cerebro, vel in spiritu
animali. Morbi præcipui instrumenti pertinent
ad Crystallinum, ceteræ omnes partes inferiunt:
duo humores, Vitreus & Albugineus, ac Septem
Tunicæ omnibus notissimæ, quarum prior Adna-
ta seu coniunctiua vocata, multas patitur affe-
ctiones, quas in præsentia recensito, deinde ad
Palpebras, tum ad Corneam Tunicam, deinde ad
Vucā, seu Rhagoidē, aliasque partes me cōtinentā.

In hac Tunica Adnata sunt Taraxis, Ophthal-
mia, Chymosis, seu Chemosis, Hypophagma,
Hypopyon, & Pterygion. Isti omnes affectus si-
mul etiam cum eo affectu, quem Græci dicunt
Epiphoram, possunt redigi ad Ophthalmiam: qua
re, nunc, intelligetis.

Ταραξίς quæ Latinis dicitur Vacillatio, seu Cō-
turbatio, nil aliud est, quàm intemperies calida
coniunctiue cum aliquo rubore; sed sine tumo-
re; est quasi principium inflammationis; propte-
rea ortum ducit potius ex causis extrinsecis, in-
solatu, balneo calido, puluere, summo, festuca, aut
aliquo animale uio oculū ingrediente, aut ex portu
vini meracioris, aliisque causis externis. His caus-
is quandoque accedit vera inflammatio, quæ Ophthal-
mia dicitur, quando scilicet vel totum corpus,
vel caput humoribus, fuerit plenum, vel oculi
naturaliter imbecilles.

Hæc inflammatio est vel Legitima vel Spuria:
Legitima sit ex sanguine attracto, vel propter causam
extrinsecam, quæ causa extrinseca si fuerit
percutio, facit illū affectum, qui ὀφθαλμία appellatur,
Arabes vocant Tarfati, Latini dicunt
Punctum sanguinis, quia sanguis extra venatur,
& circa Coniunctiuam rubedo apparet.

Idipsum fit aliquando ex fluxione, siue fiat à
parte propter suppressam sanguinis ex naribus
excrecionem, siue à toto corpore, vel ex plenitu-
dine totius, vel ex retentis conuictis excretionibus.

Spuria sit ex Bilioso sanguine, quado huic bi-
li ichor biliosus, & acris misceatur, erumpunt la-
crymæ frequentissime, quæ palpebras erodunt: in
illius ruborem faciunt, atque etiam in angulis ocu-
lorum: & hic affectus Græcis propriè dicitur
ἰσχυρισμός.

Ophthalmia Vesicali.

Quod si inflammatio suppuratosa, quandoque est cum flatu connera, & fit Ophthalmia Vesicalis nuncupata: emulatur, n. vesica inflata; Aliquando habet fluxionem ichoris tenuis, insipidi sine vlla acrimonia: vocant hunc affectum Arabes Fluxum Lacrymarum.

Fit autem hæc fluxio eodem modo, quo omnis destillatio, aut per expressionem cerebri à frigido, aut per colliquationem à calido, aut expellente facultate naturalis substantiam ichorosam, in caput delatam.

Fit etiam aliquando Ophthalmia Melancholica, quæ indurata consuevit transire in illum affectum, quem Vnguem, seu Πτυάγιον Græci vocant; Quamuis hic affectus fit etiam sine vlla inflammatione: Sponte enim adnascitur hic panniculus, seu membrana, quæ in substantia & colore vnguem emulatur, & non modò Coniunctiuam, sed etiam quandoque Corneam occupat.

Inflammatio autem sanguinea, quæ legitima est, quandoque suppuratur; quandoque verò induratur. Vocant huiusmodi affectum Græci γέννησις, seu Suggillationem. Gal. 5. de comp. per loc. c. 1. vocat Hypopyon materiam contentam sub membrana venas inflantem absque suppuratione. Paul. lib. 3. inquit esse suppurationem.

Aliquando hæc inflammatio vique adeo augeatur, ut palpebras inuertat: neque enim claudere possumus (possunt) oculum; imò verò prætumore inuertuntur: Hunc affectum Græci vocant Χύμωσις, vel Χύμωσις.

Signa Ophthalmia. &c.

His sic declaratis, non modo patent causæ verum etiam magna ex parte horum affectionum signa.

Etenim Taraxis siue Vacillatio est rubor sine tumore ex causis prægressis, ut dictum est.

Inflammatio Legitima habet ruborem cum tensione venarum insigni, cum plenitudine totius corporis.

Biliosa absq; ichore habet paruum tumorem; sed cum colore citrino, vehementissimo dolore, febre acuta, in corpore bilioso, post siccam constitutionem, ut notauit Hipp. & cum eo Gal. 3. aph. 11. 12. 13.

Si connexum habeat ichorem, multæ sunt lacrymæ, quæ, ut dixi, erosionem faciunt.

In Pituitosa tumor est mollis, ferè indolens, & si cum ichore, multæ emanant lacrymæ; si cum flatu, vesicæ in Coniunctiua apparent.

In Melancholica color est liuidus.

In Hyposphagmate nullus ferè est dolor, imò insens ipsi patientibus plerumque hic sanguis in Coniunctiua extra venas apparet.

Suggillatio, seu Hypopyon facile cognoscitur: nam sub Membrana præcipuè Cornea, quando pus adest, alba materia apparet; vbi verò non est suppurata materia, venæ Coniunctiua repleta, & quasi indurata, videntur præ se ferre membranâ quandam fusci, aut liuidi coloris ad differentiam Pterygi, seu Vnguis; qui album habet colorem; qui emulatur vnguem.

Chemosis omnium facillimè cognoscitur ex signis propositis, si tumor sit adeo magnus, ut palpebras inuertat.

Præsentia.

DE Prognosticis Ophthalmia pauca nobis veniunt dicenda: certum enim est, Ophthalmiam, quo grandior fuerit, & ex humoribus frigidis, & tempore hyemali facta, eo diuturniorem esse; contrariam verò breuiorem.

Dictum est etiam Spuriam transire aliquando in Vnguem Oculi; Legitimam verò vel in suppurationem siue Hypopyon, vel in Vlcus, & vlcus sanè varium, de quo infra abundè dicemus.

Omnis Ophthalmia fluxum alui superuenire bonum esse docuit Hipp. 6. aph. 17. Lippientem alui profluvio corripitur bonum, ex quo docet Hipp. quantum ars ipsa Ophthalmicis præstare possit, euacuando humores consuentes.

Therapia.

ITaque nos quoque ad curationem descendentes pauca quædam attingemus de euacuantibus totum corpus, & caput: nam cætera volo vos requirere intra hæc de Catarrho. Primum autem illud moneo Taraxin, siue Vacillationem, quæ sequitur causas externas, solis localibus remedijs, & victu conuenienti sanari.

Idcirco si fiat ex festuca, seu animalculo oculum ingredienti, oculus aqua impleatur, aut lacrymæ excitentur, aut ambra calefacta oculo appropinquetur, vel denique inuersa palpebra colatur festuca refina imposita extremitati styli.

Si fuerit fumus, aut puluis, aut insolatus, satis est oculum abluere aqua tepida aut rosacea.

In vera Ophthalmia locum habet venæ sectio. *Vene sect.* de qua nihil dicam, nisi quod pertinet ad Quantitatem, quod scilicet in his casibus liceat multum sanguinis semel educere. Galen. lib. cur. per sang. missionem, cap. xi. detractis lib. vi. sanguinis Lippientem breui curauit. Qui veretur hanc summam sanguinis missionem, non vereatur saltem in corpore plethorico lib. i. vel ij. & pro necessitate augmenti inflammationis sectionem repetat, hirudines venis sedalibus adhibeat, cucurbitulas affigat; pro reuulsione quidem infernis locis; pro deriuatione Scapulis, & Occipiti, imò occipiti magna affixa cucurbitula cum scarificatione, maximum præstat laborantibus oculis emolumentum.

Idipsum faciunt Vesicantia, & in diuturnis fluxionibus Setacea, & Cauteria, sicut in Recentioribus hirudines post aures, sectio venæ frontis *Phlebot.* apertio venarum nasi *cauter.*

Sectionem venarum, quæ sunt circa angulos oculorum, non propono, quia operatio mihi non est assueta, sicuti quoque (ut arbitror) non modò turpis, sed inutilis est incisio frontis per longum, aut transversum, quam Græci hypospismū vocant.

Nam si fluxio sit per venas interiores, nihil faciat hæc incisio: si sit per cutem, & venas exteriores,

*Hirudin
& Cucurbit.*

riores, satis erit uti reprimentidus, astringentis frontis, & temporibus adhibitis, de quibus nunc mentionem faciam.

Pharmacia.

Transco igitur ad Pharmacia: in hoc casu si febris non prohibeat, quamprimum licet uti purgantibus pilulis. Profitetur Gale. 1. 3. meth. 1. 1. purgante valido medicamento se vnicuique die Oculorum Inflammationes sustulisse: quod & ego pluries sum expertus: sed si febris vigeat, accipio Ahalis consilium, ut lenientibus primò, utamur, vel cassia, vel syrup ros. vel alius id genus medicamentis.

Circa preparantia illud moneo, ne ocularia ita si in preparantibus admisceatis, quod tamen vulgò video practitantes facere: ducunt hæc humores in oculos, cum tamen ab initio longè a parte fluxione tentata sint retrahendi, itaque tantum medicamentis ocularibus utendum, cum totum corpus, & caput magna ex parte mundum est, & scopus est fluxam in oculo digerere materiam.

Tertium quoque moneo, in affectibus Oculorum sterutamentis quidem mihi minus probatis, non tamen omnia reijcio, quæ scilicet nares expurgant, ut succum betæ, aut malux, aut manna cum aqua hordei, vel alicæ, & id genus leuiora. Auic. 3. 3. tract. 4. c. 1. comprobat in affectibus Oculorum usum purgantium per nares.

Idipsum facit Gal. 3. meth. 3. & lib. de cucurbit. & scarificatione: propterea minus me sunt audiendi, qui vniuersaliter improbant hæc remedia.

Localia Transco ad Localia, inter quæ sunt primò Reprimentia, hæc adhibentur aut ipsimet oculo, aut partibus circumstantibus, quæ adhibentur oculo, non debent adhiberi nisi post primam, aut secundam diem: nam siue materia sit calida, siue frigida, ex reprimentibus maximum sequitur incommodum: in calida retentus humor dolorem auget, oculum exulcerat, in frigida con crescit, & induratur: idcirco difficillimè digeritur: Fronti & temporibus iud, & vultu fad. mouentur.

Recipe Pulu gallar.

Rbois. rub. an. drach. ij.

Farin. volat. sem. vnc.

Terra sigill.

Sang. drakon drach. i. sem.

Album. ouis. n. iij.

Succ. plantag. q. sem. M.

Qui non studeat his longis compositionibus, poterit accipere terram argillam cum alburno oui, aut albumen cum farina volauti: nam hæc omnia usum præstant efficacem.

In frigida fluxione pulueres sint ex thure, olibano, myrrha, melle, spica, & excipiantur vino austero.

Interim ipsi oculo ad demulcendum dolorem, & prohibendam fluxionem nonnulla conueniunt quandoque emplastica moderatè Reprimentia, & in magno dolore opiata. Emplastica sunt farina amyli, tragacanthum, albumen oui, & c. cõ-

positus Sief album, lac ipsum, decoctum fœnugræci, quamuis hoc virtutem habeat diuisionariam, mucilago omnis præcipuè seminum cytonior.

Poteritis itaque accipere albumen oui recentis diu conuasatum, quam gallaturam vocant, & permiscere cum aq. ros. & per lineos frequenter oculo inponere, aut accipiatis medullam panis recentis imbutam vel in simpliori lacte, vel in lacte, & aq. rosac. Sed consulo, ut æstate lactis usum fugiatis: nam facile acescit, & acrimoniam ex aciditate oculo infert:

Efficacissimum erit medicamentum hoc, quod

Recipe sol. hyoscyam. M. sem.

Summit. papau. alq. n. vi.

Plantag. M. i.

Bull. in f. q. aq. Plantag.

Facta colatur huiusmodi decoct. extrahatur.

Mucilago semin. cytonior. & vnc. ij.

huius mucilag.

Addat. Aq. ros. vnc. i. &

Gallatur. vnius oui recent.

Utamini hoc medicamento, conueniat autem in fluxionibus calidis, in quibus, ut dixi, propter vehementiam doloris licet quandoque uti opio. Et propterea habens passim in officinis paratos sief albos cum opio, quibus uti solo ego, ne oculum ledant, aut visionem perturbent, hoc modo.

Recipe Sief. alb. cum opio drach. i.

Dissolu. in aq. ros. deinde adde

Decoct. fœnugr. vnc. v. M.

Si fluxio sit frigid, ab initio conuenit uti contriando puluerizato misto cum eod. decoct. fœnugræci, aut farcocolla macerata primùm lacte, & deinde permista cum eodem decocto.

Vbi verò scopus sit materiam aliquantulum digerere, semper ea sunt eligenda, quæ molli careant idcirco pomum coctum cum aliqua portione facc. in linteo oculo appositum primas habet partes: idipsum facit ouum recens induratum, in duas partes diuisum, ablato luteo, & cauitate impleta, aut saccharo candido, aut saccharo communi.

Vel, vbi scopus digerendi sit maior, poteritis immiscerere cum saccharo aut puluerem cymini, aut meliloyi.

Sed Antiquiores mei nihil præstantius inueniunt natura corticum obuæ sacc. comista, & huic cauitati albuminis imposita, adhibentur hæc omnia per linteum rarum & mundum idipsum faciunt fomenta per molles spongas ex decocto tœnugræci, camomeli, anethi, & meliloyi, sanguis colubinus, is præcipuè, qui in plumis continetur, quæ sunt sub al. s. ita calidus in oculum immisus digerit, præcipuè verò probatur à Gal. 4. comp. per loc. ad Hypophagma, ad Sanguinem Extravaenatum.

Cum Inflammatio Coniunctiue, vbi ad statum peruenit, vel possit discuti & geri, vel transmutetur aut in suppurationem, aut in membranam aut in vlcus, propterea loquemur primò de medicamentis vnamquamque materiam digerentibus postea verò transitum faciemus ad Suppurationem, ad Pterygion, siue Vngulam, quæ est membrana, & ad vicera.

Calida igitur materia digerit potest, aut fomentis quæ sunt ex decocto meliloyi, anethi, fœnugræci:

Diabu-
tyruu.

græci, Fiunt quoque linimenta varia; sed præ-
ceteris omnibus celebratissimum est Diabutyru,
hoc medicamentum pro varia Butyri lotione po-
test accommodari inflammationibus non modò
in statu existentibus, sed etiam in incremento,
in statu quidem lotio fieri consuevit in vino mal-
uatico austero, & pro singula butyri vicia adda-
tur drach. j Tutiz, & semiserup. Camphoræ.

Si quispiam hoc vii voluerit in augmento s. lo-
tio Butyri in aq. rosac. Est remedium præstans-
simum, quo ego vii soleo.

Ceterum non modò inflammationes, quas vo-
cant Ophthalmias, sed etiam Pustulæ Coniuncti-
uæ, quas Græci, & ἰνφιδράσια vocant, hoc eo-
dem modo curantur, Sicuti & Vesicæ aqua plene
quæ Coniunctiuam & Corneam occupant, quas
ἰνφιδράσια phlyctenas appellant, curantur, vi Op-
thalmia Aquosa, aut scilicet cumino contuso, &
melle commisto, aut puluere absynthij, aut corti-
cum rhababari in succo rutæ, aut succo fœniculi,
& ubi Vesicæ sunt anaplæ, commodè adhibetur
toti oculo emplastrum ex farina fabarum, fœnu-
græci, addito cumino, & aniso contuso, simul cum
succis rutæ, & fœniculi.

Vbi inflammatio sit Melancholica, humor pri-
mo est molliendus.

Itaque fiat fomentum ex aqua tepida, in qua-
bullierint malua, althæa, semen lini, & fœnugrec.
postea digeratur fortioribus prædidijs. Fortiora
sunt cassia lignea, & cinamom. pulueriz; mistum
cum cymino, puluere hyssopi, addito succo aut
anagallidis, aut minoris centaureæ rutæ, vel cupbra-
giz.

Ad Chemosis, quæ est magna inflammatio, in
qua palpebræ inuertuntur, Galen. 4. de comp. per
loc. c. 1. (B.) laudat medicamentum ex Luteo oui,
& corporibus muscarum confectum; nihilominus
tempore statu hæc ipsa emollientia & digerentia
conueniunt, de quibus iam memini.

Sed si inflammatio transierit in Hypopyon,
siue in Suggillationem, siue Syppurationem (quæ
sunt idem) cum materia sit valde profunda, diffi-
cilè digeritur, id circo Gal. 1 j. meth. c. 2. triplicè
proponit curandi modum, Primus est per dige-
rentia, Secundus per capitis concussionem, Ter-
tius per Corneæ perforationem. Vt digeratur ma-
teria, cum sit valde profunda, primum erit atte-
nuanda, præcipuè verò si denigrata fuerit, idcir-
co cõuenit vii euaporatione, vi scilicet fiat decoct,
& per tubulum fumus in oculum recipiatur,
Decoctio sit talis.

Recipe Radic. Bryon.

Cucum. syluest. an seml vnc.

Pulp. colocynt. drach. ij.

Radich. alth. vnc. i.

Centaureæ minor.

Sileris montani,

Pulegij an. M. j.

Bull. ad consumptionem 3. partiz. & s. suffu-
migium.

Huc succedunt digerentia fortia. Antiquio-
res, vi potestis videre apud Galen. 5. de comp. per
loc. cap. 1. ascendebant ad Muriam, qua vieban-
tur per spongiam est valde mordax medicamen-
tum; satis est accipere acetum & vinum album

equis portionibus, & in huiusmodi liquoribus in-
coquere folia lauri, rutam, chelidonium, euphra-
giam, fœniculum, centaureæ min. & si decoct. fiat
in vase æneo, erit fortius medicamentum. Est re-
medium non vulgare aqua destillata ex folijs oli-
uæ in eodem vase æneo. Probantur quoque tro-
chisci viperini, aut ipsa vipera combusta, & in ci-
nerem redacta, quæ melle, aut succo, vel rutæ, vel
chelidoniæ excipiantur. Hæc omnia fortem ha-
bent vii digerendi, & attenuandi.

Quæ si non conferant, caput, vi dixi, fortiter
agitandum est, vi pus descendat; aut purgenda
est cornea in parte inferiore, dummodo suggilla-
tio sit alba, nam in denigratis, neque concussio,
neque apertio quidquam facit, est enim materia
indurata satis.

At si transeat materia in Vlcus, huiusmodi
vleus, aut est superficialis, aut profundum, Super-
ficiale est duplex, aut angustum & rotundum,
aut larum, primum dicitur Βότρυς, Botryon, secū-
dum dicitur Κάλαμος, Cēloma. Si fuerit vlcus pro-
fundum, est adhuc duplex; nam aut est vsque a-
deo profundum, vi totam erodat corneam, aut est
sine totius corneæ erosione.

Vbi erosio corneæ succedit statim excernitur
pupilla, & primus exitus pupilæ æmulatur caput
muscæ, idcirco Græci vocant hunc affectum
Μυοίφαλον, Myncephalon, Si vltius progredia-
tur malum, æmulatur acinum vutæ, & tunc voca-
tur Σταφύλωμα Staphylocoma. Si maior adhuc sit
portio vutæ egressa, vi vix palpebræ occuldan-
tur, vocant hunc affectum, Μύλον Græcè, Milon
Melum. Et ubi valde indurefcit instat capitis cla-
ui, vocant Ἡλόν. i. Clauum, Aut. Claualem Rup-
tionem.

Si tota cornea non disrumpatur, vlcus tamen
superfundum, & sordidum, vocatur Επικαύμα
Epicauma. Profundum sine sordine dicitur
Ἀργέμον argemon.

Huiusmodi vlcera sine sordine facillè sanantur
aut pulueribus siccantibus, qualis est terra la-
mia, amyllum, hus. iuna, cerusa, puluis factus ex
testis ouium in pollinem redactis, hæc vel in-
sufflantur, vel stylo excepti pulueres vlceri impo-
nuntur. Exsiccant pariter aqua virgæ aureæ, po-
lygoni. Sarcocolla aut simplex, aut in lacte ma-
cerata primas quoque obtrinet partes, & ubi adsit
lacrymarum fluxio, nihil præstantius hoc medi-
camento.

Accipiat lapidem hematitem, & fricetis su-
per cotem in aqua rosacea, aut aqua plantaginis
vsque ad rubedinem insignem ipsius aquæ dein-
de utamini hac aqua. Vbi sit vlcus cum dolore, Fuligo
Butyr.
nihil est præstantius ipsa fuligine butyri, Modum
conficiendi hanc fuliginem legatis apud Diosco-
ridem 2. lib. cap. de fuligi.

Vbi adsit sordities, abstergendum est vlcus aut
soto caprino, aut aqua mellis, aut aqua in qua tel-
gesies thus sit extinctū, addito melle rosato. Hoc
medicamentū abstergit, exsiccat, sicuti et valen-
ter exsiccat; & plus ceteris valet infusione frigi-
dæ croci, aloes, & myrrhæ, siue in puluere, siue
misti cū aliquo liquore exsiccante, & cõsolidare,
viesset succus hypericonis, aut succus mille folij.

Quod

Quod si vena iam sic egressa, oportet primò A
vucam ipsam egr. ssum intromittere, primùm e-
molliendo, deinde digito comprimendo: facta
intromissione, statim adhibendum medicamen-
tum ex albumine oui cū sarcocolla, & cum amy-
lo, deinde verò spongia vino saustero imbuta, in
quo bullierit myrthus, rosa, balaustium, & acacia
superimponatur.

Sanato vlcere Maculę remanēt; Maculas Oculi
vocat Gręci: Superficiales proprio nomine. Ne-
phelia, Latini Nubeculas; Profundiores autem,
quę radices aliũs egerunt Λευκόμετα Leuco-
mata Soluuntur istę Maculę aquis quibusdam
stillatitijs, aut cinamomi, aut garyophyll. Quidam
summopere laudant vrinam pueri vase æneo de-
stillatam.

Hoc scio experientia, summopere maculas illas
delere, os sapię puluerizatum facc. cand. aquis
portionibus commistum: insufflatur in oculum,
aut in forma linimenti cum melle, adh. betur par-
ti interiori palpebrę. Quidam neque inutiliter
in eundem vsum accipiunt pumicem; Alij acci-
piunt lap: illos quosdam paruos, planos, alperos, C
qualis est lapis geodes, & imponunt inter palpe-
bram, & oculum, nam ille lapis moto oculo pau-
latim nubeculas illas sumit.

Quod pertinet ad Pterygium si medicamenti
superari possit, est conficiendum lapide pumice:
deinde adhibenda hęc medicamenta quę forti-
ter digerāt, sed vbi membrana est indurata, opus
est manuali operatione, quā potestis legere apud
Paulum lib. 6. cap. 18.

Ad hanc partem pertinent duo affectus, qui
tractandi sunt flammeis medicamentis, Carbu- D
culus scilicet, & Carcinoma oculi, sunt enim in-
sanabiles.

Versabimur in præsenti lectione circa affectus
Anguli Maioris, ac Palpebrarum, quos omnes,
Deo fauente, expediam.

Anguli Maioris Oculi Vitia.

Q Vinque affectus sunt circa Angulum, de
quorum nominibus tametsi aliqua sitinter
scriptores differentia; Ego tamen hac in parte se-
quar Paulum.

Primus affectus Paulo dicitur Ἀγκίλωψ Anch-
loph & est inflammatio huius anguli: Alij dicitur
Ἀγκίλωψ Aegilops, siue abscissus. Tertius est
Fistula, (Epinyctis Plin. lib. 30. cap. 6.) Nomine Fi-
stulę vlcus intelligo angustum, & oblongum, si-
ue habeat ossis cariem, siue non habeat: hęc enim
Fistula Lacrymalis vocata vtroque modo contin-
git Quartus affectus est Πύεξ, siue erosio carun-
culę huius Anguli Maioris, ad quam sequitur cō-
tinua quzdam lacrymarum effluxio. Huic oppo- F
nitur ille affectus, qui vnius, quę Gręci Ἐγχαΐδης
vocat, & nihil aliud est, quam carnis in hac par-
te excresecntia, idcirco quidam vocant Ἀερόκο-
δον: Aut Additionem Carnis Lacrymalis.

Curatio. In curauone Anchilops, qui affectus
est omnisbus conspicuus, suppositus euacuationi-
bus, & reuulsionibus vt pluries dictum est, circa
localia, & duplex, & ea quidē insignis outur diffi-

cultas: Prima est circa Reprimētia; Secunda
circa suppurationem: nam vtręq; Fistulę periculum
inferre videntur; illa quidem repellendo humorē
ad profundas partes; hęc verò putrefaciendo inti-
bilominus virū; aliquādo agendū est necessariū.

Vbi fluxio tunc primū incipiat, angulo an-
tea non laborante, reprimētia conueniunt inam
si antea nunquā laborauerit hic locus, profundę
partes sunt robustę: itaque repulsio potius fiet ad
latera, quā ad profundum: at si inflammatio
fiat iam procedente morbo in hoc loco nullo mo-
dō repulsio conuenit.

Videbitis in praxi, laborantes Fistula Lacrymali
incidere inflammationes, in quo casu non con-
uenit repulsio. Repellētia sunt succus plantagi-
nis mistus cum albumine oui, & aqua rosacea, aut
rosa recēns contusa, vel succus rosarum, vel pul-
uis rosarum mistus cum succo plantaginis.

Materia iā fluxa, si fieri possit, est digerenda.

Digeritur autem vel supposita alyca in aceto
coctis, aut rutę folijs, pariter aceto coctis, aut en-
chlea contusa melle excepta. Prę ceteris valet
centaurium minus, siue succus, siue folia contu-
sa: Quidam pro secreto habent nucem rancidam
concrusam & applicatam.

Aliquando oportet vt suppurantibus, quando
scilicet natura iam suppurationem inchoauit, &
hūmor est sanguineus & copiosus, vt suppuratio
impediri non possit; in hoc casu satius est quā
primū suppurare, & abscellum nō probē adhuc
confectum aperire, quā vt digerentibus, quę
crassiorē materiam relinquunt, & fistulę pericu-
lum adaugeant.

Abcessus aperiat in parte decliui longē ab
oculo, curetur sicut alij abcessus, turunda impo-
sita, & superposito cerato diacalciteos vocato, seu
vulgō diapalma. Ego cū superioribus mēsis
hic Patavij habuerim nobiliss. mulierem hoc ab-
cessu laborantem, post disrupum abscellum ad-
hibui Diabutyrum, quod vnica die sanauit ab-
scellum; itaq; consulo vt hoc etiam vtamini.

Ceterū vbi adsit fistula, si fuerit absque ossis
carie, poterit sanari medicamentis siccantibus, &
agglutinantibus; sed hoc primū diligentissimē
obseruandū, vt locus iste ab omni sanie, & ichore
per compressionem digito factam expurgetur, de-
inde aut aliqua aqua foras, aut puluis ilpergatur.

Puluis potest componi hoc modo.

Recipe Sarcocol. Myrrh.

Antimon. an. drach. i.

Chalciteos

Floris aris an. drach. sem. ss.

Si nimis forte sit medicamentum, addatis pul-
uerē aut purpuratū, aut conchas, aut ossis sepię.
Aqua accommodata fieri cōsuevit ex chalcen-
tho, ac flore aris, quę bulliant in aqua rosacea.

Ego hunc in modum parare soleo aquam, quę
tamen non est valde mordax: Accipio albumen
oui induratum sine luteo feruens adhuc, & in ea
cauitate impono chalcanthum, pręcipue illud al-
bum, quod vulgō dicunt Cuperosa, simul cum
flore aris, deinde impono in linteo mundo, & ex-
primo totam hanc substantiam in aqua rosacea,
quam deinde impono in vase æneo.

Modus
aduren-
dis os cor-
ruptum.

Huius guttulæ aliquæ paulatim infundantur in Fistulam, studendum autem, ut post impositionem medicamenti pars illa perpetuò sit compressa, in quem usum debet parari globuli aliquo instrumento, qui continuo compriment angulum oculi. Ceterum ubi os sit corruptum opus est igne actuali; docebo vos modum vitendi igne actuali absq; periculo; nam ego usus sum hoc ipso Venetus in quodam Monacho S. Georgii: In istis, qui laborant tali fistula, aliquando lacrymæ retinentur, & simul sanguis & ichor, & tunc sunt Apostemata, & Inflammatione aucta debet Medicus curare, ut inflammatio fiat. Nam cum primum sit, multo minus aliquid excernitur aut puris, aut ichoris, ita ut non fiat amplius. Facto tumore potest aperiri in angulo, (potius in loco declivi.) Facta apertura imponitur turunda ex radice gentianæ, aut medulla canæ, quæ aperit foramen, ut commodè possit videri os, tunc paratur cannula ferrea, in qua imponitur stylus ignitus triangularis, & præmunito oculo linteis imbutis in succo plantaginis, albumine oui & rosaceo, ut locus ipse non semel, aut bis, sed usque ad desquamationem ossis oculi. Ego in eo casu per triginta dies continuos vi coactus sum adustione bis in die: Exsquamato ossis agendum pulueribus siccanibus, qui illi eua n sunt, qui valent in Rhya de, siue erosione carnis anguli. Sunt autem pulvis aloes, tutia crocus, myrrha, quibus pulueribus adduntur quoque medicamenta proportionata ex siccantia extrinsecus, de quibus iam dixi.

In Encanthide verò opus est medicamentis erodentibus carnem. Lapis sarcophagus, vocatus primas habet partes pulueris, & interusus in defectu huius lapidis, vitamini aliis erodentibus, sed præmunito oculo conuenit adhibere Aegyptia, cum melle commistum, aut puluerem misly, vel sory, vel chalcitreo, aqua etiam, aut vinum in quo alumen ebullierit, vtiliter administrantur & hæc de affectibus Angulorum.

De Malis Palpebrarum.

Quod ad Palpebras, multum quidem numerantur affectus. At horum omnium curatio tandem redigitur ad quatuor capita, nam quidam curantur mollientibus, quidam siccanibus, quidam manu chirurgica, nonnulli mixta quadam ratione.

Mollientibus tractantur καλάρησις, siue καλάρησις, Πτελωσις, & Κριθή.

Est Chalazion tumor durus grandini similis in colore & figura.

Est pariter Pulosus tumor durus, qui saxum æmulatur.

Est Cithis, seu Posthia, id quod Latini vocant Hordeolum.

Duo priores tractantur emollientibus, & præ ceteris laudatur Ammoniacum & bdellium, dissoluta in aceto acerrimo.

Posthia, Cithis, siue Hordeolum, cum est durus callus, tractatur, eodem modo, quandoq; verò est inflammatorius, in quo casu eget suppuratione.

Commodè fit suppuratio, adhibito frumento multificato ipsi hordeolo.

Siccanibus tractantur Ξερσθάλμια, siue Sca-

bies Palpebrarum humida, quæ infesta, & angulum, & palpebras: Ξερσθάλμια, quæ est Lippitudo Sicca, & Ξαλποσθάλμια, quæ est Affectus Pruriginosus Palpebrarum cum dolore, ac robore Siccanibus pariter tractatur, Τράχυμα, Σύνουσι, Τίλασις, & Μυδνοσις.

Est sunt affectus qui contingunt Interiori Partii Palpebræ superiori hoc discrimine, quod Tracoma sit leabrities quardam palpebræ; Sycofis sit scabrities, sed cum fissuris quibusdam, & granulis duris, rubris, qualia sunt grana ficus; Tylosis est summa huius affectus induratio, ita ut palpebra vix moueri possit.

Phthiriasis est affectus pedicularis palpebrarum Pladarotes est intemperies humidissima, cum continuo fluxu materiæ aquæ, & humidæ ex palpebra cum tumore œdematoso.

In Mydesi effluit quidem humor, sed quandoque cruentus, aut luidus, nam adesi putredo, & caro quardam corrupta in parte interna.

Ex affectibus, quos proposuimus curandos, cum aliqui sint Humidi, ut Pladarotes, Mydesis, & Pterophthalmia. Alii verò Sicci, ut Tracoma, Sycofis, Tylosis Xerophthalmia, & Sclerophthalmia, ideo in eorum curatione triplici modo incedendum est; In humidioribus satis est ut medicamento siccante.

Multa possent proponi, sed consulo, ut vitamini vno ex his tribus, quæ sunt experta; videl. aqua confecta ex calce, aut ex chalcantio albo aut ex squama ætis; & quævis non nulli has præparent aquas per infusionem horum corporum, tamen ego illas consueui parare, ut de cui in præcedente lectione, imponendo calcem, aut chalcanthum in albumine oui indurato, & calente, & expresso per linteum in aq. rosæ.

Si quis etiam

Receptas Vini Maluat. austeri lib. i.

Fol. laur. rutæ an. p. sem.

Flor. roris. m. vnc. sem.

Alum. drach. ii.

& Bull. hæc omnia in vase æneo, liquorem componet ad hos affectus accommodatum.

In siccioribus prætermittenda non est emollio, & in induratis fructanda est Palpebra lapide pumice usque ad cruentationem, deinde inungenda aut diabutyro, cuius iam memini, aut vnguento composito, vel ex ætunia veteri, siue lardo loto in vino maluat. cum additione pulueris tutiæ, & modica camphora, ut in singula vncia ætuniz sit drach. i. Tutiz. & scup. sem. camphoræ.

Alii Affectus qui compositionem requirunt curationem sunt Φθίριαισις, Μάδαρσις, Μίλκρσις, Διούχιασις, Τριχίασις, Φαλαγγασις.

Est Phthiriasis morbus pedicularis palpebrarum qui curatur partim medicamentis absterforiis, partim pediculos necantibus. Absterforium erit lotio facta ex aq. marina, in qua bullient sal, sulphur, & staphisagria addito modico melle.

Post lotionem necant pediculos palpebrarum aut ipsa staphisagria cum melle, aut linimentum factum ex aloë succotino, staphisagria, puluere ablyonitii

absynthii & melle scyllit. aut medicamentum subscriptum, quo Paulus viuitur, cui admodum simile describit Aetius.

Recipe alum se issilis partes ii.

berba pedicularis partem i.

Teratur, & eo cilium attingatur.

Madarosis est defluuium pilorum palpebrarum, cuius multae sunt causae, aliquand o lues Venet. aliquando humiditas nimia, quandoque humorum corruptio:

Huic prouidendum purgatione totius corporis & propterea, vbi adsit humorum corruptio cum B acrimonia, conuenit vsus succi vnus integri granati contusi cum toto cortice, siue simplex, siue melle commistus.

Disticha est ortus pilorum palpebrarum duplicato ordine, sicut Trichiasis in triplicato, & Phalangosis in quadruplicato ordine. Affectio molesta est, & ex subortus pilis pungit oculum.

In quo casu necessaria est euulsio, & post euulsionem locus aut igne actuali inurendus est, aut oleo ex sulphure, vel ex chalcantho: Quidam cum pice, aut resina omnia simul componunt, atque C vniunt, vt noxam non inferant.

His non conferentibus, veteres ad chirurgicam operationem deuenerunt, quae sit acu pilum recipiente, & illum educente per foramen factum in palpebra. Videatis Paul. lib. 6. & Ambros. Pareum lib. 16.

Alii affectus palpebrarum sola manu chirurgica tractantur: Hi sunt *Λαγωπάθεια*, Lagophthalmia, id est, Oculi Leporinus. Estque inuersio superioris palpebrae, vixgri oculis apertis, perinde ea lepores dormire debeant, *Εκτροπία*, ectropion id est, inuersio inferioris palpebrae, propter cicatricem, aut carnis excrescentiam adueniens. *Αγκυλωσις*, Ancylosis, vel *Αγκυλωβλήφαρος*, ancyloblepharos, quae & agglutinatio seu inuisuatio dici potest, nam est coniunctio vel naturalis, vel acquisita vtriusque palpebrae, aut simul, aut cum cornea, vel coniunctiua: Solum manuum chirurgicam requirit etiam *Υδαρίς*, Hydars quae est tumor in palpebra superiori, quam vulgus *Νατά* vocat: siue sit species melicentidis, siue atheromatidis, siue steatomatis. Modum curandi legite apud E scriptores propositos.

His expeditis, transeo ad ea, quae maioris sunt momenti.

De lesa visione.

TRanseo ad illos affectus, qui omnium maxime visionem tollunt, aut deprauant, aut imminuunt.

Tollitur visio ex triplici potissimum affectu: Ex Gutta serena, ex Glaucoma, & ex Suffusione.

Gutta serena est priuatio visionis propter nerui optici vel rupturam, vel integram obstructionem aut exsiccationem. In hoc affectu oculi nullam in se labem habere videntur, & tamen patiens nihil videt.

Glaucoma duplex est: Vnum est exsiccatio humoris crystallini, cuius meminit Gal. 2. de visu paracryp. quae scribit morbum esse in-

A sanabilem; Alterum est ex abundantia humoris, siue crystallini, siue albuginei: Hic affectus non tollit visionem, sed tantum, aliqua ratione imminuit, & quando est naturalis color, nihil visioni incommodat.

Virum hic color aliquando siccitatem sequatur, vel ne, & quomodo idem color possit fieri & ex siccitate & ex humiditate, docui alias in nostris lectionibus.

Tertius affectus, qui tollit visionem, est integra Suffusio, ex humore concreto, vel in ipso humore albugineo, vel quod frequentius est, inter albugineum, & corneam.

Deprauatur visio aut in Phantasmatibus, aut in Suffusione imperfecta, aut in Strabositate, seu mala oculi pupillae, & humoris crystallini situatione, aut in hallucinatione, aut etiam in Mydriasi & Phthisi pupillae.

Deprauatur primo in Phantasmatibus, quando quidem Phantasmata nihil aliud sunt, quam corpuscula quaedam ex crassis vaporibus genita ab infernis partibus in humorem albugineum, vel saltem ante crystallinum transmissa, vario modo figurata, vt propterea patientes putent se videre aut muscas, aut culices, aut quaedam puncta nigricantia, modò duo, modò tria, modò plura, quidam dicunt se videre nubeculas albas, rubras, aureas, mobiles. Fiunt haec omnia ex phantasmatum varietate in figura, & in colore:

Neque audiendi sunt hac in parte Peripatetici quidam, qui existimant haec corpuscula in oculo: existentia nullo pacto videri posse, eo quod sensibile supra sensum non faciat sensationem; & quod necessarium sit medium inter sensibile, & obiectum.

Peripatetici opinantur.

Prima ratio in ceteris sensoriis, praecipue tactu locum non habet, nam sensibile supra sensorium facit sensum, & in sensu visus tunc tantum locum habet, quando obiectum positum super sensorium impeditur & prohibetur ingressum luminis, sed huiusmodi corpuscula lumen non prohibent, idcirco si medium est necessarium, est necessarium pro recipiendis speciebus rerum sensibilium externarum, at si res visibilis est in oculo, & in organo, non est opus medio: Valeant igitur huiusmodi rationes philosophorum.

Deprauatur visio in Suffusione non integra, quando humor concretus est circa centrum pupillae circumferentia vero est sine vilo humore impediens: tunc enim vt scribit Galen. 1. de caus. & sympt. 2. exteriora obiecta videntur perforata. Quod si concretus humor sit in parte superna, vel interna, vel dextra, vel sinistra, obiecta videntur tantum circa illam partem, & locum, qui non est impediens; in alia, & alio loco non videntur. Ego sola inspectione agnoui impedimentum in patientibus.

Tertio sit deprauata visio ex mala situatione vel totius oculi, vel pupillae, vel crystallini: Hae mala situatio si fuerit vel ad superiora, vel ad inferiora, facit apparere res geminas; si sit ad latera res non apparent geminatae.

Si quaeras causam, Ego veram proponam quam alibi non inuenieris. In isti crystallinus habet cubam figuram, in anteriori parte est planus

Cur obiecta apparent geminata.

propterea extremitates terminantur lineæ, & angulis, si vertatur oculus ad angulū nō mutatur planities. si vertatur ad superiora, vel inferiora, mutatur planities: nā angulus necessariō se porrigit in oculo straboso ante planitiem alterius oculi sanij angulus crystallini strabosi est altior & eminentior qua crystallini sanus: brigitur vnus humor habet suā planitiem, alter porrigit angulum. species visibilis primō recipitur in illo oculo, cuius crystallinus porrigit angulum, qui recipiatur in planitie alterius, vbi autem species bis recipiatur obiectum apparet geminarum.

Deprauatur etiam visio in Mydriasi, id est, in Dilatatione Pupillæ, propter quam obiecta apparent minora, sicuti in Atrophia, vel in Tabe Pupillæ, quandoque tollitur visio, quandoque obiecta apparent minora.

Pupillæ Dilatatio, & Constrictio aut fit ex vitio rhagoidis tunice, aut ex ipsamet pupilla, aut ex corporibus subiectis. Ex vitio rhagoidis quando vsque adeo intumeicit, vt vel pupillam extendat, in quo casu fit Dilatatio, aut comprimatur, & tunc fit Constrictio. Ex pupilla cū vel exsiccat, vel laxatur à nimia humiditate, in quo casu constringitur, aut impleta à nimio humido dilatur Corpora subiecta ipsa & dilatauonem, & constrictionem faciunt; nam siue albugineus augeatur, siue conrescat materia inter albugineum, & pupillam, dilatur pupilla; si dehciat albugineus constringitur pupilla: Deficit verō aut exsiccat, aut euacuatur, id quod contingit per quardā vulnera corneæ, & rhagoidis.

Daprauitur etiam visio, vt dixi, in Hallucinatione, quandoquidem siue cornea siue pupilla, siue humor albugineus, extraneo imbuatur colore aut citrino, aut rubro, aut fusco, omnia obiecta ejusdem apparent coloris, vocaturq; affectus *ταράσσει*, et hæcenus de visu deprauato.

Diminuitur visus tripliciter: aut enim interdiu optimè vident, noctu vique etiā stellas aut literas sub candela inspicere possunt. Hunc affectum Paul. & Auen. vocant Nyctalopiam; Auctor tamen libri definitionum Med. & Introductorii Nyctalopen vocat, in qua patientes sub lumine candelæ noctu omnia integre videant; interdiu nequaquam.

Secundo modo diminuitur visus, quando propinqua obiecta commodè inspiciuntur; remota autem minime. Hunc affectum Græci dicunt *μυωπία*, vel *μωπία*.

Eodem nomine potest etiam appellari imminuta visio, in qua obiectum proximum vix potest videri; remotius multo melius cernitur.

Hunc modum quidam Recentiores reprobant; sed male, quia ego habui patientes.

Tertius modus diminutæ visionis dicitur *Ἀμύωπία*, vel *Ἀμύωπία* in qua patientes neque propinqua, neque remota bene intuentur.

DE causis sunt aliqua dicenda: nam earum tractatio curationem docet. Itaq; interdum optimè vident, noctu autē minime, qui spiritus visorios paucos, & tenues obtinent, humores & oculorum tunicas densas, & solidas: Isti enim à copioso humore illustrantur; noctu autem propter densitatem tunicarum & humorum, & spiritus paucitatem oculus satis superque non illustratur: quod si humores, & tunicæ sint admodum raræ, & tenues, tunc à paucio lumine illustrantur; à multo autem disgregantur, vt propterea noctu in paucio lumine melius intueantur, quam in multo.

Qui optimè vident proxima, remota autem minime isti quoq; tunicas habent raras, tenues, spiritus pariter admodum subiles, & puros atq; copiosos etiam: idcirco paucio egent lumine proxima itaq; faciliè intuentur; distantia non possunt inspicere, quia & spiritus, & humores, & tunicæ raræ, & tenues disgregantur.

Cōtra verò melius intuentur remota obiecta illi, qui habent spiritus crassos, tunicas & humores solidos & densos. Triplex est causa. Primo quia obiectum, quo remotius est (dummodo seruetur distantia conueniens, eo fortius suā imprimat speciem. nam, vt rectè docent Perspectiui, species visibilis dum rēdit ab abiecto in oculum, facit pyramidem cuius basis, est in obiecto cuspis verò in oculo: itaque quo cuspis est acutior, eo fortius penetrat; acutior autem est cū est remotius in proportionata distantia, quā vbi obiectum est proximum. 2. Vbi obiectum distat, nō potest inspicere, nisi spiritus visorios, non quidem sua mole penetrat ad obiectū visibile; sed est saltem necessarium, vt vis visoria illustratione quadam illuc perueniat neque enim videmus species in oculo, sed obiectum per speciem: nam species de ducit oculū de potentia in actum, & facit, vt videatur obiectum, quod propterea videtur illud magnitudinis, & figuræ, & coloris, cuius est, quod si species, quæ est in oculo, videretur, nulla esset ratio, quamobrem magnitudo, & cætera obiecta visibilia distingueretur: propterea magnus Arist. lib. de sens. & sensibili cap. 1. hanc veritatē declarauit, eū dixit, speciem visibilem esse illam, quæ facit videre. Itaque cū res sic se habeat, spiritus animalis, quanquam crassus, in visione rei distantis attenuatur; proximum verò obiectum non potest inspicere, quia adhuc impurus, & crassus est.

Accedit tertia causa, quod quo obiectum est ipsi oculo magis proximum, eo minus illustrantur partes oculi: nam proximum obiectum facit vmbra: Tunicæ autem densæ, & solidæ vt illustrentur, magno egent lumine; ideo obiecta remota melius intuentur: Ex dictis patet causæ cur quidam, nec proxima, nec remota bene intueantur.

His sic declaratis cū tot modis visio tollatur, deprauetur, & imminuatur, illos omnes prætermittam, qui curationem non admittunt.

Non admittunt curationem visio Ablata propter nerui Rupturam, aut Obstructionem confirmatam.

firmatam, vel inflammationem indurata: et facile cognoscitur hic affectus, quia oculus in omnibus partibus videtur sanus, & tamen visio non adest.

Neque potest sanari Glaucoma ex siccitate: nam defectus crystallini humoris, qui iam colorem oculi mutauit naturalem, amplius restitui non potest, siue fiat hic defectus ex senio, siue ex atrophia totius corporis, siue ex punctura, aut vulnere oculi. Non inficior ex punctura, aut vulnere, aliquando euacuatum esse humorem, sublequatamque siccitatem; (cœcitatem) & tamen iterum eundem humorem fuisse restitutum, visumque recuperatum; sed hoc contingit euacuato albugineo, non autem crystallino, & in pueris, non autem adultis, vt scribit se aliquando vidisse Gal. 1. de caus. symp. c. 2. Et ego ipse vidi Venetiis puerum, qui percussus forcipe in oculo, statim euacuato albugineo cœcus factus est per 6 menses, cum atrophia oculi, et tamen restituto iterum albugineo visum recuperauit, pupilla tamē remanente, distorta ad superiora, in qua parte erat vulneratus.

Est quoque insanabilis antiquata Suffusio & indurata. Per indurata intelligo non tantum illā quæ in membranā conuersa est, nā hæc deponitur: sed illam intelligo, quæ in substantiā gypseam, aut calcis est mutata, quæ cognoscitur ex colore albißimo, ex abolita prorsus visione, vt neque lumen intueantur: et præterea, quod compresso oculo digito, materia illa nihil mouetur, & abuso vno oculo, pupilla nulla ratione dilatur. Si dilatur pupilla, si lumen saltem intueantur, spes curationis relinquatur.

Cæterū cum ex Suffusionibus quædam sint spuria, quædam legitimæ: & spuria sit in crassatio quædam insignis aut crystallini, aut humoris albuginei, hæc in crassatio antiquior facta est insanabilis.

Ex legitimis autem Suffusionibus insanabilis est illa, quamuis non indurata, quæ habet materiam collectam inter humorem albugineum, & crystallinum: et tenui neque medicamenta neque acus penetrare valent eo loco.

Denique Strabositas confirmata & in adultis est affectus insanabilis: quamuis in Puerulis latitantibus corrigi possit impressio aliquo globulo purpureo suspenso in opposita parte oculi Strabosidum enim pueri frequenter intuentur illud obiectum, paulatim Strabosum oculum in suum situm naturalem redigunt. Cæteri affectus sunt sanabiles.

Signa Affectuum Curabilium.

A Nequam eorum morborum, qui curabiles sunt, curationem aggrediamur, quædam de signis sunt dicenda, partim diagnosticis, partim prognosticis.

Nam quod pertinent ad Guttā Serenam vocatam, cum sanabilis sit, quando ex recenti vel obstructione, vel inflammatione fiat, cognoscetis hæc distincta esse à fractura nerui, quod nulla præcesserit causa extrinseca, cuius fracturæ causæ

non vulnus, non casus, non contusio; & si sit obstructio, amittitur visus illa oculo momento temporis absque ullo dolore.

Si sit inflammatio, cum visio abolita, adest dolor circa oculorum radices, & acuta febris.

Circa Phantasmata illud etiam animaduertendum, hæc autem esse per consensum à ventriculo, aut per essentiam in oculo. Quæ sunt per consensum omnia sunt mobilia, variae magnitudinis ac figuræ, quandoque vnum, nonnunquam alterum, aliquando ambos occupant oculos, & ieiunius, ac cruditate laborantibus sunt magis impensa, quā post cibum nuper acceptum, & post convenientem victus rationem.

Quæ verò per essentiam sunt in oculo, firma sunt, perpetua, semperque vnius, & eiusdem magnitudinis & figuræ. idcirco hæc infusione minantur, priora autem non necessariò. Et signū futuræ suffusionis ex phantasmate desumptum illud est, quod quandoque splendores quidam versantur circa oculum patientis & interdum & noctu. Fit autem hic splendor refracto spiritus visui radio ad huiusmodi corpuscula tenebrosa, & in crassata: nam in hoc casu reflectitur lumen spiritus visorii ad crystallinum, & splendor apparet.

Circa Suffusionem illud quoque notandum cum spuria sit, & legitima, vnam ab altera esse distinguendam. Spuria, quæ sit ex albuginei crassitie, & densitate, in hoc distinguitur à legitima, quæ sit ex materia: quia priorem non præcedunt Phantasmata, & paulatim patientes visum amittunt, quasi per caliginem, fumum, aut nebulam respiciat.

Cum vero visus iam est abolitus, si respiciatis oculum, illum quidem conturbatum, confusum, & obscurum videbitis, non tamen circa pupillā apparebit illo color vel plumbeus, vel gypseus, vel cinereus, vel albicans, qui suffusionem sequitur: & præterea nunquam in Spuria Suffusione amittitur visio tantum secundum medietatem, vel secundum particulam, sed secundum totum, vel minuitur, vel tollitur. In legitima Suffusione multum quoque refert distinguere materiam, & locū. Materiam, utrum sit humor, an membrana. Locum, utrum sit collecta inter corneam, & rhagoidem, & albugineum, vel inter albugineum, & crystallinum.

Cognoscetis materiam Suffusionis esse humorosam, si digito oculum comprimentes videbitis ipsum agitari, & dilari, præterquam quod visio imminuitur tantum. Vident enim quasi per nebulam.

Contra quā contingat in facta cum membrana, quæ neque dilatur, & visum prorsus adimit. Si materia sit inter corneam & rhagoidem, facile cognoscitur, quia cornea, quasi vterque quidam inflatur & repletur, & si coniungat, (quod aliquando contingit) vt hic humor sit collectus tantum iuxta pupillam, recta linea aspicientes nihil vident, aut agrè vident: si intueantur ad latera, commode possunt inspicere: Vbi sit inter rhagoidem & albugineum, materia videtur iuxta pupillam: Cornea tamen est lucida, & transparent.

Vbi est inter crystallinum, & albugineum, tollitur visio, nulla sensibili apparenta circa pupillam

lam mox: Oculus tamen aliquā prae se fert perturbationē ad differentia obstructionis nervi optici.

Quod etiam pertinet ad vitia rhagoidis, nō est difficile distinguere Dilatationē, aut Constrictionem ex plenitudine factam ab ea, quae fit ex inanitione, nam in plenitudine intumescit, oculus siue cum inflammatione, siue citra inflammationem: Contra verō, contabescit, & imminuitur,

Curatio.

TRanseo iam ad curationem, quam distribuo in quinque partes, seu classe: quandoquidem omnes propositi affectus curantur aut solis remediis intrinsecis, & ijs, quae attinent ad viuendi rationē aut curantur & sola viuendi ratione, aut teruo curantur & purgatione, & victus ratione, & medicamentis extrinsecis: Quidam verō solis extrinsecis curantur, sed pharmaceuticis; quidam denique optimi requirunt chirurgicam.

In prima classe sunt Phantasmata, Suffusio incipiens, & affectus ille neuorū ex recenti obstructione, aut inflammatione factus: Nam hi omnes affectus multo melius curantur purgatione totius corporis, & Lepus, reuellentibus, & deriuantibus, ac conuenienti victu, quā localibus medicamentis, & praeterea ubi adit obstructio nervi optici, quamprimum deueniendum est ad pilulas, efficaciter caput purgantes, antequam materia induretur. Exhibeantur cochiae preparatae, aut foetidae. Praeparantur humores oxymel. comp. & scilicet; & iterum repetatur purgatio.

Et capite, ac corpore vniuerso purgato, omnia illa adhibeantur, quae possunt illud quā primū purgare, ab oculis diuertere, & humiditatem siccare.

Idcirco instituantur Masticatoria, Natania, Gargarismata. Statim siue Setaceum in occipito, fiant Vesicantia post aures: omnia denique peraguntur, quae possunt caput exsiccare, & crassam materiam attenuare: Quod si ad sit inflammatio nullo genus mittendi sanguinis praetermittatur perfectas venas, per cucurbitulas & scapulis, & occi, pitui, per hirudines post aures, per aperturas narium, venas, & (si fieri possit) per venas quoque angulorum oculi, atque omnes aliae reuulsionēs adhibeantur.

In Phantasmatis, quae fiunt ex ventriculo, praeter victus rationem, quae omnium maximē est necessaria (nam in hoc casu cauendū est à leguminibus omnibus, à caseo, lacticijs, placētulis, acribus omnibus, vino geueroso, & multo potu aqueo, nimia Venere, studio, & somno statim post cibū, & somno facto capite admodum depresso) Praeter haec nihil praestantius frequenti vīu specierū hierae, quā maximē laudat Gal. 4. de locis aff. c. 2. Quantitas sit à drach. ij. ad sem. vnc. pro temperamenti varietate: In robustioribus, & qui habent ventriculum humeribus valde plenum, ego etiam vīu diaphanico hierae cōmisto ad drach. iij. vel ij. Vīu frequenter oxymelite preparato cum absinthio, & in obesis. si oxymel absinthites sit, scilicet, multo praestantius. Vīu deinceps hoc Electuarius ad Phantasmata, & incipien-

tes Suffusiones, quo ego plures & curavi, & praeparavi:

Electuarius est talis:

Recipe Sileris mont.)

Eupragia)

Feniculi)

Anisorum) exsiccat. & pulu.

Hyssopi) rīz. an. vnc. ss.

Pulegii)

Chelidonia)

Ruta

Betonica

Lencl. an. vnc. i.

Cardamomi

Gingib.

Piperis.

Cinamom.

Cymini an. drach. i.

Mellis aut succari q. s.

M. & f. Electuar.

Dosis est à drach. i. vīque iij. summo mane, quatuor horis ante cibum, & vespere in ingressu cubilis.

Sola victus ratio illos sanat oculorum affectus, qui ex spirituum tenuitate, & paucitate, & tunicarum, atque humorum prauitate proficiuntur: In his enim satis est vitu cibo optimi succi, spiritus multos, neque admodum tenues generant, propterea eligantur carnes solidae caponis, phasianorum, perdicis, Vinum sit optimū. Oculi quondie vino etiam odorato lauari solent, aut replendum vas vitreum viridis aut purpurei coloris, quod magnitudinem aequet orbis oculi, vitulum repleatur vino, & oculi in eo temperantur.

Solis medicamentis externis curantur intemperatae oculi atque, materia, ex causis extrinsecis facta, ac minores indurati, qui pupillam augadstringant, aut dilatent, frustra in his casibus corpus ipsū purgatione, aut sanguinis missione colliquatur, sans enim est vnicuique intemperatae contraria adhibere remedia. Calida quidem abluitionem ex aqua rosaceae aut plantaginis, Frigida abluitionem ex vino, aut aqua eupragiae, vel feniculi cum modica aqua (vīta) vitis, Humida inspersione puluerum aut tincturam aloes, aut ossis sapiae, Sicca denique impoſito lacte, decocto maluarum, altheae, aut facto emplastro ex mucilagine lemnium maluae, & altheae cum lacte muliebri, & farina amyli.

Durum tumorem hac ipsa ratione, hoc inquam Linimento poteritis emollire, praemisso tamen fomento ex decocto maluae, bismaluae, & altheae, & semine lini.

Omnia requirunt medicamenta, tam interna quā externa, Hallucinatio, & vnaquaeque Suffusionis differentia, dummodo in membranam nō sit conuersa; haec enim curatur chirurgicis, De internis pauca dicam, nam certum est in Hallucinatione illis agendum medicamentis, quae iecoris, aut lienis obstructiones sanent, nam magna ex parte siue color sit citrinus, siue viridis, aut liuidus, qui Hallucinationem facit, ex horum viscerum obstructionibus proficiuntur, quibus praeterea prospiciendum.

Quod

Quod verò ad Suffusionem pertinet, quæ di- A
cta sunt in superiori lectione procuranda obstru-
ctione nerui optici, conueniunt etiam in Suffusio-
ne facta, siue legitima, siue spuria.

Per spuriam vero, vt dixi, intelligo tunicarū,
& humorum dēfinitatem, spirituum crassitiem, quæ
cum aliquando Nyctalopen, & Myopen faciant,
vt iam ostendi, idcirco vnus est in omnibus curæ
modus, & per Interna, & per Externa.

Nam quod pertinet ad Interna, omnibus po-
test administrari illud meum electuarium.

Quod verò pertinet ad Exteriora, maxima est B
horum sēlva: Dicam autem, quæ mihi præstan-
tiora videntur: Sunt quædam lenia, quædam ve-
ro fortiora.

Inter leniora est inspiratio, seu efflatio in oculo
ab illo facta: qui aut cinamomum, aut fœnici-
culum aut cardamomum, aut piper nuperrimè
masticauerit.

Est quoq; linctus linguz ad huc imbutz suo
co rei manz, siue sit fœniculus, siue quid tale.

Est quoq; aqua panis, quæ aut simplex, aut cō-
posita paratur. Simplex quidem ex solopane re- C
centi calido: Composita ex pane confecto cum
multo sale, fœniculo, euphragia, & ruta.

Ipsæ quoq; aquæ chelidoniz, rutæ, & fœniculi
inter leniora connumerantur: si istis addatur ali-
quid croci, fortius fiet medicamentum: si eligan-
tur succi, erit adhuc efficacius: imò verò chelido-
niz succus propter acrimoniam lactis, aut rosæco
debet commisceri.

Quantum autem possit hic succus ad huiusmo-
di affectiones, docet Dioscorides, qui in lib. 2. ca.
de chelidon scribit hirundines pullos iam oboc- D
catos hoc succo pristinz sanitati restituere. Accep-
it hoc, ni fallor, ab Arist. qui 6. de hist. animal. in
fine, scribit hirundines pullis non ex natura, sed
ex vulnere oboccatiz visum restituere.

Idcirco Gordonius consulit, vt fiat medicamē-
tum ex istis pullis hirundinaceis, vt scilicet eorū
oculi pungantur, vt cæci fiant, postea tunc acci-
piantur, cum iam visum recuperauerint: Paren-
tes enim imposito chelidoniz succo filiolos sa-
niant: Hos vult cremari, & in puluerem redigi, &
cum melle oculis adhiberi.

Mibi hoc consilium non probatur, nam si quæ
est virtus in hoc pullo, est in oculo ratione succi
nuper impositi; itaq; oculus non oboccatiz esset
tantum accipiendus, vñone & si catione tota
virtus consumitur, sed satius est, vt dixi, vt ipso
succo chelidoniz.

Efficacius medicamentum sunt omnes felles
animalium; ex minoribus sunt felles piscium, de
inde vituli, tum bouis, aut tauri, mox verò auium
rapacium, vulturis, aquilæ & c. Isti omnium sunt
efficacissimi.

Vsurpantur aut recentes melle commisti, aut
exsiccati & in puluerem redacti, propterea habe-
ris etiam apud Rhasesa descriptionem Sief. de
fellibus.

Inter efficacia medicamenta est quoq; oleum
ex aniso destillatum, ex fœniculo, aqua destillata
ex cinamomo, & ex caryophyllis.

Sed omnium fortissima aqua erit ista:

Recipe Ammoniack

Bdellij

Opopanac.

Serapim. an. vnc. i.

Flor. aris. drach. vi.

Chalcantbi vnc. iij.

Succi verbena

Euphragia

Chelidon.

Rut. Fanic. an. vnc. ii.

Myrrha

Aloes an. drach. ii.

Tragacanth.

Gumm. Arab. an. drach. iij.

Misc. omnia, & destillentur per alembicum vi-
treum

Tragacanthum & Gummi imponuntur, vt
conferuent robur aculi, neque patiantur, vt ni-
mium dissoluantur tunice & spiritus.

Gummi Opopanacum & c. imponuntur, vt
durum Puntorem emolliant: cetera verò vt for-
titer digerant; propterea est aqua omnium præ-
stantissima.

Sic agendum, vbi ipse sit materiam in oculo
existentem digerere, aut tunicas & humores dē-
fatos rarefacere.

Sed vbi iam humor in membranam sit conuer-
sus, sola depositione curatur, de qua nihil dico,
sed hoc tantum moneo, Medicum ante depositio-
nem duo præstare debere: Primum est, vt vtatur,
& cibis, & medicamentis omnino contrariis illis,
quæ habent vim consumendi Phantasmata, &
Suffusiones incipientes: nam vbi opus est men-
branam deponere, vt tutior sit operatio, oportet
humorem incrassare, & propterea per quatuor,
aut quinq; menses ante depositionem consulunt
Medici, vt patientes vtantur cibis crassis succi, pla-
centulis caseo, lacte, oryza, halica, piscibus, omni
deniq; cibo incrassante: quæ in parte illud vos mo-
neo, laborante vtroq; oculo suffusione, hoc consi-
lium esse accipiendum, si vnus tantum laboret,
nequaquam. Dum enim crassum humorem v-
nius oculi in membranam conueritis, suffusionis
principium in alio inducitis.

Secundum quod moneo est, per octo saltem
dies ante depositionis tempus corpus diligenter
purgandum, sanguinem mittendum, tenui victu
vtendum, & cibis ac potuionibus omnino refrige-
rantibus, ne ex perforatione inflammatio succe-
dat, idcirco pridie absq; cibo sunt continendi, aut
saltem sola pilula vel panacella cum emulsione
semiorum melonum. Cetera pertinent ad istos,
qui deponunt cataractas.

Collyrium in Hebetudine oculorum cū mem-
branæ densatz sunt, & crassatz, de quo Io. Cra-
to à Krafthheim in quodam consilio certam se scri-
bit habere experientiam

Recipe Eupharg. rut. chelid. maior.

Verben. beton an. M. i.

Sem. fœnic. siler. mont. an. vnc. ff.

Rad. calam. arom. drach. vi.

Abjunc. hortens. M. f.

Flor. cymbarefar. an. M. i. f.

Thur.

Thur. Aloes, Myrrh. an. drach. ii.

Aq. ros. lib. ii.

Vin. malu. Aq. rut. an. lib. i.

Urina pueri lib. sem.

Infundantur omnia per dies quinq; postea s. a. destillentur in vase vitreo, ac destillatum vitro bene cooperto seruetur vsui.

DE AFFECTIBVS AVRIVM

Cap. XXII.

TRanseo iam ad symptomata & morbos Aurium, quamvis autem symptomata sint in duplici differentia, dolor scilicet, & actio auditoria vel imminuta, vel sublata, vel depravata, nihilominus horum omnium curationem & naturam sub vno complectar titulo, Auditus scilicet, quous modo laesi.

Læditur autem auditus vel affecto præcipuo organo, vel partibus interuenientibus, vel ipsomet cerebro, aut nervo in principio sui exortus. De affectionibus cerebri aut nervi, quatenus ex cerebro statim ortum ducit, nihil in præsentia satis hæcenus dictum est occasione phrenitidis, lethargi, comatis, carii, & aliarum id genus affectionum. Præcipuum Auditus instrumentum (quidquid alijs sentiant) potest duplex constitui: Vnum susceptivum tantum speciei audibilis, & est Aer implantatus; Alterum susceptivum & iudicativum speciei eiusdem, & est Nervus Auditorius quinq; coniugationis, dilatatus circa antrum, seu meatum, quem cochleam vocant. Cæteræ omnes partes auditui interueniunt: Meatus exterior, Tympanum, siue Misinga, Chorda Tympano alligata, tria ossicula, quorum primum vocant Malleum, secundum Incudem, tertium Stapedam, & Meatus atq; Anfractus omnes, quorum primus est, qui Aerem continet Implantatum intra Misingam, cui succedunt Fenestra, tum Aquæductus, deinde Labyrinthus, mox Cochlea, ubi nervus reperitur dilatatus circa præcipuum auditus organum. In his omnibus partibus varia contingunt vitia: In Aere quidem Implantato contingit intemperies, impuritas, siue crassities, ex permissione vari vaporis, & humoris, defectus ob disruptionem Tympani motus inordinatus vel propter agitationem à causa extrinseca, sonitu scilicet vehementi, aut à causa intrinseca, vapore scilicet aut flatu, quæ corpora dum percutiuntur ad antra, & cavernas propositas, sonitum faciunt in aure perpetuum, propterea depravatum auditum, qui modò acutus est, & sibilus dicitur, modò grauis, & propriè Sonitus vocatur.

Vapores autem, & flatu vel generantur in ipsa met aure, exorde, pure, ex quacunque alia materia, vel conflant à cerebro, sicut in Phrenitide, ut docuit Hipp. & Gale. primo in primum pro. rhet. 18. Aliquando vel à toto corpore, ut in febribus, vel à parte determinata, ut liene, vtero, ventriculo, iecore, laborantibus quouis morbo, siue in intemperie, siue in mala compositione, aut unitate soluta, vel cum lue Venerea, vel sine lue, frequentissimè autem fit hic sonitus cum lue, aliquando critique, aliquando symptomaticè.

Præcipuum Auditus instrumentum, sicut &

A Tympanum, variis subiiciuntur morbis: Intemperiei omni & cum materia, & sine materia, obstructioni à quocunque humore, siue calido, siue frigido, tumorous pariter & inflammatoris, & duris ac frigidis: propterea verò abiectionis, quibus disruptus succedunt ulcera quandoq; sordida, & maligna, quandoq; benigniora, & munda.

Meatus ipsi præcipuè exterior à variis obstruitur causis, quandoq; à sordibus, nonnunquam à corpusculis ingredientibus, pitis, saba, vel alio huiusmodi corpore, aut ex caruncula adnata, vel ex inflammatione, ut dictum est.

Deniq; ipsum Tympanum, Chorda, & Ossicula patiuntur solutâ unitatem, nam Tympanum dissolvitur vel à vehementi sonitu extrinseco, aut ab irrupente flatu interno, aut corroditur ab ulcere: Ossicula verò inuicem colligata seunguntur, & ab inuicem separantur.

Et propter has omnes causas Auditus vel imminuitur, vel tollitur. Imminuitur quidem ex solis intemperantia siue cum materia, siue sine materia; ex moderata obstructione, ac densitate: **C** Neque etiam tollitur auditus, sed tantum imminuitur, læsis illis ossiculis:

Quamquâ enim scio Realdû Columbû cui adhaeret Archang. Piccolom. & Andr. Laurent. voluisse hæc tria Ossicula usq; adeo ad Auditum conferre, ut sine illorum collisione Aer Implantatus sonitum recipere non possint: nugæ tamen sunt, ut ingenuè dicam, Ossicula usq; adeo parva inuicem semper connexa sonum edere internum eo modo, quo fabri ferrarii, dum malleo incudem percutiunt, faciunt hæc Ossicula ad firmitatē Tympani, & ut recta linea sonus deferatur da Fenestras, Aquæductus, & alios Anfractus, non ut ipsa sonum edant, & propterea etiam si quispiam aures obstruat, & nihil per aures audiat, lignum tamen, aut ferrum in os imponat, quod cytharæ, aut alii instrumento insit, sonus instrumenti percipitur, delato huiusmodi sono per internum oris meatum usq; in aurem, in quo casu ossicula nullo modo moventur.

Et posteaquam de hac re facta est mentio, moneo vos, hoc esse signum certissimum, quo potestis distinguere affectiones Tympani, & Meatus Exteriori ab affectionibus Nervi Auditorii, & Meatus Interni: nam ubi Nervus Auditorius, & Meatus Internus afficiatur experimento iam dicto, nullus percipitur sonus, sed in affectione Tympani, & Meatus Exteriori sonus percipitur.

Faciunt autem absolutam Surditatem obstructio completa, densitas insignis, ac tumor durus siue Nervi Auditorii, siue ipsius Tympani.

Signa.

FAcilè cognoscuntur affectiones Meatus Auditorii exterioris: nam sensibus parent, aut saltem imposito stylo: Affectus verò partium internarum ab ipso Tympano distinguitis, partim proposito experimento, partim etiam aliis signis: Inter quæ hoc est maximum, quod scilicet qui Sardi sūt propter Nervi affectionem, etiam si fuerint tantum Sardastru, habent quoq; lingue motum impedi-

Impeditum. Ratio est quia neruus quintæ coniugationis ramulum mittit in linguam, qui inferius in neruum septimæ coniugationis facit ad motum linguæ, atque ideo affecto neruo, coafficitur lingua. Vbi verò Tympanum sit affectum, neque tamen, Surditas sit completa, isti opumè loquuntur: Qui verò profus Surdi sunt à naturate, siue ex Neruo, siue ex Tympano aut alia quacūque causa, hi etiam necessariò muti sunt, nō propter neruum, quintæ coniugationis, vt voluit Andr. Laur. sed quia Auditus est sensus discipline, vt qui non audiunt, neque articulas voces profere possint.

Affectiones sic facillè distinguuntur: Inflammatio quidem siue Interna, siue Externa, cognoscitur ex dolore omnium vehemenissimo, ex calore, ex febre: & si fuerit externa, neque instillationem medicamentorum absque dolore sustinet: si fuerit interna, ad sunt deliria, quandoque conuulsiones, & vigilie intensissimæ, & iniecta nullum inferunt dolorem.

Obstructio cognoscitur, quia sit subitò, & Auditus tollit absque febre: Intemperies autem paulatim succedit: Vtrum sit frigida an calida, ex aliis propositis signis poteritis colligere, sicut etiam facillè poteritis intelligere, nunquid surditas, vel Aurium Tinnitus fiat ex calida, aut frigida materia, & vel ex ipsa aure affecta, in quo casu sola Auris patitur: an potius ex cerebro, in quo casu, & alii sensus, & motus, ipsæ etiam actiones principes viuuntur: an denique per consensum, in quo casu dolor habet interualla, augetur, & minuitur, a suntque signa aut totius corporis male affecti, aut alterius partis laborantis.

Vlcus patet ex sanie, & si fuerit malignum sanies est viridia, fetida, sanguini nigro, & putrido commista.

Prognostica.

Inflammatio est morbus acutissimus, & in septima die consuevit iuuenes interficere: seniores verò non ita quidem interficiuntur, sed omnes tamen fatigant: nam delirium & conuulsionem affert, & in senioribus in abscessum transit, & residuum facit, vt docuit Hip. & Gal 3. prog. 13. & 14. Si transeat in scirrhum, est insanabilis, sicut in sanabilis etiam est Surditas, ex disruptio Tympano, aut Neruo Auditorio, aut euacuatio Aere Implantato: antiqua etiam, vt Rhazes scribit, duorum annorum, insanabilis est: sed hac in parte respiciendæ sunt causæ: nam ego aliquando sanavi surditatem, & annorum. Itaque naturalis Surditas est quidem insanabilis, si uel & illa, quæ sit ex carne adnata intrinseca: Quæ verò ex obstructione, & intemperie cum materia, quamuis antiqua, si recto tractetur, sanari potest. Tinnitus Aurium ex Lue Venerea ipse quoque rectè admodum curatur, consuevitque omnia spernere remedia, cum antiquus fuerit, excepta inunctione hydrargyri: hac ipsa enim ego antiquos sanavi Aurium Tinnitum.

Curatio.

In curandis Aurium affectionibus ab Inflammatione exordiat, & quod pertinet ad euacuationem totum corpus, & caput, siue sine medicamento, siue sine sanguinis missionibus, pauca admodum dicam. Idipsum enim in Aurium Inflammatione faciendum quod & in inflammatione oculorum, vt scilicet pluries mittatur sanguis, & per se tam venam è dextero parus laborantis, & per hirudines, & per cucurbitulas, atque etiam per nares. Ad deriuationem conueniunt etiam hirudines post aures: itaque versabor circa Localia.

In primis considerandum, an Inflammatio sit in Meatu Exteriore, & Tympano, an potius in Neruo interiore: Si fuerit in Meatu Exteriore, accipiedum Galeni consilium 3. comp. per loc. cap. 1. vt scilicet medicamenta non adhibeantur, neque per injectionem, neque per instillationem, sed tantum per leuem quandam infusionem: addo & per euacuationem: atque per modum linimenti: nam quæ iniiciuntur, aut instillantur, dolorem augent: Infunduntur autem aut oleum violac. vel rosac. aut lac muliebre vel simplex, ac nuper emulsum aut mistum cum succo plantaginis, aut simili succo: Conueniunt etiam in hoc casu, & maxime sunt accommodati in huiusmodi inflammationibus millepedes, illa animalcula, quæ sub valis tepentur: hæc incoquantur in olio rosac. oleum autem rosac. imponatur in cortice mali granati: oleum sic decoctum imponatur in aures. Valent etiam hoc tempore circa initia decoctione factæ ex cochleis cum suis testis in aq. plantag. aut portulacæ. Evaporatio potest fieri ex decocto eiusd. plantag. portulacæ, cochleis, atque asellis, illis, siue millepedibus, de quibus supra. Linimentum exterius accommodatum fiat ex albumi ouis, farina hordeacea, oleo rosato, aut violato.

Sed ubi inflammatio sit interna, his reprimendis acetum vultus permiscetur. Hæc est sententia Galeni loc. cit. lib. 3. de comp. loc. ca. 1 præbet enim acetum penetrationem, neque audiendi sunt Recentiores quidam, qui vltum reprimendum in his casibus reprobant, quod materia repereussa in cerebrum vel alias nobiliores prout datur partes, nullum maius periculum homini imminere potest quam magna ipsius Nervi Auditorij inflammatio. Auditis Hipp. 3. prognos. 13 & 14. docentem, inflammationes istas delitium, & conuulsionem inferre, & iuniores septima die interficere, itaque reprimenda est omnino materia. Transacto principio circa incrementum adeps anserinus, aut gallinaceus aut oleum amygdalinum dulce infundendum est. Lan. succida auris contegenda est aut emplastro facto ex mucilagine radicum altheæ, farina hordeacea, & seminum lini, prædicto oleo & pinguedinibus commista.

In statu dimittenda est farina hord. & vt iuuenior suppuratio emplastro addenda erit farina seminum lini cum radicibus altheæ coctis, cribatis, & opumè contritis.

Ad disruptionem imponendum est stercus columbinum, atque excitandum sternutamentum, Pitru.

Disrupto abscessu vlcus deinde est sanandum, primum quidem iniectione mulsæ, deinde insper- sione pulueris ex ruta, myrrha, aloë & thure. Si fuerit sordidum, abluatur aqua hordeac. mulla- sum oxymelitæ scyllitico, aut cum modico vin- guento Aegyptiaco. Ad siccationem vitamini in- stillatione aquæ thermalis, potissimum In defectu aquæ thermalis potest præparari aqua alterata cum alumine, thure, myrrha, & aloë, in- spargendique sunt iam propositi pulueris.

Quod si his non cesset morbus, probauit Gal- medicamentum factum ex scorïa fœti, pulueriza- ta infusa in aceto, & exsiccata. Recenti oves lau- dant, ut hæc infusio & siccatio septies fiat: Potis- simum erit medicamentum ad sanandum om- nium vlcera omnia. Sic tractatur aurium inflama- tio cum fuerit interna.

Hoc dico propter Paroidas, quæ sunt post au- res, in quibus nunquam ab initio conueniunt Re- primentia: imò si magnæ fuerint, naturæ opus perueniunt, si paræ, auribus vitandum.

Venio ad Interperies, Obstructiones, atque alios humores frigidos. De calida intemperie nihil dico, curatur illis ipsi refrigerantibus, quæ pro- posita sunt in principio inflammationis: Frigi- dam verò intemperiem mirificæ corrigat aut oleû in quo ebullierit castoreum; emplastrum conse- ctum ex cæpa sub cineribus cocta; aut euaporatio quæ fit per orificium vasis oleum chamomelinæ continentis, calfacti ad ignem: & si huic intem- peraturæ Flatus cõnectantur, qui Sibilum, aut Tui- nitum faciat, conuenit ipsi oleo chamomelinæ amygdalini amatum addere, cyminum, rutam; extrinsecusque apponere sacculum repletum aniso, feniculo, cymino, sale, & chamomelo contusis, & calefactis.

Ceterum in antiquo Tinnitu, nihil erit prestati- us hoc medicamento:

*Recipe Euphorb. drach. i.
Radicum cyclam. drach. ij.
Cymîn. Anis. an. vnc. ss
Ol. amygd. amar. rutæ an. drach. i. sem.
Vin. alb. odor. vnc. ij.
Aqua ardent. vnc. i.*

Bull. ad consumpt. vini & aquæ; deinde oleum E infundatur:

Post oleum conuenit gossypio muscato autem ipsam implere. Illud autem notandum circa hæc medicamenta, quæ iniiciuntur, semper debere esse repida, & singulis tribus, aut quatuor horis au- rem esse inundandam à priore medicamento, at- que nouum infundendum.

Quod si Obstructio, aut Durus Tumor adsit, emollientibus primò agendum, & erimò suffu- migationibus, seu euaporationibus, deinde inie- ctionibus, & emplasteis: Potestis sic incedere.

*Recipe radic. bryonæ.
cucum. syluest. an. sem. vnc.
pulpæ colocynth. drach. ii.
Elleb. nigr. drach. i.
radic. cyclam. vnc. i.
Puleg. Calament. Orig.
Maluarum an. M. ss.
Bull. simul, facta express. ex prædict. de-*

cocto si, & euaporatio, aut fumus per infundibulum in aurem recipiatur.

Ex reliqua materia f. emplastr. quod extrinsec- cus Auri superponatur. Hoc medicamentum mi- rificè attenuat, & emollit, cui succedi deinceps aliud, quod digerat. Digerit autem præ ceteris omnibus oleum raphaninum, & huiusmodio- leum, quod vobis propono.

Recipe Euphorb. Castor. an. drach. sem.

finan. drach. i.

radicem cyclam. sem. vnc.

Cinam. sem. drach.

Ol. rut. chamom. an. vnc. ii.

Aqua ar. vnc. ij.

Bulliant ad consumptionem aquæ, & de- inde vixit oleo iam propolito per in- stillationem.

Qui non superat frigidas affectiones his medi- camentis extrinsecis iam propositis, neque alius superat- re poterit: Consulo tamen, ut ad hæc non deuie- niant, nisi purgatio accuratè toto corpore, & ca- pite: & pro purgatione mirificæ valent pilulæ Arab. Et si in aliquo affectu capitis Sternutatio- ria, & Gargarismata, ac masticatoria locum ha- bent, ac mirificæ profunt, profunt sanè in affecti- bus Aurium.

De causis extrinsecis amouendis pauca sunt dicenda. Nam Rhases noster in omnibus ferè istis casibus laudat sternutamentum, sed si animalcu- la ingrediantur, præter sternutamentum possunt etiam educi multo liquore in aurem intulo, & postea capite in laborantem partem concussio: Si vermes adhuc, faciliè necantur factio collyrio ex succo absynthii, aloë commisto. Denique si sit fa- sia, aut pilum, hoc moneo, ne aliquid humidum iniicias: nam hæc dilantur, & maxime infe- runt dolores. itaque potius siccis medicamentis vitandum, aut suffumigationibus, aut si hoc cor- pusculum videatur, stylo ignito per cannulam fer-ream imposito primum exsiccabitur, postea facti- le extrahetur. Hæc laus de Affectib. Aurium.

DE AFFECTIBUS NARIVM, Cap. XXIII.

Nasus, qui à natura conditus est & pro inspi- ratione, & pro Olfactu, & pro purgandis ce- rebri excrementis, ut faciei detorem prætermi- tam, duo potissimum symptomatum genera pa- tiunt: Alterum quod pertinet ad actionem Olfac- toriam imminutam, ablatam vel deprauatam, Alterum verò, quod pertinet ad excrementa im- modicè fluentia, sanguinè scilicet ex naribus im- modicè excurrentia. Dicam primò de affectioni- bus Odoratum ludentibus, verba deinde factu- rus de Sanguinis Fluxu.

De Leso Olfactu,

Imminuitur, aut tollitur Odoratus, repleto aut obstructo vel meatu aliquo, vel partibus Odo- ratur inferuentibus, Sunt autem meatus primo ampli & patentes narium scilicet, in quibus sunt tumores duorum generum, Alii qui extra nares pendent,

pendent, & Polypi vocantur: Alii intra nares A
inclusi, qui Sarcomata dicuntur. Minus patentes
meatus illi sunt, qui ad os ethmoides spectant,
quod Gal. 3. de loc. aff. 4. vocauit Cola (colato-
rium) habetque meatus in parte superiore ad si-
militudinem cribri: idcirco Cribroides dicitur: si-
cati in parte infera propter similitudinem spon-
giæ Spongoides vocatur. Obstructio in his locis
Olfactum imminuit, aut tollit; quod ipsum fit,
vbi aut membrana huic ossis propinqua est affecta,
aut ac in osse cuneiformi vocato, quod in fronte
reperitur, imputus redditur, aut caruncule ma- B
millares, & neruus in illas insertus, ac ventriculi
prioris multa imbuuntur materia, vt potestis col-
ligere ex Gal. primo de caus. sympt. 4. Est autem
hæc materia magna ex parte pituitosa, quando-
que tamen purulenta, vt grimus sanguinis, aut
materia melancholica, quandoque putrida, in
quo casu deprauatur etiam odoratus, quia sæpe
semper percipitur, aut non putrida, in quo casu
diminuitur tantum, vel tollitur. Fluit autem vel
à cerebro, vel à toto corpore, vel à determinatis
partibus, & retinetur propter obstructions, vel C
tumores iam dictos.

Ceterum quod ad tumores pertinet Sarcoma
scilicet & Polypum, hic multiplex est; quidam
enim est membranofus, qui etiam Vesicalis iure;
dici potest æmulatur enim vesicam, & propte-
rea dum fit efflatio, intèditur, dum fit inspiratio
retrahitur: alius est pituitosus, qui facile cogno-
scitur, quia indolens est, albicans, perpetuo mado-
re refertus; alius est melancholicus, & hic du-
plex, alter induratus, vt percussus sonum edat, al- D
ter cancerofus, qui carnes habet nigricantes, tumi-
das admodum dolore, & inflammatione refertas;
quandoque hic vlceratur, & huiusmodi vlcera si-
ne Polypo Ozenæ dicuntur; cum Polypo dicen-
tur Polypus Cancerofus.

Ozenæ autem quedam sunt crustosæ, aliæ
non crustosæ & tumidæ, & quedam malignæ,
quedam benignæ, aliæ profundæ, & cum carie
ossis, aliæ verò superficiales, & in summis Varii
pinnis; suntque omnia hæc vlcera auctoritate
Gal. 3. de comp. loc. 3. ex fluxionibus humorum
vitiosorum, & acutum, vel ex cerebro, vel ex aliis E
partibus.

Signa.

Ex signis iam propositis facile cognoscun-
tur, sicuti etiam Obstructio deprehenditur
ex imminuto, aut sublato Odoratu sine dolore,
ac tumore villo: at vbi obstructio sit in osse eth-
moide, vox ipsa vitatur, vbi supra ipsum os, vox
nihil patitur.

Prognosis.

Ex istis affectibus Polypi, & Ozenæ malignæ
vsq; adeo difficilem habent curationem, vt
Cancerofis grauioribus medicamentis minimè
sint tractandi, à leuioribus tamen nullum sen-
tiunt emolumentum Illi potissimum insanabi-
les, qui vsq; adeo interni sunt, vt meatum illum
occupent, qui tendit à Naribus in os, quod ipsum
dico de vlceribus.

Curatio.

Horum omnium curatio primò quidem pe-
tenda est à purgatione totius corporis, &
capitis, à reuellentibus, & deriuantibus medica-
mentis, cuiq; humori accommodatis, de quare
nihil dico amplius, sed statim venio ad Localia.
Itaq; pro Obstructione tollenda tria veniunt hoc
ordine peragenda: Primo fiet Euaporatio ex hu-
iusmodi decocto:

Recipe radic. cyclam seml vnc.

Bryon. Cucum. syluest. an. drach ij.

Elleb. nig. Colocynth. an. drach. i.

Iunip. Centaur. an. M f.

Bull. simul in f. q. aq. & aceti, & sumus recipia-
tur in vtramq; nares.

Post suffumigationem idem decoctum in na-
res recipiendum est: nam euaporatio humores
crassos attenuat, attractio decocti eosdem expur-
gat, & per os, & per nares. Post purgationem sic-
ca quedam suffumigatio adhibeatur, aut ex ari-
dis, & odoratis cum succo calaminthæ, aut centau-
rez commistis, flinimentum, quo nares intrinse-
cus illinantur. Suffumigium, vel linimentum fiat
aut ex trochiscis hedy. broi, aut ex aloë, myrrha,
thure, croco, cinamomo, & caryophyllis.

Neq; quispiam obiciat: sternutamentum in
affectis naribus minimè conuenire, quod scripse-
rit Gal. 1. 3. meth. c. ij. humores per partem labo-
rantem ducendos non esse intelligenda est. n. Ga-
leni sententia de humoribus, qui vel in capite, vel
in toto abundant corpore; isti enim reuellendi,
& deriuandi sunt. Sed impacta & in herens ma-
teria ipsa quoque sternutamentis est expurgata,
sicuti etiam inflammatio facta aut scarificatione
aut abscessus punitione.

Quod ad Polypos, si exiles fuerint, & angustū
habeant pendiculum, excidendi sunt aut ferro
ignito, aut si ferrum non sit ignitum post exci-
sionem vltio adhibenda est.

Cancerofis Polypis neque manus chirurgica,
neque actia medicamenta sunt ad mouenda: satis
ex dolore lenite, aut fluxum, & incrementum
prohibere. Hoc præstabitis tali linimento.

Recipe succi omnium granat. vnc. i.

cern. lot. sem. vnc.

lithargyr. pulueriz.

plumb. vst. an. drach ij.

puluer. rosar. drach i.

succi Lenticulæ palust.

Vermicularis, solam an. q. f.

M. & f. Liniment. in mortario plumbeo
cum pistillo plumbeo.

In mitioribus, que excidi non possunt, vitami-
ni medicamento à Gal. proposito 3. de comp. per
loc. cap. 3. quod longa experientia inuentum est
multæ vtilitatis: est medicamentum confectum
ex succo trium granatorum; primò ex primitur
succus ex grani, postea cortices tunduntur etiam
in pila; ex vtroque succo aut simplici, aut misto
cum puluere rosarum, fit medicamentum ad Po-
lypos, & ad narium vlcera, quæ crustosa non sint
neq; maligna.

Nam crustosa debent primo tractari medica-
mentis

mentis crustam amouentibus, ut est butyrum, seu unguentum rosaceum, & pomata vocata: Sublata iam crusta medicamentum propositum conuenit, ut fortius exsiccat, coquatur lento igne in vase aeneo: si fortius adhuc volueritis medicamentum addatis lythargyrum, & cerussam.

*Urina
Asini.*

In malignis vlceribus opus est diligenti lotione, sit autem haec lotio, attrahit in nares aut lixiuio, aut aqua salsa, vel alia thermali simpliciter, aut melle mista: sordidum sed efficax medicamentum est urina asini. Ego consueui in his casibus parare stillatitiam aquam, quae simul & semel abstergit & exsiccat, ac putredini vehementer resistit. Compositionem huius aquae habetis apud Pharmacopolam sub tribus syderibus.

<i>R. Sals. parill. elect.</i>	<i>Scordij M. ij.</i>
<i>Ligni Indis. pinguis an. lib. ij.</i>	<i>Calendula.</i>
<i>Corticis eiusdem lib. i.</i>	<i>Pimpinella.</i>
<i>Vini alb. montan. lib. xij.</i>	<i>Serpent. Maior</i>
<i>Aquat. Betonica.</i>	<i>Salvia.</i>
<i>Salvia.</i>	<i>Hyssopi.</i>
<i>Scabiula.</i>	<i>Stoebad.</i>
<i>Fumarij.</i>	<i>Distamni.</i>
<i>Cichor.</i>	<i>Melissa.</i>
<i>Sem. iuniper.</i>	<i>Agrimoniae an. M. S.</i>
<i>Hedera.</i>	<i>Theriac. ferment.</i>
<i>Bacc. lauri an. vnc. ij.</i>	<i>Mitridat. an. vnc. ij.</i>

Guaiacum, salsa, & cortex infundantur in media parte vini, & aquae per horas xij. Cetera vero conquassentur per horas sex in reliqua vini & aquae potione, deinde omnia permisceantur, & destillentur in duplici vase vitreo sa.

Post lotiones in Malignis Vlceribus vtebatur Et Gal. pastillis Andronis, Phasionis, Musae, & ceterorum. Sed ego vii soleo cinnabari misto cum thure, myrrha, cypero, squinantho, atque alijs id generis aromantibus, ex quibus cum carbone salicis conficitur formula quaedam in modum illarum rerum, quae vulgo dicuntur oselleti di Cipro.

Suffumigij descriptio talis est.

Recipe Syracis liquida

<i>Belzoini an. drach. vi.</i>
<i>Ligni aloes drach. vij.</i>
<i>Thur. alb. vnc. i.</i>
<i>Laudani vnc. i. sem.</i>
<i>Iridis, Caryophyllorum an. drach. ii.</i>
<i>Rosae Damascen. drach. iij.</i>
<i>Cinnabaris vnc. ij.</i>
<i>Carbon. Silicis lib. s.</i>
<i>Aqua vit. q. s.</i>

M. f. formula longa, ut magis ignis in hoc suffumigio accensus perduret.

Ita curantur vlcera sanabilia.

Qui vero profitentur curare Polypos, & Vlcera existentia in meatu tendente à naribus in os, mihi videntur longe ab omni ratione declinare. Volunt illi filum accipere nodis plenum, & illud filum ducere à naribus in os, & hac ratione ducendo illos nodos Polypum consumere: componendo autem medicamenta vlcus exsiccare. Est consilium auarum, nescio quis possit hac praestare.

DE HAEMORRHAGIA id est Profluvio Sanguinis ex Naribus. Cap. XXIV.

Sanguinis ex Naribus Excretio, quandoque ita superabundat, ut quomodo scribit A. mat. Lusitan. centur. 2. curat 100. & Brasauol. in comment. sup. 2. aph. 5. part. & Matth. de gradib. 9. ad Alman. aliquando spatium duorum aut trium dierum ad 20. libras fuerit excretus, ideo symptoma est, quod ad se curam trahit.

Causae.

Est autem hoc symptoma vasis narium quodvis modo reteratis. Per vasa intelligo venas & arterias superiores & inferiores, superiores quidem quae sunt supra os ethmoidem inferiores, quae sunt sub osse, & in narium plinnis. Reseratio autem triplex genere est Diuresis, Anastomasis, Diapedesis, nomine Diuresis amplector & simplicem erosionem, quae proprie Diuresis dicitur, vel rupturam & incisionem, quae Rhexis appellatur, siue fiat à causa externa, casu, contusione, vulnere, siue ab interna, ut abscessus in cerebro disruptione. Anastomasis sit magno aliquo vase secundum proprium officium dilatato. Dilatio fit vel à sanguinis copia, vel ab acrimonia, vel ab utraque causa. Abundat sanguis vel in cerebro primaria ratione, vel confluit in cerebrum à toto, ab hepate, corde, liene, suppressis mensibus, & haemorrhoidibus. Redditur vero actis hic sanguis ex calida intemperie, potissimum cum febre ardente, ex viscerum inflammationibus, & obstructionibus. Diapedesis sit aut per transcolationem sanguinis, quae fit vel ob raritatem tunicae, vel ob sanguinis tenuitatem, aut sit aperto aliquo officio vasis alicuius parui. Laxitas & raritas vasis consequitur humidam intemperiem: Tenuitas similiter consequitur abundantiam serosi sanguinis, quodalis generari consuevit in Hydrope & Cachexia. Ex dictis patet, sanguinem hunc quandoque excerni symptomaticè, aliquando criticè: febres enim ardentes, & inflammationes plurimae per Fluxum sanguinis Narium iudicantur.

Signa.

Cognoscitur autem sanguis fluens ex venis ad differentiam arteriarum, quia ex arteriis profluens cum salu quodam excernitur. Distinguitur venae, & arteriae superiores ab inferioribus, quod ubi ex supernis excernitur, simul & semel per os & nares educitur: ubi ex inferis, per nares tantum. Rhexis ex causa externa, ruptura, aut incisione sola relatione cognoscitur: quae vero sequitur abscessus, rupturam, deprehenditur ex praecedentibus signis phrenitidis, vel tumoris. Diuresin ex humoribus actibus cognoscitis ex puritate, ex calore, ex sanguine, cum insigni quadam nigredine, aut rubedine, & quia primo sensum

sim educitur, postea verò in maxima copia. Cognoscitur Anastomosis ex copia sanguinis in pectore corporis habitu carnosior, ac venis latis, & turgidis donato, & si primò ex capite excernatur, facies semper est rubra, nares, & oculi capitis dolor præcipuè pulsatilis, grauitas insignis: Si ex liene, tumor ad est lienis, & ex sinistra nare excernitur; sicuti si ex iecore, ex dextra excernitur: In eo autem qui vitio hæmorrhoidum vel vteri euacuantur, suppressi sunt menses & hæmorrhoides.

Nō est difficile cognoscere sanguinem ex propria sui, aut vasis tenuitate exeuntem, quandoquidem continuè emanat, sed in pauca copia, & decolor est, subtilis, subsistens in capite, ut dixi, ad cachexiam, & hydropem propenso.

Distinguitur Criticus à Symptomatico, quod Criticus fiat cum concoctione, in die critico, prænuntiato ab alia die indicatorio, & sit per directū partis laborantis, in moderata quantitate, & iuuat ipsū patientem: propterea dicebat Hipp. 6. aph. 17. Caput dolenti, & circumdolenti &c. Idipsum docet 4. Aph. 60. vnde etiam 5. aph. 74. hunc Criticum sanguinem, inquit, à tumore & ab scissus liberare: Et quamquam 4. aph. 25. scripserit sanguinem ex supernis partibus exeuntem, vnde quoque exierit, malum; Galenus in comm. excipit sanguinem ex naribus fluentem, neque ipse Hipp. omnem sanguinem ex naribus prodeuntem malum esse existimauit, qui scribit 5. aph. 37 in suppressis mensibus hunc ex naribus prodeuntem bonum esse.

Prognostica.

Si autem ultra modum excernatur, quandoque ad Hydropem, quandoque ad mortem ducit. Scribit Alex. Bened. 4. de cur. morb. 4. cuidam ex secta vena naris interna forcipe sanguinem esse euacuatum, qui nunquam suppressi potuerit, ut eadem patientem interfecit, quod sanè fuit maximum, venam patentem & proximam conglutinari non potuisse, cum tamen hæc difficultas in illis tantum sit, quæ superiores sunt.

DE SPUTO SANGUINIS.

Cap. XXV.

Coniungam tractatum de Sputo Sanguinis cū tractatione de Fluxu sanguinis Nariū: non enim differt multū natura, aut curatio vniū symptomaticis ab alia. Itaque explicata natura & causis, atque etiam signis fluxus sanguinis nariū in præsentia ea tantum notabo circa sputū sanguinisque peculiaris huius symptomaticis sunt.

Notanda singularia de Sputo Sanguinis.

Differt primò symptoma, inquit, Fluxus sanguinis Nariū sola copia est symptomaticus, sed ipsum sanguinis symptoma est, non modò ratione copiae, sed & temporis, & modi, & qualitatis sanguinis exeuntis, qui aliquando simplex est, siue biliosus, siue melancholicus, siue purus, aliquando est purus, aut alteri humori cōmixtus.

Differt etiam loco: Sputum enim sanguinis ex loco sit multiplici; aliquando ex denubus nō-

nunquam ex faucibus, quandoque ex capite, non raro ex ventriculo, sæpius ex thorace, de qua Exspuitione in præsentia est sermo.

Nomine autem Thoracis intelligo Asperā Arteriam, Pulmones, Mediastinum, Cavitatē Thoracis, & Pleuram, ac Musculos Interiores.

Est quoque aliqua in causis differentia: nam quod ad proximam pertinet, quamquam Sputū sanguinis, sicut & Fluxus sanguinis Nariū fiat vel per rhexin, & diæresin, aut anastomosisin, & diapedesin, nihilominus circa causam diæresis vnum est notatu dignissimum, aliquando scilicet fieri in Pulmonibus diæresin absque materię acrimonia: hoc libenter propono propter illos Medicos, qui cum interrogant patientes sputo sanguinis laborantes, nunquid in catarrho salum aut acrem percipiant saporem, si ab agris intelligat, nullum esse acrem saporem, statim pronuntiat sanguinem ex Thorace ac Pulmonibus exspui non potuisse. Contra hos est Gal. qui 3. de caus. sympt. 2. erosionem inquit fieri non tantum ex humoris acrimonia, quantum ex putredine: & propterea apertissimis verbis, atque clarissimis exemplis 4. d. loc. aff. 8. docet, plerumque Tabidos factis Sputo apparente minimè acris, & quod ab initio nihil mali polliceri videbatur, quos tamen omnes interiisse scribit Gal. Itaque fieri potest, ut sicut in externis corporibus putrescente carne, & vasis in ea contentis sanguis excernatur, ita quoque in Pulmonibus putris materia, sed non acris, Pulmonis vasa putrefaciat, & erosione consumat, ut sanguis excernatur. Circa causas remotas hoc etiam animaduertendum, Sputum sanguinis ex vehementibus clamoribus, & luctatione, & ponderis gestatione facilius excitari, quam Fluxum sanguinis Narium. Hæc circa causas videntur notanda.

Signa.

Circa signa distinguere oportet Locos inter se, & affectiones ex quibus & propter quas Sanguis Exspuitur, itaque quod excernitur simplici exspuitione, sit ex dentibus & palato; quod sputum sit secretum, ex faucibus descendit; Vomitione ex ventriculo; Tussi autem ex Thorace.

Nunquid primariò descendat ex thorace, an potius transmittatur à capite in Thoracē, & postea tussi erigatur, id quod pluries fieri docet experientia, & Galen. 4. de loc. aff. 5. in princip. hoc opus, hic labor: Sic tamen distinguemus. Vbi ex Thorace primò effluit sanguis, aut excernitur in magna copia, aut in pauca; si in magna, videndum an aliquid excernatur per nares, vel non, & si per nares, videndum est an primus sanguis excretus fuerit per nares, an per os: propterea, an sit concretus, vel non, nam si prima excretio fiat ex naribus potius quam ex ore, si sanguis fuerit minimè concretus, si talis exeat, qualis ex nuper aperta, vena, præcedente capitis dolore, grauitate, faciei & oculorum rubedine, certum est signum sanguinem quamquam Tussi eiectionem ex capite in Pulmones descendisse.

At verò si prima excretio fiat per os, si sanguis ex naribus effluens sit grumulosus, & nigricans, si

cessit casus, aut clamor, aut percussio circa Thoracem, aut longa Tussicula, vel Acris Destilatio-
suspicandum ex Thorace prodire.

Ceterum dum ex Thorace sanguis excernitur si ex Aspera Arteria educatur, paucus est, & ex leui Tussicula statim educitur, & ubi erosio sit magna, dolor in glutitione sentitur, ac per eam *spuma*, seu portio asperæ arteriæ simul cum sanguine educitur.

Si ex Musculis Thoracis, aut Pleura; sanguis pariter est paucus, & non nisi cum magna Tussi reijcitur, & cum dolore partis, à qua excernitur; B magna ex parte nigricat, & grumosus est.

Qui ex Pulmonibus, copiosus effluit, ruaber ac splendor, sine dolore. Spumæ tanquam certo sanguinis ex pulmonibus exeuntis signo minime fidendum: quamvis enim Hipp. & Gal. 3. de hum. mor. 3. 1. aperte docuerint Spumofum sanguinem ex Pulmonibus esse, quod etiam repetit Hipp. 5. aph. 13. attamen Gal. in comment. proposito 13. scribit, non omnem sanguinem ex Pulmonibus exeuntem, Spumofum esse, sed illum tantum, qui est cum ulcere pulmonis; imò verò 7. aph. 30. addit, non solum sanguinem ex Pulmonibus exeuntem Spumofum videri, sed aliquando etiam in Pleuriide Spumofum fieri, itaq; sanguis multus & Spumofus ulcerati Pulmonis est signum; Multus non spumofus valis apertionem significat sine ulcere, cum dolore autem significat vlcus Pleuræ.

Prognostica.

Huiusmodi Sputum ex Aspera Arteria, atq; ex Thorace eiectum, ex Musculis intelligo thoracem, quamquam non facile, ut tamen magna ex parte curatur.

Sed quod sit ex Pulmonibus, ubi inflammatio rupturæ, aut vlceri superueniat, omnino insanabile est, hoc docuit Gal. 5. meth. 8. sed si inflammatio vlceri Pulmonis non superuenerit, casus non est deploratus, imò nonnullos sanitati restitutos docet Gal. loc. cit. & aphor. 17.

Curatio tam Hemorrhagiæ, quam Hemoptoi.

In curando hoc Sputo, & Fluxu sanguinis, proponam auxilia, & eorū materias, primò vniuersales communes, deinde vnicuique proprias: & quia auxilia per indicationes hauriuntur, indicationes verò sunt multæ, partim quidem ab ipso symptomate acceptæ, partim à causis desumptæ, quæ faciunt symptoma, partim à morbis venarum, vel arteriarum, quos parit ipse sanguis confluens, idcirco in his omnibus sigillatim versabimur.

Sanguis itaque quatenus impetu quodam mouetur, indiget reuulsione, deriuatione, reprimentibus, & interceptantibus in via.

Reuulsio multis sit modis, duo tamen ceteris præstant: Venæ sectio & cucurbitulæ. Secatur venæ è directo partis, à qua sit fluxio: ex nare etenim dextra reuellitur sanguis secta vena in cubito dextro, & sinistra in sinistro, sic docente Galen. lib. cur. per sang. miss. c. 21. & 15.

Quando autem sanguis fluere propter suppressos menses, aut hæmorrhoides, aperiantur venæ fedales, aut prouocentur menses, vel sectis venis infernis, vel eruris scarificatis Cucurbitulæ illi potissimum partis adhibita, à qua incipit fluxio, insigniter reuellunt, sic scribit Gal. loc. cit. cucur

bitulæ jecori affixæ fluente sanguine ex nare dextra, aut lieni fluente illo ex sinistras, sanguinem suppressum.

Veniunt plerique ligaturis, hæc minus probatur licet à Gal. proponatur 5. meth. 6. Ligatura. n. cum primò; soluitur, caput implet, partesq; omnes, ex quibus sanguis fluit, quia sanguis sub ligatura retentus, vinculo soluto, effrenis factus in imbecillum labitur locum: idcirco Oriabasius, & Aetius, & Auicenna ligaturis vtuntur ad somnū conciliandum, non aliam ob causam, quàm quòd vinculo soluto, caput ipsum repleatur.

Ad deriuationem fluente ex naribus sanguine laudat Gale. locis cit. cucurbitulam occipiti affixam, siue sit scarificata, siue non.

Reprimentia, tametsi multæ sint utilitatis, cautè tamen sunt administranda, & vt dicebat Gale. 5. meth. 6. nūquam ante euacuationes totius corporis, & repetitas reuulsiones: in quo casu profluxu sanguinis Narium valet linimentum frōti appositum ex succo semperuiui minoris, aut portulacæ cum albumine oui & puluere rhois rubri, rosarum, & sanguinis draconis.

Thoraci autem conuenit auctore Gal. 5. meth. 8. ætate oleum myrtinum suæ de cytonijs, hyeme nardinum; sed cum fluxio vrget, nullum conuenit calidum medicamentum. Dicebat Hipp. 5. aph. 19. omnia refrigerata, calefacienda, exceptis istis, ex quibus sanguis fluit, aut fluxurus est: & propterea in hoc impetu sanguinis, Thorax erit etiā illiniendus prædictis succis & pulueribus; ne tamen nimium refrigerentur partes spirituales, admittendum vinum astringens, & in pulueribus ipsum thus, aut mastix.

Ad Interceptiōdū sanguinis motū medicamēta sunt adhibenda partibus, per quas trāsit sanguis, & à quibus incipit motus; propterea in Fluxione ex Naribus iugularibus venis linteæ in aceto, aut succo plantaginis, aut in posca madefacti actu frigidi semper detinerit, debent; & si fluxio incipiat à iecore, aut ab utero, loci illi sunt refrigerandi. Hec est Hipp. sententia 5. aph. 23. In his, inquit ipse, frigido vtendū, vnde sanguis fluit, aut fluxurus est, circumcirca ipsos locos propter hanc causam nō immeritò Præcantes vtuntur etiam his actu frigidis in partibus illis, quæ facile frigiditate toti comunicant corporales sunt testes, manus, & pedes, quibus partibus linteæ in aqua, aut posca madefacti perpetuò sunt continendi.

Ad superandā causam, si fuerit acrimonia sanguinis facile corrigitur acrimonia purgato humore, acrimonia faciente, aut bile, aut exusto humore melancholico, aut salsa pituita, deinde superantibus morbos, propter quos isti humores augentur de qua re nihil dico, hoc tamē moneo, præcantes in omni Fluxu sanguinis cōmendare vsū rhabarbari, quotidie masticati simul cū passulis ad scrupulum, vel drach. sem. cū tamen hoc remediū valeat in sanguine aciore reddito pp bilis permissionē;

Itaq; causæ sunt distinguendæ, & propterea, ubi causa Fluxiōis sanguinis fuerit nimia serositas & tenuitas, præter purgationē serosæ humiditatis, opus est medicamentis calorificis & siccantibus, contra quā fieri consuevit in ceteris omnibus

Ligaturæ improbantur:

nibus fluxionibus, quæ refrigerationem requirunt.

Ideo Matth. de Grad. in com. 3. super 4. ad Almanfor. scribit se curasse vsu theriacæ fluxionem sanguinis serosi. Itaq; non solum theriac. sed etiã mithridat. & trochisci cyphæos, & omnia atomatica sanant hanc sanguinis fluxionem.

Quod pertinet ad morbos; Morbi, vt dixi, sunt ruptura, aut apertio, aut erosio. Ruptura, siue incisio, & vulnus sanantur agglutinantibus, atque adstrictorijs; Anästomosis, siue apertio solis adstrictorijs, & refrigerantibus; Erosio partim adstrictorijs siccantibus, ac demum renutrientibus, vt docuit Galen. 7. comp. loc. c. 4. Agglutinantia sunt amyllum, tragaianthum, gummi arabicum, mumia vocata, rasura chartæ pergamenæ, succus millefolij, succus consolidæ, succus portulacæ.

In fluxu sanguinis Narium sunt pessaria ex pilis leporinis, aut ex gossypio vito, & illiniuntur his succis, & pulueribus, & inponuntur in nares, aut ipsimet pulueres insufflantur in nares, aut ipsi succi in nares trahuntur. Legi apud meos veteres, in quibusdam libris manuscriptis, aquam cyclam. attractam in nares statim sanguinem suprimere: at quia cyclamen est calidum in 3. nunquam volui experimentum facere.

Pro Thoracæ autem conficienda sunt hæc in modum Eclegmatis, hoc scil. modo.

Recipe rhois yubri

terra sigill. an. dra. l. i.

lap. hamatit. drach. sem.

amyl. tragaianth. an. drach. i. sem.

sem. anisor. scrup. ij.

succi millefol. portulac.

syr. myrtini an. q. s.

M. pro Lambitio.

Aduertite, in omni Eclegmate pro sputo sanguinis admiscenda esse aliqua calida, quæ sint vehiculum frigidorum, & astringentium: hoc est præceptum Gal. 7. de comp. per loc. 4. atque ideo non modò in vsu agglutinantium, sed etiã astringentium simpliciter hæc regula est obseruanda, & non modò in Lambitijs, verùm etiam in medicamentis, quæ statim deuorantur, vt propterea Gal. illum commendauerit, qui diaspermation cõposuit, quod semina anisi, cemin. & fœnic. rec. pit. etiam si pro sistendo sanguine exhibeatur.

Sed non modò calida, verùm etiam opiata vtiliter admiscuntur medicamentis Thoracis, quãdo Sanguis Exspuitur. rationem attulit Gal. in illo 7. de cõpos. per loc. 4. vt Tussis sedetur, & propterea ego in his calib. vii. feliciter cõtinuei vnc. sem. succari ros. antiq. cū drach. sem. semini hyosciami, & sem. papau. albi. sed vbi impetus sanguinis urgeat, ad fortiora opiata est confugiendum, ad Philon. ad recent. theriac. vbi non tantùm urgeat, satis erit vii. adstrictorijs, & quamuis adstrictoria multa sint, vt lapis hamatites, sanguis draconis, bolus armen. trochus. de spodio, de carabe; Ego tamen duo vobis proponam tanquam secreta sanè egregia: Altero ego lape vsus, & feliciter. Est autem cortex oui puluerizatus, abiecta tamen interiore pellicula. Datur ad drach. ij. ex succo millefolij, aut ex aqua vel polyg. vel plantag. vel portulacæ; neq; valet solùm ad curationem, sed ad præ-

A seruationem, vt si per 30. continuos dies quispiam eo viatur saltem ad drach. possit à Sputo Sanguinis præseruari.

Alterũ remediũ est sordidũ quidem, sed celebrissimum, stercus muris pulueriz. ad drach. ii. exhibitum simul cum succis aut aquis propolis.

Ceterũ illud animaduertendũ, in Sputo Sanguinis incumbendum esse nõ tantũ adstringentibus, sed, & dissoluendis grumis in Thorace contentis, isti enim putrefacti, aut suppurati, pulmones corrumpunt, & Phthisin faciunt.

B Ad illos grumos dissoluendos valet, & oxymel, & posca; sed quia impetus sanguinis vel virget solvend. vel non virget; vbi multũ urgeat, posca vtend. ad diss. dum frigida; si multum non urgeat, vtendum grumos calida; id ipsum dico de oxymelite, sang.

Ad renutritionem nil aliud facit magis, quàm vsus lactis, ad renutritionem. s. vasit erosi præter cibaria optimi succi: sicuti ad animam illius renutritatem cum acrimonia nihil præstatius iocrafantibus, vt pedibus vitulinis, crebello, cute, oriza, alica, & ceteris, quæ increasant.

A proprietate sanant fluxum sanguinis Narium ipsemet sanguis exiens exsiccatus, puluerizatus, & insufflatus, aut, stercus asinum mense Mayo priet. collectum, exsiccatur, & pulueriz. Plura potius le- iuuasia, gere apud Gal. 7. de cõpos. loc. 4. & alios scriptores.

DE PHTHISI, SEU TABE. Cap. XXXI.

A Curatur de affectu que Græci *σπιν*, vel *σπιν*, Latini autem Tabem vocant de eo verba faciam nõ tantũ in propria, & exquisita significatione accepto, sed etiã in impropria, & spuria, nõ tamen in communi. Cum .n. Phthisis genericè

D Tabes dicatur, nomen Tabis, quod significat Consumptionem, dici consuevit de quacumq; corporis Macie siue cū febre, siue circa febrẽ, & siue ex affectu thoracis, siue ex affectu yecoris, aut ventriculo, aut alia corporis parte, vt potius colligere ex Gal. 4. aph. 10 & 1. de diff. feb. 8. & lib. de marasmo c. 1. & 5. Nos itaq; hanc amplã significationẽ dimittimus, & nomine Tabis cõplectarũ tamen Cõsumptionẽ totius corporis cū febre assidua, siue ex vulcere Pulmonis, quæ propria exquisita est huius affectus significatio, siue ex vlcere asperitæ

E arteriæ, aut aliarũ partiũ Thoracis, quæ est impropria, & spuria. Nomine *Extenuationis totius corporis* cū Gal. 1. de Marasmo. cõsumptionẽ intelligo nõ tantũ humiditatis toridæ, aut secundarum humidorũ durarum, sed carnosæ, atque etiam feminilis in corde primũ, mox in toto corpore. Per *febrẽ continuam* intelligo hecticam, quandoque in 2. nonnunquam in 3. gradu, cui tamen connectitur vt plurimũ putrida, siue quotidiana, siue tertiana, siue quartana. sic .n. scribit Gal. in com. 9. 3. in 1. epid. aliquando est hemitritus .i. c. semitertiana, vt docet Hippocr. 1. in 1. epid. 23.

Nomine vlcetis omnem vlcetis differentiam amplectar. 9. Quamuis enim Gal. 7. aph. 19. Phthisin dicit fieri ex vlcere Pulmonis insanabili, frustra proponeretur curatio, si omnis Phthisis esset insanabilis: Variæ itaque sunt vlcetis differentiæ, superficialis, profundæ, cum inflammatione, citra inflammationem, mundi, sordidi, cum purulagine totius substantiæ Pulmonum, ac sine purulagine, cū

Defini-
tio.

fluxione, & citra fluxionem: pro differentia vlc-
tū varia, eūdem quoq; erit varietas, vt intelligeas.

Causæ.

Causa Phthisis, seu Vlcis Pulmonū quan-
doque ortum ducit ex ipsismet Pulmonibus
aliquando ex causa extrinsecus illis adueniente;
quandoq; ex vtraq; causa simul coniuncta. Pro-
pria ratione Pulmones incurrunt Phthisin post
Peripneumoniam suppuratam: nam disruptus ab
scellus transit in vlcus; aliquando post variolas,
quæ Pulmones obident, & erodunt; nonnunquā
post reiectam duram materiam grandini similē,
de qua meminit Galen. 4. de loc. aff. 8. quam ego
quoq; obseruavi in Illustri Comite de Nare, qui
Phthisicus obiit, & in alio nobili Belgæ; quando-
que propter sanguinem per anastomosineductū
datur occasio erosione dupliciter. primò, quia ille
ipse sanguis extrauenatus in substantia Pulmonis
receptus, siue suppuretur, siue putrescat, ipsū cor-
rumpit Pulmonem; propterea dicebam in præce-
denti lectione sollicitos debere esse Medicos in
dissoluendis sanguinis grumis, dum euenit spu-
tum sanguinis, ne relictas grumus Pulmonem
corrumpat. secundò modo fit ipso sanguine folli-
culum in pulmonibus sibi ipsi præparante in mo-
dum mei ceridis, quam Ferneli lib. 5. pathol. Vemi-
cā appellat. hæc Vomica disrupta vlcus relinquit.

Relinquitur etiam Vlcus fractis Pulmonum
vasis, neque bene curatis, succedente scilicet in-
flammauone, siue fractura sit facta ex clamore,
siue ex percussione, & casu.

Causæ verò quæ Pulmoni adueniunt, aut sunt
extrinsecæ, aut intrinsecæ. Extrinsecæ est vapor
contagiosus alterius Phthisici, qui vapor non mo-
do nuper inspiratus, sed etiam in stragulis, & po-
sitis in lignorum, & muri receptus alium, præ-
cipue dispositum, inficere potest: Quæ intrinsecus
Pulmoni aduenit, sunt in duplici differentia;
Vna causa est, & cōmanis, facta fluxione a capi-
te in Pulmones: Altera est facta fluxione ad Pul-
mones, vel ex corde, vel ex iecore, vel ex vtero, aut
alijs corporis partibus, & quod frequentius est, ex
alijs Thoracis partibus; hoc docet Gal. 1. in 1. epid.
com. 17. cum autem sit hæc fluxio, siue ex capite,
siue ex alio loco, aut erodit ipsum Pulmonem sui
acrimonia, aut corrumpit putredine; Erodit acri-
moniabilis flaua, atra, siue pituita, siue sanguini
commista, ac falsa pituita, & hæc omnium frequen-
tissimè, vt docet Gal. & Hippocr. 3. in 3. epid. 32.
5. meth. 13. & 1. in 1. epid. 17. Sine acrimonia, sed
sola putredine Phthisim facit humor quique pu-
tridus, pituita putrida, bilis putrida, melancholia
putrida, ac sanguis ipse, de quo Aræteus primo de
Diuersis. 8. in Phthisicis, inquit, spua esse varia, li-
uida, nigra, pallida, flaua, viridia, quandoq; alba,
nonnunquam commista; & hæc omnia, inquit, E
esse puluerenta; & quamuis Gal. 2. de nat. hum. 1. x
Pus dixerit ex toto sanguine fieri nihilominus ip-
se Gal. cum Hipp. 7. aph. 38. pituitam in pulmo-
nem descendente in dies 20. suppurati do-
cuerit, & idem Gal. in com. 30. 7. partic. pituitam
in pulmones dilabentem, inquit, in formam puris

Sputa
Phthisi-
corum
varia.

A conuerit; & de hac puris natura loquitur Galen:
in illo 4. de loc. aff. 8. qui locus est attentè legen-
dus; nam docebit vos modum generationis pu-
ris, proponit ibi Phisicos quosdam, qui ab ini-
tio, cum nihil mali habere viderentur pallidum
exspuebant sputum, & paulò post cruorem, ac de-
inde manifestum præ se ferebant Pulmonum
putrescentium naturam, & idè omnes, vt ipse
scribit, interibant.

Causæ autem mixtæ sunt in illis, qui propen-
sionem habent ad Phthisin, & Destillationem pa-
tiuntur. Habent autem propensionem primum
quidem iuuenes, vt docet Hipp. 3. aph. 29. & no-
mine *iunenum*, vt ipse scriptum explicat 5. aph. 10:
intelligit eos, qui annum agunt ab anno 18. vsq;
ad 35. Habent quoq; propensionem ad Phthisin,
qui pectus habent angustum, acutum, collum ob-
longum, aures amplas, qui proprie à Gal. primo
in primum epid. 18. *Alati* nuncupantur, quod ha-
beant scapulas eminentes, *Propen-
si in
Phthis.*

Signa.

Signa Phthisis non sunt vsq; adè obseura, vt
vulgaribus etiam Medicis deprehendi nō pos-
sint; quandoquidem corpus ipsum iam extenua-
tum, in quo omnium articulorum ossa eminentis-
sima apparent, vngues incuruantur, inferior ven-
ter ex rotundo fit planus, ex molli durus, & ten-
sus vt tympanum, costæ connumerari possunt, o-
culi exauantur, & splendidi fiunt, nares euadunt
acutæ, aures siccæ, similisq; stans, vbi febris, cōti-
nua accesserit, & iussicula cū Spuro siue copioso,
siue paucis, satis superq; Phthisin ostendit; nihilom-
inus accedunt alia; maxillarum rubedo propter
igneum Pulmonum calorem, sudor tepidus in fi-
ne coctionis propter defectum calidi innati, Spu-
tum quoq; quod omnino aliquando puris formā
præ se fert ex substantia, colore, & fœtore; ali-
quando caret quidem his signis, nec tamen pro-
nuntiandi sunt illi à Phthisi immunes, propterea,
quod (vt ante dixi) solet Pulmo erodi, non tan-
tum ex legumopute, quantum etiam ex pituita,
& alijs humoribus, formam puris suscipientibus:
si accesserit Spurum Sanguinis, hoc quoq; fortius
erit signum, sed licet neq; sanguis apparuerit an-
tea, neq; addit, non propterea affirmandum, istos
vlcere non laborare.

Possunt itaque nonnulli in Phthisi incidere
absq; Spuro Sanguinis, qui Vomica passi fuerint:
nam disrupta illa Vomica, pus excernitur, vel
album, vel alterius coloris, nullo permixtum san-
guine.

Neque dicendum est, saltem præcessisse Perip-
neumoniam, quasi ille abscessus sequatur in-
flammauonem Pulmonis præcedentem: hoc
enim est falsum, quoniam isti abscessus parui
possunt aliquando in Pulmonibus fieri: & in
duro folliculo includi, non modò absq; signo in-
flamationis, imò, quod maius est, absque vlla
febre. hoc est, quod voluit Hippocr. 6. aphor. 41.
vbi inquit: Quibus suppuratio in corpore non
innotescat, id fit vel ob crassiem puris, vel ob
densitatem loci. Alio etiam modo potest fieri
pus

pus absq; sanguine, quando scilicet materia erodit carnem substantiam, non autem magnum aliquod Pulmonis vas: in hoc casu sanguis ille motus, qui educitur ex carne erosa, vertitur statim in pus, & continentur sub forma puris: hoc docuit Gal. exemplo vlcis renum 4. apho: 71. ubi inquit erosa carne renum posse educi pus absque sanguine; erosa vase maiore, externi sanguinem cum pure; idcirco, ut dixi, Phthisici etiam sine Sputo Sanguinis esse possunt.

*Distin-
ctio Pu-
ris, &
Pituitæ
putresce-
ntis.*

Cum absq; Sanguinis Sputo quispiam Phthisicus esse possit, reliquum est, ipsum pus distinguere à putrescente pituita. Distinguitur autem primò quidem substantia, quæ semper in pituita est viscida Sin pure autem nequaquam. Secundo in odore, quia pus semper est foetidum, præcipuè verò carbobibus iniectum. Tertiò distinguitur ex gravitate, quia pus in aqua calida fundum petit; pituita supernatat. Illud tamen moneo, pus plerumq; supernatante, eo quod viscidæ pituitæ commistum sit, propterea baculo diligenter separandum est pus à pituita nam post separationem descendit.

Licet quoque de Phthisicis coniecturam facere, si cum alijs Phthisicis consuetudinem habuerint, si ex parentibus Phthisicis sint oriundi, & naturalem habent ad hunc morbum propensionem habent verò propensionem, qui, ut antea dixi, Alati vocantur. Hæc de diagnosticis sufficiant.

Distinguendæ sunt deinceps causæ Phthisis, ac loci affecti, si facta sit Phthisis ex præcedenti Peripneumonia, aut Angina suppurata, aut phrenitide, vel lethargo pariter in pus conuerso, aut ex pleuritide, vel ex præcedenti vulnere, aut contusione Thoracis: istæ omnes causæ faciliè innotescent ex ipsiusmet patientis relatione: præterquam quod ex angina, & peripneumonia, phrenitide, & lethargo breui temporis intervallo fit Phthisis, ex pleuritide non item; quandoquidem pleuritis, antequam phthisin inferre possit, transit in Empyema; Empijci autem non evadunt Phthisici, nisi post 40. dies à disrupto abscessu. hoc docuit Hippoc. 5. aph. 15. si Phthisis fiat ex Vomica disrupta, nullo præcedente sensibili morbo, pus statim tussi eijcitur; quod si fiat ex sanguine suppurato insequente anastomosis, aut diæresin, vel rupturam, primò in quidem præcessit Sputum sanguinis copiosum, deinde verò credibile est, Medicos importune adstrictos viros esse, neq; grumos sanguinis dissoluisse.

Si fiat ex destillatione falsa, aut acris, hæc est omnibus conspicua: fauces enim ipse quoque inflammantur, & quandoque excoquantur, sputum falsum, & acre percipitur, quod etiam quandoq; ad nates, ad dentes, & alias confluit partes.

Sed si Phthisis fiat ex fluxione à cordè fetido isti sunt valde iracundi, frequentibus obnoxij febribus, & ex ira potissimum, aut motu corporis, vel usu acrim, & aromaticum, nulla præcedente tussi, aut destillatione, sanguinis Sputum incurunt, mox Phthisin.

Si verò fluxio fiat propter suppressos menses, hæmorrhoides, varices, aliasue excretiones, hæc quoque ex relatione habebuntur.

Quod si denique fiat Phthisis ex humoribus,

aut biliosis, aut pituitosis, in Thorace putrescentibus, & ad eandem putredinem Pulmonem ducentibus, signa sunt proposita a Galen. 4. de loc. aff. 8. Spurum incipit pallidum, aut flavum, liquidum, cui succedit parva febricula, & paulatina sanguinis Sputum, sed exiguum; deinde corporis extenuatio, & ipsiusmet Pulmonis Corruptio.

Quod ad locos pertinet, si Vlcus fuerit in aspera arteria, & in epiglottide, pauca est sanguinis, & sputi, & puris excreti portio, vox omnino vitatur, aut aboletur, aut saltem rauca, & prava redditur. aliquando, ut docuit Galen. 1. loc. aff. 12. sputum siue portio ipsius asperæ arteriæ, cum pituita educitur. Experimentum quoq; hoc Vlcus ostendit. nam si paulatim acetum, aut aliud acre lambant, acrimoniam sentiunt, & si duriores deglutiant ossam, dolorem patiuntur. hæc omnia observavi in quodam Phthisico Veneto.

Quod si Vlcus sit in partibus pectoris, sanguis pariter admodum paucus est, nigricans, tussi admodum vehementer eiectus, cum dolore partis ulceratæ.

Si ex pulmonibus, facilius educitur, ac in maiori copia, & propterea vel nullus, vel exiguus est dolor nā Pulmo nō dolet, nisi ratione membranæ ipsum circumvoluentis, & ligamentorum circa dorsū.

Vnum tamen licet vos monere, quod accepi à Gal. 5. meth. videlicet ex paucis sanguine, aut pure excreto non posse conici, Vlcus non esse in Pulmone. Ratio est, quia inquit Gal aliquando ipsum Vlcus non erodit asperas arterias ipsius Pulmonis sed tantū carnem, & vasa adiacentia; antequam ille sanguis in cavitatē asperæ arteriæ recipiatur, opus est tempore: nam dura est membrana asperæ arteriæ, neque faciliè ipsum statim suscipit; hic grumum facit, & ille grumus est impedimento, ne sanguis, aut pus genitum possit tussi expurgari; itaq; in vlcere retinetur, & Phthisin facit insanabilem, cum tamen Spurum sit paucissimum.

Prognostica.

Venio ad prognostica: Vlcus asperæ arteriæ, ut docet Gal 5. meth. 12. plerumq; ad sanitatē perducipōt. & proficitur Gal. se plures sanasse.

Vlcus Pectoris pariter facilius sanatur, quā Vlcus Pulmonis, propter tres causas à Gal propositas 5. meth. 3. Prima, quia illa pars est magis carnosæ; Secunda, quia pus genitum non retinetur in vlcere, sed diffluit in capacitatem thoracis. Tertia, quia quiescit locus ille contra quā in faciat Pulmo, qui continuè movetur, & saniem pravam habet, & in se retinet, aut si eiciat, tussi tantum eiecit, tussis autem Vlcus exasperat.

Non est tamen omne Vlcus Pulmonis insanabile, ut quidā existimant, quod docuit Gal. 5. meth. 8. & ego ipse nonnullos consumatos Phthisicos sanavi, quantum verò propria collegi experientia, facilius curantur Phthisici ex Peripneumonia præcedente; & ego curavi nobilissimam matronam Patavinam Lauram Fabriaram ad S. Ioannem. facile etiam curatur Phthisis ex pure descendente vel ex capite, vel ex faucibus; propterea curavi quoq; uxorem meam, quæ ex phrenitide sputa suppurata incidit in Phthisin. sanatur quoque Vlcera multò facilius, quæ sine fluxione sunt, quam illa, quæ fluxionem adiunctam habent.

*Prox. Au-
toris
Phthisi-
ca ad ip-
so curata*

Quæ verò inflammationem vehementem iam contraxerunt, ex Gal. sententia insanabilia sunt, sicuti, & sordida, quæ pouissimum cognoscuntur ex sputo admodum graueolenti; propterea Hipp. 5. aph. 1. hoc sputum graueolens carbonibus in iectum pessimum putat esse signum. Deplorati et sunt, qui iam Marasmodem inciderunt febrem, quibus propterea ex defectu caloris capilli defluunt. Hinc Hippoc. 5. aph. 1. 2. pessimum inquit esse signum, si capilli deflauant. Fit quoque profusum alui propter eandem causam, estque pessimum signum, ex 5 aphor. 14. ex imbecillitate facultatis sputum etiam deficit; propterea dicebat Hippo. 7. aph. 17. à Puris Sputo Tabes, si Sputum retineatur, moriuntur.

Curatio.

Cum in Phthisi adsit Vlcus, Febris, & Tabes idcirco etiam indicationes variae sunt: ab Ulcere enim sumitur indicatio, si sordidum fuerit abstergerendi, si cauum, carne implendi; si humidum, siccandi, & tandem obducendi cicatricem; quod si fluxionem tentetur, fluxio erit arcenda.

A febre quatenus hectica est, sumitur indicatio refrigerandi, & humectandi. De putrida, non loquor, quia per accidens Phthisi coniungitur.

A Tabedemum sumitur indicatio, rescindi humiditatem deperditam, & instaurandi carnes.

Dubitabit autem vestrum quispiam, à quonam incipiendū sit? Paucis dico in Phthisi cum Marasmo, seu febre marasmode, re iam existente deplorata, sola curatione palliata, ut dicunt, agendum propterea humectandi, atque omni ingenio renuendi sunt. Si febris non sit marasmodes, sed hectica secundi gradus; putridam tamen habeat connexam affectu dignam, à putrida incipiendū, qua non sublata frustra administrantur Phthificis remedia: si putrida non adsit, aut quidem adsit, sed leuisscula; ab Ulcere incipiendum, quo non curato febris, & Macies persistit.

Ab Ulcere igitur incipientes pro illo mundando, primum quidem valent looch de pino, looch sanum, & expertum, looch de pulmone vulpis. describuntur hæc medicamenta à Mesue, & à ceteris antidotariis: vsus est per modum lambitui Poteritis, & vos Eclegma si componere.

Recipe farin. erub. orobi.

lupi norum an drach. i.

radic. Ireos pulueriz.

aristoloch.

semin. gossyp. an. drach. sem.

putrioriat. drach. i. sem.

Terantur omnia, & excipiantur aut mulla, aut melle ros. simp. aut sapa, & paulatim deglutiantur.

Hoc enim perpetuo obseruandum in Vlceribus vel Asperæ Arteriz, vel Pulmonū, & Pectoris ut medicamenta assumpta super lingua ibi contineantur, inclinata ad posteriora ceruice, ut paulatim arteriam ingrediantur. Hæc mullæ forma ad hunc scopum est valde efficax.

Recipe mell. opt. vnc. iii.

aq. communis lib. ii.

botrydis, pulmonar.

enula, hyssop. an. M. sem.

Ireos, lupin an. drach. ii.

A Bull. ad consumpt. tertiz par. despumando ipsum mel. deinde vtamini hac mulla ad mundif. Vlcus.

Post absterforia valent siccantia, & hæc quidē vario. administrata modo: Illiniantur nares, & palatum aut trochiscis hedychois, vel de gallia moscata dissoluis in aqua vitæ, aut in vino odorato; aut fiat suffumigium ex styrace, galbano, belzoino, thure, olibano, addito pro diuionibus mosco, & ambra.

B Auic. à quo accepit Valesc. de Taranta: proponit suffumigium ex arsenico rubro, quam Græci Sandaracham. ad siccandum vlcus est fortissimū medicamentum. sed periculum suffocationis imminet. idcirco aut ab illo abstinendum, aut miscendum est arsenicum styraci, thuri, belzuino, ex quibus omnibus f. formulæ, quales componuntur ex cinnabari ad expurgandam lucem Veneream, estq; idem administrandi modus: modum qui vult legere, videat libellum nostrū de luc. Vener.

Ceterum consulo, ut rem mitionibus perficiamus, & eclegmatibus, atq; alijs assumptis exsiccantibus, Vlcus sanetur. Scio non deesse in horum administratione maximas difficultates. Tabido, n. corpori, & febrienti calidum, & siccum præbere medicamentū, est contra omnem medicam indicationem inichilominus, quia Ulcere non siccat, ut antea dixi, neq; Febris, neq; Tabes potest desinere, hinc sit ut doctiores Medici in Phthificis vsu siccantium admiserint, & ne à Gal. nostro recedamus, ipse 4. loc. aff. vlt. in illis Phthificis de quibus meminit vniur Athanasia, Ambrosia,

D medicamentis ex aromatis compressis, omnino siccantibus. hinc factum est, ut Fracastor, sane doctiss. 3. de morb. contag. c. 8. pro sanandis Phthificis laudet decoctum ex ligno Indico. Idcirco, & Philip. Ingrastias Medicus paucis celeberrimus in consilio quod scribit pro Duce Terræ nouæ, proficitur se plurimos sanasse phthificos vsu decocti ex ligno, & duas huius rei proponit historias. Ego quoq; profiteor me Phthificum sanasse luc. Gallica laborantem ligni Indici decoctio ante annos 17. qui adhuc est in viuis: Memini de hoc in trach. de luc. Vene. idcirco, & Alens. Ferrus lib. 2. de luc. Gall. mirificè in Phthificis commendat huiusmodi decoctum, ut verò tūc administretur, potest parari hunc in modum.

Recipe Ligni Indic. vnc. vi.

Infundatur in aqua cochlea. plantag.

potygon. an. vnc. iij.

Deinde f. decoct.

adden carn. et stud. nem. euisc. vnc. iij.

consol. vnic. peruinc. an. M. i.

F expres. quæ seruetur pro syrupo, cuius dentur vnc. vi.

Instituatur victus optimi succi, aqua potius exsiccans, propterea assa potius præbeantur.

Si quis Ligni decoctū vereatur, chinæ radicem accipiat. Ego quoq; hac feliciter suum vsus in Illustri Laura Fabaria Patavina Phthifica post suppuratam Peripneumoniam, quæ adhuc viuit.

Et vbi Macies negotium vobis facere videatur alterum duorum faciendum primum est, ut præbeatis

*Decoct.
Guaiaci
in Phthisi*

beatis lac asininum, sed cum oleo ex guaiaco: A
Hac ratione ante annos sex ego curavi nobilem
Germanicum Augustanum Phthisicum; aut po-
teritis præbere ius, hoc modo confectum.

Recipe aut lignum Indic. aut Chinam.
si Lign. Ind. vnc. iij. si China vnc. i.
Infund. in aq. lib. vi.

Deinde recipe bord. mund. M. sem.

Amyl. Tragacant. an. drach. ij.

Sem. acetos. plantag. an. drach. i.

Sem. melon. mundat. vnc. sem.

Nucl. pin. pistac. an. vnc. i. sem.

Carn. Test. nemoral. vnc. ii.

Ponantur, quæ imponi possunt, in ventre opti-
maz pullæ, omnia simul bulliant vsque ad perfect.
carnis coct. & facta omnium express. ius hoc præ-
beat spatio 30. dierum.

Hoc quoque iure feliciter vtor in Phthisicis.
Quantitas est vnc. vi.

In his verò loco feruli parare soleo hordaco-
um quoddam hoc modo: Accipio.

farin. bord. lib. iii.

sacc. sniff. pulueriz. lib. totidem.

Impono hæc in olla noua, primo ponendo par-
tem farinæ, deinde partem lacari, & sic vicissim
donec tota hæc quantitas sit recepta in olla.

Aliquando consueui permiscere etiam pulue-
rem, aut salsæ, aut rad. chinæ, aut pulmonariæ, aut
botridis, vt. s. sint horum puluer. omnium vnc. vi.

Olla ipsa iam operata pasta cruda imponitur in
furno spatio 9. dierum. singulo die manet tantum
quartam horæ partem.

Ex illa mixtura simul cum iure optimo fereu-
lum sit mane, & vespere, quo solo Phthisicum sa-
nauit religiosum Venet. degentem apud S. Nico-
laum de Tolentino.

Sed præter hæc conficiuntur quoque potiones
nonnullæ vulnerariæ vocatz, quæ pulmonum Vl-
cera sanare creduntur medicamenta, quæ in has
potiones recipiuntur, poteritis legere apud Am-
bros. Parzum lib. 18. suæ magnæ Chirurgiæ c.
28. Fiant enim hæc potiones, ex decocto beton. a-
grim. vincæ peruinæ, virgæ auræ, aristoloch. scab.
folijs oliuæ, fol. vitis, alijsque id genus. Mihi olim
communicata est aqua similis stillantia, qua se-
mel tantum vsus sum, sed certè cum fructu: præ-
beaturn ignaro medicamento. sit hæc potio ex ster-
core canino comedente ossa tantum, & ex hedera
terrestri, atque herba, quam vocant pyrolam: mi-
scantur succi harum herbarum cum stercore pro-
posito, & omnia destillantur. Dosis est vnc. iij.
Hæc igitur agenda in Ulcere sine Fluxione.

Si fluxio adsit, iam vos docui in tractatu de ca-
tartho modum curandi omnem Fluxionem ac-
rem à Capite ad Thoracem: propterea confugatis
ad illum locum.

Si fluxio fiat à corde, epithematibus erit cor re-
frigerandum, sicuti, si à iecore, iecur ipsum.

Quando verò suppressi sint menses, vel hæmo-
rroides, aut varices, aut cauteria, consueui istæ ex-
creationes omnino promoueantur.

At si magis vrgeat Marasmus, quàm Vlcus, vt
antea dixi, Marasmo est incumbendum vsu la-
ctis, electuarijs, resumptiujs, atque morsellis, quæ

tamen Vlcus quoque respiciant; & propterea ele-
ctuarium poterit sic conficere.

Recipe cooblear. nu. x.

caudar. caner. fluuiat nu. xx.

carn. testud. nemoral. vnc. iiii.

pilosell. pulmonar.

emula ca. M. f.

semin. plantag. portulac.

acetos. an. drach. ii.

liquirit. vnc. sem.

passular. vnc. iiii.

Bull. in sq. aq. & f. colatura deinde.

Recipe Amyl. vnc. sem.

Prun. dulc. vnc. vi.

Bull. in prædict. decoct. & pulpæ per setaceum
transmissæ adde.

Nucl. pin. pistac. an. vnc. ii.

sacc. sin. q. s. M. & f. elect.

Dosis erit vnc. j. summo mane 4. hor. ante ci-
bum, & tantundem post cenam.

Denique Morselli possunt sic componi.

Recipe pulp. nuc. Ind. vnc. iiii.

carn. capon. vnc. vi.

nucl. pin. amygd. dulc.

pistac. an. vnc. i. sem.

marg. præp. corn. cer. vss.

sandalor. rub. an. drac. i.

sacc. dissol. in aq. borrag. q. s.

M. & f. conf. in Morsell.

Datur vnc. i. in prandio, & cena.

Balneum aquæ dulcis in hoc casu mihi est su-
spectum, & quia concitat destillationem ad Thora-
cem & quia si sit calidum, corpus siccatur, & dige-
rit si frigidum, modicam illam caliditatem extin-
guunt; atque relinquendum est balneum. Hæc de Phthisi.

Balneum
aq. dulc.

DE TVSSI, ET RESPIRANDI DIFFI- CULTATE. Cap. XXVII.

Coniugam tractatum de Tussi, cum tract.
de Difficultate Respirationis, quanquam n.
Tussis habeat quasdam causas cum Difficultate
Respirationis minime communes; in potioribus
tamen cum ipsa conuenit itaque dicam primum
naturam, & priuatas tussis causas, deinde verò
sub titulo difficultatis Spirandi recensebo com-
munes, & Tussi, & Difficultati Respirationis.

Est itaq; Tussis Galauct. 2. de sympt. caus. 4. ve-
hement. efflatio cum sonitu, ex spiritu impel-
lente inequalitatem asperarum arteriarum. Hec de-
finitio colligitur partim ex loc. cit. partim ex 4. loc.
aff. c. 8. & partim 2. simpl. c. 17. quo in loc. Gal.
nica hac voce inequalitatis. s. complexus est omnes
Tussis causas.

Defini-
tio.

Cum aspera arteria naturaliter plana, & leuis
esse debeat, vbicunq; inequalitas accedit, tunc pri-
mum natura inequalitatem excernere studet; si-
cuti, & per sternutamentum expurgatur cerebrum,
& per vomitum ventriculum; cum verò dura sit
aspera arteria, atq; ided contractioni inepta, per
quam contractionem in cæteris partibus noxii ex-
pulsio fieri cõsuevit, natura in pulmonibus alium
inuenit modum superandi hanc inequalitatem
per impulsum aeris, per vehemẽtem efflationem.

Aq. Fil.
vulner-
is,

quæ vehemens efflatio & spiritus impulsio sit ex A
valida Thoracis constrictione; inæqualitas verò sit
aliquando ex causis extrinsecis, non nunquam ex
internis

Hist. du
Stuma
Tussis ex
esse in
Pulmo-
nes de-
lapso.

Extrinsecæ sunt fumus præcipuè aeris, & vene-
natus, pulvis, cibus, aut potus in arteriam ingredi-
ens. Noui puellam, cui quarto ætatis anno portu-
cula ossis delapsa est in Asperam Arteriam, & in-
de in Pulmones, & ex eo tempore in hanc usq; diē
qua agit xvi i i. annum semper laborat Tussi, &
Sputo Sanguinis.

Ingrediuntur huiusmodi corpora, aut quia oper-
culum arteriæ sit ab aliquo vlcere erosum, sicuti
plerisq; contingit Lue Venerea laborantibus, aut B
quia apertum est, quo tempore sit deglutitio, vt
in profuse admodum ridentibus.

Internæ causæ aut sunt essentielles, aut per cō-
sensum. omittam omnes illas, quæ per consensum.
fit enim aliquando Tussis compressis pulmonibus
ex lienis, iccoris, aut ventriculi, aut iouis abdo-
minis tumore.

Tussis ex
Vermi-
bus

Quandoque etiam ex vermibus, quanquam de
Loco & Modo, secundum quem & per quem fiat
tussis ex vermibus, aliqua sit difficultas Gal. cō.
17. & 24. 2. in 6. Epid. vbi Hipp. mentionem facit C
Tussis aridæ, & c. factæ non ferino sed spiritu. Gal.
inquit, quod etiam si per ferinū intelligamus ver-
mes, nihilominus falsam esse illorum sententiā,
qui putant excitari Tussim vermibus os ventriculi
vellicantibus; in qua tamen sententiā video, rex
Recentioribus perstitisse Christoph. Vegam 3 lib.
de art. med. cap. 10. de Tussi. Cæterum ego qui-
dem vidi Tusses excitatas, ex vermibus, sed ascē-
dentibus usq; ad fauces, & irritationem inferenti-
bus in arteriæ asperæ initio, qui paulò post eicie-
bantur. Io. Serrarius in præfatione observationū
Capitis scribit Tussim aliquando fieri ex vermicu-
lis in ipsius pulmonibus genitis & contentis.

Vermicu-
li in Pul-
mon ge-
niti.

Quicquid sit, de hac frequentiores Tussis caus-
æ, quæ à vobis sunt considerandæ, sunt, quæ per
essentiam pulmonis infestant: intemperies, & mor-
bi instrumentarii: nam de morbis in soluta vni-
tate nihil ampliùs dicendum. satis de hac diximus
in tract. de Phusi & Sputo sanguinis. neque etiā
hoc in loco erit sermo de de Tussi facta ex Pleuri-
tide aut Empyemate, vel Peripneumonia: Nam
de his affectionibus infra sigillatim acturi sumus. E

Anacephalosis causarum par- ticularium Tussis:

Peculiares igitur Tussis causæ sunt vel intem-
peries frigida potissimum, quæ illos maxime
infestat, quibus imminuta, vel potius prorsus ex-
siccata est Columella; aut intemperies calida, aut valde
sicca, non tamen æqualis, sed prorsus inæqualis.

Causæ verò, quæ pertinent ad morbos instru-
mentales, communes, sunt Difficultas Respira-
tionis, & Tussis, & propterea primū de Difficul-
tate Spirandi est agendum.

Differentia Difficultatis Spirandi.

Difficultas Spirandi, Dyspnœa Græcis dicta, quæ
diog, communiter accipitur pro omni Res-
piratione celeri, frequenti, magna, parua equali
inæquali, cum sono, & sine sono, siue fiat erecta
ceruice, siue decumbente corpore: hoc potestis
colligere ex Gal. primo de diff. resp. primo Nos
amplam illam significationem dimittimus, & no-
mine Dyspnœæ nunc temporis triplex tantum vi-
tium complectimur. Primum est *Spiratio crebra*
sine sono, sine febre. Secundum est: *Spiratio valde*
crebra cum sono, sine febre Sublimis: hanc proprie
Græci vocant *Ἀσθμα*. Latini Anhelationem, eaq;
affectus Sulpitiosos, Anhelosos, & Anhelantes:
nam, vt dicebat Gal. in com. 5 6. part. & in 23. 6.
& 7. de comp. loco. 6. & 4. loc. aff. cap. 7. isti respi-
rando amulantur eos, qui diu exercitati fuerunt,
propterea crebrum habent spiritum rea. Tertius est,
quoque *Crebra, & Sublimis Spiratio, sed facta erecta*
ceruice, & vocatur proprie *Ὀπθιρία*.

Has differentias potestis colligere partim ex
Hipp. 4. in 6. Epid. 4. vbi scribit Hipp. filiam. A-
gelis laborasse Difficultate Spirandi, postea verò
tuberculo disrupto Asthmate laborasse, ex quo lo-
co Gal. 3. de diff. resp. cap. vlt. colligit differentiam
inter Dyspnœam & Asthma, quod scilicet Dys-
pnœa sit quidem crebra Spiratio, sed multo cre-
brior sit asthma, ita vt, si Galeno credimus, crebri-
tas sit quidem utrique communis, sit tamen ma-
ior in Asthmate; sed apud Gal. distinguitur quoq;
Asthma ab ipsa Dyspnœa propter Sublimem Re-
spirationem: Respirationis Sublimis meminit
Hipp. 2. in 3. Epid. 4. & sect. 7. com. 6. Gal. in allo *Respira-*
commento 4. 2. in tertium Epid. & 4. de loc. aff. *tio Subli-*
7. inquit Sublimem Respirationem esse illam; qua mis-
si omnibus Thoracis musculis eleuatis. atq; admo-
tionem impulsis, vt propterea magna dicatur ratio-
ne huius eleuationis, cum tamen parua sit ratione
aeris inspirati; nam in Asthmate & Orthopnœa
propter instrumentorum angustiam modicus aer
recipitur, vt docuit Gal. 3. de diff. resp. c. 6. thorax
tamen valde dilatur.

Recentiores addiderunt illam differentiam *cum*
sonitu, nam apud Gal. & Hipp. nunquam inueni
factam huius mentionem.

Dixi autem fieri hanc Difficultatem *sine febre:*
quia si complectamur Difficultates Spirandi cum
febre, ampla nimis fiet tractatio, complectemur
omnes febres, omnesq; Thoracis Inflammationes
Empyema præterea, de quibus sigillatim agendū.

Causæ communes tussis & difficult. respirationis.

Itaque causæ & Tussis & Difficultatis Spirandi
iam propositæ apud Galen. locis cit. duæ tan-
tum sunt: Tuberculum scilicet Pulmonis, & hu-
morum, etiam sanorum & lentorum copia. Tubercu-
lum autem potest esse duplex, aut crudum &
suppurationi ineptum, quale est Straioma, aut
Ateroma, id genus tumoris scribit Reald. Co-
lumb. lib. 15. se in Suspiciosis post mortem sectis
supra illis, non supra, etiam in illis. laps

sepe inuenisse: Aliud est Tuberculum, quod ad suppurationem tendit: tale fuit, quod contingit filia Agelis, cuius meminit Hipp. 4. in 6. Epid. 4. & tamen fuit sine febre id quod confirmat nostram superius prolatam sententiam, in Pulmonibus contineri pus, nulla existente febre.

Altera causa, Humor scilicet crassus & lentus, aut generatur in Pulmonibus, aut defluit ex capite, aut partim generatur, partim defluit quini- mo qui defluit quandoque est crassus, quandoque tenuis, & si contingat, ut crassa existente materia in Pulmonibus tenuis confertim descendat, fit subita quaedam Orthopnoea, quae durare consuevit aliquot horas tantum, sicut ubi maxima est plenitudo, atque angustia, continua fit Orthopnoea; & haec materia aliquando continetur in ipsa asperarum arteriarum cavitare, quandoque verò in ipsamet Pulmonum substantia, & tamen Orthopnoeam progignit, cuius rei vidi ex perientiam in clarissimo à consiliis secretis Veneto Milledonio; aliquando etiam continetur haec materia crassa, & pituitosa, in spatio inani, quod est inter Pulmones, & Costas, & tunc comprimit Pulmones.

Huius meminit Gal. 4. de loc. aff. 7. qui (ut dixi) alias non videntur cognouisse Difficultatis, Spirandi causas sine febre, praeter istas, quanquā puris quoque mentionem faciat, 4. de loc. aff. 7. Nos parum experientia, partim doctissimorum virorum testimonio alias vidimus Asthmaus & Orthopnoe causas sine febre ab istis valde diuersas.

Prima est Hydrops Pulmonis, casus rarissimus, cuius meminit Hipp. 2. lib. de Morb. & ego hunc Hydropē vidi ante annos 7. in quodam clarissimo ex familia Marcella, cui post mortem dissecto inuentae sunt lib. multae aq. spumosa in capacitate Thoracis, & pulmonibus. Audio quoque Maximilianum I. Imperatorem, laborantem palpitatione, hoc morbo interisse,

Hydrops Pulmonis.

Siccitas, & Tabes

Secunda causa est Pulmonum siccitas dum essem junior, memini me cum Excellentissimis viris vidisse quendam religiosum ordinis S. Marci de Auancio, qui curabatur, ac si laboraret Orthopnoea ex humoribus crassis, nō conferentibus auxiliis, post mortem inuenti sunt ambo Pulmones tabe affecti & exsiccati.

Coalescentia.

Tertia causa est Coalescentia: aliquando pul- mones coalescunt cum membrana luccingente costas, & tunc fit Asthma & Orthopnoea insana- bilis. Hunc casum vidi in alio Religioso.

Lapides & materia gra- uosa.

Quarta causa sunt Lapides in pulmonibus ex- tenti, aut grādo. Huiusmodi Lapides scribit Paul. lib. 3. c. 31. pumicatos quinque numero fuisse ex- cretos. Id ipsum quoque de grandine scribit Gal. 4. de loc. aff. 8. praeter Fern. 5. pathol. c. 10.

Quinto denique est inter causas Difficultatis Spirandi sine febre Gibbositas: nam siue fiat ex casu, aut ictu, siue tuberculis costas intro trahen- tibus, semper necessariò Pulmones ipsi comprimū- tur, ut compressi & Tussim, & Difficilem faciant Respirationem. Hoc docuit Gal. 1. de diff. resp. cap. 11. & in com. 4. 6. part. quando scribit Hipp. Qui gibbi ex asthma, &c.

Quaecunque autem sit causa siue Tussis, siue Difficultatis Spirandi iam à nobis propositae &

expositae, oportet asperas arterias ut primariò aut secundariò lasas esse, in Tussi quidem, nam, ut dixi, finis ipsius Tussis nullus est alius, quam ineq- ualiter superare, quae in asperis continetur as- terijs, ut abundè docuit Gal. 2. simpl. 17. Pariter Difficultas Spirandi, in qua modicus aer recipitur, semper harum arteriarum angustiam sequitur, non autem lenium, ut exposuit Gal. 4. de loc. aff. ult. in fine.

Signa.

Sed iam transcamus ad signa, in qua parte peto vestram attentionem. Difficultas ergo Spirandi necessariò fit aut ex lēsis Pulmonibus ipsis, aut ex triplici musculorum genere affecto, scil. sepio transuerso, musculis intercostalibus, ac musculis superioribus: fit praeterea Difficilis ex usu aucto, id est, calore igneo vel Cordis, vel Pulmonum: fit etiam Difficilis ex facultate deficiente: quandoque ex pluribus simul coniunctis causis.

Non est difficile distinguere Difficultatem Spi- randi, de qua nunc est sermo, ex Pulmonibus lēsis ab illa, quae fit ab usu aucto: nam ubi usus auge- tur, Spiratio est magna viroq; modo, & quia om- nes musculi operantur, & quia multus aer recipi- tur, in Asthmate verò modicus recipitur aer. Prae- terea, ubi usus augeatur, spiritus est calidus et effla- tio est vehemens, est enim propria febris 4. de loc. aff. 7. in Asthmate neq; vehemens est efflatio, neque spiritus calidus.

Distinguitur 2. à musculis affectis: nam ubi- cunq; vel Septum Transuersum, vel alij musculi laeduntur, Spiratio fit quidem crebra, sed parua, ratione dilatationis, quanquam possit esse magna ratione aeris in spirati.

In Asthmate opposito modo res se habet: Tho- rax multum dilatur, & modicus aer recipitur: praeterea vdi Septum Transuersum, vel alij musculi laeduntur, si adest inflammatio dolor adest, & ve- hemens, efflatio, et spiritus calidus; in Asthmate nequaquam.

Tertio, & hoc est maximè obseruandum, ubi Septum Transuersum comprimitur à tumoribus ventris inferioris, Respiratione fit quidem Difficilis, sed absque Tussi, nisi tumor sit inflammatorius: hoc notate, Itaque (ut dixi) tumores comprimētes Diaphragma, nisi sint inflammatorii, Tussim nō faciunt. hoc colligitur primū quidem ex Gal: deinde etiam ex ratione: ex Gal. qui 5. de loc. aff. 7. proponens signa inflammationis partis gibbae jecoris, proponit Tussim inter cetera, & Difficul- tatem Spirandi; dum loquitur de scirrho in eodē loco, nullā Tussis mentionem facit: sed quod ma- gis refert. idem Gal. 2. de sympt. caus. 4. dum as- signat causam propter quam fit Tussis ex inflā- matione jecoris, inquit causam esse non compres- sionem, sed transmissionem alicujus materiae ex parte inflammata in Pulmones. at verò ex scirrho, ex tumore duro, neque vapor, neque materia ele- uatur, quae in Pulmones, transmitti possit; atque ideo potest quidem tumor durus comprimendo Septum Transuersum Difficilem facere Spiratio- nē; non tamen Tussim. hoc apertius confirmatur exemplo

B

C

D

E

F

exemplo Pleuritidis, quæ aut externa sit, aut valde parua, utraque enim difficilem facit Spirationem, sed absq; Tussi, ut docet Gal. 3. de loc. aff. 3. in fin. & ratio est in promptu, quia ex parua Pleuritide, aut externa, neq; comprimuntur Pulmones, neque quicquam humoris, aut vaporis in illos recipitur, quod Tussim excitare valeat.

Distinguitur etiam hæc Difficultas Spirandi à facultate deficiente; quamvis enim deficiens facultas faciat Respirationem, in qua omnes musculi operantur, sicuti etiam in Asthmate, attamen in hoc distinguuntur, quod minus crebra est Spiratio, ubi facultas deficit, & spiritus attrahitur tantum per nares, & si calor non adsit, est omnium rarissima.

Denique potestis distinguere præsentem Difficultatem Spirandi simplicem à complicatione causarum ex signis à me iam propositis, & declaratis, quæ propria sunt huius, vel alterius causæ.

Ceterum distinguere etiam oportet causas, quæ ipsum Pulmonem angustant, & coarctant: nam, si sint humores crassi, Tussis adest cum hercore, sputum album (paucum) est, sed crassum. Si humores sint tenues, tussis est vehementissima, sputum paucum, & liquidum, & frequenter superuenit Catarrhus, præfocans vocatus.

Si sit ex crudo tuberculo, sanis, & nihil antea Tussentibus superuenit hic affectus, primum quidem cum leui Tussicula, & ea quidem inani; dein de verò etiam cum Difficultate Spirandi; quod si tuberculum ad suppurationem deveniat, Tussis humida succedit, cum sputo purulento.

Hydrops Pulmonis facile cognoscitur ex Difficultate insigni Spirandi, Tussi humida, sputo liquidiore, & aqueo, & si patientes vertant se in vnum, vel alterum latus, fluctuationem sentiunt; si auris thoraci adhibeatur, ebullitio sentitur, efferuescentia quædam, palpitationi subiiciuntur isti, ac perdurante malo, hydropem incurrunt.

Si Difficultas fiat ex grandine, aut ex calculo, Tussis est sicca, difficultas spirandi continua; præcessit autem catarrhus admodum crassus, & lentus, aut tuberculum suppuratum; propterea minime sunt illi audiendi, qui dicunt posse Respirationis Difficultatem fieri absque Tussi ex humoribus induratis circa Pulmones: nam Gal. 4. de loc. aff. 3. horum sententiam aperte explodit, qui inquit, eos qui grandinem in pulmonibus habent, Tussim habere diuturnam, postquam tandem huiusmodi grandinem exspuerint.

Coalescentia Pulmonum cum costis nullum habet certum signum, nisi sanguinis Sputum præcesserit, aut Pleuritis, aut Peripneumonia, in quibus casibus, solent Pulmones costis adhærere.

Siccitas etiam facile cognoscitur ex macie universi corporis, lenta febricula, ex siti, ex Tussi primum quidem inani, deinde verò prorsus deficiente; nam ubi intemperies sit æqualis, nulla amplius sit Tussis.

Gibbositas non eget signis, ut cognoscatur.

Tussis verò quæ sit ex intemperie frigida, cognoscitur ex Spiratione frigida, rata, tarda, præterea ex Tussi inani, quæ compresso spiritu non modo (rarefcit) sedatur, sed etiam curari potest, & sa-

narum: nam compresso spiritu, partes incalescunt spirituales, & sic fugant frigidam intemperiem.

Calida verò intemperies cognoscitur ex spiritu calido, spiratione crebra, & veloci, & quia inuatur medicamentis frigidis.

Præfagia?

OMnes istæ Difficultates Spirandi, quæ admodum crebre sunt cum sonitu, & quæ sunt erecta ceruice, ut Orthopnoea difficile sanantur, quinimo Asthma ad senectutem, usq; comitati consuevit: Orthopnoea verò in accessione pleorq; interficit; idcirco qui Asthmate laborantes cum Tussi gibbi euadunt, ante pubertatem moriuntur, eo quod, ut scribit Gal. in com. 4. 6. part. illud Asthma factum est ex tuberculo suppurato: ubi autem Tuberculum est usq; adeo magnum, ut gibbositatem faciat, tandem ægros interficit.

Therapia.

IN curanda Tussi, & Difficili Spiratione aliquando pugnandum est contra ipsum symptoma: magna ex parte verò contra causas morificas, aduersus symptomata quidem, cum Tussis usq; adeo grauis est, ut alicuius vasis fracturæ periculum imminet, vel est usq; adeo molesta, & frequens, ut somnum adimat, & quietem omnem: pariter Difficilis Spiratio cum in Orthopnoeam tendit, & eam quidem cum periculo suffocationis, ipsi occurrendum symptomati.

Curatio Tussis.

Ardendam itaq; Tussim duo valent medicamentorum genera: vnum quod partes arteriarum exasperatas leuigare, & complanare potest: alterum, quod fluentem materiam compescere, & intercipere valet in prima classe sunt omnia medicamenta quæ componuntur ex succo glycyrrhizæ, amygdalis dulc. contritis amygdalagacantho, penidist, zuccaro aut candio, aut communi cum mucilagine vel sem. maluz, aut radi. cum alihæ eex his componuntur formulæ, quæ sub lingua continuò detinentur vnam ex istis descriptam habetis apud Gal. in lib. de parat. facil. c. 14. sed communissima, & officinis vulgaris habetur apud Mesu. in cap. de Tussi sicca, ubi habet duas pilularum bechicarum descriptiones: prima est Rhasis, secunda est ipsiusmet propria, quæ, ut dixi, officinis omnibus est communis.

Ad intercipiendum catarrhum valent omnes, confectioes opiatæ, ut propterea Gal. in hunc usum 5. meth. 13. acceperit theriacam recentem Mesue ab Alexan. Trall. in hunc usum accepit pilulas de cynoglossa, quibus crocum addit: datur semidrach. post. cænam, & certè mirificè Tussim sedant.

Non displicent inunctiones Thoracis factæ ex mucilagine semin. mal. butyro recenti, oleo amygdalino.

Ego felicissimè vti soleo emplastro facto ex pomis dulcibus, primò quidem tritatis, postea coctis

coctis in olla cum oleo amygdulæ butyr. & modico croco ad penetrationem.

A si tussis non sit usque adeo infensa, caussis est incumbendum, atque ideo si fiat ex intemp. frigida, ut antea dixi, sola spiritus compressio aliquando ipsam sanat, si tamen perseveret, convenit extrinsecus inunctio ex oleo chamom. liliorum alborum. Gal. (5.) 8. met. 13. utebatur medicamento ex Thapsia, sed de hoc medicamento inferius loquemur.

Intrinsicus conveniunt magnæ antidoti: antiquæ theriaca, mithridatum, diatriopiper. Gal. loc. cit. proponit diaspermaton, siue confectioem ex seminibus, quæ est opiata, & proponitur non tantum pro refrigeratione instrumentorum, quantum pro reiectione sanguinis. Atque ubi sanguis non reiecitur, neque recens theriaca valet; neque Diaspermaton.

In Tussi ex intemperie calida inunctio fiat ex oleo violato, nenuphar. fiat eclegma ex mucilag. psylli, emulsione seminum papau. albi, aut melonum cum syrupo viol. simp. Potius sit aq. hordicibus vetò pulana.

In intemperie sicca conveniunt omnia humectantia, de quibus dixi in tract. de Phthisi, quæ modò non repeio.

Curatio Orthopneæ;

Venio ad curationem Orthopneæ in Accessione, quo tempore varia conveniunt reuulsionum genera clisteres acres, & præcipue, quæ flatus discutiant; quando quidem si Septum transversum à paribus naturalibus flatu repletis non comprimatur, facilius spirant in eundem usum faciunt Cucurbitulæ, Ligaturæ, Frictiones.

Si Orthopneæ fiat cum abundantia sanguinis, in ipsa accessione convenit etiam venæ sectio; propterea Hipp. 4. acut. 21. inter ceteros affectus quos inquit requirere venæ sectionem ante purgationem, proponit Orthopneam siccam, id est, ut ipsemet, & Gal. interpretatur, inflammationem non suppuratam; at ubi pus est factum, ubi crassi & visceri abundent humores, perniciosa est venæ sectio. Conveniunt quoque interceptientia fluxionem, quia (ut antea dixi) gravis Orthopneæ tunc sit, cum crassis humoribus in Pulmonibus collectis, tenuis accedat materia confestim ex capite descendens. Hanc igitur interceptere oportet, & quamvis ad illam interceptiendam valeat Diacodon, Ditrachanthum cum bolo Armena, & pilulæ illæ bechicæ, in suffocationis periculo propter hanc tenuem fluxionem expedit ascendere ad opiata. Licet enim Gal. 7. de comp. per loc. c. 6. in omnibus spirandi Difficultatibus opiatorum usum prohibuisse videatur, nihilominus 1. 2. method. 1. in hac suspitione suffocationis concedit usum opiatum medicamentis itaque ad pilulas de cynoglossa erit confugiendum.

Derivanda quoque est materia ad partes Thoracis exteriores, & propterea laudat Aetius Rubrificantia quædam, ut frictionem Thoracis cum pumice, cum squilla, vrticis Gal. 1. 1. met. cap. 17.

A ad extrahendam materiam, quæ in Pulmonibus est, præter alia calorisifica, laudat quoque cucurbitulam ipsi Thoraci affixam.

Sed illud vobis notandum, neque cucurbitulam neque rubificantia ea administranda, quando fluxio sit ex capite; nam augebunt fluxionem neque cum corpus est plenum, sed tantum in Orthopneæ ex primaria pulmonum repletionem, & post universales evacuationes, & reuulsionem. interim vitendum eclegmate, quod valenter crassos attenuet humores, & vias aperiat. itaque poteritis medicamentum sic componere.

Recipe sal. Ammoniac. gr. x.

Oxym. scyllit. vnc. i. M.

Hoc medicamentum ad incidendum, & attenuandum est efficacissimum. Alii accipiunt ipsum gummi Ammoniacum in aceto dissolutum, addito syrupo de hyssopo, & oxym. scyllit. sed ubi materia partim fluat, partim sit impacta, proponendum medicamentum mistæ facultatis hoc modo.

Recipe Amyl. Tregac. an vnc. ij.

Pulu. Ileos. Hyssop. an drach. i. sem.

Sirup. de farfar.

deliquirit. an. q. s.

Oxim. scyllit.

M. pro Lambit. de Accessione satis.

Extra Accessionem cum variz sint causæ, vario quoque modo curatio est instituenda. Si fiat difficilis Spiratio, aut Tussis ex crudo tuberculo, Gal. 7. de comp. loc. 6. & 4. meth. c. 17. inquit, totam curationem huius positam esse in medicamentis aromaticis calidis; & siccis, materiam tuberculi absumentibus; idcirco proponit usum theriacæ antiquæ, Ambrosiam, & Athanasiam, quæ sunt medicamenta ex multis conflata aromaticis; & gummi calidis, Syrace, myrrha, costo, cassia lignea, cinnamomo, videatis descriptionem apud Gal. 2. de Antidot. 8. itaque medicamenta sint calida, & sicca.

Victus ratio pariter ad siccum inclinet; propterea Gal. in 7. de comp. per loc. posuit quidem vini generosi concedit, sed in pauca quantitate.

At verò si Difficilis Spiratio fiat ex tenui humore, hunc, ut dixi, in crassare oportet: modum in crassandi partim proposui in tract. de catarr. partim nuper trimis; itaque non receptam.

Venio itaque ad crassum catarrhum, si fiat Spiratio Difficilis ex catarrho admodum crasso, primum quidem conveniunt omnia illa euacuantia, & totum, & caput, reuellentia, & derivantia, atque Exsiccantia ipsum caput, de quibus dixi in tract. de Catarrh.

Vnù in præsentia moneo circa vomitum, qui commendatur à Paulo in his casibus, Vomitum in Orthopneæ minime convenire, si materia primaria in Pulmonibus contineatur, si angustus sit thorax, & si difficilis sit patiens ad vomendum Gal. quos, & quand. purg. oportet in his casibus vomitum prohibet. nunc itaque omni diligentia curabimus catarrhum iam in pectore existentem, ut crassa materia Pulmonibus adhærens facile educatur, & Pulmones ita exsiccantur, & corroborentur, ut in posterum neque geneten, neque materiam.

Vena
sect.

Opiato-
in vsu.

Vomitum

teriam suscipiant novam, ita in curatione procedendum primum quidem praemissis, & capitis evacuationibus, ac reuulsionibus convenien-
tibus laudo, ut per quinque dies continuos praebatis sem. vnc. huius electuarii, ter in die naturali, videl. i. hor. ante prand. 2. hor. ante cenam, & hor. 6. post cenam. Electuarium est tale,

Recipe Penidiar. vnc. ij.

Mann. elect. vnc. ij.

Ol. amygd. dulc. rec. vnc. i.

Flor. cass. nou. extr. vnc. sem.

Pulm. Vulp. prepar. drach. ij.

Ducantur in mortario, & f. Elect. & vsurpetur, ut dictum est.

Hoc Electuarium aluum servat lubricam: propterea catarrhum diuertit, & parres thoracis dilatat. Post primos quinque dies hoc aliud laudo electuarium, quod nihil praestat, quam vias dilatet, & sputum iam induratum emolliat: Componitur hoc modo:

Recipe passul. ping. enuel. vnc. ij.

Saccar. fia. vnc. iii.

Ol. amygd. dulc. vnc. i. sem.

Dissolvitur saccharum, & additis passulis.

Et oleo f. Electuarium Dosis est vnc. sem. ante prand. & cenam: mirifice Thoracem dilatat, ut probavi experientia. in eundem usum facit conserua florum malus, aut conserua ex radice altheae simul cum melle, & pro pauperibus est optimum remedium.

Interim dum sic dilatantur viæ extrinsecis remedijs debet iungi thorax, linimentis se emollientibus, quale est vnguentum pectorale vocatum, oleum amygd. commune, pinguedo anatis, & anseris, butyrum recens, aut emplastrum ex pomis descriptum in praecedenti lectione.

Intussecus verò eclegma parandum, quo paulatim singulis vtatur horis ad educendam materiam iam emolliatam: Poterit sic parari:

Recipe radic. ircos. Semin. bombac. an. drach. i. sem.

Pulver. calaminth.

Serpentar. Cent. maior. an. drach. i.

Succi enulæ.

pulmonar. an. vnc. i.

Oxymel. scillis.

Syr. de sarsapar. an. q. s.

M. pro Lambicuo.

Vbi satis superque emollita est materia, atque etiam pro maiori parteeducta, alia conveniunt remedia, quæ humorum reliquias consumant, & pulmones roborant. Multa proponuntur adstrictoria. Ego præstantiora vobis nunc referam, probatissimum est hoc remedium:

Recipe thebent. lot. in aq. hyssop. vnc. ii.

Ammoniac. drach. ii.

Penidiar. vnc. sem.

Pulm. Vulp. preparati drach. i.

Botryd. pulverizate.

Aristoloch. an. drach. i. sem.

*M. omnia, & ducta in mortar. retigan-
tur in form. elect.*

Dosis est ad vnc. sem.

Cautio circa vsum Pectoralium.
Medicamentum exsiccet, sed etiam detergit, quod in Asthmate ex crassis humoribus Gal. optatissimum est semper. n. vobis hoc est memoria tenendum, Pectoralia medicamenta in Asthmate pro crassa materia humidis debere esse admista, ut si fuerint sicca, cum aliqua humida potione præberi debent. Idcirco Galen. 5. simp. cap. 13. in affectibus Thoracis prohibet usum eorum medicamentorum, quæ verè diuretica sunt, ut apium, asarum, & similia, eo quod sunt nimis calida, & sicca, & tamen si legatus eundem Gal. 7. comp. loc. 6. ex sententia Archigenis, Andromachi, & aliorum, in huiusmodi medicamentis pro Asthmate ingrediuntur calidissima, & siccissima, piper, costus, cinamomum, cassia lignea, &c. sed quæ sunt sicca, debent præberi cum aliquo potu humido.

Idcirco secundo loco probatur summopere vsus aquar. thermalium, sulphuratarum, quales sunt nostræ Aponenses: exsiccant valenter: sed quia multa est portio, humectat etiam crassam illam substantiam, ut non facile induretur. Tertio

Aque Thermales Sulphur.
loco est Ius Galli antiqui: hoc ius præparatum in Asthmate est efficacissimū. Paratur hoc modo. *Ius Galli antiqui.*
In ventre galli antiqui cuiusvis ætatis, & flagellati, ac modicè saluti imponantur hæc.

Recipe prassi, hyssopi, puleg.

Botrydis Pulmonar.

Enul. Calamint. an. M. j.

Anis. Cimin. Danc. an. vnc. i.

Penid. vnc. sem.

Nucl. pin. vnc. iii.

Bulliant vsq; ad perfectam carnis coctionem, & f. forti expressione dentur iuris: vi. summo mane cum vnc. f. oximel. scillis in spatio 15. dierum; Vespere aut imo ante cenam iniiciatur clister, ex parte huius iuris crassiore addendo.

Hiera pro clistere vnc. 5.

Mell. rosat.

Ol. rutacei an. vnc. ij. M.

Archigenes, quod laudat summopere Gal. probat usum millepedum, siue asellorum, & ipsos exsiccet, exsiccatos cum melle excipit, atq; exhibet, à quo etiam accepit Aet. Anton. Valet. in exercit. 6. ad Hollet. scribit se à Græco quodam accepisse, familiare esse hoc medicamentum in Græcia; infundi tantum hæc animalia in vino, non autem præberi in substantia. habent vim, ut scribit Gal. attenuatoriam, & discussoriam: idcirco prodesse possunt.

Millepedes.
Alias plurimas compositiones potestis apud varios scriptores legere, sed tamen placet mihi huic parti coronidem imponere proponendo descriptionem Electuarii, quod habeo in lib. meis manuscriptis tanquam secretum opimum: habet omnes scopos, dilatandi Thoracem, emollienti sputum, attenuandi, & incidendi, exsiccandi, & corroborandi, & quia est descriptio longa, ne vos decipiam, tuli descriptionem, est opumè compositum.

Recipe butyr. recent. in aq. sarsara.

decies loti vnc. i. ij.

Nucl. pin. Passul. Daçyl.

Amygd. amar. an. vnc. ij.

Hyssop.

Hyssop. ireos thimi.
Satureja serpentar.
Pras. Pulegi.
Calament. sem. vrtic. an. vnc. sem.
Cinam. Caryoph. Gingib.
Galang. Pip. nig.
Anisof. Cardamo. an. drach. ij.
Lig. al. Nuc. mosc. an. drach. i.
Muls. dilut. lib. iij.

Conficiatur hoc modo : infunduntur Passulæ , & Daſyli per triduum in præd. muls. deinde eoq. lent. igne , & exprimantur : huic expresso succo add. buyr. iam propos. & iterum bull. in lib. ij. Mell. de spumati , & in fin. add. ipsos nucl. pin. amygd. & vnc. i. Pul. vulp. preparati. Huius Elect. datur vnc. i. vbi maximè vrgeat morbus , in mitiori affectu vnc. sem. quatuor hor. ante cibum spatio 30. saltem dierum ,

Sulph. Qui hoc modo non curantur , debent deinde ad maiora confugere. Grauiora sunt ipsum sulphur aut viuum , aut lotum cum aqua farsara. Datur drach. i. aut in ouo sorbili , vt præcipit Auic. aut cum melle : Est quoq; compositio in officinis Diasulphur vocata cuius datur vnc. sem. Flos sulphuris est adhuc multo fortior : Datur scrup. i. in conserua florum malu. & in therebintina perlucida. Auicenna quoq; exhibet arsenicum per hos : quod ego tanquam causticum reprobo : neq; vt ingenue dicam , placet mihi suffumigatio ex arsen. nam in hoc casu , in quo vix angustantur , suffocatio etiam immivet , quare hoc venenatum suffumigium poterit strangulare . Non improbo suffumigium ex stryace , belzuino , thure , myrras sicuti neq; improbatum extrinsecus Cauterium in ipso medio thorace . videbitur vobis immanis ggeratio . sed quid dicetis , si Aetium legatis , qui in hoc casu octo facit inuisiones , quas tamen Ego minime probo . Non tamen displicet , vt antea quoq; dictum est , in suffocationis periculo Fricatio Thoracis ad rubificationem ; & propterea medicamenta siue sinapismi , siue dropaces , quæ vim habent rubificandi , & aurabendi , in hoc casu probantur .

Cauterium .
Fricatio Thoracis .
Sinapis .

De Hydropneumonis nil habeo , quod dicam nisi quod dixit Hipp. 2. de morbis , sectionem scilicet in hoc casu esse faciendam : modum sectionis proponam in cap. de Empyemate : hoc tamen non præteribo ; in pauca aquæ quantitate mihi nõ improbari medicamenta valde exsiccantia , & victum medicamenti proportionatum ; ita vt in hoc casu minimè permiscenda vel addenda sint humida medicamenta , sicuti cum materia est crassa : imò verò licet vii solis , & legitimis diureticis : quandoque enim materia Thoracis , & Pulmonis per vrinâ purgatur . licet quoque vii sulphure , atq; alijs exsiccantibus .

Victus ratio in Asthmate proportionem respondeat .

DE PLEVRITIDE Cap. XXVIII.

Tameñ multæ sint in Thorace partes inflammationibus obnoxie , Pulmonibus exceptis , vt Pleura , Periostrum , Musculi intercostales Interni , & Externi , Septum Transuersum , & Mediasti-

A num , nihilominus , quia harum omnium curatio paucis admodum mutatis coincidit cum curatione vera Pleuritidis ; ideo sub hoc titulo curationem complectemur omnium inflammationum , quæ propositas partes infestant . a Pleuritide igitur exordium lumentes , quæ Pleuresis Arabibus Latinis Dolor Lateralis dicitur : hæc primò duplex constitui potest . vera vna altera falsa .

Pleuritis duplex.

Vera Pleuritis est semper inflammatio : Falsa est Dolor Lateris sine inflammatione siue ex flatu extendente , siue ex vapore acri , aut intemperie cum materia : huius meminit Gal. 5. de loc. aff. 3. Istius quoq; puto mentionem fecisse Hipp. 2. acut. in primis text. ubi . quando consulit vtendum fomenti tentatiuis .

Vera Pleuritis adhuc multipliciter distinguitur : nam vna est legitima , altera spuria . Legitima adhuc bifariam diuidi potest ratione loci affecti .

Est autem legitima exactè exquisita inflammatio membranae succingentis costas in parte Thoracis anteriore : Legitima sed non exactè exquisita est inflammatio ei usdem membranae , sed in parte Thoracis posteriore . cum autem dicitur inflammata esse Pleuram , illud animaduertendum quod docet Gal. 5. de loc. aff. 3. affecta membrana confici etiam musculos intercostales internos , sicuti quando inflammatio in musculis internis incipiat ipsi Pleuræ communicatur , & hæc , vt dixi , est duplex Pleuritis legitima , quæ vobis est notanda , quia multi pleuritici fiunt ex parte posteriore , vt docuit Galen. 5. de loc. affect. 3.

Definitio .

Spuria Pleuritis ratione loci ea est , quæ occupat musculos intercostales aut internos , aut externos sine Pleura , aut occupat ipsum periostrum , adhuc magis spuria est , quæ fit in Mediastino . Potest etiam ad spurias referri inflammatio Septi Transuersi , quandoquidem cum membrana succingente costas communionem habet , inflammatio autem musculorum Thoracis superiorum , & eorum quoque , qui etiam in Thorace reperiuntur faciunt tamen ad motum non Thoracis , sed brachiorum : iste sunt omnino extraneæ oculis patientes nullo modo ad Pleuritidem referendæ neq; ad spuriam ; neque ad legitimam .

Est quoque Pleuritis legitima , & spuria ratione materie . nam sanguinea Pleuritis legitima est biliosa , pituitosa , & melancholica spuria : quamuis Galenus 4. de caus. puls. 8. mentionem non fecerit Pleuritidis melancholicæ , ideo tam omisit , quia cum sermonem faceret de Pleuritidis pulsibus , & intelligeret melancholicam Pleuritidem non fieri ex melancholia naturali , sed ex exusta , vt docuit libr. de const. art. propterea nouit , & supposuit pulsum Pleuritidis melancholicæ esse eundem cum pulsu pleuritidis biliosæ . Huius vero melancholicæ pleuritidis meminit . 2. de Cris. 2. & 2. de diff. feb. 9. & libr. de const. art. cap. 15. quo in loco docet apertè , nomine Pleuritidis pituitosæ , & melancholicæ non intelligere tumorem ex syncera pituita , & melancholia ; quandoquidem apertè docet (& notate locum) pituitosum , & melancholicum tumorem in pleura nullam facere febrem .

Mor.

Huiusmodi Pleuritis ex tam multiplici causa producta sit vel per modum attractionis ex calore, & dolore, siue calor fiat ex motu, siue ex balneo calido, aut inunctione, aut cucurbitula, vel alia simili causa; aut sit per modum transmissionis, parte aliqua fortiore in hunc locum excrementa mittente, siue sit cerebrum, ut in Pleuritide pituitosa, siue alia corporis partes, praecipue verò vterus, & haemorrhoides suppressae; propterea scribit Hipp. 4. in 6. Epid. 37. eos, qui tentantur mariscis, neque Pleuritide tentari, neque Peripneumonia, neque alijs. ex ventriculo, quamuis imbecilli, & multam generante pituitam, Pleuritida aut raro, aut nunquam fieri consuevit, & hoc est quod scribit Hipp. 6. aph. 33. eos, qui acidum eructant, Pleuritide non admodum tentari. id quod etiam repetit lib. de aer. aq. & loc. Fit etiam Pleuritis suscipiente parte fluxionem praepter imbecillitatem, siue imbecillitas sit naturalis, ex gibbositate, scilicet. nam gibbi Pleuritidi sunt subiecti; Aut quia morbus sit haereditarius: Ego enim noui quosdam, qui saepissime in Pleuritide vexatum: sit quoque imbecillitas ex percussione, aut casu,

Pleuritis hanc ditas.

Signa.

Cognoscitur hic affectus quinq; illis signis tantopere à Galeno decantatis 2. de cris. x. 2. de loc. aff. 9. 3. de loc. aff. 3. lib. de const. art. c. 15. & alibi. Sunt autem Dolor, Tussis, Febris, Difficultas, Respirationis, & Pulsus durus.

Per haec signa rectè considerata non modò dignoscitur Pleuritis, sed etiam distinguitur, & à falsa, & ab omni spuria, & ab inflammatione iecoris, & ab ea, quae non est exactè exquisita.

Distinguitur à falsa, quia in falsa febris non ad est, aut admodum exilis, & potius praecedit, quam subsequatur dolorem, dolorque ipse est vagus, ac mobilis: Respirationis est non admodum difficilis, tussis non adest, ut docuit Gal. 5. de loc. aff. 3.

Differt autem ab inflammatione iecoris: primò quia dolor Pleuriticus est punguius; dolor inflammationis iecoris est grauius; praeterea dolor Pleuriticus quandoque ascendit ad iugulum, quia membrana succingens costas ad iugulum perducitur: dolor iecoris nunquam transit mendosus costas. Tertio quò magis pleuritis augetur, eò tussis sit validior, & sputum appareat: in inflammatione iecoris tussis semper est exigua, & ea quidem sicca: accedit quòd in inflammatione iecoris pulsus non est durus, sicuti in ipsa Pleuritide. haec signa, & alia maioris momenti colligite ex Gal. 3. de loc. aff. ult.

Distinguitur etiam à Pleuritide spuria ratione loci, quia in Legitima dolor exacerbatur, quando patiens veretur in latus oppositum laboranti lateri; in spuria exacerbatur decumbente aegro super parte affecta, & ideo, si digitis prematur locus ille, doloris habet sensum. praeterea pulsus minimè durus est, vel multò minùs durus est, quàm

A in legitima Pleuritide. Tertio in spuria Pleuritide Tussis non adest, auctor est Galen. 5. de loc. aff. 3. Fauet huic ratio: Nam Tussis non fit nisi irritentur Pulmones; at quomodo irritabuntur illa membrana costas succingente? non inficior, augescente hac inflammatione posse aliquem vaporem, & Pleuræ, & Pulmonibus communicari, ut Tussis fiat eodem modo, quo fit etiam ex inflammatione iecoris, sed tamèn hoc non semper contingit.

B Differt quoque ab inflammatione Septi Transuerfi, quia spiratio in eo casu est difficilior, & delirium maius; modò verò, inflammatio Septi est cū delirio usque adeo magno, & continuo coniuncta, ut eam putent phrenitidem esse firmatam, & hinc voluit Phrenitidem esse nominatam à Septo Transuerso, quod Graecis *σπείρας*, id est Mens appellatur.

Differt quoque ab inflammatione Mediastrini: nam in hac inflammatione dolet pars anterior aut posterior Thoracis non circa latera, sed circa mediam Thoracis partem.

C Inflammationes variae pro varietate materiae facile distinguuntur; primum quidem ex sputo: nam Sanguinea habet sputum sanguineum: Biliosa flauum; Pituitosa spumosum; Melancholica liuidum, aut nigrum. Possunt etiam distinguere circuitu febrium: nam biliosa exacerbatur de tertio in tertium, ut est videre apud Gal. prima aph. 12. Sanguinem habet febrem synocham: Pituitosa quotidie exacerbatur: praeterea ex pulsibus potest haec distinctio fieri, nam in biliosa, & melancholica plenitudo pulsus sunt omnium durissimi, in sanguinea minus, in pituitosa ferè nihil.

Notatio de Pulsu Serrino.

A Vdri aliquando, vulgares Medicos pleuriticorum pulsus explorantes statim affirmare eos Pleuritide tentari, qui Pulsum habeant Serrinum vel serranum; qui, ut ingenuè dicam, mihi vix sunt potius ex scripto, fortè etiam perperam intellecto, quàm ex rei veritate duci. Gal. 2. quidem de Cris. 10. inquit Pulsum Serrinū esse proprium inflammationis pleuritidis: sed lib. de puls. ad tyron. c. 1. & 4. de caus. puls. 8. hanc tuam explicat sententiam, & docet, non in omni Pleuritide Pulsum esse Serrinum, sed in magna tantum; neque in omni magna, sed quae pro parte est mutata in abscessum in pus; nam si tota materia sit in pus versa, pulsus minimè facit serrinum; Vbi medio modo se habet, vult Gal. Pulsus esse Serrinum, id est, dum tangitur quatuor digitis, sub vno digito apparet durum, sub secundo mollem, sub tertio durum, sub quarto pariter mollem, eo quòd sicuti inaequalis est materia in inflammatione partim cruda, partim in pus conuersa, ex cruda durities, ex putulenta molities sentiatur. Haec sententia, praeterea quod mihi nunquam proprio innouit experimento, videtur omni ratione carere: nam ut alia omnia omittam, tactus ipsius pulsus non est omnibus vnus, & idem: esto igitur, sint duo, qui tangant pulsus, vnus quidem in vna arteriae parte, alter verò in alia; necessarium erit, si vera

si vera sit Galen. ratio, ut ea pars, quæ vni digito erat dura, alteri sit mollis, & quæ erat mollis, dura: præterquam quod animo concipi non potest, arteriam per tam breue spatium posse hanc insignem obtinere inæqualitatem, ut particulâ sit dura, altera verò mollis, & ut ingenuè dicâ, puto esse fictitiâ, & imaginariâ pulsus differentiam.

Prognostica.

Venio ad prognostica: sunt hæc vel longitudo, vel breuitas, vel salus, vel mortis, vel modi euentus Pleuritidis. Quod ad primum pertinet, quanquam omnis Pleuritis sit morbus acutus, ut colligitur ex primo acut. 8. & propterea 14. die, si legitima sit, quod summum est, absolui consuevit: Spuria tamen siue pituitosa, siue melancholica, multo longior esse consuevit, facili autem prædici potest huiusmodi longitudo aut breuitas non tantum ex Pleuritidis idea, quod scilicet sit, vel biliosa, vel sanguinea, vel pituitosa, vel melancholica, sed magis ex præcognitione, & cognitione temporum Pleuritidis: nam si citò transeat principium, & augmentum breuem Pleuritidem oportet esse: si longiora fuerint hæc tempora, longa quoque ipsa erit.

Cognoscitur autem principium Pleuritidis longum esse, si aut nullum appareat sputum, aut illud tenue, & crudum, præterea album & paucum, cognoscitur Augmentum, si sputum iam appareat, & magis crassum, ac coctum, quam antea: si præterea symptomata pathognomonica, Tussis, Dolor, Febris, Difficilis Spiratio, & Pulsus Durities intenduntur: si denique alia superueniant accidentia, sicut, vigilæ, nausea & huiusmodi.

Status cognoscitur ex sputis copiosis, facilièeductis; quæ omnia colliguntur ex Gal. primo de Cris. 18. Quod autem scribit 3. de loc. aff. vlt. delirium superueniens Pleuritidi esse signum status, aut intelligendum est de principio, aut falsa erit sententia: nam delirium in augmento superuenit.

Prognostica ad mortem partim colliguntur ex lib. de tot. morb. tempor. cap. 6. partim ex 2. prognost. à text. 43. vsque ad 48. & in text. etiam 56 capiuntur enim à sputo, vel non apparente, vel livido, nigro, admodum spumoso, scetido, bilioso, impermixto, difficile excreto, præterea verò ex symptomatibus pathognomoniceis maximis, ex superuenientibus malignis, ut delirio vehementi, vigilis, vomitu, inappetentia, alui fluxu, de quo scribit sigillatim Hipp. 6. aph. 16. alui fluxum Pleuritidi superuenientem malum esse, eo quod, ut scribit Galenus, indicium sit hepatis simul cum ipsa Pleura inflammati.

Definit Pleuritis aliquando in Peripneumoniâ, quod etiam pessimum est, sic scribente Hipp. 7. aph. 1. ex Pleuritide Peripneumonia malum: permutatur quandoque in Phrenitidē, quod etiâ pessimum est: sic scribit Hipp. 6. in 6. Epid. 21. mōis motionem pleuritidē sanare; aliquando tamē adest mentis motio & pleuritis: nonnunquam permutatur in abcessum, vel in suppurationem. sic scribit Hipp. 5. aph. 8. pleuriticus, qui in 14.

die non expurgantur, transire in suppurationem siue Suppurationis nomine intelligamus transmutationem materiæ in pus, siue collectionem puris inter Pulmones, & pleurâ in capacitate Thoracis.

Curatio.

IN Curatione Pleuritidis cogor uti omni diligentia; neque enim vllum remedi genus in Remedii Pleuritide vltimum proponi potest, quod maximam non habeat controuersiam: idem dico de diuisione rationis: suntque antiqua satis hæc disceptatio, ut licet colligere ex Galen. primo de placit. Hipp. Plat. 25: ubi scribit, dubitasse Antiquos, vitum melior sit venæ sectio, an purgatio: hæc sit de mulla, petisana, de aqua, & aliis id genus plurimis: Nos itaque à venæ sectione, & purgatione initium sumentes quinque circa venæ sectionem considerabimus: Primum vitum conueniat in omni Pleuritide: Secundum vitum si conueniat, præferenda sit purgationi semper, an potius aliquando purgatio præcedere debeat sectionem venæ: Tertia questio erit de loco sectionis venæ. Quarta de quantitate mittendi sanguinis. Quinta de tempore.

Quod ad primum pertinet: Hipp. in illo 4. acut. 76 videretur apertè voluisse aliquando in Pleuritide prætermittendam esse venæ sectionem, & loco illius purgationem esse accipiendam; cuius sententiam amplectari videntur ex Græcis Aer. Alex. ut propterea idem Hipp. 4. in 6. Epid. videatur quoque rationem proponere, propter quam nō licet semper in Pleuritide venam secare, inquit enim in cruenta spuitione venâ non secari, si ad sit dolor lateris, bilis: quasi voluerit Hipp. in Pleuritide biliosa cum cacochymia non licere venâ secare, propterea Auic. in hac Pleuritide biliosa sectionem venæ prohibet: & quod magis est Gal. loc. cit. com. vlt. 4. in 6. Epid. asserit, in parua Pleuritide se aliquando venam non secuisse, quasi voluerit nos Galenus monere, in parua Pleuritide sectionem venæ non esse necessariam, sed quod ad hanc pertinet difficultatem, Ego sanè arbitror, in omni Pleuritide modò vires consent, venam esse secandam: licet enim biliosa & pituitosa sit Pleuritis, ut in natura explicanda vobis significauimus biliosum, aut pituitosum, nō sinceram bilem, aut pituitam, & propterea quamuis plenitudo sit spuria & notha, in morbo tamen vique adeo periculoso, & graui est necessaria venæ sectio: multo magis, ut puto, facienda est in Pleuritide sanguinea, quanquam parua: nam tamen ab initio parua videatur Pleuritis, progressionem tamen temporis augetur, & quandoque Medicus vult suppetas ferre, cum iam tempus præterit, non improbo tamen, ut in hac parua Pleuritide vitamini ab initio statim fomento aliquo tetratio doloreni leniente, & materiam discutiente, sunt enim hæc instituta, ut docuit Gal. in illis primis com. 2. acut. & confirmauit Trallian. ut videamus, nunquid valida sit in corpore plenitudo: nam si adhibita fomenta dolorem leniant, humor iam fluxus digeritur, & nouus non influit.

Quinq; consideranda circa venæ sect.

itaque in hoc casu venę sectio prætermitti potest, qualia sint hæc fontenta, audietis suo loco. Sed quid dicemus ad Hippocratem, qui, ut dixi, purgatione vitut dolore descendente; sectione autē venę dolore ascendente? Puto (Auditores) Hippocratem sic interpretandum: in omni Pleuritide secandā esse venam, si vires cōstet, sed dolore ascendente primò secandam esse venam, deinde purgandum; dolore verò descendente primò purgandum, mox venam secandam: nam ubi dolor descendit, humor est gravis pituitosus; itaq; expedit, cacochymiam minuere, antequam secetur vena, & propterea idem Hipp. videtur hanc suā explicare sententiā in eod. 4. acut. 10. ubi proponit eos affectus, in quibus venę sectio præmittenda est purgationi; qui tamen affectus utrumq; requirunt remedium: quare ita in hac parte agendum puto, & simul & semel satisfecimus secundo quæsito, quod erat utrum venę sectio debeat semper præmitti purgationi, an potius e cōtra.

Quæstio
nes de
loco mis
sedi sãg.
in Pleu-
ritide.

Modò antiquissimam, & difficillimam de loco sectionis venę in Pleuritide quæstionem decreui in præsentia reddere facillimam. Sunt, ut video, quinque hac in re præcipuę sententię. Prima elicitur ex Hipp. 4. acut. 76. vel 75. cui subscribit Galenus eodē loco, & libr. cur. per sang. miss. 16. Secandam scilicet esse venam in Pleuritide è directo partis laborantis, & eam quidem proximam, laborante scilicet latere dextro, eam quę est in cubito dextro; laborante sinistro eam, quę est in sinistro. Huic etiam sententię adhaeret Celsus; & ex Arabibus scriptoribus Constantin. Africanus ex sententia Isaac hanc eadem tuetur sententiā: Cum verò Arabum familia nouam induxisset opinionem, ante paucos annos primus omnium Petrus Brisotus Parisiensis veterē Gal. & Hipp. sententiā non tantum opere, sed & doctissimis commentariis restaurauit: cuius vestigia secuti sūt hactenus Curtius Papiens. Ferdin. Mena Hispan. Manard. & alii plurimi, qui hac de re commentarios ediderunt publicos.

Secunda sententia est eorum, qui putant semper venam lateris oppositi esse secandam: Huius opinionis fuit inter antiquos Aurelian. 2. acut. 18 & Archigenes ex Aet. 2. tetrab. serm. 40. cap. 58. & Gariopont. Medicus antiquissimus: quorum sententiā ex Recentioribus mordicus tuentur Andreæ Tucinas, Trineauel. & alii, qui pariter publicè contra opinionem Brisoti, & aliorum scripserunt.

Tertia opinio est eorum, qui putant primò secandas esse venas inferiores, biq; diuisi inter se sunt: nam Auic. vult secari primū venam pedis eiusdem lateris, postea venam cubiti oppositi, deinde venam eiusdem lateris affecti; Mesue ut longiorem faceret reuulsionem, incipit a sectione venę pedis partis oppositę, deinde secat venam in cubito opposito, postea eandem lateris affecti.

Quarta opinio est eorum, qui volunt primò secari venam lateris oppositi, deinde verò proximam, in qua sententia est Rhases, & Auerr. 7. collect. 29. & Halyabb. 6. practico; atque alii plurimi Arabes.

Quinta opinio est Vesalij, qui putat, in omni Pleuritide siue dextra, siue sinistra solam dextri lateris venam esse aperiendam, eo quòd existimat sanguinem, qui facit omnem Pleuritidē, mitti à vena illa azygos vocata, siue sine pari, quę incipit in parte dextra, & desinit in sinistram, ita tamen ut rami illius non inferantur in venas partis sinistra, & propterea, inquit ipse, necessarium est, ut si sanguis in parte sinistra consistens educti debeat, iterum reuertatur in dextram, & propterea sectio partis dextre melius hunc euacuat sanguinem.

Vesalij
opia.

Cum hæc & tot sint de loco secandę venę sententię, primū quidem reiicienda est proflus Vesalij opinio; non quidem propter eam rationem, quam attulit Amatus Lusitanus cent. 2. curat. 51 qui docet, venam azygos habere ostiola, quę admittunt quidem sanguinem ipsam ingredi, sed prohibent egressum, ita ut propter hanc causā sectio venę sanguinem illum euacuare nō possit: cui sententię adhaeret etiam Holler. cum tamen Andr. Laur. lib. 7. cap. 3. hanc Lusitani sententiā reiiciat, atque asserat, illam experientię non conuenire: Quicquid sit de hac re, alia est ratio, propter quam accipienda non sit Vesalij sententia, quod scilicet non semper fiat Pleuritis circa octo inferiores costas, sed quādoque circa quatuor superiores, in quo casu dolor ad iugulum ascendit; quatuor autem costę superiores non recipiunt sanguinem à vena azygos, ut ipsemet quoque fateatur.

Vesal. o.
pin. rei-
cta.

Quod pertinet ad alias sententias, illę omnes, quę volunt, incipiendam esse venę sectionem à partibus ab inflammato loco remotis habent pro se rationes insolubiles: sūt & tamē in actu practico magna ex parte aliter est agendum. Rationes insolubiles sunt: Primo quia certum est, & omnibus acceptum, ut inflammationibus incipientibus ante deriuationem opus esse reuulsionis: Secundò est quoq; omnibus notum Reuulsionem debere fieri non ad proximas partes sed ad remotas. Hęc est sententia Glauc. 2. Glauc. 2. lib. de reuuls. & alibi pluries. Tertiò certissimum est, oppositas partes esse & inferiores cum supernis, & sinistras cum dextris, aut dexteras cum sinistris, ut omittā in præsentia eam, quę sit ab ante in retro, aut contra, ab intus foras, vel contra. Quariò certissimum est, in Galeni doctrina fieri reuulsionem æque vtilem, laborante vna parte superiore ex infernis, atq; etiam ex opposito latere. Id potestis colligere ex eod. Gal. 13. meth. 5. qui laborante vno crure, inquit aliud crus scarificandū. Et tamen eod. lib. cap. 11. laborante crure vtilem inquit esse reuulsionem ad brachia: Sic laborante brachio, utilis est reuulsio ad inferna, & ad latus oppositum.

Cum igitur hæc ita se habeant, summa cura ratione visi sunt Arabes, & qui eorum doctrinā sectantur, circa inflammationis initia uti reuulsoria venę sectione, aliquando ex pede, aliquādo ex latere opposito.

Illud quidem minimè accipio, quod à Mesue propositum est, ut pedis oppositi vena secetur. Cōsulit vtiq; Hipp. per directum, & per communes vias faciendas esse reuulsiones, quod etiam do-

et Gal. 2. Glauco. 2. At vena pedis oppositi neq; A directionem, neq; facilem habet cum latere opposito communionem.

Neq; verò probatur omnino Auic. opinio, qui etiam ad inferiora, & oppositum latus reuellit: nam quod pertinet ad reuulsionem ad inferiora, hæc mihi tunc probatur, cum Pleuritis fiat ex suppreffis mensibus, & hæmorrhoidibus; in quo casu si vna non sufficiet reuulsio, constantibus viribus, repetenda est secunda, aut sacrificanda sunt crura: vbi verò neq; ex vterq; neque ex hæmorrhoidibus fluxio fiat, sed ex iecore, aut liene, rarius est pro reuulsione eligere brachium oppositum dummodo tamen, vt dictum, & suppositum est, fluxio sit in principio, aut quando maxima sit totius corporis plenitudo, vt tunc possit nis vena secari eodem die: nam in hoc casu inflammatione incipiente primò potest secari vena partis oppositæ, deinde verò persistente dolore eodem die secabitur vena lateris æstet.

Quando
secari
possi
venæ
late-
ris
oppo-
siti.

Audiuiti qua ratione Arabum sententia, & eorum, qui illos sequuntur, sit amplexanda: nunc audite, cur admodum raro ita sit agendum, sed potius in omni ferè Pleuritide statim secanda sit vena eiusdem lateris affecti.

Non cur
secanda
eiusdem
lateris.

Prima ratio est; quia inflammationes interne raro admodum nobis innotescunt in verò, & legitimo fluxionis initio, nam dum fluxio, sit non tamen est facta, inflammatio non potest habere ea signa, quæ sunt pathognomonica inflammationis: Pathognomonica sunt dolor, tussis, febris, difficultas anhelitus, pulsus durus: vbi adsunt hæc certissimum est argumentum fluxionis iam factæ: non enim hæc consequuntur fluxionem dum iam incipientem; nam si debet febris ardens, & acuta excitari, & alia omnia iam proposita symptomata oportet fluxionem esse factam; si fluxio est facta, ergo opus est deriuatione, & non reuulsione, & in hoc omnes conveniunt, sed in hoc differunt, quòd Arabes constituunt tempus principii trium, aut quatuor dierum, sed hallucinatur; nam aliquando vnica die sit inflammatio, & ea quidem maxima, & propterea dicebat Gale. in cō. 6. 2. 4. par. obstructionem, & inflammationem repente fieri: et ratio est, quia aliquando, imò magna ex parte Pleuritides fiunt per decubitus: at decubitus subito, & confertum sit. Quod si quis dicat: Quomodo igitur differt principium inflammationis ab augmento, si in principio fluxio est facta? Distinctionem ponit Galen. lib. de morbor. temp. c. 1. Inquit: inflammatio in principio non differt ab inflammatione incrementi in specie, in forma: habet eundem characterem, tumorem, ruborem, sed differt secundum magnitudinem, quia aliquantulo maior est in augmento; aut quia aliquod adhuc confluit, aut quia sanguis iam fluxus incipit concoquit, & in pus transmutari, vt propterea dixerit Gal. lib. de morbor. temp. c. 3. in hoc differre inflammationem augmenti ab inflammatione principii, quia in augmento materia fluxa incipit verti in pus. itaq; concludamus, si in principio materia est iam fluxa, quantquam admittamus aliqua ex parte adhuc fluere, in hoc casu conuenit euacuatio deriuatoria, quæ si-

Obiectio

Salutio.

mul reuellit, & fluxam, materiam euacuat: et propterea Hipp. qui optimè nouit, etiam in principio Pleuritidis, materiam iam esse fluxam in illo 2. acut. 10. consulit mittendum esse sanguinem vsq; ad mutationem coloris, eo fine, vt docet Gal. in com. v. reducat sanguis in ipsa inflammatione contentus, & propterea Galen. ipse lib. illo de rat. cur. per sang. miss. cap. 16. venam eiusdem lateris in Pleuritide sectam inquit presentancum attulisse auxilium, in opposito latere aut nullum, aut paruum.

Itaque tandem concludamus, cum accesseritis ad ægros, quibus ad sint hæc Pleuritidis signa, minimè in dubium reuocandum, fluxisse, seu fluxam iam esse magna ea parte materiam; alioquin nec dolor, nec tussis, nec cetera adessent, in quo casu nisi, vt dixi, menses sint suppreffi, aut si ma corporis plenitudo quoad vasa, statim aperienda vena eiusdem lateris: in aliis casibus quomodo agendum intellexisti.

Dum incidit sermo de quantitate mittendi sanguinis in Pleuritide, duo queri possunt: Primo: Virum conueniat sanguinem euacuare in maxima copia, & vsq; ad animi deliquium: Secundo: Virum reperta venæ sectio ex eodem latere loci habeat: Quod ad primum Hippoc. cui subscribit Gal. 2. acut. 10. mittit sanguinem vsq; ad mutationem coloris, dum s. ex rubro in nigrum mutetur. quod est dictum vsq; quo euacuatur sanguis ille, qui inflammatione excitatur: hoc à fieri non potest absq; copiosissima sanguinis excretionem: idcirco idem auctor 4. acut. 7. 4. probat sectionem venæ vsq; ad lyncopen. Hæc tamen operatio Actio minus placuit, & summa cum ratione cum enim inflammatione, quæ ex parte sit facta, materia sit iam extra venas, difficultillimum est, ne dicam impossibile, absq; summa virium iactura illam, quæ extra venas est, in venam ducere, & per sectam venam educere: Quod si non educatur, calor naturalis exsoluitur, vt nec materiam illam digerere, nec per sputum educere, nec in pus conuerttere valeat: idcirco copiosa hæc sanguinis excretio tantum est facienda, cum corpus est plethoricum, densus habitus, ætas firma, constitutio non calida, inflammatio incipiens, atq; ea legitima: Deficientibus his conditionibus lauius est venam eandem sepius tundere: Quæ est solutio secundi quæ sit; dummodo tamen vires permittant, dolorq; augeatur, aut saltem nulla ex parte post primam venæ sectionem immunitus sit: et propterea quod ad tempus pertinet, non sunt illi audiendi, qui dicunt post quartam in Pleuritide venam non esse secandam: dummodo enim vt dixi, dolor non cedat, & tussis sit sicca, vel cum paucissimo spuro, & tenui, quæ sunt indicia inflammationis; quæ ad huc non suppuratur, & tamen augeatur, licet venam secare, & post quartam, & post septimam. Hoc fecit Hipp. 3. in 3. epid. 29. casu Anaxionis, cui octaua die venam secuit.

Est autem secunda vena, vbi Pleuritis urgeat quacumq; diei hora siue matutina, siue vespertina.

Et si alius sponte non reddiderit, clyster indicendis. Hippoc. 4. acut. 7. 8. cui assentitur Galen, clysterem doct sectam venam injiciunt.

Tempus
secunda
venæ.

Notandum.

Ceterum missa hac controuersia, quod propria ex A perientia obseruauit, vobis proponam, aliquando scilicet Pleuritides quasdam incipere ab intestinis & iecore, ut non minus emolumenti attulerit clyster, quam venae sectio: & si venae sectio praemittatur, humor fluens sursum trahitur. Itaque interrogandi sunt, virum quid dolorem sentiant, simul & motum, & ebullitionem quandam in ipsa iecoris parte sentiant: tunc enim clyster praemittendus: vbi verò nullus alius sit scopus, quam faeces educere, parum curo, siue praeposatur, siue postponatur, sic ductus experientia propria, & aliena: sic ergo agendum, vbi aetas, & vires per miserint.

Sed in pueris, & imbecillioribus quid agendum? Audent quidam moti exemplo Auenzoar, qui filio triū annorum venam secuit, pueris etiam venam secare, contra rationem, & Galen. auctoritatem.

Ego sanè ante 14. annum pueris non audeo venam secare, sed aut hirudinem vnam vel alteram impono venae cubiti, ut sit venae sectio, aut adhibeo cucurbitulas natibus & lumbis.

Imbecillioribus, sed adultis, aut aperio saluatellam eiusdem lateris, aut cucurbitulas pariter admoveo.

Trall. vbi non adest totius corporis plenitudo, viriur scarificatione in ipsa met parte dolentis apposita, deinde cucurbitula, quae operatio mihi videtur frustratoria; nam si plenitudo corporis non adest, quodcumque fomentum parti dolenti adhibuitur impacta eam materiam digerere poterit, si plenitudo adest, cucurbitula ex scarificatione ab initio fluxionem concitabit: itaque dimitenda.

Transio ad purgationem. Quaeritur circa purgantia medicamenta, virum hæc conueniant descendente dolore prætermissa venae sectione: Id quod voluit Hippoc. 2. acut. 11. & 4. acut. 75. cui sententia ex recentioribus videtur subscribere Trincavel: qui causam reddit, cur descendente dolore conueniat purgatio, non autem venae sectio. Ratio est, inquit, quia vbi dolor descendit, Pleuritis fit p[er] venam azygos, sine pari, quæ ortum habet ex vena cava, antequam ingreditur cor, & pulmones, quasi dicat, fieri non posse, ut hic sanguis in ea parte contentus, per tam longos ductus usque ad cubiti venam ducatur, cum debeat & transire cor, & pulmones, & ramos venarum iugularium longa admodum via,

Ceterum hæc ratio si vilius esset momenti, neq[ue] iecoris inflammatio deberet curari per sectam venam in cubito: neq[ue] enim potest euacuari sanguis inflammationem iecoris faciens per cubiti venam, qui non transeat cor, & pulmones, & ceteras venas: & tamen Gal. 13. met. 6. in inflammationibus iecoris venam cubiti, inquit, quamprimum reuellere & deuolare a parte inflammata; multo magis hoc præstabitur in Pleuride, & eo potissimum, quia si Lusitano, & alijs credimus, quicquid tenuat Velatus, rami venae sine pari coniunguntur cum quibusdam ramulis venae axillaris, ut expedita fiat euacuatio a loco patiente, & sanè Gal. nollet huius non fuit sententia, qui in illo

com. 2. acut. non admittit Hipp. sententiam, dolore descendente purgatione vtendum. Docuit, Hipp. inquit, ipse Gal. prima aph. 23. in acutis tardè purgationibus vtendum; propterea inquit, cum Pleuritides magna ex parte febres habeant acutas, purgatio est periculosa, venae sectio nunquam, Atq[ue] ideo etiam dolore descendente, ut antea dixi, venae est secanda: Purgatio antiquorum si febris sit acuta, est omnino fugienda, dico antiquorum quia Hippoc. ibi proponit nigr. elleb. & peplum, quod nostrates esulam dicunt; Galenus autem in commentatio[n]e proponit Hier. diacolocynth. Sunt medicamenta calida & valida: propterea in acuta febre fugienda.

Non tamen, quanquam fuerit secta vena, si, gienda sunt nostra benigna medicamenta, imò vero in sanguinea & biliola Pleuritide tunc præberi potest cassia cum thyma[m] ad. syr. ros. solut.

In melancholica crassa idem syr. cum sero capr. cui addatur opthym. aut folia lenæ.

In pituitosa tenui manna ipsa mirificè valet eum decocto iuiubarum ad vnc. iiii. In crassa mel. ros. solut. ad vnc. iiii. vel v.

Interim cogitandum de loca libus medicamentis, & de lambitibus, siue eclegmatibus, circa quæ peto vestram attentionem. Quod pertinet ad exteriore, ardua est circa vsum reprimentium ab initio difficultas: nam Mesue, quem etiam alij sequuntur, ab initio viriur medicamento reprimente ex rosis, balaustris, & alijs id genus, & videtur habere pro se rationem; quia omnis inflammatio incipiens tractatur reuellentibus, ac reprimentibus, & Galen. 11. meth. c. 17. in principio, cum antea locutus esset de v[er]bo adstringentium in inflammationibus iecoris, subdit in inflammationibus pectoris adstringentia minus conuenire, non dicit præsertim non conuenire, sed minus; & Hipp. quoq[ue], 1. acut. c. 4. viriur in Pleuritide hordeo, & fursuribus in posca, aqua & aceto, acetum autem reprimat.

Ex altera tamen parte reprimentia omnino suspecta videntur. Primo quod quatenus adstringentia materia iam fluxam inducent: Secundo quod eandem in pulmones repellant: rest autem Peripneumonia Pleuritide deterior, & propterea Gal. loco illo cit. 11. meth. 17. summo opere cauet, ne huiusmodi inflammationes Thoracis ad Pulmones repellantur; & profecto huiusmodi suspensiones tanti sunt momenti, ut ego nunquam sum ausus ut adstrictoria in Pleuritide.

Ad Mesuem possumus dicere id, quod & ipsemet confiteatur, & docuit etiam Conciliator differentia 208. hæc reprimentia tunc tantum conuenire, cum materia adhuc nullo modo est fluxa, cum est calida, & tenuis, & parua: sed si non est fluxa, quomodo est Pleuritis, est suppositio nugatoria. Non est Pleuritis, si materia pro aliqua parte, imò quandoque, & ut plurimum pro maiori parte non sit fluxa.

Itaque Hipp. loc. cit. non viriur fomentis reprimentibus, in qua re perperam damnatur ab Alex. Trall. sed viriur eo fomento ad attenuandam, & incidendam materiam crassam, quæ spuriam facit Pleuritidem: idcirco illi sunt tolerabiliores, qui

qui medicamentis digerentibus, & anodinis ali qua permiscet moderatè adstrictoria; sicuti etiam laudandus est Auicennas, qui influxione calida & tenui vitur linimèto ex ol. viol. & cera, cuius sententià secutus Halyabb. 6. pract. atq; alij Arabes.

Foment. Itaque, vt tandem ad materias fomentorum deueniamus: vbi materia sit valde tenuis, & calida, aut vtamini linimento proposito ex cera, & ol. viol. aut, quod magis mihi placet, vtamini spongia imbuta in aq. tepida alterata cum violis, malua, & modica rosarum portione, aut adhi-

Crassa. beatis vesicam bubulam eadem aqua plenam, vel ol. viol. & amygd. dule. Quod si materia sit crassa, & pituitosa, vtamini fomento Hippocratico. Recip. pugil. ii. turfurum, aut crassiorum, aut, vt ego facio, medianorum, & calefaciatis in posca admodum diluta, ita vt sine acrimonia bibi possit. Fur-

Flatibus fures ponantur in sacculo, & adhibeantur loco dolenti: Mirificè sanant dolores laterales ex sanguine pituitoso factos, vt ego experientia comprobaui: Idipsum facit aut eruum aut hordeum cōfractum in eadem posca calefactum. Quod si flatus dolorem faciunt, siccum fomentum ex milio, fur-

furibus, sale, & chamomelo calefactis in sartagine positi in sacculo mirificè valet. Hæc in principio.

Communiter practicanes circa Pleuritidis initia vt consueuerunt eclegmatibus, quæ facultatem habeant humorem incrassandi, vt fluxionem ad locum affectum prohibeant, qui profectò duphici nomine mihi peccare videntur. Primum, quia dum Medici ad Pleuriticos vocantur, fluxio magna ex parte est facta, vt propterea factam incrassare nihilud sit, quàm spurum, aut digestionē drehibere. Secundo plerunq; sunt Pleuritides Spurtæ, defluentibus vel à capite, vel à toto corpore crassis humoribus, in quo casu incrassantia sunt venena; idcirco materia Pleuritidis, & copia humoris iam confluxi, antequam incrassantia administrentur, semper sunt obseruanda: & si quidem id quod fluit calidum & tenue exstiterit, & exigua sit copia congesta, conuenit parare eclegma, quod vim habeat prohibendi nouum defluxum, & simul digerendi id, quod iam fluxum est.

Prohibent autem defluxum vulgares compositiones, Diacodion, Diatraganthum, Diapenidion, Saponæ: sit autem, vt nostis, Saponæ ex saccharo, amylo, & oleo amygd. dule. recentium. Inuat etiam in hoc casu Diacodion cum sapa dissolutum, vel huiusmodi lambituum.

Recipe penid. sacc. cand.

viol. an. vnc. sem.

syr. de iuiub.

de liquirit.

de papau. an. q. s.

M. pro Lambit.

Papauer Rubrum

Sed vt digeratur etiam materia fluxa, & tamen incrassetur, nil præstantius papaueris rubei flore, qui quidem flos cum indiscriminatim à quibusdam vsurpetur, qui putant illum in Pleuritide à tota substantia prodesse, excepto hoc casu, noxiū est medicamentum, moderatè quidem digerit, sed vim habet incrassandi idcirco conuenit in pauca fluxa materia, & influente tantum tenui; Sed si hæc materia calida & tenuis pro

A maiori parte sit fluxa, dimittenda sunt incrassantia.

Non dico (Auditores) id faciendum esse post quartum diem, etiam ante 4. vbi aperta sint signa multæ mæstis, iam collectæ opus est vt primum digerentibus, si possit digeri, sin minus, euacuantibus aut per sputum, aut per sudores, aut per vrinas.

B Digerentia multa quidem proposita sunt ab antiquis scriptoribus, præcipuè ab Aetio, sed ea vsq; adeo feruida, vt à febre ardenti omnino prohibeantur: idcirco nostris temporibus inuenta sunt quedam, quæ nonnullis secreta dicuntur, quæ passim administrata in hoc casu iuuant: Ea recensabo, quibus ego & mei vsi sumus feliciter. Omnium communiss & satis vulgare remedium est potus olei de semine lini; quidam vtuntur hoc oleo simp. ad vnc. vj. alij addunt vnc. ij. succi altheæ, detrahentes vnc. ij. olei. Datur 4. horis ante cibum, calidum, tribus diebus continuis, mirificè digerit, & dolorem lenit, & si inflammatio sit maior, etiam suppurationem adiuuat, neque sputum impedit.

C Si tamen febris sit ardens, mihi magis placet oleum amygdal. dule. succaro cand. aut penidiis commistum.

Aliud remedium est pomum Apium excavatum & repletum puluere liquiritiæ, pendii, & oleo amygd. dule. coquitur super cinerè: & tota hæc substantia deuoratur mane, & vesperti, pauld ante cibum. Nonnulli in eodem pomo imponunt gran. iij. olibani puluer. & præbent idem pomum coctum cum olibano patienti tempore somni. Hoc quoque remedium digerit, suppurat, & quod maius est, si abscessus sit factus, ulico disruptionem facit, vt experientia certissime comprobatur.

Quartum est vsus rasuræ dentis apri. Huius rasuræ datur drach. i. aut in aq. pimpinel. aut sartag.

Quinto probatur in eundem vsu drach. i. corallor. rub.

Sed efficacius, & quod mihi magis placet, est remedium factum ex puluere corticum auellanarum rubeorum. Ad digerendam profecto Pleuritium calidam hic est puluis omnium præstantissimus.

E Si immunda quoq; remedia, sed vilia, non debent omitti, aliud vobis proponam manuscriptū in libris meorum aorum. Ipsi summo pete commendatur stercus gallinæ, quæ vescatur herbis mense Maio, & propterea præbent stercus viride exsiccatum. Pulueris datur drach. i. aut in aquis prædictis, aut in aq. flor. chamomel. stillantia, quæ ipsa quoque sola Pleuritidem iuuare consueuit. Possunt hæc quoque in eclegmatibus permisceri, ita vt paulatim accipiantur.

Extrinsecus pariter est tentanda digestio: Proponuntur a scriptoribus hæc in parte quedam fortissima. Apud Aet. inuenietis vsu sulphuris, pipetis, aluminis, sinapis, & aliorum id genus caloricorum. Mihi magis placeant, quæ blandè, & insensibiliter digerant, & alia mihi familiaria vobis proponam.

Primum est vnguent. ex dialthæa, quod si satis esse non posse videatur, ego accipere consueui folium brassicæ, & illinire butyro, & super

Ol. sem. lini.

Ol. amygd. dule.

Pomum Apium.

Rasura dentis apri.

Apri.

Corall. rub.

Paul.

cort. auel. lan. rub.

Stercus gallina.

inspergere puluerem cymini, & loco dolenti ap-
ponere: est præstantissimum remedium à me fre-
quenter vsitatum,

Efficax etiam est remedium frustum vitis, in
quo fuerit pix: calefiat, & adhibeatur loco dolenti.

Tertio summo opere iuuat placenta sub cineri-
bus cocta, in duas partes diuisa, melle illita, & in-
spersa cymino, & anisis, loco patienti adhibita.

Sed vltimo loco est fomentum, quo, vt ingenue
dicam, quosdam morti propinquos restitutos,
& nuper expertus sum. Fomentum in augmen-
to morbus sit minus efficax; In statu est effica-
cius: Dabo virumq; exemplum.

In augmento,

Recipe fol. malu-

alibet an. M. ij,

Chamomel.

Anethi

Melilot. an. P. j,

Sem. lini.

sanguis an. vnc. ij,

F. decoct. f. a f. expressione spongis hoc deco-
cto imbibitis. f. foment. vt præcepit Hipp. Spon-
gia linteo inuoluta, ne cutis ex caliditate adstrin-
gatur,

In statu prædictis medicamentis addere soleo
hyssop. prass. pulegium, calament. orig. centaur.
& est efficacissimum fomentum.

*In mate-
ria cras-
sioris.*

Sed vbi materia tanquam crassior debet eua-
cuari, primum omnium euacuatio debet fieri per
sputum: idcirco conueniunt omnia illa Ecleg-
mata, quæ vobis proposui cap. de Asthmate ex
materia crassa, quæ scil. recipiant semen vtiæ,
grana orobi, erui, in farinâ redacta, rudices ieros,
puluerem, aut succum enulæ & pulmonariæ, oxy-
mel syrup. de farsara, de hyssopo, & alia id ge-
nus attenuantia, quibus si addantur aliqua ex il-
lis, quæ diximus experimento longo inuenta esse
Pleuriticis conferentia, siue dentem apti, siue cor-
tices auellanae, multò melius erit.

*Sputo nõ
succeden-
te quid a-
gendum.*

Quod si sputum succedere non possit, aut eua-
cuanda est materia per sudorem, aut per yrinas,
aut per exteriora medicamenta vel tandem sup-
puratio est tentanda. Inter sudorifica est vsus aque
cardui benedicti simul cum drach. sem. semin eius
de cardui benedicti. Datur autem huius quæ vnc.
v. Hæc aq. valet tantum ad mouendum sudorem,
sicut ad mouendas yrinas laudatur in hoc casu the-
rebinthina ipsa simplex, aut mista cum puluere li-
quiritiæ. Therebint. datur vnc. i. & abluatur in
aq. capil. Ven. Liquirit. sit. drach. i. Hæc Diuretica
non debent tamen in quocunque casu admini-
strari, sed cum videritis, vt dixi, sputum non
procedere, & yrinas copiosiores fieri, nam dice-
bat Hipp. 4. acut. 28. malè cum illis Pleuriti-
cis, & Peripneumoniacis agi, qui nihil expuunt,
nisi yrinæ copiosæ effluant, & profecto, vt dicam
cap. de Empyem, nam plerumque & Pleuriis,
& Suppuratio per yrinas purgari consuevit,
itaque vbi naturæ propensionem videritis, tu-
tò accedatis ad diuretica, ad capill. vener. a-
pium, & fenicula: ad semina frigida, vbi febris vi-
geat.

Exterius autem trahenda est materia, quando,

vt dixi, ceteræ excretiones bene non procedant,
Atq; ideo in hoc casu accipio Aetii consiliu, vt
locus dolens scarificetur, & post scarificationem
cucurbitula adhibeatur, & acce aliquod medica-
mentum supponatur, siue sit ceratum factum, si-
ue aliud simile; & sequenti die iterum cucurbitu-
la adhibeatur, ita vt & beneficio cerati & cucurbi-
tula materia paulatim educatur; Id quod etiam
vesicatorio in tali casu fieri poterit: Quod si his
non cedat morbus, actum est.

Inter auxilia, quæ vno & eodem tempore spu-
rum, yrinas, & sudores in Pleuriticis mouere co-
suevere, est balneum aquæ dulc. cuius meminit *Balneu
aq. dulc.*
Hippoc. 3. acut. 58. cum scribit. huiusmodi bal-
neu plus iuuare Peripneumoniam, ac Pleuritim,
vt Gal. docuit, quàm ardentis febres: quæ aucto-
ritate ducti & Arabes, & Græci, & Latini in Pleu-
ritide balneum commendat; quæ quidem ope-
ratio mihi admodum suspecta videtur: nam si
balneum administretur, vbi dolor virgat, vbi spu-
rum bene non procedat, quod fieri debere voluis-
se videtur Hipp. dum scribit, balneum dolorem
sedare & sputum mouere, hoc tempore Pleuritidis
est ad huc in augmento, vel saltè in principio sta-
tus, quo tempore balneum colligatos in vnaqua-
que corporis parte humores duces præcipientes in
locum affectum, & propterea Gal. 12. meth. c. 3:
in inflammatione partium Thoracis balneum ha-
bet suspectum, ne pars inflammata à balneo cale-
facta & relaxata fluxionem suscipiat.

Quod si quis dicat, administrandum esse tem-
pore concoctionis, & in declinatione tantum, pro-
fecto nullus erit vitus: nam in declinatione desi-
nit dolor, & sputum iam est concoctum, ac ma-
gna ex parte oductum. Itaq; vno verbo Balneum
probat. Hæc (vt dixi) spectant ad medicamen-
ta Pleuritidis materiam quouis modo euacuantia,
vbi vel per digestionem, vel per aliam sensibilem
excretionem iuuari possit.

Sed vbi post 7. diem sputum non procedat, &
his omnibus rite administratis dolor, ac febris
intendantur, certum est signum suppurationis in-
cipiens; in quo casu tamen Medicinæ scripto-
res consulant statim vsu Suppurantium: ego
tamen ex primo acut. 33. colligo, Hippocratem
vniuersaliter procedendum esse voluisse, qui scri-
bit in Pleuritide, quæ sputum habeat paucum &
glutinosum, in qua dolor sit maximus, necessariu
esse abstinere à purgana, quousque fictione venæ,
aut purgatione dolor remittatur; loquitur, vt scri-
bit Gal in com Magnus Hipp. de Pleuritide mali
moris, quæ non est incipiens, sed iam progressa,
& facile potest tendere in Suppurationem.

Ad euandâ Suppurationem id ipsum facien-
dum, quod ab initio præcepimus ad euandam
Pleuritidis incrementum, vt si vires consent, ite-
rum seceetur vena, detur medicamentum, & te-
naris victus ratio impereur,

Quibus tamen non obstantibus, si dolor persi-
stat & febris, iam certum est Suppurationem fie-
ri; idcirco hanc statim iuuare oportet & internis,
& extrinsecis remedijs. Intrinsecus conue-
nit hæc mixtura sapius exhibita, quæ iusta est præ-
stantior.

Recipe

Recipe butyr. recent. vnc. iij.

(Dicebat Gal. 7. simpl. c. de butyr. butyrum sine
mitione alterius maturare.)

Mucilag. ficuum vnc. ij.

Ol. amygd. dulc. vnc. i.

saccar. parum. M.

Exuinfecus paretur huiusmodi emplastrum

Recipe radic. alib. coliar. & per

tribum transmiss. vnc. iij.

farin. tritic. vnc. iij.

mucilag. radic. alib.

car. ycar. an. vnc. ij.

butyr. recent.

pingued. gallin anat. an. vnc. i.

decoctionis alib. malv. caryc. q. s.

M. f. emplastr.

Facta Supuratione quid agendum sit, intelli-
getis capite de Empyemate.

Nunc itaque expedito fonte chirurgico &
pharmaceutico, ad victus rationem, seu Dietam
me conferto.

Leuiora omitam, quæ pertinent ad aerem, ad
motum animi & corporis, ad venerea, ad somnum
& vigiliam, & tantum verba faciam de educa-
dis excrementis, de cibis, ac potionibus.

Quod igitur spectat ad excrementa, aluius val-
de lubrica est seruanda. Nam ut dicebat Hippoc.
& Galen. 1. acut. 32. vbi in Pleuritide alui excre-
menta retinentur, in flatum conuersa dolorem
augent, flatu ipso ad locum dolentem ascenden-
te, & quod magis refert, alimentum corrumpit,
ut ipse quoq; in flatum vertatur, & Pleuritidi ne-
gocium faciat ideo non modo aluius lubrica est
seruanda, sed illis medicamentis, quæ flatum
discutiant, ut propterea etiam si clysteres ex cali-
dis sint, nihil obstat & multum iuuent.

Neq; audiendi sunt Recentiores, qui hoc ab
Arabibus acceperunt, caute agendum in mouenda
aluo Pleuriticorum, eo quod facile superueniat flu-
xus alui, qui valde periculosus est & perniciosus.
Isti omnes ducti sunt illa Hippoc. auct. 6. aphor. 6
Pleuriticis alui fluxum superuenientem malum
esse, sed si intellexissent causam, propter quam
Pleuriticis alui fluxus succedit, optime scirent,
quando timendus sit alui fluxus, & quando non:
Dicebat Gal. in illo comment. malum esse alui flu-
xum in Pleuritide, quia signum est iccur quoque
inflammatione tentati; at Pleuriti non potest coaf-
ficere iccur, nisi quando sit in parte dextra, & quā-
do dolor descendat, si fuerit in parte sinistra, aut
dolor descendat, fluxus alui nullum imminet
periculum; atq; idcirco tunc aluius moueri potest,
vel clysteribus, vel medicamentis.

Quod ad cibum & potum pertinet, docendi
estis, quales cibi & potionem conueniant, quibus,
quando, & in qua quantitate:

Conuenientes Pleuriticorum cibi, ut est colli-
gere partim ex Hippoc. & Gale. 1. acut. 18 27. &
44. atque ex aliis recentioribus, sunt potissimum
pisana, & eius cremor, chondrus, quem puto idē
esse cum alica, quam antiqui hordeum vocabant,
neque ex frumento pipisito, quod non nulli far vo-
cant, sed ex zea, quam nos vulgo speltam voca-

A mus: Ex hac fit, sicuti etiam ex hordeo, alica, siue
chondrus

Praeterea conceduntur Pleuriticis mull. semin.
melon: panatella cum ead. emulsiōe, lac amygd.
dulc. Gal. in com. 27. proponit etiam pisces saxa-
tiles, & ex non saxatilibus asellos. Isti omnes cibi
potius biliosis conueniunt, quā pituitosis, & alien-
illis potissimum, qui fluxiones hēnt acres & tenues.

Pituitosis potius conuenit mulla, pisana, sed
melle mistra, & modico atero, & pauco sale: potest
etiam in decocto non admiscere, sicuti scio fecis-

B se Hippoc.

Quod ad potum pertinet, biliosis conuenit aq-
hord. pituitosis mulla, in mitione humorū aqua
pectoralis communis ex iuiubis, hordeo, caryeis,
capillo venetis, & passulis, siue simplex præbea-
tur, siue cum syrupo, aut iulep acetoso.

Sinique cibis & potus, excepta æstate semper
calidi, aut saltem minimè frigidi. Aestate non est
opus hæc calefacere: Dicebat Hippo. 1. acut. 43.
oxymel bibendum hyeme calidum, æstate frigi-
dum.

De vino putant aliqui moti Hipp. auctoritate
3. acut. 4. illud Pleuriticis, sed dulce, conceden-
dum; ibi enim docet Hippoc. dulce vinum spi-
ritum mouere, sed multa quoque scribit incom-
moda, quæ vini dulcis potionem consequuntur.
Primo quidem biliosis minimè conuenit: natu-
bram facit spiritum exsiccat & reprimat, obstruc-
tionem infert, aluum his non subducit, & in flatum
vertitur: quantum autem patiuntur Pleuritici ex
flatu, docui in precedenti. Vinum autem dulce
status generat; itaq; dummodo febris sit in decli-
natione, & Pleuritis pituitosa, & nulla viscerum
obstructio, & status erumpant faciem, vinum dul-
ce non improbat: absque his conditionibus om-
nino reiiciendum est.

Vinum
dulce
quan cō
cedendū

Nullus est affectus, in quo vulgares homines,
ut Medicos in præsentia omitam, victum vsque
adeo tenuem seruent, qualis est Pleuritis. Medicis
enim etiam inuitis vulgus in Pleuritide abstinere à
carne, ouis, vino, & quocunque alimento, quod
aliquas corpori inferre vires possit. Vtrum hæc quan-
tenuis victus ratio in omnibus sit seruanda, & quo
magis tempore conueniat, an in principio & aug-
mento, an potius in statu, nunc ex Hipp. Gal. & ra-
tione differendum.

Hippoc. igitur 1. acut. 43. tantum videtur con-
cedere vsum oxymel. mullæ, & aquæ vsque ad 7.
vel 9. Nam in 44. tex. subdit, pisanam non esse
dandam, nisi post 7. aut 9. ex quo loco, ut do-
cet Gal. in com. sumpsit Erasistratus occasionem
dicendi, Hippoc. patientes famia necare, qui ta-
men inquit id faciendum, si vires sufficiant; &
ratio est, quia vbi inflammatio ex alimento susci-
pit incrementum, quod minus malum est, suppu-
ratur, sed, quod magis refert, aliquando in gan-
granam transit, & hoc est, quod voluit Hippoc.
1. acut. 33. & 34. ex alimento quosdam Pleuriti-
cos quasi syderatos inuente apparere circa locum
affectum liuido colore, & propterea idem Hipp.
2. acut. 37. in Pleuriticis semper potius detractio-
ni ciborum incumbendū esse scribit, & multo ma-
iora, ut docet Galen. in commen. esse in comino-

da, quæ sequuntur ad cibum pleniorē aucta inflammatione, quàm quæ sequuntur ad cibum tenuiorem. Idcirco Gal. 10. meth. 5. inquit, se in his casibus hoc ipso tenui victu, quem præcepit Hipp. loc. cit. 1. acut. 43. feliciter vsum esse: quia tamen semper prima indicatio est à viribus desumenda, idcirco non debetis statim, atq; vobis Pleuriticus offertur curandus, ad tenuem victum contugere, sed vires primùm præsentēs, deinde etiā futuras considerare, si præsentēs sint imbecillæ; statim ad cibum est confugiendum, nulla habita inflammationis ratione. Hæc est doctrina Gal. 9. meth. 13. quæ habet pro se rationem: nam quæcunq; agimus pro Pleuritide, vel alio quocunque morbo, agimus ut vitam conseruemus, sed ex defectu alimenti deficit vita: nam vires, ut docet Galen. loc. cit. vel est ipsa vita, vel actio vitæ; deficientibus ergo viribus omnia deficient. Accedit, quòd ubi vires deficient propter inanitionē, etiā si cibis exhibeatur, inflammatio augmentū non suscipit: tunc enim inflammatio augeatur, cum humores superabundant; sed in defectu virium propter inanitionem humores, non superabundant adurco in hoc casu tunc nutriuntur Pleuritici, & hoc est, quod voluit Hipp. 1. aph. 5. cum scribit, in tenui victu agros delinquere, & maius esse erratum in cibo, pauciore, quàm in pleniore, contra quam scripserat & ipse, Gal. 3. acut. 37. Ex quo advertatis, solutionem contradictionis. nam in illo 37. Hipp. & Gale. respexerunt ad inflammationem cum viribus validis, in quo casu plus obest copia, quàm detractio; 1. aphor. 5. respexerunt ad vires debiles, in quo casu plus obest detractio quàm cibis plenus.

Sed si vires sint quidem in præsentī validæ, coniciamus tamen, illas non posse sufficere usq; ad finem morbi. Queritur vitum melius sit pleuriticis in principio alere, an potius in statu? Sed antequam hoc discutiamus, forte quæret quispiā: quibus signis possimus colligere aliquem non posse sufficere cū tenui victu usq; ad statum, aut contra posse tenuem victum sustinere.

Proposita sunt signa à Gale. 1. acut. 44. Constituiamus Pleuritici dñi habitus, temperamēti pituitosi, qui non sit assuetus multo cibo, qui egrotet in regione, constitutione, & tempore anni frigido, post vitam otiosam, & crapulam, neque habeat os ventriculi sensibile, hunc certum est, commodè posse sustinere inedia usq; ad statum morbi, si status non transeat 7. vel 9.

Ex aduerso sit Pleuriticus, qui omnia habeat contraria: hunc prima die cognoscetis minimè inedia posse sustinere, & propterea queritur, Vitum statim nutriendus, an potius post primos dies? Hipp. videtur hac in parte sibi ipsi contrarius, qui vniuersaliter quidem 1. aph. 8. præcepit, in statu omnino à cibo abstinendum; & 2. 3. & 34. maxima proponit incommoda, quæ eos sequuntur, qui statim, tempore cibum accipiunt, periculum suffocationis, syderationis, supurationis propterea 2. acut. 240. text. infra, varia enumerat incommoda eorum, qui abstinent circa initia, ut postea cibum capiant circa statum nam inquit,

hos inedia ex siccat, amarulentos reddit, anxios, & studa deiecit, & cetera, quæ potestis legere text. 44. 2. acut.

Ex altera tamen parte idem Hippo. 1. acut. 28. & 29. inquit, cibum copiosum esse præbendum, cum sputum bene procedit: at ubi sputum bene procedit, est tempus status, itaq; in statu cibum præbet, & propterea 2. acut. 37. scribit, subtrahendum esse cibum usq; ad vigorem; in vigore cibum concedi. Idipsum facit in 1. 54.

Est contradictio insignis apud me, quæ tamen sic conciliari potest: Vires Pleuriticorum, quando sint quidem valide ab initio, sed in posterum non possint tales persistere, sunt omnino circa initia conseruanda, & multo minus peccabunt Medici primis diebus aliquid cibi concedentes, & postea tempore status subtrahentes, quàm ab initio extenuantes, & cum iam vires ceciderint, cibo replentes egros.

Sed cum status aduenit, status Pleuriticorum consuevit esse duplex: vnus benignus, alter malignus. Benignus est, in quo sputum bene procedit, & excernitur: in huiusmodi casu, quo melius sputum procedat, eo tutius alimen tum augere possumus. Hoc animaduertite: nam vires corroborantur. Et cum, ut dicebat Gale. 1. meth. ca. 17. Pleura tantum recipiat alimentum, quantum sufficit pro illius nutritione, etiam si aliquid plus offeramus, non potest pati nocumētū; imò verò aucto calore statim sputum melius concoquitur & excernitur.

Sed ubi status fuerit malignus, id est, sputum agrè educatur, & illud quidem glutinosum, crassum, liquidum, abstinendum est à cibo: nam in diu est maxima inflammationis, quæ si incrementum suscipiat, facile agrum interficiet hoc habeo ab Hipp. 2. acut. 40. ubi increpauit eos, qui in statu Pleuriticis, nutriunt, inquit, mortem omnino secuturam, nisi Pleuritis benigna sit: quasi dicat, ubi benigna est, & sputum excernitur, cibis nulla infert noxam.

Qualis autem sit tenuis cibis, qualis vespertinus & mediocris, potestis colligere ex dictis superiore lectione, ubi ex sententia Galeni proposita sunt alimenta Pleuriticis conuenientia, de quibus nihil dicam; sed ad Peripneumoniam me consero.

DE PERIPNEUMONIA,

Cap. XXIX.

Peripneumonia, quæ & Pneumonia dicitur, nil aliud est, quàm inflammatio pulmonis. Gal. auct. 2. de loc. aff. 9. & 4. de loc. aff. 8. est aut inflammatio quædoq; legitima ex sanguine. s. syncro, magna tamen ex parte aut pituitosa, aut biliosa.

Non disputabo, ut faciunt Arabes, vitum magis & frequentius sit biliosa, an pituitosa; seu vitra sit legitima, biliosa, an pituitosa.

Causa, & modus generationis.

Est autem huiusmodi inflammatio, aut per paulatinam congestionem, aut per transusionem, per paulatinam congestionem, ubi Pul-

Hipp.
loc. C5.
ciliantur

Status
Pleuriti
cor. du-
plex.

Hipp.
sibi ipsi
contrari
us.

F

monet aut intemperie laborant, aut morbo instru-
mentario: Intemperies multiplex potest esse vel
frigida, vel admodum calida, prout etiam inflam-
matio est, vel est calida, vel pituitosa,

Morbus instrumentarius est aut obstructio, ut
in Asthmate & Orthopnoea, cui aliquando succedit
Peripneumonia, aut est compressio à tuberculis,
quæ faciant gibbositatem. ut propterea gibbi sa-
culo euadant Peripneumoniae.

Quando fit per defluxum, dupliciter fit: aut
per transmutationem materiz ab vno loco inflam-
mato in alium; sic permolari consuevit Pleuritis, &
Agiua & Phrenitis in Peripneumonia; aut fit
per defluxionem materiz vel pituitosæ, siue insi-
pidæ, siue falsæ simplicis, aut mistæ ex capite, ex
toto corpore, ex suppressis mensibus hæmorrhoi-
dibus, aut varicibus: nam aliquando, ut docet
Gal. & Hipp. 6. in 6. epid. 8. ex suppressis varicibus
fit Peripneumonia,

Signa,

Peripneumoniz signa pathognomonica, quæ
ipsam demonstrant affectum, sunt vi. præcipua
Tussis, difficultas spirandi, sensus gravitatis, febris
continua, pulsus molles, frequentes, celsæ, ina-
quales, & rubor maxillarum, his quandoq; con-
nectitur, Dolor circa partem pectoris vel anterio-
rem, vel posteriorem, prout materia communica-
tur ligamentis huius vel alterius loci, Sputum
autem sanguinis non necessarium Peripneumonia
ostendit: Hoc docet Gal. 1. in 3. Epid. 4. Pythio-
nem cruenta exspuisse cum febre continua, non
tamen fuisse Peripneumonicum, inquit aliquan-
do effundi sanguinem ex venis Pulmonis, siue id
fiat per diapedesin, siue per anastomosis, nulla ex-
sistente in Pulmonibus inflammatione, & sanè, ut
docet Gal. eo loco; & nos etiam docuimus in tra-
ctatu de sput. sangu. etiam sine febre exspui san-
guis potest.

Difficultas spirandi, in Peripneumonia est illa,
quam Orthopnoeam vocant. Spirant enim semper
erecta cervice. Distinguuntur à cæteris Orthop-
noicis, & febre, & spiratione calida, & celerissima,
ac frequentissima,

Distinguuntur autem variz Pulmonis inflam-
mationes sic; Biliofa putum habent flauum, ac
linguam pariter flauam, febrem acutissimam, sitim
inextinguibilem, vigiliam, & delirium, oris amaritu-
dinem. Pituitosa linguam, & sputum habet palli-
dum, spumans, sitis est modica, febris lenta, pro-
pensio in somnum, oculi tumidi, sonitus maior
inter respirandum. Sanguinea linguam ac spu-
tum habet rubrum, cruentum; febris est maxi-
ma, quandoque vigilant, quandoque etiam in
somnia sunt propensi.

Prognostica.

Hic affectus acutissimus est, & si biliosa sit
peripneumonia, raro admodum perungit
septimam, ut plurimum, quarta vel quinta die;
Pituitosa nona, seu, quod summum est, 14. die
iudicatur: Media est sanguinea? Loquor nunc de
eæque resolvitur.

Nam si suppuretur, ob suppurationem in lon-
gius tempus affectus protrahitur; Ratio autem
suppuratur, quin interficiatur, sicuti etiam frequen-
tius intereunt patientes antequam inflammatio di-
geri, & resolui possit.

Signa autem Peripneumoniz lethalia primum
quidem capiuntur à sputo, quod siue non appa-
reat, siue appareat quidem, sed dolorem ac difficul-
tatem spirandi non tollat, lethale est; sicuti etiam
lethale est sputum, in quo pus à bile separatum ex-
cernitur; sicuti etiam deterrimum, ac deploratum
est sputum liuidum, ac nigricans, quæ omnia
potestis legere apud Hipp. 2. progn. à 50. text. in-
fra. In rex. 49. eiusd. lib. scribit Hipp. Grauedines
& sternutamenta, siue præcedant, siue subsequan-
tur Pulmonis inflammationem, mala esse. Gal. in
com. dicit, addendum quoq; defluxiones ex capi-
te in Pulmones: hæc enim omnia mala sunt per
modum signi & causæ, per modum signi, quia v-
bi magna est inflammatio, multius replet caput va-
poribus, ex quibus fit sternutatio, coryza, & cathar-
rus, repleto autem capite, & ad Pulmones trans-
mittente, inflammatio augetur.

Austiuistis Hipp. 6. aph. 16. dicentem, fluxum
alui in Pleuritide superuenientem malum esse:
id ipsum docet de Peripneumonia, aliquando ta-
men potest humor pituitosus, aut alius per alium
deici cruce, quod Peripneumoniz vtilitatem præ-
stet.

Curatio.

Quod ad curationem pertinet, parum differt
curatio Peripneumoniz à Pleuritide, prop-
terea omnes Medicinæ scriptores ad tractatum de
Pleuritide vos ablegant.

Aliqua tamen hoc in loco sunt notanda. Pri-
mum est, in Peripneumonia facta ex permutatio-
ne, aut Pleuritidis, aut Anginæ, de qua permutatio
ne; meminit Hipp. 7. aph. 2. & 5. aph. 10. non con-
uenire sectionem ænæ: & ratio est; quia vires
hoc tempore magna ex parte sunt collapsæ, præ-
terea, ubi fit inflammatio ex permutatione, tota
materia simul colligitur quasi per decubitus, ut
minimè reuelli possit; tertio pro maiori parte est
in pus conuersa, ut propterea materiam purulentam
in venas ducere non liceat.

Propter has causas tantum est sanguis mitten-
dus in Peripneumonia incipiente, seruatus regulis
in tract. de Pleuritide traditis.

Sang.
miss.

Circa medicamenta alium sub ducentia nil in
nouandum; ita agendum, sicuti dictum est in
tract. de Pleuritide.

Sed circa exteriora medicamenta, consulo, in
his casibus à reprimendum vsu quocunque tem-
pore & circa initia prorsus desistendum esse. Ra-
tio est manifesta, cuius etiam meminit Galen, 1. 1.
meth. 17. quod scilicet materia propellatur ab ex-
terius partibus ad Pulmones.

Reprimē-
tia im-
probatum

Reliqua fomenta, quæ vim habent digerendi,
præmissis vniuersalibus euacuationibus, & reuul-
sionibus, nihil quidem obesse possunt, sed tamen
mihi non admodum probantur: nam vix ali-
quid à Pulmonibus digerere possunt, & mate-
riam à Pulmonibus in Pleuram ducere possunt,

ut propterea transeat affectus in Pleuritim, & A
quoniam minus malum sit Pleuritis, quam Pe-
ripneumonia, nihilominus si duæ simul compli-
centur inflammationes, deploratus est casus. Pos-
sunt autem ambæ simul coniungi, quando fomen-
tis calidis materia pulmonum trahitur in thora-
cem pleuræ in & musculos thoracis. Si dolor ad-
sit circa mediastinum, quia tunc temporis mate-
ria continetur in membranis, illi loco fomenta ca-
lida applicita non improbantur, licet mihi impro-
bentur apposita dextræ, vel sinistræ parti, cum nul-
lus urgeat dolor.

Cautio
circalā-
bitiu.

Quod spectat ad lambitua incrassantia, cautè
admodum administranda: nihil enim deterius
Peripneumonici contingit, quàm ut sputum reti-
neatur, & ita vis periculum impendit Peripneu-
moniciis ex sputi retentione, quàm Pleuriticis, ita-
que si fluxio sit valde tenuis, non improbat
eclegma, quod recipit syrupum de liquiritia, vio-
latum, de iutubis, modò tamen permisceatur ali-
quid syrupi acetosi, aut oxymelitis, ut tenue,
quod influit, incrassetur, sed quod iam fluxum
est crassius reddidit, attenuetur.

Circa vsum attenuantium illud moneo etiam,
quod video omnes prætermisisse, non probari mi-
hi attenuantia medicamenta illa, quæ insignem
obtinent caliditatem, cum tamen omnes Medi-
cinæ scriptores probent & ipsa medicamenta,
quæ Orthopnoicis conveniunt, iteos, hyssopum,
prassium, & alia id genus, non probantur hæc, pri-
mo quia inflammationem augent secundo quia
viscus iam ab inflammatione debilitatum præpa-
rant ad vlcus, propterea ad incidendum ego non
transirem aut mulsam, aut oxymel, aut in calidioribus
syrupum acceptosum, syrupum de farsara, &
si quid calidi addendum sit, potius fiat decoctio
in aq. radicis iteos, vel hyssopi. & prassij, & facta
colatura ex ea aqua componatur malsa, aut fiat
oxymel, vel syrupus acetosus. Reliqua sunt com-
munia Pleuriti, nisi inflammatio tendat ad sup-
purationem: Hoc modo curatur Peripneumonia.

DE EMPYEMATE.

Cap. XXX.

Sed ubi vel Pleuritis vel Peripneumonia con-
uertuntur in pus, hunc affectum Græci vocant
Empyema, Latini verò Suppurationem, moneo
tamen vos, nomen Empyematis vel Suppurati-
onis tripliciter accipi, communiter, propriè, &
propriissimè: communiter accipitur pro omnis
puris collectione, ex quovis humore, & in quavis
corporis parte, de hac loquitur Hippo 6. aph. 41.
cum dicit: quibus Suppuratio in corpore existens
non innotescit, &c. hæc ratione 7. aph. 44. Vni-
versaliter, inquit, omnes Suppuratos, qui vrun-
tur, aut secantur, si pus album effluat, servari, si
F equalis amuræ olei, interire: quod sigillatim scri-
bit de Suppuratione iecoris eodem lib. aph. 45. &
de hac Suppuratione in genere loquitur eod. lib.
aph. 57. ubi meminit Suppurationis in collo vesicæ

Propriè autem accipitur Suppuratio pro colle-
ctione Puris in Thorace tantum, siue colligatur
pus post disruptam anginam, ut 5. aph. 10. siue ex
pituita desillante, ut 6. aph. 38. siue ex sanguine

extrauenate, ut cad. 6. aph. 20. siue ex bile, ut 4.
de loc. aff. 8.

Deniq; accipitur propriissimè pro collectione
Puris in Thorace post Peripneumoniam & Pleuri-
tim tantum. Et hoc dupliciter potest intelligi,
aut enim per Suppurationem intelligimus con-
versionem sanguinis in pus, quod tamen adhuc
continetur intra suos folliculos, intra membranas
aut intelligimus collectionem puris in cavitates
thoracis post disruptos abscessus. Galen 5. aph. 8
& 15. dicit, magis propriam Suppurationis signi-
ficationem intelligi de collectione puris, nam in-
quit isq. Hipp. peculiari nomine collectionem pu-
ris in capacitate thoracis, ruptionem vocat, quam-
vis Gorræus lib. definit. Med. scribat, proprium
Empyema esse collectionem puris in capacitate
thoracis post disruptionem, contra quam sentias
Gal. sed hæc his parvi est momenti.

Non in præsentia nomine Empyematis intelli-
gimus utramq; ultimam significationem: collectio-
nem puris post Pleuritim, post Peripneumoniam,
vel adhuc collecti intra membranas, vel in capaci-
tate thoracis contenti.

Causa.

IN tractatu de Suppuratione nil difficilius par-
te illa, quæ de signis pertractat, atq; ideo in
hac ipsa hodierna lectione quam diligentissima
versabor, nam de causis Suppurationis nil aliud
dicendum est, quàm illud, quod colligitur ex Gal.
1. prog. vltim, Pus fieri à nativo calore & putre-
dinali, nam ubi materia, quæ debet suppurari, &
consequenter putrida est, continetur in parte so-
lida, cuius innatus calor sit validus, si copiosum
pus, album, lene, æquale, si calor partis solidæ,
aut profusus deficiat, aut imminutus fuerit, vel nul-
la sit transmutatio, vel ea quidè parva, & im-
perfecta.

Signa.

AD signa igitur transiens sunt hæc Diagno-
stica, Distinctiva, & Prognostica: & Dia-
gnostica sunt vel Suppurationis incipientis, vel iam
factæ, vel abscessus disrupti, & consequenter col-
lectionis puris, siue sanici in capacitate thoracis.

Signa incipientis Suppurationis tria sunt: Ri-
gor superueniens, cum antea non adesset, hoc do-
cet Galen & Hipp. 2. progn. 58. quem locum no-
tate, ut sciat Galenum ibi docuisse, Rigorem fieri
ex loco determinato, non autem transmissa ma-
teria à venis ad extra venas. 2. Signum est febris
acuta. 3. mutatio doloris in pondus quoddam.
Sunt iudicia Suppurationis incipientis.

Facta Suppuratio cognoscitur iis signis, quæ ab
Hippoc. proponuntur 2. prog. 60. febris, quæ ex-
acerbatur horis vespertinis, tussis sicca, sudores
multi, oculi concavi, maxillæ rubentes, vngues
incurvati, umbres circa pedes, & calor circa di-
gitos, multo maior, quàm in cæteris partibus, ad-
de pondus maximum, parti suppuratæ incumbens
ut patientes, si Pleuritici fuerint recte ambulare,
vel stare nequeant, quod ego experius sum in
duobus Pleuriticis.

Signa disrupti abscessus sunt definitiva pon-
deris, fluctuatio puris in capacitate thoracis, tussis
humida, cum aliqua puris expectoratione.

Distinctiva quædam sunt loci, quædam materię

Sup.

Suppuratio enim aliquando est in vnica parte, aliquando in ambabus, si in vnica, illa quoque est calidior, vt si lintheum aqua imbutum vtriq; thoracis parti imponatur, quod super parte suppurata imponitur citius exsiccat, adde quod difficilius quiescunt patientes super latere opposito. nam si ruptus sit abscessus, sanies comprimit pulmones, & sic videntur suffocari, si non sit disruptus, pondus augetur, ac dolor tensius, vt propterea super laesa parte melius quiescant.

Signa verò caussarum, seu materiarum, capiuntur à causis praegressis: nam si propriissima sit Suppuratio, praecessit vel Pleuritis, vel Peripneumonia; Si impropria praecessit, Angina in abscessum conuersa, aut destillatio ex capite, aut sputum sanguinis, quod non integrè fuerit expurgatum, vt propterea in pus transierit.

Prognostica:

Transseo ad Prognostica: Sunt hae vel futurae Suppurationis & rptionis, vel longitudinis & breuitatis, vel salutis & mortis, vel denique modi salutis, aut mortis.

Futurae Suppurationem qua ratione praecognoscere liceat, docuit Hipp. 1. prog. § 2. vbi docet eos dolores, qui non desinunt neque ventris subductionibus, neque vene sectione, neque purgatione, & inedia in suppurationem transire.

Signa etiam futurae disruptionis cognoscuntur ex perseverantia febris, ex virium robore, ex carentia sputi, atque aliarum omnium excretionum. praecipue verò abscessus, in quos solet huiusmodi affectus desinere, vt postea audietis.

Breuitas, aut Longitudo Suppurationis, & disruptionis, quam maximè intelligere oportet, potenda est à natura inflammationis, à magnitudine, & à quibusdam connexis; A natura, quia vbi inflammatio sit ex humoribus calidis, & in pulmonibus, quae sunt partes molliores & calidiores, multò citius suppuratur & disruptitur, quam in pleura, & propterea dicit Hipp. 2. progn. 62. huiusmodi inflammationes 7. die disrupti, & propterea necessarium est in 4. suppurati. A magnitudine etiam desumitur huiusmodi breuitatis signum, quando symptomata, quae inflammationem consequuntur, continua, & magna persistent. A Connexis verò, si aetas sit iuuenilis, temperatura calida, tempus anni, & regio calida, citius suppuratur & disruptitur abscessus; Contra verò vbi inflammatio sit ex humoribus frigidis, aut mistis, in estate, & tempore, & regione consensuali, in longius protrahuntur, praecipue si symptomata videantur imminui. Propterea dicebat Hipp. 2. prognost. § 7. quosdam ex istis disrupti in 20. 30. 40. & 60. die. Et sane isti duo, quorum apte memini qui ex Pleuritide Suppurati sunt, non ante 60. diem abscessus disruptionem habuerunt. Id ipsum fit si pars sit frigidior, & magis densa, sicut est Pleura, propterea ceteris partibus semper Peripneumonia citius suppuratur & disruptitur, quam Pleuritis, propterea Hipp. § aph. 8. Pleuritis 14. constituit diem, in qua si per sputum inflammatio non desierit, Suppuratio incipiat.

Quod pertinet ad Prognostica salutis, vel mortis, proponuntur hae ab Hipp. partim in § 6. 2.

A progn. partim in 63. & in § 6. quidem proponuntur signa bona, vel mala abscessus non disrupti in 63. verò signa abscessus disrupti.

Priora autem bona sunt, facile spirare, & faciliè decubitus ferre, tussi admodum non consistari, corpus aequaliter calidum habere, siti non vexari, conuenienter dormire, excreciones omnes vri-nae, & alui satis naturales obtinere. Addo ego, quod experientia obseruavi in ijs duobus, quos retuli, vires & vitales & naturales constare: Nam ambo isti cum abscessu maximo ambulabant & equitabant, vt intelligeris; imò vnus ex istis, qui erat religiosus Franciscanus dum ascenderet equum post 60 diem, ex quo abscessu laborabat, pallus est disruptionem abscessus propter illam agitationem.

Opposita omnia sunt signa lethalia.

Signa verò lethalia post disruptum abscessum sunt, si febris non desinat, aut desinens reuertatur sputum exiguum sit, & illud quidem paruum, liquidum, fauum, vinde. Contra verò scribit Hipp. si eodem die quo facta est ruptio, febris desinat, sputum appareat, optimum pus, scilicet candidum, lenè & aequale, & si num salutis signum.

Sed dicit quis: Quasi fieri potest, vt disruptio abscessus, collecta sanie in capacitate thoracis, quae putrida est & cordi magis propinqua, quam vbi continebatur intra membranam, febris quamprimum desinat? Ego super hac difficultate, quae apud me noua est, volui videre super hoc loco Hippocratis Interpretes: qui rem hanc sic pede transeunt. Ego, vt ingenue fatear, propria experientia non obseruauimus suppuratos post disruptionem, quamquam seruati fuerunt, à febre prius immunes fuisse.

Itaque mihi persuadeo hoc tantum voluisse Hipp. Signum salutis esse, si febris, quae antea suppuram fuerat magna, non prius desinat, sed desinat esse magna: Sic ego locum interpreter, cum igitur tales seruati possint, reliquum est, vt de modo loquamur.

Modus, quo Suppuratio consuevit finem habere duplex est (loquor nunc de Suppuratione non rupta.) vnus est per abscessum, & hic abscessus est duplex: vnus est in ipsa eadem parte affecta, alter est in partibus distanibus, in parte ipsa affecta fit quandoque abscessus, quando materia iam integre suppuratur, dum non potest disrupti ad partem thoracis internam, facit tumorem circa costas omnibus apparentem.

Hunc vidi ante plures annos in pleuritico Natta, qui 60. die tramine disruptione abscessus incidit in huiusmodi tumorem, quem ego aperui & Suppurati. Chirurghi, & spatio 8. dierum eduximus sanies plus, quam xv. libras, albae lenis, & equalis, & loco aperto seruato per annum integrum tandem sanitati est restitutus, & dicitur Pigozzo ad Portellum, & est nunc in viuis.

Ceterum vbi abscessus non est vsque adeo perfectus, pus non est integre transmutatum. nam tunc temporis consuevit facere abscessum aut post aures, aut circa articulos, & licet Hippocrates 2. Progn. 64. & 65. mentionem faciat articularum internorum, ego tamen vidi in puella quadam petri.

Dubita-
cio insi-
gnis.

Hist. nau
te Suppu-
rati.

Peripneumonica abcessum in articulo cubiti dextrum, qui seruauit quidem puella, sed cum luxatione cubiti, subsequente post abcessum suppuratum maxima ossis corruptione,

Alter modus est per vias vrinae.

Vbi autem iam disruptus est abcessus, potest purgari & per vrinas, & per alium. sed frequentius per sputum; qua ratione id fiat, audietis in sequenti lectione.

Quaquam Suppuratio in abcessum externum destinata, tamen quia abcessum alij saluantes sunt quidam perniciosi, alij vero medi; decet in praesentia proponere signa abcessum saluatiura, lethaliū, & eorum, qui medi dicuntur.

Salutaris itaque erit abcessus in Empyemate, si potius fiat ad inferiores partes, quam ad superas, ut circa genua, vel pedes, si cito suppuretur, & suppuratio formam accipiat pyramidalem, quam Hippocrates primo prognost. 40. fastigiatam vocat, secundo prognost. 64. fistulosam dicit: Si praeterea fiat è directo partu laborantis, & sputum, quod antea crudum fuerat, superueniente abcessu, concoctionem adipiscatur, propterea (Audiores) iure à me dictum est superiori lectione, abcessus illos apparere in illis suppuratis, in quibus pus absolutum, & perfectum non est; sed pro aliqua tantum parte transmutatum, hoc voluit Hippocr. 3. prognost. 67. cum dicit, bonos esse abcessus in Pulmonia, quando sputum ex flauo purulentum euadat, & mutatio appareat,

Denique boni sunt abcessus, qui cum aliqua sunt coctione.

Nam ex alia parte omnium deterrimi sunt, qui sunt cum sputo omnino crudo, atque vrinis & alij excrementis pariter crudis, qui sunt potius ad superiores partes, ut post aures, quam ad inferas, qui lati sunt, & plani, neque cito suppurantur, neque sputum adiuuant.

Medij sunt illi, qui sunt perseverante quidem febre, & dolore in inflammationibus non biliosis sed potius pituitosis cum vrinis medio modo coctis, quae scilicet aut non prorsus careant sedimento, aut crassius habeant sedimentum, quam conueniat vrinae bene coctae, haec colliguntur ex Hippocr. 3. progn. 65.

Per quam viam deponat natura huiusmodi humorem à thorace in articulos, aut in adenes, pro curatione non est necessarium declarare, tamen ut cunctis satisfaciamus breuiter dicendum naturam huiusmodi humores deponere & per spatia inania, & per venas, & arterias. Dicebat Gal. 7. aph. 54. naturam aliquando abcessum in osse existentem per cutem purgare, multo magis id fieri potest, vbi materia continetur in aliqua ampla cuitate.

Disputatio de excretionis Puris ex Thorace per Urinas.

Alter modus per quem purgatur Sanies, ut diximus, est per Urinas, huius meminit Hippocrates secundo in 1. Epid. 10. & 44. vbi meminit stranguriam factam propter materiam acrem,

A quandoque Purulentam ex varijs corporis partibus ad vesicam demandatam: Meminit quoque Gal. 6. de loc. aff. 4. cui assentiuntur Paul. & Aet. & inter recent Beniuen. in suo de admirand. & Langius lib. 2. Epist. ep. 4. Am. Lusitanus lib. 3. curat. 68.

De via per quam fiat huiusmodi purgatio, est aliqua dubitatio: nam Gal. loc. cit. docet, Purulentam materiam in Pulmones receptam deinde transumi in arteriam venosam, ab hac in sinistram cordis ventriculum, à ventriculo in arteriam magnam, à qua deinde in emulgentes, & vias vrinae.

Fallopium inquit, se aliam inuenisse viam, rimum scilicet venae cauae insertum in venam sine pari sub diaphragmate, per quam potest pus ad vrinas deduci.

Alij putant, id fieri per venam arteriolam (inter quos fuit Mesues) quae deferat huiusmodi pus ad dextrum cordis sinum, in venam cauam, in gibbam iecoris, & in emulgentes.

C Sed decipitur Mesues: neque enim vena arteriosa vllum admittit corporis ingressum, sed tantum egressum, sicuti neque ex dextro sinu in venam cauam aliquid amplius potest permeare propter valvas, siue ostiola, quae ex natome apparent.

Itaque accipienda est Vesalii sententia, tamen non in quocunque casu, sed tantum vbi suppuratio fit in parte dextra, & vbi sit inter membranam, non etiam collecta in capacitate thoracis: tunc enim facilius recipitur in Pulmones. Recepta autem in Pulmones purgatur, ut voluit Gal. per sinum cordis sinistram.

D Neque quis obiciat: hunc Sinum omnium corporis partium nobilissimum, & spirituum vitalium fontem hanc praeiudicem sustinere non posse; non profecto si sanies ibi diu conquelescat, exstinguet patientem; si aliquo temporis spatio, vel saltem inducet Syncopen, aut Lipothymiam, huius rei habetis historiam apud doctissimum & elegantissimum Andr. Laurent. lib. 3. ca. 13.

Sed si quamprimum transeat, sicuti contingit, vbi facultas cordis valida noxiam à se expellit, potest fieri purgatio, in columi existente ipso suppurato,

De excretionis Puris Empyicorum per Aluum.

Fit quoque purgatio per Aluum, & modum, quod sit huiusmodi purgatio, eundem esse censuit Mesues, quem antea proposuimus, per dextrum scilicet cordis sinum. Sed decipitur ob causam dictam.

Ferus locus est ille, quem proponit Gal. 6. loc. aff. cap. 4. per quosdam ramos venae portae, quam ipse ibi vocat *σπληνική*, vel *σπληνική*, qui inferuntur in diaphragma; Pus receptum in hos ramos statim tendit ad portam, & per mesaraicas ad intestina: quaquam Ego non putem ab re esse posse eandem materiam recipi in ramos cauae, & mitti ad gibbam iecoris partem, deinde vero ad sinum, ad portam, & ad intestina: nam si sit pus per sinistram cordis sinum innoxio corde, poterit

poterit etiam trāfire per iecur innoxio iecore : & A
 sane (Auditores) ego hoc obseruavi experientia
 in eo Nauta, cuius heci memini, fieri eodem tem-
 pore, quo abscessus exterior apparuit, apparuisse
 quoque saniem cum alui excrementis deiecitam.

De Reiectione Puris per Sputum.

Denique magis consueta & familiaris purga-
 tio Suppuratorum est per Sputum, non di-
 sputo in presentia, id quod facit abunde Gale.
 5. de loc. aff. 3. contra Erasistrat. virum hęc purga-
 tio fiat per transumptionem materię, aut quia
 recipiatur in venas mediastini ea parte qua dorso
 alligatur, aut quia comprimitur a costis in ipsos
 pulmones : nam quocunque modo res habeat,
 certum est Purulentam hanc materiem in multa
 copia excretam, albam, lenem & aqualem, feli-
 cissime Suppuratos indicare, ut propterea ego se-
 mel viderim in alio Nauta (quod sanē videtur in-
 credibile, in hoc suppurato tabido reddito, & de-
 plorato) naturam confertim pus per Sputum edu-
 xisse per spatium 8. dierum, singulis diebus plus
 quā ad lib. vj. & viij. ita ut videretur potius ex
 ventriculo, quā ex thorace educi, nam librę
 multę simul educebantur, sed cum iussit & sana-
 tus est. Casum similem refert Nicol. Florent.
 serm. 4. tract. 2. c. 26.

Est etiam bonum huiusmodi Sputum, si citō in-
 dicet Suppuratos. Hipp. 5. aphor. 15. constituit vl-
 timum terminum 40. dierum, hęc sententia in-
 telligenda est non à die Suppurationis, sed à die
 disruptionis, nam, ut intellexistis, post 14. diem
 aliquando intercedunt 60. dies, in quibus fit Sup-
 puratio, & post istos 60. dies, si fiat disruptio, ha-
 bet adhuc terminum 40. dierum, in quibus si pur-
 getur, patientes à tabe redduntur immunes.

Curatio.

His existentibus modis, quibus Suppurati sa-
 nantur, necessarium est oculatum Medicum
 animaduertere diligenter, quam viam natura sen-
 set, nam si vias Urinę : diureticis est agendum;
 non sint tamen vera diuretica : nam sanies est a-
 cris, vera diuretica sunt calida, & sicca in tertio, E
 idcirco exulcerationem renum, vel vesicę in ferro
 possunt, & eo potissimam, quia, ut intellexistis ex
 Hippoc. 2. in 1. Epid. 10. & 14. istę urinę faciunt
 Stranguriam ex puris acrimonia : itaq; eligantur
 ea diuretica, quę aqueam augment humiditatem, &
 propter hanc causam urinas mouent, ut est serum
 caprinum, aqua hordei, aquę ferratę, emulsiones
 omnium frigidorum, his possunt addi etiam tem-
 perata, vt cuscutha, capil. Vener. polytrichum,
 quinq; folium : & non modo tanquam medi-
 camenta hęc sunt prębenda, sed etiam in cibis F
 perpetuū permiscenda, vt in pusana, vel in eius
 cremore.

Si Alium tentauerit, subducenda est alui, sed
 potius clysteribus, quā medicamentis, & illis
 quidem placidis, Imminet enim idem exulcera-
 tionis periculum, sint itaque Clysteres ex decocto
 hordei, ex pusana cum saccharo, butyro, & ad sum-
 mam casta extracta.

Si tentauerit Sputum, quę ratione purganda sit
 materia per sputum, abunde docti estis capite de
 Tussi & Asthmate quo confugite. Moneo tamē,
 vt perpetuū misceris Eclegmanibus ea, quę pul-
 mones ipsos corroborare valent, ne fortē & ipsi
 exulcerentur, vt est pulmonaria, siue succus, siue
 puluis accipitur, pulmo, vulpis pręparatus, pro-
 pterea looch de pulmone vulpis prębeatur : &
 quia necessaria sunt expectorantia valida (maie-
 ria enim in capacitare thoracis contenta, si debeat
 educi per sputum, fortioribus eget medicamen-
 tis, vt est radix ireos, puluis eruiorobi, sem. bom-
 baceis, caulis ; calamentum, & alia id genus) hęc
 quoque temperanda sunt syrupo violato, aceto
 simplici, syrupo de farsara, vt aliqua ex parte cor-
 rigantur.

Si tentauerit Abscessum, in quacunque fuerit
 parte, abscessus quamprimum suppurandus & sup-
 puratus aperiendus, imo verō neque integra sup-
 puratio est expectanda : nam pus ipsum ossa cur-
 sumpit, vt ego experientia vidi.

Sed si nihil horum tentauerit natura, quid est
 agendum? Deploratus est istorum casus, nisi ali-
 quid agamus. Paulus & Aetius proponunt varias
 vñones in varijs thoracis partibus, quę non pene-
 trent, quę omnes mihi videntur inutiles. nam tā-
 ta puris copia neque decem, neque viginti exter-
 nis vñionibus potest purgari.

De Apertione Thoracis Suppuratis.

ITaque excogitarunt Medici Apertionem i tho-
 racis, aut vñione, aut sectione. Gal. cum Hip-
 p. 6. aph. 27. atq; i lib. de internis affect. laudat ma-
 gis vñionem, quā sectionem ; ego hac in parte
 Ambros. Patris sententiam amplector, qui ferro
 ignito locum vult aperiri. Modum legauis apud
 illum lib. 3. c. 10. ibi enim habebitis, quęque ico-
 nem instrumenti ad id accommodati.

Apertio
 Thora-
 cis.

Sed de Loco, in quo facienda est hęc Sectio, tā-
 ta est apud scriptores, controuersia, vt nulla maior Locus.
 esse possit. Paul. lib. sexto, capite trigesimo quar-
 to dicit, faciendam esse inter sextam & quintam
 costam; Alii dicunt inter quintam & quartam ex
 mendosis; Amat. Lusitan. centuria, prima. curatio
 68. dicit faciendam esse inter quartam & tertiam.
 Non desunt, qui dicunt inter tertiam & secundā.
 Ambrosius Pareus differt ab his omnibus, qui
 docet, faciendam esse sectionem inter secundam
 & tertiam costam ex legitimis.

Et sanē (Auditores) cū duo in hac sectione
 sint maximē animaduertenda : vnum est, vt post
 sectionem pus in capacitare thoracis collectum ef-
 fluat; alterumne in dissectione vulneretur diaph-
 ragma, si fiat sectio in aliqua ex costis, mendosis,
 mihi persuadeo, aut saniem non esse effluxuram,
 quādo scilicet sint costę ultimę : nam diaphragma
 vt ex anatome potestis colligere, alligatur omni-
 bus costis mendosis; aut, si altior sit sectio, verē-
 dum est, ne vulneretur diaphragma.

Et quamuis Lusitanus dicat, se in cadauere ex-
 perimentum secisse impositionis phlebotomi intra
 octo diaphragmate, hoc tamen nihil est. nam alia
 est ratio cadaueris, alia corporis : in cadauere enim

ad superiora trahitur diaphragma in viuentibus propter continuu motum descendit ad inferiora.

Quomodo educendum Pus. Itaque mihi placet consilium Paræi, ut inter secundum & tertium ex legitimis sectio fiat. Pus autem debet paulatim educi: nam si confestim educatur, moriuntur, ut dicit Hipp. 6. apho. 27. & causam protulit Gal. in com.

Euacuato Pute ad renutitionem corporis, &

Ad prohibendam nouam regenerationem puris, conuenit lac vel humanum, vel asininum, dum enim renutriuntur partes, vlcus etiam coalescit, & sic noua sanies non generatur.

Sed si quispiam ab visione & sectione abhorreat, studendum est exsiccando puri intrinsecis & extrinsecis medicamentis, quorum sylvam habetis apud Aetium: quare in hac re diutius non verabor.



PRÆLECTIONVM PRATICARVM

Pars Secunda :

DE CORDIS PALPITATIONE.

Cap. I.



OMNES motus præter naturam in corde excitati referri poterunt vel ad Palpitationem, vel ad Syncopen, quarum illa deprauata, hæc imminuta, abolita ve est actio. Palpitatio varijs exprimitur nominibus, Græci

παλιδντις καρδιας vocant: Auicenn. Tremorem: Alii Pulsum, Saltum nonnulli Cordis: Rhasis Tullationem, quidam Ictigationem hanc affectionem nuncupant, Distinguntur à se inuicem Ictigatio, & Tullatio, quod illa motus sit tremulus, non continuus, hæc verò continuus. Cum tot sint nomina, quibus nuncupatur hic affectus, videndum, verum hæc vnum significant, an plura: Fuerunt quidam, qui dixerunt, omnia esse synonyma, ego tamen dico, omnia hæc aliquid diuersum significare, teste Gal. lib. de caus. pulsuum, deinde cum actiones deprauate secundum Gal. de caus. sympt. primo in triplici sint differentia: quædam enim à natura sunt, causis morbisicis irritata, quædam à natura simul & morbo, quædam à solo morbo, eiusque causis; non abs re quaritur, ad quod nã læsarum, siue deprauatarum actionum genus referenda sit Palpitatio.

Altimarius cum alijs nonnullis in earum motionum classem reponunt, quæ à sola causa proueniunt morbisica, nihilque differre illam volunt à Palpitatione à Gale. 2. de caus. sympt. 2. explicata, quam à solo morbo in partibus distentionem admittentibus fieri ibidem Gal. docet.

Alii inter quos Fernel. & Holler. facultati, siue nature à causis morbisicis impulsæ, hunc motum acceptum ferendum censent. Sunt denique, qui naturam simul cum morbo huius symptomatis causam statuunt.

Ego, ut nulli harum opinionum simpliciter adherendum, ita omnes amplectendas censeo, etenim quandoque à sola natura causis præter naturam irritata symptoma hoc prouenit; quandoque à solo morbo, siue causa morbi, & denique ab utraque aliquando suscitatur.

Ad Altimari autem quod spectat opinionem, in tribus cum eo mihi non conuenit: in loco, in forma motus, in causa effectrice, ipse enim Palpitationis nomine intelligit distentionem à vaporescentia ve frigido crasso in cordis ventriculis coercito factam; ego verò huius affectionis sedem non in ventriculis tantum, sed etiam in Pericardio

et intra membranam Cordis parenchyma circumuestientem contineri existimo, quod in pericardio, & ratio, & Galeni auctoritatis comprobant, si enim Palpitatio in omnibus, quæ distendi possunt, partibus fieri potest, quid obstat, quominus Cordis etiam Capsula huic obnoxia sit præsertim cum ibi adsit materia, quæ in statum resolui possit, unde Hollerius dissectum se vidisse scribit cadaver cuiusdam Palpitatione laborantis, in quo hæc Capsula Cordis vitris instar inflata erat, & Christophorus à Vega mentionem facit cuiusdam hac ipsa passione agitati, in cuius præcordijs murmur, & sonitus ab alijs quoque aures pectori admoventibus percipiebatur; id quod fieri non potuisset, si flatus, aut vapor in ventriculis conclusus fuisset.

An inter membranam inuestientem Parenchyma Cordis tanta fieri possit flatum collectio, quanta ad palpitationem sufficiens sit non immerito quis dubitauerit: nullus enim ibi videtur flatus locus, cum arctissime adhæreat membrana; non omnino tamen impossibilem esse statum ibi collectionem mihi persuadeo: si enim frequenter hæc passio contingit in cute, quæ tamen tenaciter subiectis partibus adheret, quid mirum, si in viscerum quoque membranis eueniat, cum maxima flatus vis sit penetrandi, separandi, distendendi.

Denique nullo pacto dari posse in sinibus cordis flatum frigidum, crassum, qualis effectrix huius præter naturam motionis causa statuitur, non contentandis ostendi potest rationibus: Non enim in dextro; quippe qui sanguine plenus non admittit; neque enim dimensionum penetrationem patitur natura; non in sinistro, cum nec ibi generari possit, nec aliunde transmitti & infundi, generari non potest, cum desit tam materia, quam efficiens; fons enim caloris cor, si ad tantam redigatur caloris inopiam, ut flatum generet crassum, mors præforibus est, neque diuturna esset hæc affectio, quæ tamen ad multos extenditur annos, deest materia, humor scilicet melancholicus, & pituitosus; nam qui ex dextro in sinistram sinum effunditur, seu transcolatur sanguis, non nisi tenuis esse potest, cum sensum omnino fugiant foramina, quæ permeat.

Quod non aliunde transmittatur, sic ostenditur: per arteriam magnam non potest, obstantibus valvulis, quæ prohibent regressum spiritus à corde in corpus diffusi; nec per arteriam venalem; mortem enim afferret flatus frigidus sinistram cordis sinum occupans, extincto spiritus vitali nec tam multos annos durare posset hæc affectio: Hæc omnes rationes apud me tantum posuere, ut

omnino olim statuerem Cordis ventriculos locum non esse : iam verò sententiam mutò & palinodiam cano, etsi autem difficilimum sit unicuique arbitrari, in ventriculis Cordis frigidum flatum posse generari, qui Palpitationem inferat; nihilominus si, quæ proposita fuere argumenta, dissolvantur, res erit faciliior & plana.

Ad primum igitur, in quo dicebatur, in Dextro Cordis Sinu non posse coaceruari tantum flatum, quantum ad palpitationem efficiendam requiritur, cum omnem locum ibi occupaverit sanguis; Respondi potest, negando consequentiam, ratio autem est, ubi partes eius, sunt naturæ, & conditionis, ut ultra statum naturalem extendi possint, etiam si humore sint pleni, à flatu tamen vel aliunde irruptente, vel in ijs genito, extendi illas magis posse, nulla ratio est, quæ neget; & ita docebat Gal. lib. de vit. respir. 2.

Maiores est difficultas de Sinistro Ventriculo, quæ constituimus continere sanguinem, & spiritum calidissimum, qui propterea non videtur flatum admittere; sed hæc ratio nihil concludit, quia nos non volumus flatum excludere omnem spiritum, & in ipsius succedere locum, sed simul cum spiritibus substantia commisceri flatuum non nihil, à quo possit excutari Palpitatio; nam si hic si ius recipit aerem frigidum ab ipsis pulmonibus per arteriam venalem ad contemperandum nimium Cordis æstus transmissum, quomodo non admittat aliquam aliam flatus portionem, quæ simul cum spiritu dilatationem, & constrictionem faciens huius accidentis effectrix causa existat, quæ præsertim diu in Corde non retervetur, sed concitata motione aut expellatur statim, aut dissipetur, aut digeratur.

Quod in Dextro Ventriculo gigni possit, & materiz & efficientis demonstrat præsentia, Quod ad materiam; talis reperitur ibi sanguis, qualis in iecore producitur; is autem plerumque est viscosus, melancholicus, pituitosus qui ad flatum generandum apertissimus est ergo accedente partis calore, nihil prohibet, quo minus flatum generetur. In Sinistro quoque dari materiam flatu generando aptam, nemo inficiabitur, qui Gal. 6. de vit. part. 4. inspexerit, ubi docet, in Sinistro Cordis Ventriculo sanguinem crassum reperiri, sed quod magis est, non sanguis tantum crassior, sed ipsa quoque pituita ibi coaceruari potest, id, quod experientia confirmatur, scribit enim Anton. Beniven. de admir. c. 89. in cadauere quodam inventum fuisse abscessum pituitosum in Sinistro Cordis Sinu, scribit similiter in duobus cadaueribus dissectis per magnam inuentam fuisse pituitæ copiam in Cordis ventriculis. Vesal. lib. 1. anatom. c. 5. carneam ibi massam duarum librarum pondere se inuenisse, quæ non nisi à crasso sanguine gigni potuit.

Sed dicet quis, quomodo in sinistram sinum permeabit, foramina enim & Gale. & omnium ferè Anatomicorum auctoritate obscura admodum, & non peruia, ut penitus transitum denegare videantur humoribus crassis. Ego venio in sententiam Realdi Columbii, qui lib. 7. cap. 1. statuit, sanguinem in Sinistro Ventriculo contentum non confluere illuc per aliud septum, sed transmitti à

A Dextro Ventriculo per venam arterialem ad pulmonem, ibique attenuari, deinde cum aere una per arteriam venalem ad Sinistram Cordis Ventriculum deferri. hæc assertio suffulta est rationibus non leuibus; nam pulmones sanguine ex Dextro Cordis Ventriculo hausto nutriti apud omnes in confesso est, cuius portionem aliquam si reflueredicamus in Sinistram Sinum, nihil inde sequitur absurdi. Confirmari id etiam potest experimento lib. 1. §. ab eod. Real. in mediū adducto, scribit enim inuenta fuisse corpora, in quibus septum, ventriculos Cordis dirimens, cartilagineum fuerit, id quod nulla ratione penetrare potuit sanguis, siue crassus, siue tenuis.

Occurritur hic nobis variè: primo quidem, si concedimus & observamus Sinistram Cordis Ventriculum, & pituita, & carnea mole, & abscessu oppleri posse, quomodo potest ibi generari, indeque in totum corpus distribui vitalis spiritus? prodiluenda hac obiectione dico primo facultatem spiritum generatricem non esse propriè in ventriculis, sed in ipsa solida Cordis substantia, à cuius temperie dimanat, hinc Gal. 1. ad Glanc. incur. syncop. inquit, spiritus deficere ob immoderatam Cordis intemperaturam; idem repetit 1. 2. meth. §. Cum igitur in ipsa substantia Cordis vis illa resideat, natura, etiam si aliter deficiat ventriculus, in altero tamen elaborare, & gignere potest spiritum, scribit etiam Real. Columb. desiderari in nonnullis Sinistram Ventriculorum; qui tamen & ipsi viuunt.

Quærenti autem; qua ratione moveri possint arteriz, quæ spiritum & calorem à Ventriculo Sinistro suscipiunt Respondendum cum Galen. ex lib. de vit. puls. c. 5. moveri arterias non à spiritu, ipsas opprente impulsas, sed à facultate, a solida substantia Cordis transmissa in arteriarum tunicas, etiam si ergo obliteretur omnino, vel oppleatur sinister sinus, obstaculo tamen id esse non posset, quo minus vis pullatrix in solida substantia illata in arterias dimanet, accedit, quod idem Gal. lib. de usu part. 8 scribit, communicari calorem, & spiritum toti corpori non per arterias duntaxat, sed venas etiam, & alis vias, ergo deficiente etiam sinistro sinu potest animal vivere calorifque beneficio frui, ac sustentari.

Rursus si quærat alius, quem igitur sanguinem in se continere poterunt Arteriz, nisi à Sinistro Cordis sinu illum hauriant. Huic satisfacere possumus cum Gal. lib. 2. quod sanguis in arter. c. 5. dicentes, connecti cum arteriarum orificij orificia venarum, ita ut arteriz sanguinem attrahere possint ex venis, unde ibidem Gal. diuisa, inquit, vena maiore non tantum qui in venis est, sed etiam qui in arterijs, sanguinem effluere.

F Ostendimus hæcenus materiam generandis flatibus idoneam in Cordis Ventriculis dari, restat ut de Causa Effectrice pauca dicamus, quæ plerique cum Galen. 3. de symp. caus. 2. calorem statuant debilem sed hic in corde, eum fonte omnis caloris locum habere nequit. Dupliciter responderi potest huic instantiæ: primo si dicamus in Corde naturaliter se habente non posse dari imbecillum calorem, & consequenter flatum gigni non posse;

posse sed si Cor à naturali temperie ad refrigerationem deflectat, quis neget flatum generari posse? & dari quidem posse in Corde calorem remissionem & imbecillum, manifestè colligitur ex 3, de prælag. ex puls. 5. ubi proponit Gal. talem esse aliquando Cordis frigiditatem, ut resistat, calēbus & putrescentibus humoribus, ut febris putrida inde generetur. Deinde alia est responsio, meoq; iudicio magis probanda Flatum non semper gigni à calore imbecillo, ut pote quem à calore etiam in tenuissimo procreari posse existimo, quotiescunque huic multa suppetit materia, ex qua subinde, & continenter novus generatur flatus, vel quando locus ubi conclusus est, adeo est densus, ut collectus genitusque flatus in eo dissipari nequeat. Galeni igitur sententia calorem debilem flatuum auctorem statuentis, non simpliciter accipienda, sed eū conditionibus huius, nisi vel ingens materię sit copia, vel loci densitas dissipationi obstat, ubi enim hæc duo adfunt, ex intenso etiam calore flatus generari possunt, id quod ipse docet Gal. 1. meth. ult. de dolore agens colico, in quo abstinere nos jubet à vehementer calidis; hæc enim dicit fundendo humores flatus multiplicare, & ita dolorem augere: Auctor. 4. acut. 90. scribit alium flatus gignere, contradicere videtur Gal. cum potius flatus discutiat, tandem tamen & ipse Gal. veram esse hanc affectionem concludit, alium asserens in corporibus cacochymicis flatum excitare. Ceterum non tantum potest flatus generari in corde, sed transmititur etiam ad ventriculos. Primo enim quid prohibet, quo minus ingrediat in Sinum Dextrum per venam cavam, cum per hanc confluat sanguis in cor, & variæ quidem nature, melancholicus, pituitosus, flatulentus. unde omnes Medici flatum communicari aiunt à splene, aut à iecore, aut à melleo per venas. Ad Sinistram alia transmitti via potest, primo quidem per arteriam venalem; si enim aer, quid etiam non flatus per eam communicari potest, eū pulmones ut plerumque flatus & pituita referunt? Secundo per arteriam magnam, at iniquies, ostiola prohibent, quæ non admittunt, ut reuertatur spiritus, qui semel effluxit. Respondetur, ostiola illa etiam si prohibeant sanguinis spiritusque regressum in cor, tamen non ita occludunt arteriam, ut nulla omnino portio, vel flatus, vel sanguinis remeare possit, falsum enim sic esset Hipp. pronuntiatum, totum corpus esse conspirabile. Unde Host. in scholio, cap. 29. proponit historiam Palpitationis factæ ex spiritu flatulento per arteriam magnam in Ventriculum Cordis Sinistram effuso.

Hactenus quomodo ratione loci nostra ab Altimaro discrepans sit opinio declaratum fuit.

Ad Formam igitur motus transeundum quam similiter diuersam statuo ab ea, quam proposuit Altimarus, qui putat, nullum aliud esse motum, quàm Eleuationē, siue Distentionē, & Constrictionē ventriculorum, seruante corde proprium situm & locum. Nos contra ita fieri censemus hanc Dilatationem & Constrictionem, ut totum Cor etiam locum mutet. Ratio est in promptu: nam ubi dilatantur ventriculi, longitudo transit in rotunditatem, & cu-

spis à thorace reuolvens sursum vergit; contrariū accedit in Constrictione.

Sed ad tertium, Efficientem videlicet Causam putat Altimarus hanc Dilatationem & Contractionem duntaxat fieri à flatuoso spiritu, genito ex humore pituitoso, ideoque curari discutientibus flatum, crassosq; & frigidos humores incidentibus, & attenuantibus. Ego verò non frigidum tantum flatum, sed vaporem quoque & spiritum calidum, & ebullientem huius præter naturam motionis causam esse existimo. Quæ mea sententia confirmari potest hoc argumento. Vapor in quacumq; humani corporis parte membranosa conclusus Palpitationem inferre potest, sed fit, ut aliquando coerceatur in ventriculis Cordis, ergo. Maiorem probo ex Gal. 2. de symp. caus. 2. ubi de causa Palpitationis in genere verba faciens non tantum frigidam mentionem flatus facit, sed vaporem quoque similem illi, qui in aqua ebulliente bullas exhalat, hoc symptoma producere posse pronuntiat: talis autem vapor non nisi calidus esse potest. Deinde lib. de plenit. scribit dari plethoram non tantum ex sanguine genitam, sed etiam ex substantia vaporosa calida, quæ in flatu multum effert vescentis, dolensq; disruptis, vasa distendit. Vapor ergo non tantum frigidus, sed etiam calidus, exitum non inueniens, huius affectionis causa est censenda.

Sed hic obicies; Vapor calidus est tenuis; caloris enim est fundere & attenuare. Gal. autem à spiritu crasso palpitationem fieri scribit. Respondetur: etsi vapor calidus tenuis sit, eum tamen incrassari posse vel ambiente frigore ipsum coarctante, & in angustiam red gentes, vel loci densitate exitum denegante. Minor; hunc scilicet spiritum calidum aliquando præter naturam in ventriculis multiplicari posse, confirmatur primo, quia Cordis fuoltantia ingentes quandoq; patitur interperanas calidas, cum, vel sine inflammatione, in quibus spiritus supra modum calefacti, & igniti multi instar feruentis, ventriculos distendunt. Vide Gal. 4. aph. 69.

Aliquando spiritus, & vapor ille aliunde transmittitur impetu quodam in Cor, unde ita percuti, & ob immoderatam exercitationem æstuantis non raro in Palpitationem incidunt, abrepto scilicet vapore, ac spiritu in ventriculos, interdum bilis transmittitur, ut in febribus; hinc Fernel. 7. Pathol. ult. scribit, se in duobus hac affectione extinctis vidisse bilem reorridam præassatam topi instar concretam, inq; arterias effusam, à vi scilicet expultrice Cordis extremum conatum adhibente. Transmittitur interdum sanguis ebulliens feruidus Fernel. lib. 3. ca. 30. Palpitationem fieri scribit à sanguine in ventriculis Cordis ebulliente, & agitato; & Rhasis nos. 9. ad Almanf. proponit curationem Palpitationis, à causa calida factæ.

Denique aliquando coaceruatur in ventriculis, quod fuligens spiritus, & calor transmittit nequeat ad arterias, propter impedimenta variæ, de quibus fufius infra dicetur: propterea Gal. 7. de loc. aff. 2. scribit Palpitationem fieri per omnes magnas intemperantias, ergo & per calidas, & huius

huic obnoxios tum curari, tum praeservari sanguinis missione: quae potius obesser, si causa frigida dependere, & per febres ardentissimas interire fuerit omnes, quod similiter non contingeret, si frigida esset affectio: et quamvis Arist. in assignanda causa motus naturalis Cordis deliquerit, veram tamen Salus huius praeter naturam causam attigit lib. de vit. & mort. cap. 8. dum dicit, illum euenire à spiritu ebulliente retento, & coarctato propter antiperistalsin à circumstante ipsum, & concentrante frigore.

Secunda species Palpitationis Cordis.

DAti autem Palpitationem à facultate simul naturali Cordis, & grauitate eiusdem factam id est Tremulam, fortassis nec Arist. nec Medici concedunt. Arist. quidem, qui opinatus est locum motum Cordis fieri tantum à sanguine ebulliente, & aere per refrigerationem hausto, refrigerante, & constringente. dum enim sanguis effluuiscit, ventriculi dilatantur, aequae attrahitur frigidus, cuius appulsu reprimatur feruor, vicillimque subsident, & constringuntur ventriculi. Galenus verò hunc motum à facultate Cordis insita procedere docet; at falsam esse Arist. hac in parte sententiam demonstratur primo, quia ipse non poterit assignare causam motus Cordis retentiu, quo scilicet Cor retinet, quod vtile sibi est, & familiare, expulsiis noxiis, qui mediantibus sit fibris: Deinde si tantum ab ebullitione sanguinis prodire, nullum seruaret ordinem, & frequentes fierent, Palpitationes; pro varietate enim ambientis variè immutaretur ordo Dilatationis, & Constrictionis. Repugnat denique huic Aristot. assertioni ipsa Cordis structura; substantia enim Cordis solidissima est, fibrisque instructa, validissimis, quibus non frustra donatur Cor; rectis enim dilatatur, transuersis constringitur, reuinet obliquis. Medici cum ipso Altimario contra hunc Tremulum Cordis Motum ita insurgunt. Tremor symptoma est motus voluntarij, semperque ad facultatem refertur animalè: ergo in Corde locum habere nequit. Quibus responsum volo, me concedere totum argumentum, non est Tremor, qui facultatis animalis symptoma est: est tamen similis motus nam ut tremor à facultate sit imbecillior, & grauitate membri, ita etià Palpitatio ob easdem interdum causas contingit idque dupliciter, imbecilla existent facultate, vel comparati vnè, vel simpliciter, in comparatione, quando scilicet maius Cor acquirit pondus, maiorem molem, quam ut par sit facultas illi mouendae: quemadmodum baulus alias robustissimus imbecillis dici potest propter oneris magnitudinem. Redditur autem grauius, ponderosiusque Cor vel per consensum, vel per essentiam: per consensum propter tumorem, in pericardio, aut collectionem materiae adeo copiosae, ut officiat libere Cor dilatationi. Gal. 1. de loc. aff. 2. cum reperisset in gallis, & simijs aquam copiosam, & tumores duros in pericardio. eadem quoque, in hominibus inueniri posse scribit, indeque Palpitationes fieri, dum Cor in aqua quasi mouetur. Aliquando haec de-

A bilitas simpliciter Cordis accidit, reddita scilicet facultate imbecilla propter intemperiem siue frigidam aduersantem calori eius insito, siue humidam, eundem calorem obtundentem, siue siccam substantiam absorbentem humidam, siue calidam, quae digerendo similiter exhaurit humidum primum: hinc Auicenna omnes maximas intemperantias Palpitationem efficere posse scribit, Potest quoque deficere ex spiritus, & caloris penuria, qui fundamentum est, vitae, & roboris vitalis, omniumque functionum, docente Gal. in com. 9, 7. part. in aphor. in initio.

B Dicent Aduersarij: ab imbecilla facultate motus sit imbecillis, & imminutus, non deprauatus, at Palpitatio inter motus refertur prauos sed in contrarium proferre possum auctoritatem Galeni 5. aph. 9. ubi cum Hippocrates mentionem fecit desipientiae ex sanguinis profluvio, Gal. in commento expresse docet dari desipientiam, quae deprauata est cerebri actio ex facultatis imbecillitate: itaque id ipsum in vitali facultate accidere potest, ut scilicet deficiente facultate tremulus fiat partium motus, ubi enim facultas non par est edendo motui sufficienti, non laus dilatatur Cor, nec constringitur spiritus, & consequenter nec fulgines recte expurgantur, nec restigio ponitur debito Cor; usu igitur aucto, facultas cogitur accelerare motum, qui, cum non eadem semper sit fuliginum copia, nec eodem modo refrigerandi necessitas, urgeat, varius euadit, iam enim maior conatu facultas dilatationem molitur, iam de constrictione magis est sollicita &c. ob virtutem languidam non potest quidem esse nisi paruus, sed praeterea inaequalis ob causas dictas. Vnde lectigationis, seu Trepidationis nomine à Medicis insigniuntur. Videatis Gal. primo de causis puls. 8. ibi enim scribit, ex imbecilli facultate pulsum provenire paruum quidem, qui tamen pro aucto usu variè se habeat in frequentia, & celeritate.

Tertia species.

Tertius Palpitationis modus Cordi contingens est motus factus à facultate irritata à causa noxia, similisque aut rigori, aut singulti. Dari hunc in Corde suadet ratio, & auctoritas, ratio; nam si Cor multo nobilius ventriculo, pulmonibus, & tamen pulmones, & ventriculus habent facultatem excretricem rei noxiae, quod ostendit vomitus, tussis; quare Cor pars nostri corporis praestantissima illa priuaretur: accedit, quod Cor necessitate vitae est nobilius ipso cerebro; at cerebrum praeter facultatem animalem habet facultatem peculiarem excrenandi noxia, ergo quoque Cor, id expressis etiam verbis docet Gal. 6. de dect. Hipp. & Plat. 1. Palpitationem inquiens esse motum à natura re contristante impulsam. Distinctionem ibi proponit Actionis Affectione, quae talis est: Actio est motus à natura procedens secundum leges naturae; Affectio verò est motus similiter factus à natura, sed praeter modum, & leges naturae; a Palpitatio est affectio, quemadmodum, & pulsus non naturalis, &c. ergo. Constat igitur

dari palpitationem à facultate irritata.

Quærat aliquis: Quænam illa sit facultas, quæ formatam huius motus auctorem statuimus? quis sit motus? quæ denique sint causæ, propter quas insurgit facultas?

Facultas non est alia, quàm Pulvisifica. Si quæragur ulterius: an facultas hæc animalis sit, an naturalis? Animalem non esse clarum est, neque enim per electionem agit, nec muscutorum indiget, vultur ve ministerio ad obeundam hæc actionem, non est naturalis illa, quæ operatur per gravitatem, & levitatem, vel ad motum elementi in missione prædominantis, non est illa communis, quæ tribuit singulis partibus attractionem, retentionem, concoctionem &c. Est gradus excellentior facultatis vegetalis existens in Corde longè præstantior triplicem ob causam, quarum prima instrumentum, quo agit, secunda instrumentum per quod agit: tertia finis, cuius gratia agit. Instrumentum quo agit est spiritus vitalis, siue calor innatus, cuius maior vis, & efficacia in ipso fonte: omnes quidem partes exercent suas operationes per spiritum, sed eum à Corde suscipiunt. In C

strumenta, per quæ agit, sunt Cordis fibræ fortissimæ, quas natura non frustra condidit: nulla pars corporis fibras validiores habet, ut docet Gale. 6. de usu part. 8. ipso Corde: propterea facultas, viēs his instrumentis, validissimum motum efficere potest. Tertia causa est finis. Si natura per hunc motum debet conservare calorem innatum totius corporis, si vitam tutari, si spiritum omnium functionum instrumentum reficere, omnino necessarium erat propriam huic facultatem destinare. Motus huius præter naturam in corde facti triplex potest esse modus: aliquando enim systole maior est, frequentior, & celerior: aliquando vero diastole: aliquando modò hæc modò illa, ita ut mixtus motus sit, & inæqualis. Ratio diversitatis ex varietate dependet causæ irritantis: quandoque enim irritatur hæc facultas per mediam facultatem expultricem; interdum per attractricem; nonnunquam per utramque simul: si per expultricem, motus systoles est maior, frequentior, celerior: si per attractricem, diastole magnitudine, frequentia, & celeritate systolem superat: si B per utramque, motus est varius, in quo modò systole, modò diastole maior, velicior, crebrior. Irritatur facultas expultrix quia sensum appulsum, & impetum rei noxiæ; et propterea omnes in hoc conveniunt, antequam expultrix impellatur, sensum tactus in Corde ex illentem pati ab obiecto tangibili, unde sunt, qui velint motum hunc Palpitationis animalelem esse ex parte, quod absque sensu non contingat.

Causa noxia, aut per essentiam est, aut per consensum: per essentiam, aut in ventriculis, aut in solida Cordis substantia; in ventriculis, vapor siue fuligo elevata ex materia putrida, vel non putrida, acris, mordaci, purulenta, venenata vel non venenata: in substantia, ut sunt abscessus, ulcera

Cor va-erisipelata, calculi, tumoris duri, unde alias diximus, prius eos convinci, qui Cor varijs morbis his tenentis negat: de abscessibus testimonium habetis tam. gravissimi viri Nicol. Maffæ in sua anat. de Corde,

A Holler. in scholio c. 29 de internis, de vlcerebus varia exstant testimonia. Ioan. Fernel. 5. path. 12. Tyngauct. lib. 6. c. 1. qui scribit, se vidisse in corde cuiusdam, qui hac affectione contabuerat, vlcus sordidum malignum. Io. Bauhinus in obleruat. Medicis, qui se vidisse ait membranam circumdantem vndeque erofam, quæ ad erysipelata, & inflammationes, Galenus non negat fieri hæc posse in Corde: negavit tamen diu durare posse, cum statim ad interitum deducant: sed si Cor subiectum est suppurationibus, putredini, abscessibus, ut experientia sapius comprobavit; necesse est præcessisse inflammationem, cui omnia illa succedere solent: non alegandi etiam à Corde tumores duri; horum mentionem facit Joubert, in suis annot. ad Guidon. de vlcerebus.

Causæ per consensum sunt aut in Pericardio, aut pulmonibus, aut cerebro, aut ventriculo, intestinis, iecore mesenterio, toto corpore. Quod ad Pericardium, scripsit Holler. non modò materiam, & aquam putridam, sordidamque ibi inventam esse, sed aliquando vermes, quæ omnia Palpitationem efficere possunt: hæc primo confirmatur testimonio Mesues in cap. de affect. cord. in fine scribentis, interdum Syncopen fieri, non tantum ex vermibus os ventriculi vellicantibus, sed etiam ad ipsum Cor accedentibus, deinde Alex. Padermontani in lib. 1. secret. ubi proponit remedia contra vermes Cordis in morbo, quem Lunaticum ipse vocat; præterea Ioan. Schenck. in suis obleruat. ad Io. Schenck. missi, qui scribit, inuentum esse vermem in Pericardio cuiusdam Circumforanei subita morte extincti. Consensum Cor, ut Palpitationem, & Tremorem patitur, cum arterijs, pulmonibus &c. quæ transmittunt, aut materiam, aut vaporem, aut putridum, aut non putridum, venenatum, aut non venenatum,

Alia causa, qua mediante facultas Cordis ad hunc motum efficiendum incitatur, est attractrix impulsiva: irritatur autem, & ipsa varias ob causas. primo propter redundantiæ caloris nimium dilatantis ventriculos, quibus dilatatis, insurgit attractrix, ut arceatur vacuus; secundo ob defectum vel aeris, vel sanguis in Corde.

Quæritur hic: an Cor defectum hunc percipiat beneficio tactus, ut ad expultricis irritationem necessarium esse ynanimi consensu Medicina statuit?

Respondetur, hoc fieri non posse. Sensorium enim non monetur à causis privativis, sed positivis. Obijcies: Orificium ventriculi famem percipere, qui sensus est indigenæ; ergo quoque Cor per tactus sensum percipere hunc defectum poterit.

Respondendum illam facultatem peculiariter tributam esse illi parti à natura, & nulli alix præterea. Alia igitur ratio Cordis quod absque etiam sensu tactus attrahere potest, quod utile Gale. 6. de usu part. 15. tres proponit modos, quibus Cor ad aliquid impellitur; primus est similis illi qui in foliis fit dum dilatantur; secundus est per calorem ut enim calor in glychnio oleum, ita Cordis calor maximus, deficiente sanguine, alteri aliunde

alutē e trahitertius fit propter substantiæ familiaritatem, & humiditatem: sicut magnes terrum, ita omnes partes alimentum sibi familiare proleant, ergo etiam sine sentu impelli potest attractrix. Diximus, irritari attractricem, aut à nimio calore, ventriculos dilatante, aut à defectu aeris, vel sanguinis; deficit aer multas ob causas, aut quia nervi musculi imbecilles non attollere possunt thoracem, unde non satis aeris allici potest; aut quia via, per quas ingreditur, obsepæ sunt humoribus, crassis, calculis, tumoribus; similiter etiam varias ob causas sanguis deficit, de quibus alias, ubi de Syncope dicemus.

Dubitatio.

Sed duplex hic occurrit dubitatio: Diximus impulsa attractrice ob defectum aeris, & sanguinis, siue spiritus diastolen fieri magnam, &c. sed quomodo hoc fieri potest; ubi deficit sanguis, ibi facultas quoque languescit dilatare igitur multum non poterit; deinde, ubi deficit spiritus, & calor, minuitur usus, & consequenter, ut non multa refrigeratione, ita exigua quoque distentione est opus.

Solutio.

Respondetur ad primum: non esse necesse, ut deficiente sanguine, statim etiam labefactetur facultas; quippe quæ primò, & per se in sanguine non consistit, sed in substantia Cordis seminali, & in humido primigenio; unde aliquandiu sanguine etiam deficiente vigere potest.

Ad secundam respondendum est cum Galen. lib. de vit. respir. cap. 5. non tantum propter frigidam qualitatem attrahit aerem, sed etiam propter substantiam aptam reficiendis spiritibus; ergo deficiente calore, & spiritu, maior est necessitas attrahendi aerem, non ut refrigeretur Cor, sed ut reficiantur, qui ex hausti sunt, spiritus.

Causas medias per se quisque indagare poterit, nec opus est earum enumerationem hic insinuare; quare deinceps ad signorum explicationem nos converteremus.

Causa mediatæ.

Iam locus postulat, ut expositis causis Palpitationis immediatis, de mediatis mentio fieret, sed quia tot sunt differentia, & causæ Palpitationis ut hæcenus audiistis, si eas proponere in immensum excreceret hæc tractatio. Satis itaque sit intelligere, medias causas ad ipsum potissimum Cor referendas esse: quanquam enim in universo corpore, aut diuersis partibus ingens fuerit vaporum, siue humorum apparatus, non sequitur tamen Palpitatio, nisi Cor ipsum habeat aliquam dispositionem ad illa suscipienda: inter disponentes causas primas tenet sensibilitas Cordis membranae Cor circumuestientis: unde merito Auicenna inter ceteras Palpitationis causas hunc sensum exquisitum reposuit, propterea ad medias referti poterunt omnia cordis siue naturalia, siue acquisita temperamenta, vitiosa, calida, frigida, humida, sicca.

Signa.

Itaque his breuiter expositis ad Signa transeo. Quæ à me in duas distribuuntur partes: in priore erit sermo de distinctis: in posteriore de prognosticis Diagnostica prætereo, quandoqui-

dem huiusmodi affectiones partim ex relatione agrotantiū imolestam quandam Pulsationem, vel locem, frequentem, & inaequalem se in sinistra parte sentire dicentium, partim admodum manu deprehendi poterunt.

Distinctiua igitur in primis inuestiganda, quæ in quatuor classes diuidi poterunt: quædam erunt signa præcipuarum differentiarum, seu specierum; alia causarum; quædam locorum patientium; nonnullis denique demonstrantia morbos, & affectus Cordis.

B De primis, cum triplex constituta sit Palpitationis differentia, prima est motus solius causæ morbificæ, & noxam inferentis; secunda est motus facultatis simul, & morborum; tertia facultatis à causa noxia irritata: sic distinguere poteritis istas differentias.

Quando Palpitatio est motus solius causæ morbificæ, citò accedit, & recedit, estque Pulsatio vehemens, magna, crebra, tam in systole, quam in diastole.

Ubi est motus naturæ, & morbi, semper hic motus est parvus, frequens, aliquantulum celer, & magna ex parte continuus; aut, si non est continuus, leui tamen occasione ex motu tam corporis, quam animi, cibo, & potu; venere statim exarcebatur.

Habet, & motus, qui ab irritata sit facultate, sua interualla, est tamen longior, quam motus à sola causa; et propterea cognoscitur, si expultrix irritata fuerit ex systole maiore, celeriore, & frequentiore.

D Querat quispiam: qua ratione possit hæc systoles celeritas deprehendi? Respondeo, primo ex respiratione; nam respiratio similiter inspiratione est maior, celerior, frequentior; secundò ex pulsu, quia contractio est maior, vehementior, celerior: tertio; & quidem optimo ex motu Cordis, qui concitata expultrice multum excellit tam magnitudine, & vehementia, quam celeritate, & frequentia motum ob attractricis irritationem excitatum. Ratio est in promptu; in systole enim latitudo Cordis transit, in longitudinem, & propterea cuspis Cordis tangit, & ferit thoracem; unde faciliè admodum manu sentitur illa Pulsatio. contrarium fit in dilatactione: retrahitur enim cuspis à thorace; unde motus est insensibilis.

E Causæ Palpitationis cum plurimæ sint, necesse erit eas distinguere. Flatum, & vaporem patet faciliè accessus, & recessus: peculiariter verò dum flatus Palpitationem facit, vniuersum corpus refrigeratur, pallefcit, tinniunt aures, vertigine caput tentatur, & in alijs quoque partibus Palpitationes lese produnt in facie, cilijs, supercilijs, cute denigritota, inflatur venter, & soluitur affectio vi plurimum exultatione, aut crepitu. Vaporem similiter Palpitationis auctorem ostendit similiter aurium tinnitus, vertigo, suffusio quandoque oculorum, facies rubicunda, mox pallida, pulsatio venarum oris amaritudo, extremities biliosa.

F Quæ eadem signa humorem quoque biliosum detegunt, nisi quod vapor calidus breui spatio temporis, humor verò biliosus Palpitationem diu durantem efficiat: Est præterea grauissima, quæ

*Signa
status
& va-
por.*

*Humo-
ris Bilio-*

que à bile fit Palpitatio, & interdum adeo violenta, ut costis effingat. Vid. Fernel. propensio quoque ad iram, & Palpitatio occasioque ira excitata sunt signa, & indicia biliosæ materię.

Ex ebullitione sang. Si ex sanguinis ebullitione, & redundantia Palpitatio fiat, signa plenitudinem demonstrant, habetis apud Gal. lib. de plenit. qualia sunt distentio venarum totius corporis, rubor faciei, vita crapula dedita, cibaria sanguinem accumulata, suppressæ sanguinis evacuationes ex viro, hæmorrhoidibus, naribus. Dicebat Avic. Qui ex sanguinis redundantia in hanc passionem incidunt ab usu Veneris iuvantur, qui nocet, si materia pituitosa Palpitatio producat.

Melancholia. Si melancholia Palpitationem faciat, innoscescit ex colore plumbeo, nigricante, timore, mœrore: exacerbabitur à causis timorem & mœorem incutientibus, estque familiaris magna ex parte lienis imbecillitate, aut melancholia flatuosa, siue hypochondriaca laborantibus: cognoscitur quia etiam à pulsu duriore.

Aqua. Si ex aqua fit in Pericardio contenta, patientes referunt se sentire Cor in aqua quasi natat. Ego vidi Clarissimum Marcellum, qui cum hydropothoracis ex congesta ibi, & in Pericardio quoque magna aqua copia (id quod sectio ostendit) laboraret, sibi Cor quasi in aqua natat videri dicebat: accedunt pulsus molliores, spiratio frequens, non siccant ægri, oculi concavi sunt.

Vermibus. Si ex vermibus, difficultet hæc causa cognosci potest: Alexius tamen Pedemont. scribit consequi non modo Palpitationem, sed Tremorem totius corporis, Lipothymiam, & Synopen: totum corpus pallescit, & refrigeratur, sudor quoque erumpit circa thoracis & cervicis partes.

Mater. Purulenta. Putulentam materiam Palpitationem gignere colligimus ex pregressa inflammatione. Huius in Pericardio existentis signa sunt febris acuta cum dolore circa partes thoracis: hac enim cessante, si subsequatur Palpitatio, longoque perduret tempore, si patientis contabescat sine manifesta causa, suspicandum ad suppurationem peruenisse inflammationem, abscessum disruptum, putisq; ibi factam collectionem.

Locus patientes sic distinguemus: multum enim refert, an hæc sit essentialis Cordi, an per consensum, & si essentialis, an in solida substantia, an vero in ventriculis, seu cauitatibus sinuum.

Palpis. essenti. Si essentialis est Palpitatio, erit perpetua, siue continua, respiratio, & pulsus summe vitabuntur, imò si primario Cor laboret, accedet Lipothymia, & Synope admodum frequens: id videtur innuere voluisse, licet recte & occulte Hipp. 2. aph. 41. Siue igitur insignis sit intemperies, siue morbus in mala compositione, siue unitate soluta, necesse est affectu esse continuum, & Synopen causari.

Per consensum. Si per consensum Cor afficitur à Pericardio, idque nil aliud patitur, quam extensionem, breui accedit & recedit, affectio est omnium leuissima, pulsus, & respiratio non immutantur.

Ab ore Ventriculi. Quod si primarius affectus sit in Ore Ventriculi, adest Cardialgia, Nausea, Vomitus, Singultus, Ructus, inappetentia, Bulimos: hæc enim si sint insignis, Cor in consensum trahunt.

Ab Vt. Si ex Vtero ortum ducat Palpitatio, suppressio plerumq; manifesta est mēstruæ colluiciei, aut materię seminalis aut vtriusq; simul: ad sunt præterea indicia passionis hysterice, dolor, & inflatio, rugitus, excretio materię alba, alterius ve coloris, & sæpe incurrunt patientes symptomata animalis facultatis, Epilepsiam, Carum, Convulsionem.

Liene. Si ex Liene, intellexistis partem hanc facile, & frequenter communicare Cordi suam affectionem, quia hoc viscus est plenum multis arteriis, est Cordi vicinum, & è directo positum: signa in conspectum sed dabunt Lienis male affecti.

Cerebro. Si ex Cerebro, indicia non deerunt laborantis cerebri, vel Melancholia, vel Epilepsia.

Non referam hic signa causarum, ob quas agitrix irriteretur, id est, defectus aeris & sanguinis.

Notandum duntaxat, Palpitationem aliquando fieri ex solo nervorum vitio, nulla apparete ratione in cerebro, thorace, musculis, hoc observare mihi licuit in fratre meo, quem solo theriacæ usu principio spinalis medullæ adhibuit in integrum restitui.

D. Signa indicantia varios morbos, siue sint intemperies, siue mala compositio, siue unitas soluta, proponenda restant, nec verba sum facturus de signis Intemperaturarum, cum hac satis superq; explicata sint à Gal. art. medic. 1. 29. & seqq; ibi enim ostendit & recēset signa omnium, quibus Cor agitari solet ob intemperie quæcunq; tandem illa sit, pulsus sunt frequentes, celeres, non tamen necessario maiores; omnis n. insignis intemperies deijcit actum virtutis, ut dicitur, & robur facultatis, facultas autem prostrata magnam edere pulsum non potest; nec multum etiam inæquales sunt.

Cordis Tumor, et Abscessus. Si tumor, aut abscessus Cor occupat, semper inæqualem & inordinatum deprehendes pulsum cum respiratione difficili, si calidus tumor fuerit, necessario febris adest lethalissima, quia experientia didici, cum inflammatio totum invadit Cor, non potest transire naturalem diem. Licet enim eundem febrem præhensio acuta, statim liuere cepit supercilium sinistrum, & antequam 22. elapsæ essent horæ, totum corpus sphacelo tentatum fuit, ipseq; exspiravit. Ego gravem subesse aliquam Cordis affectionem suspicatus, curavi, ut dilaceretur cadaver, quo facto, Cor invenimus duplo maius, quam in anis esse solet, cum venis tumētib; & inflatis ad digitum crassitudinem.

Historia. Potest fieri, ut citra mortis discrimen aliquando infestetur cor inflammatione Pericardii & exigua; id quod vlcera & abscessus manifestum faciunt, totum autem Cor sustinere inflammationem diutius nulla ratione potest, alia ratio est in tumoribus frigidis, de quibus superius ex sententia Iouberii.

Ulcera Cordis. Vlcera Cordis innoscescunt ex Palpitatione sepius repente cum febricula hectica: omnia ad sunt signa phthisicos, pulsus parvi, languidi, macies & consumptio totius, nihil tamen exspuunt. Si ita deficiat pulsus, ut intermittat duas res, aut quatuor pulsationes, oportet insignem aliquam causam esse, quæ ne libere spiritus, & sanguis ad arterias transmittatur, prohibeat.

Scribit Vesal. 1. anat. 5. pulsū illius, cuius Corde

carnea illa moles inuenta fuit, ad noctem vsq; pulsationes intermisisse, nam dum tentat, expellere quod noxium est, longissimam efficit systolen, & tandem in his, in quibus impeditur transmissio sanguinis, gangrænas exspectes. Vesal. loc. cit. refert exemplum, de quo iam facta est mentio, in gangrænam sinistri cruris incidisse.

Prognostica.

Prognostica alia sunt salutis, alia mortis, non nulla temporis salutis, vel mortis, quædam de nique modi. Capiuntur autem à differentiis, causis, locis affectis, & morbis, ex quibus Palpitatio fieri solet. Propterea Palpitatio illa, quam dixi esse corpus naturæ, & morbi propter imbecillitatem facultatis tam absolutam, quam comparatiuam, hæc inquam differentia maxime lethalis est: nam aut continua est, aut leuissima de causa excitatur cum causam habeat Cordi essentialem, eamque grauissimam, intemperiem scilicet in ignem, vel morbum instrumentalem, siue communem: itaque nullus eorum, qui hac specie corripuntur, euadit. Sed omnes intereunt: de quibus tali vera sunt, quæ Gal. 5. loc. aff. 2. profert, Palpitatione laborantem quinquagesimum annum superare non posse, nec ceteræ Palpitationis differentiæ, quæ ex flatibus, vel vaporibus facultatem irritantibus, aut ventriculos eleuantibus fiunt, non necessario interficiunt ante quinquagesimum: ratio est, in illa facultas est vsque adeo languida, vel propter intemperiem in ignem, vel morbum in mala compositione, vel unitatis solutione, ut primo aduentante senio, in quo magis ac magis exsoluitur, ac marcescit calidum innatum, amplius resistere causis noxiis non possit.

Si per consensum Cor afficiatur, facultas adhuc valida existens potest pugnare aduersus causas maleficas etiam post 50. annum, & ita ægri 60. etiam necdum quinquagesimum attingere possunt, quare, ut dixi, semper respiciendum ad differentias, causas, loco & morbos.

De tempore pauca dicenda, dictum enim iam est, complures hac affectione tentatos succumbere post quinquagesimum ætatis annum.

Quod ad modum, omnes repente mori consueverunt, præcipue vero qui frequenter incurrunt hoc symptoma: de hoc extat oraculum Hippocratis. 3. aph. 41. Eos qui absque causa &c. Quæ verba non tantum de Syncope intelligenda, verum etiam de Palpitatione, ut Galen. in fine illius com. monet.

Curatio in accessione.

Curatio ab omnibus in duas præcipue scinditur partes, in quarum prima sermo instituitur de ijs auxiliis, quæ diriguntur aduersus ipsum symptoma tempore accessionis: in altera ipsam causam, & morbum extra accessionem respiciens curandi ratio proponitur.

In accessionis curatione quædam occurrunt, quæ prorsus reicienda censeo, licet à probatissimis Medicis excogitata, & commendata sint.

Primo vniuersaliter proponitur reuulsio facta per frictiones & ligaturas. Huiusmodi operatio nonnunquam est suspecta, quum scilicet Palpitatio ortum ducit ex spiritu calido, & vaporoso, ex san-

A guine bilioso in asterijs contento, & impetum in Cor faciente, ex frictione enim sanguis redditur tenuior & calidior, ex ligatura ardeant arteriæ, ut sanguis, & spiritus ad inferiores partes non transcant, hinc maiori impetu ferri solent ad Cor. Holl. in schol. ad c. 20. lib. 1. de intern. conueniunt igitur hæc potius in flatu, & humoribus frigidis, quam in fluxione calida.

B Secundo laudatur à plethoræ aspersio ex aqua frigida aq. ex posca, ros. circa frontem, & exlimas partes facta ad conseruandos vitales spiritus. sed alia ex parte sanguis, spiritus, vapor repulsi intro fluunt, & replendo Cor affectionem augent, ut propterea primæ operationes planè contrariæ sint huic posteriori: illæ enim retrahunt, hæc intro compellit, conueniuntque quidem in Syncope, nequaquam in Palpitationem.

C Tertiò eandem ob causam non placet, præcipue in causa calida, vltus odoramentorum, nec panis calidi, vel apomatum tempore accessionis: nam, omnia hæc calorem augent, spiritus incendunt. in spiritu flautoso frigido cum vilitate adhiberi possunt.

Quid igitur agendum in ipso commotionis tempore? Varia pro varietate causarum. Si Palpitatio ortum ducat ex sanguinis redundantia, in ipsa accessione venæ sectio institutenda.

Nec obiciat aliquis: Vires concidere ob Palpitationem, deficientibus autem viribus venam secandam non esse. eteum ubi vires languent propter sanguinis copiam, & suffocationem, tantum abest ut venæ sectio eas prosternat, ut potius subleuet. Sic Hipp. 4. acut. 23. in Apoplexia à plenitudine exorta sanguinem mittit, habita scilicet ratione causæ ipsam inferentis.

D De loco venæ aperiendæ dubitatio est, quæ sic dirimi potest. Si sanguinis plenitudo aliquod inflammationis periculum minetur, statim incidenda est vel communis, vel jecoraria. id docet Gal. 13. meth. 6. ex exemplo jecoris, huiusmodi, inquit, sanguinis missionem quamprimum reuellere & deriuare à parte. Si inflammationis notæ non ad sint, in hoc casu reuulsionis gratia secandæ sunt venæ oppositæ, vel Inferiores, vel dextræ: Inferiore quidem, si menses, aut hæmorrhoides sint retentæ: Dextræ in plenitudine totius absque suppressione dictarum euacuationum. ubi autem post sectas venas vel inferiores, vel oppositas malum persequatur, repetere licet venæ sectionem in sinistro cubi.

10.

E Si vires accessionis tempore vsque adeo instantes sint, ut venæ sectionem non perferant, ad hirudines, & cucurbitulas sacrificatas transeundum. Rhases 7. continent. cucurbitulas dorso apponere iubet. Auic. 4. 1. c. proprio de ventosis improbat cucurbitulas dorso affixas, hoc potissimum nomine, quod accersant Palpitationem attrahendo sanguinem ad thoracem. Contradictio hæc satis conspicua sic tollitur: Cucurbitulæ in plenitudine totius corporis dorso admotæ cum multa flamma, & profunda sacificatione, si præsertim amplæ sint Tremulam hanc Cordis affectionem excitare solent ideo inferioribus locis hoc casu affigendæ: sed euacuato toto, & per medicamenta, & sanguinis missio-

Loca.

Cucurbitulæ.

Renj. & Auic. c. ciliatur.

missionem, cucurbitulæ paræ, leuiter scarificatæ. A
eum flamma pauca dorso applicatæ iuuant. Attra
hunt enim vaporem, flatum, sanguinem à centro
ad circumferentiam.

Præter hæc, Cordialia tam externa, quàm in-
terna, administranda parim calida, parum frigi-
da pro varietate materiæ peccantis, sed de his cum
causam simul respiciant, fusius infra dicemus.

Curatio, & Præseruatio extra Accessionem.

Distribuiam alteram curationis par. è in capi-
ta tria: Quæ in primo de causâ calida, si-
ue ea sit intemperies simplex, vel cû materia, aut
vaporosa, aut biliosa, aut sanguinea, cum, vel abs-
q; inflammatione, & erysipelate, siue adsit febris
siue non; in secundo de causis frigidis, in tertio
de Palpitatione ex vermibus. De Palpitatione
per consensum nimis longum foret hic agere: Ex-
plicabuntur deinceps affectus omnium partium
infra D.aphragma, Cordi consentientium.

Quod ad causâ calidâ, hæc superatur primum
conuenienti victu, cuius maxima hac in parte est
necessitas; atq; ideo Arabes omnes, à quibus potif-
simû Palpitationis auxilia petenda, sunt admodû
diligentes in aere, cibo, potu, motu, &c. Nâ qd ad
aerē, oî modo tenuis, & frigidus eligendus, & ppea
consulû Medici, vt aut cœlû mutetur ab ægris, aut
si id fieri nequeat, saltem aliteretur aer cœclaus, in
quò degût illi, decoct. rosar. santal. vitis, salic. flor.
nymph. item aq. & acetio. A motu vel omnino ar-
cēdi sunt, vel leuiter & placidus imperandus. Cibi re-
frigerandi vim habeant: propterea pisces cōcedun-
tur, prifana, alyca, oriza. Inqat enim aliqua ratio-
ne spiritus densare, & sanguinē crassiorē redde-
re, idcirco adstrictoria frigida & sicca, succus gra-
nat. erāt limon. itē acetosæ, nymphæ, rhibes, &c.
nō improbat. Potus debet esse aqua, aut simplex
aut mista est vino granatorû acido. Nō prætermi-
tēda Cordialia aut frigida, aut tēperata, vt rosæ,
nymphæ, cātala oîa, cornucetui, margaritæ ppar.
hyacinthus, à proprietate, imò omnes gēz. Hæc
libariis permiscenda, vt robur Cordis seruetur.

Transio ad medicamenta in causâ calida:

Si Billis abundat, primo certum est, leniendam
esse aluum aut hoc medicamento

Recipe Flor. cass. recent. ext. vnc. i.

pulp. Thamarin. vnc. sem.

Marg. prap. sant. rub. an. drach. sem.

M. cum sacc. f. bol.

Aut si portionem maluerint fiat hoc modo:

Recipe sol. nymph. p. sem.

santal. rub. drach. i.

Decoquantur aut in sero capr. aut aq. viol. & fiat
expressio

Recipe Syrup. ros. sol. vnc. v.

Decoct. di. le. q. s. M. f. pot.

De sanguinis missione dubitatur, ytrum in
biliosa materia conueniat, sed facile huic dubi-
tationi satisfacere possumus: In exquisita caco-
chymia omnino prætermittenda venæ sectio, sed
ratō, imò nunquam hanc inuenietis & inter centū
vix vnum, sed adest potius spuria: quanguam igitur
ex bile fiat Palpitatio, dummodo plenitudo ad-
sit spuria licet sanguinem mittere. Sed ex qua ve-
na? Tempore Præseruationis fauus est semper

ex loco opposito, quàm patiente. Gal. lib. curandi
per sanguinis missio. c. 19. vbi loquitur de sanguinis
missione pro præseruatione.

Si palpitatio originē sumpserit ex Liene, secari
poterit vena iecoraria, siue communis sinistri la-
teris: nam ita habetur ratio partis mittentis &
suscipientis. Si ex Iecore, dextri lateris venam se-
cabitur. De cucurbitulis & hirudinibus ibidem e-
st iudicium, quod proposuimus de curatione Ac-
cessionis tempore.

Si Palpitatio sanguinea sit largior conuenit sâ-
guinis missio, nunquam tamen ad animi deliquiū
facienda, etiam si maxima adsit plenitudo quoad
vasa, propter præsentiam symptomatis, quod vel
deicit, vel deicere pot. vires. Gal. 1. ad Glauc. 14.

Pro biliosa materia præparanda hic Syrup. egre-
giè conuenit.

Recipe Syrup. de succ. limo.

de rib. de gran. an. vnc. sem.

Aq. en. diu. viol.

flor. nymph. an. vnc. i.

M. pro Syrup.

Quod si materia sit sanguinea, videntur fere
omnes Medicinæ scriptores in hoc conuenire, vt
Syrupi attenuantes exhibeantur, motu Galen. testi-
monio 5. ve loc. aff. 2. qui Palpitationem tractat &
sanguinis missione & extenuantibus medicamē-
tis. Exigunt autem materiam extenuantium me-
dicamentorum ex lib. de palp. c. 5. vbi Gal. om-
nia ptoponit calida medicamenta, attenuante fa-
cultate prædita, qualia sunt puleg. calamenth. hy-
sop. origanum.

Hæc operatio apud me suspecta est, imò peti-
culosa: quandoquidem, vt intellexistis in superio-
ribus generatur flatus ex causa calida, quando vel
cacochymia, vel plenitudo ad sit. Locus est apud
Gal. 4. acut. 90. Itaq; si calida præbeantur, atten-
uantia in sanguinis copia, flatus & vapor eleuabū-
tur, & Palpitationē augebūt eligenda igitur sunt
attenuantia, sed refrigerantia, vt prifana, o xymel,
quorum meminit Gal. 1. meth. 14. aut Syracet.
simpl. acetosæ, cur. de succo limon. cū decoctis po-
lytrichi adianti, pentaphyl. cichor. & sonchio; &
potestis ascendere vsq; ad betonicam. Gal. aut sen-
tentiam 5. de loc. aff. prolacram de medicamentis, explicat,
ac victu attenuante intelligendam puto, non de
attenuantibus medicamentis, sed de verè extenu-
antibus. Talia aut sunt, quæ sanguinem minuūt
vel per se vel per accidens, per se minuunt venæ
sectio, & omnis sanguinis euacuatio, omnis pur-
gatio vel per vomitum, vel per aluum, vel per su-
dorem, vel per vrinas; per accidens verò victus
tenuis, labor, frictio, balneum. Locus est apud
Gal. 2. aph. 28. vbi sub nomine attenuantium
medicamentorum, hæc omnia intelliguntur, &
profecto in sanguinis abundantia extenuare con-
uenit, id est sanguinem mittere & imminuere.

Post præparantia conuenit purgatio, si vires
sunt aut languidæ, aut non validæ, accipio Auic.
consilium, vt paulatim corpus purgetur; præbet
ipse singulis diebus per 8. dies, drach. sem. rhabarb.
optima est purgandi ratio, Si vires consent, con-
uenient isti boli.

Recipe fl. cass. drach. vi.

*Cucurbit
Hirudin*

*Galenus
explicat*

*Serg.
misno.*

Lacus.

Elect. ros. Mes. drach. iiii.

M. & cum sacc. f. bi. li.

Præbeantur hor. s. ante cib.

Cōuenit maxime illud Electuatum, quia præceptum generale in Cordis Palpitatione, & necessarium, ut semper Cordialia admiscerantur. At vero elect. ros. Mel. recipit trochiscos de gallia moscata, itaq; si huius electuati copia non adsit, accipitis elect. de succ. ros. admiscendo gum. s. moschi, & tantundem ambrosiæ, aut specierum cordis temperat. drach. sem.

Quod si quis obijciat, hæc purgantia esse suspecta, quod omnia sunt Cordi insensibilia, ita ut potestis huic obiectum satisfacere dicentes, medicamentum esse Cordialibus correctum, deinde vero illud vos moneam, in Palpitatione per essentiam facta abstinendum à purgationibus validis & propterea dixi, potius paulatim euacuandum esse corpus rhubarbaro exhibitio: ubi autem vires constant, nec essentia, sit affectio, Cor optime sustinet utrum horum purgantium, nam purgatio materia, quæ Cordi erat noxia, proprium Cordis robur peruenit.

An Vomitoria conueniant.

Secundum est: utrum hæc materia per Vomitum possit educi. Palpitatione: pro parte negativa est argumentum fortissimum, non esse educendam, ita enim bilis, tam per os ventriculi sensibile, cum ex hac nimia sensibilitate & morfu possit fieri & Palpitatio, & Syncopæ: ex altera tamen parte communis est omnium scriptorum sententia, humores ori ventriculi inhaerentes per eundem locum esse euacuandos. Galen. s. de loc. aff. c. 7. lib. quos & quando purga. port. Resolutio est: Ore ventriculi tam actu humorem biliosum continentem, necessaria est vomitio: idcirco aut oleo amygdal. dulce; aque misto, aut sero caprino misto cum oleo quamprimum educendus hic humor, infuso latere, & inferiora petat, potius per inferiora purgandus est: facta purgatione Cordialia suadent ad ministranda intrinsecus & extrinsecus.

Quod ad interiora Cordialia, non possum probare Cordialia, quæ tanquam frigida proponuntur ex descriptione Mesues, Auic. Serapion sub nomine Læuicantis, diamoschi dulcis, electuatum de gemmis. Ratio est, quia in omnia Doronicum ingreditur, quod speciem esse Aconiti Corrusius ostendit, deinde proprio experimento confirmavit Matthiæolus in cap. de Aconito, Proferuntur omnes esse medicamentum calidum & sicum in tertio gradu, itaque & tanquam calidum, & tanquam venenatum medicamentis Cordialibus non admiscendum. Placent trochisci de camphora non Mesues, quia illi recipiunt cardamomum, spicam, lignum aloes, & crocum, medicamenta valde calida, sed Rhafis potius, qui reuera sunt frigidi, & dentur ex illius sententia drach. cum succo Macinorum, siue pomorum S. Petri. Si tamen temperies Cordis non sit vique adeo calida, dosis trochiscorum est minuenda, & satis est præbere drach. sem. & si succus Macinorum non adsit, possint præberi hi trochisci cum aq. viol. aut nymph. 4. ho. ante cib. 12. aut 15. dictum spatio. Præter trochiscos de camphora, vos ipsi poteritis ex tempore parare aut pulueres, aut rotulas, aut conseruas valde utiles.

Doronicum cum Aconiti specie.

Poma S. Petri. a. poma pinguia.

A Pulvis poterit hunc in modum præscribi:

Recipe Santal. rub.

Offis de corde cerui.

Corn. ceruin.

Marg. præpar. an. drach. i.

Sem. acetos. portul. endiu. an. drach. sem.

Camph. scrup. sem.

Sacc. ar. ad pondus omnium.

M. Dosis diach. i.

B Si volueritis Rotulas pro singulis tribus drachmis pulueris abiq; saccharo, poteritis accipere vnc. iii. vel quatuor sacchari opt. dissoluti in aq. borrag. aut buglossæ, & formare confectionem in rotulis. Si Conseruas.

Recipe conser. ex. acetos. citr.

ex succ. acetos. an. vnc. i.

prædi. pulu. drach. i.

Diuidatur in duas partes.

C Extrinsecus autem conuenit hoc Epithema.

Be. aq. viol. ros. flo. nymph. borrag. an. vnc. iiii.

succ. limon. aceti an. vnc. ii.

specier. proposit. drach. ii.

camph. gr. iiii.

Addas Croci gran. iiii. ad penetrationem.

Adhibebuntur Epithemata Cordi super calefacto actu frigida per linteam, aut pannum sericum & repetatur pluries: Deinde ipsi Cordi adhibeatur aut vnguentum rosat. cum succo citri, aut limonum factum, aut Linimentum ex succo endiu. lactu. portulæ, addito succo limon. & acetos. Auicenna in caliditate vsque adeo vehemens, ut euitet inflammationem futuram in corde, ascendit ad Opiata, & sane maxima ratione, nihil enim potest esse periculosius inflammatione cordis, ut etiam si quis obijciat. Opiata esse inimica Cordi, cum tantus sit calor, ut inflammatio imminet, poterit etiam opiatum resistere.

Intrinsecus igitur poteritis præbere hoc medicamentum:

Recipe conser. u. viol. flor. nymph. an. vnc. i.

Sem. hyoscyami drach. i.

Marg. præp. drach. sem.

M. & diuidatur in duas partes.

E Si augere volueritis facultatem huius medicinali, post bolum præbeat vnc. iiii. emuls. papau. alb. aut vnc. vi. huius decocti.

Recipe pomorum mandrag. n. i.

hyoscy. M. i.

Capit. papau. alb. n. viii.

Lactu. flor. nymph. viol. an. M. sem.

F Bull. in lib. ij. aq. ad consumpt. tertie partis, facta colat exhibeantur vnc. vi. post conseruam propositam.

Extrinsecus autem poteritis adhibere aut idem decoctum, aut succum ipsius hyoscy. & lactu. commistum tam cum succo acetos. ac limon. & modica croci portione.

Dum transco ad causam Palpitationis frigidam, non possum communem omnium sententiam recipere circa missionem sanguinis, ut scilicet humore etiam frigido & pituitoso existente vena aperiat: quanquam enim Gale. s. loc. aff. 2. illos omnes à sanguinis missione adiutos esse scribat, qui Palpitationi subiiciuntur, certum est, ibi sermonem fieri de Palpitatione ex calida causa, ut propterea

Opiata.

pterea dicat Gal. Illos omnes interire propter acutum aliquem morbum. Et sanè nulla est ratio, quamobrem in Palpitatione ex flatu crasso, genito ex multa pituita cum intemperie frigida & Cordis, & aliarum partium principalium, sanguis mittatur. Si dicant reuulsionis gratia, alii sanè reuulsionis modi absque villo periculo administrandi. Itaq; in exquisita cacochymia prorsus à venæ sectione abstinendum. Pro reuulsionem satis erunt cucurbitulæ nō scarificatæ, cauteria, & vesicatoria, & quando Palpitatio sit recens & frequens, accipiat potius vesicatoria, quàm cauteria: vbi Palpitatio sit antiqua, & per rara quædam intervalla inuadat, conuenientiora sunt cauteria, insiguntur autem semper partibus infernis, vel infra, vel supra genu, hoc pitum curo.

Sed vbi exquisita non adsit cacochymia, sed plenitudini iuncta, præcipue in flatu genito ex humore melancholico; in hoc casu conuenit venæ sectio; nam vt pluries docui, humor melancholicus, quamquam frigidus & siccus, producitur ramē ex intemperie calida iecoris Gal. 3 de caus. symp. 2. 1. de critib. 1. 2. melancholiam gigni dicebat ex calore sufficienter immodico. Itaq; in hoc casu secunda est vena, aut dextri lateris tantum, si ex feruido iecore augeatur hic humor, aut dextri, & sinistri, quando & iecur augeat succum melancholicum, & lien propter suam caliditatem eundem in vapores digerat, qui deinde in Cor impetum faciunt. In hoc etiam casu conuenit apertio hæmorrhoidum, siue sint innatæ, siue non, quamuis enim innatæ non sint, dummodo natura augeat excrementum melancholicum, vtile est venas sedales aperire. Hoc est Gal. consilium 4. aph. 15. Conueniunt quoq; Cauteria & Symplicia, vt dixi de succopituitoso.

Quod pertinet ad Pharmaciam, distinguendi sunt humores frigidi in pituitosos, crassos, & aqueos, siue tenues, in melancholicos, ac consequenter flatulentos. Si crassi sint, pro leniente medicamento dabitur.

Recipe Mell. ros. solut. vnc. i.

Decoct. cord. q. s.

M. f. potio.

Si bolum voluerint,

Recipe Elect. lenit. drach. x.

Spec. hier. simp. drach. ii.

M. & cum saccharo f. boli.

Preparatio sic fiet.

Recipe oxym. simp.

Syr. bizant. cum acet.

de cortic. cit. an. vnc. sem.

Decoct. sem. & cort. citr. menth.

Spic. meliss. beton. vnc. iii. M. pro syr.

Pro purgatione consulunt omnes Arabes confugiendum ad magnas Hieras vel Ruffi, vel Archigenis. Hiera ista sunt quidem aromaticis medicamentis referta ideo cordiales; recipiunt tamen validissima medicamenta colocynth. turbit. agaricū; idcirco si recens fuerit affectio, non imprudatur vsus magnæ hieræ. Sed si fuerit antiqua, opus est continuo medicamento succum pituitosum paulatim expurgante: aliis mihi magnæ istæ hieræ non probantur. Itaque si detur lo-

cus hieris magnis, (erit autem locus, vbi vires sint valide.) sic poterunt præscribi.

Recipe Hier. magn. Diacolocynth. ex descriptione Ruffi drach. ii.

Spec. hier. simp. drach. i.

M. cum succo f. boli, qui dentur quinque hor. ante cibum.

Si bolos auersentur, hæc Potio erit accommodata,

Recipe sem. oxym. Caryoph. drach. i.

Meliss. Cort. cit. an. P. i.

sem. cit. drach. ii.

f. decoct. f. a. f. & express.

Recipe myrob. chebul. drach. i. sem.

Infund. in præd. decoct. & f. expressione;

Recipe mel. ros. sol. vnc. iij.

Diaphenic. drach. i. sem.

præd. decoct. q. s.

M. & f. pot.

Quod si propter virium imbecillitatem non liceat simul & multum purgare, consulo, vt in frequenti vsu habeatis aut pilulas, aut bolos, aut rotulas, quibus vtantur patientes bis in hebdomate; intermediis verò diebus accipiant medicamentum cordiale flatum discuties, cuius descriptionem infra proponam. Pilulæ sint aut de hiera simplici, aut de hier. cum agar. aut alephang. Dosis erit drach. i. gor. 1. ante cenam: Si quis voluerit Rotulas, sint tales.

Recipe Turbit. elect. drach. ij.

Agar. trochisc. drach. i.

Sipp. Zingib. an. sem. p. i.

Cinam. Caryoph. an. drach. sem.

Ambr. Mosc. an. gran. iij.

Saccar. dissolu. in aq. melisse. q. s.

M. f. confect. pro rotulis, quarum dosis erunt drach. ii.

Medicamentum autem Cordiale, quod intermediis diebus est vsurpandum, est multiplex. Habetis apud seplasiarios Magnas Confectiones, quas dicebam Doronicum recipere mihi, & aliis suspectum Electuarium laxificans, de gemmis, Diambatam, Diamoscum.

Si quispiam Doronicum vereatur, sicut & ego, his omissis poterit sibi aut facile, aut tempore dato magna confectiones parare. Ex tempore poterit.

Recipe Conseru. Buglos. Meliss. an. vnc. i.

Cinam. Nuc. mosc. an. drach. sem.

Crocigrab. iij.

Ambr. Mosc. an. gran. i.

M. Erit dosis pro 4. vicibus.

Si tempus præparandi medicamentum adsit, poteritis præpare vinum aliquod medicamentum quale est illud.

Recipe vini opt. lib. iii.

Sem. oxym. Caryoph. vnc. sem.

Cortic. citri P. sem.

Spic. Meliss. an. M. sem.

Caryophyl. Nucis mosc.

Cardamom. Cubeb. an. drach. i.

Infundantur hæc in prædicto vino, quod dein de poterit aut destillari, & post destillationem aromatizari gran. 1. mosch. & ambr. vel sine destillatione vsurpari poterit singulo mane quatuor

hor. ant. cibum vnc. l. vel alteram: si destillatum A fuerit vnc. sem.

Eodem modo parari poterit pulvis Cordialis ex praedictis medicamentis, cuius usus erit in ferculis, & sanè hic pulvis egregiam ferit opem.

Quod si materia sit aquea, & ea quidem in thorace contenta, ut in hydropo pulmonis, casus est deploratus: poteritis tamè tentare ea omnia, quæ aquam putantur educere in hydropi. It. de quibus dicam suo loco: neque præterminanda sunt expectorantia, & pulmones siccatia, de quibus dictum est in curatione affectuum pulmonis.

Extrinfecus adhibenda fomenta ex spongijs, decocto aliquo calosifico, & digerente imbunt. Sit autem decoctum ex cymino, anisa, sceniculo, coriandro, seseli, ocyro, corticibus citri, melissa, pullegio, hyssopo, calamitho, & origano, regioni Cordis frequenter adhibendum.

Quod si humor melancholicus sit Palpitationis causa, sic leniatur alvus.

Recipe syr. de polypod. vnc. iij.

mel. ros. fol. vnc. ij.

Decoct. cord. q. s.

M. f. pocus.

Sic præpatentur humores.

Recipe syr. de pom. simp.

de sum. ter. simp.

de cortic. citr. an. vnc. sem.

De coct. sum. meliss.

borag. buglos.

cort. & sem. citr. vnc. iij.

M. pro syr.

Pro purgatione inuenerunt Arabes medicamentum, quod Cordialissimum existimant, & sanè illorum auctoritate & exemplo Recentiores illo etiam saepe utuntur, est autem Confectio Al Kermes vocata, quia sericum recipit succo illo purpureo tinctum, quod Kermes vulgò dicunt, hanc Confectionem Manardus duplè ob causam vituperavit in annotationibus, quas habet in

Confe-
ctio Al-
Kermes
à Manar
do impro-
bata.

Io. Mel. sed neutra militat: Prima est, hunc colorem spiritus potius dissolvere, quam roborare posse, eo quod simile attrahat simile & propterea color ille purpureus ad se sanguinem & spiritum trahit. ridicula sane ratio, neque enim medicamentum commissum iam ceteris purpureum habet colorem: & dato quod habeat intrinsecus acceptum, neque videtur, ut possit propter colorem mouere. Neque, secunda militat, cum inquit, Lapidem Lazuli, qui intrat hanc confectionem, esse in minima quantitate, ut nihil possit præstare, Putat ipse, deceptus quibusdam codicibus, recipere hoc medicamentum tantum Lapidis Lazuli drach. ij. cum tamen vera Ioan. Mesue descriptio, quam ego habeo in textu antiquo, & illam vidit quoque Castellanus, contineat drach. xij. & propterea habet vim deiectionis insignem, si accipiat, quod vult Mesues ad Aureum j. quod est pondus drach. i.

Rationes
eius sol-
puntur.

commissum iam ceteris purpureum habet colorem: & dato quod habeat intrinsecus acceptum, neque videtur, ut possit propter colorem mouere. Neque, secunda militat, cum inquit, Lapidem Lazuli, qui intrat hanc confectionem, esse in minima quantitate, ut nihil possit præstare, Putat ipse, deceptus quibusdam codicibus, recipere hoc medicamentum tantum Lapidis Lazuli drach. ij. cum tamen vera Ioan. Mesue descriptio, quam ego habeo in textu antiquo, & illam vidit quoque Castellanus, contineat drach. xij. & propterea habet vim deiectionis insignem, si accipiat, quod vult Mesues ad Aureum j. quod est pondus drach. i.

Cautio
circa eius
usum.

Sed ut dicam, quod sentio de hoc medicamento, puto hoc eo modo, quo nunc est in usu, valde suspectum esse. Plurimos observavi, qui hanc Confectionem accipiunt quotidie ad scrup. j. vel drach. sem. Error est maximus, nam lapis Lazuli est

medicamentum venenatum, calidum & siccum in 4. ut propterea, si non deliciarur, manens in corpore, adulatum sanguinem ipsum desecat, tandem comburit, atque vlcera inducit propterea scribit Dodonæus, obl. 54. sequendam vidisse Palpitationem laborantem ex flatui, qui ex frequenti usu huius Confectionis extinctus est, cum expuitione sanguinis reorridi, Itaque caueatis ab usu frequenti huius medicamenti. Si quis tamen vii vel x. diebus ad drach. i. quod si tutius agere volueritis, præcipue viribus non existentibus validis, illud agite, quod ego consuevi in his casibus. Pargo paulatim patientes, aut per ius galli antiqui aut per meum electuarium magistrale. Ius galli antiqui sic paratur.

Historia

Ius galli
antiqui

Recipe Polypod. quercin. vnc. iij.

Fenic. vnc. ij.

fol. sen. vnc. iij.

Myrob. ind. Chebul. an. vnc. sem.

Sem. cit. vnc. i.

Cort. citr.

Spic. Meliss. an. M. f.

Cinamomi

Lign. aloes Nuc. Mosc.

Caryoph. an. drach. i.

Imponentur in ventre galli antiqui flagell. bulliant in suffic. quant. aq. vlque ad perfect. carnis coctionem, facta expressione ius seruetur ad pupheam usum, nam ubi subsidat, pars superior clara administrabitur in portu singulo die 4. horis ante cibum ad vnc. vi. vel vij. ex subsidentia fiunt Clysteres, qui maximum sanè habent usum tali modo.

Clysteres

Recipe prædict. decoct. lib. i.

Hier. diacol. drach. ij.

Mell. ros. ol. chamom. an. vnc. iij.

M. f. clyster

Electuarium erit tale.

Recipe stor Borrag. buglos an. P. j.

Cor. citr.

Mel. s. Osym. an. P. f.

Fol. sen.

Epith. Polypod. an. vnc. iij.

Myrob. chebul. ind. an. vnc. sem.

Cort. elleb. nigr. drach. vi.

Pasbular. enuel. lib. i.

Anis. Fenic. an. an. vnc. ij.

f-decoct. in f. q. aq. & f. express.

Recipe Prun. Damasc. lib. ii.

Bulliant in prædict. decoct. & extractis nucleis pulpa per seraceum transmissa iterum lento igne bulliat in prædict. decoct. vlque ad moderatam consistentiam, cui adde

Cinam. Caryoph.

Nunc. mosc. an. drach. ij.

Saccari fin. q. s.

M. f. Electuarium, cuius dosis est vnc. i. eel drach. vj. paulò ante cibum.

Purgantibus medicamentis, quæ succum melancholicum edueunt, Corroborantia succedent, quæ & intrinsecus & extrinsecus administrabuntur.

Corrobo-
rantia.

Circa Interiora illud monito, quod est magni momenti, scilicet, frequentem usum Theriacæ & Mithri-

etanditque confectionis suspectum esse, non tam ob nimiam suam siccitatem, cuius vis in melancholico humore, qui sicus est, effugienda, quam propter rationem, quam dat Galenus s. simplicium 18, ubi ait, hæc medicamenta Alexiteria nuncupata mediam quandam naturam, inter corpus & causam deleteriam obducere, ut propterea, si magna quantitate exhibeantur, possint facultatem corporis superare.

Addo ego hæc medicamenta, quæ propriè aduersus venena disinguntur, ubi in corpore venenata non inueniunt substantiam, agunt in ipsum corpus, innatum calorem digerunt, humidum substantiale colligunt, & consumunt, ut in 18. Itaque sunt potius in usu, frequenter Trochisci de gallia moscata, atque alia medicamenta calida, & odorata de quibus dixi supra.

Extrinsècis conveniunt in hoc casu epithemata, in hunc modum præparata.

Epithemata.

Recipe Aqu. Melissæ, flor. citr. 3.

Buglos. an. vbi. ij. q. iij. q. iij.

Opuntia remul. p. m. iij. q. iij.

Croc. g. iij. vi.

Sem. ocym. drach. i.

Garyoph. Nuc. moscat. iij. p. m. iij.

Cinem. an. drach. sem. i.

Pro distillis addantur Ambra.

Mosci an. gran. ij.

M. p. m. Epithem.

Adhibetur per panem tinctum colore coccineo, & post fomentum illandus est locus aut Theriaca aut Mithridatio, cui admisceantur vinum aromaticum cinamomum, caryophylli, styraz, cum aliqua croci portione.

Victus ratio sit proportionata, tam in pituitoso, quam in melancholico succo optimi alimenti calefacientis. Aeris quoque magna est habenda ratio, ut propterea alteretur aer ipse suffumigationibus factis per trochiscos de gallia moscata, aut ex decocto cinamomi, caryoph. cort. citri in vino aromatico, & aqua melissæ.

Superest Palpiratio ex Vermibus, quos dixi ex Mesue, Holletio, & aliorum sententia quandoque in Pericardio reperi, horum Vermium curationem, quod ego sciam, nullus proponit, excepto Alexio Pedemontanus, qui hoc proponit medicamentum.

Recipe Ramul. Matricarie (Truncetum ap-

pellant) in umbra siccet. vbi. ij.

Gentian. a. Peonia ayn. drach. ij.

Myrrh. drach. i.

M. & s. omnium pulvis subtilis, Vbi usus postulaverit, si fuerint Infantuli lactentes, pulvis modico succo citri excipitur, & labia pueri illinantur. Si maior natu fuerit patiens huius pulvis accipiat aut scrup. i. aut drach. sem. aut drach. i. vel in succo limonum, vel in aq. gramini. Alii nonnulli probant in hoc casu allium, & dicunt experientia comprobatum esse, vermē inuentum in Pericardio cuiusdam defuncti, non alia ratione esse extinctum, quam usu socii allij.

Nostrates mulieres familiariter in vermibus videntur corpa a calonia, quod prædita sit eadem ferè facultate. Non itaque improbat hoc medi-

camentum siue intrinsecus accipiantur, dum febris non adest, siue succus cum succo limon. Cordi adhibeatur, modico croci addito.

DE SYNCOPÉ Cap. II.

Post depravatos Cordis motus, diminuti, & ablati succedunt, quos Græci varijs complexi sunt nominibus, aliquando *ἄλυσιν*, quando *ἀσυνδυασίαν* seu *ἀσυνδυασίαν*, nonnumquam *ἀσυνδυασίαν*, & *συνκοπὴν* vocantes. Latini vertunt hæc nomina Defectum animositatis, Cōcisionem, Cōsternationē. Animi Reliquum, Defectum Pulsus, Calum Virtutis. Comprehendi possunt hæc omnia sub definitione à Gal. 12. meth. ca. 5. in principio tradita, dum inquit: *Syncopē esse virium lapsū præcipitem*. Dixi hæc omnia comprehendi Syncopē, si intellexeritis, quid nomine *Virium*, quiv. nomine *Lapsus* intelligendum. Per *Viris* intelligimus potissimum Vitales, subinde & Animales & Naturales. Rursum per Vitales intelligimus Animolam, seu Irascibilem, generatricem Vitalis Spiritus, Respiratoriam, Pulificam, atque illam, quæ calorem totius corporis tuetur, & ex Spiritu Vitali animalem gignit: denique per Vires intelligimus non virium substantiam, aut fecunditatem quæ in temperamento partis solidæ est posita, & hæc enim labente, deficit vita, sed intelligimus operationes harum facultatem seu virium. Per *Lapsū* intelligimus imminutionem & ablationem harum operationum. Imminutionem quidē vel quorundam, vel omnium, si quorundam, ut animositatis vel irascibilis facultatis, ut dicitur Eclysin plurius, aut omnium, dicitur Lipothymia, aut Lipopsichia, & propterea hic affectus est via ad Syncopē, auctore Gal. 12. ad Glauco. cap. 14. Quod si aboleantur omnes, saltem ad sensum, vera dicitur Syncopē. Diximus, defectum animositatis Eclysin dici, secus hæc in parte Galen. 12. meth. c. 5. ubi Defectum Animositatis, siue ingentem aliquem timorem ait esse viam & causam ad Syncopē, & hunc affectum in comm. 147. partic. aphor. ita nominavit etiam Eclysin ex quo loco colligitur, hanc Eclysin esse affectum & primariū Cordis, & secundariū ipsius Cerebri. Cordis quando spiritus Cordis primò, & per se refrigeratur, Cerebri quando imaginatio, mouet spiritum & calorem ad interna, hinc iure dictum à philosophis: Timorem esse motum in sanguine & spiritibus, ut instrumentis; in facultate appetente, ut in materia in imaginatione, ut in causa efficiente: Diximus, *Lapsū esse præcipitem*: nam si sensim deficient vires, possunt patientes Fæbe seu Marcore perire, non necessario Syncopē interire.

Causa immediata.

Causa præcipitis lapsus virium immediata est unica: Refrigeratio scilicet. Caloris Innati in Spiritu Vitali, per Refrigerationem intelligo aut imminutionem caliditatis, aut omnimodam extinctionem; diminutionem caloris in Eclysi, & Lipothymia; extinctionem in Asphyxia & Syncopē, Di-

pe. Dixi esse Refrigerationem, & Extinctionem in spiritu, non in parte solida: nam ubi calor partis solidæ prorsus extinguatur, nunquam reuocari potest, mors statim succedit. Hic enim Calor vera facultatis est essentia: Calor spiritus Cordi præbet usum: Calor solidæ substantiæ est ipsa essentia, Gal. 1. de prælag. ex puls. c. 4. atq; ideo etiam si calor spiritus deficiat, remanente aliqua solidæ partis caliditate, iterum potest calor spiritus redire, deficiente calore in parte solida, æquum est, per Spiritum intelligimus Vitalem, subinde Animalem, qui ex Vitali gignitur. Naturalem prætermitto, etiam si Gal. 1. 2. meth. c. 5. sub dubio reliqueret, utrum hic Spiritus denotet, nec ne. Ego tamen aperte sentio hunc minimè dari, qui video Spiritum omnem ideo esse constitutum, ut sit causa efficiens opifex operationum: ac causa efficiens opifex operationum naturalium partim est spiritus insitus, partim influens à Corde. Hæc est doctrina Gal. 1. de loc. aff. 6. 1. simpl. 9. 2. de nat. fac. 8. 3. in 6. epid. 18. & alibi. Itaq; Hepar naturalibus partibus non Spiritum operationum effectorem, sed materiam tantum suppeditat;

Naturalis Spiritus non datur.

Quæret quispiam, Si Spiritus non est præcipuus aut caloris, aut vitæ subiectum, cur deficiente hoc spiritu deficiat vita; quando quidem Syncope, ut dici solet, de medio tollit statim plurimos, & ita Syncope est mortis species, ut definitur à quibusdam mors momentanea.

Utrum Spiritus sint animati.

Hæc dubitatio fuit causa exortæ disputationis, inter Philosophos & Medicos; utrum Spiritus sint animati: Pro dissolutione lege Valles. lib. 2. contr. c. 8. Conciliator, diff. 48. Illud satis fuerit dixisse, Calorem spiritus, & si non sit anima, neque spiritus propriè sit animatus, sed tantum per participationem, nihilominus, ut docuit Gal. 2. ad Glauco. 1. esse adeo præcipuum instrumentum animæ, ut eo deficiente insignituer patientes animo linquant, Moriuntur autem non ex unico defectu caloris spiritus, sed simul deficiente caliditate innata solidarum partium.

Causa mediata.

Hic calor spiritus propter quatuor causas, vel refrigerescit vel exstinguitur. 1. est Alteratio contrariæ qualitatis. 2. Suffocatio. 3. Marcor seu defectus alimenti. 4. Dissolutio, seu Digestio caloris.

Intemperies.

Quod ad primum, quicquid senserit Fernel, & alij recentiores cum eo, qui lib. 5. c. 12. scribit Syncopen nunquam fieri ex intemperie, hoc vobis statuendū, nihil facilius innatam caliditatē posse refrigerare quàm contrariam qualitatem frigidā, siue extrinsecus, siue intrinsecus occurrat extrinsecus quidem, ut sit aere valde frigido & gelido, qua ratione in montibus nivosis reperiuntur homines huic maxime obnoxii, aut propter potum frigidum, præcipue in illis, qui nimio itinere, aut alia causa sunt calefacti: sic scribit Ant. Beniuen. lib. de admir. cap. 37. quendam post exertationem vehementem epoto vitto gelidissimæ aquæ in Syncopen incidisse, quam statim mors excepit: Internæ quoque illæ sunt usus oppii, mandra-

A gore aut alterius succi valde frigidi, dummodo conferunt in Cor agat,

Suffocatio autem, sit vel à causa interna, vel externa; interna vel per essentiam, vel per consensum; per essentiam, ut in Corde reuolvente vaporibus & sanguinem, vel propter impedimentum in magna arteria obortum, vel in arteria venali, aut in vena arteriali, siue impedimentum sit obstructio, siue tumor, aut ex calculo, aut ex carne substantia, aut ex callo; per consensum sit Suffocatio, aut transmissio humore ex toto corpore, vel iecore per venas & arterias in idum. Cor, siue fuerit sanguis multus, siue crassus, viscidus, pituitosus, vel melancholicus, qui deinde vel propter copiam, vel propter crassitatem in venis illis stabilizatur, & immobilis reddatur, & quasi gelu contrahatur. Huius meminit Petr. Salius 4. lib. de intero. ubi scribit, in duabus puellis hæc Syncope defunctis se sanguinem inuenisse in vasculis amplicis vliq; adeo crassum & tenacem, ut prima parte manu arrepta totum sanguinem, quasi gladium ex vagina extraxerit, huius Syncopes etiam Hip. 4. acut. 20. & seq. tex. meminit, ubi loquitur de venarum interceptionibus;

Suffocatio.

Fit quoque Suffocatio propter Pulmones, siue tuberculum, aut abscessus in illis disrumpatur, ex quo sanies ad Cor effluat, vel influat, quemadmodum etiam aliquando fit propter Anginam suppuratam, aut in Empyemate, vel Peripneumonia; propterea dicebat Hipp. 7. aph. 8. A tuberculi interiorum rupture, &c. Fit quoque ex Pulmonibus Suffocatio, cum pleni crassis & viscidis sunt humoribus aliquando autem hoc fit vitio musculorum Thoracis, aut nervorum thoracem mouentium, aut denique vitio cerebri siue Apoplexia lahorat, siue alio consimili affectu. Fit quoque consensus ab Ore Ventriculi in Bulimo, in febre illa Syncopali humorosa vocata, in qua Per Ventriculi, & arterie consequenter à multa, & frigida materia obsidentur, ut calor suffocetur innatus. Denique fit consensus, ab Vtero humorem, siue vaporem transmittente, siue hic vapor & humor sit ex sanguine, siue ex semine, aut alio putri humore, cum, vel sine occulta qualitate.

Causa autem extrinseca est aut aer inspiratus aut animi affectus. Aer inspiratus est calidus humidus ut in balneo, aut calidus siccus ac fumosus ut in laconico, & ubi fumus carbonum, aut venenatus, siue arte fiat, ut in suffumigio ex cinnabri, siue sit naturalis lacus, ut est Antrum quoddam Neapoli, vel alia quædam venefica caverna. Animi affectus Suffocationem inducuntur, cum calor ipse sanguinis conferunt ad Cor venit, id quod fit in subito & vehementi timore, aut merore, quandoque etiam ex ira: quamquam enim ira motus fiat & ad interiora, & ad exteriora, aliquando tamen plus potest tristitia concepta ex damno, in qua spiritus contrahuntur, quàm possit desiderium vindictæ, in quo expanduntur.

Antrum Neapolit.

Defectus pabuli nil aliud est, quàm defectus spirituum. Deficiunt autem Spiritus aut vitio facultatis, aut vitio materiz, aut quia ipsi digeruntur, & euacuantur, vel propter causam internam, vel externam. Vitium facultatis est insignis aliqua

Marcor, seu defectus pabuli.

qua intemperies ipsius substantiæ solidæ Cordis, aut inflammatio, velut erypelas, abscessus & vlcus, vel alius tumor frigidus: hæc omnia exsoluunt roborem facultatis generatricis spirituum quāquam enim isti morbi non sint propria & immediata Syncopes causa, quatenus tamē spiritus deficiunt, sunt Syncopes causæ, h. e. sunt causæ mediatae, in terueniente scilicet facultatis defectu, huius rei meminit Gal. 5. de loc. aff. c. 2. 1. aph. 4. 1. 1. ad Glau. 1. 4. & lib. de puls. ad Tyr. c. 11. Nominē defectus facultatis non intelligo omnimodum defectum, sed tantum diminutionem: nam propria facultatis diminutio siue etiam defectus omnes magnos Cordis morbos, siue intemperie siue in mala conformatione, seu compositione, siue in soluta unitate inferre potest, at verò ubi facultas ista spirituum generatrix prorsus aboletur non Syncope, sed mors succedit. Syncope itaque ex defectu spiritus propter lesam & diminuatā facultatem spirituum genitricem gignitur. Deficit etiā spiritus ex defectu materiæ: Mā est sanguis, & aer Sanguis dupliciter dicitur deficere, aut quia corruptus & improbus generatur, aut quia euacuatur: gignitur corruptus propter causas venetas gignitur improbus propter vitium sanguificationis lecoris, ut in Cachexia & Hydrope. Euacuetur in superpurgationibus omnibus, in hæmorrhagia natium, vulnere, & si alix similes sunt. Deficit aer ubi prohibetur inspiratio: prohibetur autem, ut dixi in c. de Palp. vel ob pulmonū vitia, vel propter musculos & nervos Thoracem mouentes, vel propter Cerebrum affectū, ut in Apoplexia, Caro, &c. Deficit spiritus ex causa externa, ut in profuso gaudio, motu vehemēte, Venere, inedia, & vigiliis: ex causa interna quoque, doloribus scilicet ingentibus Oris Ventriculi, & Coli intestini, nervosarum partium. Dissoluitur quoque ex omni euacuatione aut ventris aut vrinx, aut sudoris aut aquæ, aut puris, propterea ubi secantur Hydropici, aut Empyici, si tota aqua, vel pus simul excernatur, vel mors, vel Syncope succedit 7. aph. 44. 45.

Dissolutio.

Quarta & vltima causa est Dissolutio, quæ pariter fit aut à vehemētiore caliditate, sicut maior flamma minorem surripit, ut contingit in febribus ardentissimis, siue ex communi venarum putredine, siue ex partium principalium inflammatione. Huc quoque spectat Syncope ex humoribus tenuibus oborta, quam Arabes vocant Syncopen Minutam, de qua Gal. 12. meth. 4. & 6. oritur enim ex biliosis humoribus Oris Ventriculi vellicantibus, propter quos spiritus digeruntur, & toto corpore rarefacto, ut docet Gal. 12. meth. 5. & 6. spiritus & humores per vniuersum corporis habitum diffantur, & digeruntur.

Spirit. Aggregatio.

Hæ sunt veræ Syncopes causæ, tam mediatae, quam immediatae, quibus nullo modo addenda est Spirituum Aggregatio in Corde: etenim spirituum aggregatio, quæ Syncopen facit, suffocatio nem sequitur, alias causas non item. Sunt quidē inter recentiores, qui non rectè affecti sunt mentem Aui. & Auenzoar. tract. 1. 2. 3. qui scribit in Syncope fieri Spirituum Aggregationem in Corde, hinc multi inquirunt fieri non posse, ut quando

A fit aggregatio, quæ sit Syncopes causa, corporis partes extremæ destitutæ maneat calore. Ego dissentio & dico, aggregationem spirituum non esse causam Syncopes, imò tantum abest, ut spirituum aggregatio sit causa Syncopes, ut potius ab illa liberet. Vbi aggregantur spiritus absque causa suffocante, neque ratione causa aggregantis, neque spiritus aggregari videre potestis Syncopen adesse.

Sed iterum dicent id fortasse fieri ob dilationem Cordis.

Ego contra: ubi dilatur Cor, ibi permanet calor, neque potest adesse Syncope.

Defectus caloris in toto non est Syncope: necesse est ut calor in Corde exstinguatur, à quatuor scilicet dictis causis.

In Syncope ex latitia, ex humoribus tenuibus humores diffundi, non aggregari constat. Quomodo ergo semper Aggregabuntur Spiritus in Corde ad Syncopen faciendam.

De signi distinctiuis.

C Signa Syncopes alia sunt distinctiua, alia Prognostica. Diagnostica enim non sunt proponenda, quia ex distinctiuis colliguntur, hæc verò aut sunt distinctiua affectionum similium, aut causarum, aut locorum affectorum. Affectiones similes sunt Caros, Apoplexia, Praefocatio Vteri. Distinguitur Syncope à Caro, quia in Syncope vel tollitur, vel valde minuitur spiratio; in Caro seruetur.

Distinguitur ab Apoplexia respiratione, qua in Apoplexia respiratio deprauatur, in Syncope tollitur, & si quæ est Apoplexia sine respiratione, tunc est connexa cum Syncope.

Distinguitur à Praefocatione Vteri, quia hæc absque Syncope non tollit sensus internos, non functiones principes, non mutatur color faciei.

Distinguitur denique ab his omnibus sudore nam in Syncope, ut docuit Gal. 3. de symp. caus. 2. sudor frigidus erumpit, in his tribus affectibus minime.

Distinguitur Syncope secundum suas quatuor causas, hoc modo: si fiat ex Refrigeratione, pulsus aut sunt aboliti, aut omnium parvissimi rarissimi & tardissimi; totum corpus refrigeratur, vix sudor apparet; causa refrigerans precessit.

Si adsit Suffocatio, pulsus semper sunt inæquales, inordinati, intercepti, & si Suffocatio sit ex sanguine, venæ sunt turgidæ, facies rubicunda, precessit retentio excretionis sanguineæ consuetæ. Si fiat Suffocatio ex Pulmonibus, precessit pulsus inæqualis sicuti Antipatro Medico 4. de loc. aff. c. vlt. aut precessit Orthopnoea, vel peripneumonia, vel Angina, vel Pleuritis suppurata, vel Hydrops Pulmonum. Quod si Suffocatio sit ex Ore Ventriculi, precessit Nausea, Vomitus, Singultus, Bulimos, color faciei est plumbeus, vel lividus, subhumidus, imò, ut dicebat Galen. 12. met. ca. 3. & venter ipse subhumidus est. Si vterus suffocationis sit causa, aut precessit mensesum retentio, aut secundina, vel adest fœtus mortuus in vtero, vel mola, atque ideo regio vteri aut tumida, aut indurata apparet.

Quod

Quod si fiat Syncope ex defectu facultatis spiritum generantis, aut ex defectu pabuli, pulsus semper sunt omnium parvissimi, sed frequentissimi: ideo aut forniculosi sunt, aut vena culosi, ita Gal. lib. de pulsibus ad Tyron. c. 1. scribit. & si vitium facultatis sit, etiam extra accessione pulsus sunt parvissimi & frequentissimi, & propterea sæpius in Syncopen incidit Palpitatione laborans.

Distinctio autem intemperaturarum, & aliorum morborum corporis petenda est ex superioribus in Palpitatione. Si deficiat sanguis propter secoris vitium, cognoscetis ex Cachexia & Hydrope. Si verò deficiat propter euacuationes, id habebitis ex relatione.

Si propter venenum, aut adest febris pestilens aut inspiratione aerem attraxerunt venenatum, vel biberunt deleterium pharmacum, vel præcebit morsus venenatus.

Si deficiat aer, faciliè cognoscetis ex morbis iactis, impediendis morum Pulmonis, & Thoracis, Orthopnea scilicet & alius Pariter, si deficiat spiritus ex aliqua causa externa, aut ex dolore vehementi, aut nimio sudore, vel alia euacuatione simili, omnia hæc habentur ex relatione adstantium.

Denique cognoscetis causam spiritus dissolvente, quando a sit febris aliqua ardentissima, siue ex inflammatione, siue ex maligna humorum in venis omnibus, vel saltem Cordi proximis putredine.

De venenis dixi quomodo cognoscantur, quod præter hanc Syncopen à venenis, alia quoque inferuntur symptomata ante ipsam Syncopen, vi liuorem, nigredinem, refrigerationem, vomitiones, & alia id genus similia.

Prognostica.

Est omnis Syncope affectus lethalissimus, præcipue illa, quæ connexam habeat aliquam visceris inflammationem: Dicebat Gal. 1. 2. met. ca. 6. eos nunquam euadere posse, qui ex tali causa Syncopem incurrant: neque minus lethalis est Syncope ex vitio Cordis essentiali facta, de quo scribit Hipp. 2. aph. 4. 1. eos, qui frequenter, & sine manifesta causa animo deficiunt, repute interite.

Curatio.

In curanda Syncope quedam sunt agenda tempore accessionis, quedam extra accessionem.

In accessione semper, vnicuique casu excepto, primo symptomati incumbendum, i. e. viribus recuperandis, deinde verò ipsi causæ, propter quam vires vel nimia refrigeratione labuntur.

Casus verò, in quo primum & per se causa incumbendum est, quando Syncope sit à sanguine suffocante propter arteriarum, & venarum plenitudinem, in quo casu statim secunda est vena, ipsorum accessionis tempore, ut docuit nos Gal. & Hipp. 4. acut. 23. 24.

Et quanquam Trincavellius oppositam tace-

Atur sententiam qui etiam in suffocatis viribus sanguinis missionem timet, nihilominus Gal. nosse & loc. cit. & lib. de morb. caus. c. 3. aperte docet, Calorem Suffocatum non alia ratione melius transpirare, & propriam viam recuperare, quam sublato onere, itaque statim mittendus sanguis, parca autem mittatur, nam sublata Syncope, & paululum relictis viribus, præseruationis tempore re-

Exceptio hoc casu symptomati primum incumbendum, ut scilicet calor & spiritus reficiatur, & causa noxia adimatur.

B Reficiuntur spiritus aut alimentis, aut odoramentis.

Sint Alimenta tenuis, & spirituosæ substantiæ. Vinum in omnibus conuenit; & quod scribit Gal. 1. ad Glauc. 14. in Syncope vinum esse dandum quatuor casibus exceptis: Inflammatione febre ardente, dolor capitis, & delirio, de præseruatione intelligendum: nam in ipsa Syncope, præterquam, quod indicatio, quæ à viribus sumitur, reliquas omnes superat, accedit etiam, quod tunc calore extincto, neque febris, neque inflammatio augetur, neque vapores caput petunt. Sit autem vinum in causa frigida cum humoribus crassis generosum, subdulce, antiquum, fuluum, æstate frigidum, hyeme calidum: in intemperie calida ex humoribus biliosis sit subausterum, ut aliquam habeat vim propellendi humores biliosos ab Ore Ventriculi: conueniunt quoque destillata, quæ sorbilia.

C Ex odoramentis præcipue, quæ recipiunt moscum, & ambaram, quæ in omni Syncope conueniunt, vterina excepta, in qua graues, ac prauis natibus odores sunt apponendi, conuenit odor panis recentis, maluatici, carnis assæ, caryophyllis accipnamomo perunctæ.

D Ut verò occurratis causæ in ipsa accessione singulæ sunt distinguendæ: nam si Syncope fiat ex refrigeratione, os aperiendum, & aqua ardens, aut vinum Hippocraticum in os infundendum, lingua & palatum diaphnapi, theriaca, mithridato, castoreo illinenda. Cordi pannus sericius tinctus grano coccineo, maluatico madefactus, & caryophyllis, cinnamomo, atque nuce moscata inspersus apponi debet: id ipsum in initio ex theriaca, aut mithridato, maluatico dissolutis, facere licet.

E Quod si spiritu sint suffocati, agendum reuelentibus frictionibus, ligaturis, cucurbitulis, sinapismis, suppositoriis, quandoque etiam clysteribus & fluente materia ab infernis in Cor, reuulsionibus fiant ad inferna: si fluxio fiat à capite aut thorace, brachis reuulsionibus adhibeantur in quo casu conueniunt etiam clamores, vellicationes, euulsionibus pilorum, barba; apprehensio narium, cuius meminit Gal. 1. ad Glauc. 14. Inuat apprehensio narium, si sit Syncope ex suffocatione, ut melius spirent patientes, & calor melius euenietur, & in eundem finem narium adhibeantur, quæ crassos humores attenuant, acetum acerrimum, pulegio, origano castoreo intinctum; præcipue verò inuat hoc, si super lamina ignita inspergatur & fumus recipiatur.

Quod si fiat ex Dissolutione Syncope, occurrendum

In Syncope vi
nū effidā
dam quæ
tuor ex-
ceptis ca-
sibus.

dum causæ spiritus dissoluentis non unico modo, sed multiplici nam si fiat ex nimia lætitia, aut nimio sudore, cuius refrigeranda & adstringēda ventilationibus & flabellationibus, frequenti- bus inspectionibus aquæ frigide, alteratione ac- ris per refrigerantia, folia salicis, rosarum, nym- phææ, myrti.

His non conferentibus, vniuersæ cuti adstri- ctoria adhibeantur, oleum rosaceum, omphaci- num myrrino commixtū, cui addantur terra Ci- molia, aut Lemnia, aut in ijs sudoribus & Gyp- sum.

Quod si digerantur spiritus, vel propter alui fluxum, aut sanguinis per hæmorrhoides, vel mē- ses, aut per vomitum, aut per nares, hæc omnia prædicta sunt lethalia, nā fluxiones augēt. Itaq; siue fluat aluus, siue menses aut hæmorrhoides, superiores partes vinciantur, fricantur, cucurbitu- læ illis admoveantur si fluant menses, mammis, si alius, ventriculo, aut umbilico, aut brachijs affigantur, sicuti fata fluxione per nares cucur- bitulæ sunt affigendæ aut lieni, aut iecori, prout ex dextra, vel sinistra fluxerit sanguinis copia, C omnesque reuulsiones ad inferiora faciendæ, Gal. 1. ad Glau. 14. Sed præter reuulsiones occurrēdū etiam accommodatis remedijs ipsam fluxionem adstringentibus, de quibus non est præsentis loci disputare.

Quod si spiritus diregerantur propter vitium iecoris non probè sanguificantis, in hoc casu cu ratio in corroborantibus facultatem sanguifica- tricem.

Si fiat ex veneno, huic occurrendum. Omnia venena rediguntur ad quatuor capita. 1. aut ex D aere inspirato, ut in aere pestilenti. 2. aut morfu insiliuntur. 3. aut intussecus accipiuntur, ut Arsenicum. 4. aut ipso in corpore generantur ex prauis succis, ex improbo victu. Singulis propria conueniunt alexipharmaca, ut Theriaca, Mithri- dat. atq; alia.

Si dissoluantur spiritus ex Facultate Cordis vi- riata, propter intemperies, audistis in tract. de Pal- pitatione, qua ratione vnicuique intemperiei sit occurrēdum. Atque ideo cum hæc de curatio- ne sufficiant tempore accessionis, iam transeun- E dum ad præseruationem.

Præseruatio à Syncope.

E Xtra Syncopes accessionem, ut præseruentur patientes, duo præcipuè sunt agenda: I. ut caus- sa adimatur. II. ut vires ita confirmantur, ut nob- faciliè ipsius noxiæ causæ iniuriam sentiant.

Quod spectat ad causarum ablationem, mo- rietur hac in parte multa nobis esse prætermitten- da. Itaq; si Syncope fiat ex plenitudine sanguinis, F obstruente ipsas arterias, duo sunt noranda: Primum, ut extra accessione sanguis largius mi- ratetur, quàm in accessione ipsa, in qua moderatè euacuandus est. Alterum est, ut sanguis ipse cras- sus, & viscidus attenuetur, sed aliquando quidem attenuantibus medicamentis, & incidentibus, nonnunquam verò, imò pluriè serosam humidi- tatem augentibus itaque in hoc casu ad sangui-

A nem attenuandum cōuenit aut aqua hordeacea, aut potius feri caprini: aut si vires non sint valide, præbeatur ius pulli alteratom incidentibus, aua refrigerantibus, aut temperatis. Sunt autem refri- gerantia, acidum citri, limonum, syrupus de aci- do citri syrupus acetosus simplex, radix graminis, pentaphyllum, cuscuta, capillus veneris, atque id genus.

Si fiat Syncope ex inflammatione viscerum, vnū habeo quod moneam propter Gal. qui in lib. 1. ad Glau. c. 14 sicut & 12. meth. c. 6. prohibet in his casib. vinum. Auditores, aperte profitetur Gal. eos, qui laborant Syncope cum interna infla- matione viscerum, deploratos esse: quid igitur vi- num prohibet? Inflammatio, dicit quispiam, au- gebitur. Fateor, si vinum sit generosum, concedi potest vinum oligophorum. Gal. vina illa, de qui- bus antea mentionem fecerat, prohibuit fulua, sci- licet & generosa, hæc non conueniunt; tenuiora, in casu potissimum deplorato, sunt concedenda.

Circa Syncopen, quæ sit ex humoribus crassis, quam Gal. 1. 2. meth. c. 3. curat frequentibus frictio- nibus, inunctionib; mulla, oxymelite, hyssopo al- teratis, vel perfusione ex oleo de absinthio, vsu ipsius absinthii, diatrium piperecon, & id genus.

Moneo quantum ad hæc auxilia pertinet, non semper frictiones illas asperas esse administran- das, sed tunc tantum, quando humor crudus qui- dem fuerit, non tamen prorsus corruptus: nam fatetur idem Gal. 1. ad Glau. 4. & 12. meth. ca. 13. in hac humorum corruptione nullam, aut exi- guam esse salutis spem, eo quod humores corru- pti ad benignum amplius reduci non possint. Da- tur aliquando humor adeo corruptus, cuius co- ctio exspectanda non est: in hoc igitur casu tan- tum abest, ut frictiones iuuent, ut prorsus obli- vit: nam corruptus humor non est ducendus in ve- nas, sed potius pauiatim per suppositoria, per cly- steres, per benigniora medicamenta purgandus.

Circa localia medicamēta vnū moneo: Pro- hibet Gal. 1. ad Glau. 4. Localia medicamēta ante humorum euacuationem, & tamen idem Gal. 1. ad Glau. 14. concedit in multa pituitæ copia, circa os ventriculi collecta, oleum de ab- sinthio.

Hæc in parte vobis illud norandum, Localia medicamēta ante humoris excretionem aut ef- fectū digerentia, aut calefacientia, & simul adstric- toria. Dirigentia omnia ante humorum excrecio- nem sunt suspecta. de his dicebat Gal. 1. 2. meth. 3. ex reuulsionibus importunis viscerum inflan- mationes excitari. ut verò calidum medicamen- tum, moderatè adstringens, fouet calorem nati- uræ, & noua prohibet humorum fluxionem.

Tertio norandum circa hanc Syncopes diffe- rentiam spectandam rationem: nam Gal. in Syncope humerosa precipit victum tenuissimū, vsque ad septimum Concedit solam mullam, aut oxymel cum infusione aquæ, pisanam vel aly- cam. Hæc regula non est perpetuè obseruanda. nam si loquitur in præsentia de humoribus cras- sis, qui sæpe sæpius inferunt Syncopen, qui fieri potest, ut istique adeo tenui victus vsque ad septi- mam absque Syncope ab egris sustineri possit?

Obier-

Observandi Igitur sunt patientis pulsus, qui si inaequales & inaequales fiant, Medicum monent, ut cibum praebeat, & vinum exhibeat.

Quod si Syncope fiat ex humoribus biliosis & acerbis, circa hanc partem, moneo, Gal. voluisse hos vomitu esse eliciendos, propterea, praehet hydraeum. Hæc regula tunc iam locum habet, cum ipsi humores acres ori ventriculi sunt impati; si in fundo conneantur, non sunt ducendi ad os ventriculi, cum tantum sensibile sit causa Syncopes, sed per inferiora educendi. Ad educationem vero probatur ipsum oleum, amygd. ad vnc. vi. vel cassia, vel clysteres molles. In hoc etiam casu maxime solliciti esse debemus de corroborando ore ventriculi per adstrictoria & frigida, ut est vinum granatorum, coroneorum, agrestis, succus ribes, quæ omnia administrari possunt aut per os, fam panis in his succis unctam, aut per Cannam Nutriendi quoque sunt isti patientes, si circuitus febrim habuerint, paulo, aut accessionem, quamquam id in aliis casibus sit prohibendum: Nutriantur autem cibo aliquo crassi succi, non facile altera bil, ut est aluca, vel oryza, ac praebeatur, vel vinum, vel fructus adstringens cydonium, vel quid tale.

In Syncope ex fluxionibus variis, in qua ligaturæ conueiunt ad resolutionem, moneo ligaturas istas minime vehementes esse debere, dicebat Gal. 1. ad Glaucc. 14. huiusmodi ligaturas perinde humorem ad se attrahere, sicut hæc affectio ex qua fit Syncope q.d. Galen.

Denique si Syncope fiat ex dolore; varii vero eius loci dolentes, varia erit curandi ratio: de his, qui pertinent ad Ventriculum, Ileum Colon, Intestina; partesque naturales, hoc anno verba faciemus, quod ad alios pertinet, potestis legere rationem curandi 12. meth. 18. 1. ad Glaucc. 1. etiam si ibi verba fiant de dolore capitis. Hæc de causis expugnandis.

Notate: In tempore præseruationis non tantum esse custodiam habendam vitium, quam spiritus superpositis, sed etiam illarum, quæ resident in humoribus, & partibus solidis, & propterea non tantum cibis quidam solutus, est prædendus, verum etiam omnes partes principes, cor, cerebrum, iecur, proprijs remedijs internis & externis munienda sunt, de his, quæ ad cor, atque tam calidis, quam frigidis, tam internis, quam externis. Palpitatione supra diximus, satis etiam dicemus in sequenti de alijs.

DE AFFECTIBUS PARTIUM NATURALIUM. Cap. III.

Naturalium partium, quarum vitia aggredimur, alia generationis, alia nutritionis, alia sunt. De famulantibus generationis, in humilibus saltem priuatim hoc anno verba faciemus. De ceteris nunc sermonem aggredior, & à nutritioni seruientibus exordior.

De partibus nutritionis famulantibus.

EX his partibus quædam alimentum recipiunt, nonnullæ præparant, alia conficiunt, nonnulla excrementa recipiunt & expurgant, & quæ

verò prædictis inferiunt. Recipit alimentum Gula, Præparat Ventriculus, conficit lecur, Expurgant crassum primæ concoctionis excrementum Intestina; crassum verò secundæ concoctionis Liëbiliosum Vesica Fellea. Serosum Renes & Vesica. Cæteræ, quæ inferiunt, sunt hæc: Mesenterium, quod omnia viscera dorso alligat, & mesaraica muniat. Omentum, quod Ventriculum calefacit Peritonæum, quod omnia viscera continet, ut musculos prætermittam, qui ad excrementorum expulsionem faciunt. Incipiemus à vitijs Gulæ, quam Græci oesophagion, alii aliquando Stomachum vocant, teste Gal. 5. de loc. aff.

DE VITIIS GULÆ. Cap. IV.

Hæc pars quamquam sit via quadam & ingressus & egressus, nunc tamen à nobis considerabitur tanquam via ingressus, ad quam spectat Deglutitio, quæ tribus modis vitatur: Depravata, Diminuta, Ablata.

Depravata Deglutitio duobus considerari potest modis: primo, ratione obiecti, improprietate, in quod Deglutitur; altero, ratione modi Deglutendi: Primum modum prætermittam, eum de se loquens morbos Ventriculi abunde sim, verba facturum.

Depravata Deglutitio, ratione modi est, cum quæ in os recipiuntur, per nates reiciuntur Causa huius depravata Deglutitionis est triplex.

Causa Depravata Deglutitionis.

Triplex, inquam, est: aut magnum vlcus palati, in quo casu, cibis ingrediuntur in foramen vlcotis, & facta inspiratione alimentum in nates deducitur, altera causa. Aliquando est vlcus, vel erosio in operculo: nam, ubi erosa est hæc particula, cibaria potissimum liquidiora ingrediuntur asperam arteriam pro aliqua saltem parte, & sic iussu superueniente cibis & potibus per nates reiciuntur, causa est de qua loquitur Gal. 5. de loc. aff. 5. angustia, circa principium Oesophagi. Est autem hæc angustia non tantum causa depravata deglutitionis, sed etiam ablata & diminuta: neque enim cibaria, aut potulentia Oesophagum ingrediuntur: itaque ablata & diminuta Deglutitionis causas percurramus.

Causa Diminuta & Ablata Deglutitionis.

Ostenditur aut diminuitur Deglutitio, aut propter vitia Gulæ, considerata ut est via, aut propter vitia eiusdem, considerata ut est instrumentum. Ut est via, angustatur, occluditur vel propter errorem externum, os nucleum, spinam, crassam pituitam: aliquando propter morbum, siue sit tumor, siue caro aduata, siue coalescentia ex vlcere. Ut organum consideratur adhuc, vel ut animale, vel ut naturale: ut animale ratione musculorum laryngis: hi enim musculi Deglutitioni inferiunt, quatenus attollunt laryngem, qua sublata Gula deprimatur, & cibis superius existens ad inferiora detrudatur: isti musculi laryngis non funguntur suo officio, aut quia in paralytia

Isin incident, aut quia tumore afficiantur, ut in Angina: quod si conficeretur, ut organum naturale, habet facultatem attracticem, & expultricem; itaque ubi facultas attractrix, vel expultrix aut imbecilla redditur propter aliquam intemperiem, aut impeditur propter vlcus, vel propter inflammationes, aut humores frigidos, neque attractio, neque expulsio fieri potest conueniens: aliquando etiam Deglutitio vitatur propter insignem ventriculi inappetentiam, in quo casu non mouetur facultas attractrix; Sed hoc est vitium ventriculi.

Sed quia aliquando contingit, ut deglutiantur potulenta, & non solida, quandoque melius solida descendat, horum causarum perpendendae, & proponendae.

Descendit facilius cibus solidus, quam potus, quando vlcus aliquod adsit, vel in palato, vel in operculo, vel in Oesophago; vlcus enim facilius irritatur ab ipso potu, quam à cibo.

Secundo descendit facilius res potulenta, quando adsit angustia ex tumore, sed non occupante totum Oesophagum. Tertio descendit potus, non autem cibus, quando muscoli Epiglottidis sunt resoluti; nam res potulenta tanquam liquida, tamen non adsit hanc viam impellens, sponte descendit. Idem contingit, quando infirma est facultas attractrix, vel expultrix propter intemperiem. Contra citius descendit solidus, quando pituita crassa sit deglutitionis impedimentum: tunc enim cibus solidus sibi viam parat, detrudit crassitiem, id quod liquida potio facere non valet.

Signa Causarum distinctiua.

Cognoscitur sponte sua vnaquaque Deglutitionis vitiosae differentia: causarum verò sic distinguuntur.

Si sit Paralysis musculorum Laryngis immoto existente Gutturis potulenta descendunt; quod si adsit Conuulsio, eleuatur quidem Larynx, sed cum dolore, neque ad libitum deprimitur.

Si inflammati sunt muscoli, eadem sunt signa, quae Anginae nunc non proponendae.

Quod si adest Vlcus Palato, apparet aperto ore.

Si erosum sit Operculum ex quacunque re acceperit, mordicatio sentitur in ea parte, & vox est rauca, & tussicula excitatur.

Quod si obiectum aliquod externum viam impediatur, id ex relatione haberi poterit, ut cum duriores ossam, aut nucleum deglutierint.

Quod si adsit intemperies, cognoscetis his signis, quia imbecillitas degluendi est equalis per totum Oesophagum, nullus adest dolor, nullum impedimentum, & erecta ceruice melius deglutiant, quam supini. Quod si adsit impedimentum ex tumore, ipsimet patientes sentiunt cibum descendentem, deinde verò redeuntem, & in eo loco impedimentum, & dolorem sentiunt. Et si tumor sit inflammatorius, adest dolor insignis febris, & sitis. Si tumor sit durus, immodicus est dolor, & affectio antiqua.

Si adsit vlcus ab aceto, & alia quacunque re acri, vel acida; irritationem sentiunt, sanguinem,

A & pus reiciunt, aliquando etiam membranularum portiones.

Coalescentiam cognoscetis, si post vlcus signa, iam cessante pure, & sanguine, Deglutitio, nis vitium augeatur.

Prognostica.

HAec omnia maximum agitis inferunt periculum; nam sine Deglutitione nemo vivere potest; nihilominus datur aliquod Deglutitionis impedimentum ex causa plerumque insanabili, ex luxatione scilicet vertebrarum ad intra, de qua mentionem non facio: ceterarum causarum sunt maioris vel minoris periculi pro illarum diuersitate nam, & coalescentia est insanabilis, ut duri quoque tumoris; idcirco curationem illarum causarum aggredi oportet, quae sunt sanabiles.

Curatio.

In curandis Oesophagi vitijs versabor circa causas, quae meatum impediunt: et si haec causa fuerit viscida pituita, frequenti curabitur vsu oxymellis simplicis, clysteribus acerbis, & deriuatione facta ad nares per sternutamenta.

Quod si fuerit ipsa infixa vel acus, vel numisma, aut simile quoddam solidum, & durum; quod ab humiditate impleri, & extendi non possit, optumè conducunt larga potio, aut iuris, aut aquae theriacalis, aut ferulacis, vel olei: sed si id quod impactum est fuerit substantia, quae ex humiditate impleri, & extendi possit, eligenda sunt illa, quae incidendi, & exsiccandi facultatem obtineant: idcirco conducit oxymel, scylliticum aqua rehutana commixtum, aut in defectu huius, aqua sulphurea, aluminosa, quae habent rationem impedimentum in Oesophago ad mouendi.

Quod si fuerit in superiore Oesophagi parte, aliquando imposita cerea candela oleo illi ita; impedimentum deturbatur. Interim ut dilateatur meatus, conueniunt cucurbitulae sine sacificatione occipiti, & scapulis impositae: conueniunt emplastra ex emollientibus confecta ex mucilaginibus, oleis, & pinguedinibus, butyro, farina, seminis lini subactis: & si diu persistat impedimentum, ut nutriti non possint, clysteribus nutriantur. Ad inueniendum hunc nutriendi modum Aetius, Celsus, Celsus Aurel. praeter recentiores multos, quauis Alyosius Mudea epist. x. oppositum tueretur.

Quod ad Inflammationem pertinet, quia, ut dixi, huius curatio proponetur in sermone de vitijs Ventriculi, hoc tempore illud tantum moneo propter Aui. qui consulit, ut in principio inflammationis Oesophagi dorso apponantur frigida, & stipica medicamenta, ut repellatur fluxio. Quod ad locum pertinet, conuenit cum Gal. 1. 3. meth. 17. in fine scribente, in affectibus Oesophagi dorso medicamenta esse adhibenda; sed materia medicamenti frigida, & attractoria mihi non placet.

Primo quia spinalis medulla, & nervi omnes ex frigido medicamento possunt imbecillitatem, & forte obstructionem integram contrahere.

Secun.

Cur aliquando deglutiantur facilius solida, aliquando.

Clysteres nutritiui.

Medic. frig. dorso applicata improbat.

Secundo, quia cum Oesophagus multum distet à cute, existente media spina, ratio persuadet frigida extrinsecus admota repellere humorem ad locum affectum.

Tertio, quia inflammatio, aut est in membrana exteriori, aut in interna; si in illa, propellitur humor ad interiora, quod est magnum malum; si in hac, repellentia ad locum illum non perveniunt.

Adde, quod vix, ac ne vix quidem fieri potest, ut inflammatio, Oesophagi incipiens statim deprehendatur; itaque si iam principij tempus præterijt non est opus reprimentibus; quare potius digerentia, aut suppurantia, ut infra dicemus, sunt adhibenda huic loco.

Si fuerit vlcus, epumè sanatur epota aqua Testutiana, & in huius defectu componenda medicamenta detergentia, & siccantia, quæ paulatim accipiantur, & propterea, quod ad modum componendi, accipiendum Galeni consilium 4. meth. 7. ubi in his casibus v. endum præcipit medicamentis ex siccantibus, & ad strictioris, ut rosæ, balaustris, Hypocistide, corticibus granatorum, admisceantur emplastica glutinosa, quæ medicamento consistentiam tribuunt, ut amyllum, tra gacanta, gummi Arabicum. His permiscenda ea omnia, quæ aut vlcera sanant, aut intemperies, aut inflammationes. Quare me conscio ad affectus oris ventriculi.

DE VITIS ORIS VENTRICULI,

Cap. V.

OS Ventriculi quædam patiuntur symptomata communia, alia verò propria; et communia quidem sunt in duplici differentia; aut alijs consentientia, aut alijs quoque convenientia. Per Consentientia intelligo Dispositionem, Vertiginem, Carum, Melancholiam, Palpitationem, Syncopen. Per alijs convenientia intelligo Dolorem; nam dolor non tantum Ori Ventriculi, quantum etiam ori corporis ipsius Ventriculi atque alijs partibus convenit. Communia etiam sunt toti Ventriculo, & Ori eius Singultus, Nausæa, Vomitus. Propria autem quæ ad appetentiam cibi, & potius pertinent. Nunc ad tractationem de Doloris animum convertam.

DE DOLORE ORIS VENTRICULI,

Cap. VI.

Nomine Doloris nunc complector Cardialgiam, Cardiogmum, Cardiacam, Anxietatem, & proprium ventriculi dolorem; quomodo distent hæc inter se, nunc audieris.

καρδιαγμία idem sonat, quod Cordis Morsus per Cor autem, voce antiquis usitata, in præsentia. Os Ventriculi intelligimus, Gal. plur. locis, plenius 2. de decret. c. 8. Est cardiogmos morsus Oris Ventriculi, qui distet à Cardialgia, quod hic morsus sit leuior, habeat intervalla, & sit quasi via ad futuram Cardialgiam. Differre hæc duo inter se patet apud Gal. primo de caus. symp. c. 7. ubi inter vitia Oris Ventriculi ponit Cardialgiam, & Cordis morsum.

Notandum præterea, Morsum significare non

tantum dolorem, sed etiam motum facultatis expultricis concitatum ad vomitionem futuram. Gal. in comment. 30. prima præterit; in com. 30. 3. prog. in comm. 17. aph. 4. partic. ubi inquit Cordis Morsum esse signum vomitionis futuræ. Et Galen. 3. de nat. facult. 12. inquit ex affectu, quem Cardiogmon vocant, cognosci vitium facultatis expultricis Oris Ventriculi irritatæ.

καρδιαγμία verò est dolor mordicativus gravior, continuus, in quo facultas expultrix vique adeo succumbit propter doloris vehementiam, ut non habeamus ex Cardialgia futuri vomitus signum sicut ex Cardiogmo.

Causa Cardiogmæ, & Cardialgiæ.

Fiat autem utrumque ex una, & eadem causa, sensu subiecti mordicationis fieris, aut ex ore ventriculi nimium sensibili, aut ex vehementia causæ. Est Os Ventriculi sensibile nimium aut à natura, aut propter vlcus Vehementia causæ est posita aut in qualitate acida, aut salsa, aut acris, aut punctoria. Acida est duplex, aut pituita, aut bilis atra. Dico bilem atram, quia Gal. lib. de plenitud. c. xi. naturalem melancholiam dicit non esse acidam. Salsa est pituita; aut cibus vel potus assumptus. Acris est aut humor aut cibus, vel potus siue naturalis siue corruptus. Humor est bilis quæcunque. Cibus, & potus naturaliter acres sunt capæ, allium, aromata, potiones medicamentosæ; ex corruptione verò ad nidorem facta siue propter calorem ventriculi, siue propter ciborum proprietatem, idem humor acris generatur.

Causa pungens sunt Vermes, qui accendunt ad ipsum Os Ventriculi; isti omnes aut in ventriculo generantur, aut aliunde transmittuntur.

Generatur quidem, & transmittuntur à cerebro pituita acida, & salsa: Transmittitur tantum, non generatur melancholia ipsa, seu illius serositatis, cuius meminit Gale. 3. præterit. 38. & 3. de loc. aff. 7.

Biliosus humor, qui omnium maxime Cardialgiam facit, aliquando in ventriculo generatur, aliquando suscipitur, aliquando attrahitur, aut aliunde transmittitur. Generatur autem non omnis species, sed illa, quæ aut porracea, aut æruginosa dicitur, cuius meminit Gale. lib. de attrib. c. 2. & 2. progn. 32. ubi scribit, illam produci ex quadam ciborum proprietate, ut brassica, porro, & similibus. Suscipitur propter insignem Oris Ventriculi imbecillitatem. Fiat autem hæc imbecillitas, aut propter magnum cerebri vulnus, Hippocr. 6. aphor. 50. teste, quibus cerebrum percussum est, febrem, & bilis vomitum superuenire necesse est. Idem fit ex quacunque Oris Ventriculi intemperie. Attrahitur autem, & propter dolorem, & propter calorem: & propter alimenti defectum, teste Gal. 3. de nat. facult. 13. inanitum ventriculum quasi animal pravos, & à jecore, & ab alijs infernis paribus succos ad se trahere. Mixtur autem vel à toto, ut in febribus prætertitanis, sub accessionis initium, aut à jecore vel intemperato, vel mala conformatione affecto. Est autem intemperies calida vel naturalis, vel alcutia. Mala autem conformatio est mala situatio meatuum.

meatus vesicae fellex, teste Gal. 2. de temp. 6. & 4. A
acut. 27. & secundo acut. medic. 75.

Cardial-
g. ex Ver-
mibus.

Præter has causas diximus Cardialgiam etiã
fieri ex Vermibus, nomine Vermium non tantũ
intelligo teretes, & oblongos, qui in testinis ge-
niti ad os ventriculi ascendunt, sed etiam omnia
illa animalia complector, quæ scribunt auctores
in ventriculo gigni in modum erucæ. Sic enim
Anton. Beniuen. de admirandis. cap. 88. post n-
gentes Ventriculi Dolores eicctam esse materiã,
quæ Vermem, erucæ similem, in se continebat.
Idipsum scribit Hieron. Capucius in suo com. de B
lumbic. c. 33. Idcirco Ambr. Parus lib. 24. c. 19.
scribit aliquando eicctum Vermem erucæ simile
Vlcus ventriculi, ex quo fiunt etiam Cardialgiæ,
fit ab omnibus humoribus erodentibus, vel post
disruptum abscessum, vel propter medicamento-
sas qualitates susceptas, aut denique propter ve-
nenum intus genitum.

Cardiacæ nomen, ac natura.

H Adenus de Cardialgiæ causis, transeo nũc
ad Cardiacam; & nomine Cardiacæ non in-
telligo Syncopem ex ore ventriculi factam, sicut
accipit Soranus, Erasistratus, atque alii referente
Cœlio Aureliano 2. de acut. 30. & 33. sed affectũ
accipio pluribus quidem notum, sed nemini i. re-
gè descriptum; propterea nos huius naturam
ex ipsa rei euidentiã desumemus.

Defini-
tio

Celsus mihi inter ceteros videtur melius hũc
Affectum descripsisse lib. 3. c. 19 qui ait, Cardia-
cam esse totius corporis imbecillitatem cum su-
doribus, propter oris ventriculi languorem. nomi-
ne imbecillitatis totius corporis intelligit omnes
facultates naturales immunitas, ut propterea
hic affectus non sit Syncope, sed habeat propen-
sionem ad Syncopen: & quanquam actio mentis
sit imminuta, (sunt enim valde debiles) est ta-
men eo tempore deprauata; isti enim stare loco
non possunt, iacent in cubili, neq; in eo vno &
eodem situ vix aliquo spatio temporis manent,
huc atq; illuc iactantur; propterea Anxii, Inqui-
eti, & Implacidi passim apud Medicinæ scrip-
tores dicuntur, ut potestis videre passim apud Gal.
nost. 7. aph. 56. acut. 46. & 1. de humor. 17.

Si quis quærat, quamobrem, cum sint debi-
les, tantopere agitari possint, & agitentur, Ratio-
nem proponit magister noster Gal. 1. de mor.
muscul. c. vlt. in si dum scribit, huiusmodi Car-
diacos & Anxios propter imbecillitatem omnem
causam noxiã molestè ferre, & propterea fre-
quenti illa corporis motione tentate noxiã caus-
sam exuere.

Est quoq; defectio facultatis naturalis, ut pro-
pterea habeant appetentiam deactam, cibum
continere non possint, extrema semper habeant
frigida, sudor tamen vultuosus circa faciem, col-
lum, & thoracem perpetuo. abundet, pulsus sint F
quidem frequentes (nam hic affectus semper est
cum febre acuta) sunt tamen valde parui, & lan-
guidi, plerumq; inæquales.

Locus Affectus.

Locus affectus est os Ventriculi, sed ad diffe-
rentiam Cardialgiæ & Cordis Morbus caus-

noxia est in ipsis tunicis impacta, & præter impa-
ctionem destruit robur huius partis, quæ cum sit
seder appetentia, & communionem habeat vsq;
adeo insignem cum Cerebro & Corde, sublato
huius partis robore, cadit facultas Naturalis, &
debitatur insigniter Vitalis, & Animalis.

Causæ Cardiacæ

Hic verò languor Oris Ventriculi, ut docuit
Gal. 5. de locis affect. c. 2. fit aut ex magnis
intemperantijs, & in cardiacæ, quæ est cum febre
acuta, locum potissimum habet intemperies ca-
lida, quæ nativum huius partis calorem fundit
& humiditatem colliquat; aut ex inflammatio-
ne, & ex quocunq; alio tumore, aut ex magno
ulcere, aut ex venenata qualitate; propterea Cal.
7. aph. 56. loquens de hac Anxietate, quam ego
Cardiacam voco, scribit illam potius referendã
esse in proprietatem humoris, quã copiam, quæ
si dicat in venenatam qualitatem: & propterea
Alex. Trallian. lib. 7. cap. 2. Cardiacæ causam
esse inquit humores acres & venenatos, addit
etiam vermes. Inflammatio, siue sit legitima,
siue spuria inter has causas reperitur ex Hippo.
& Galen. 4. acut. 47. ubi est mentio Anxietatis,
Implaciditatis, quæ sequitur Cardiacos ex infla-
matione pituitosa Oris Ventriculi. Harum caus-
arum meminit auctor Introductorij, & Finit.
Medicatum, qui Galeno ascribuntur; & Aetlib:
9. c. 5. inflammationis meminit.

Puto auditores hunc affectum illum esse, quem
recentiores quidam Medici Germani Ardorem
Ventriculi nominant, putantque esse affectum
Antiquis ignotum, quod tamen falsum est. Ex
his potestis colligere, quid sit Anxietas, atq; Car-
diaca.

Ardor
Vetri-
culi

De Anxietate

Anxietatis nomen, quam Doloris speciem
diximus, non vno & eodem modo sæper
accipitur; alienando. n. animi perturbationem in-
signem, significat, de qua hic non est sermo. quã
do autem accipitur pro corporis morboso statu,
dupliciter accipi consuevit, aut vitibus exsolutis,
& languentibus; aut Ore Ventriculi affecto Gale.
1. progn. 16. 2. prophet. 44. Nos hic nomine An-
goris illum intelligimus, qui sit vitio Oris Vetricu-
li, & quia hoc vitium potest esse aut composi-
tum, aut simplex; compositum cum Cardialgia,
cum Cardiacæ affectione de hoc iam satis dictũ
est: nunc erit sermo de simplici.

Simplex Anxietas igitur, siue Angor, qui etiã
Inquietudo & Implaciditas dici potest, ut collig-
itur ex primo prognost. 16. & 4. acut. 47. est
Dolor grauatiuus Oris Ventriculi cum agnatio-
ne corporis ex humore frigido multo, tunicis Oris
Ventriculi imbutis. dicitur Dolor, quia in re sequi-
tur Galenum 3. de decretis c. 6. qui hac in parte
Chrysippũ laudat dicentem, Anxietatem esse Do-
lorem, & ad differentiam Cardialgiæ diximus
esse. Dolo rem grauatiuum; ille enim est mor-
dicatiuus. addidi, cum inquietudine, ac agita-
tione corporis; nam isti quoque propter pon-
dus rei molestæ, huc atque illuc mouentur,

Defini-
tio.

vi moleſtiam fugiant, ad differentiam Cardiacæ affectionis diximus cauſſam eſſe *frigidum humorem & multum Ori Ventriculi impactum*; nam vi intellectus Cardiacæ habet pro cauſſa vlcus, inflammationē, venenatos humores; & propterea Hipp. 7 aph. § 6. hanc ſpeciem Anxietatis inquit curari vino, aquę aqualiter commiſto.

DE DOLORE VENTRICULI, ſpecialiter ſumpto. Cap. VII.

Dolor autem Ventriculi, diſtinctus à iam propoſitis Doloribus, ille eſt, qui in omnibus aliis Ventriculi partibus fieri conſuevit, Ore excepto. Habet hic Dolor has ipſas cauſſas, quas iam recensuiſimus. Inflammationes, abſceſſus, humores frigidos, mordicantes, inæquales intemperies, flatum extendentem. de his omnibus Galenus in comment. 2. 1. aph. 7. part. vbi ſcribit, Dolores Vētriculi, qui medicamentis nō cedunt, ſed diu perſiſtunt, nullo commiſſo errore, aut ex inæquali intemperie, aut ex inflammatione, in abſceſſum tranſeunte, fieri poſſe, dummodo inflammatio ante abſceſſum patientem non interficiat ſed, præter has, alia quandoque cauſſa Dolores inferi grauiffimos, Lapis ſcilicet in Ventriculo gentius. Cardanus 2. Contr. tr. §. c. 9. in quo agit de venenis, ſcribit ſe in duobus corporibus ſectis eorum, qui grauiffimis vexabantur Doloribus, Lapides in ventriculo reperiſſe. Humor Dolorem faciens poteſt eſſe multiplex, & quandoque in cavitare, quādoque in tunicis continetur.

Lapides
in Ventri-
culo.

De differentijs diſtorum omnium.

Hinc proprio Marte poteſtis varias Doloris differentias haurire, à forma, loco affecto, cauſſis deſumptas; Præter quas ſunt, & alię à tempore petiæ, ut quidam Dolores ſunt continui, alij intermittentes, iſti verò exacerbantur aut ante cibum, aut ſtatim à cibo, vel §. aut 6. horis ab aſſumpto cibo.

Signa eorundem Affectuum omnium.

Signa varias oſtendunt Doloris differentias, diuerſas cauſſas, diuerſo locos.

Cardiogram cognosceus, ſi morſus habeat quædam interualla, ſi adſint aliqua ſigna vomitionis futura, à Galeno & Hipp. propoſita 4. aph. 17. 3. prognost. 30. vertigo ſcilicet tenebriſoſa, tremor labij inferioris.

Cardialgiam cognosceus ex continua oris ventriculi mordicatione.

Cardiacam ex omniſi virium languore, iactatione, extremorum refrigeratione, & vinctuſo ſudore capitis, colli, & thoracis.

Anxietas facilè deprehenditur ex ſenſu grauifatis circa Ventriculum, iactatione corporis cum virium robore.

Dolor ventriculi diſtinctus à Doloze Oris Vētriculi deprehenditur ex ſitu; nam vbi delet Os, Dolor circa ſpinā poſſimū ſētitur in regione illa poſteriori, quæ reſpondet cartilagini ſcutiformi. Ceteri Dolores Ventriculi ſunt inferiores, & potiùs ad ſiniſtram partem tendunt, ſicut & pondus Ventriculi.

A Varietate humorum ſic diſtinguetis. Si ſit pituita acida, ſimul cum morſu adeſt inſignis appetentia, & frequens exſpuitio, iuuatur à calidis.

In melancholico humore, qui eſt acidus, adeſt quidem appetentia, ſed non iuuatur à calidis, & præterea mæiore ac timore vexantur.

Si bilioſus ſit humor, ſenſus doloris ceteris eſt vehementior, adeſt ſitis, amaritudo oris, inappetentia, nauſea, vertigo, bilioſi vomitus, ac deiectiones bilioſæ.

Si humor ſit ſaluſ, adeſt quidem ſitis, ſed nō oris amaritudo, & quod per ſputum ejicitur, ſaluſ eſt.

Si adſit inflammatio, ſigna omnia lethalia. ſebis ingentiſſima, ſitis, omnia ſymptomata Cardiaci affectus, Syncope, quæ ſape ſepius ſuccedit, Galeno auctore lib. de pulſ. ad Tyron. c. 11.

Quod ſi adſit vlcus præter excretionē ſanguinis & puris, præter nauſeam & vomitum, ſuccedit etiam ſenſus mordicationis ex quacunque re acida & ſalfa per os accepta.

Quod ſi adſit ſtatus, Dolor eſt extenſiuus cum rugitu, & regio illa Ventriculi manu appoſita tumida in modum folliſ inflati apparet.

Si adſit lapis, dolor eſt continuus cum ſenſu grauitatis, neque vllis medicamentis cedit.

Si adſit Abſceſſus, ſignum abſceſſus accipitur ex inflammatione præcedente, cum dolore perſeuerante. Sic dicebat Hipp. 7. aph. 2. 2. habentibus dolorem diuturnum, ſuppuratio.

Si dolor ſit cōtinuus, materiæ impactæ eſt indicij in ipſis mēbranis, ſiue cū tumore, ſiue citra.

Quod ſi habeat interuallum, ut exacerbetur ante cibum, argumentum eſt doloris, qui ſit ex fluxione materiæ bilioſæ à iccore, propter ſenſibilitatem Oris Ventriculi.

Si verò exacerbatur ſtatim à cibo, ſignum eſt materiæ bilioſæ, aut actis contentę in fundo ventriculi, quę aſſumpto cibo agitur.

Si exacerbatur dolor poſt §. aut 6. horas, argumentum melancholiæ eſt, aut fluentis ab ipſo hene ad Ventriculum, aut reſidentis in fundo Ventriculi.

Quod ſi longiora habeat interualla, quandoque dierum, quandoque hebdomadarum, poteſt fieri fluxio, vel à cerebro, vel ab utero, vel à toto corpore, quarum partium affectus propriis ſignis diſtinguendi.

Prognoflica.

Omnes ſane Ventriculi Dolores magni quidem, ſed lethaliſſima omnium Cardiacæ, præcipuè ſi ex vlcere cum inflammatione prodeat. Venenata etiam qualitas, ut ſteſt injellexiſtis, momento temporis interficit, ſicut & aliquando Vermes: ante tres annos Ego vocatus ad puerum, reſectum Vermibus, & 1 annorum, cui pilulas exhibui, mane cū reuerteret morſus, curauit appetiri Ventriculum, inueni §. 3. Vermes omnes dodrantes, omnes viuos, ori Vētriculi adeo ſenaciter inhaerentes, ut viz auelli poſſent.

N. B.
Hiſtori-
am Ver-
mium in
Vētri-
culo.

Cautio.

Cautio. Doloris Ventriculi vel dirigitur ad causam, vel ad symptoma &c. dum erit sermo de causa, distinguam sermonem meum in partes tres, in quarum prima verba facia de omni materia ablegi timore, in secunda versabor circa inflammationem, in tertia proponerem curationem vlcis, primam autem partem in duas subdividemus, prout materia vel in cavitate continetur, vel in tunica est imbibita.

Loquemur primo de materia non impacta. In hac curatione indicationes desumuntur à quantitate materię, à motu, à qualitate, & ab ipso partu. Affectu, siue pars sit Venterculus suscipiens, siue alia pars mittens.

Ratione quantitas materię opus est euacuare.

Ratione motus revellere, & derivare.

Ratione qualitatis, quia mordax est, oportet uti contemperantibus mordacitatem.

Hos scopos proponit Gal. 2. simplic. c. 14.

Ratione partis suscipiens opus est uti adstrictorij, & malam temperiem alterantibus, uti monet Gal. 7. meth. ij.

Quantitas humoris aut, ut vomitorijs, aut deiectionis imminuitur. Vomitorijs, quando ad Os Venterculi ascenderit. Sint Vomitoria in materia biliosa aqua tepida, ius tepidum hydreleum. Vomitoria in frigida materia debent componi ex oxymelite, ut et assuem incidant, ex oleo, ut mordacitatem tollant, ex iure, ut facilem humoribus præbeant exitum. Validiora dolente Ore Venterculi non sunt tentanda, in omnibus tamē, siue calidis, siue frigidis humoribus amygdalinum oleum rursus præberi potest, ad vnc. vi. vel viii. ut si vomitus non succedat, alius saltem deliciatur, vel moveatur.

Permissū aut in frigidis humorib. oleo est ipsū oxymel, in calidis aut succo citri, aut limonū, i. salsa pituita, syrupus aceto. Sint ex ep. gratia olei vnc. vi. oxymelitis, aut succi, aut syrqi vnc. i. & s.

Si materia ad Os Venterculi non ascendat, sed pous, in fundo contineatur, per inferiora est ducenda, vel medicamentis, vel clysteribus, vel suppositorijs.

Cautio. De medicamentis sit vniuersale præceptum; Laborante Ventrículo medicamenta nunquā fortia esse eligenda, primo ne robur ventriculi dilloquantur, secundo ne plus à longinquis partibus trahant, quā ab ipsa parte affecta educant: quod si multa sit materia, diuidatur euacuatio, atque ideo si antiquus fuerit Dolor Venterculi, in materia biliosa ego vti consuevi alternis diebus, aut drach. j. pilularū de tribus cū Rhabarb. aut drach. sem. rhabarb. pulueriz. cū vnc. sem. sacari ros. aut tempore calidioro alternis diebus præbeo vnc. sem. aut drach. vi. cassie hora vna ante prandium.

Quod si pituitosus sit humor, parti ratione exhibeo drach. j. pilularum masticinarum hora vna ante cenam.

In humore aut melancholico præbere cōsueui iusculū, aut ex colubo, aut ex pulla, in cuius ventre incoquantur polypodij, epithymū, & sena, ita ut singulis diebus sex huius iuris vncias accipiant, quæ drach. ij. illorum medicamentorū accipiant.

Quod si non fuerit affectus antiquus, potestis, puto, in his casibus semel totam vacuare, & educere materiam.

Biliosam vnc. v. syrup. ros. solutui.

Pituitosam toudē vnc. ius mellis rosati solutui.

Melancholicam verò hoc medicamento:

Recipe syrup. de polypod. vnc. v.

dissoluantur cum decoct. cordial.

Clysteres quoque varij, pro varietate materię, sunt eligendi. In bilioso succo sic paretur clyster.

Recipe Viol. Malu. Beta an. M. f.

Hordei mundi P. i.

fiat decocto s. a. deinde

Recipe decoct. prædict. lib. i.

saccar. rub.

ol. violat. an. vnc. ij.

Cass. extract. drach. vi. M.

In Pituitosa, & Melancholica in decocto accipiat Anisū, Fœniculū, Chamemeli, & loco sacchari mel rosatū, loco olei violati chamemelinū.

Quod si Dolor fuerit ex materia flatuosa, in hoc casu omnium maximē clysteres conueniunt, qui in hunc modum concinnantur.

Recipe Anis. Fœnic. Dauci an. vnc. i.

Carthami drach. ij.

Pulegij. Origani an. M. f.

Flor. chamem. aneth. an. P. i.

f. decoct. s. a. Deinde

Recipe præd. decoct. lib. i.

Hier. pro clyst. drach. vi.

Ol. rut. mell. ros. ad. vnc. ij. M.

Suppositoria in quocunque Doloze non sunt spectienda, omnia verò debeat esse acia, quamquam humor sit calidus, nam ratione acrimonie diuertunt à Ventrículo. Suppositoriū sic paratur,

Recipe troisc. alband.

Diagrid. an. gran. viij.

spec. hier. drach. sem.

falis gemm. gran. x.

Mel q. f. M. & f. supposit. tria.

Postulante vsu imponatur vnum post aliud. Sed si flatuosa sit substantia, sic conficiatis suppositoria,

Recipe Cymin. Anis. Fœnic.

Sem. rut. an. drach. sem.

Synap. Piper. an. scrup. i.

Spec. Hier. drach. i.

Mel q. f. M. & f. suppos. 4.

Inde ad digerendum flarum conuenit aut humidum, aut siccum aliquod fomentum, Ventrículo appositum.

Si humidum volueritis, erit tale

Recipe absinth. menth. spic. an. M. i.

Puleg. Calam Orig. Distam. an. M. f.

Sem. rut. fœnic. anis.

Cymis. l. i. f. i. i. i. an. vnc. ij.

f. decoct. in s. q. aq. sed in fin. decoct. adde vin. albi odor. lib. iii. & facta forti express. cum spongiis f. foment.

Si hæc omnia exsiccata & calefacta in sacco lineo venterculo apposueritis, siccum habebitis fomentum. Præstat tamen egregiam operam, & est admodum vulgare fomentū ex cineribus calidis positis in scutella cū aliquo linteo cooperta.

K 2 Aliquan-

Aliquando autem insperguntur calidi cinques vino maluatice, & superinfunditur pulvis caryophyllorum, cinnamomi, & piperis; & opume facit idipsum panis assus vino maluatice imbutus, & praedictis pulueribus inspergitur.

Cucurbitulae magna, vel umbilico, vel ipsi patienti Ventriculo applicata, statim misce digerit.

Ceterum materia non tantum istis modis, sed aliis quoque est ab Ore Ventriculi, imò vniuerso Ventriculo deriuanda, & reuellenda.

Primum quidem id fieri potest omnibus illis remediis, quae extremis & externas partes calefaciunt, siue sint frictiones, siue balnea, aquae calentes, siue sint sinapismi, dropaces, aut vellicantia. Haec enim omnia in Dolori Ventriculi conueniri non modò colligitur ex Gal. 7. meth. c. 11. & 8. de compos. local. ca. 4. verum etiam ex antiquioribus Medicis, Sorano, Archigene, Herophilo, Themisone, referente, Caelio Aureliano 2. de acut. 3. & 4. & sane quanquam materia Doloris faciens sit calida, haec tamen remedia calida, tanquam diuersoria, reuullen, & attrahentia calorem ad partes extremas, in nullo casu sunt improbanda, etenim iam propositi Medicinæ scriptores, quibus adheret Celsus & Aetius in pura Cardiaca passione, in qua vires utique adeo sunt collapsae, in qua Os Ventriculi praemixta humiditate exsoluitur, viuuntur hisce medicamentis calidis ex pyrethro, pipere, pulpis caryocar aliisque auxilijs non modò attrahentibus, sed siccantibus.

Tandem reuulsio facienda est per cucurbitulas scarificatas, & non scarificatas, per sectam venam, ut monuit Gal. 7. meth. c. 11. ac confirmauit 8. de comp. loc. 4.

Debet quoque deriuari ad vias vrinae, ad nares, ad os, ad musculos per cauteria; aliquando etiam ad ipsos articulos, quanquam antea fuerint dolores affecti. Habetis Galen. 7. meth. ca. 11. sic disputantem. considerandum est, an pars mittens humorem ad Ventriculum sit ignobilior parte suscipiente, an verò sit aque nobilis: si locus mittens sit ignobilior, dicit Gal. attrahendam esse materiam illam ad partem ignobilem. itaque si Dolor Ventriculi prouenit a Doloribus Arthriticis, Medicus non verebitur relegare Dolores ad primum locum: si sunt aque nobiles, studendum est vtriusque corroboracioni.

Difficilis admodum est curatio Doloris Ventriculi, facti à materia in tunicis impacta, quando quidem huiusmodi materia neque vomitorijs, neque dejectorijs, neque clysterijs, aut suppositorijs, vno verbo, non facile reuulsione cedit: & quod maius est, per continuos Dolores utique adeo vires deiciunt, ut quae conueniunt, vix admitti possint.

Idcirco cū calida existente materia adsit scopus mittendi sanguinis, nihilominus & vehementia doloris, & vix languor plerumque hanc venæ sectionem prohibent, id vobis manifestum fiet, si Galen. legas 9. meth. c. 5. sub h. 1. ad Glauc. 14. circa m. ubi scribitur nimia sensibilitate Oris Ventriculi a morbo facto ab humore bilioso, à diu differendam esse venæ sectionem, quamdiu affectus ille perdurauit, sed ubi humores tunicis sunt impacti, Dolor nunquam desinit, nisi prius

A excitetur aluus, & euacuetur.

Euacuatio autem ut dixi admodum difficilis est, idcirco in hoc casu si febris urgeat, ut plerumque, urget, Cardialgia autem impediatur, necessarium est ante sanguinis missionem Os Ventriculi robore intrinsecis, & extrinsecis remedijs. Intrinsecis, ossa panis intincta vino granatorum, vel, ut fecit Hippoc. 1. Epid. 2. polenta succo granatorum excepta, & subacta. Extrinsecus autem aut absinthio vino aliquo austero, aut oleo de citonij, vel oleo rosato, omphacino.

Reborato Ore Ventriculi, si ita postulet morbus, ut scaturiat vena siue superior, siue inferior, ut alia docui, non sunt quidem in hoc casu pretermittendae ceterae reuulsiones.

Sed hoc moneo, ne diu in illis insistatis, quandoquidem impacta materia non cedit reuulsione, vires concidunt.

Itaque post haec deueniendum ad remedia, quae impactam materiam in tunicis consumant. Galenus, & ceteri Medicinæ scriptores, quantum potui ex multis colligere, non distinguunt inter calidam, & frigidam materiam, imò verò Galenus ipse ad hanc materiam tunicis impactam etiam biliosam probat vsu aloes, & hieræ simplicis, quae tamē sunt calida & sicca. Hoc potestis legere apud Gal. 7. meth. 1. com. per loc. 2. 6. de tued. valet. 10. Ego verò distinctione opus esse iudico, in materia calida placent mihi huiusmodi Rotulae.

Recipe rhabarb. elect. matur. puluer. drach. ij. cornu ceru. vss.

margar. prepar. an. drach. i.
saccari dissol. in aq. ros. q. s.

D M. & s. confect. in rotulis exhibeantur drach. iij. duabus, vel tribus horis ante cibum.

Idem praestaret, sed fortius, pulvis ipse rhabarb. & cornu cerui vss. insimul mistus absq; saccharo.

In materia autem frigida conuenit non modò vsus pilularum ex aloes, aut ipsius hieræ simpli; verum etiam pilularum alephanginarum drach. j. Interim quoque potest haec materia paulatim exsiccari hac potione in materia quidem frigida.

Recipe Comar. absint. M. i.

Spica. Calam. arom. squinantib.
Menth. sicca an. ss. s.

Coriana. prepar. vnc. ii.

Incidantur incidenda, contundantur contundenda & infundantur in vino albo, modicè adstringente per dies tres.

Huius vini exhibeantur quotidie vnc. ii. sed ante vinum accipiant Rotulam vel ex diatriopipereo, aut ex diacymino, aut ex alio simili.

Si materia est calida, vinum debet eligi pauciferum, & adstringens, in quo infundatur absinthium, sed cetera praetermittantur.

Extrinsecis quoque digerit potest haec materia, si mentis illis, de quibus memini in praeterita lectione in sermone de Dolori ex Flatu.

Haecenus de Euacuantibus, transeo ad secundum caput, quod est de Epicrasticis de mitigantibus acrimoniam humoris: haec vel intrinsecus, vel extrinsecus apponuntur. Intrinsecus vel sunt alimenta, vel medicamenta. inter alimentum est oriza, alyca, pūsana, ferculum ex farina amyli,

amyliis pinguis, butyrū, ac, em alio vel se n -
num mel inuim, vel amygd. luleum in cerebelli, &
podes animalū, aliaquid genus vātuosa, & en-
ptastica, & quanquam lactis vsus videatur febrili-
entibus suspectus, Hippo. tamen, ut noſtis 4. aut.
7. multas praebebat in ardente febre lactis hūmi-
nas, & quanquam id potius loco med. camenti ex-
hibiturum fuerit, nihilominus salinum lac, ubi fe-
bris sit vsq; adeo intensa & ardens, poterit de lo-
co alimentū, & medica. menti tuto praeberi, sit ita-
men suspectum: Sunt alia, quae rursū praeberi pos-
sunt, est serum ipsum, est aqua non tantū in frigi-
da, sed etiam, ut consulti Galen. 1. e. met. c. 14. ali-
quando etiam arte refrigerata. Aqua igitur ista
frigida, seruatis legibus a Gale. propositis 2. met.
5. momento temporis Cardiaigram sanat, quod
si quisquam frigidam sustinere non possit, ut an-
tea dixi, adest serū, item aqua destillata, aut aqua
aliqua cocta coriandri, aut mallice alterata, & si
vires non consentiunt, est tandem ipsum ius vel sim-
plex vel alio modo alteratum, prout variū fue-
runt humores.

Extrinfecus demulcendus est hic humor, ad C
quem finem multa faciunt. Primum in frequen-
tius est placenta, seu fricata, vū vocant ex 2. aut
3. ouis, in fluxione calida cum oleo rosae, aut me-
linonū frigida cum oleo de mentha, aut mastic-
ino. Idem praestat omentū prædictis oleis imbu-
tum. Proter quam causam practici in hoc casu
non deuenerint ad animalia exentera, ad pul-
mones calidos, ut aliquando in Phrenitide face-
re consueuerunt, signorū, cum nihil sit præsturi-
us, nihil efficacius ad demulcendum inordace n
succum, & digerendam moderatē materia, his
ipsis animalibus, aut pulmonibus.

Illud autem sit vobis perpetuum, nullum epi-
cera istiusq; medicamentum intrinfecus, aut ex-
trinfecus apponendum sine admissione adstricto-
ris, nam Ventriculi robur extoluitur. & fluxio-
nes concitantur, qualia sint adstrictoria, nunc in-
te Higenis, nam post epicerutica, & euacuantia ad-
stringendus est Ventriculus quandoque frigidis,
nonnunquam calidis medicamentis.

Frigida sunt succus granatorū, thibes, agresta,
& alia de quibus in Syncope.

Calida, mastix, absinthium, spica, calamus a-
romaticus, aloē, &c. ex quibus confici possunt ex-
terna, & interna medicamenta.

DE Curatione Inflammationis Ventriculi. Cap. VIII.

Difficillimam, aggredior curationem Inflam-
mationis Ventriculi, quae quidem varias ha-
bet intentiones pro materia, inflammationē fa-
cientis, varietate, & pro vario inflammationis tē-
pore, in principio enim, ut noſtis, repellere est ne-
cessarium, in augmento repellentibus dilucien-
tia quaedam sunt miscenda, in statu potius dige-
rendum quā suprimendū, sicut in dechnatio-
ne febris digerentibus vitendum, non praetermis-
sam adstrictoris, ut robur Ventriculi conser-
uetur: & haec quidem locum habent Inflamma-
tione ad resolutionem tendente: quandoq; omis

A suppurata, nonnunquam induratur. Esto igitur
si Inflammatio non legitima, & ea quidem in prin-
cipio, repellente ante omnia opus est, non diu
vertabor in his reuellentibus, dixi hactenus quae
sint istiusmodi, teres, suppositoria, frictions, ligatu-
ra, cucurbitulae.

De Sectione Venae.

Sectionem venae, aut ex cubito, aut ex infernis par-
tibus, seruata illa conditione, de qua heri mē-
tionem feci, fiatiente lectem venam Os Ventri-
culi roboretur, si valde langueat, si Lipothymia,
aut Syncope imminet.

Quod ad reliquas pertinet euacuationes, vom-
itoria in hoc casu nunquam sunt eligenda, haec
prohibuit Gal. laborante Ventriculo 13. meth. ca.
1. acceptiq; tota Medicorum schola, quā iam
Rhaſes, qui in 5. Continent. prohibet vomitū, in
Diffusionibus concedit, vel quod error sit in tex-
tu, vel quod vomitum praecipiat in Inflammatio-
ne iam suppurata, ut disrumpatur abscessus.

Vomito-
ria impro-
bantur.

De medicamentis.

De medicamentis quoq; maxima est dubita-
tio, nam valida omnia medicamēta, eo quod
trahant humores ad Ventriculū, sunt reiicienda
est haec sententia Gal. 13. meth. 1. Ventriculo &
intestinis laborantibus per has partes non est eu-
acuandum Proponunt Arabes lenientia quae sū,
praecipue cassia, & myrobalanos, sed quibusdā
cassia improbat, propter laxitatem: nam laxa-
us meatus, facilius confluunt humores: estq;
hoc medicamentum propterea contrarium illis,
quae in principio admodum strantur, quae debent es-
se repellentia.

Myrobalani aliter quibusdā suspecti sunt pp
insignem adstrictionem, dicebat, n. Gal. 8. de cōp.
local. 2. in materia, iam tunc imbibita, maximū
ex adstrictoris noxam inferi. Ergo tamen
vitūq; hoc medicamentum, vel aliud eiusdem
facultatis, rursū praeberi posse mihi persuadeo, e.g.

Recip. flor. cass. non. ext. vnc. i.

myrob. citrn. pulueriz. drach. ij.

aut pulp. phamarin drach. ij.

M. & cum lactato f. boli.

Acrius in hoc casu praebet serum, sed parū &
sepe. Placet mihi vsus seri, dummodo alteretur
aliquo medicamento adstrictorio. Non prepara-
tur cum oxymele, nam acetum ex sententia Gal.
2. de comp. loc. 1. omnibus inflammationibus,
Phrenitide excepta, est noxium, preparetur itaq;
cum acido citri, vel limonum, & in eodem sero
ad conseruandum robur Ventriculi ad reprimē-
dam fluxionem incoquantis absinthii commoda.

Hoc viebatur Gale, ad bilem reprimendam
6. de tuend. valet. c. 10.

Quod ad Repellentia, quae non vacuant, ex-
terna & interna proponuntur ab omnibus in ini-
tio refrigerantia & adstrictoria, ego verō existi-
mo in his casibus semper aut absinthium, aut
spicam, quanquam fluxio sit calida, admiscenda
esse, in hoc igitur casu, quantum ad localia per-
tinet agendum, sicut scribit Gal. se aliquando

K 2 egito

egile 11. meth. 16. ut scilicet reprimantibus quædam digerentia, sed tamen robur Ventriculi conservantia, admisceantur, g.e.

Recip. ul. rosar. aut mellin. vnc. i.

de ab. sint. aut mostic vnc. sem.

Aut potius accipere pulpani cyon. coctā in aqua, deinde verò illa imbuere in oleo de absinth. aut masticino. Gal.iple etquebat cyonem in aq. & absinth. in oleo, deinde admiscebat oleum ad uiz. & post coctionē viebatur oleo in eundem v. lūm accepit myrobalanorum succum coctum in aqua, & expressit, simul cum oleo de absinthio: B aut ē fomentum ex decocto rosar. labruscæ, balau. stor. cyonior. & absinth. in vino aultero.

Hæc omnia conueiunt in Inflammatione, quando nos non possumus in principio distinguere.

Et propterea non accipiat Arabum consilia, qui ipsi Ventriculo non solum lactucam, endiu. sed & succum papaueus exhibent actu frigida.

Errores sane, ut arbutor, non admittendi; Pars enim hæc tā præcipua, & vniuersi corporis promptuarium, non est vq; adeo refrigeranda. Paulatim admiscenda his medicamentis digerentia, sunt autē hæc digerentia, spica nardi, radix ireos, & chamomelum, & propterea olea etiam ex his confecta, chamomelinum, nardium possunt prædictis misceri rosaceo & mellino, possunt etiam ipsæ radices, aut herbes, siue flores in fomētis addi.

Aduentante statu vobis considerandum, an in flammatio ad resolutionem tendat, id quod cognoscetis ex febre, & symptomatis valde minutis an potius ad suppurationem, in quo casu febris, & rigor repetere consueverunt; an fortē induretur id quod cognoscetis, quia etiam si febris sit imminuta, symptomata non deficiunt, grauitas D Ventriculi, inappetentia, vomitus, & alia id genus.

In hoc casu unico auxilio, sed vario modo composto, volo ut omnibus satisfaciatis: est autem emplastrum ex meliloto,

Si inflammatio ad resolutionem tendat, huic emplastro volo ut addatis crocum, myrrham, cinamomum, spicam, & absinth. puluerizata.

Si in abscessum conuertatur inflammatio, huic emplastro addatis buryrum, rad. altheæ coctas, & per cribrum transmissas, & folia malue cocta: & si E disruptio inter, addatis etiā carycas coctas & cotulas, sterces columbinæ, & aliquid saponi nigri.

Quod si indurata fuerit inflammatio, addatis mucus sem. maluar. alth. ol. amygd. seruata prior regula, ut scilicet hoc etiam tempore, & in quacunque intentione, adstrictoria quædam propter Ventriculi robur admisceantur.

In eundem finem extrinsecus quoque ad proportionem medicamentorum interna medicamenta exterioribus proportionē respondere debent, que ideo circa intra conuenit succus granatorum, cyoniorum, rosarum, quibus admiscere oportet aliquid pulueris absinthij, aut spicæ, eligatur autem absynth. ponticum; nam illud commune nimis amarum & calidum est.

In augmento augeantur digerentia, ita tamen vineque saccharum, neque mel in hunc usum accipiantur; omnia enim dulcia in inflammationem augent, & propterea Gal. 11. meth. 19. in Inflammationibus Ventriculi & Iecoris mulsam prohibet, & Rhales noster in textu quoque mellis usum interdicit.

A

In statu si ad resolutionem tendat Inflammatio, exhibeatur frequenter decoctum ex squinantho, spicæ admisceantur radices diureticæ, tenuiculi, petroselapii, asparag. Detur quondie aut alternis diebus drach. i. spec. hieræ, aut pilul. alephang. vel aloes; aut exhibeantur trochisci de spica, descripti a Rhale in textu. Præbeantur autem aut in vino albo non adstrictorio, aut ex decocto digerentis. sed si ad suppurationem tendat, frequens sit vsus decocti ex malua, althæa, carycis, passulis, fenugræco, addita porruuncula absinthij, aut spicæ pro seruando robore Ventriculi.

Alimenta debent esse pauca & tenuis substantiæ, dicebat Gal. 10. meth. c. 5. quod confirmavit primo ad Glau. 14. & 12. meth. 3. & 6. in Inflammationibus Ventriculi & Iecoris unicam salutis spem esse virium robur, Inflammationibus harū partium ex alimento semper incrementibus: idcirco si vires consent, nutriantur vsq; ad statum sola aqua bordei, aut ad summum colata pulana aut emulsi, sem. melonum: si vires hoc non permittant, ad alia confungiendum alimenta, sed hæc prædictione, agrum moriturum.

Quod si quis multo assumpto alimento superstes euadat, abscessum effugere non potest.

Itaque quamprimum distrumpere abscessum est opus. Nō possum saus mirari barbaros medicos, qui tutiorem existimant abscessus ruptionem ad exteriora quam ad interiora, cum tamen ipsa doceat Anatome, egoque propria comprobarim experientia, disruptum abscessum in exteriori ventriculi tunica saniem effundere in illam capacitatem ventris, quæ est inter peritonæum, & intestinum, ubi aqua hydropicorum colligitur. Locus sanè, ex quo sanies educi nequit, & in quo vlcus insanabile remanet: hoc vidi in Bernardino Trevisanomeo locero, qui septimo die habuit talem abscessum, hinc factus fuit paralyticus, & mox obiit, quod si distrumpatur abscessus in membrana interiore, minus est malum, quia sanies per aluum & vomitum educitur, vlcusque ab assumptis medicamentis sanatur.

Itaque disruptio est tentanda compressione ventris, irritando vomitum, disruptio abscessu cum remaneat vlcus, sanationi vlceris incumbendum.

Vlcus verò, ut de omnibus agamus, variā sortitur curationem, pro varia sui forma; nā superficialis, & mundum solis astringentibus & siccantibus sanatur, sordidum & profundum absterforiis, mundificantibus & siccantibus, & carne replentibus.

Ratione loci aliqua etiam est diuersitas Vlcera enim Oris Ventriculi & quia hæc pars est valde sensibilis, & quia in se nō retinet medicamenta (præterlabuntur enim) difficilimè sanantur, ut rectè docet Halen. 6. meth. c. 4. quæ sunt in aliis membranis, citius curari possunt.

Supponamus igitur superficiale, vlcus Os Ventriculi occupare; sanabitur sacco rosarum, granatorum, tribes, aut decocto rosarum, balau. stor. corucum, granatorum; sed multo melius est co-

ponere

ponere medicamentum, quod possit aliquandiu A
ipſi partu aſſerere glutinoſum: & erit tale.

Recipe Gummi Arabici.

Tragacanth. an. drach. ij.

Amyli. drach. ij.

Puluer. roſar. acacia.

Hypocyſſidos.

Boli Armeni orientali an. drach. i.

Succ. granat. q. ſ.

Miſce, & fiat miſtura mollis, quæ paulatim
deglutienda in ore detineatur.

Sed ſi vlcus fuerit ſordidum, abſtergatur. in B
hunc uſum facit uſus ſæpequens aq. mellis, ſive
aqua ſit hordeacea cum integro hordeo parata,
ſive ſimplex. Ego in hiſ caſibus nihil inuenio
præſtantiuſ aqua Teſtuciana, aut ſimplici, aut cum
melle roſato commiſta mundat, & exſiccatur, ac
conſequenter carne replet. In defectu aq. Thec-
turianæ eligi poteſt alia aqua thermalis, quæ mi-
neram habeat ſalfam, aut ſaltem aluminofam,
quod ſi neutra, adſit poteris arte factam ſic præ-
parare.

Recipe Aluminis drach. i.

Piloſell plantag. polygon. an. ſſ. i.

Scabioſ. M ſ.

Mell. ꝛnc. ij.

Bulliant ſimul in aq. lib. 8. uſq; ad conſump-
tionem lib. 1. & facta colatura ſer. erit ad uſum.

Facta abſterſione ſiccandum eſt vlcus. Auic.
miris laudib. hieram extollit, quæ mihi etiam pro
batur. Iuuabunt quoq; hoc tempore trochiſci
de ſpodio, de charabe, & terra ſigillata, potentis
drachere horum trochiſcorum ſingulo mane ſcrup.
ij. & ſtatim ſuperbibat decoctum aliquod exſic- D
cans, ſive conficiatur ex ligno ſancto, ſive ſalfa,
ſive ex rad. chin. ex fol. oliu. ex ſcabioloſ. beton. a-
grimoni. aliſque id genus.

DE BULIMO ex Galeni ſententia.

Cap. IX.

Hæc pro curatione vlcis ſatis quidem eſſe
poſſunt, non tamen ſatis ſunt pro ſanando
Oris Ventricle affectu, qui ipſum quoq; cor in co-
ſenſum trahit, & Syncopen inducit. Dicitur a Græ-
ci *Βελιμος*. Gal. eo, quod hic affectus Syncopen
inducit 1. ad Glauc. 14 Bulimon dixit eſſe Ani-
mi Deliquium. Cæterum natura Bulimi nihil
aliud eſt, quam indigentia, & imbecillitas ex ni-
mib; Oris Ventricle refrigeratione, eſt indigentia
omnium corporis partium, neque enim nutriun-
tur, quia alimentum ad illas non tranſmittitur.
eſt imbecillitas, quia tranſmittitur alimentum
extincta facultate appetere Oris Ventricle, nã
in huiusmodi affectu facultas appetens eſt pro-
ſus extincta, hinc decipiuntur illi, qui Bulimon
putant eſſe magnam famem, hos redarguit Gal. F
2. aph. 2. ſi Bulimon, inquit, inceperit, quidem
a fame, ſed deſinit in deiectionem Facultatis Ap-
petentis.

Cauſa immediata.

Cauſa autem eſt nimia Oris Ventricle refri-
geratio: ideo enim exſtinguitur Facultas
Appetens, quia nerui ſexu conjugationis, qui
Ori Ventricle inferuntur, à materia & inter-
perie frigidiſſima innatum amittunt calorem

& communicato hoc frigoris ſenſu per commu-
nes arterias Cordi, ſit Syncope, hinc iure Gal. 1.
de cauſ. ſympt. 7. Bulimon eſſe inquit, compoſitum
affectum ex impotentia, indigentia, imbecillita-
te, & refrigeratione, cuius refrigerationis cauſa
externa plerumque eſt; æt frigida, ut in hiſ, qui in-
ter faciunt perniuoſos montes; aliquando eſt uſ-
us ciborum refrigerantium.

De Bulimo ex aliorum quorundam ſententia.

DE Bulimi natura & cauſis hætenus ex Ga-
leni ſententia, cui adhæret Auic. Serapio, &
alij ex Arabibus.

Nunc autem, ut in ſcriptoribus tunc verſari
poſſis, de eadem eſſeptione ſub hoc nomine de-
ſcripta ex aliorum ſententia agendū, itaq; apud
Paul. Aet. lib. 2. c. 1. Bulimon ſignificat Magnã
Famem, ſed ſine Syncope, & Vomitione. Apud
Alex. Trallian. lib. 7. cap. 6. ſignificat Famem cum
Syncope, aliquando etiam ſine Syncope.

Datur præter hæc Caninus Appetitus qui Ma-
xima eſt Fames, ſed cui vomitio poſt aſumptos
cibos ſuccedit, & propterea cum varia ſint horum
omnium ſymptomata, vaſque quoque ſunt cauſæ.

Nam Bulimon ſine Syncope & Vomitione, ſed
cum maxima Appetentia, aliquando ſit ex nimia
venarum ſuccionem, & inanitione, ut in extenuatis
poſt longos morbos, in iſ, qui fluxibus laborant
vel alio modo propter vigilias, immodicam Ve-
nerem, exercitationem corporis aut aerem cali-
dum digeruntur.

Fit etiam aliquando ex maximi vermibus, ali-
mentum ſutripientibus, quos ſcribit Galen. lib.
de Theriac. ad Pitonẽ 15. Cõfirmat Alex. Trall.
lib. 7. c. 6. qui ſcribit aliquando exercitum vermem
longitudine cubitorum 12. qui Bulimum tuſtulit.
id ipſum confirmat Auic. & Nicol. Florentinus
ſerim. 5. c. 32. inquit, ſe Florentiæ mulierem vidit
ſe ſingulis horis comedentem, quæ accepta colo-
cynthide 100. & plures magnos eiecit vermes,
& curata eſt ab immodica appetentia.

Fit deniq; hic affectus aliquando ex Iecoris am-
plitudine, quod propterea facit cõtinuam à Ven-
triculo ſuccionem huius rei exemplum habet
apud Cornel. Gemmam 1. Coſmocrit. cap. 6. qui
ſcribit Mulieri Fameliæ poſt mortem inuentum
eſſe Hepar maximum, & pinguedinis lib. 20.

Fames autem illa Syncopalis Arab. vocata, quæ
Alex. Trall. Bulimon dicitur, ſit ex inſigni Oris
Ventricle caliditate cõtinuò, colliquante, &
diſſolvente humidum ſubſtantiale Ventricle,
ex quo ſit indigentia; ſed ſi quam primùm indi-
gentiæ non ſuccuramus, Syncope ſuccedit, præ-
cipuè verò, ſi quatuor illæ adſint conditiones,
quarum meminit Gal. 1. de cauſ. ſympt. c. 7. 1. Ca-
uſæ vehementia. 2. Oris ventriculi ſenſibilitas.
3. Arteriarum imbecillitas. 4. Cordis infirmitas.

Putant alij, ex humoribus etiam calidis & bi-
lioſis id fieri poſſe. Alex. tamen in calidam intẽ-
periem hæc reſert.

Caninus autem Appetitus ſemper ſit ex hu-
moribus acidis, ſive puuitiſis, ſive melancholi-
cis Os Ventricle adſtringentibus; hinc ſit, ut cum

K + non

non adfuit indigentia, inò potius Ventriculi plenitudo impetant quidem Ore Ventriculi contrictio, sed ut canes stium assumpta euomunt. Ex dictis igitur facile est vniuscuique Appetitus deprauatam naturam & causas dignoscere, & distinguere.

Signa Bulimi, & aliarum deprauati Appetitus Specierum.

Bulimi species à Galeno proposita hæc habet signa, corporis maciem & extenuationem insignem, venas exinanitas, pulsus paruos, tardos raros, refrigerationem totius, indigentiam cibi, & tamen ad assumenda cibaria sponte nunquam mouentur.

In Bulimo Pauli adest fames, sed sine Syncope & Vomitione, ut dixi, & si fiat ex vermibus, Arist. 1. de generat. animal. 19. huius magni vermis signum proponit, excrementa scilicet vermes cucurbitinos continentia.

Quod si hæc fames fiat propter indigentiam totius corporis, aut præcessit morbus longus, aut aliqua insignis euacuatio, quæ adhuc permanet aliquando, & corpus sensim ac paulatim reficitur: ubi autem adest vermis, etiam si copiosum adsit alimentum, corpus non reficitur.

Si id fiat ex amplitudine hepatis, naturalis erit hæc praua appetentia, & ad proportionem magnitudinis hepatis vniuersum corpus carne, & pinguedine abundat.

Syncopealem tamen non est difficile cognoscere; isti enim, antea dixi, cum primum elurunt, Syncope, incurrunt, nisi præsto sit cibus.

Caninam Appetentiam ex fame & vomitu cognoscetis, vitium vero acidus humor sit primum aut melantholia cognoscetis, ex signis superius à me propositis.

Prognostica.

Ex istis affectionibus fames Syncopalis, & Galeni Bulimos periculosa, & lethalia sunt.

Curatio.

Atque ideo in harum affectionum curatio ne quædam sunt agenda in Syncope; alia vero extra Syncope.

Quid agenda in Syncope, alias docui.

Extra Syncope, quia Bulimos Galeni sit ex impenita refrigeratione; fames Syncopalis, Bulimos scilicet Alexandri est cum insigni caliditate; illi occurrendum est caliditatis huic refrigerantibus, modera è adstrictorij.

Sint califica alimenta, & medicamenta.

Inter alimenta califica miva cyoniorum composita, cuius etiam meminit Galeus de comp. secundum loc. cap. 3. primum obtinet locum. Parari potest hoc tempore ex succo cyoniorum, & saccharo, additis cinnamomo, caryophyllis, pipere & gingibere. Pro diutioribus addere poteritis aliquid moschi & ambræ. Dialinapis est quoque accommodatissima alimentum materia. Vinum ex

omnium sententia generosum eligi debet, odoratum, optimum: carnes etiam condiri debent aromatibus propositis. debet fieri succus carnum aromatibus permixtus, Gelatinam vocant.

Ad proportionem alimentorum exhiberi debent califica medicamenta, aromaticum rosatum, diatrion pipereon, theriaca, mithridatica confectio.

Extrinsècè etiam fouenda est Ventriculi regio vino odorato, in quo ebulliant leui ebullitione absinthium, calamus aromaticus, mentha, semina coriandrorum, feniculi debent quoque adhiberi cerata, quorum vna hæc erit forma.

Recipe lign. aloes.

nuc. mosch.

caryophyll.

cinnamom. an. drach. 3.

olei de spica vnc. sem.

cera re, ina q. s.

M. f. Ceratum.

Curatio Famis Syncopalis ex intemperie Ora Ventriculi calida, absoluitur medicamenti frigidis, & adstrictorij, de quibus memini in tract. de Cardialgia, & quæ recensui administranda in principio inflammationis Oris Ventriculi, ad quæ confugiendum.

In Fame à magno Verme producta, quid agendum audietis in tract. de Vermibus.

Quod si Fames fiat propter insignem euacuationem, & corporis inanitionem, succurrendum est alimento crassioris succi, non facile alterabili ut est alica, & oriza, cutis & pedes animalium, caro bubula, aliaque id genus. Occurrendum præterea ipsi causæ digerenti: si fuerit nimia corporis raritas, balneis frigidis adstrictorij: si fuerit aeris caliditas, regio est mutanda. si fuerit aliqua insignis euacuatio, hæc suppressenda. de his suo loco.

Quod si fuerit Iecur magnum, nulla est curandi ratio, nisi ut exhibeantur alimenta duræ coctionis & modici alimenti, ut sunt omnia cochilia, omnia testacea, legumina, olera, placentalia.

In Appetitu autem Canino, quia maximam habet affinitatem huiusmodi curatio cum curatione Picæ Malacæ, idcirco simul hæc curatio est proponenda.

DE PICA ET MALACIA.

Cap. X.

Vocant Arabes Picam & Malaciam, Corruptionem appetitus. confundunt nonnulli has duas voces, quæ tamen sic distinguuntur, quod Pica sit Appetitus Corruptus tam in viris, quam in mulieribus, in paruulis & adultis. Malacia vero sit Præua Appetitua mulierum tantum utroque generis.

In primo Præui Appetitus genere aliquando inueniuntur, qui multum caloris comedant, ut referi Fernel. lib. 6. c. 3. alij delectantur lacertis, ut scribit Marcell. Donat. lib. 4. hist. mirab. c. 1. alij venantur araneas, ut scribit Cæsar Rhodig. lib. 3. antiq. lect. c. 17: alij denique delectantur carbonibus, gypso, aliisque extraneis, ut potestis legere apud Levin. Lén. 1. de occult. c. 6. apud Trincauel. lib. 7. c. 5. qui scribit, se aliquando vidisse puellam,

namque filamenta comedebat. Ego vidi Patavii A
poellam inter eos frequentissime comedentem.

In Malacia delectantur quidem aliquando præ-
gnantes rebus extraneis, aliquando vero delecta-
tur etiam familiaribus alimentis, sed usque adeo
avidè appetunt, ut si statim non accipiant, aut se-
tum interficiant, aut abortum faciant, aut fecum
stigmatè illo signatum reddant. Interficiunt aut
facta spirituum & sanguinis reuulsione ab vtero
ad ipsum caput propter continuam imaginatio-
nem. Videatis tres hujus rei historias à Ioanne re-
latas 2. tom. suar epist. 12. quarum unam refert B
Anton. Mizaldus curat. 78. cent. 7. Harum quo-
que meminit Marcell. Donat. lib. 4. hist. mirab.
cap. 1.

De Causis.

DE huiusmodi Prætorum Appetituum causis
varia est scriptorum sententia. Quidam
in acidis humoribus referunt, alii in salis: nonnul-
li in amaris: Ego paucis censeo esse multiplices,
in alijs alios, quandoque scilicet biliosos, magna C
ex parte pituitosos, acidos & melancholicos; om-
nes tamen corruptos corruptione quadam inex-
plicabili, & propterea cū disputant inter se scrip-
tores, fiantne huiusmodi Appetentia, propter si-
militudinem, an propter contrarietatem. Ego,
quanquam scio Rondelet. c. 14. meth. curand.
morb. & Io. loc. cit. voluisse fieri hanc appetentiam
propter similitudinem, ut humor acidus acidum
apparet, falsus falsum, & sic de singulis, non
possum tamen in hanc ire sententiam; nam Ap-
petitus Naturalis appetit, quidem simile; Viti- D
osus autem appetit contraria, hic verò vitiosus est
accedit, quod si quæ assumuntur, essent similia
illis, quæ sunt in Ventriculo, ex hac assumptione
augeretur appetentia ipsa tamen experientia do-
cet Appetentiam istam illis assumptis sedari ac-
cedit, quod si hæc usque adeo extranea, quæ assu-
muntur, non essent medicamenta eorum, quæ in
corpore, necessarium esset, momento temporis
insanabiles suboriri morbos, quis enim potest
animo concipere carbonem aut calcem supra
carbonem, & calcem injecta non maxima inter- E
re mala? & tamen experientia docet, istos & is-
tas innoxie hoc assumere, aut saltem multum
non lædi, itaque mea est sententia, quæ fuit etiā
Auric. Trincavel. & aliorum. hæc potius assumi,
ut sint medicamenta illius humoris, qui in cor-
pore continetur, & propterea expetuntur aliquā-
do tanquam manifestis qualitatibus contrariis, &
hac ratione, quæ bilem continent, acida appetunt.
Non ego mulierem biliosam, quæ toto eo tem-
pore, quo vtero gestabat, nihil aliud bibebat præ-
ter acetum, atque absque vlla moxa adhuc vivit. F
quæ verò humorem frigidum continent, atque
humidum, delectantur siccantibus, Calce & Gyp-
so, sed quæ extenduntur ad quædam particularia,
quæ appetunt certa, quædam & determinata
ut humanam carnem, vel quid simile, istæ quoque
humoris proprietatem inexplicabilem continent;
at contrarietas qualitatuum primarum locum non
habet.

Signa.

Cognoscitur facillè hic affectus ex ipsa rela-
tione, & causæ ex ipsamet appetentia varia
distingui possunt.

Prognostica.

Est hic affectus, si diu perduret, periculosus:
quandoquidem ad Cachexiam, ad Hydro-
pem, ad lapidum generationem conducit. Scri-
bit Nicol. Flor. serm. 5. cap. 36. mulierem quædam
prægnantem, quæ pipetis libras xx. comederat,
post partum incidisse in vlcus vteri, in profusio-
nem sanguinis, & tandem interuisse.

Curatio.

Curatio perficitur Vomitorijs, deiectionijs,
alterantibus, aut saltem siccantibus noxiā
materiam.

Vomitória eadem sunt in Canino Appetitu,
quæ etiam in Pica ac Malacia, oleum aut com-
mune, aut amygdalarum dulcium cum oxyme-
lite, in eo tantum differunt, quod in prægnanti-
bus non debent esse vomitória unquam valida,
in cæteris, si hoc non sufficiat, potestis præbere
drach. i. pulu. asari in ol. amygd. dulc. aut in iure
tepido, potestis ascendere ad succum raphani, &
quia agaricus est medicamentum & vomitoriū,
hoc tunc potestis uti vel infusione, vel in sub-
stantia, ad drach. i. Omnis facillimè paratur vo-
mitus post copiosum cibum ac varium.

Si ad vomitum non sint faciles, deiectionijs ma-
teria educatur. Docui in tract. de Dolo Ventri-
culi, quomodo una quæque materia sit educenda:
illud tantum addo in præsentia, in Pica in Appe-
ritu etiam Canino licere aliquando ad validiora
confugere, quæ in Dolo Ventriculi, prohibui-
mus, idcirco potestis præbere pro viriū robore.

Hiera Diacolocynthid. drach. ij. Vel
Diaphoenic. drach. ij. cū drach. ij. hieræ.

Vel

Pilul. Aggregatiar

de hieræ cum agar an. drach. sem. Af.

Et quanquam humor acidus, & insignis Ap-
petentia videatur prohibere usum aceti, ne augea-
tur Appetentia, at tamen plus potest humorum
crassities, & tenacitas, quæ requirunt detergentia
& incidentia, quàm ipse Appetitus, propterea li-
cet uti oxymel. scillitico, aut compos. ad vnc. i. &
sem. usquequo humores præparati, & integrè e-
uacuari fuerint.

Quod si relinquatur materia tunicis imbibita
hec est siccanda, propterea ad Picam & Malaciā
omnes Medicinæ scriptores exsiccantia commen-
dant, sem. rat. puleg. mentam siccam, absinthium,
spicam, calamum aromat. spec. hier. & alia supe-
rius proposita.

Sed ad alterandum frigidam intemperiem, &
corrigenam illam accliditatem, quæ est in caus-
sa, Canini Appetitus, victus ratio maximè con-
ducit.

IN hoc autem tota est posita, ut assumant pingua alimenta, oleosa, butyrum, pinguedines, cerebella, medullas: deinde verò vinum superbiunt generosum, & licet tantum cibi non assumpserint, quod possit multum sustinere potum, consulto proponunt Medicinæ scriptores post usum pinguium largam meri potionem, ut Ventriculus refrigeratus caleat, & aciditas, propter vntuositatem, remoueat.

Hinc Hipp. 2. eph. 2. l. Famem meri potio soluit. Causam verò potestis legere apud Plurarch. 6. quaest. conuiu. cap. 3.

DE DIMINUTA ET ABLATA APPETENTIA. Cap. XI.

TRanseo ad Imminutam & Sublatam Appetentiam, vocatur Græcis Απορεσία, vel Απορεσία, quæ duo nomina sic inter se distinguuntur, ut Απείρησι significet omnimodam à cibo Abstinentiam; Απορεσία verò auersionem quidem ciborum, sed non omnimodam abstinentiam. Petenda est distinctio ex Galen. 1. in 1. Epid. 29. Auersionem ciborum, quæ etiam Græci vocant Απορεσία, ut 4. eph. 17. colligitur. Hic affectus 3. habet proprias causas: quandoquid si quis prorsus abstineat à cibo, siue cibum auerse ut, id facit, vel quia nullus aut quia exiguus est suctionis sensus, vel quia non sit suction in Ore Ventriculi, vel tertio quia non sit corporis inanitio.

Causæ Famis & Appetentiæ.

AD Famem enim excitandam hanc causam ferre necessarium concurrere docuit Gal. 1. de caus. sympt. cap. 7. dum inquit quinque ad Famem faciendam concurrere, Inanitionem, Appetentiam Naturalem, Suctionem, Sensum suctionis, & Appetitum Animalem. Tria veniunt explicanda in hac serie, 1. quomodo ex inanitione fiat appetentia. 2. quales illæ sint veng, quæ faciant suctionem. 3. quomodo in assumptio cibo statim conquiescat famis.

Perlustrentur Andr. Laur. hist. & contron. anatom. auct. lib. 6. q. 17. pag. 453. editionis Francosurti in ethema Paltheimiana anno 1602. in 8. sine figuris, & Salust. Saluan. variat. de re Medica lect. lib. 2. ca. 4. & Dominus Leonius artis medendi sectionis 3. lib. 1. cap. 7 qui Lectorē doctē erudient solutionem dictarum trium questionum.

Causæ proximiores, & magis immediate Prostrata Famis.

TRes sunt præcipuæ causæ Deiectæ Appetentiæ, defectus sensus suctionis, defectus suctionis, defectus inanitionis. Mediatas omnium horum causas inquirere oportet.

Causa magis mediata.

Primò deficit sensus Suctionis, vel quia deficit facultas, vel quia læsum est instrumentum,

vel propter errorem externum, deficit facultas, aut quia non transmissa, aut quia dissoluta, non transmittitur in apoplexia, phrenitide, caro, quocunque delirio, & à cogitationibus spirituum ab Ore Ventriculi diuertentibus: dissipatur autem vel è veneno, vel à febribus ardentissimis calorem, & spiritum digerentibus. Instrumentum verò, nervi scilicet sextæ coniung. facultatem non admittunt, vel quia sunt obstructi, vel à rumore compressi, vel à nimia refrigeratione densati, vel ab alia causa adstricti. Error externus est copia materiarum, quæ Os Ventriculi repleat, siue si pituita vitrea, & frigida, cuius meminit Galē, 1. de plenitudineq. caput. vndecimo siue salsa, aut biliosa, per aliquam corporis colligant. nem. & humorum fusionem à capite, vel ab aliis partibus in Os Ventriculi transmissam, de qua Gal. 1. in 1. Epi. 39. Secundò non fit Suctio, vel quia Ventriculus sit nimis frigidus, & propterea parum digerat, venæ circa illum existentes non euacuentur, aut quia semper vberem habeat alimenti copiam, quam aliunde attrahat; quæ ratione Gal. 3. de nat. fac. 13. dicebat. Inappetentiā fieri ob nimiam lecoris plenitudinem, nunquam deficiente alimento ipsis venis Oris Ventriculi. Tertio, non fit Inanitio vel propter defectum caloris innati, siue ratione temperamenti, siue ratione ætatis, de quo Hipp. 1. eph. 13. Senes facillimè ieiunium ferunt, &c. aut quia excrementa confusa in corpore retinentur. Excrementorum verò nomine non modò intelligo feces, & urinam, sputum mucum, sudores, menses, & hæmorrhoides, verum etiam ipsam seminis retentionem, retinentur autem hæc excrementa vel obstructis, vel adstrictis, vel densatis partibus.

His accedunt aliz causæ extrinsecæ: aer frigidus, crassus, flatus austrius, otium, somnus prolixus, animi inæquor, & timor, cibi, & potus pinguis, oleosi, vntuosi, crassi succi pituitam in toto augentes propter quas omnes variz reperuntur historiz eorum, qui sine cibo vitam incoluim duxerunt, non modò dies, & hebdomadas sed menses & annos, sic enim scribit Athenæus. 2. dipnosoph. Amitam quandam Timonis singulis annis duos menses sine cibo fuisse, huius rei quæ plura volueris exempla eorum & earum, qui vitam etiam per annos sine cibo vixerunt, poterit legere Laurent. Iouber. in prima part. paradoxi 2. vbi & historias profert, & causas subiungit, propter quam nonnulli ad duos, decem, & plures annos absq; cibo vixerunt.

Præter ceteras Deiectæ Appetentiæ causas Auic. 13. tertii in c. de Destruct. Appet. proponit defectum humoris melancholici, qui supponit (quod etiam docuerat prima primi doct. 4. c. 1. humorē melancholicum ad excitandam Naturalem Appetentiam conferre, huius sententiæ fuit etiam Valles. lib. 1. controu. c. 20, qui id confirmat duplici argumento. Primo, quia naturaliter confluit melancholia ad Ventriculum. Secundo, quia acidi & austeri saporis est, qui vterq; Oris Ventriculi adstrictionem facit, & proinde Famem excitat: neque hoc negauit Gal. 1. de vs. part. 4. qui concedit succum melancholicum naturalem austum, & acidum,

Vide For tun. Li. cet de ijs, qua diu viuunt sine alimēto.

videndum esse, illumque naturaliter à Liene in Ventrículum transmitti ad retentionem & concoctionem alimenti.

Hæc sententia reprobatu à Fuchsi. in com. ad 7 cap. 1. lib. de sympt. caus. qui hoc potissimum adducit argumento: nullam esse venam, quæ ducat humorem melancholicum ad Os Ventrículi, inseruntur quidem in corpus Ventrículi, non autem in Os addit, consuiere melancholiam, ad ipsum Ventrículum non eo tempore quo fit Fæces, sed horis potius diuersis, quanquam hoc negat Vallesius.

Ex causis igitur relatis patet, non modò causam Defectæ Appetentia ipsius Cibi sed & Potus, liquando enim reperiuntur nonnulli, qui à potu abstinent per dies, menses, & annos, huius rei exempla habetis apud Athenæ. 2. diopos. cuiusdā Aristis Laponis, qui singulis vitibus, per 30 dies abstinebat à potu, non tamen ab eliquo rerum salutarium, & mingeat etiam.

Sed, ut breui omnia complectar, leuissimo negotio potestis colligere etiam causas immoderate Sitis: quandoquidem etiam si Naturalis Sitis sententia Aristot. 2. de an. 1. 8. sit appetitur frigidum & humidum, Vitiosa tamen sitis quandoque fit appetitus tantum frigidum, quandoque tantum humidum, aliquando vtriusque.

Locus affectus in Sitis præter naturam.

Locus affectus est semper Os Ventrículi, quod tamen laborat aliquando per consensum, nonnunquam per essentiam, & primariò. Consensus fit vel à lingua, fauibus œsophago, propter communem membranam Oris Ventrículi, & harum partium quandoque fit à Pulmonibus, & arteriis, communicata affectione membranis linguæ, & faucibus; aliqua fit ex lecore, mesenterio, intestinis, liene, vtero, renibus, potissimum in affectione, illa Diabetica vocata, atque ab vniuerso corpore.

Causæ Sitis præter naturam.

Causæ aliquando sunt caliditas tantum, quædamque siccitas tantum, nonnunquam calor cum siccitate. Est caliditas tantum propter errorem externum, propter præsentiam vel falsæ pituitæ, vel bilioli succi in Ore Ventrículi abundantis, aut propter falsos vapores, & ichores ab ipso ventre eleuatos, laborante hydrope ascite, rata est hæc Sitis species, quæ fit calido tantum, ut docuit Gal. 1. simpl. 30. habetque iam causas dictas. Fit ex siccitate tantum, quæ siccitas fit ex inanitione, aut ex errore externo. Inanitio fit per se, vel ex accidenti, per se in quacunque nimia euacuatione, & superpurgatione, siue vomitus, siue alii, vrinae, sanguinis vel per menses, vel per alias partes, seminis, ac sudoris, per accidens fit ex abstinentia à Cibo, & Potu.

Causæ extrinsecæ sunt nimia exercitatio, balneum digerens, vsus salterum, siue pisces sint, siue carnes, siue aquæ salinæ, ut marinæ, vigilie, moror, longa declamatio, aer siccus, præcipue si sit hiante excipiatu, ex calida & sicca intempe-

ne sit vel cum inflammatione, vel citra inflammationem, siue intemperies sit in ipso Ventrículo, siue aliis partibus propolis, aut in toto corpore, quemadmodum in febribus coniungit. Error externus hic quoque locum habet: vsus aromaticum acrum, vini generosi, præcipue si in eo aut Vipera, aut Diplas, ut scribit Gal. 1. de caus. sympt. 7. fuerit extincta. His igitur sic breuiter enarratis de causis ipsius Sitis, quod pertinet ad signa Inappetentia & causarum breuiter expediam.

Signa Inappetentia.

Si Inappetentia fiat, quia facultas non transmittatur, id facile cognoscetis, si patientes apoplexia, delirio aut alio simili cerebri affectu laborent: si dissoluatur facultas, aut adfuerit veneni suspicio, aut citra nunc adest febris ardens, & maligna, non fiat suctionis sensus propter neruos aut obstrucos, aut densatos, petenda sunt signa ex C. de Balimo: quod si non fiat suctionis propter defectum calidi non digerentis, isti sunt omnino torpidi, pigri, somnulosi, neque ad cibos, neque ad potiones feruntur, abundant spuito, vrinae sunt crudæ: quod si adsit pituita dulcis aut insipida copiosa, præter hæc signa habent etiam vomitum, aut nauseam, & subuersionem: quod si adsit pituita salta, Sim laborant sine oris amaritudine, & cum morsus Oris Ventrículi, sicuti præsentia bile sitis adest cum amaritudine, & cum morsu Oris Ventrículi: quod si non fiat suctionis, quia non fiat inanitio, facile cognoscetis, vel quia excrementa consueverunt retineri, cuius est densitas, corpus est plenum, vene sunt turgidæ, versantur in aere frigido, otiosi sunt, præcelsus victus ratio, quæ vel plenitudinem, vel cacochymiam, vel vitium inferre potuit.

Signa Sitis Immoderate.

Causæ Sitis variæ sic inter se distinguuntur, nam si fiat ex causa calida siue siccitate, à nimio Potu eduntur, & propterea distenduntur, & inflammantur, vel Potum vomitione, aut deiectione, aut per vrinas reddere coguntur, vitium verò hæc causa calida si pituita salta, an bilis, ex superius dictis potestis colligere; sicuti si fuerit ichor falsus, id ex hydrope cognoscetis: quod si fiat Sitis ex inanitione ex sola ægritudine, aut adstantium interrogatione potestis causam inanientem intelligere, siue sit euacuatio ventris, vel vomitus; vel sanguinis, vel vrinae, vel seminis, aut sudoris siue sit media, aut alia ex propolis causis. nec difficili negotio potestis intelligere, vitium causæ Sitis sit aliqua viscerum inflammatio, aut febris ardens ex putredine in venie communibus. Quæ hæc enim omnia sua habent signa.

Prognostica.

Itaque nunc ad prædictionem affectionum propositarum descendam. Quod ad sublatam appetentiam pertinet, illud Es sciendum tabuata Appetentiam ex facultatis dissolutione, siue fiat dissolutio ex veneno, siue ex febre maligna, omnium maxime exitalem esse, & patientem morti esse propinquum; hoc docuit Gal. 2. in 3. Epid. com. 3. Quod

3 Quod ad Sitim pertinet, et quae et non raro patientia deducit ad exitum quando ad ponere ventrem datur, et tunc ea imponere mouentur sic scribit Gal. 1. de caus. Sympt. c. p. 7. quidam Dysenteria obstruuntur in aqua non amā habere sunt curati. A. u. m. referuntur sicut ardens post aquam frigidam libenter epotam statim extinctus est quod idem variis exemplis confirmat Ant. Ben. u. de acmunda. c. 16. Amat. I. ubi. tom. 2. curat. 6. Forcell. 1. ubi. Med. ubi. 13. Scalig. exerc. 3. ad lib. Card. de tubul. & Marc. Donat. lib. 3. ubi. mirab. c. 6.

Curatio.

Quod ad Inappetentiam pertinet, si fiat ex humoribus putridis, multus & crudus, opus est purgatione per ventrem, trientibus, & incidentibus medicamentis. Conuenit in hoc casu vicia vice habere crynē fillu. vne. i. sem. compos. in pilul. vne. 1. M. hac de his coniecti potest per 4. aut 5. dies 4. horis ante cib. Interim si vomitus bene non succedat, acibus clysteribus agendum, aut pilulis de hiera cum agai. quae exhibeantur ad drach. alternis diebus Pro victu in hoc casu conueniunt omnia salia, ut pices salinorum, ut usacem, & properea aceraria ex uappibus, ex radice petroselin. & omnia aceto condita; quod si fuerit purita salsa, haec quoque aut vomituant clysteribus aut pilulis educenda, pilula sint de tribus cum rhubarb. nullis cum malicinis, veriusque sit drach. sem. Paulatim expurgare oportet: itaque alternis diebus praebantur hora 1. ante cenam: Syrupus autem in aceto simplex, cum aliqua portione oxymelini: quod si fuerit bilis, ipsa quoque aut vomitione, aut clysteribus est educenda. loco autem pilularum vitamini cassia tamarindis, aut rhab. aut pilul. de tribus cum rhubarb. Syrupi vero sint de acido citri, aut limon. de granat. vel alii similes, de quibus antea. Pro cibo in his casibus eligendi sunt intinctus, qui succos recipiant acidos, & aliqua ex parte incrassantes, ut prohibeatur fluxus bilis ad Ventrículum, propterea in hoc casu conuenit ille cibus, quam Gelatinam vocant.

Quod si adhuc intemperies frigida, propter quam nec multum digeratur, facultas quasi sopita excitanda est cibis quibusdam grans & caloricis, ut est confectio diaphani, intinctus viridis ex petroselin. aceto, pullaenis, & modico cinamomi: intinctus albus ex saccharo, cinamomi. & aq. flor. citri. Mihi vero, ut ingenuè dicam, nullus videtur intinctus magis in hanc rem accommodatus quam ille, qui fit ex alio, nucibus, & pane ture optimibuto, sed non admodum pingui.

Si vero non fiat inanitione, corpus est inanendum lecta venas, nec leuiss. sed pluries apertis hemorrhoidibus, repletis mentibus, citata alio, aut clystere, aut medicamentis: in quo casu conueniunt etiam medicamenta valida, promouendus est sudor, aut Laconico, aut exercitatione valida; si exanitione valide fieri non possit in ventralibus, fiat in nauicula, in curule lectus: si en-

que hoc possit fieri, adhibeatur frictio, inunctio calida, plicatio, seu appositio medicamenti ex pice, de quo nos plura in nostro libro de phenigmate, ita dem his in perandum est ieiunium; dicebat enim Gal. 5. in 6. Epid. 1. 7. le complures, qui dormire non poterant, vigilis sanati; alios vero in appetentes longa Inedia sanati.

Ex his facile iam potest colligere, etiam Siue curari etiam; namque si ex humoribus salis, aut bilis curatur sicut & generatio Appetentia ex hac causa, quae fit ex hydropexura, uel est sola praeparatione acis frigidi, quando quidem Potus illis nimis confert, itaque non inquantur, os claudum detineant & aerem frigidum imprecant. Hipp. 3. in 6. Epid. 3. 3. es claudere, sicut, aerem frigidum cum potu excipere, dum antea dententem in eis aut ledunt, aciem citius ystallantes pruni, vel cerasti, aut semulam si. et m. ex en uide de sem. in. p. 1. au albi & mel. excepta cum gummi Arabia & trahacantho.

Quod si fiat ex Inanitione, laus his potus concedatur, sed minime frigidus; ubi enim lacta est Inanitione, de hinc eandem inanitionem propterea facile exstinguuntur: habant ignis, aut aquam ferideam, aut vinum diuini.

Quod si intemperies sit calida & sicca, istis quoque suo loco, & tempore concedendus est Potus, et potestate frigidus, seu uis condimentibus, quarum meminit Gal. 9. meth. c. 5. atque interim totum corpus, & pars praecipua, quae calor & siccitas predestinatus quoque est refrigeranda & humectanda vel balneo aq. dulcis, vel epulhemate ex succis refrigerantibus.

Lenior autem Siue, quae fit ex causis quibusdam extrinsecis, ut aere calido, longo sermone, vel alijs causis leuionibus, quandoque sanatur somno, quandoque si fuerit in somno, sanatur vigiliis, ut docuit Hipp. & Gal. 4. in 6. Epidem. 23. aliquando etiam sanatur iussicula, ex qua humiditas quaedam ex capite in subiectas partes descendit, de qua Hipp. 4. aph. 54.

DE SINGULTU. Cap. XII.

EX affectibus Oris Ventrículi supersunt adhuc Singultus, Nausea, Subuersio, Vomitus & Cholera, de quibus omnibus meminit Gal. tanquam de affectionibus Oris Ventrículi, & de loc. aff. 6. 3. de caus. Sympt. 2. 8. de comp. loc. 3. Loque mur hodierno die de Singultu, qui Avyuer Graecè dicitur.

Natura.

Est autem motus contractionis velox & validus Ventrículi ex causa irritante. Dico esse motum contractionis, quia etiam post contractionem sequatur extensio, extensio tamen est reditus Ventrículi in statum naturalem. Contractio vero velox & vehemens est motus praeternaturalis, quo noxia deturbantur & excernuntur, dicitur velox ad differentiam Nauseae: dicitur vehemens ad differentiam, & Nauseae, & Vomitus &

tus, & Subuersionis; nam Singultus, vt optime docuit Gal. 6. aph. 39. cum depellere tentet materiam membranarum impactam, est motus validior, quam Vomitus, in quo excernuntur, quæ in cavitatibus continentur, cum dicimus esse motum ventriculi, intelligimus pouissimum exteriorem membranam illamque præcipue, quæ & Ori Ventriculi, & oesophago inhaeret. auctor est Galenus 2. de caus. sympt. cap. 6.

De causa proxima.

DE causa proxima insignis est controuersia scripsit Hipp. 6. aph. 36. Singultum fieri ex Repletionem & Inanitionem, sicuti & Conuulsionem. Gal. loc. cit. & 8. de comp. loc. c. 3. Singultus causam refert in humores, aut vapores irritantes. rei veritas est, Singultum neque ex Inanitione neque ex Repletionem tanquam ex causis proximis fieri. ratio est clara; nam Conuulsio, quæ fit ex Repletionem aut Inanitionem, non est motus compositus, sed simplex; nam ubi nervus vel exsiccatus, vel admodum repletus contrahitur, non amplius extenditur, nisi sublata siccitate, aut materia replente. Singultus autem omnis est motus compositus, primum, vt dixi, ex contractionem, secundum ex dilationem; ita que rei veritas est Singultum omnem fieri ex causa irritante aliqua, hæc verò aut est per essentiam in Ventriculo, aut fit per consensum; per essentiam est flatus vel vapor in membranarum, præcipue in exteriore, imbibitus; vapor autem potest esse aut aeris aut salis, aut acidus, aut veneficus, vel ex alia quapiam corrupta, & putrescente materia eleuatus; siue hæc materia sit cibus & potus, ex propria natura aeris, & prauus; siue in Ventriculo, corruptus, siue sit humor biliosus, melancholicus, aut pituitosus, aut sanies, vel sanguis extraneus. aliquando continetur hæc materia in tunicis, vel cum inflammationem, aut alio tumore, vel citra inflammationem, & tumorem; tunc autem tumor & inflammatio non sunt causæ Singultus proximæ, & immediate, quia cum continuus sit tumor, continuus esset Singultus, non tamen est; propterea ex tumore, flatus, vel vapor eleuatus est, qui ex terio

re Ore Ventriculi tunicam ad excretionem irritat. Fit per consensum tripliciter, aut communicata affectione, aut materia, aut per compressionem ventriculi.

Communicatur affectio, quando nervus sextæ coniugationis, Ori Ventriculi insertus, coafficiatur cum altera parte nervosa, & cum istis nervis copulationem habente. Sic scribit Arist. 3. probl. 3. ex Pulmonibus Singultum fieri, eo quod, vt docet Gal. 16. de vs. part. nervi sextæ coniugationis, primo inseritur in Pulmones, dein in Os Ventriculi. Pari rationem scripsit Hippo. 3. de morb. ex Pleuritide Singultum fieri, in eundem sensu docet Gal. posse intelligi Hippo. 7. aph. 3 in quietem, Vomitus, & Singultum cum rubore oculorum malum; indicat enim aut inflammationem cerebri aut Ventriculi. Pariter scribit Hippocr. 3. de fract. 49. ex luxatione coxendicis, aut alterius magni articuli Singultum fieri propter

commuacem nervorum passionem.

Secundus consensus fit communicata materia si ex inflammationem lecoris, transmittitur humor biliosus ad Os Ventriculi, qui Singultum facit, vt docet Gal. 7. aph. 17. ex illo patet fit Singultus communicata materia ex 7. aph. 10. ex toto corpore, vt in febre Singultuosa, cuius meminit Hippo. & Gal. 4. acut. 58.

Tertio fit Singultus per compressionem, quam vis Gal. non videatur huic causæ admodum assentiri, qui potius ex aliorum sententia videtur affirmare 5. aph. 8. & 7. aphor. 17. ex magna lecoris inflammationem Singultum, fieri comprimente lecore ipsum Ventriculum, nihilominus hanc causam confirmat exemplum à Fernelio productum 6. pathol. ca. 3. cuiusdam, qui per tres continuos menses passus est Singultum ex incuruata costa ventriculum comprimente nunquam sublato singultu, nisi blandè prius costa illa curuata atolleretur.

Singultus ex compressione

Causa præcatartica.

Sunt præter has causæ quædam mediata, quæ flatus aut vapores in ipsas tunicas impingunt. est aer frigidus receptus, aquæ potus nimis, etiam potus confertim assumptus, ciborum copia, intestinorum repletio.

Signa.

Cognoscitur facillè singultus, & causæ sic distinguuntur; si adsit vapor aeris, sentitur erosio, calor, & si humor fuerit, ex quo vapor eleuatur, biliosus, adest amaritudo, si acidus vel salis, iam habuistis signa in præced. lect. si fuerit in cavitatibus, vomitus excitatur, & statim desinit Singultus. Si in tunicis, adest Nausea cum, vel sine vomitione, sed affectum non sanante. Inflammationis & tumorum signa suis patent locis; si fuerit consensus ab alia parte propter communes nervos, facillè id cognoscetis ex affectu illius partis; nam si fiat ex Pulmonibus, aderit tussis, difficilis spiratio; si ex Pleura, aderunt signa pleuritidis, & sic de singulis; quod si communicetur vapor aut humor, pari ratione in spicere oportet: utrum iecur an lien, an intestina, an torum laboret corpus; accedit etiam in Singultibus; qui per consensum fiunt, longè esse interualla, exceptis illis, qui sequuntur compressionem; tandiu enim perdurat Singultus, quamdiu persistit compressio.

Prognostica.

ET quia vt dicebat Gal. in illo 5. aph. 58. & 7. aph. 17. non potest iecur ut inflammatum Ventriculum comprimere, nisi magna sit inflammatio, propterea Singultus ex hac causâ factus est lethalis, sicuti etiam lethali, ille, qui sequitur Voluulium, quandoquidem non fit ex Voluulo Singultus nisi maxima sit affectio, auctore Gal. 7. aph. 10. ceteræ omnes causæ minus sunt periculose. lethalis quoque est Singultus, qui fit per consensum

sum

sum alterius nervi convulsi, siue propter inflammationem, aut luxationem vehementem aut vulnus; ceteræ autem causæ non sunt admodum difficiles curari, ad quas me conuerto.

Curatio.

ET in primis, quod pertinet ad Singultum factum ex solo vapore, aut flatu, tria proponuntur remedia à Galin. 3. de diffic. resp. ca. 10. de quibus anteillum meminit Aristoteles 3. probl. 1. & 17. & ante Aristot. Plato in conuiuium sub nomine Erisimati Medici: primum est retentio spiritus, quæ iuuat coactio intrinsecus calore ad dissipandum flatum vel vaporem: secundum est ablutio oris aq. frigida facta; & ego sæpius hunc consueui hoc remedio sanare; Singultum ex humoribus vel vaporibus acerbis: id ipsum facit sorbitio eiusdem frigida sensim facta. tertium est sternutatio, cuius meminit etiam Hippoc. 6. aph. 13. quod si præter vaporem adsit humor in cavitate Ventriculi, Vomitus est eliciens: si fuerit in tunica, vltus hietæ, ælephanginarum, vel aliarum cossi milium maxime conducit: quod si contumax fuerit Singultus, ad fortiora ascendendum, & si materia fuerit acris, eligenda sunt medicamenta, quæ simul & semel acrimoniam obtundant, & penetratiosum medicamento tribuant; nam materia est impacta in membrana. Opus est etiam medicamento digerente, & per vias deriuante propterea Gal. iure op. 1. 3. de comp. loc. 3. laudat in medicamentum Alecepidis, quod constat ex opio ad contundendam humoris acrimoniam, ex costo propter penetratiobem, ex asaro propter vim diureticam, ex spica, &c. propter facultatem digerendi, datur drach. i. aut ex vino, aut in humoribus valde calidis ex aqua in eundem usum recipi potest philonium, aut theriaca recens, aut pilule de cynoglossa, & sanè ista quamprimum sanant Singultum, datur drach. sem. & si humor sit frigidusculus, his medicamentis addan scrup. i. aut scordij cretici, aut dictamni, vel pulegii, vel asari, quod si humor sit tantum frigidus, & propterea singultus fiat potius ex flatu, nihil præstatius castoreo, deus drach. i. castorei, valet quoque mithridatica confectio ad drach. i. diacymium, diatriopipericon.

Neque internum exteriora sunt prætermittenda, ex multis hoc vnum est efficacius ceteris; sponsa acetosa acerrimo imbuta, in quo ebullierit castoreum, pipet, sinapi, pulegium, & asarem, adhibeatur ipsi Ventriculo adhuc calida, & frequenter foueatur locus ille.

Interim reuulsoria quoque administrentur, sunt quædam mulierculis familiaria quæ multum iuuant; vngue comprimere extremitatem in minimi digiti, aut ligare, animum distrahere, & alio auertere, sicut faciunt mulieres puerulis, exenata alicuius rei admiratione.

Quod si fiat Singultus ex icore comprimentis, lethalis est, ut dixi, sed tamen minus affligentur patientes, si super latere dextro decumbant. Vbi coitit sit incuruata, illa sensim & paulatim in suum locum restituenda & reducenda.

DE SUPINITATE, INVERSIONE VOMITU, ET NAUSEA. Cap. XIII.

Non admodum dissimili ratione ab ea, quæ nuper proposuimus, sanantur tres affectiones mutuo se consequentes, Supinitas, Subuersio & Nausea, duæ priores affectiones sunt symptomata facultatis retentricis, tertia est symptoma facultatis expultricis, auctor est Gal. 3. de caus. sympt. 2. & lib. de diff. sympt. 4. distant hoc inter se, quod Supinitas sit complexus ciborum imbecillus, Subuersio sit complexu ciborum deprauatus, & propterea utraq; affectio sentitur tantum assumpto cibo.

Causæ.

Funt isti affectus aut per essentiam, aut per consensum, aut ex errore externo per essentiam sit Supinitas & Subuersio, vel ex intemperie humida, vel ex humore pituitoso aqueo, irrigante Os Ventriculi, sed sine putredine, aut alia corruptione. Gal. 8. de comp. local. 3. possunt tamen reliquæ Ventriculi tunice prauis humoribus reddere, hinc dicebat Galen. 6. de loc. aff. 1. in Supinitate & Subuersione Ventriculi tunice (non loquitur de Ore Ventriculi) esse humore melancholico acido imbutas; at verò in Nausea Os Ventriculi aut multa abundat humiditate, aut etiam corrupta: & quando multa abundat humiditate, illa potest induci ab alimentis quibusdā, ut usu cerebri, aut medullæ, cuius meminit Gal. 3. de aliment. facult. 8. & 9 quando est corrupta, corruptio potest esse ad nidorem, & ad acidam, 1. de lec. aff. 4.

Nausea & Vomitus in eo tantum differunt, quod Nausea sit motus quidam irritus, ad quem nulla succedit excretio; in Vomitu autem, quæ in cavitate Ventriculi continentur, educi conluerunt, causæ verò cum utrisque communes sint, idcirco ab ipsa Nausea, de qua dixi in superiore lectione, statim transeo ad Vomitum.

De Causis Vomitus.

Est Vomitus vel propter imbecillitatem facultatis retentricis Ois superni Ventriculi, aut proptere expultricem irritatam, de causis imbecillitatis retentricis iam satis dictum est; sunt enim illæ, quæ Supinitatem, Subuersionem, vel Nauseam inferunt, expultrix autem facultas mouetur ad Vomitum, vel per essentiam, vel per consensum, si per essentiam, hoc tripliciter fit, vel ex pondere, vel ex mole, vel ex motu.

Pondus est materia multa, & grauis, contenta vel circa Os Ventriculi, vel in cavitate, circa Os Ventriculi, quando oclusum fuerit, vel ex tumore, vel ex carne, vel ex callo, aut alia cõsimili causa, huius rei exemplum habetis apud Fernell. lib. 6. pathol. ca. 1. Quæ continetur in cavitate, aut ibi gignitur, aut retinetur, vel transmittitur, vel attrahitur, generatur vel pituita, vel porracea bilis ex ciborum prodictate, ex xlu brassicæ, beatæ & fructum, est sanguis vel per diuresin, vel per anastomosin venarum Ventriculi, aut arteriarum

in caui-

in cauitate collectus: sunt aliquando lapides, de A quibus dixi in capit. de Dolo Ventriculi. Non transmittitur autem, vbi Pylorum, aut intestini duodeni, aut ileon, vel mesaraicae ocluse sunt. vel à carne, vel à callo, vel abscessu, vel inflammatione, vel alio tumore, qui transitum alimenti impedit: huius rei exemplum habetis apud Ant. Beniuen. de admir. c. 32. 36. & 37. Gal. 3. de caus. sympt. 2. cui ad stipulatur Aui. 13. tertit. 5. c. 10 vbi proponunt Pylori occlusionem ex carnea substantia. Colligitur per transmissionem tertio, à iecore, à liene, ab intestinis, ab utero, à cerebro, à toto corpore. A iecore quidem mittitur bilis flaua, pullida, crocea, eruginosa, aliquando sanguis, vel qui a iecore fit calidius, vel quia sanguinem ab utero suscipit propter retētos mēses, ab hæmorrhoidibus, p p suppressam consuetam euacuationē; a toto corpore vel p insignem plenitudinem, vel propter membrum mutatum. cuius excretionis meminit Gal. 3. de caus. sympt. cap. 2. & 5. de loc. aff. 5. à liene similiter transmittitur vel melancholia, vel sanguis niger; quandoque mittitur à mesaraicis, præcipue vbi factus sit aliquis cruentus abscessus; à capite transmittitur ipsa pituita; à intestinis quandoque humores, quandoque excrementa ipsa, vt in Voluulo contingit, quinimo aliquando partim ex transmissione intestinorum, partim ex facultate attractice ventriculi que iniiciuntur per inferiora, clysteres scilicet quandoque vomitu eliciuntur, auctor est Gal. 3. de caus. sympt. 2. sed quod mirabilius est, aliquando ipsa suppositoria integra & immutata per vomitum fuere eiecta, videatis historiā relatam à Matthæo de Gradib. com. 5. lib. 2. ad Almanfor. Valeriolad 3. de sympt. caus. 2. Has ob causas fit Vomitus ex pondere.

Fit etiam ex Mole, quando scilicet Ventriculus non potest extendi ad amplitudinem rei contentæ, non potest extendi propter triplicem causā, vel quia dolet, siue ex vlcerē, siue ex alia causa; vel quia comprimitur aut à iecore tumido, aut liene, aut mēsentērio, aut omento, aut quia est nimis angustus. Angustia verò est naturalis aut præter naturā, de naturali meminit Gal. 2. art. Med. c. 71. præter naturā, quia vel ex atrophia, vel ex tumoribus. Atrophia sequitur siccam intemperiem, aut diuturnum ieiunium: Tumores autem sunt multiplices.

Morsus est causa Vomitus, fit autem hic morsus à materia vel acri vel salsa, vel acida, vel amara, aliquando fit à Vermibus, & ijs variis. Scribit Beniuen. se quandoque Vermem erucæ similem, pituita inuolutum vomitu eiectum vidisse, c. 88. Petrus Forestus, & Ambrosius Paræus, ille quidē lib. 8. suar. obseruation. 19; hic verò lib. 24. sui operis 19. scribit, quādoque eiectos vermes scarabæis & erucis similes. Alia plurima, eaque præter omnem quidem rationem, & naturæ conditionem euomuntur, quæ ad maleficia referuntur, sunt clauus, acus capilli & alia quanquam capillos quidam Medici non referunt ad maleficia, vt potestis colligere ex Nicol. Monardes lib. 3. de simpl. cap. verbenā, & ex Clusio in annotat. ad hoc caput. Hæ sunt cause essentielles Vomitus.

Fit verò per consensum propter communem neruorum affectionē, de qua dixi in præced. lect. fit autem hic consensus aut ex Renibus calculo affectis: sic primo in 6. Epid. 6. In Renem dolor grauis: cum implentur cibo, vomunt pituitam, cum autem abūdauerint dolores, eruginosa, &c: aut ex Cerebro vulnerato, 7. aph. 50. atque sic deinceps de aliis omnibus cum neruis sexus coniugationis communicationem habentibus.

Vomitus differentia.

EX quo iam licet vobis colligere Vomitus differentias desumpas à materia, à loco causæ desumuntur nonnullæ, & satis contemplabiles, à tempore, à modo, ab effectu. a tempore, quia Vomitus quidam est continuus, alius intermittens, rursus ex intermittētib. quidam repetunt quotidie, quidam per longiora intervalla; & qui quotidie; quidam statim assumpto cibo; quidam in fine coctionis: qui verò per longiora intervalla, vel ordinatē, vel inordinatē repetūt: & qui redeūt ordinatē, vel redeunt singulis hebdomadis, aut singulis mensibus.

Præterea horum alij sunt breues alli diuturni; qui perdurant 7. 10. & plures annos. Ego noui Virginem Vestalem, quæ laborauit Vomitu, per 43. annos in monasterio huius vrbis materiam duplo maiorem, quàm ipse cibus, euomentem.

Differantiæ à modo Vomitionis; nam aliquando est facilis, placidus, sine labore, quandoque cum symptomatis vehementissimis. cum Dolo Ventriculi, Anxietate, Palpitatione Cordis, & Syncope: Denique sumuntur differentia ab effectu, quia Vomitus quidam est criticus: propterea iuuat criticus, siue sit bilis, siue alterius humoris, etiam sanguine non excepto; alius verò est symptomaticus: Potestis etiam medium constituere.

Signa Affectionum commemoratarum omnium.

VERSABIMUR in præsentia circa signa affectionum propositarum. Supinitas duobus potissimum signis cognoscitur: fluctuatione scilicet, quam Græci κλυσίνα vocant, & inflatione. præterea rugitu & extensione Ventriculi Subuersio autem cognoscitur ex anxietate, grauitate, quam sentit Ventriculus assumpto cibo: vt propterea, sicut scribit Gat. lib. de diff. sympt. cap. 4. cupiāt isti patientes assumptum cibum quam primum per inferiora delicere.

Nausea verò cognoscitur ex ipso Ventriculi motu, vomitioni consimili, hoc tantum excepto, quod nihil exernitur: & si fiat Nausea ex sola humiditate tunicas irrorante, nulla adest sitis, imò verò πτυλισμός seu frequens spuitio, saliuatio vocata: quod si adsit materia corrupta, nidorosa, præter Nauseam adest quoque inapetentia, & abominatio ciborum, ructus nidorosis, sicuti quando humor est acidus, simul cum Nausea adest appetentia, vt potestis colligere ex primo de loc. aff. cap. 4.

Eodem

Vomitus
per consensus
a Renib.

à Cerebro
o vulnerato.

Eodem modo poteritis Vomitus cognoscere ex ambelilitate retentis, factum.

Quod si fiat Vomitus propter Os Ventrliculi supernum aliqua ratione occlusum, facillimum est hoc cognoscere, quia ipsi nec patientes referunt, se sentire cibum descendere usque ad Os Ventrliculi, nec tamen pertransire posse. Ego vidi Virginem laborantem Vomitu ex inflammatione Osi Ventrliculi, emplastro ex meliloto applicato ipsi dorso è regione ventriculi Sanatam: Si Os infernum sit occlusum, vel mesenterice, aut intestina, cibus in Ventrliculo recipitur, & ibi aliquo temporis spatio moratur, postea ejicitur, corpore interim in atrophiam incidente, & quicquid per alia aut vasa eiciere.

Et si occlusio fiat ex inflammatione, adest febris acuta: Si ex subtili carnea, febris aut nulla est, aut exilis, & ipsa carnea subtilior tandem ex cernitur vel per inferiora, vel per superiora, vel per utrumque locum. Iustus rei exemplum est Virgo illa, quæ superioribus mensibus laborabat Vomitu continuo ante tres annos, cum menses supprimerentur, incidit in febrem continuam, quæ ab eo tempore nunquam illam dimisit. Eiecit 80 lib. sanguinis per aliquot dies & portiones illæ carnea pingues, & suppurantur, per quinque menses, sunt 60 lib. Causa: quia habuit vnum ex illis abscessibus carneis, quos nathas vocant, qui fiunt in externis partibus, ut vidi in Monacho S. Iustinae. In his abscessibus contingitur glans, caro, pinguedines: Car igitur non in internis etiam inveniuntur? Et ego credo abuisse circa pylorum hunc abscessum, qui comprimebat ventriculum, quo minus posset cibum continere. Quomodo potuit autem vivere sine cibo? Cum tunc fuerint menses suppressi, credibile est, hoc tempore fuisse ortum hunc abscessum & augmentum, ex hoc potuit etiam nutrir.

Si materia Vomitus contineatur in Ventrliculo, non quia excerni non possit, sed quia generetur, id cognoscetis, quia Ventrliculus perpetuo aliqua laborat affectione, vel Inappetentia, vel Supinitate, Subuersione, Nausea, Sigultu, Dolo Rugitibus Inflammationibus, accedit, quod materia, quæ excernitur, aut est pituitosa, biliosa, portacea, sive morsu, virore, quæ generatur non per adustionem, sed ex ciborum proprietate, ut brassica, betula, porro, aut similibus.

Si fuerit sanguis ex Ventrliculo excernitur in modica quantitate, & rubicundus est; nam si fluat ex lecore, copiosior erit, & magis nigricans: si ex Liene, adhuc magis niger & aciditatis participes, præterquàm quod melancholicæ & affectionis lienis aderunt signa. Virum vero quando ex lecore transmittitur ad Ventrliculum, id fiat ex primaria lecoris affectione, an potius ex supprestis mensibus, vel hæmorrhoidibus, ex plenitudine totius, ex membro mutilato, poteritis facile intellegere partim ex relatione ægrotantis, partim ex signis aut plenitudinis, aut caliditatis lecoris.

Quod si materia transmittatur ab intestinis, aderunt signa Volutuli, & dolor Ileii, secum retentio; excrementa autem, quæ Vomitu rejiciuntur, quandoque fæces redolent, si transmittantur à Capite, aderunt signa cerebri humidi, &

catarrhorum, gravitas, dolor, somnus, rissus &c.

Si fiat Vomitus ex lecore habet intervalla, & Vomitus excernitur potissimum ante cibum, aut statim à cibo cum morsu, amaritudine oris, & siti.

Si transmittatur Melancholia, Vomitus infestat quinque vel 6, horis ab accepto cibo cum maxima Osi Ventrliculi erosione, cum anxietate, & melancholia, & cum stupore dentium.

Quod si humor, aut vapor veneficus sit causa Vomitus, inter vomendum maxima superueniunt symptomata: Convulsio, Vertigo, Palpitatio & Syncope.

Si fuerit Vermes, iste Vomitus ostendet Vermes.

Si fuerit angustia Ventrliculi naturalis, cognoscitur, quia nunquam cibi multum continere poterunt. Præter naturam habet illa signa, quæ habent tumores Ventrliculi, de quibus dictum est.

Id ipsum dictum de viceribus & causis comprimendis, & de affectione communium nervorum, quorum omnium signa sunt à nobis proposita.

Signa distinctiva Vomitus Critici à Symptomatico gerunt vicem prognostici.

Prognostica.

Nam omnis Criticus est salutaris, omnis Symptomaticus letalis. videndum itaque qualis sit Criticus, & qualis Symptomaticus. Tres sunt Critici vomitus præcipue conditiones.

Prima conditio est, ut talia deiciantur, qualia oportet, quod est dicere, qualia morbum constituunt, hac ratione unusquisque Vomitus materix bibulose, etiam æruginosæ, melancholicæ, illius & nigrae, scetidæ & corruptæ, aliquando salutaris est, sic scribit Gal. 5. de loc. aff. ca. 9. Ex vomitu æruginoso, convulsionem sanatis: sic Hipp. 4. aph. 37. excretionem omnes liquidas, nigras, foetidæ, si bene prodeant, bonas esse scripsit, quam de his omnibus 2. progn. à 38. tex. vsq. ad 42. malas & perniciosas esse dixisset. Regula habetis generalem 1. aph. 2. & vii. 4. aph. 2. Si talia excernantur, qualia &c.

Neque ab his excretionibus sanguinem excipio; quanquam enim Hippoc. 4. aph. 25. sanguinem ex supernis partibus excurrentem, undecunque exierit, malum esse scribat, nihilominus & in mulieribus & aliquando in viris servata, corporis integra sanitate educitur: hoc potest colligi ex 1. aph. 32. quando scribit Hipp. Mulieri sanguinem Vomenti menses superuenientes bonum, non scribit sanguinem illum Vomitu eiectionem letalem esse, imò verò, quando menses non fluxerint, posse illum esse salutare, docuit Brasavol. in comment.

eius loci, qui asserit, quædam mulieres, quibus suppressi fuerant menses per Vomitus singulis mensibus noxium sanguinem expurgasse; id quod ego quoque semel observavi in Virgine monialis, sed & in Viris, præcipue senioribus, vel quod multo vivatur alimento, cum tamen paucageant, vel propter vitam otiosam sanguinis Vomitus, sunt viles. auctor est Plin. lib.

Conditio. Vomitus Critici.

Sang. Vomitus Salutaris.

1. cap. 8. Malignum felsen & Vomuum Saturnum vixit 90. annum vixit cū Vomitu- ne sanguinis: quod etiam confirma Cardanus i com. 2. 4. part. 4. Idcirco idem Hipp. 7. aph. 37. Sanguinem Vomui ejectum cum febre malum sine febre malum esse non dixit.

Secunda conditio Critici Vomitus est. vi plura non educantur, quam oportet; nam omnis in- modicus Vomitus, in d. omnis excretion in mode- rata etiam sudoris, vi notat Gal. 2. in 6. Epid. 33. vires ipsas denit.

Tertia conditio, vi fiat cum tolerantia virtu- tis, hoc dico non tantum propter copiam, quan- tum propter symptomata potest enim esse modi- ca rei electa portio, & tamen vires non sint tole- rantes, nam aut Syecopem aut Palpitationem, aut Con- uulsio, vel quid tale succedit: propterea in Vol- uulo, quamquam pauca delucianus, est tamen ex- uialis Vomitus propter praua symptomata.

Quidam quartam addunt conditionem, vi fiat cum coctione, quam necessariam esse non puto; quandoque enim humores turbidi sunt ab ini- tio, quos natura vult expurgat, sicut & medi- camentum, quando natura non fuerit efficax.

Symptomaticus Vomitus ex iam dictis pater & propterea omnis Vomitus, qui sit ex imbecilli- tate facultatis retentricis, aut ex Onficiis con- clusis, aut ex Ventriculo ulcerato, aut tumefacto, vel naturali angustia donato, aut ex compressio- ne, vel deniq; ex communi neruorum latione semper periculosus, & letalis.

Curatio.

Itaque ad methodum curandi & materias Me- dicas descendentes distincte in singulis dif- ferentiis versabimur, dico in sanabilibus; nam insanabiles pretermittam.

Occurrit autem primo, Vomitus ex imbecilli- tate Retentricis, ex qua sit etiam Supinitas & Sub- uersio & Nausea: propterea eodem modo sanan- tur, huic cause quando fuerit ex intemperie hu- mida, & materia humida, occurrendum siccan- tibus & adstrictoribus, partim internis partim ex- ternis.

Ex internis tribus hiera simplex, pilule alyphi- græ extoloe lora simplicia. Sed præ ceteris iuuat E- apium piper subtiliter puluerizatum, aut in bolo confectum, aut in vino exhibitum. Petrus Badius lib. 1. rebp. 9. lib. 1. se aliquot curasse vsu piperis, perbet drach. piperis pulueriz. in uolui in ho- stio. Vos excipite aqua melle rosato simplici, aut modico vino odorato, & bolum conficite: Ego vi- soleo hoc pulue ad drach. i. ex vino odorato tri- bus horis ante cibum.

Recipe Spice, Mentha sua.

Abstach. exsic. an. drach. ij.

Piperis drach. i. f.

Cinamomi

Caryophyll. an. drach. f. M. f. puluis.

In eandem usum potest administrari Theria- ca, & mithridatica confectio. Extrinsecus in hoc casu mistic facit emplastrum de crusta panis, & propterea, mulieres etiam facile parant ad Vo- mitiones medicamentum ex paneislo imbuto vino odorato, in- spargunt pulueres massicis,

A caryophyllorum, nucis moscatæ, piperis, cinna- mo miq; omnia maxime valent. His non conse- rentibus secuti Actii consilium 1. retrabl. 2. c. 180 ad picationem, ad sinapismos, dropaces deueni- endum; hæc enim omnia uon exsiccant tantum sed humidam materiam foras deducunt poi- rit parare dropacem huius conditionis i

Recipe Massicæ vac. sem.

Opoponac. serapin.

Bdell. an. drach. i.

Sinap. Piper.

Cinam Caryoph. an. drach. sem.

Olei de spic. vnc. sem.

Dissoluantur gummata cum vino odor. ad- dantur pulueres, & oleum, & cum cera ficerant.

Si Retentrix facultas sit vitata propter humo- rem, vel nidorem, vel acidum, curatio pertinet ad alium locum.

Propterea statim me confeto ad Vomitus fa- ctum ex pondere ex copia humoris in Ventricu- lo contenti, hic humor sit pro ratione quantitatis, non educatur, arte est educendus, aut Vomitu aut blando medicamento. Vomitus in hoc ca- su probauit Hipp. lib. de loc. in hom. confirma- uit Gal. 2. in 6. Epidem. 8. Vomitus Vomitus fa- nat: si resistat humor, ante Vomitionem inciden- dos multa, oxymelite, præcipue verò oxymellite alterato aut absinthio, aut spica, aut pulegio. Id- circo oxymel compositum, & scillitum simplia- ci est præstantius.

Post Vomitus, vel deiectionem ventris robo- randus Ventriculus, de quibus infra.

Sed si fuerit sanguis, ante omnia reuulsio est necessaria. secundo opus est medicamentis gru- mos dissoluentibus; tertio oportet vi adstringē- tibus, refrigerantibus, agglutinantibus, ad reuul- sionem faciunt non modo frictions, ligaturæ, cu- curbitulæ, vel scarificatæ, vel non scarificatæ, sed omnium maxime ipsa venæ sectio: secunda est autem vena pro vario loco, ex quo sit Vomitus: si ex iecore, fecerit iecotaria dextri lateris, si ex lie- ne, sinistra; si non fluant menses, nec hæmorrhoi- des, aperiat infernæ vne, referetur hæmorrhoides

Dissoluantur grumi sanguinis aut syrupo ace- toso simplici, oxymellite, & quia hæc leuiora sunt, si res non succedat, drach. i. mumia; loco mumia potest accipi omne genus coagni, siue leporini, cuius meminit Gal. 1. meth.

Sanguis coagulatus in Ventriculo primo qui- dem est dissoluendus, deinde euacuandus, tertio vitandum auxiliis, quæ nouam sanguinis afflu- xionem prohibeant, dissoluantur grumi sangui- nis nisi solū oxymellite, aut posca, verum etiā aqua destillata ex corticibus nucum, aut lixiuo, vel simplici, vel misto cum lacte ficulneo: sint li- xuij vnc. iiii. lactis drach. i. euacuetur deinceps aut pilulis de hiera, aut hiera simplici, aut rhabar- baro, aut melle rosato solutiuo.

Ad prohibendā nouā sanguinis affluxionem vitandū aut refrigerantib. vbi adsit anastomasis; qualia sunt aqua polygoni, plātaginis, portulacæ, aut adstrictoribus, vbi adsit aliqua orosio, vt sunt succus ribes, prunorū syluest. mori immat- ura, acetia, hypocistis, trochisci de charabe, &c.

Quod si vas sit fractum, utendū medicamen-
tis agglutinantibus qualia sunt amyli, tragac-
thum, gummum arabicū datur drach. a. horū putu-
rū cū albumine oui & hæc de Vomitu languis.

Quod pertinet ad Vomitu aliorum humorū,
cū habeat hic Vomitus eandē fere causā, quā
Cholera, ideo antequam illius curationem ag-
grediar, de natura Cholerae aliqua dicemus.

DE CHOLERA. Cap. XIV.

Dicit affectio Græcis *χολέρα*, Arabibus Cho-
lrica passio, & apud Hipp. 4. acut. 103. du-
plex est, Humida & Sicca: Humida rursū po-
tēst subdividi in Legitimam & Spuriā, nā Le-
gitima, quæ ut docet Gal. 2. Meth. 2. ab humore
nomen desumptū, est excretio bilis per os & su-
pernum & infernum. Spuria autem est excre-
tio cuiuscūq; materiæ acris, siue sit bilis, siue sit
cibus ad nidorem corruptus, vel ad putredinem
hoc potēstis colligere ex Gal. in comm. 103. 4.
acut.

Sicca aut Cholera est excretio tantum cuius-
dam flatūs, vel vaporis acris.

Causa.

Legitima, in qua videtur, bilis excernitur, ha-
bet causas & excretionis & augmenti bilis;
excreatur enim vno, & eodem tempore hæc
materia & per superiora, & per inferiora, quia v-
trūq; os est imbecillum: hoc docet Gal. 3. de
natural. facult. 5. est verò imbecillum vtrūq;
os, aut quia laxatum, aut quia irritatum, de caus-
is laxatis abundē diximus in C. de Nausea; sūt
enim causæ humida; propterea Gale. 3. de caus.
sympt. 2. dicebat ex frigida potione Cholera gi-
gul.

Irritamentum est ex materia aciori, & super-
no & inferno ori imbibita, de qua meminit Gal.
3. de nat. facult. c. 1.

Causæ verò augmenti huius bilis circa Ven-
triculū tres sunt: Generatio; Attractio; Expulsio.

Generatur bilis in Ventriculo ex quorundam
ciborum proprietate, ut porri, alli, cepæ, brassi-
cæ, betæ, ut colligitur ex 2. progn. 39.

Attrahitur propter eundem motum circa ora
hæc Ventriculi, factum.

Transmittitur etiam materia & à iecore, & à
toto corpore, vel quia ibi multa generatur, vel
quia retinetur. Retinetur autem maximē quan-
do densatus est corporis habitus: Generatur verò
aut ex naturali temperamento calido, & ætate
iuvencili, propter quam causam scribit Gal. atq;
cum eo Hipp. 3. aph. 30. Iuuenibus Cholera sic-
ca: Generatur quoq; ex quorundam ciborum pro-
prietate, præcipuè vero ex melonibus, ut docet
Gal. 2. de alim. facult. c. 4.

Humida autem Cholera Spuria habet pro ma-
teria quæcūque humorem acrem, atq; ideo
generatur illa frequenter in illis, qui se ipsos re-
pleant rebus dulcibus, mellis & saccharatis, far-
cinibus, compositisq; illis edulis ex sanguinea
porcino pinguedine, aromatibus. idipsum autem
fit ex immo vlu lactinorum, omniumque acriū

& aromatum præcipuè si hæc retineantur in vē-
tre, corrumpuntur enim, & si tandem excernan-
tur, faciunt Cholera humidam: si verò impingan-
tur in membranas, faciunt Cholera Siccam, in
qua erumpit vapor acris, non autem materia.

Signa.

Cognoscuntur faciliè hi affectus, & distingū-
tur et inter se non difficulter; nam in Le-
gitima, ut dixi, bilis tantū excernitur, siue flava,
siue pallida, aut crocea, aut æruginosa, in Spuria
excernitur, ut antea dixi, cibus ac potus corruptus
in nidorem, aut putredinem conuersus. in Sicca
præter quam quod vapor tantū erumpit, vter
est tumidus, dolens, rugitus ad sunt sitis, nausea,
oris amaritudo, & propterea omnes istæ Chole-
ræ differentiæ periculosi sunt affectus.

Prognostica.

Cholera est affectus acutus, ita ut aliquando
hominem vno die interimat; & propterea
dicebat Gal. 5. aph. 1. ex Cholera aliquando con-
uulsiones fieri, & ad Glau. 1. inquit, fieri etiā
syncopen; etiam si aliquando huiusmodi Chole-
ræ critico modo appareant, & corpus ipsum à ni-
mia humorum cacochymia liberare consue-
rit, ut docuit Gal. 7. met. cap. 11.

Curatio.

In curatione huius affectus tria sunt animad-
uertenda: primo, an expurgatio sit copiosior
iusto; secundo, an potius vel nihil excernatur, ni-
si flatūs acris, ut in Cholera Sicca, vel minus quā
oporteat tertio, utrum euacuatio proportionē re-
spondeat quantitati humorum peccantium, &
vires.

Si euacuatio iusto copiosior fuerit, ut conuul-
sio, & syncopē succedat, statim utendū ad stric-
tiora: nihil dico de reuulsoribus, neq; de restituenti-
bus vires, quia de his satis tractat, de syncopē fa-
cta ex nimis purgationibus; id tantū dicam,
quod huc pertinet, in Cholera nihil esse præstā-
tius ad adstringendum ex medicamentis externis,
quā emplastrum de crusta panis; & quia Chole-
ra, ut intellexistis est multiplex, quandoq; Legi-
tima, quandoq; Spuria, & in Spuria excernuntur
omnes humores, acres, acerbis, cibi corrupti ad
nidorem, ad putredinem, aliquando sanguis ipse,
ut abunde Brasauol. com. 103. 4. acut. declarauit.
& simul cum his rapiuntur quoq; alii succi ali-
mentales, & ichorosi; ideo hoc emplastrū de-
bet vario cōponi modo pro varia humorū quali-
tate redundantium, ut exempli gratia in calidis
humoribus, Bile, Sanguine, Arabiis, hoc modo

Recipe Crust. pan. assat. vnc. iii.

Imponatur vel in succo granator. vel in om-
phacio, vel in aceto, deinde contundatur, & per-
cibum transmittatur; huic adde:

Succi cinton. vnc. i.

Olei ros. omphac. vnc. sem.

Puluer. rosar. myrtillar.

ecacia an. drach. i. M.

Vbi humores fuerint mixti cum frigidis, mixtum quoque debet esse medicamentum.

Cruis panis poterit imbibit aliquo vino austro, aut generoso: poterit admisceri succus mēti; cōsistit; possunt addi pulueres mallicis, caryophyllorum, cinamomi: vel potestis vos accipere aliquid cinamomi, & aliquid rosarum, & sic varij modo medicamentum componere.

Idē est iudiciū de internis medicamentis, quę in sincera bile debent esse frigida adstrictoris, ut sunt succi ribes, granatorū, prunellorum, tynest. cydoniorum: in permixione humorum frigidiorū, absynthium erit admiscendum, mentha, &c.

Sed si minus edubatur quam oporteat, iuuanda est natura, sed de loco per quem debet iuari, est aliqua difficultas. Rondeletius fuit huius sententię, iuuandam esse naturam per os supernum, quando patiens sit facilis ad vomitum, & ex vomitu nō incidat in syncopen, aut cōuulsionē, sed hęc sententia est contraria Hipp. Gal. & rationibus Hipp. 4. acutā. 104. text. vlg; ad 110. curatio nem proponit vitiūq. Cholera: sed a 104. vsque ad 109. meminit tantū Cholera Sicca, in qua appetitissimē prohibet vomitum; in 110. loquēs de Humida proponit nullam, & vomitum, sed si Gal. credimus, & rationibus est error in textu, & addendum est aduerbium Non: Rō est in promptu, nā si in Cholera Humida materia purgatur & per superna, & per inferna, Medicus perinde iuuatur naturā, si educat per inferiora, atq; si educat per superiora: quod si educat per superiora, paraffert naturę incommodum, quia os supernū est sensib. le, infert syncopen, Palpitationem, Cōuulsionē, id quod non facit os infernum. Itaq; satius est per inferiora educere. Modum educēdi per inferiora proposuit idem Hipp. lococitato, Aut per clysteres molles, ut esset hic Clyster.

Recipe lēst. aut pusan. bord.

ant tur. ping. lib. i.

succ. rub.

olei violat. an. vnc. iij. M.

Aut poteritis præbere vnc. iij. vel v. ol. amygdul. recentis cū vnc. i. vel altera Vini granat. Na aliū subducet, & os supernū adstringet. Laudat etiam Hipp. vsū lactis asinini, & sane maxime conducit possuntque dari in Cholera Sicca lib. iij. vel 4. in Humida imperfecta vnc. viij. vel ad summū lib. i. Non improbo vsum cassię, tamat. in modica quant. Sint cassię drach. v. vel vj. tamat. drach. i. vel altera, Gal. 8. de comp. loc. 3. ex sententia Archigenis viebatur aqua simul cū vino generoso, ut simul & semel educeretur humor, contemperaretur & roboraretur Ventriculus Debet autem præberi aqua tepida non frigida, ut voluit Aretius, & Mesues, qui illam proponunt ad alterandum, non ad vacuandum: debetq; præberi copiosum ad lib. 3. vel 4. in iunioribus robustis frigidę assuetis, dum modo Cholera sit Legitima,

Loco aquę cōmunis potest etiam accipi hordeac. aut serum caprin. quę omnia iuuant & evacuando & alterando. De ceteris verō alterantibus & corroborantibus ne verbum quidem dicā quia magna ex parte sunt proposita in tractatu de Cardialgia, & aliis Ventriculi affectionibus:

illud tantū animaduertatis, cuius meminit Hippocrates 4. acutor.

Uetus Ratio.

IN Cholera Sicca abstinendū a cibis & porio: inibus indulgendum somno, utendū balneo aq. dulcis, & si status iste admodum virgeat, utendū vino aliquo moderato, albo, tenuis substantiæ, cuius ratione calor ipse confirmetur, & vapor digerantur. Quod si natura ipsa sponte sua humores istos quantum decet, expurgauerit, nihil innouandum, sed totum opus naturę relinquendum.

Hactenus de affectionibus Oris Ventriculi.

DE LAESA CONCOCTIONE.

Cap. XV.

CVM Cōctio sit per mutatio alimenti in substantiā, alendo corpori similē, ut docuit Gal. 3. de nat. facult. 4. & 8. & 3. de caus. sympt. primo idcirco trib. præcipuē modis læditur, aut quia alimentū nullo modo transmutatur, & dicitur Gręce *Αναστροφή*, aut egre admodū, & nō nisi longo tēporis intervallo mutatur, vocaturq; *Βραδύτης*, aut mutatur quidem, sed in substantiam alendo corpori minimē accommodatam; Vocari autem potest *Αναστροφή*, ut docuit Gal. lib. de diff. sympt. 4. Loquemur primū de Sublata, & Imminuta Cōctione, & inde etiam de Praua. Diminuta aut Ablata Cōctio sit vel læsa facultate, vel ob errorē externum. Læditur facultas aut impedita, aut labefacta: Impeditur a morbis instrumentariis, & communibus, de quibus abundē dictum est superius. Labefactatur propter intemperies simplices, aut compositas, de quibus nūc erit sermo: & quia de Diminuta, vel Ablata Cōctione loquimur, idcirco intemperantias tantū proponemus Cūditati efficiendę propria.

Sunt autem frigida, vel humiditati vel siccitati connexa.

Rursum vel aequales vel inæquales.

Tertio vel primarię vel secundarię.

Inæquales intelligo tam ratione frigiditatis, quā ratione passiuarum qualitarum; nam ratione frigiditatis duplex est in Ventriculo inæqualis intemperies, vna ratione loci, altera ratione materię: ratione loci cū Os Ventriculi est calidum, fundus aut frigidus: ratione materię cū tunica frigide, humores in cavitatē contenti sunt calidi: ratione passiuarum qualitarum est inæqualis intemperies, cū tunica Ventriculi amiserunt propriam humiditatem substantificam, & tamen humor abundat excrementitius.

Est primaria intemperies, quę sit in ipsismetunicis Ventriculi, Secndaria verō quę sit aut defectu bilis aut deficiente calore iecoris, omentu septi transuersi, lienis, cordis, venę, & arterię magnę, quas omnes partes docuit Galenus suo calore ad Concoctionem, Ventriculi conferre 3. de nat. facult. cap. 7.

Sed dicit quispiam, quid conferibilis ad Cōctionem? docet idem Galenus 1. de V. part. 4. bilem naturaliter non concurrere ad Ventriculū & si concurrat facit Cardialgiā, Inappetentiā, Subuersionem cibi, quomodo ergo bilis confert concoctionis.

ilis quo Respondet. Bilis aut confluit ad cavitatem, *modo in-* aut ad fundum Ventriculi inter tunicam, & tuni-
vent Co- cam, ad cavitatem non confluit naturaliter, &
tionem. thutis, ac perniciofa est, si fluxerit, naturaliter
confluit ad fundum, ad tunicas ipsas, ut suo calo-
re iuuet calorem innatum ventriculi, sicut iuuat
aliq̃ partes circumstantes, locus est Gal. pro hac
re 6. de a nat. admin. c. 12.

Causa Procacitatis.

Mediatz haurum intemperaturarum causæ
sunt in triplici differentia: aliz enim refri-
gerant & humectant, aliz refrigerant, & exsic-
cant, aliz primò & per se exsiccant, secundariò re-
frigerant, quæ refrigerant & humectant, sunt in
ternæ & externæ: internæ aut cibi, aut medica-
menta. cibi sunt omnes fructus horarum, frigidi,
humidi, melopepones, mora, pruna, &c. sunt om-
nia olera frigida, potus aquæ aut vini admodum
niue, & glacie refrigerati, inter medicamēta sunt
omnia soporifera, opium, hyoscyamus, papauer, la-
tucca: inter causæ extrinsecas est aer frigidus, a-
quæ & medicamenta frigida, refrigerant, & ex-
siccant omnia acerbæ & austera, ut mespila &c.
omnia acida, ut species melon, limon, citr, granat,
ribes.

Quæ autem exsiccant, id faciunt vel per se,
vel ex accidenti: per se quidem in terra plurimæ me-
dicatæ, ut terra lemnia, samia, armena: ex ac-
cidenti inedia, evacuatio omnis, siue per nimium
veneris usum, siue vomitum, aut quacunq̃
alia ratione, in hac classe possunt reponi illa om-
nia quæ propter insignem caliditatem digerunt
calidum innatum simul cum humido, siue sint
medicamenta, ut est aurum illud portabile, quo
plurimi ad conservandam valetudinem vtuntur,
item maximæ iccoris & aliarum præcipuarum
partium intemperantiæ.

Non est silentio prætermittendum mixticæ ca-
lorem innatum extolui ob nimiam tunicarum
Ventriculi tenuitatem; ubi enim tunicæ Ventri-
culi ex erassis sunt tenues siue quia nimium ex-
tendantur à copioso cibo & potu, siue quia alimē-
tum à icore non recipiant, calidum & humidum
innatum amittunt: hoc voluit Gal. 3. de natur. fa-
cult. 7. quando inquit, præter alias causas, quæ
ad Cōctionem concurrunt, concurrere etiam to-
tam Ventriculi substantiam, per totam substanti-
am intelligit convenientem tunicarum crassitiem,
de qua etiam meminit Hipp. & cum eo Gal. 2.
aph. 3. dum inquit, partes ad ventrem perti-
nentes debere esse bene corporatas, & carnosas.

Externus error positus est in excrementis, ali-
mentis, atque in somno: in excrementis, quando
Ventriculus sit multa pituita refertus siue dulci,
siue acida, siue alia, in alimentis, quæ peccant aut
quantitate, aut qualitate, aut tempore, aut ordi-
ne, aut præparatione, quantitate, cum plus accipi-
tur, vel cibi, vel potus quàm conveniat, qualitate
aut occulta, aut manifesta; Occulta, id est, venefi-
cia, manifesta vel peccante in prima, vel in secun-
da qualitate, in prima, cum frigidus, in secunda,
cum nimis crassum, viscidum, & lentum fuerit
alimentum, quale desumitur ex leguminibus, ca-
leo, lactucinis, placentulis, piscibus, testacis præ-

cipue, & crustatis, cartilagineis, & alijs id genus:
quoad tempus error committitur, si ingeratur ei-
bus, antequam prior descenderit, vel antequam ex-
crementa educata fuerint, vel statim ab exercita-
tione corporis, quoniam fuerit super calefactum
corpus: de ordine scio, Gal. 3. de caus. symp. pri-
mo, improbasse illos, qui primò accipiunt austera
adstrictoria: in fine autem mensē liquida, & cor-
ruptibilia: sed de his non est communis quædam
regula,

Error quidem est in præparatione, dum mule
simul miscentur diuersarum facultatum dum cō-
diuntur multo lardo, aut pinguedine, alijsq̃ oleosis

De somno nihil est, quod dicam: norunt om-
nes, quæ totum faciat defectus somni ad crudita-
te inducendas.

Signa Diagnostica.

In tractandis propositarum intemperaturarum
signis primò diagnostica, dein distinctiva, mox
prognostica sunt referenda. Diagnostica sunt, quæ
Diminutam, vel Ablatam Cōctionem ostendunt
& hæc facillimè comparantur: patientes enim re-
ferunt se cibum etiam coctum facilem post novè,
& decem, & plures etiam horas in Ventriculo nō
motum sentire, propterea gravitate premi, ructi-
bus acidis vexari, anxietate, & tandem vomitio-
ne cibum ipsum vel prorsus non mutatum, vel
ægrè mutatum reddere coguntur: quod si aliquā
do descendat, liquidas facit deiectiones in mo-
dum Cœliacæ affectionis.

Si hæc cruditas fiat ex errore, externo in cibo,
potu, aut somno, comparatur ex relatione patien-
tis, & facillè emendatur: idcirco statim sublato
errore externo Ventriculus reuertitur ad natura-
lem statum.

Si verò error sit in excrementis, opus est arte
ad dignoscendam hanc causam: cognoscuntur
itaq̃ excrementa vitiatæ. Con cōctionis causa,
quia etiam, ante cibum acceptum sentitur in Vē-
triculo gravitas, morsus, prout varia est humorū
natura, dum fiunt vomitiones, & deiectiones, ip-
sa excrementa apparent plurima, vel sincera, vel
cibi commista, & post excretionem Cōctio me-
lius perficitur.

At si intemperies sit Cruditatis causa, vel si-
gna excrementorum non ad sunt, vel quanquam
adsint, & excrementa educantur, Cōctio tamen
non duadit melior:

Signa Distinctiva.

Distinguetis aut intemperie frigidam humidā
à sicca frigida hoc modo: quia in frigida hu-
mida totū corpus, & partes ad hypochondria spe-
ctantes sunt bene corporatæ, adest sputuū copio-
sū, patientes sunt propensi in somnū, leduntur à
refrigerantib, & humectantib, iuuantur à calidi &
siccis, cōtra verò in frigida & sicca intemperie Vētri-
culi partes, & totū corpus est emaciatum, idcirco
emulantur isti marasmū senilem, atq̃ ideo dicun-
tur laborare hectica Ventriculi: fiunt, nō, tamē-
inæqualis sit intemperies; nā ut antea dixi, cū de-
fectu calidi, humidi adest abundantia excremen-
tosi succi, ut propterea exsiccati nū sitiant, imò & cali-
fre.

*Alimenta
ledunt
Cōctionē
Quantita-
tem.
Qualita-
tem.*

*Hectica
Vetri-*

frequenti sputo vexentur et hoc modo cognoscitur. **A**

fecis inaequalem intemperiem in pulvis. In actius verò cognoscitur, quando Os Ventriculi est calidum, fundus est frigidus, quia etiam adit in concoctio, neque ad sit macies corporis, patientes tamen laborant siti & inappetentia cum tamen Ventriculus frigidus plus appetat, quàm comcoquat fieri. frigidus existit atque sius adit, argumentum est inaequalis intemperiei inter os & fundum.

B Cognoscitur etiam intemperies inaequalis inter tunicas refrigeratas, & humores calidos, quia Coctio non fit, aut imperfecte fit, & tamen patientes sentiunt oris amaritudinem, morsum Ventriculi vertiginem, excrementaque per vomitum & alium eiecta simul cum cruditate bilem habent, committant ipsi vobis confirmabit rectis temperatura multo calidior.

Venarum caillam cognoscetis esse Cruditatis causam, si non modo incoctus maneat tribus, sed aliquando corrumpatur ad nidorem, quandoque ad putredinem, nonnunquam ad acidam, simulque adsint alia quamplurima symptomata ad Os Ventriculi sperantia, de quibus superius.

C Vbi a tunice Ventriculi nimium laxata & attenuata sint Cruditatis causa, id cognoscetis aut ex causis praegressis, quia isti frequentibus copulationibus sunt dediti, aut cibo se nimium replent, ut propter validam extensionem crassities abeat in latitudinem, accedit quod isti quoque imbecilles habent facultates retentivem, & expultricem; ut propterea ad vomitum sint faciles, ad reddenda alia excrementa inepti.

Prognostica.

E Si omnis Cruditas magni momenti, quamcunque tandem intemperiem sequatur, dicebat Hipp. 3. in 6. Epid. primo. Ventris torpor omnium confusio. Gal. abundè 3. de caus. sympt. 1. & de cib. bon. & mal. succ. c. 14. omnia refert incommoda siue cruditas sit in tenuibus, siue in crassis humoribus ex intemperaturis tamen multo deterior est sicca, ut colligere potestis ex Galen. 7. meth. cap. 1.

Curatio.

C Vratio intemperaturarum propositarum habetur quidem apud Gal. in 7. meth. frigide & humida in ca. 4; sicca verò in ca. 6. Egotamē frigiditatem a frigiditate non seungo; nam ut dicebat idem Gal. in princ. cap. 6. ubi progreditur siccitas, frigiditatem semper habet connexam, & copulatam; Nos verò in praesentiarum loquimur de sicca ex usu artis, quae iam progressa sit.

F Frigidam gigit & humidam intemperiem curare non licet, nisi primum euacuatis humoribus quae vel in cavitate, vel in tunicis continentur, de qua euacuandi ratione nil amplius dicam; quia vos remitto ad sectionem praeteritas. nunc itaque erit sermo de alierantibus tantum, tam internis, quam externis.

VI. Alterantia

E Tum ingens sit medicamentorum sylva, conveniunt in hoc casu ex rotulis Diatriopipercon, arom. tunc rosatum, Diapoliucon, Diacimium, & alia id genus. Ego tamen in frigida & humida intemperie nihil pulveribus praestantius inuenio. Constat ergo hic pulvis.

Recipe Spicae, Absynth. exsiccat.

Atent. succ. an. drach. ij.

Zingib. Cinamom.

Caryoph. an. drach. i.

Saccari. drach. iij.

Pulverizentur omnia & misc. dosis sit drach. i. in vino aliquo aromatico, siue simplex fuerit siue alteratum, vel absinthio, vel caryophyllis, vel cinnamomo, & nuce moscata haec enim pro maiori vel minori frigiditate & humiditate abundanti fortiora, vel minus fortia sunt eligenda non improbo conseruam ex absinthio, zinziber conditum, mithidaticam confectionem tempore debito. Conveniunt & aquae thermales, saltae praecipue, sulphuratae, aluminosae & nitrosae.

Extrinssecus conveniunt fomenta calidissima & eicantia aut ex vino odorato, in quo leuiter ebulliant, spicae, squinanium, calamus aromaticus, mentha, absinth. aut fiant stillicidia ex aquis medicatis iam propositis. post stillicidia verò adhibeatur hoc ceratum.

Recipe mastice. vnc. sem.

Aloes, Cinamom.

Carioph. an. drach. i.

Cerae. s. M. f. ceratum

Vitus Ratio.

Vitus ratio proportionem respondeat, utantur carnibus tantum assis, praecipue auium sylvestrium, sit panis biscoctus, aut saltem optime coctus. parum bibant; vinum autem sit generosum: corpus exerceant: si exerceri non possit, aut balneo digerente, aut frictione aspera utantur: alius sit lubrica, pilulis possimum aliphanginis vocatis, aut hiera simplici, aut pilulis de hiera vocatis.

Curatio Sicca Intemperiei.

Siccam intemperiem corrigit Gal. 7. meth. 6. & 7. usu lactis asinini nuper emulsi & melli despumato commisti, haur humano ex vbere succo. loco mellis vos poteritis uti saccato sine lactis ab initio vnc. iij. saccati vnc. sem. augeatur paulatim dosis usque ad vnc. vi. & viij. cum saccho vnc. i. quatuor horis ante cibum post balneum, cuius meminit idem Gal. loc. cit. ut vero balneum tepidum, & mora in balneo usque ad moderatam caliditatem: post balneum fiat unctio ex oleo amygdalino, post unctionem lac exibeatur. ceterum quibus lac non convenit, ego praebere consuevi formulas quasdam & ius, quae praeparentur hoc modo. Formula descripta est talis.

Recipe pulpe nucis indic. vnc. iij.

amygd. dulc.

nuc. pin. macerat in lact. an. vnc. ij.

cinnamon drach. sem.

carnis coponis vnc. iij.

Contundantur omnia & cum saccharo dissolu-
tocium aq. Ros. citri. aq. meliss. confect. in mor-
tel datur drach. semibus confectionis, & po-
tea statim superbibant vnc. vj. huius iuris.

Recipe sol. mala. rad. alib. an. Ad. j.

amygd. dulc.

nucleor. pin. an. vnc. iij.

amyl. vnc. i.

menth. N. f.

cinnamon nuc. mosc. an. drach. j.

Ponantur in ventre optimi pulli, & bulliant
ad perfectam coctionem, & facta expressione ius
seruetur ad usum.

Pro integra Cruditatis curatione quinque su-
persunt dicenda, primum quidem de externis ad
siccam & frigidam intemperiem, secundo de vi-
tus ratione in eadem, tertio de curatione Inae-
qualis Intemperiei, quarto de auxiliis ad Laxita-
tem & Tenuitatem Ventriculi, quinto de reme-
diis aduersus venenatam qualitatem.

Externa remedia ad frigidam & siccam intem-
periem multa proponuntur, oleum masticinum
nardinum, omnia animalium his oleis imbuta,
cauelli parui super Ventriculum impositi, manus
pueri impolluti, & alia id genus: sed tria sunt
praecipua, primum rasura panni purpurei imbuta
oleo nardino & masticino, secundum est Stilli-
cidium ex oleo; oleum verò sic paratur.

*Stillici-
dium.*

Recipe ad. amygd. dulc. lib. ij.

commun. lib. iij.

massic. arid. an. vnc. ij.

vin. alb. odor. vnc. viij.

absint. menth. an. M. f.

cinnamo. nuc. mosc.

caryoph. an. drach. j.

Hæc ponantur in sindone, & bulliant in præ-
dictis oleis & vino ad consumptionem vini &
facta expressione oleum seruetur ad usum: fiat
hoc stillicidium per 10. aut 12. dies. mane &
vesperi, actu calidum, ieiuno ventre per horam
vnam plus minus deinde statim superponatur
aut omeprum, aut rasura purpurea oleo imbuta
vel hoc ceratum.

Recipe Ladani, massic. an. drach. ij.

ol. ex nuc. mosc. drach. i.

cera q. s. M. f. cerat.

Picatio

Tertium est Picatio quæ hunc in modum ad-
ministratur pix liquata, oleo masticino aut nar-
dino commixta, picatio calens extenditur super
corium adhibetur Ventriculo, & statim adhibita
remouetur, atque iterum calens apponitur, & sic
vicissim tollitur, usque quo rubor in carne exci-
tetur. Quantum possit hoc medicamentum ad
attractionem alimenti, ad restaurandam substā-
tiam perditam, docuit Gal. 6. detruend. vale-
rud. 2. 14. meth. 14. & singulatum in intempe-
rie frigida & sicca 7. meth. 7.

Piscus ratio.

IN hac intemperie circa victus rationem hæc
potiora vobis sunt notanda, vt cibus paulatim
præbeat; nam Hipp. 2. aph. 7. inquit, quæ
longo tempore extenuata sunt corpora, sensim
sunt reficienda alterum est, vt cibi sint hume-
dantes, moderatè calorifici, sed multi alimenti
& pauci excrementi; ideoque præter omnia lactis
genera, emulsio amygdalarum dulcium, & feru-
cula ex farina amyli, & hoc lacte, modico addi-
to cinnamo, & saccharo primas habent huius nu-
tritionis partes, de vino illud vos moneo, ne in
sicco Ventriculo austerum vinum vnquam con-
cedatis; quanquam enim Gal. 7. meth. 6. hoc cō-
cessisse videatur, ibi loquitur de sicca intemperie
absque frigidityte, quæ propterea non est pro-
gressa; nam vbi adest calidum innarum adest
quoque humidum substantificum: vbi verò hu-
midum substantiale deficit, necessariò deficit &
calidum in quo casu nihil perniciosius adstricto-
rius, quæ reliquum humiditatis depascuntur, vt
idem Gal. monuit 7. meth. 7. ideo consultum est
in his casibus, ante omnia cibaria copiosam præ-
bere patientibus potionem aut iuris optimi, aut
lactis, aut emulsion. amygd. dulc. vt tunica exsic-
catis, & à liberali hoc potu humidatè extendi
possint, & reliquia cibi probè complecti, non ta-
men laudo Garciz Lippi Lusitani consilium c.
4. lib. de varia rei med. lect. qui docet, hunc potum
vini liberalem esse debere. Vinum, auditores, ie-
iuno ventre præcipue exsiccatis conuulsiones in-
fert. hoc docuit Gal. comm. 21. par. 2. aph.

*Notan-
da circa
Victum.*

*Large
Vini po-
tio dan-
natur*

D

De Inaequali Intemperie.

QUod pertinet ad Inaequalem Intemperiem,
si fuerit inter fundum & os, vt fundus sit
frigidus, os calidum facilis est sanandi ratio, & ea
quidem duplex: primo vt in principio mensæ ex-
hibeantur calida, in fine frigida & austerà, se-
cundo vt parti anteriori ventris calida adhibeantur,
aut medicamenta, posteriori autem circa 12. ver-
tebram frigida, ibi enim est os Ventriculi.

E

Quod si Inaequalitas sit inter tunicas & humo-
res, vt humores sint calidi, tunica verò frigida,
quod contingit icore admodum feruido, primū
calidum humorem educere oportet aut vomitu,
aut deiectionibus, quæ tamen cale faciant, & bilem
simul expurgent. Talis est hiera simplex, tale rha-
barb. aloë, potio ex absinthio, purgant bilem, &
tunicas calefaciunt.

Si inaequalis sit Intemperies rationis passuarū
qualitatum, vt tunica sint sicca, ex defectu humi-
di substantifici, & tamen abundet humor pituitosus
excrementibus, hoc opus hic habet, in hac cu-
ratione ante omnia humores in cavitatē coniecti
placidis medicamentis sunt educendi, quæ hu-
mores moderatè calefaciant, & sint potius ali-
mentalia, quàm medicamentosa: Talis est man-
na, mel. viol. solut. cassia, myrob. chebuli, quo-
rum vnus vel alter, dummodo ex illis sit, quā
Syria condunt non Veneus; cognoscetis au-
tem Veneus fuisse conditum, si perfolius emit-
tatur sonitum, si minus conditus fuit in Syria.

Purgatio Ventriculo necessarium deinceps ipsum humectare simul & siccare id ego vario modo prestare consuevi: primum quidem dum lac exhibeo, in ipso lacte infundo quinque vel sex guttas olei, aut ex aniso, aut ex feniculo, aut ex cinamomo, vel si adsit suspicio luis Venereę, ego impono oleum ex ligno sancto ad guttas 3. vel 6. si lac locum non habeat, in iure, cuius memini in præterita lectione addere consuevi, aut radicem chinanaut salię, aut aliquid liqui Indici, si oleum fuerit, apud me multo melius est, quàm china vetus, & cariosa. alquando usus sum sanguine porcino calente destillato, misto cum aliqua portunculâ aq. cinamomi: hæc. n. omnia humectant, nutriunt & simul exsiccant.

Ad proportionem verò internorum medicamentorum externa quoque debent esse sicciora, atq; ideo si picatio administratur, ipsi pici dissoluti poterunt addere, ut etiam consiliis Acrius, aliquid pipæris & pyratrhi.

Videtur ratio.

Videtur quoque ratio nutriendi quidem esse debet, & humida, sed siccantibus permixta, hoc casu locum habet illud meum ferculū, quod soleo parare ex flore sativę hordei, & ex saccharo pulverizatis, in olla positus, & in furno usque adeo exsiccatis, ut crustosa evadant: vnc. j. huius pulv. in lib. j. aut iuris optimi, aut emuls. amygd. dulc. est ferculum in hoc casu aptissimum.

Laxitatis tunicarum Curatio.

Si laxæ sint tunicę, tota curatio consistit in medicamentis adstrictorijs vel calidis, vel frigidis, ut laxitas sit connexa vel frigiditati vel caliditati.

Sunt materię calidę adstrictorię: absynthiū, spica, squinanthum, calamus aromaticus massix, aloë, olibanum, ibus. Frigidę autem citonia, rose, granata, sorbe, agrestia, rhibes, & alia. Ex his potestis vos componere medicamenta.

Curatur vitium inconcoctionis venenatę atheriaca, aut mithridatica confectione.

DE DEPRAVATA CONCOCTIONE

Cap. XVI.

Praux Coctionis quancquam Avicenna 3. tertii 1. 3. c. 2. & cum eo recentiores quidē quatuor constituent differentias primam ad nidorem, secundam ad acidum: Tertiam ad putredinem, quartam ad extraneam qualitatem; quia tamen omnes tandem ad duas rediguntur, nos cum Gal de duabus tantum loquimur, de ea scilicet quę fit ad Acidū, & de illa, quę ad Nidore. Fit vitæque hæc corruptio, aut læsa facultas, aut ex erroribus externis. Læditur autem facultas vel ex morbis instrumentarijs, & communibus, de quibus antea abunde dictum est, & idcirco hos omnes prætermittendos censeo; aut labefactatur ob intemperiem, de quibus in præsentia erit sermo.

Et primum quod spectat ad Acidā corruptio nem, hanc semper fieri ex intemperie frigida do-

cuit Gal. 3. de caus. sympt. c. 1. primo de loc. aff. 1. quancquam frigiditas nomine non intelligi insignem lapsum intemperaturę frigidę ex hac. n. fit cruditas, sed imminutum, & imbecillum calorem propterea dicebat loco citato, frigidam intemperiem ne quidem aggredi ciborum coctionem; imbecillum autem calorem alterare quidē, sed imperfecte. dicitur in Lienaria ructus acidus est opimum signum. Hippocr. 6. aph. 1. quia hic ructus indicat nauium Ventriculi calorem in Lienaria deperditum iam remanescere.

Corruptio autem ad Nidorem, admodum fit ex intemperie, semper sequitur intemperiem calidam & siccam. idcirco dicebat Arist. 4. met. c. 12. sect. 1. quę sequitur Galen. 4. in 6. epid. 2. §. 8. meth. 5. 2. de alim. facul. 6. Nidorem fieri a calore vitio.

Vitæque tamen hæc corruptio fit etiam ab erroribus externis. & dum fit sermo de Acidā, error est vel in excrementis, vel in alimentis, in excrementis, quando vel ex propria natura sunt acida, ut est pituita acida, melancholia acida in Ventriculo contenta, aut quando habent naturam austera, quę a caliditate transmutatur in acidam & hoc notate propter ea, quę infra dicentur. hoc fit in melancholia naturali, quę ex propria natura potius est austera. Avicenna inquit, esse saporis Põuci, id est austeri; ex vitio verò fit valde acida, ut docuit Gal. 3. de loc. aff. 7. li. de atra bile, c. 3. lib. de plenitud. 1. 1. atq; passim.

Ex alimentis pariter fit corruptio ad Acidū, peccantibus illis vel copia, vel qualitate. Copia, quando nativum calorem, etiam si validum, suffocant, ut docuit Gal. com. 2. 2. lib. 2. acur. peccant Qualitate quando sunt aut nimis frigidi, atq; humidi, ut vina tenuia, fructus humidi cucurbitę, olera frigida, aut quando facili putrescunt, ut lac, pituita, & alia id genus, aut quando sunt saporis austeri, ut sorba mespila, cytonia, quę ex vltiori coctione in acidum saporem mutantur. & quancquā Gale. 4. simpl. c. 8. austerum scribit mutari in acidum ex augmento humidi, non tamen negare potest, id etiam fieri accidente calore, qui, ut antea diximus, melancholiam exustam scribit fieri acidam a calore vitio, & fructus etiam quotidie inspicimus vitio tempore ex austeris & acerbis in acidum mutari non tantum propter humiditatis incrementum, quātum propter aeris caliditatem. ex his colligitur corruptionem ad Acidum in Ventriculo neque unico modo fieri, neque ex unica causa, atque ideo iure Alexan. Tral. lib. 7. cap. 16. attribuisse, corruptionem ad Acidum ex intemperie calida fieri, & aliquando sanari refrigerantibus.

Qui super hac questione aliquid dixerunt, sunt Valles lib. 6. controuers. 8. qui hoc tantum docet, acidum saporem non fieri ex intemperie frigida, sed tantum ex calore debili. quia ratione putat se omnes ambiguitates solvere. Sed decipitur, quia corruptio ad acidum in lacte, in vino exili tenui, & similibus, quę modicam habent caliditatem, aut facili putrescunt, non fit a calore imbecillo, sed a calore valido surripiente calidum innatum vel lactis, vel pisanę, vel alterius corporis similis.

Ructus acidus erit in Lienaria bo-

Corruptio Nidore.

Super Ponticas

Hoc etiam dicit Auer. 3. collig. 16. In cuius sententia venit Christoph. à Vega com. 1. lib. 2. de diff. febr. qui inquit, saporem acidum à calido in huiusmodi casibus non per se, sed ex accidenti fieri, quia ex accidenti caliditatis maior surripit minorem; sed neq; hæc solutio sufficit; quãdoq; enim, vt antea significauimus, calor immodicus Ventriculi cibos conuertit ad acidum, quando scilicet aut copiosiores sunt, quàm cõueniant, aut saporis acerrimi, & austeri; in huiusmodi enim casu, si calor non esset validus nullaprorius fieret mutatio sed ex vehementia caloris id quod est copiosum, acerbum, & austum, mutatur in acidum: itaq; si quispiam à vobis quærat, vtrum sapor acidus frigidam sequatur intemperiem, an potius frigidam, & calidam, opus est distinctione; est enim quæstio dubia; duobus, n. modis potest intelligi aut enim quæritur, vtrum sapor acidus sit semper in subiecto frigido, aut quæritur vtrum causa saporis acidi effectiua sit semper frigida.

Ad primum quæsitum resolutè dicendum, omnem saporem acidum, quatenus est acidus, esse in subiecto frigido, nunquam in calido. Aciditas semper soboles frigiditatis, hoc docuit Gal. 4. simpl. 8. 12; 13. 15. dixi autem quatenus est acidus, aduertire, quia in vno & eodem subiecto adest aliquando aciditas, & acrimonia, vt in aceto acerrimo, in melancholia exusta, in quo casu sicut aciditas sequitur frigiditatem, ita acrimonia caliditatem, mistumq; illud est inæqualis intemperatura, vt de aceto docuit Galen. tor. lib. 3. simpl. & de melancholia 4. aph. 22; 23 & alibi.

Ad secundum quæsitum alia est responsio. Causa effectiua saporis acidi, si sermo sit de Ventriculo, potest esse frigida, potest esse calida, & calida agens per se, & ex accidenti: est frigida respectu cibi temperati & moderati: est calida agens ex accidenti in cibo facile putrescibili, vel qui ex propria natura modicam habeat caliditatem: est calor intensus agens per se respectu cibi & potus copiosi, purioris substantiæ, præcipue austere & acerbæ, eadem est ratio corruptionis ad Nidorem.

Nam corrumpitur cibus ad Nidorem aut ex excrementis, aut ex alimentis ex excrementis vel abundantibus vel deficientibus, abundantes sũ bilioli, vel atrabilia res, qui sua caliditate alimentum exutunt, & in Nidorem vertunt, defectus humorum est pituitæ defectus, defectu pituitæ est causa conuersionis ciborum ad nidorem, puto nobis insinuassee hoc Gal. 3. de nat. facul. c. 7. quando

Que ad proponens ea omnia, quæ ad Concoctionem cõferunt, bilem, calorem, spiritum, totam Ventriculi substantiam, præter cetera pituitam proponit. Ego libenter ex aliis intelligerem, quomodo pituita conferat ad concoctionem.

Quomodo Pituita conferat ad Cõctionem. Auditis meam sententiam. Cõctio in Ventriculo est elixationis species. Elixatio non fiat absq; humido; Pituita igitur confert ad Cõctionem tanquam materia humida, ex qua fit elixatio, vt propterea deficiente pituita facilissimum sit cibos cõuerti ad Nidorem, neq; quisquam dicat, potulenta accepta gerere vicem materiæ humidæ; sagax enim natura ideo fecit Ventriculũ pituitæ promptuariũ, vt si aliquando aut deficiat potus, aut

iusto parcior sit, alimenta non exurantur, quæ facillimè exuruntur, si pauciora assumantur quàm conueniat, aut calidiora & sicciora, vt acria & aromatica, aut dulciora, vt mellita, idcirco Gal. 1. de diff. feb. 4. hydrias (placentulæ erant ex melle, sescamo, & farina paratæ apud antiquos) aliaq; id genus mellita, & oua frigida, vel pinguedine, aut oleo, aut butyro in sartagine cocta, & raphanũ, aliaq; id genus in Nidorem veri scribit.

Ex proximè dictis duo statim colliguntur: primum est, Corruptionem ad Nidorem vt plurimũ fieri sine calida Ventriculi intemperie, quãdo scilicet oriatur ex proprietate ciborum, qui vel ex preparatione, vel ex propria natura, vel ex coque di modo, vt frigida, facillè in Nidorem cõuertuntur alterum est, quomodo fiat aliquando corruptio ad putredinem. Fit hæc aut ex intemperie calida humida, de qua verba faciens Gal. 8. meth. 7. dicebat, illa vix absq; putredine stare posse. Fit quoq; ex ciborum natura qui facillè putrescunt, lacticia, & fructus, & alia id genus humidiora.

Signa.

Cognoscitur autem facillè omnis hæc Corruptio: ad Acidum quidem ex ructu acido; ad Nidorem ex ructu nidoroso; ad Putredinem ex annelitu foetido; præterquàm quòd corruptioni Nidorese consuevit succedere ephemera febris, vt docuit Gal. 8. meth. c. 5. Corruptioni ad putredinem succedit putrida; hoc colligi potest ex Gal. 5. in 6. Epid. 3. 1. quando dicit Hipp. rigor ex superiore ventre; febris ex interiore.

Causæ autem sic inter se distinguuntur: nam si error fuerit in alimentis assumptis, ipsimet patientes referunt, nũquid in corruptione ad Acidũ, vel plus nimio se repleuerint, an acidũ cibũ, aut potum, vel putrescibilem, vel frigidũ atq; humidum, aut deniq; austum vel acerbum præsumserint, sicut qui Nidorosum eructant interrogati referre possunt, vtrum oua frigida, aut hydrias, vel raphanũ, vel quid tale nidorosum acceperint.

Quòd si error sit in excrementis, acida cognoscuntur ex Canina Appetentia ex iuuamento ciborum calefacientium, & medicamentorum, ex vomitu vel pituitoso, vel melancholico acido; sicuti biliosa deprehenduntur ex amaritudine oris, cardialgia, sit, vertigine, inappetentia, vomitionibus, & deiectionibus biliosis.

Quòd si fiat Nidor pp pituitæ defectum, necessarium est, aut istos admodũ frugaliter & temperanter viuere, aut frequentibus vomitionibus, vel deiectionibus ventris esse deductos, præterquàm quòd neq; exspuunt, sed perpetua siti vexantur.

Quando autem hæc corruptio intemperiem sequatur frigidam, ea carentia suis cognoscitur, ex appetentia valida, ex iuuamento calidorum, & ad differentiam erroris externi vnusquisque cibus, etiam moderatus & optimus, ad acidũ vertitur.

Sicuti in calido Ventriculo adest inappetentia suis, iuuamentum à frigidis, & cibi concoctu faciles vertuntur in Nidorem, difficiles verò optimè mutantur; nam, vt dicebat Galen. 1. de loc. aff. 4. 2. de alim. facul. 6. in calidis bubula caro melius

Nidor ex Pituita defecit.

concoquitur, quàm alia edulia melioris succi, & A
facilioris concoctionis.

Distinguetis autem calidam & siccam intemperiem à calida humida; quia calida sicca præter situm totum corpus est extenuatum: Venæ quidem sunt amplæ, & nigro sanguine repletæ, deficit tamen carnosa substantia, eo quia ex chylo exusto sanguis exustus generatur: quæ carnes ab horrent, hinc Hipp. 4. in 6. Epid. 2 §. Venticulo calidi carne frigidi.

Calidi & humidi neque sitiunt, bene habituantur sunt, & cibum facile ad putredinem conuertunt. B

Pregnotica.

Est tamen omnis hæc Corruptio mala, quamquam illa, quæ sit ad Nidorem, sit deterior; nam Acida est sine febre; Nidoroſa inuehit ephemeram, & propterea quæ ad Putredinem, deterior est Nidoroſa, quia generat febrem putridam deinde malitia cuiuscunque corruptionis hinc patet, quod ex omni corruptione fiat macies corporis, aliæque plures in corporis ambitu, ac determinatis partibus morbi, de quibus meminit Gal. 3. de caus. sympt. cap. 1.

Curatio.

In præſenti curatione non erit sermo de emendando errore externo, siue in alimentis, siue in excrementis, non in alimentis, quia hic non est ex usu artis: neque in excrementis, quia supra multis docui, quomodo omnia excrementa siue in cauitate, siue in tunicis contenta expurgari debeant, itaque de remediis ad corrigendas intemperies erit tantum sermo, neque de omnibus sed tantum de frigidis, quia in præcedenti lectione calida proposuimus medicamenta.

Itaque hoc vnum moneo, antequam aggrediamini curationem intemperaturæ calidæ, ex qua sit Nidor, vel Putredo, si foris illa corruptio adhuc persistat, ante omnia amouendam esse: tollitur autem, si propensionem habuerit ad intestina, vel clysteribus vel deiectionis, deiectionia autem sint medicamenta frigida, ut Syrup. ros. solut, tamarindi cassia.

Notatio.

Nolo ut hac in parte sequamini Galenum, qui 8. meth. §. in hac corruptione ad Nidorem vitur diarriopipereo simpl. & primo de loc. affect. 4. in eadem vitur potione ex absinthio, aut hiera, excusandus tamen est Galenus, vel quod mitiora non habuerit, & frigidiora, vel quod respexerit ad corruptionem ad Nidorem factam ex errore externo, non ob intemperiem calidam ventriculi. Quod si natura ad superiora propensionem habeat, vomitu educatur hæc corruptio, deinde alteranda est intemperies calida, quando siccitati fuerit connexa, aut sero captino, aut aqua hordeacea, aut, si macies vsgeat, iure pullæ alterato cichoraceis, & hordeo, aut lacte asinino. Acta frigida prohibet. Refert enim Gal. 7. meth.

8. quendam hac intemperie calida & sicca laborantem ex potu frigido in difficultatem deglutationis incidisse, & eandem obiisse: propter quam causam exteriora quoque admodum frigida suspensa sunt, vel quia Ventriculi caliditatem & robur exsoluant, vel quia, ut docet Galenus loc. cit. septum transversum refrigerent, & anhelitus difficultatem inferant: itaque Ventriculo quanquam calido nihil actu frigidum apponatur, sed siue oleum rosaceum administretur, siue molinum, aut simplex, aut succo lactucæ, vel cichorei commistum, tepida potius, quam frigida administrentur: neque intermittantur, ea quæ robur conferuant, ut oleum masticæ, aut de absinthio.

In calida & humida vno verbo conueniunt omnia alimenta, cibaria, potiones, quæ saporem habent vel austerum, vel acerbum, vel acidum; hæc enim omnia refrigerant, exsiccant; præterquam quod conueniant etiam pulueres ex terris medicatis, ut terra lemnia, aut samia, puluis testarum buccinarum, cochlearum, cornu ceruinum, margaritæ præparatæ; hæc enim omnia refrigerant, exsiccant, C

Videtur ratio.

Atque ad proportionem respondeat quantitas cibi, qui in calido siccoque ventriculo sit copiosior: In calido & humido sit tenuior.

DE ALUI FLUXIBUS.

Conuerto iam sermonem meum ad Fluxus Alui, & communem Medicorum sententiã secutus omnes ad tria capita redigam: Lienteriã scilicet, Diarrhœam, & Dysenteriam; nam sub Lienteria Cœliacam passionem compicitor, sub Dysenteria Tenesmum, sub Diarrhœa omnes Fluxus Hepaticos.

DE LIENTERIA. Cap. XVII.

De Lienteria autem primò erit sermo, quæ Leuiss Intestintorum dicitur, sicuti Cœliaca Affectio Ventralis Vocatur. E

Differentia Lienteriæ, & primo de legitima.

Est autem Lienteria duplex, Legitima, & Spuria. Legitima est celer deiectio alimentis assumpti, non mutati, ex imbecillitate retentricis fundi & inferioris orificij Ventriculi, atque intestinorum superiorum, est celer deiectio alimentis, quia alimentum, simulatque ingestum est, deiecitur, & ideo nullam subit mutationem, sed eundem colorem, odorem & substantiam retinet, in quo differt à Cœliaca Affectione, in qua alimentum deiecitur quidem, sed aliquo temporis spatio reſerunt, & aliqua ex parte alteratum, diximus hoc fieri ex facultate retentricis inuvalida; quamquam enim cibus non mutatus videatur pertinere ad vitium facultatis alteratricis, nihilominus, ut docuit Gal. 6. de loc. aff. 16. aph. 1. lib. de Defectio.

de diff. sy npt. 4. non idem dicitur non mutati, A
quod facultas alteratrix sit invalida, sed quia de-
centi tempore non sentiuntur. est itaque vitium
sentientis & reitricis utriusque inferni. Pylori vo-
cari non solum ex imbecillitate superioris, fuit
Supinitas, Subversio, Nausea, Vomitus, ita ex im-
becillitate inferioris fit Lienteria. hoc colligitur
ex Gal. 3. de nat. facult. 5. addidi imbecillitatem
reitricis intestinorum, secutus Galen. 3. 22. 3. in
1. Epid. 3. 5. atque alibi purities, ubi Lienterie causâ
intestinorum leuitatem seu imbecillitatem pro-
ponit, quicquid in hac parte And. Laurent. sen-
tat controuersi. 18. libr. . quiputatur, intestinis nulli
am esse communem vim reitricem.

Causa Imbecillitatis Reitricis Facultatis.

R Edidit verò hac Facultas imbecillis, aut
ex intemperie frigida & humida, sed præ-
cipue humida laxante, & dilatante. Os Ventri-
culi Infernum, ac membranas intestinorum, &
Ventriculi, aut ex citore externo, qui vel in ex-
crementis vel in assumptis est, in excrementis
pituita frigida humida, quamquam Gal. 3. aph.
21. & 6. aph. 2. eandem quoque proponat. Que
tamen ad Lienteriam faciendam mihi apta esse
non videretur. habet enim facultatem adstrictio-
nam, qua ratione huius in supremo officio In-
ferni Cautam excitat, ita constringendo infe-
riorem celerem deiectionem prohibere potest.
videtur. Accedit, quod si Hipp. 6. aph. 1. Rictum Acidum
proponit, nunquam futurum saluti argumentum
Lienteris, ergo sequitur acidum humorem non
posse esse causam Lienteris, quando superue-
niente huiusmodi Rictu, humoris Acidum indice,
iam salus est propinqua.

**Error in
Assump-
tis.** Est quoque error in assumptis vel medicamē-
tis vel alimentis medicamentis lubricantibus,
frequenter vitiatis, ut Cassia, &c. alimentis pa-
riter, frequenter vitiatis in prima mensa humi-
dis, & facile putrescibilibus, ut lacte, & fructi-
bus horatis, aut nimium oleosis, & pinguibus
& hæc de Lienteria Legitima.

De Lienteria Spuria differentis & causis.

S Puris verò duplex est. Vnus quidem est excre-
tio alimenti incoacti, sed admodum tarda,
ob vitium facultatis alteratricis. Altera est deie-
ctio cetera quidem alimenti non mutati, sed ob vi-
tium facultatis expultricis. Prima differentia se-
quitur Cruditatem Ventriculi insignem, ubi e-
nim cibus post 10. vel 12. horas in Ventriculo
non transmutatur, aut vomitu emittitur, vel per in-
feriora, si per inferiora, potest vocari Lienteria,
sed Spuria, & ratione Formæ, & ratione Causæ,
ratione Formæ quia non est celeris deiectio, ra-
tione Causæ, quia non sequitur reitricem in-
validam, sed alteratricem. Altera differentia.
Scilicet Lienteria est tantum spuria ratione Causæ

si sit enim deinde alimentum mutatum, & ce-
ler, sed sit à facultate expultrice irritata huius
memini Gal. 3. de caus. sy npt. 2. 6. aph. 1. Expul-
trix autem irritatur vel ab excrementis, vel ab
alimentis ab excrementis salis, biliosis, atrabi-
lariis: ab alimentis verò acutibus aromaticis, sal-
sis, amaris: quandoque etiam à medicamentis
vel delectis, ut est Anisum, vel nimis fre-
quenter vitiatis, præcipue in pulvere acceptis;
pulvis enim facile in membranas impingitur,
& perpetuum facit irritamentum.

Hæc verò causæ tunc fortius agunt, cum vl-
cus in interiore Ventriculi tunica, aut intestino-
rum fuerit, cui vlceri ad sanitatem perducto suc-
cedens cicatrix, quando magna fuerit, una &
præcipua est Lienterie causa, ut quemadmodum
scribit Gal. 6. aph. 1. veteres quidam existima-
runt, nullam esse aliam Lienterie causam, quæ
nimiam tunicæ interioris leuitatem ex cicatrice
inductam.

Signa.

Cognoscitur facile Intestinorum Leuitas, si
cibi & potiones impermutata excernantur
sicuti Cæliaca affectio contra distincta cognosci-
tur ex excrementis aliqua ex parte mutatis, val-
de humidis cum sonitu, flatibus & fetore ciectis
Legitima Lienteria sic contra distinguitur à Spu-
ria, quod in Legitima sit celerissima deiectio, & si
ne morsu in Spuria aut parua est deiectio, aut
sit cum morsu, rursus Lienteria, quæ sit simpli-
ci intemperie cibum habet immutatum, sed sin-
cerum & impermixtum, quæ sit ex præsentia pi-
tuita, habet deiectionem alimenti humidioris,
spumosi & pituitæ commixtam, quæ sit ex ali-
mentis, sola agrotantis relatione comparari po-
test, quæ verò Spuria est propter vitium conco-
ctionis, habet quidem cibum immutatum nullo
humori commixtum, sed non nisi post multas ho-
ras deiectum; illa, quæ sit ex morsu ab humori-
bus salis, biliosis vel atrabiliaris, præter alia si-
gna superius proposita habebit alimenta his hu-
moribus permixta, & si ad sit vlcus, simul cum a-
limentis sanies, & sanguis effluit, & dolor senti-
tur in Ventriculo, quod si fuerit cicatrix, neces-
sario vlcus præcessit, & hæc species Lienterie est
insanabilis.

Pregnostica.

EXcepta Lienteria, quam parit cicatrix, quæ
curam non recipit, ceteræ curantur quidem,
sed si diu perseverarint, ad maciem totius corpo-
ris, aliquando ad Hydropem, aut saltem Cachex-
iam deducunt.

Curatio.

IN curanda Lienteria & Cæliaca affectione di-
stinguendæ sunt differentiæ, & causæ, & quod
ad differentias pertinet, tractanda est primo Le-
gitima, deinde Spuria, quoad causas, cum Legi-
tima sit vel ex copia humoris pituitosi vel ex in-
tem-

tempeste humida, agendū primò de humoribus.

Humores isti vel in Ventriculo continentur, vel in intestinis: si in Ventriculo, vomitu sunt purgandi, ut voluit etiam Rhases; nam euacuatio per superiora maximè facit ad retentionem alimenti, reuulsis n. humoribus ad superiora, os Infernum paulatim adstringitur & roboratur. paratur autem Vomitorium ex drach. pulueris aseni in iure, vel et decocto raphani in eodem iure simul cum oxymellice, sed si puritas fuerit extra Pylorum, in ipsi intestinis, pes inferiora est deicienda, atque ad hanc vnam respexit Hipp. B & cum eo Gal. in comm. 1. 2. par. 4. quando dixerunt, Leuitatem Intestinorum ex pituita per inferiora cutandam esse. Ceterum in eligendis subductoris medicamentis video Medicinæ scriptores, quantum ego censeo, longè à scopo aberrare.

Imbecilla, ut dixi, in huiusmodi affectibus est facultas Reientis, & Ventriculi, & Pylori, & Intestinorum; neque enī sola pituitæ præsentia possit Lienteriam facere, nisi etiam iustissima solida cōsistat in susceptilem intemperiem. itaq; C omnia medicamenta relaxantia, ut castia & manna, & omnia electimè purgantia, ut colocynthidis, quam proponit Rhases, & Elleborus, quæ proponit Auic. & alia omnia huius farinae suspensa sunt, vtpote quæ humores ad locum imbecillam ducant, & fluxionem magis concitant. quid igitur agemus? Auditores, si vobis suppetat aquæ Tectuarianæ copia, vel alterius salis potabilis, hac tuo viemini. Pituitam subducit, Ventriculū & intestina calefacit, & exsiccant, atque simul adstringit, in defectu aquæ Tectur. accipiuntur myrob. D catheduli cōtiti ad drachm. misti cū oxym. simpl. Hiera quoque simpl. vsque ad vnc. sem. in hoc calu administrari potest. Ceterum clysteres existente materia in intestinis, satis superque pituitosum succum deducunt, & si medicati fuerint, simul adstringent: poterit autem clyster sic parari.

Recipe pulg. Origan.

Calamentan. M. i.

Spica, Squinant. an. M. sem.

Coriand. prepar. drach. ij

Decoct. secundum art. deinde

Recipe diel. decoct. lib. i.

Hiera pro clyst. vnc. sem.

Mell. ros. vnc. ij.

Ol. laur. mastic. an. vnc. i. M.

Sed maior est difficultas de preparatis. Audientes hæc qualiacūq; fuerint sūt mea inuēta; nā ex vna parte scriptores proponunt pro crassa materia multam, mel ros. oximel. at verò hæc omnia quæcumque incidunt, alium subducunt, atq; ideo suspecta sunt. sunt ergo illa eligenda, quæ F incidant & simul calefaciant, exsiccant atq; atq; adstringant. Inter cætera probatur acer. scilicet syr. de mentha, de absinth. sed præ cæteris omnibus laudatur vel sal theriacale, vel sales extracti ex pulueribus stomachicis, catonificis, ut esset sal extractum ex absinthio, ex mentha, spica, & si quispiam propter difficultatem extractionis salium non facile habeat hæc in promptu, lixiuia tamò

facile parare poterit ex cineribus horum medicamentorum, quantum possint lixiuia ad abstergendum & exsiccandum, docuit Gal. ex Asclepia de 2. de antidotis ca. 7. qui ad venena ex spongiis comparata probat lixiuium ex cinere samentorum vitis præparatum. at si lixiuium ex cinere samentorum vitis potest abstergere humorum crassitiem, cur non poterit idem puritatem abstergere, præcipuè vero si paratur ex cineribus stomachicis, si comburatur absinth. mentha, coriandru spica, squinantum, pulegiū & calament; ex quibus omnibus lixiuium in hūc vsū parari potest: sit autem dosis vnc. i. siue simplex præbeatur, siue mixtum cum aceto scillino, aut syrupo de mentha, aut simili. Post absterisionem, & euacuationem calefaciendus est Ventriculus, medicamentis tamen adstrictoribus, & inter cætera misticè facit drach. pulue: coriandrorum, quotidie exhibita tribus horis ante cibum ex vino aliquo odorato. idem facit miua cydoniorum composita theriaca, mithrida: & quando fluxio sit vsque adeo immodica, ut vires deciat, præbendæ sūt antidoti opiatæ, ut philonium ad drach. sem. cum enim somnis conediatur, cibus retinetur, atque sic conquiritur.

Interim extrinsecus adhibendum est emplastrum ex crusta panis, cerata varia calorisifica, præcipuè medicamentum ex pice, addito pipere, & pyrethro, cuius anteq memini.

Curatio Spuria Lienteria.

Sed si spuria fuerit Lienteria, & quidem fiat ex humoribus, acribus, aut falsis, hi quoque ante omnia sunt educendi, vomitu potissimum ex aqua & oleo, deinde verò alterandi non quacunque ratione, sed medicamentis, quæ etiam adstringant; idcirco aut præbeat serum chalybeatum, aut in eius defectu lac ipsum chalybeatum: conuenit autem summopere vsus ipsius chalybis in puluere hunc in modū accomodari.

Redipe Saccar rosat. vnc. ij.

Chalyb. præp. in acet. drach. ij.

Coriand. præpar. drach. i.

Trochis. de spod. drach. sem.

Syr. myrt. q. s.

M. f. mixtura mollis, dentur drach. ii. trib. hor. ante cibum.

Interim extrinsecus fiant fomenta, & inunctiones frigida, & adstrictoria, de quibus meminī superius.

DE DIARRHOEA. Cap. XVIII.

Lienteris succedit *Διάρρεια*, quam Latini Alui Profluium vocant; estque deiectio frequentis, copiosa, liquida, materia excrementitiae di. Defui- quens, copiosa, liquida, materia excrementitiae di. xi frequentem, copiosam, & liquidam, vtolsten de rem conditiones prorsus oppositas conditionibus naturalis excrementi, quarum meminit Hipp. 2. progn. 13. dixi autem, esse deiectionem materiæ excrementitiæ, ad differentiam Lienteris Dysenteris, & Fluxionum Hepaticarum, in quibus excernuntur humores alimentales.

Cons.

Qua autē ratione Immodicus Fluxus sit sup-primendus, & Deficiens iuuandus, non est facile intelligere.

Immoderatus Alui Fluxus duobus modi intelligi potest: aut enim vires deicit, & syncopē inducit: aut duntaxat imbecillitatem aliquam, seu corporis extenuationem, lassitudinem, vel quid tale infert.

Si vires deiciat, vnicuique constat Fluxum statim esse supprimendum, vel adstrictorium, vel opiatum, vel validē reuellentibus, de quibus in tractat. de Syncope ex Fluore Alui, ad quem locum vos remitto.

Sed si quantitas excurrentis copiosa quidem sit, non tamen syncopen inducat, non statim confugiendum ad adstrictoria, non ad opiata, & reuulsoria varia à scriptoribus proposita, quæ si indistinctè administrantur, omnia sunt periculosa, imò lethalia: oportet itaque illum, qui rectè Alui Fluxum sit curaturus, ante omnia distinguere locum, ex quo sit fluxus; deinde verò & causā, itaque nos id ipsum facientes, incipimus à Fluxu Stomachico, idest ab illo, qui sit communicata materia ab ipso Ventriculo, vel primariò humorē generante: vel à cerebro suscipiente: in hoc casu ante omnia conuenit ipse vomitus, reuellitur enim materia, & euacuatur per locum decentem, ut propterea in hanc rem scripserit Hippoc. 6. aph. 1. 5. in longis Alui Fluoribus superuenientem vomitum Fluxum sanare: debent autem vomitoria minime oleosa, aut pingua esse, sed, ut antea dixi, sufficit drach. i. pulu. rad. asari in iure, cum, vel sine oxymell: & facta euacuatione, si humor generetur in Ventriculo, calefaciendus est Venter, docui modum calefaciendi in Cap. de Cru dit. Si fluat ex capite, est reuellenda materia ad nares, ad suturas, per frictions, punctiones, sme gmata, pulueres calidos, vel attractorios, ut calamenthi, maioran, ireos, aristolochiz, sinapi, piperis & pyrethri: & si inueterata sit cerebri affectio, reuellenda est materia per cauteria, vel occipiti vel brachiis infixa, exsiccandumque omni ratione caput.

Materia in mesaraicis contenta im probatur. Vomitoria.

Sed si materia in mesaraicis contineatur, ne, que conueniunt vomitoria, neque adstrictoria neque reuellentia ad vrinæ, neque reuellentia ad ambitum corporis.

Non sunt tentanda Vomitoria, quia ex Gal. & Hipp. 4. aph. 1. 1. intellexistis, quæ sunt in intestinis, non sunt euacuanda per vomitum: at materia istæ aut continentur in intestinis, aut in venis magis distantibus, quàm sint intestina à Ventriculo: ergo multo minùs licet hanc materiam extrahere ad Os Ventriculi violenter. Confirmatur quia antequàm ducatur ad Ventriculum, debet duci in Intestina: at intestina Fluxu laborantia sunt imbecilla, ergo ipsa suscipient Fluxionem, & sic Fluxus augebitur, tertio hæc quæ in venis continentur, siue lienis, siue in sima iecoris, aut aliis propinquis paribus, necessariò sunt calida, putrida, corrupta, unde multo minùs conuenit ea per os ventriculi educere, quod nobile & sensibile est quàm per intestina ignobilissima, quòd si quis Hipp. obijciat 6. aph. 1. 5. dicentem Alui Fluxum

Vomitum sanari, & Gal. in eod. com. qui scribit, docere nos naturam quid agendum sit in Fluxibus Alui: Respondeo, hanc sententiam de Fluxu Stomachico & Cerebrali intelligendam, non de aliis, propter causas dictas, & dicendas.

Obiectio soluitur.

Neque conueniunt Adstrictoria: nam si materia praua, & corrupta iam circa venas istas est collecta, quid præstabunt adstrictoria? Fluxionem quidem impediunt, sed in parte, ubi humores sunt vel tumorem, vel obstructionem aliquam excitabunt, hoc potest colligi ex Galen. 1. 3. meth. 1. 4. qui in principio inflammationum iecoris prohibet adstrictoria, ne retentis humoribus inflammatio augeatur.

Adstrictoria.

Neque conueniunt Diuretica, hoc videbitur paradoxon, quia Galen. 5. meth. 3. & 1. 3. method. 1. 1. docet laborantibus Intestinis humores ducendos esse ad Vrinæ; & propterea scribit Hipp. 4. aph. ult. Mictus plurimus paucam significat Deiectionem: ex quo colligimus, diuersionem humorum ab Intestinis ad Renes Fluxum Ventris sanare, hæc tamen sententia mihi non probatur, & rationem desumo ex Gal. 7. meth. 1. 1. qui vniuersalem tradens rationem curandarum Fluxionum aperte docet, nunquam esse deferendos humores à partibus minus momentaneis ad magis momentaneas. Hoc stante vos ipsi considerate, qualisnam ex his duabus partibus sit magis momentanea an in testina, quæ sunt ampla, & copiam ac qualitatem humorum absque insigni molestia sustinere consueuerunt, an potius iecur, Vena, Renes ac Vesica ipsa, quæ omnes partes sunt nobiles, angustis viis præditæ, ut & colluues, & acrimonia, aut Calculos, aut Vlcera, vno verbo aut Dysuriam, aut Stranguriam gignere possunt & eo proissimùm, quòd humoribus ultra gibbâ iecoris partem existentibus datum est intestinū ipsum, tanquam locus ad purgationem accommodatus, Gal. 1. 1. met. 1. 9.

Diuretica.

Neque ducendi sunt humores ab his loci in Ambitum totius corporis, quandoquidē non possunt à mesaraicis in ambitum corporis transmigra- re, nisi per iecur, & Venas communes, hoc autem est trāsferre materiam ex locis minus momentaneis

Attractio ad Ambitum corporis.

in nobiliores: & propterea Gal. 4. de tnen. val. 6 in abundantia crudi succi, circa primas vias consistens, apertissimè prohibet, vsum omnium attractentium foras; at si prohibet vsum attractentium foras in simplici qualitate, multò magis prohibebit in corruptione succorum, itaq; existentibus humoribus circa has partes, neque Vomitoria, neque Adstrictoria, neque Diuretica, neque Attractentia ad Ambitum corporis conuenire possunt.

Multò minùs accipienda est omnium fere communis sententia, qui locis, à quibus Fluxio incipit, quanquam nobiles fuerint, ad reuulsionem faciendam cucurbitulas adhibent, ut si, à iecore fiat Fluxio, adhibent cucurbitulas iecori; si à Liene, Lient, error sanè maximus, quia non modò retinet materia ibi congestam, sed ex propinquis partibus aliam ducit, & trahunt, contra quæ præcepit Galen. 7. meth. 1. 1. & suadet ratio. Quid igitur agendum in huiusmodi casibus tria sunt præstanda: primò euacuanda est materia per Aluum,

Tris Alui Fluxus præstanda.

Aluum, aut clysteribus, aut medicamentis aditus. **A**ctorns. secundò, si tenuis fuerit, & calida, meral. fanda, & refrigeranda: tertio expugnand. sunt morbi, propter quos materia augetur. Medicamenta sunt. Myrobala in ipis si materia fuerit aquea, exhibeatis hos bolos.

*Recipe Myrob. abebul. contrit. drach. ij.
Coriand. præp. drach. sem.
Specier. hier. drach. i sem.*

M. & cum syr. myrth. aut de menth. f. boli.
Si fuerit calida.

Recipe Rhabarb. el. immat. drach. i.

Nón ipsum rhabarbarum torrefactum propono, quia hoc amittit adstrictionem.

Myrob. citrin. comut. drach. i.

Cum syr. myrth. aut succo plantag. f. boli & deaurentur.

Clycteres in materia calida debeant sic componi.

Recipe Fol. plantag. M. j.

Hordei torref. p. f.

Bulliant vel in aqua, vel in sero chalyb. deinde

Recipe præd. feri lib. i.

saccari rub. vnc. ii.

Mutyri vnc. ij.

Quòd si fuerit frigida, parentur clystere ex vino chalybeato, aut aliqua aqua medicata, vel aluminosa, adin isto ipso saccharo.

Facta Euacuatione, si materia sit calida, tenuia inestanda refrigerantibus, ut oriza, alyca, pedibus vitulinis, curc, cerebto, atq; ceteris vinctuosis etiam emplasticis. Conuenit in hoc casu lachalybeatum, aut doctum cum aq. plantag. hoc modo.

Recipe lact. lib. j. sem.

aq. plantag. lib. sem.

bulliant vsq; ad consumt. lib. i. Deur deinceps lact. prædicti vini, quatuor hor. ante cibum.

Quòd si materia sit tenuis frigida, poteris exsiccare hoc puluere:

Recipe Thur. inasculi

maßich. an. drach. i.

coriand. præp.

cymun torref. & pulu. an. drach. i. sem.

caryoph. ciuam. an. drach. sem. M.

Datur drach. vna ex vino aliquo odor. & subadstring.

Hæc quidem exsiccant, & moderate adstringunt, sed non sanant vitia partium: verum remedia, quæ sanant, proponemus infra.

Procuranda Diarrhœa facta à fluxione venarum communium, ante omnia distinguere oportet: vitium fluant humores propter vitium attracticis, an potius propter laxitatem, & amplitudinem viarum, vel propter robur partium munitur, irritatæ à copia, vel ab acrimonia.

Si fluant ob vitium attracticis facultatis, amouenda est causa attractionis, quæ erit vel dolor, vel calor in Ventriculo, & Intestinis, atque ideo calor est refrigerandus sero aut aqua horde. vel alijs sullant. frigidis, aut aq. naturalibus ferratis, acidis. Dolor & mordicatio sanari debet epice-rasticis, lacte, ure pingui, clysteribus ex pulana

ex cod. lacte, & alijs propositis in tract. de Cholera.

Quòd si fluxio fiat propter venarum laxitatē aut amplitudinem, adstringendæ sunt partes ad Ventriculum & Intestina atque tenentes, externis & internis.

Extrinsecus fiat hoc Fomentum:

Recipe Fol. labrusc. cori. granat.

Balaust. Rosarum.

Hypocist. an. M. j.

Bull. in sud. quant. aqu. & aceti. & facta express. f. foment. cum spongiis quæ adhibeantur calidæ regioni totius Ventriculi, & Abdominis, & subla-tus spongiis adhibeatur hoc ceratum.

Recipe Pulv. ros. drach. ij.

corall. rubeor.

trochisc. despodio an. drach. i.

Mastic. Caryoph. an. drach. sem.

Cere q. f. M. f. Ceratum.

Intrinsecus in causa calida pareatur hic Puluis

Recipe corall. rub. ros. rub.

flor. granat. aa. drach. ij.

Coriand. præp. drach. i.

C Puluer. & deur ad drachm. vnam.

In causa frigida accipiat cyminum torrefactum, thus, myrrham, styracem, masticem, cori-andros, pariter puluerizata ad drach. i.

Sed si fluxio fiat exiliente plenitudine, aut ca-cochymia in venis communibus, hic labor est. Primò quidem in hoc casu omnia Adstrictoria sunt suspecta propter rationem superius adducta quod scilicet prohibeatur fluxio a parte nobilio-re ad ignobiliorem: nam si retineatur materia in venis communibus, necessario putredini, & feb-bus periculosa: certum imminet periculum.

Neque conueniunt Expurgantia eandem ma-teriam per Aluum, quæ iam supponimus plus in-isto fluere, quæ scilicet materiam alimentalem, quæ in Ventriculo & Intestinis continetur, secò ducit.

Neque etiam conueniunt Vomitoria dupli-cem ob causam: primò quia materia, quæ in ve-nis contingitur computribus, antequam attra-hatur ad Ventriculum, peruenit ad Intestina, quæ cum sint imbecilliora, ipsa potius suscipient flu-xionem quàm Ventriculus; alia est ratio, quòd scilicet non liceat per partem vsque adeo tenuē-tem prauos humores educere, idcirco Gal. 1. 1. meth. 9. loquens de euacuanda materia in venis communibus contenta, inquit per Vomum il-lam non esse educendam, nisi sponie sua ad Ve-ntriculi impetum habeant.

Quid igitur agendum? dicam liberè meam sententiam, in hac venarum plenitudine ante Sang. omnia laudo aliquam sanguinis missionem. **missio in**
Scio statim aliquem dicturum, Galen. hoc pro **Venarum**
hibuisse 1. ad Glauc. 14. acut. 16. cui satisfaci- **plenitu-**
mus infra: nunc dicam, propter quas causas ve- **dine.**
næ sectionem collaudem in Diarrhœa. **Obiectio**

Primo conuenit vne sectione, quia partem illius materiz, quæ in venis continetur, simul cum san-guine educit; sunt enim humores omnes simul mixti, & perfectam venam omnes simul expur-gantur, ut docuit Gal. 4. aph. 2.

Præterea hæc sanguinis missio reuellit ab inte-
stinis abique periculo; neque enim materia, quæ

euacua-

ducatur, in alium locum transfertur, sicut pie-
raque reuulsiones faciunt.

Tertio. Hec venæ sectio expugnat causam
augentem ipsum humorem, qui confluit ad inte-
stina: nam in plenitudine adest intemperies cali-
da humida. Venæ sectio refingerat & siccataq;
ideo Gal. noster 7. meth. 11. in omnibus Fluxio-
nibus ad Ventrículum inquit corpus ipsum aut
vacuandum, aut purgandum per euacuationem
intelligens sanguinis missionem, quam contra
distinguit à purgatione, clarius 5. meth. 3. in Flu-
xitus Alui à reuulsione inquit ducendos esse
humores ad vterum. Ego peto quosnam humo-
res voluerit Gal. duci ad vterum. non est profes-
sio existimandum, voluisse Gal. duci ad vterum
bilem, pituitam, aut atra bilem, quia excitaretur
morbus multo deterior, quàm Diarrhœa minus
malum est, ut fluant isti humores per Intestina,
quàm per vterum, & tamen Galenus consulit re-
uulsione facienda ad vterum nihil aliud vult
Gale. Auditores, quâ illud ipsum, quod docuit 7.
meth. 21. Fluxiones. scilicet ad ventrem aliquando ferri
propter suppressos menses, aut hæmorrhoidas, aut
membrum mutilatum, aut aliam suppressam ex-
cretionem, in quo casu Fluxus curatio est reuul-
sio mensium, apertio hæmorrhoidum, denique ex-
cretionis consuetudo: ita quod non est usque adeo
timenda sanguinis missio in Diarrhœa, quando
adest venarum plenitudo, vel cum suppressione
vel sine suppressione consuetudine excretionis: &
ideo Auic. 16. tertii tract. 2. cap. de Diarrhœa ex
vitio lienis scribit, si opus fuerit missione sangui-
nis in hac Diarrhœa mittendum esse sanguinem,
quod habet à Rhaie in diuisionibus: si licet id
facere in Diarrhœa melancholica ex liene, licebit
etiam in biliosa, vel atrabiliari cum plenitudine
totius corporis.

Ad Galenum loc. cit. dico, prohibuisse venæ
sectionem in Fluxu Alui consequente magnitudinē
febris alicuius acutæ, de hoc loquitur 1. ad Glau.
c. 14. loquitur. n. ibi de febribus accidentibus. inter
quæ est Fluxus Alui, itaq; Alui Fluxu incipiente
cū febribus ipsis, neq; ego facile suadeo sectionē
venæ, cum natura in febribus ipsis siue critico
modo expellat, non est impedienda, siue symp-
tomatice, non est irritanda, aut vltius agitata,
& hinc dicebat Hipp. 1. aph. 20. Quæ iudicantur
& iudicata, &c. sed extra febres alia est ratio, cū
non sit necessarium id fieri critico modo, sed, ut nūc
supponimus, deponente natura plenitudinem to-
tius corporis, quæ continuò fouetur à calida & hu-
mida intemperie in hunc imbecillē locum, ut si
plenitudo non minuatur, si intemperies non alte-
retur, Fluxus nunquam cessabit, itaque ideo 4. ap-
cept. 116. inquit Fluente Aluo sanguinem non
detrahes, quia si post sectam venam perseveret
Fluxus Alui, vires deiciuntur. Sic ego facio hanc
consequentiā: si secta vena cesset Fluor Alui,
ergo secunda vena in Fluxibus; na cessante Flu-
xione, vires conseruabuntur; sed sic est, quod in
plenitudine venarum perfectam venam, facta re-
uulsione, euacuatione, & alteratione intempera-
turæ augment materiam Fluxus, debet cessare
Fluxus Alui, ergo conuenit venæ sectio.

Pro curando Alui Fluxu ex cacochymia in ve-
nis communibus subsistente, nil accommodatius
remediis diureticis, & in cutem ducentibus, quæ
simul & semel intemperiem corrigant venarū;
nam quod spectat ad Diuretica, si materia fuerit
acris, siue bilis flaua, siue atra, duci poterit ad vi-
rinas aut emulsionem seminum melonum, aut a-
qua capill. Vener. cultura graminis endiuæ aut
sero capr. aut aquis medicatis naturalibus frigi-
dis, Villensibus in agro Lucensi, Calderianis in
agro Veronensi, aut Virginis in Patuino agro,
omnibus tandem, quæ habent mineram, vel fer-
ream, vel æneam, vbiunque reperiantur.

Quod si humor sit frigidus. Diureticis expur-
gandus est calidis, ut decocto asari, apii, petrosel-
tænic, asparagi, rufci, ononidis, aut aquis naturali-
bus medicatis, sulphuratis, aluminosis, & nitrosis
aut tandem decoctionibus lassa, saxatras radices
chinx, rad. canç, seu arundinis, quæ omnia partim
ad virinas, partim ad corporis ambitum humores
ducunt, licet multo accommodatiora sint ad du-
cendam materiam in corporis ambitum car-
duus benedict, tormentilla, iuniperus, &c.

Ceterum debent etiam in hunc usum Exterio-
ra administrari remedia in cutem attrahentia, &
simul alterantia: & in Fluxu quidem bilioso &
atrabiliari nil præstantius est balneo aque dulcis
tepido, alterato, violis, hordeo, fol. vitis, salicis,
malua, althæa, &c. sicut in causa frigida balneū
conuenit calidum, vel ex aqua sulphur. aluminos.
aut nitrosa, vel ex dulcibus, sed alteratis, salua, ro-
re marino, iunipero, origano, calamenth, &c. cali-
dis marinis: in eundem usum veniunt frictiones
asperæ, inunctiones calidæ ex oleo, chamomel. a-
noeth, lilorum alborum: faciunt etiam hoc ipsum
dropaces, seu cerata attractoria, sinapismi; & in
Fluxibus inueteratis, & contumacibus etiam ve-
siantia remedia. Pac ratione reuellit mater-
ia, & simul etiam alteratur temperamentum
partis humorem generantis.

Sed si Alui Fluxus imperfectus fuerit quæ-
ritur: quid tum sit agendum.

Disgladiantur inter se Medicinæ scriptores, &
adhuc sub Iudice lis est: num Fluxiones istæ si-
ue in ventrem, siue in alios locos, cū imperfec-
tæ fuerint, sint iuuandæ.

Gal. 1. ad Glau. c. 14. generalem videretur cōsti-
tuisse regulam in Alui Fluxu, etiam si nō fuerit
promultitudinis ratione, nil esse innouandum, &
illos, qui aliquid tentare voluerunt, vel sanguinē
mittentes, vel aluum subducentes, in grauiora
discremina patientes subduxisse,

Ego tamen nolo, ut huic axiomati acquiesca-
mus, sed totam hanc litem per quasdam conclu-
siones nunc à me proponendas volo vos facile
dirimere.

Prima Fluxum verè symptomaticeum licet im-
perfectum, nunquam tamen esse iuuandum ra-
tio est quia verè & propriè symptomaticus Fluor
ille est, in quo educitur materia quæ morbum
non facit, quæ longè est à morbi natura aliena;
at cū in morbis ea non exornantur, quæ mor-
bum faciunt, morbum non iuuant, & vires deici-
unt. Gal. 4. aph. 47. dicit Excretionem, quæ mor-
bum

Diure-
tica fri-
gida.

Diure-
tica cal-
da.

Attrahē-
tia ad cu-
tem ex-
terna.

Galenus
explica-
tur.

Obiectio
soluitur.

Tempus fontem exaltes, & quia sit A
 Excretiones in principis facta
 tanquam inuulsi, & perui iolas nec admittend-
 us nec iuuat, id confect id habet 1. de cris. 84
 aph. 22. in Ep. 75 & sed dicitur Excreto etiam
 in principis morbo est proportionata, in qua
 talia d. ciuntur qualia oportet, hæc vocatur sym-
 ptomatica ratione temporis, quia est in principio
 non est symptomatica ratione excretionis, quia ta-
 lia d. ciuntur, qualia oportet hæc igitur si imper-
 fecta, uanti poterit, quod uult Act. 9. ap. 35
 Trall. lib. 8. c. 5. ut excretionem omnium colligunt
 autem hoc ipsum ex Gal. com. 5. 3. in 1. Epid. quo
 in loco cum uideret Hipp. quinto die lauisse cap-
 put Methoni, ut sanguinem e naribus imperfecte
 fluentem iuuaret, scribit hoc exemplo nos do-
 cuisse Hipp. Excretionem imperfectam est in princi-
 pis esse iuuandas, quod & ratio suadet, nam quæ
 iuuare debet, necessario & qualitatem, & quanti-
 tatem habere debet proportionatam, ut nō solum
 t. h. den. iuuat, qualia oportet, sed etiam tanta,
 quanta oportet, unde dicit Gal. 1. ap. 23, sicut qua-
 litas qua itit, ita quantitas quantitati responde-
 at, dicit. o cum talia d. ciuntur, qualia expedit,
 quanquam in principio, dum modo imperfecta
 sit, purgatio adiuvati debet. Confirmatur, si enim
 in principio licet materiamurgentem educere,
 materiaurgens non tantum est illa, quæ ad
 Excretionis loca aouetur, & tamen nullo modo
 educitur, sed etiam est illa, quæ tendit ad Excre-
 tionis loca, & incipit excreni, sed non tantum, quā-
 tum expeditur, igitur omnino est iuuanda.

Ad Galenum, qui prohibet hæc fieri, dico, pro-
 hibuisse illum, quia suo tempore benigna reme-
 dia, & facultate adst. ictora prædite non inue-
 niebantur, sed omnia erant venefica, ut idcirco
 natura citra periculum iuuari non potuerit. Nos
 habemus autem hæc benigna, ut est elect. lenitiu
 diaca. hol. dial. ebest. cassia, Thamarindus, syrup. ros
 quæ omnia tunc administrari possunt.

Tertia conclusio: si Excretio Critica fuerit, sed
 imperfecta, aut sit in die critico principali cum
 omnibus signis optimæ crisis, ex Gal. 1. aph. 20.
 tunc licet imperfecta videatur, non est tamen iu-
 uanda fieri, cum vix ac ne vix quidem potest,
 quin natura cum omnibus optimæ crisis signis
 in die decretorio præcipuo integram faciat Ex-
 cretionem. si autem dies decretoria principalis
 non sit, aut omnia crisis signa absoluta, & perfec-
 ta non adst. tunc considerandum, verum adst.
 aliquid periculi Fluxionis materiz ad partem
 principem, quæ vel faceret, vel augeret inflamma-
 tionem, in quo casu etiam in die critico licet no-
 bis naturam iuuare.

Ratio est, cum enim non omnia sunt perfectæ
 crisis signa, & quæ repere sit euacuatio, incipiunt
 augeri symptomata, indicium est plus materiz
 fluere ad partem nobilem, quam ad vias excre-
 tionis, ideoque iuuanda natura.

Quod si nil urgeat, permittatis ut transcat di-
 et crisis in sequenti natura iuuetur, sequendo
 Hipp. & Gal. consilium 1. aph. 21.

Cum Fluxionum, quas Hepaticas dicunt, alia
 sub Diarrhoea, alia sub Dysenteria continen-
 tur, primum nunc de Dysenteria dicendum; La-
 tini Intestinalium Formina vocant, nunc autem
 Dysenteriz nomine propriam accipimus, ad dif-
 ferentiam Hepaticæ, & aliarum, & de quibus infra

differentia.

Distinguitur hæc multis modis, & primum
 ratione loci: nam in quinque superioribus
 intestinis *Dysentria* vocatur, in ultimo verò, seu
 recto nomen mutat, & *Tenismus* vel *Tenasmus*,
 vel *Tensio* vocatur.

Rursum autem distinguitur Dysenteria siue
 in vna, siue in alia intestinalium parte in *Fientis*
 & *Factam*. *Fientis* est, in qua sanguis non educi-
 tur, vlcus nondum adest: *Facta* verò semper est
 cum vlcere.

Fientis tres sunt species: in prima externatur
 tantum humores mordaces, sed cum torminib.
 vehementibus ad differentiam *Diarrhoeæ*, in se-
 cunda aut excreniuntur abrasa pinguedo, quando
 vlcus sit in intestino crasso, aut excreniuntur mucus
 intestinis adhaerens, quando affectus est in tenuio-
 ribus intestinis; in tertia excreniuntur tenuis pel-
 lícula, & *tridipus* dicta. De his tribus meminit Gal.
 6. de loc. aff. circa init. 4. aph. 26.

Facta verò Dysenteria triplex est: in prima ex-
 roditur interior intestini tunica præter epidermi-
 dem erosionem tamen superficiali, ut sanguis tan-
 tum excreniatur in secunda portio interioris tu-
 nicæ simul cum sanguine, & sanie educitur: in
 tertia & interior & exterior tunica iam corrupta
 & separata est, meminit harum differentiarum
 Gal. 4. aph. 26 & 6. de loc. aff. 2. circ. init. 4. de vl.
 part.

Et hæc vltima differentia a liasiquoque consti-
 tuit Dysenteriz species, scil. Malignas, Depascen-
 tes, Sordidas, interdum Callosas.

Causa.

Dysenteriz causæ aut Essentiales sunt, aut
 Per consensum, aut Externæ.

Essentiales sunt aut abscessus disruptio in in-
 testinis facta post intestinalium inflammationem,
 aut est ruptio, vel anastomosis, vel erosio venarum
 intestinalium ab acri, & calido sanguine in ve-
 nis Intestinalium existente.

Per consensum sit ex humorum fluxione, siue
 sint falsi, siue bilioli, cuiusunque speciei, siue a-
 trabilares, atque ideo, siue confluant ex cerebro
 & ventriculo, siue ex iecore, & liene, siue ex to-
 to corpore. Avicenna in hac parte inutili quadā,
 ut reor, usus est diligentia 23. 3. tr. 1. cap. 2. qui
 tempus proponit, in quo humores isti exulcera-
 tionem in intestinis facere possunt; dicit enim
 bilem id facere 14. diebus, falsam pituitam 30.
 melancholiam 40. falsa est propositio. Dysente-
 riz meliz primo, aut 2. die incipiunt a bile flaue
 vel atra, a pituita falsa.

Externæ causæ sunt potius aquæ in-
usus salicorum, & acrum immodicus, aliam-
remedij venefici, aut valenter purgantis, seu sic
antititionum, seu colocynthisque in clysteribus
imposita plerunque faciunt eiusmodi exulcera-
tiones.

De Tenesmi causis, & differentiis.

EX iisdem causis fit Tenesmus Legitimus, da-
tur enim & Spurius, isque duplex est, unus
per essentiam, per consensum aliter; cum enim
Tenesmus Spurius nil aliud sit, quam frequens
deiciendi cupiditas, hæc interdum fit ab hæmor-
rhoidibus intumescenibus, interdum à constri-
ctione intestini, propter eiusdem refrigeratione,
siue refrigeratio facta sit ex infusione super lapi-
dem, seu aquæ frigide aliquando fit hic conatus
ex vermiculis rectum intestinum vellicantibus;
non raro fit à stercore indurato; interdum eja-
à lapide in intestino existente: & licet Galen. 6.
de loc. affe. 2. nunquam se vidisse dicat calculum
ex intestinis eiectum, alij tamen viderunt, ut
Ant. Beniuen. de admirand. c. 9. Avic. 16. 3. tract.
2. c. 3. Fernel. lib. 6. pathol. 9. Ego verò non uni-
cum, sed plurimos simul, & per plures dies vidi
lapillos per intestina eiectos in quodam fabro Pa-
tauino, qui spatios. vel. 1. o diebus post longam
alui suppressionem, & ingentes venis dolores,
partim v. su. clysterium acrum, partim aliorum
remediorum multos eiecit lapillos magnitudine
nucis avellanz, coloris flavi, vsque adeo duros, ut
vix infringi potuerint. Fit Tenesmus spurius et-
iam consensu, compressione scilicet facta aut ab
vtero, vesica, aut à vasis seminalibus aliqua ra-
tione tumescenibus.

Signa Dysenteria.

Non est difficile Dysenteria in genere, aq-
uius species iam fientes, & factas distin-
guere. Distinguendi autem sunt loci, Verum
scilicet exulceratio sit in superioribus, aut magis
in inferioribus intestinis; nam vlcus in superius
potius curatur, in inferius aut clysteribus, aut
suppositoriis: sic verò distinguuntur; nam si mor-
bus sit in intestinis gracilibus, labatur apperen-
tia, adest febris ingens, sitis, oris amarus, dolor
suprà umbilicum, & excrementa educuntur a-
liquo temporis spatio, postquam tormina patienti
vexant, & ipse sanguis, aut sanies confusa
& cum alius alui excrementis prorsus admixta
est, sanguis item in maiori copia educitur & a-
brasio est tantum mucii, non pinguedinis & a-
brasio pelliculæ, seu membranz admodum pau-
ca & exigua, si verò contra exulcerata sint in-
testina crassiora, dolor est infra umbilicum, &
cum primis tormina incipiunt, egri deieciunt,
quæ deiciuntur a sanguine sunt separata: san-
guis est in minori copia, febris aut nulla est, aut
parva, tumida, si qua abrasio, iam ampla, &
crassa esse consuevit, & ante illam pinguedo ex-
cernitur. Ego quatuor vidi Dysentericos, in quibus
in dies exercebantur potiones intestini

magis, ut sepe excederent mensuram trium, vel
quatuor digitorum; & duæ mulieres quæ hoc
morbo laborarunt, sanatz sunt, duo viri ambo
defuncti.

Signa Tenesmi.

Versabar circa distinctiva signa Dysenterie
& proposui hætenus, quæ ratione superiorum
intestinatorum Vlcera ab infernis distinguantur;
& quia inter inferiora intestina est rectum, quod
peculiarem patitur exulcerationem, & passionem
Tenesmi vocatam, igitur antequam pergam,
eius diagnostica, & distinctiva causarum signa
proponenda sunt.

Dignoscitur ex assidua deiectionis cupiditate.

Causæ verò inter se sic distinguuntur.

Si enim fuerit vlcus, sanies, aut simplex, aut
cruori commista, interdum cum mucos, interdum
cum alijs humoribus, educitur.

Si fuerint Hæmorrhoides tumentes, nil præter
naturale excrementum excernitur, quod tamen
cum labore, & difficultate emittitur. Igitur dol-
or, calor, tumor, & circa sphincterem insignis a-
dest angustia, interdum sanguis copiosus erum-
pit, tuncque deiectionis desinit cupiditas.

Si fuerint Vermes, adest potius stercorarius, &
pruritus, quam vera deiectionis cupiditas, & cum
excrementis excernuntur, vermiculi excrementis
adherentes apparent.

Si fuerit Lapis, aut fex indurata, nil omnino
excernitur nec remedia aliquid iuvant, nec inie-
cti clysteres possunt recipi.

Si fuerit externa frigiditas, primò ex relatione
còparari poterit, deinde ipsi patientes frigiditatis
& adstrictionis sensu in ea parte se habere dicunt.

Si fiat hæc passio per contentum vel ab vtero,
vel à vesica compressione, detentus habent &
grit quando supini decumbunt, quàm si fuerint
proni minus enim comprimuntur intestinum.

Signa differentiarum Dysenteria.

Iam verò distinguendæ sunt Dysenteria diffe-
rentia à genere & causis deumpso, & de
speciebus quidem Dysenteria, quæ est in fieri, nil
est dicendum. Unaquæque species ex superioribus di-
ctis distinguatur: Prima qui tradunt tantum tor-
mina cum morbo. Secunda qui excernitur vel
mucos ex superioribus, vel pinguedo ex infernis in-
testinis. Tertia quia pellicula, epidermis, simul cum
excrementis educitur.

Tres verò species sunt Dysenteria sic distin-
guuntur. In prima sanguis tantum excernitur;
in secunda cum sanguine sanies. In tertia in-
testinatorum portiones prorsus educuntur.
Sed quia secunda, & tertia alias habent diffe-
rentias, & etiam sunt distinguendæ. Vlcus enim
neq; sordidum, neq; admodum profundum, nec
puritilaginofum, neq; depallescens, aut callosam sa-
niem emittit, albam, non sordidam, boni coloris,
rubro sanguini mistam, non admodum copio-
sam, cum paucis dolore, sibi ipsi equalem, sine fe-
bre, aut exigua, & sine pravis symptomatibus.

Hist. la-
pidu per
intestina
excreto-
rum.

Hæmor-
rhoid.

Vermes.

Lapis.

Frigus
ext. int.

Consen-
sus ab
vtero.
Vesic.

Vlcus. a. sordidum multam habet saniem vari coloris foetidam; & si putrilaginosum fuerit, febrem habet coniunctam, & praua symptomata; excernuntur intestinorum portiones, & si fuerit depascens, inaequalem emittit puris portionem, interdum multam, interdum paruam; & si fuerit callosum, caret dolore ad differentiam illius, quod nec callosum est, nec fluxione tentatur: Quae fluxio cognoscitur ex qualitate humoris exeuntis. Si enim sit pituita salsa, simul cum torminibus, mucus excernitur; praecessit, vel adhuc adest salia destillatio.

Si sit bilis flaua, vel atra, color flauus vel niger utriusque humorem declarabit.

Multum vero ad curationem refert distinguere, num fluxio fiat per intestinorum venas, an per cavitatem: Si enim per venas, dolores sunt maximi, deiectio exigua; si per cavitatem, deiectio est multa, dolor & exulceratio leuis.

Confert etiam ad curationem nouisse, utrum vlcus factum sit ex rupto abscessu post intestini inflammationem. Cognoscitur autem quia de repente nulla praecedente alui fluxione sanies, & sanguis corruptus erumpit, praecessitque febris & insignis intestinorum dolor.

Prognostica.

Prognostica huius mali à Genere desumuntur, Loco affecto, & Causis. A Genere quidem quia sicut exulceratio superficialis, & benigna, si recte tractetur, facile ad curationem tendit; sic è conuerso malignum vlcus, depascens, & callosum, profundum, sordidum, putridum, non modò ægrè sanatur, sed plerumque nullam admittit curationem. Hinc Hipp. 4. aph. 26. dicit, Dysenteriam esse lethalem, in qua veluti carunculae exeant. Per carunculas autem intelligit quidem intestinorum membranas, quae carnis formam non habent, sed tamen carunculas vocauit, quia educta portio usque adeo crassa carne amulatur. Tunc enim indicium est intestini exulcerati circa tunicam internam & externam, quam exulcerationem dicit incurabilem Gal. 4. de usu part. 4. (6. 7.) Si interna enim tantum separatur, curationem admittit, ut nos propria experientia comprobauimus. De hoc ipso vlcere putrilaginoso loquitur Hipp. 6. aph. 3. In longis intestinorum difficultatibus inappetentia, & febris malum: ex his enim duobus signis, febre scilicet superueniente, & inappetentia ostendit Hipp. vlcus magnitudinem, & putredinis malignitatem.

Quoad Locum, semper, ceteris paribus, deteriora sunt vlcera tenuium intestinorum illis, quae occupant crassiora:

Quoad Causam effectiuam Hipp. duas videtur innuisse lethales Dysenteriae causas, melancholiam scilicet naturalem, & atram bilem, de naturali melancholia meminit 4. aph. 23. de atrabili 4. aph. 24. cum dicit: Dysenteria si ab atrabili incipiat, lethale. Ne autem decipiamur, haec duae sententiae limitationem patiuntur cum & ex melancholia naturalis, & atra bile, habita temporis ratione, possit fieri Dysenteria salutaris, dicebat Hipp. 6. aph. 48. Lienosis Dysenteria superueniens bonum

est sermo de melancholia naturali critico modo ex purgata, Dysenteriam faciente, quae si diu non daret, utilis esset, si enim diu daret, etiam in Lienosis, vel ad Hydropem, vel ad Lienteriam perducit, teste Hipp. 7. aph. 48. de atra bile vero idem auctor docet 7. aph. 5. Difficultatem Intestinorum furori superuenientem bonum: at furor fit ex atra bile, igitur et ex atra bile fit utilis Dysenteria.

Sed quid dicemus ad illud Hipp. Dysenteria ab atra bile exitialis, ubi Gal. in comm. rationem reddit, quia est quasi cancer intestinorum, & sicut cancer externis in paribus est insanabilis, sic etiam in internis.

Solutio est, atram bilem fluere ad intestina vel per venas & arterias, vel per cavitatem. Si illud, cancerum facit, estque insanabilis, si hoc, sanabilis.

Duo notanda.

Dysenteriae prognostica, vel ad bonum, vel ad malum protulimus superius; duo adhuc supersunt vnum praenuntiatum futurae Dysenteriae, quod sumitur ab Hippocr. 7. aphor. 23. dum dicit: post synceram deiectionem Intestinorum Difficultatem subsequi, per synceram deiectionem flauam, vel atram bilem intelligit. Alterum prognosticum quod spectat huc, desumitur ex 7. aphor. 28. Mulier utero gerens superueniente Tenesmo abortit, quae sententia sano modo intelligenda est, Praegnantibus enim ob duas causas fit Tenesmus absque abortus periculo Prima hemorrhoidum tumor: dum enim intumescunt hemorrhoides, frequens deiectioni cupiditas succedere consuevit. Secunda causa est vteri tumor ex grandiore foetu intestinum comprimente. Ex his causis non fit abortus; sed tunc tantum, cum tenesmus sit ex vlcere, in quo casu & propter dolorem, & propter inflammationem vlcus connexum, & propter vigilias, & frequentem surgendi morum vires deliciuntur, & debiliores redduntur, ut tandem abortus fiat.

Curatio.

Dvplex est curatio: Vna Coacta: Canonica altera. Illa respicit symptomata potius, quam morbum, aut causam: haec primo ad causam, & morbum dirigitur, subinde ad symptomata. Loquimur primo de Coacta. Symptomata sunt aut in intestinis tenuibus, aut in crassissimis illis dolor & aliquando insignis sanguinis fluxus; ideo ratione doloris opus est anodynis, vel stupefacientibus; ratione sanguinis vel adstrictoriis, vel agglutinantibus, vel opiatibus. In intestinis infernis est dolor, & circa rectum intestinum est molesta illa, & frequens deiectioni cupiditas. His omnibus, cum vires deliciant, primo occurrendum; non tamen omnino causa, & morbus spernendus, ideoque occurrendum externis, & internis, vel assumptis vel iniectis per inferiora.

Assumpta conueniunt, ubi tenuia laborant in intestina: Iniecta vero ubi laborant crassiora, ex Gal. 5. de locis affect. 2.

Incipio ab iniectionibus, clysteribus scilicet, qui pro varietate materiae fluxus variis sunt oportet.

Si igitur Dysenteriz materia sit pituita salsa, utendum clysteribus epicerausticis quidem, sed absterforiis: nam si pituita salsa, quæ humor crassus est, solis epicerausticis tractetur, adhærebit intestinis, & pro tempore iuuabunt quidem Clysteres, sed paulo post maior subsequetur noxa; Ideo sic fiat Clyster,

*Recipe Iuris intestinor aut
capitis castrati vnc. viij.
saccari rub. vnc. ij.
M. f. clyster.*

Si fuerit bilis, vel tenuis est, & facile, & frequenter deiecitur, aut crassior est, ut etiam atra bilis, ut propterea modica illius quantitas educatur

Si fuerit tenuis fluxus, & facilis ad exitum, opus est clystere epiceraustico incrassante non abstergente, ubi mirifice facit

*Decoctum ex cap. castrat. additi
etiam Pedibus aut castr. aut vituli cum
Butyr. & adipe capræ ad vnc. i.*

Adipem Capræ dicit Gal. i. i. simpl. c. de pingued. non ideo eligi in Dysentericis, quod maiorem habeat vim epicerausticam adipe suillo, sed quia statim concreuit, & intestinis promptius adhæret, ut sit instar straguli prohibens materiam acré exulcerare. in eadem classe est pusana hordeac. iniecta, succus orizæ, alycæ, emulsio sem. melon. & papau. albi, simul cum aliqua portione fatinz amyli. Idem præstat lac in hac tenui materia chalybeatum, addita semper caprini adipis portione, vel in maximis doloribus vng. ros. quod mihi magis placet quam oleum, sicut etiam infrigidans vnguentum in lacte dissolutum ad drach. vi. vel vnc. i.

Sed si crassa fuerit materia siue flaua siue atra bilis, nec facile educatur, hic epiceraustico addendum saccharum rub. ad vnc. i. sem. nec accipiendum lac chalybeatum, sed utrimini potius pusana hordeac. quam alycæ, orizæ, vel amylo: Hæc intrinsecus, tanquam iniecta pro doloribus crassioris intestini sufficiant.

Ad quorum proportionem respondeant externa, ideoque inungendus venter oleo ros. lintei, vel omenta animalium hoc oleo imbuta super abdomen retineantur.

Possunt etiam fieri fritaliz ex ouis simul cum ol. ros. & si flatus adsint, admisto etiam masticino.

Ad frequentem verò deieciendi cupiditatem, si ex frigida causa oriatur, vel pituita mucosa, vel infusione super lapide &c. varia conuenient remedia. Ego autem vii soleo tabula aut nucis, aut cupressi calefacta apud ignem, & illita vel butyro, vel adipe caprino, cui insideat æger. Idem facit sacculus, plenus floribus thapsi barbari, vel mentastri etiam calefacti. Mirificè etiam prodest aut pix, aut resina prunis imposita, ut fumum recipiat locus affectus. Quidam experti sunt, plus hic præstare funem pice oblitam, accensam & suffumigatam. Prodest & euaporatio facta ex decocto brassicæ, pulegij, calamenthij, mentastri, origani, chamomelij, anethi.

Venetis doctus sum a piscatoribus oua squatinæ piscis cartilaginei exsiccata, & in puluorem re-

ducta per modum suffumigij administrata hunc conatum statim curare. Non tamen prætermittantur, ubi adsit pituita intestinis adhærens, Clysteres quidam absterforii moderatè calefacientes ut qui sunt ex decocto mentastri, sisymbrij, flor. chamomel. & anethi in vino, addito vel saccharo, vel modico melle rosat.

Quod si acris potius sit materia, hæc dimittitur, & accipiat potius suppositorium vel ex adipe hircino, vel ex butyro, iniiciantur clysteres epiceraustici (de quibus supra) sed in modica quantitate.

Assumpta verò proportionem respondeant intestinis. Nam in præsentia pituitæ salsæ dentur iura alterata cum malua, endimia, soncho, hepatica, plātagine.

In præsentia utriusque bilis, nisi febris valida vigeat, nil præstantius lacte. Hoc verò ubi nimium fluat aluus, aut coctum præbeatur, aut chalybeatum. Chalybeatum verò plerumque est ingrati saporis, igitur melius est ut lacte decocto. Coquitur autem vel sine aqua, vel cum aqua, illud ad tertiam partem consumatur, hoc verò ad consumptionem medietatis.

Recipe lactis lib. i.

*aq. plantag. aut sonch. vnc. vi.
& coq. ad consump. mediet.*

Hoc lacte non modo dolores sustulit, sed incipientes Dysenterias sine alio auxilio sanauit.

Quod si non nimium fluat aluus, aut lacte non chalybeato utendum, aut sero caprino, aut aliqua aq. stillat. & maxime commendo emulsiones sem. frigid. non tantum melon. aut cucurbit: sed etiam papaueris albi. Possunt enim præberi vnc. vj. & viij. harum emulsionum quatuor horis ante cibum.

Imò & ipsi Cibi medicamenti proportionem respondeant, ut vim habeant Epicerausticam, seu sint fercula ex amylo, aut panatellæ cum emuls. sem. vel melon. vel papauer. albi, aut succo orizæ, aut alycæ, pedes vituli.

Quod si his non cedat dolor, vel fluxus sanguinis adstringentibus non cedat, de quibus infra, ad opiata tandem confugiendum est.

Et per superiora quidem potest præberi aut

*Sacch. rosat. vnc. sem.
sem. hyoscyam. contus. drach. i.
M. f. boli.*

*Aut præbeatur Pill. de Cynogloss. drach. sem.
aut Requei Nicol. drach. sem.*

In clysteribus verò potest incoqui, aut hyoscyam. aut semen. papau. aut mandragoræ. Verbi gratia.

*Recipe sol. hyoscyam. M. f.
pom. mandrag. incis. n. i.
sem. papa. alb. vnc. i.
bull. in iure pingui, & fact. express.*

*Recipe disti iuris vnc. viij.
Butyr. vnc. ij.
seui hirc. vnc. i. M. & c.*

Curatio Canonica.

IN canonica seu regulari Dysenteriz curatione primo causæ incumbendum est, dein morbo.

& cum Causa possit esse vel pituita falsa, vel bilis flaua, aut atra, quomodo vnusquisque ex prædictis humoribus, cum ad aluum fluxerit, tractandus sit, dictum est in Diarrhoea; quod caput in curatione Dysenteriae cum fluxione semper est aduertendum; sibi enim omnia proponuntur præcepta, quæ ad euacuationes spectant, ad reuulsiones, ad deriuationes, per vomitum, per vrinas, per sanguinis missionem, per vniuersam cutim, vel os, & nares, aliaque partes tentandas. Hoc tantum repeto in præsentia. In Dysenteria ex pituita falsa à capite defluente cautè agendum circa adstrictoria remedia; cum enim huiusmodi Dysenteria ultra 14. & plures dies protrahantur, non desunt ex Medicis, qui putant ultra 14. diem adstrictoria tutè administrari posse. Sunt autem in magno error. Dysenteria enim ex pituita falsa tamdiu perdurare potest, quamdiu capitis intemperies falsam pituitam gignens, eandemque ad intestina demandans. Itaque elapso anno duos curati egros, qui in Ophthalmiam, & contumacissimos dolores articulorum inciderant, ex importuno vsu remedii adstrictorii administrati in Dysenteria ex pituita falsa. Igitur in hoc casu (quæ docui iterum repeto) reuellendus est potius humor ad nares, ad occiput, aut lynciput Cauteris, Sinapismis aut Cucurbitulis; alteranda cerebri intemperies; tunc verò adstringentibus viuendum.

Alterum moneo circa sanguinis missionem. In Dysenteria non quidem omni, sed in cruenta, & in corpore plethorico, tantum venæ sectio conuenit. Igitur neque in Dysenteria ex pituita falsa nec in ea, quæ sit à syncera bile in corpore admodum bilioso, multo minùs in ea, quæ sit post disruptum abscessum, conuenit venæ sectio, cum ea, quæ sit disruptio abscessu, sit ne fluxione, ideoque reuulsionem non requirat.

Hic igitur de Causa breuiter præmonitis ad morbum uapsecundum.

Curatio Vlcis.

Hic verò est Vlcus, & hoc vel superficiale, vel profundum, hocque vel sordidum est tantum, vel etiam putrilaginosum, & callosum.

Superficiale sanatur solis remediis adstrictorijs refrigerantibus, & agglutinantibus, vel iniectis, vel impositis, vel assumptis. Inijciuntur clysteres, qui aut fieri possunt ex succo semperuii, plantaginis, rosarum, portulacæ, aut ex decoct. prunellorum syluest. labruscæ, myrullorum, rhois rubri, hypocistidos, balustiorum, gallarum, nucum cupressi. Incoquantur hæc in vino austero; & si sanguis multus exeat: potest accipi vinum granat. & his succis, vel decoctis licet etiam addere pulueres agglutinantes, v.g. in vnc. vi. decocti potest imponi vnc. i. aut amyli, aut tragacanth. Neque improbo adstrictorios pulueres seu rosarum, seu acacia, aut balauft. Quod si quis morsum timeat, recipiat terram Lemn. aut Samiam, aut Cornu-cervi vstum: exsiccant sine morfu & moderatè adstringunt.

Imponuntur suppositoria, eaq; in vlcere intestini recti. Parantur autem ex iisdem pulueribus boli Armeni, Rosarum, terre Lemn. exceptis

sympo ros. de ros. siccis, aut mirtino, aut succo plantag vel portulacæ, vel consolidæ.

Affumentur verò trochisci varii adstrictorii, ut sunt trochisci de spodio, de terr. sigil. de Charabe: datur drach. i. In hac re longior non ero, videantur remedia apud Galen sententia Andromachi 7. de comp. per. loc. c. 5. & lib. 9. c. 4. & c. Ceteros scriptores omitto, confiden spotiùs in hoc puluere, quàm in pill. aut bolis, quos aliquando in Dysenteria integros, & immutatos deici in excrementis vidi. Pulueres autem vlcerato loco meliùs adherent.

Recipe ossis sepia vñ. pulu. drach. ij.

songia pice imbuta, & in ollula vñ. & in cinerem reducta.

Cortic. ouor. pellicul. ablata interiore & pulueriz. an. vnc. sem.

Margar. prap.

Bol. Armeni an. drach. i. M.

Dosis huius pulueris est drach. i.

Certo vobis pollicor, hunc puluerem recentes omnes Dysenterias, nisi fluxio admodum vigeat, licet valde cruentas, statim sanare. Datur autem in lacte, vel chalybrato, vel cocto, aut in aqua polygoni, vel alia adstrictoria, & refrigeratoria.

Si Vlcus sit sordidum, hæc omnia non modò sùt suspecta sed perniciosà: augè enim vlcus, & interdum alia inducunt symptomata. Opus igitur est abstersione; ad quam inijciuntur clysteres vel ex mulla, vel ex aqua hord. cocta cum integro hordeo, cum aliqua fursurum, aut patientiæ portione, addito vel melle rosato, vel sacch. rubr. (Non habenda est ratio morbi & doloris, ut quando dolor vigeat, dimittatur,) mell. tol. aut mulla. Imò si calor ingens adsit, abstersio fiat sero caprino, pusana hordeacea, modico saccharo adiecto. Si dolor non vigeat, & sensus non sit exquiritus, licet ascendere ad aliquam aquam vel nitrosam, vel balsam, ut est Testucian. quæ siue simplex, siue melli mista in abstergendo primas habet partes.

Duo notanda.

Dvo autem hic moneo: Primum ut quando ad abluenda vlcera magna capitur clyster, quantitas, maximè si rectum intestinum non laboret, sit saltem lib. i. & semis.

Secundum est: In valde sordido vlcere vnico clysteri non acquiescendum, sed duo, interdum tres, vnus post alium inijciendus; deinde verò statim siccante clystere iniecto viuendum modicæ quant. qualem superius præscripsimus vel ex vino, vel ex succo pulueribus adiectis.

Quod si Vlcus putrilaginosum, & callosum his absterforiis non cedat, ad fortissima deueniendum Inijciuntur itaq; clysteres, aut ex aqua marina, aut ex infus. oliu. ex mutia, ex piscium faldedine vel simplici, vel mista, vel cum aqua Thestucii, aut alia infirmioris facultatis. Neque mirandum, ad hæc tandem veniendum esse: Callosum enim vlcus, & putridum, nisi quamprimum mundetur, & putredo superetur, intestinum perforat, & tunc de salute actum est. Igitur in his casibus

calibus Medici permiscet clysteribus vnguent. A
Egypti. ad scrup. i. vel drach. sem. & Galen. 9. de
compol. per loc. proponit trochisc. ex charta com-
bust. pastillos Andronis & Biasiolis, qui recipiunt
auripigmentum, & alia caustica ad superandam
pueritiam, & demendos callos. Sublata sordit-
ie, agendum siccanubus, & sarconis, id est medi-
camentis carne generantibus de quibus supra dixi.

Sed si in superioribus intestinis fuerint hec Vl-
cera, & assumptis per os opus sit, nihil prastantius B
est aqua Tectuc. melle ros. mista. Si haec non ad-
sit, componatur lixiuim ex cineribus vlceri ap-
propriatis, quae puritiam resistant, ut est scorpiu,
dictamnus, tormentilla, scabiosa, aristolochia,
scobs ligni Indici, salsa &c. Huic lixiuio addatur
mel ros.

Post abstersionem ad cicatrizandum valent
pulueres propositi. Conficiuntur & quidam olea
ut est illud ex perforata, quod oleum rubrum di-
citur. Datur vnc. sem. in iure. Est etiam optimum
oleum, quod balsamum vocant, sed artificiale est. C
Dicitur Venetiis oglio delli Spagnoli. Dosis est a
drach. i. ad drach. ii.

His accedat victus ratio proportionis respon-
dens. Et haec de Dysenteria.

DE FLUXU HEPATICO. Cap. XXI.

A Ccuratissima de Hepaticis Fluxionibus tra-
ctationem aggredior, idque duplici de caus-
sa. Primo, quia video hanc partem a paucis Scri-
ptoribus esse tractatam. Secundo, quia vno & eo-
dem tempore docebo modum curandi Hepaticas
Fluxiones, & varia Iecoris viua. Ante omnia au-
tem dicendum, quid nomine Hepaticae Fluxionis
intelligatur, Interdum enim hoc nomine quispiam
intelligere potest vnamquamque Deiectionem ex le-
core factam, siue ex morbo siue ex errore externi,
hanc acceptionem excludimus. Fluxus, n. qui fit
ob errorem, externum, facultatem Iecoris expul-
tricem irritantem, non sunt Hepatici, deoq; siue
chylus acris & mordax, siue bilis ob meatus fel-
lei obstructionem, seu humores a toto corpore, re-
nibus, vtero ad Iecur transmittantur, & deinde
ab eiusdem facultate expultrice detrudantur, non
est Fluxus Hepaticus. Alio modo hic Fluxus sumit-
ur pro omni illo, qui Iecoris morbum sequitur,
siue morbus sit cum imbecillitate, siue non, &
haec quam accepio tenetur. Nam omnis Fluxus,
que fit absque locoris imbecillitate, siue sequatur
intemperiem, tumorem aut vlcus, ad Diarrhoeam
refertur, non ad Hepaticum. Itaque Fluxus He-
patici nomine illum intelligo, qui semper neces-
sario praesupponit imbecillitatem Iecoris.

Definitio.

H Vius Fluxus talis potest colligi definitio:
Fluxus hepaticus deiectio est materia va-
ria ex Iecore imbecillitate laborante. In hac defi-
nitione primum partes sunt explicandae, deinde
ocendum, quomodo haec definitio distinguat Flu-
xum Hepaticum ab alio fluxu. Tres sunt defini-
tionis partes: Materia exiens, Locus ex quo, &
Causa immediata propter quam.

Dixi materiam exeuntem esse diuersam, estq;

vel Simplex, vel Composita. Illa habet septem dif-
ferentias: Prima materia chylosa. Secunda icho-
rola. Tertia biliola. Quarta melancholica. Quinta
sanguinea. Sexta putulenta. Septima purulosa.
Compositam seu mixtam materiam redigo ad
tria capita, ad deiectionem colligatam, ad vl-
cerosam, & ad innominatam.

Locus, ex quo fluit materia, est quidem Iecur,
sed quia in hoc variae sunt partes, gibba scilicet & C
caua, fellea vesica, vasa & caro, nomine Iecoris
non intelligimus vesicam felleam; nam educa-
tur humor biliosus, fellea vesica obstructa, siue
inflamata, & intemperata absque alia Iecoris
intemperie, erit Diarrhoea, non Fluxus Hepaticus
neq; intelligimus vnam tantum Iecoris partem
aut gibbam aut cauam, sed vtramque non necessa-
rio quidem vtramque eodem tempore, sed modò
Gibbam tantum, modò Cauam, modò vtramque;
deniq; intelligo, nomine Iecoris materiam in va-
sis contentam, non in spatio inani, quod est inter
membranam & carnem, nec in carne tantum,
sed in vasis ipsis.

Causa propter quam fit imbecillitas, seu im-
mediata nomine intelligo impotentiam facul-
tatum naturalium ad agendum. Quid autem no-
mine facultatum & impotentia intelligendum, Causa im-
& quae sit causa huius impotentiae dicamus. No-
mine facultatum omnes quatuor naturales in-
telligo, maxime vero Alteratricem: unde Gal. 8.
de comp. per loc. 6. eos vocat Hepaticos, qui alte-
tratricem facultatem habent vitiosam. Subinde
tamen etiam intelligo Attractricem Expultricem,
& Retentricem, nam ex his etiam fieri Fluxio-
nes Hepaticas testatur Gal. loc. cit. & 3. de caus.
symp. 2. Nomine impotentiae intelligitur triplex
vitium, aut abolita facultas, aut diminuta, aut de-
prauata, licet deprauatio ipsi potius alteratrici,
quam aliis conueniat.

Causa imbecillitatis.

E T quae est huius impotentiae causa? Est
morbus in intemperie, sed quia etiam dan-
tur morbi in intemperie Iecoris, ex quibus fiunt
Fluxiones, quae tamen Hepaticae non sunt, po-
stulat hic locus, ut doceamus, quare Iecur ex
intemperie, & magis est, ex inflammatione,
abscessu, vlcere, interdum dicitur imbecil-
lum, interdum non, hoc potest colligi ex Gal. 8.
de comp. med. per loc. c. 6. cit. init. Item 7. de
loc. aff. 7 ubi proponit inflammationem, & alios
Iecoris tumores cum imbecillitate, & citra haec:
Ideo docet idem Galenus proprie & per se eos
tantum dici Hepaticos, qui in intemperie laborant,
non tumores, quasi dicat, posse tumores in Ie-
core subsistere, Iecur autem non esse imbecil-
lum. Totam difficultatem posita est in partis cog-
nitione, ad quam spectat praesertim sanguificatio;
tunc enim Iecur dicitur laborare imbecillitate,
quum praecipuum Iecoris instrumentum sangui-
ficationi dicarum intemperie laborat. Igitur vi-
dendum, quodnam sit praecipuum sanguificatio-
nis instrumentum. Antiquam fuisse video de

Cere Ie-
coris san-
guificat.
instrum.
ex Gal.

Opini-
aliorum

hac re disputationem. Nā & Gal. tempore, quod colligitur 6. de plac. Hipp. & Plat. 8. disputabatur An præcipuum sanguificationis instrumentum esset caro Iecoris, an vena? Vbi aperte Gal. & 4. de usu part. 12. cui omnes fere subscribunt, venit in hanc sententiam: *Carnem Iecoris esse præcipuum sanguificationis instrumentum.* Ratio est, quia hæc substantia nullā habet in corpore similitudinem: propria actio debet fieri à proprietate partem: additum enim alterationis esse assimilationem at verò sanguis non assimilatur venis, quæ albæ sunt, sed assimilatur carni Iecoris, ego præcipua alteratio sui à carnis Iecoris.

Hæc tamē sententia licet sit Galeni, ut liberè dicam, mihi nō probatur, & ante me illam reiocit etiam Vesalius l. 3. anatom. c. 11. & J. Ioubert. 1. de cad. parad. 4. Schenkius in disput. de sanguific. instrum. Hi omnes consent. primam & præcipuam sanguificandi vim in venis consistere. Ratio est, quia illa debet esse præcipua actionis pars, in qua magis viget calidum innatum: at viget in parte seminali, quales sunt venæ, non in carne, quæ sit ex sanguine: Item, Actio fit per contactum: Iecoris caro non tangit chylum, sed venæ. Item sanguificatio non est tantum humoris rubri generatio, sed etiam generatur bilis flava, atra, pituita, serum. Igitur licet tribuamus patencymati, id est, carni Iecoris, ut rubro, officium rubrificandi sanguinem, non tamen possumus tribuere facultatem generandi tot diuersos humores. Igitur Galenus qui hoc vidit, sibi aliquod contradicere, ut 1. de nat. fac. 4. venis vim sanguificandi tribuit, & confirmatur hæc sententia, quia ex eiusdem opinione 4. de usu part. 1. venæ mesentericæ habent aliquam vim mutandi chylum in sanguinem, & tamen sunt sine carne substantia. Igitur venis tribuenda est prima ratio sanguificationis.

His sic stantibus conclusio erit: Tunc Iecur laborare imbecillitate, cum intemperies obsederit ipsa vasa, ut propterea, etiam si aut membrana Iecoris, aut caro, aut vesica fellea intemperie laborent, vel quocumq. tumore aut vlcere, modò intemperies venis non sit communicata, est morbus Iecoris sine imbecillitate.

Cum vasorum intemperies sit imbecillitatis Hepaticorum causa, videndum nunc, quæ & quotuplex sit intemperies illa, & quomodo Hepaticæ Fluxiones ab aliis distinguantur.

Est autem hæc intemperies vniuscuiusque speciei simplex, & composita, semper cum materia, vispro sui diuersitate diuersas faciat fluxionis differentias. Est item aut primaria, aut secundaria. Illa, quæ ex obiecto improporcionado seu chylo, seu humoribus ad Iecur fluentibus, & in vasis contentis statim inducitur. Secundaria verò, quæ succedit ipsi carni Iecoris intemperatæ. Est item interdum sola, interdum cum aliis connexa morbis, & variis tumoribus, vlceribus, obstructionibus. Est item aut benigna, aut maligna; hanc intelligo, quæ ex venenata producit qualitate, de qua supra dixi.

Distinctio Fluxus Hepatici ab alijs Fluxibus.

His sic declaratis iam patet differentia Fluxus Hepatici à reliquis omnibus: quæ in tribus consistit, In Materia, Loco, & Causa. In materia, quia Fluxus Iotui, chylosi, colliquatiui, sanguinei splendidi, & alii, nec ad Diarrhæam, nec ad Dysenteriam spectant.

Ratione loci distinguuntur ad differentiam eorum, quæ sunt ex cerebro, ventriculo, intestinis, liene, renibus, vtero, venis, & toto corpore; hi enim semper sunt Iecore laborante.

Deniq; causis distinguuntur, quia sola imbecillitas, quæ sequitur vasorum intemperiem, quæcunque illa sit, est causa Fluxus Hepatici, nā alii omnes morbi & intemperies sine hac imbecillitate communes faciunt Diarrhæas, non Fluxus Hepaticos.

Quod si queratur, qui fieri possit, ut Iecoris caro sit inflammata vel intemperata, & vñ adeo propinquæ eandem non subeant intemperiem, cum ab ipsa carne tangantur? Respondet, in temperie carnis Iecoris proxima vasa statim quidem alterantur, non tamen ita faciliè alterata sunt. Aliud est mutari, aliud mutatum esse. Si caro sit calida aut frigida, etiam vena calefuit, aut refrigeratur, non tamen sequitur; ergo sunt intemperatæ, nec sequitur; igitur sunt in calefacto esse, ut in ephemeris febre & putrida; in his enim spiritus & humores sunt in calefacto esse, solida alterantur, non tamen dicuntur propriè intemperata, alias febris esset, hectica, eadem est ratio intemperie venarum.

De causis mediatis.

Ex his intelligitur, quàm multiplices possint esse causæ mediæ fluxus Hepatici; tot enim sunt, quot sunt species intemperiei, morborumq; in mala compositæ, & vnitas solutione, quos omnes hos loco recensere superuacaneū duco. Igitur generalia paucis expediens statim me conferam ad Chylosum Fluxum.

Signa diagnostica Fluxus Hepatici in genere.

Circa generalia duo tantum dicenda de signis 1. de Diagnosticiis, 2. de Prognosticiis: Cognoscitur hic Fluxus in genere acceptus duobus: maximè signis. Primo, quia noctu copiosior est, quam interdiu, quia sequitur imbecillitatem, at ubi facultas est imbecillis non exturgit ad expulsionem noxi, nisi cum fortior est, ut tempore noctis: tunc enim calor concentratur non distrahitur ad varia officia. In reliquis igitur Fluxibus, ubi facultas non est debilis, quocumque tempore sit materiæ noxiæ expulsio, in Hepaticis noctu magis propter hanc causam. Secundum desumitur à proprietate extremorum simul cum continuitate directionis, cum materiæ illæ, de quibus supra, sunt omnes ad Iecur aliquo modo spectantes, &

Omnis Hepaticus Fluxus omnium deterrimus est, nunquam etiam potest esse criticus. Fit enim ut dixi, non ex irritata expultrice, sed semper ex imbecillitate facultatis: Sed ut rem intimius penetremus, species aggrediamur.

*De prima specie Fluxus Hepatici;
seu Fluxu Chyloso.*

Chylosus Fluxus est materia iam in ventriculo confecta excretio, sed diversa ex iecore imbecillo. Per chylum non intelligitur toto illa materia, & substantia, quæ in ventriculo conficitur; sic enim corpus cito tabesceret; sed pars intelligitur modò paucior, modò maior. Est varia, quia chylus interdum excernitur albus, prout in ventriculo conficitur, interdum mutatus vel ad rubeum, vel ad flavum, & cinereum: interdum corrumpitur & fetidus euadit, interdum spumofus, & pituitæ mistus educitur.

Locus affectus.

Locus affectus duplex est; interdum sunt mesaraice, aliquando concava Iecoris pars igitur huius excretionis causa, interdum est obstructio, vel tumor in mesenterio, interdum Iecoris vitium.

Differentia.

Vnde hic Fluxus duplex dici potest: Legitimus, & Spurius. Hic fit ex mesaraicis: Ille D ex Iecore.

Causa Legitima.

Iecur autem est in causa huius Fluxus, quia ut colligitur ex Gal. 8. de comp. per loc. 6. facultas attractrix non fungitur suo munere. Nō fungitur autem, aut quia sit impedita ab obstructionibus, aut tumoribus partis concavæ: aut quia intemperies vsq; adeo valida, ut ipsum attractricis robur dissoluat.

Signa distinctiva.

Ex hac causarum varietate varij etiam insurgunt Chylosi Fluxus propositæ differentia. Albus enim deiecitur chylus, & immutatus, cum mesaraicæ impediuntur: Mutatur ad rubrum, aut alium colorem, cum impedimentum sit in Iecore. Item si obstructæ sint mesaraicæ, chylus quotidie parum excernitur: Vbi vitium est in Iecore, & alius supprimitur per quatuor aut plures dies, postea confertim chylus ille putridus, & in colore mutatus educitur. Item ubi Iecur non attrahat chylum propter obstructionem, chylus nullam habet admixtam pituitam vel spumam. Quod si non attrahatur propter frigidam intemperiem, redditur spumofus, & pituitosus: Urinæ sunt crassæ, color totius corporis pallidus, & cachexiam pituitosam præ se ferens.

Estque hic Fluxus omnium maximè periculosus: Nam si Chylus in Iecur non fluat, nec sanguificatio potest fieri, & tandem fit tabes.

Curatio.

Cum Fluxus Chylosus magna ex parte fiat ab obstructione, ideo pro illo curando, versabimur magna ex parte in superanda Iecoris obstructione; nam licet interdum fiat ab intemperie frigida, quæ imbecillam reddit facultatem attractricem, hoc tamen rarius est, & huius intemperiei curatio in alium locum referenda. Nunc autem id tantum dico, quod ad Fluxum Chylosum spectat ex infirmitate attractricis factum, necessaria esse auxilia quædam chylum attrahentia & impellentia. Illa quidem sunt exteriora, & quædam Iecori adhibentur: alia verò toti corpori Iecori apponuntur cucurbitis, non scarificat. sunt frict. asperæ, aut sicæ, vel oleo aliquo calorifico, ut est de spica, de absinthio, laurino, &c. Toti corpori pro attractione conveniunt balnea, aq. cal. frictions etiam: Denique plicatio, illinitio facta per picem. De hac operatione plura lib. de phrenigmis. Impellunt autem chylum ad Iecur omnia diuretica calida, radices asparagi, feniculi, apij, petroselinæ, vina generosa, alba, aromata. Hæc de attrahentibus, & impellentibus satis.

Curatio obstructionis à materia frigida.

Trans eo ad obstructionis curationem, ubi prius docendum, quid non sit agendum, deinde verò, quid sit agendum. In huiusmodi Fluxu quantumvis diuturnus fuerit, nunquam conveniunt alium supprimentia, seu adstrictoria, seu in crassantia, seu opiata, tam interna, quam externa.

Docet enim Avicenna, & est rationi consentaneum eos, qui adhuc confugiunt, obstructiones augere, imò ex obstructionibus tumores excitare dicat, siq; nunquam Chylosum Fluxum sanare. Relinquatur igitur hæc omnia, & pro præsentis fluxus curatione tantum morbo, & causæ incidendum. Causa est crassus, & multus humor, qui extenuandus, educendusq; est. Morbus est obstructio ex eodem humore crasso, viscido, & lenio facta, qui etiam attenuandus, incidendus, & abstergendus. Euacuatio in hoc Fluxu omnium consensu vomitu fieri debet. Materia enim antecedens, quæ obstructiones augeat, est chylo commista, & in ventriculo augetur, igitur ducenda vomitu, qui paratur aut decocto pulver. rad. asari. Dosis drach. j. in vnc. viij. vel x. iuris: & si quis addiderit vnc. ii. vel vnc. iii. oxymellis ad incidendum, non erit sine ratione.

Euacuetur etiam clysteribus: neque verò eligendi sunt clysteres lenes, quales in Dysenteria, aut Diarrhœa biliosa, sed sint medicati, ut possint electivè à mesaraicis, & à concava Iecoris parte ducere. Fiat igitur decoctio abstergens ex Parietaria, Mercuriali, Beta, Furfuribus.

M 4 Addan.

Vomitum

Clystere

Addantur

Polypod. drach. iiii. vel. drach. iiii.

& decoctioni addatur

*Elect. lenitiu. vnc. sem.**Mell. ros. vnc. iiii.**olei chamomil. vnc. iiii.*

Quod de clysteribus dico, dictū velim de medicamentis per os assumendis. Licet Fluxus ad sit non sunt negligenda Purgantia. Tota enim curā di ratio in superandis obstructionibus est posita: Debet tamen haec purgatio sensim & paulatim fieri tum propter vires, tum ob naturam obstructionis. Hoc enim apud vos sit perpetuum, valis iecoris quocunque modo impeditis aut ab obstructione, aut à tumore, nunquam licere uti purgante valido, praesertim in magna dosi accepto. Igitur dicit Galenus 13. meth. 11, in oculorum incipientibus inflammationibus vntea die purgante valido inflammationem tolli posse. Quod si quis, inquit Gal. fecerit in iecoris inflammatione, maximum producet malum. Humores enim trahuntur a toto corpore in ipsum iecur, & cum transire nequeant, inflammationem & obstructionem augent. Igitur eligantur purgantia per epictasin, & alternatim viuendum purgantibus & aperientibus.

Dico vobis, quo ordine has obstructiones ego curarim? Statim ab initio, si Vomitus non praecesserit, ex hibeo leniens, seu sit mel ros. seu Elect. Lenit, in bolo. Deinde tribus diebus vtor vnc. i. oxymel. simplic. & vnc. i. de beton. Tertio instituo has pilulas.

*Recipe pil. aggreg. drach. i.**de trib. cum. rhab.**massic. a. n. drach. i. sem.**cum aq. beton. f. pil. 12. deaur.*

Alternis diebus hora 1. ante cenam duas pilulas praebco: sequenti autem mane praebco alias duas ex sequentibus.

*Recipe Trochis. de Eupat.**de Rhab. an. drach. ii.**cum Aq. Agrimon. f. pil. 12. deaur.*

Post duas has pilulas, praebco statim syrupū aperientem, & si temperatura calidior sit.

*Recipe syr. de cichor. ex descript.**Nicol. Florent. vnc. i.**Syr. acetos. simpl. vnc. sem.**decoct. Cuscut. Agrimon.**Cichor. Rad. graminis vnc. ii.**M. pro syrupo**Si frigida sit temperatura.**Recipe Syr. bizant. cum aceto**de quinq; radicib.**de Eupator. an. vnc. sem.**Decoct. rad. apij, petrosel. fanis.**Puleg. orig. Agrim. vnc. iij.**M. pro Syrupo.*

Cum fuerint consumatae omnes pilulae cum syrupis, tunc remedia exteriora aggredior, & interna fortiora.

*Exterius vtor hac inunctione**Recipe ol. amygd. dulc. & amar. an. vnc. i. sem.**Si temperamentum sit calidius.**Addo succ. cichor.*

A

*aceti an. vnc. i.**Agrim. Absynth. an. M. f.*

Bull. ad succi & acetii consumt. f. expressio. Si frigidum sit temperamentum, relinquo acetum. & loco acetii, accipio vinum aromaticum. Interdum hoc cerato vtor:

*Re. Ammoniac. dissol. in acet. acerr. vnc. i.**Agrim. Spic. Absynth. an. drach. i.**Cer. q. f. M. f. Ceratum.*

Intrinsicus autem tunc praebco aut drach. i. opoponacis confectam in tribus pilulis, & est fortissima remedii materia ad obstructiones: Aut vtor mei electuarii ex chalybe drach. ii. vel. iiii. de quo in tractatu de affecto Liene.

In quibusdam, qui pilulas, & bolos auersantur accipio guttas quatuor, aut quinque olei ex ammoniac, aut ex calchanto, modò temperamentum non sit valde calidum. Praebet potest oleum vel in vino, vel in aqua stillat. aperiente. In quibusdam vtori iure columbi sic parato.

*Recipe rad. apij, petrosel.**fanis. asparg. an. vnc. i.**ligni sassafras. drach. i.*

Infundantur in aq. lib. vj. Imponantur in ventre columbi. bulliant, & in fine decoctionis, Adde

*Puleg. Orig. Tragorig.**Thym. Agrimon. an. M. f.**Facta express. ius seruetur ad vsum**Dosis sit vnc. vi.*

Et si cui minus ardeat ius, & temperamentum sit valde frigidum, paretur vinum album forte, in quo infundantur infra scripta.

*D Recipe rad. iam dictarum an. p. i.**Calamensb. Asar.**Puleg. Orig. an. M. i.**Anis. Fenic. Dausi an. vnc. i.**Absynth. Pont. Agrim. an. M. f.*

Infundantur in dicto vino, ebulliant leui & bullitione, facta vini colatura dentur vnc. iij.

Et si quis hoc potius destillato vi velit, id etiam fieri poterit, erit iucundius, & citius penetrabit.

E

DE CETERIS FLUXVS HEPATIS CI SPECIEBVS: Cap. XXII.

VT breui methodo omnes Hepaticos Fluxus complectar, ad quatuor capita eos redigā. Ad iecoris frigidam intemperiem: Ad calidam: Ad abscessus vel vlcera, & Ad proprietates venenatas.

De Fluxionibus frigidam iecoris intemperiem consequentibus.

F

FLUXUS ex intemperie frigida prodeūtes sūt tres: Lotius, Pituitosus & Innominatus. Ut facile intelligatur horum Fluxuum discrimen, poterit illos comparare, & conferre symptomatibus quae sunt ex ventriculi cruditate. Nam sicut ex frigida ventriculi intemperie interdum, sit ex qua sita cruditas, interdum imperfecta coctio, ali-

quando

quando prava coctio, ad acidum: ita in Iecore ex A
intemperie frigida interdum fit concoctio, in-
terdum imperfecta coctio, interdum conversio
ad extraneam qualitatem: & ex sublata coctio-
ne fiunt fluxus pituitosi, qui sunt vel aquei vel
pituiti crassiores, & spumosi.

Fluxus
Aqueus

Cum autem dico sublata esse Iecoris coctio-
nem, non intelligatis illam esse usque adeo abolita,
ut nil sanguinis generetur: est enim falsum, ne-
que enim absque sanguinis aliqua generatione B
diu superesse posset, sed hoc intelligendum, ma-
gnam chyli partem in succum crudum, vel aquo-
sum vel pituitosum conuerti.

Fluxus
Lorius.

Ex infirma coctione fit Lorius fluxus. Nam
nil aliud est hic Fluor, quam materiam aquosam de-
iectio, quae colore emulatur aquam, in qua carnes
nuper mactatae fuerint ablatae. Est signum facul-
tatis alterantis quidem, sed imperfecte.

Fluxus
innomi-
nat.

Fluxus autem innominatus comparatur cor-
ruptioni ad acidum factae in ventriculo; nam hic
Fluxus est materiae pituitosae, aut ichorosae, siue C
emulantis naturam carnis, siue non, retentae diu
in iecore, ut propter retentionem corrumpatur,
alteretur a suo naturali statu, & quosdam suscipiat
colores inexplicabiles. Nam prout pituitae vel
ichoribus in Iecore retentis admiscetur aliqua
portio vel sanguinis, vel bilis, vel melancholiae,
sunt medij colores inter fuscum, liuidum, pul-
lum, qui sunt inexplicabiles.

Signa eorundem.

Facile cognosci possunt ex iam dictis differen-
tiis Fluoris ex frigida in temperie facti. Certe
rum haec ipsa intemperies facile notatur, si uri-
nas inspiciamus, quae omnino cruae sunt, albae,
tenues, vel contentis carentes, vel crassam subsi-
dentiam habentes. Ex colore totius corporis pal-
lido palpebris inflatis, facie subrumida, pedibus,
& cruribus oedematoso tumore tentatis, carentia E
suis, abundantia sputi, valida appetentia, somno
longo & profundo stupore & torpore totius cor-
poris.

Lorius fluxus licet facile ex colores cognosca-
tur, distinguendus tamen a virulento. Hic enim
virulentus, ut audietis infra, interdum fit exsu-
dante ichore crubeo & cruento, ex magnis infla-
mationibus. Interdum fit ex Ulcere. Distingui-
tur Lorius ab viroque hac ratione: Primo quia
Lorius copiosus est, Virulentus paucus. Secun-
do, Lorius ad differentiam ulcerosi est impermi-
stus. Ulcerosus enim habet sanietem crassam, & F
sanguinem quandoque nigrum commistum. Ter-
tio, Lorius est Chronicus ad differentiam viru-
lenti ex inflammationem ichor, qua exsudat
& magnis inflammationibus tunc tantum excer-
niunt, cum inflammationes sunt in statu, & ante-
quam rumpatur abscessus: igitur breue illud ex-
cretionis spatium. Accedit quod Lorius aut est
sine febre, aut cum febre admodum leni, & mi-
nimè periculosa, ad differentiam virulenti.

Prognostica.

Hi omnes Fluxus sunt signa magnae imbeci-
litate Iecoris, quae deo transit facile in Ca-
cheriam & Hydropem, & ideo statim occurren-
dum.

Curandi ratio.

ET pro curatione, quod dixi de Hepatico Chy-
loso, idem repeto de Fluxionibus nuper expli-
catis nullam vnquam suprimentibus esse tractan-
dam, sed causam tantum & morbo occurrendum.
Igitur quod ad euacuanda spectat, siue sint Vo-
mitoria, siue Clysteres, aut Medicamenta, idem
sit iudicium, eadem ratio, quam proposui in Chy-
loso Fluxu. Quia verò morbus est frigida intem-
peries, hanc calidis alterare oportet. Alterantia ve-
rò sunt interna, & externa: Illa sunt decocta, a-
que medicatae, vel destillatae, electuaria, trochisci,
pulueres, rotulae. Ex decoctis probaturius Galli
antiqui, cuius preparatio in hac intemperie sic
fiat.

Recipe absint. Pont.

Iunc. odor. spic. an. M. i.

Origeni

Diastam. Scordij Cretic. an. M. j.

Cymin. Anis. Sesel. an. vnc. ij.

Myrrh. Costi, Cass. lignea:

Cinnam. Caryoph. Nuc. mosc. an. drac. ij.

Imponantur in ventre galli flagellati & cui-
sacerati. Bull. ad perfect. carnis coctionem: facta
D omnium express. detur hoc ius ad vnc. vi singu-
lo mane per dies 20.

Maximè conducunt aquae Thermales sulphu-
ratae, salae, & aluminosae, ut sunt multae Italia, &
Germania. Ex destillatis aquis illae sunt in hac
parte efficacissimae, quas Theriacales vocant. Da-
bo vobis formulam.

Recipe absint. Pont. spica.

Cal. aromatici, an. M. ii.

Orig. Salu. Rorismar.

Calam. mont. Scord. Cres.

Diastam. an. M. j.

Myrrh. Cass. lign.

Cinamo. Garicph. an. drach. ij.

Infundantur haec in vini albi potentis lib. xij.
per 3. dies: deinde destillantur facta destillatio-
ne adde

Theriac.

Mithrid. conf. an. vnc. i.

Croci drach. i.

Iterum destillantur, & huius aq. destillatae do-
tur vnc. sem. 4. hor. ante cibum.

Potest etiam ipsamet Theriaca, vel Mithrida-
tica confecta ad drach. i. in eundem usum accipi.

Ex trochiscis omnium optimi sunt Cyphoi-
des, vel cyphios, à Galeno descripti ex sententia
Adromachi 8. de comp. loc. 7. & sanè componun-
tur ex calidis & sicci, robor Iecoris conseruan-
tibus. Ex rotulis conuenit Diacalamenthum,
Diacyminum, Aromaticum rosat. Cariophylla-
rum, Diagingiber. Item olea destillata ex Ci-
nam. Aniso. &c.

Conducit etiam misculatè vinum generosum
cum

cum infusione absinth cinam. caryoph. & zingiberis, ut est vinum Hippocraticum.

Extremis autem applicentur cerata calorisifica & siccantia, ut est

Recipe Serapin. vnc. sem.

myrrh. drach. ii.

synap Cinam. an. drach. ii.

Croci scrup. i.

Cer. q. s. M. f. Ceratum.

Ad proportionem cerati potest fieri Inunctio.

Recipe ol. de absinth.

de spic. an. vnc. i.

vin. arom. vnc. ii.

Cinam. Nuc. mosc. an. drach. i.

Bulliant simul usque ad vini consummationem. & facta express. seruetur pro inunctione iccoris.

Ratio.

His respondeat v.etus ratio, quæ sit calorisifica & exsiccans. Igitur videntur potius carnisbus auctular. montanar. Condiuntur cibaria aromatibus, & modico sale. Bibant vinum generosum album, sed parum: Exerceant corpus. Non immergantur multo somno. Abnegeti venerem proflum, & balneis videntur medicatis, vel ex sulphuratis aquis, vel ex dulcibus, sed alteratis pullegio, calamentis, origano, & ceteris calidis.

DE FLUXIBUS, QUOS CALIDA IECORIS PROCREANT TEMPERIES.

Cap. XXIII.

TRanseo ad Hepaticos Fluxus ex calida intemperie: Sunt autem in quadruplici differentia: Quidam Biliofi, alij Melancholici, alij Sanguineali; Colligatiui. Habet autem quilibet eorum varias species. Biliofi enim Fluxus aut est bilis pallida & flaua, aut cerulea, vel crocea, aut aeruginosa, Melancholicus etiam aut est melancholia naturalis, quæ nigra est sine splendore, aut exulsa, quæ interdum splendida, aliquando liuida & cinerea. Sanguineus, Lotio excepto, de quo iam diximus, & Virulento seu Vicerose, de quo dicemus infra, duas habet species: prima, quæ propria est Fluxus Hepatici, in qua sanguis excernitur niger, sed splendidus; altera est impropria, in qua floridus, & rubicundus sanguis excernitur, tamen in copia magna. Dicitur impropria, quia sit citra Iecoris imbecillitatem, ut audietis. Colligatiui etiam duplex est: unus proprius, alter improprius. Ille quidem est excreto substantie subæ ceteris humoribus multæ, quæ nil aliud est quam humidior Iecoris caro, calore eliquata. Improprius fit vitio totius corporis per febres ardentes & pestilentes, in quo primum colligantur ichores, secundo humores in venis contenti, tertio pinguedo, & caro, vniuersi corporis, colligantur.

Causa.

Flunt quidem omnes hæc differentie ex caliditatis abundantia, sed hoc discrimine, ut quædam species sequantur intemperiem simplicem;

aliam intemperiem cum obstructione, quædam intemperiem cum siccitate coniunctam. Sequuntur autem intemperiem simplicem Fluxus Biliofi, Pallidi, & Flauis, & Melancholici naturalis. Sequitur calorem cum obstructione Croci, Cerulei, Aeruginosi, Atrabiles omnes, & Sanguineis nigri, splendidam in omnibus his Fluxibus præter Iecoris caliditatem accedente obstructione, humores prædicti retinentur. Igitur si retineatur pallida, vel flaua bilis, ex vltiori vltione fit Cerulea, vel Viridis: Si retineatur melancholia naturalis, ex vltione transit in Cineream, in Auram bilis splendidam. Pariter si retineatur sanguis melancholici mistus, ut vel in ambitum corporis, vel in lienem libere transire non possit, vltius incalcescit, & ratione melancholici coniunctæ splendorem contrahit, teste Galen. 3. de caos. sympt. 2 & 5. de loc. aff. 7. Ex intemperie autem calida & siccata sit Fluxus Colligatiui; ex quo, Auditores, potestis colligere, nonnullas ex prædictis Fluxionibus esse simplices, & continuas, alias mistas, & interpolatas.

C Simplex & continua est biliosa, pallida & flaua; cum enim non adsit obstructio, & semper sit eodem modo imbecillitas, Fluxio etiam est vniuersalis.

Ceteræ fluxiones, quæ intemperiem sequuntur cum obstructione, & mistæ & interpolatæ sunt.

Mistæ quidem; nam vno & eodem tempore potest exuri Bilis, melancholia, & sanguis.

Interpolatæ sunt omnes, quia eo tempore, quo propter obstructionem humores retinentur, alius videtur adstricta, & ego in praxi hoc obseruaui, aliquando in his casibus adstringi alium hominem per dies, sed hebdomadas etiam, succedente deinde larga & putrida excretionem.

In colligatione non vnus excernitur humor non sola colligatio, si tantum sermo sit de proprio Fluxu Colligatiui; imò verò illa caro Iecoris colligata semper admiscetur aut bili flaua, aut atra.

Ex quibus facile intelligitur, cur in pluribus Hepaticis adsit etiam Tenestmus: Hoc enim dico, quia id multiplici experientia obseruaui: Hepaticos scilicet bilem vel flauam vel atram deiecentes tenestmo vexari.

Ratio est clara: Humores enim isti sunt iam calidi & acres, ut faciliè exulcerationem inferre valeant.

Signa distinctiue differentiarum.

Iam potestis absque ullo labore signa colligere. Primum quidem signa differentiarum harum Fluxionum non sunt valde obscura. Nemo non propriis oculis intueri poterit, vtrum hæc vel illa bilis flaua excernatur, an potius humor niger citra splendorem, qui est melancholici naturalis, an potius cinereus, vel admodum splendidus, ut est bilis nigra vltia. Pari ratione distinguatur sanguis, qui proprie Hepaticus dicitur, ab improprio ex nigredine & splendore, nam qui Hepaticus sequitur, niger & splendidus est; alter verò clarus

Cur Hepaticis Tenestmus sepe laborant.

& rubens. Et quia, ut docuit Galen. 3. de sympt. caus. c. 3. hic qui non proprius est, sita facultate expultrice Iecoris valida; non ab imbecillitate, igitur necessarium sequitur insignem corporis plethudinem, siue hac fiat ex membro mutilato, siue ex suppressis mensibus, seu aliis consuerit sanguinis Fluoribus, siue ex neglecta exercitatione; perseverante autem victu pleno.

Colliquatio Hepaticorum propria in hoc ab impropria distinguitur, quod propria colliquatio non sit admodum copiosa, neque sit substantia ichorosa, sed duntaxat biliosi humoris leniorem & crassitiem quandam obtinentis simul cum rufo colore, & insigni foetore ob carneam colliquationem bili commissam, ut docuit Gal. 8. de corp. per loc. 6.

Signa diagnostica calide Iecoris intemperie, &c.

EX his etiam iam innotescunt huius intemperiei calide signa. Colliguntur enim ex predictis deiectionibus: Item ex siti, oris amaritudine, nausea, inappetentia, vomitu bilioso, urinis rubris, splendidis.

Et si obstructio adsit, coniungitur interdum ictericus color, plerumque & cachexia biliosa, in qua corpus sit pruriginosum, impetigine scabie, aut Lepra refertum.

Si adsit siccitas in Iecore, præter cetera signa, aderit etiam macies totius corporis.

Prognostica.

Ideoque gravissimus est hic affectus, utpote qui non modo deducat ægros ad malum habitum, sed quod vobis mirum videbitur, aliquando deducit ad Hydropem, & tandem ad mortem, Sedulo igitur curacioni incumbendum.

Curandi Præcepta.

IN Curacione igitur primum materiam incumbendum deinde ipsis morbis, quos tres præcipuos esse diximus, simplicem intemperiem calidam, quæ refrigerantibus est tractanda. Calida cum obstructione, quæ est tractanda refrigerantibus & aperientibus. Tertiaque est calida & sicca, quæ tractanda est refrigerantibus, humectantibus & nutrientibus.

Quod ad materiam spectat, ut breui me expediam a Fluxu sanguinis Hepatico improprio, qui sit ex robore facultatis expultricis irritatæ copia hic curatur primo, secta vena in cubito, & semel & bis, si neque menses, neque hæmorrhoides sint suppressi; nam in hoc casu aperiendæ venæ inferiores, prouocandi menses & hæmorrhoides: Imperandus est tenuis victus, & in quantitate & in qualitate ciborum, ut ea tantum sumantur, quæ exigui, vel inferioris sunt nutrimenti: Exercenda verò potissimum sunt eorum corpora. Quod si quæ caliditas remanet, nunc audietis, quomodo sit corrigenda; nam quod ad materiam vel biliosam

A Iecoris intemperie fiat vel raro, vel nunquam phlebotomiam conuenit, quia in Fluxu Hepatico etiam si calor abundet externus, deficit tamen innatus, & missio sanguinis hunc defectum augeret. Altera est causa, quia venæ sectio ducit humores, qui tantum circa Iecur subsistunt, in ipsas venas. Galen. autem summo opere abhorret à venæ sectione, cum humores in Iecore existentes in venas deduci possunt. Neque aliam ob causam præcepit Galen. 3. de loc. aff. 7. & lib. de cur. per sang. miss. c. 10. In melancholicis dum secatur vena, inspicendum esse sanguinem, & si ruber fuerit, statim claudendam esse venam, quia voluit nos monere succum, melancholicum in Iecore contentum, sed in venis non distributum, non posse vacuari per sectam venam, & quia hi humores abundant potissimum circa concavam Iecoris partem; neque enim adesset Fluor alui, nisi natura humores ad concavam partem depelleret, Docuit Gal. 7. method. 11. & 13. method. 16. humores in causa Iecoris parte existentes per aluum esse educendos.

C In Fluxu Hepatico ex intemperie calida, dummodo non adsit Colliquatio, aut Fluxio Cruenta necessaria est Purgatio maiori ex parte intestinali, ob causam superius dictam, antequam superentur morbi. Hæc verò purgatio paulatim fiat, & præcedat alterantium usus; sed etiam alterationis tempore aliquando hæc ipsa sunt repetenda. Debent autem esse admodum temperata, & ex mitioribus accepta, ut v. g. esset Rhabarb. ad drach. i. in puluere acceptum, vel cum vnc. i. sacchari ros. vel cum vnc. sem. succiendui, aut cichor. Si quis bolum accipere nolit, utatur rhabarb. infuso in sero caprino, chalyb. & præparato cum acido limonum, aut cum omphacio, sagresta, Clysteres etiam molles idem præstabunt; fiant autem ex decocto hordei cum vnc. iij. ol. viol. & totidem sacchar. Non recuso, ut si aliquando natura partem horum humorum per lotium deponere videatur, medicamentis Diureticis adiuuetur, modo sint frigida, aut temperata, ita ut vno & eodem tempore urinas moueant, & calidam intemperiem tollant; in qua classe erit idem serum caprinum, in quod infundatur radix silicis, graminis, pentaph. capill. Venet. recens, cui etiam addantur emulsiones, seminum frigidorum vel melon. vel cucurbit. Placent etiam Aquæ naturalis refrigeratores, ut est nostra aqua V. rginis, Calderianæ Veronens, Villenses.

D Si humidior fuerit temperatura calori connoxa, refrigerantibus siccantia misceantur. Valent in hoc casu succus cichor. & endiu. condensatus, aut clarificatus admisto puluere vel santal. vel rosar. vel margarit. præp. vel cornu cerui, spodii. Gal. 8. de comp. per loc. 8. laudat Endiu. & Cichorium in puluerem redacta. Dosis succi densati sit vnc. sem. puluerum, drach. ii. Succus autem clarificatus vnc. iij. iiii. & vi. Puluerum eadem sit dosi.

E Possunt etiam ipsi pulueres in aqua stillatit. præberi, seu sit aqua endiu. sonchi, aut cichorii. Possunt redigi in pilulas cum aliquo ex prædictis succis.

Quod accipio ex Gal. cum scopus

pus fuerit etiam mouendi vrinas haec remedia fac-
caro, aut melle esse excipiendam nam ideo ait A-
sclepiades remedium ex cichor aut endiu loco-
citai. propositum vrinas mouere, quia melle exce-
ptum. Idem esto iudicium de saccharo.

Alterum moneo etiam; In valde humida in-
temperie satius esse vti ipsis pulueribus, quam a-
lia remedii forma, vel si quid praeter puluerem
prohibendum sit, habeat etiam vini refrigerantis
& hiecantem, in qua classe est succus thibes, gra-
nat. limon. arantior. acid. berberum. Haec enim
omnia refrigerant & exsiccant.

Tertium etiam diligenter notandum, ut cum
Fluxus iam antiquus fuerit, his frigidis remediis
ad miscantur quaedam calidissima vbi adest le-
coris imbecillitas, adest defectus calidi innati,
licet abundet ascitius: Igitur innatum calorem
conseruare oportet, vel absinthio, vel spica, vel
cal. arom. refrigerantibus addito.

Extrinsecus lecori applicentur remedia eiusdem
facultatis non tamen actu si grda. quicquid hac
in parte Rhaf. 3. continentis suaserit: nam in le-
coris imbecillitate actu frigida facile calorem in-
natum possunt extinguere, ut Hydrops succedat.
Apponantur igitur lineti madefacti in succo En-
diu. Cichor. addito limonum, succo aut acorose,
speciebus tritum santal. & modico oleo ex absinth.

Curatio Obstructionis à Materia Calida.

Quod si adfit Obstructio simul cum caliditate
trahenda est obstructio vel temperata
vel refrigerantibus, nunquam praetermissis qua-
cuanibus per intervalla repetitis & in tantum casu
licet nil prestantius sit ipso thabarba maturo exhibi-
bito singula hebdomade semel aut bis ad drach.
i. cum sacchar. ros. qua vnica materia auxilii scio
plures Hepaticos ex obstructione sanatos, nihilo-
minus possunt etiam concedi pilul. de tribus
in ead. dosi & tempore.

Quod ad aperientia spectat, eligantur tempe-
rata, ut est Capillus Vener. Polytrichum. Penta-
phyl. Cuscuta, Radix Graminis & filicis, Agri-
mon. Beron. Addantur etiam Cichoracea, quae
aliquam in se amaritudinem conueniunt, & idcirco
absterforia vi pollent. Accipiantur etiam eaque
à tota substantia profunt, & tamen obstructions
sanant. Duo proponit Gal. 8. de comp. per loc. 9.
Cochlearum carnem & pulmonem lopi tantum
puluerizata & exhibita ad drach. vel ii. Alii ad-
dunt lumbricos terrestres exlicatos, & in pulve-
rem redactos. Forte quia Galen. 1. simpl. c. de
lumbrie. scribit, illos vrinam ducere. Sed pra-
e caeteris in hoc casu laudo vsum chalybis praepa-
rationem acet. aceti. & mistum cum pulvere agri-
moniae, filicis, graminis, cichorii, siue exhibea-
tur in pulvere, siue excipiatur succo cichorii, aut
alia simili.

Extrinsecus autem vtantur inunctione emol-
liente & digerente sed absque calore. Haec erit
bona.

Recipe Ol. amygd. dulc.

rosat. compl. an. vnc. i. sem.

amygd. am. r. vnc. i.

succi cichor. Acet. an. vnc. ii.

Agri. mon. Absinth. an. M. s.

Bull. ad succi & acet. consum. Expressio.

Curatio Fluxus Colliquatiui.

Eniq; si fiat Fluxus Colliquatiuus, non opus
est euacuantibus. Tamen si enim purgauerit
materiam aliquam ex parte biliosa, cuius portio re-
tinetur in leuore, tamen plus potest carnis col-
liquatio ad prohibendum remediorum istorum
vsum, quam ipse biliosus humor retentus ad in-
dicandum.

Ideo si hic humor negotium faciat, educatur
clysteribus mollibus ex lacte & saccharo, ex puta-
na hordeacea, ex saccharo aut lacte ipso equino,
aut asinino, quod simul & semel expurgat, & col-
liquationi prospicit ideoque cum dabitur vobis
huius lactis copia consulo, vt nullum aliud eliga-
tur remedium internum ad Fluxum Colliquati-
uum praeter hoc lac.

Illud autem moneo, quod sicut ad subducen-
dam molliter aluum magis probatur equinum,
& asininum, ita ad tenuiendum leuor magis
probat caprinum aut ouillum, nisi adfit ob-
structio.

In lactis defectu, examini hoc iure.

Recipe far. amygd. vnc. ii.

Gumm. Arab. Tragacant. an. drach. ii.

Nucleor. pini. Amygd. dulc.

sem. melon. mundat. an. vnc. i. sem.

Lord. mundi. P. h.

cochlear. absq; testis. n. viij.

Plantag. Endiu. an. M. s.

Ponantur in ventre pulli. bull. ad perfect. car-
nis coctionem. facta omnium expressione den-
tur iuris voc. vi. vel vnc. viij. singula mane per
plures dies.

Abstineant vero ab omnibus acidis, & auste-
ris, & ideo non accipio Hostii consilium, qui
in Fluxu Colliquatiuo probat vsum thibes, & a-
liorum acidorum, quia magis nocent.

Refrigerant quidem, ed hiecant, nunc autem
opus est inproportione.

Ideo extrinsecus etiam conueniunt balnea aque
dulcis, & omnes cibi sint humidantes, quales
etiam Hecticis praesentantur.

Non improbo, vt in Fluxu Colliquatiuo icho-
rum & humorum qualis sit in febr. putrefacta, vt
migi refrigerantibus acidis. Tunc enim non ad-
est parus ichor, & tunc non ex hiecantia excre-
menta parum solida nil patitur.

DE FLUXU ALVI VLCEROSO AUT VIRULENTO. Cap. XXIV.

Alui Fluxum quem explicanda suscipimus;
vel Vicerolum, vel Virulentum, vel Vicerolum
Est autem materies detrita interdum tantum icho-
rosa, interdum vicerosa, detrita, patule hae, sangui-
nosa, & carnosae interdum. Ichor autem qui exet-
nitur, vel est ruber, vel flauus, vel viridis, vel lim-
bus.

Aus, albicans, mistus Sanies etiam vel alba est, vel flaua, vel viridis, vel argentea, vel quasi amurca olei, foetida, aut non foetida. Sanguis est concretus, aut nigricans, liquidus, interdum foetidus: Caro interdum est rubea, interdum obscurior, in minutas tamen distincta portiones.

Causae, ubi agitur de Inflammatione, Abscessu, Ulcere Iecoris & Mesenterij.

Funt omnes hae excretiones ex triplici affectu: Inflammatione, Abscessu, & Ulcere. Ex Inflammatione ichor tantum excernitur, Dicebat Gal. 5. de loc. aff. 7. omnem inflammationem, quae duro operculo non regatur, ichorem exsuderet, qui loturam carniū emulatur: idem scribit 4. aph. 47. & 1. aph. 12. Ex Abscessu disrupto euacuat, ichor primum albus, dein rubeus, postea sanies varii coloris, vel simplex, vel sanguini mista, interdum cum carneis portionibus. Ex Ulcere idem fit.

Nomine Inflammationis intelligitur Legitima, quae fit ex sanguine, & Spuria, siue sit erysipe lacca, siue sit melancholica, siue oedematosa.

Non dico esse oedema, quia Gal. 4. de praesag. ex pul. 8. Iecur oedema non sustinere docet, cum sit membrum sanguificationi dicatum. Abscessus nomine intelligo illum praecipue, qui post inflammationes fieri consuevit; nam duplex est Abscessus: I. cum inflammatio suppuratur; suppuratio enim est transitus inflammationis in abscessum. II. fit incipiendo nulla praecedente inflammatione, idque dupliciter, vel decumbente confestim materia ab vno in alium locum, vel paulatim in aliquam capacitatem transeunte. Hoc secundum genus abscessus magna ex parte duram habet materiam saeuam, aut pultem, aut calci similem, proprio obducta folliculo seu membrana densa, ut propterea excretioni sit inepta, ut docet Gal. 2. ad Glau. 7. qui etiam 14. meth. 12. ait, hos abscessus esse vel in genere Atheromatum, vel Steatomatum, ideoque sunt isti sine febre, quia densa includuntur membrana, de quibus dicit Hipp. 6. aph. 14. Vbi suppuratio in corpore non innotescit, id fit propter puris crassitiem, vel propter folliculi densitatem. De eodem abscessu intelligendus Galen. 2. de loc. aff. 9. cum ait, abscessum Iecoris esse sine febre, loquitur de istis, quos Atheromata & Steatomata vocant, quos plerumque in cadaveribus sectis repertos esse Reald. Columb scribit lib. 15. Anatomia.

Abscessus autem, qui post inflammationes relinquitur, ille est, qui disruptus euomit multiplicem materiam ichorosam, purulentam, sanguineam & carnosam. Est autem haec materia varia pro abscessus varietate. Varietas autem est in materia, in facultate, & in loco affecto.

In materia, quia ubi inflammatio sit legitima & consequenter sanguis sycerus abundet, transmutatio erit in abscessum puris albi. Sic cum spuria inflammatio, redolet colorem humoris sanguinei misti, flauum scilicet, viridem, aut liuidum.

Ratione Facultatis sit etiam colorum mutatio; nam si facultas alteratrix, ubi iam sanguis

extra venas exiit, sit usque adeo debilis, ut illum in pus mutare nequeat, tunc conuertitur in grumos, aut paulatim corrumpitur, & nigricans, & fluidus euadit, teste Hipp. 6. aph. 20. Sanguis ubi in aliquam secesserit capacitatem, vel suppuratur, vel putrescit.

Quod si alteratrix facultas sit deprauata, vel ratione caloris intensi, vel ratione venenatae qualitatis, sanguis etiam in prauum pus mutatur, viride, foetidum, vel alterius coloris, & prauo odoris, teste Gal. 1. de differ. febr. 6. Hipp. 1. progn. 32. Tertia causa est substantia affecta. Nam si abscessus sit inter membranam, & membranam partis magna ex parte est album pus, sed si substantiam solidam afficiat tunc colorem substantiae recipit, ideoque prauum pus efficitur. Locus autem, in quo fiunt haec inflammationes, vel abscessus, & ulcera, duplex est, aut Mesenterium, aut Iecur.

Et ex Mesenterio quidem fiunt improprij Hepatici Fluxus; ex Iecore autem proprii.

Nomine Mesenterij intelligenda non solum pars illa, per quam chylus in Iecur transit, sed aliae omnes Mesenterij partes, sicut etiam nomine Iecoris intelligitur pars sima & gibba; interdum utraque simul, in quibus fiunt inflammationes & abscessus. Atque in his partibus aliquando fiunt in membrana Iecur vestiente, interdum inter membranam, & carnem in ipsa Iecoris substantia, ut ideo quando per abscessum carnea excernitur substantia, semper excernatur ex Iecore ulcerato, cuius portiones aliquando per intestina deiectas simul cum sanguine & sanie ego ipse bis iam obseruaui. Carnis excretæ per intestina propter Iecoris vlcus meminit Auic. 13. 3. tr. 4. c. 1. & 16. Nicol. Floren. serm. 5. c. 6. & 12. qui ibi scribit, se quendam vidisse, qui 100. portiones Iecoris unico die emisit, & postridie obiit. Idem confirmat Matth. de Gradib. part. 2. sui com. in Rhafin. c. de fluxion. Gordon. part. 5. cap. de Flux. Hepat. Valesc. de Tharantin declarat, Fluxus Hepatici. Preterquam quod ex recentioribus doctissimus Mercat. Id. confirmat in epistola quadam impressa in libr. 2. epistolarum Cratonis, Et si quis modum quærat, non est adeo difficilis. Multo difficilius est exitus infantis ex utero. Difficilior est egressus calculi duri ex urinario in vesicam. Natura enim parat sibi vias, ut sanguis grumosus, aliquando exeat ex substantia callosa ossis fracti, ut docuit Galen. 5. method. 8. Multo melius potest Iecoris portio mollis per communes canales per malaricas scilicet ad intestina transire. Neque enim ibi sunt valvæ, ut quidam Anatomei falso imaginati sunt. Haec sunt differentiae & causae Fluxionum Virulentarum, ex quibus fiunt, & educuntur.

Signa:

Signa propositarum Fluxionum magna ex parte desumuntur ex signis demonstrantibus affectiones, ex quibus procedunt. Sunt autem affectiones Inflammatio, Abscessus & Ulcus: igitur versabimur in harum signis.

Signa:

Quod ad Inflammationem, ea sunt proponenda, quæ differentias, Genus, & Locos affectos demonstrant.

Cognoscitur itaque Inflammatio ex febre continua, quæ tamen exacerbationes continet, ex siti, ex dolore, & tumore circa illam partem, ubi est Inflammatio.

Si sit Legitima, adest pulsatio, vrinæ rubra, corpus plethoricum, venæ inflatæ, lingua etiam colore rubro suffunditur.

Quod si erysipelacea sit inflammatio, adest febris ardentissima, lingua scabra, nigricans, vrinæ splendida & ignea, vigiliæ intensa, calor admodum mordax, exacerbatio febris cum rigore, excrementa alui omnia acris & biliosa.

Si œdematosa sit inflammatio (non dico esse œdemā, Iecur, ut ex Gal. 4. de præf. ex puls. 4. œdema nō suspiciet) sed si inflammatio sit cū pituita, febris est minor, continua tamen, vrinæ crudiores calor mitis, lingua exsiccata quidem, sed albicans & lentorem quandam præ se ferens; alui excrementa pariter pituitam præ se ferunt.

Quod si melancholia sanguinis sit admixta, ex habitu corporis melancholico, ex imaginationibus melancholicis, & excrementis facile colligitur. Quod ad locum spectat, si Inflammatio sit in Mesenterio, febris est minor, quàm si fuerit in Iecore, dolor est obtusus, & tumor tactui apparet, circa mediam ventris regionem, & ut plurimum Fluxus sequitur Chylosus.

Quod si Inflammatio sit in Iecore, & febris, & omnia symptomata sunt grauiora, & tumor, & dolor in dextra parte hypochondrii sentitur, & ad distinctionem Inflammationis musculorū abdominis, Gal. 5. de loc. aff. 6. circumscriptam habet rotunditatem, quæ manu comprehendī potest. Tumores enim musculorum nunquam rotundi sunt. Item si tumor sit in parte gibba, adest iussis sicca, & dolor, qui costis mendosis magna ex parte consentit, nam, ut dicit Gal. loc. cit. in plethorice Iecur nothi illis costis est alligatum; adest etiam difficilis spiratio; & si maior fuerit Inflammatio, contrahitur cingulum.

Quod si fuerit in parte limba, adest insignis inappetentia, nausea, vomitus, & biliosa delectio, sitis sit maior, & aliquando Fluxus Chylosus.

Quod si hæc omnia simul reperiantur, Inflammatio totum Iecur occupat.

Et quia inflammata materia potest contineri aut in membrana, aut inter membranam & carnem, vel in ipsa carne, si sit in membrana, dolores sunt ingentissimi, nemine etiam partem tangente, rigores etiam maximi sunt. Neque tamen fluxus alui subsequitur, sicuti nec subsequitur ad materiam inflammationis collectam inter membranam & carnem, quæ cognoscitur, quia tunc dolor est minor.

Sed si fuerit in carne, dolor est obscurus, & nisi locus comprimatur, non dolet, & tamen febris est maxima, & alui fluxus necessariò succedit: nā inflammatio est adeo venis propinqua, ut illa redat imbecilliora.

Quod spectat ad Abscessum, huius signa in varias classes debent distinguī, quædam enim futurum Abscessum, quædam fientem ostendunt, aliqua iam facti, quædam iam disrupti indicia sunt.

Cognoscitur igitur Futurus Abscessus, si videatur Iecoris Inflammatio, nec remediis, nec phlebotomia, nec purgationibus, spontaneis, neque tenui victui cedere, imò dolor, tumor eo tempore persistere, & augeri, Inflammatione ad statum cedente, ut testis Hipp. 2. prog. § 2.

Fuens Abscessus tribus cognoscitur signis: Febre, Rigore, Pondere. Cū Inflammatio ad statum peruenisse videtur, & tunc rigor, qui per multos dies non apparuerit, iterum reuertitur, febris augetur, dolor in pondus transit, certum est signum suppurationis fientis, teste Hipp. 2. prog. § 3. Fit enim hoc tempore rigor, quia ab incipiente pure irritantur membrana Iecoris; augetur febris, nam ex 2. aph. 47 dum pus sit, dolores & febres exacerbantur. Fit pondus loco doloris, quia in inflammatione materia est dispersa: in Abscessu tota in vnum locum colligitur, ut docuit Gal. com. § 8. 2. progn.

Factus autem Abscessus cognoscitur ex sensu ponderis perseverante, ex amplo Iecoris tumore, ex febricula continua, sed horis vespertinis exacerbata sensim, ex rubedine maxillæ, & auris & directo existens parvi Abscessum faciens, & si diu duret Abscessus, paulatim superuenit Cachexia, tumor pedum ac totius corporis, ac tandem Hydrops.

Disruptum Abscessum non est difficile cognoscere, quando disruptio fiat ad intestina, ut fieri docet Hipp. 1. progn. 41. Imò interdum potest etiam hæc materia ad ventriculum transmitti, de qua inquit Hipp. 7. aph. 8. A tuberculi introsumptione vomitus fit, & animi defectio. Sed non semper pus per venas mittitur ad ventriculum & intestina, imò interdum purgatur per vrinas, teste Nic. Flor. ser. §. tract. §. c. 29 Interdum disrupta Iecoris membrana transit in peritonæi capacitatem, teste Aetio, & Gal. lib. de inæqual. intem. 3 Interdum, præcipue si Inflammatio sit in parte gibba, communicatur materia diaphragmati, & pulmonibus, ut iussu educatur; Sic duos vidi, Venetum quendam, & Patavinum, qui ambo ex Iecoris Abscessu in parte gibba in Abscessum enā inciderunt septi transuersi, & dextri pulmonis, equato sanguine, & pure per iussu. Sectio ipsa defunctorum post mortem facta indicauit. Interdum hæc materia inter membranam, & carnem collecta facit tumorem in regione dextri hypochondrii & directo partis laborantis, per quem feliciter loco aperto sanies educi potest, ego ipse sum expertus & feliciter successit. Hoc colligitur ex Hippoc. primo quidem in genere 1. prognost. 40 cum ait, eos Abscessus, qui foras desinunt, si sunt fastigiati, & acuminati, latis esse meliores: specialem verò de his ait, 7 aph. 45 Inflammatione Iecoris laborantes, & quibus facti sunt Abscessus, si incidantur, vel vrantur, & pus albu

exeat, sanari; si verò ut amurea olei, interire. Loquitur de Abscessibus foras prodeuntibus, & tumorem in cute facientibus. Præter cetera, quæ ruptum Abscessum ostendunt, est etiam sanies sanguis corruptus, interdum substantia solida in dies exiens, signa relictæ Vlcæris. Disruptus enim Abscessus tandem in Vlcus abit.

Sed quia non omnes Abscessus Inflammatione sequuntur, imò verò sunt aliqui incipientes, habentque propriam membranam, in qua materia continetur: hi agrè cognoscuntur, si tamen sanguinem contineant, vel concretum, vel liquidum, at non suppuratum, antequam rumpantur (& ego expertus sum) habeat hæc signa: Febrim inferunt parvam, continuam, inæqualiter exacerbata, quæ menses & annos durat, habetque connexam inappetentiam, anxietatem, & quasi pondus circa fundum ventriculi: consueverunt deliquia animi per intervalla succedere. Cum autem dirumpitur hic Abscessus, effluit sanguis, vel liquidus, vel concretus in quo distinguitur ab alijs deiectionibus eruptis: febris statim desinit, restituitur appetentia, omnia denique desinunt symptomata. At si Medicus non cautus sit de implenda illa cautela, in qua sanguis ille continebatur, post aliquot menses locus ille iterum sanguine repletur: & sic fit nova talis sanguinis deiectionis præsentis anno bis observavi in duobus Nobilibus, quorum unus elapso anno hunc Abscessum habuit, & hoc anno in eundem incidit: Alter ante quatuor annos hunc Abscessum habuit, & singulis annis rediit eadem excretio, sicut & hoc anno. Sed satis de diagnosticis.

Prognostica omnium.

Iecoris Inflammatio tripliciter desinere conluevit: aut Digeritur, aut Suppuratur, aut Induratur.

Si digeritur fit Fluxus sanguinis narium, quo iudicatur; Si suppuratur, suppuratio vario fit tempore pro materię varietate, loci, & facultatis. Pro varietate materię nam si sanguis fuerint legitimus, suppuratio fiet circa vigesimum diem, si fuerit bili mistus, 14. die Erit autem ab augmento post septimum diem ab augmento febris, & a novo superueniente rigore.

Si Spuria sit Inflammatio, sit interdum suppuratio tantum sexagesimo aut quadagesimo, aut octogesimo die, à die, quo rigor & febris rediit, teste Hipp. 2. erogn. 57. Transiit autem Inflammatio in scirrhum aut quando habet multum pituitæ, & melancholiæ admixtum, aut cum indebito tempore refrigeratibus & internis & externis tractatur. Sicut verò & quæ induratur, deducit patientes ad hydropem, sic quæ sui magnitudine & caliditate ad suppurationem tendit, magna ex parte interficit, & malignæ inflammationis signum est ipse singultus de quo ait Hipp. 7. aph. 77. Inflammatio Iecoris, &c.

Quod ad Abscessus spectat, hi etiam aut rumpuntur aut in alium locum transeunt. Illi vel boni, vel mali cognoscuntur ex quatuor conditionibus. Boni sunt, qui foras potius, quam intro rumpuntur. Secunda, ex iis qui foras erumpunt, sunt boni acuminati; non autem plani, & lati-

A Tertia desumitur ex pure: si enim hoc fuerit album, est bonum signum: si rubrum, & qualis est amurea olei, moriuntur, teste Hipp. 7. aph. 45. Quarto salutaris Abscessus est, qui sit concoctione: Vnde & urina, & pulsus, & alui excrementa sunt contemplanda. Quod si faciat decubitus Abscessus, distinguitur bonus à malo tribus conditionibus. Prima, ut fiat ad partes inferiores multum à Iecore distantes, ut circa articulum, genu, vel pedes, teste Gal. 3. in 1. Epid. 1. Secunda conditio est, ut fiat à directo partis laborantis, ut in dextro ure. Hoc testatur Hipp. & Galen. 2. in 6. Epid. 13. & 14. Tertia conditio, ut hic decubitus fiat concoctione, Hipp. 2. progn. 67.

Vlcera autem Iecoris semper sunt insanabilia

Nam potest quidem, ut dixi, sanari Abscessus in Iecore consistens, modò sit factus inter membranam & carnem, illata carne, & cum membranam, seu folliculum sibi parauit. Vbi autem corrupta est caro, rarissimum est sanari. Scio referti à scriptoribus varias eorum historias, qui vulnerati circa Iecur, tandem conualuere; Sed alia est vulneris, alia vlcæris ratio. In hoc enim præter continui solutionem adest etiam substantię corruptio. In vulnere autem non necessariò substantiæ putredo iungitur. Sed de signis hæcenus.

Curatio dictarum Affectionum, ac primum quidem Inflammationis.

D Vm transeo ad curationem dictarum affectionum, versabor imprimis circa auxilia & materias auxiliorum, quæ Inflammationem expugnant; deinde ad Abscessum, tertio ad Vlcus descendum.

E Inflammatio quidem prima fronte facilem videtur habere curationem Consueverunt enim Inflammationes in principio tractari reuellentibus, & repellentibus in augmento partim repellentibus partim digerentibus: in statu autem solis digerentibus. Sed quantum distat Inflammationis Iecoris curatio ab omnibus reliquis, mox intelligitur. Nunc autem ad reuellentia descendo, quæ sunt aut vomitus, aut clysteres, aut medicamenta, aut variæ sanguinis missiones.

Vomitibus quidem tunc tandem convenit, cum ventriculus fuerit plenus; nec enim in Iecoris Inflammatione licet ad ventriculum attrahere validis vomitoris materiam à toto corpore Sic trigram licet uti remediis purgantibus ab initio, dicebat Gal. 13. meth. 11. sc. unica die cathartico maximas oculorum inflammationes sanasse; quod si quispiam, ait, in Iecoris Inflammationibus id, facere ausus fuerit, mirum in modum Inflammationem augebit.

Igitur sint tantum Lenientia: Cassia cum Thamarindis; Syrup. rosatus solut. lotum caprinum cum eodem syrup. ros. Diaprunis simplex, electuarium de sebesten, simplex sine scammonio.

Clysteres etiam sint leues ex decoct. viol. hord. maluz, sacc. ol. viol. & cassia extracta confecti.

Quoad sanguinis missionem: Vbi neque hæmorrhoides neque menses sint retenti, nihil præstatius facta in cubito vena, vel cūmuni, vel iecoraria dex-

ria dextri lateris, quæ ut dicit Gal. 13. meth. 11. A
statim reuellit & inflammationē deriuat. Quod
si vires non consent, aut diuidatur sanguinis
militio in duas vices. Cum enim vires consent,
liberè licet sanguis est mittendus; imò quidam
consulunt ad animi deliquium: & sanè si error
hæc in parte committatur, qui in principio est le-
uissimus evadit maximus in fine; sanguis non
mittitur, siue minus, quam decet, mittatur. Infla-
matio augetur, & ob hanc solam causam in Ab-
scessum transit. Quod si sanguis in magna co-
pia mittatur, unica die desinit Inflammatio, ut
videt Medici dicere possit se febrem iugulasse.
Sed si vires non permittant, aut diuidatur san-
guinis militio in duas vices, aut aperiantur salua-
tella. Quod si hæmorrhoides sint suppressæ ape-
riantur: Si menses sint suppressi, & in iste purga-
tio, aperiantur prius venæ inferiores, mox durate
malo etiam superiores.

Quod si nullus sanguinis mittendi detur lo-
cus, astringitur, cucurbitulæ, non tamen ut ali-
qui volunt supralis & dorso. Hoc enim esse In-
flammationem; Iecoris ad pulmones, & cordace-
res, ad apponantur cubitus & lumbis.

Neque aliæ remissiones, frictions, ligaturæ,
balnea, aqua calida extremis partibus adhibita,
negliguntur.

Suadent itæ aliqui, ut sanguis ex naribus mit-
tatur dextris, quod videtur naturam iudicare
Iecoris Inflammationem per fluxum sanguinis
narium, ut docuit Gal. 3. de Cris. 1. Sed aliud est lo-
qui de Inflammatione incipiente, aliud de iam
facta. Illi enim non iudicatur fluxu sanguinis e
naribus. Hoc iudicium, si debeat esse utile, sit in
statu. Consula igitur, ut si natata eo tempore hæc
locum petat & imperfectè, adiungatur in princi-
pio autem non suadeo, ut hæc pars irritetur, & sa-
guis sic in cerebrum feratur.

Repellentia sunt vel interna, vel externa. Illa
si rite administrari debeant, debent omnia respi-
cere Inflammationis formam, locum, tempus, ma-
gnitudinem, & partis officium. Formam quidem
nam si Inflammatio sit legitima, aut Erysipela-
cea, audacter statim in principio vitendum reme-
diis refrigerantibus, & eo magis, cum Inflama-
tionis etiam obliquerit magnitudo. Licet enim
hæc remedia possint aliquam Iecoris obstructionem
inferre, nihilominus minus, est periculum cui oc-
currimus per frigida potione, quam damnum,
quod subsequitur; nam si non dentur hæc frigi-
da aut tabes subsequitur, aut Inflammatio aucta
in Abscessum abit. Idem Gal. 10. meth. 6. ad hoc
respicit frigida potione commendat.

Sed item Locus est considerandus. Locus enim
vel est pars sima, vel est pars gibba. Si illa, refri-
gerantia nullo modo debent esse adstrictoria. Si
enim adstringat locum Inflammatum, indura-
bitur, materia, & adstringetur porus felleus, &
retentilibus in Iecore augebit Inflammationem.
Si inflammata sit gibba, adstringentia non im-
probantur. Habent enim vim prohibendi fluxio-
nem a parte gibba ad simam, siquæ illa ab Infla-
matione præseruabitur.

Denique, partis officium est considerandum,

quod commune est toti corpori: ideo permiscen-
da sunt ea, quæ Iecoris robur conferunt, licet ca-
lidiuscula fuerint, ut absinthium, spica, vel aliud,
sed modica proportionem.

Igitur in his casibus, existente scilicet Inflam-
matione Erysipelacea, aut syncera, eaque magna,
& in gibba, post sectam venam & exhibitum le-
niens medicamentum, præbeatur aut.

succi endiu. cichor.

depurator. an. vnc. iij.

Infunde in prædictis succis absinthii comam
vnam, & pot. patienti præbeatur

Recipe Endiu. Portul.

Plantag. an. vnc. iij.

Syr. de Berb. aut Rob. de Rbib.

Vel R. *Ser. capr. aut aq. hord. lib. i. vel. ij.*

Syr. de acetos. cit. aut acetos. simp.

aut succ. Limon: vnc. i. M.

Quod si Inflammatio sit pituitosa, vel melan-
cholica, abstinendum ab adstrictoriis & admo-
dum refrigerantibus, igitur.

Recipe Syr. acet. simp. vnc. i.

de cich. simpl. de capill. ven. an. vnc. sem.

Aq. Endiu. Cichor.

Bettonic. an. vnc. i. M.

Exteriora ad proportionem interioribus respō-
deant. In his enim pariter obseruanda Formæ Lo-
cus, Magnitudo, Tempus Inflammationis, Offi-
cium, & Situs partis inflammatae. Forma quidem &
Locus, quia si Inflammatio sit Erysipelacea, vel
Legitima, sed in parte concaua. Tempus præterea
quia si fuerit in principio principiante, absq. cō-
trouersia conueniunt refrigerantia, & actu & po-
tentia. Sed si magna sit Inflammatio, aut sit in
gibba parte, refrigerantia actu & impermissa sunt
omnino suspecta; nam indurabunt Inflammatio
nem, quæ tandem in scirrhum degenerabit. Exte-
riora remedia, in principio Inflammationis Ieco-
ris actu frigida, in duobus casibus tantum admini-
strari possunt. Primus est, si Inflammatio sit erysi-
petacea, dicebat Galen. 13. meth. 8. in Erysipelate
scopum refrigerandi superare scopum digerendi
cum contra in Inflammatione contingat, & idē
Gal. in seq. c. 9. de reprimētib. in principio princi-
pante administratis verba faciens, ait, hæc partē
ipsam euacuare, quia materiam adhuc in valis ex-
sistentem ad vicinas partes propellunt, sed ubi
irrasierit hæc principium, & ubi Inflammatio nō
sit erysipelacea, reprimētia debent habere tres
condiuitones Prima, ut sint actu tepida; Secunda,
ut sint quæ illis, quæ sunt tenuium partium, &
penetrationem habeant, ut acetum, aut succus li-
menum & apianicorum. Tertia, ut habeant eorū
missionem, quæ partis robur conferunt, licet fue-
rint calida. Igitur supra dictum est in administra-
tione, horum remedium considerandum esse
& situm, partis & officium.

Nam ratione situs, quia Iecur est satis profun-
dum (habet enim musculos, peritonæum, & alias
superpositas partes) propter hanc causam sunt
necessaria remedia, tenuium partium; quia verò
sanguificat per totum corpore, conseruat dum est
illius robur quibusdam remediis adstrictoriis. Igi-
tur Gal. 13. meth. 23. miscebat aquam, quæ edul-

terat cytonium cum oleo, in quo efferbuerat absinth. deinde illa utebatur in principio inflammationis. Si huic remedio addatur acetum, etiam penetrabit. Loco illius potest substitui.

Recipe Olei de cyton. vnc. i.

de absinth. vnc. sem.

Succ. cichor. vnc. iij.

aceti vnc. i. sem.

Et erit remedium in principio inflammationis accommodatum. Quod si haberet Inflammatio aliquid pituitosi vel melancholici, relinquatur oleum de cyton. & eius loco.

Recipe ol. ros. compl. vnc. i.

ol. de absinth.

ol. chamomel. an. vnc. sem.

Accedente ad augmentum Inflammatione, augenda paulatim sunt digerentia. Igitur augenda est olei chamomelini quantitas, & loco succi cichorii accipiantur succus agrimoniz, aut fiat decoctum ex cichor. endiu. florib. chamomeli, anetho & meliloto, & in vnc. vj. decocti imponantur.

Acet. vnc. ij.

Ol. ros. compl. Chamomel. an. vnc. i.

de absinth. vnc. sem.

Intrinscus aut si Inflammatio sit in parte sima, pergendum est in usu remediorum aluum subdūcentium, ideoque alterius diebus, aut præbenda castia, aut seri capr. lib. ii. cum vnc. iij. syr. ros. solu.

Vel. Si Inflammatio sit pituitosa, accipiantur mellis ros. soluz. tantundem, aut in bolo Electuarii lenitium. Quod si eger remedium saepe repetitam saltidiat, vitendum clysteribus foruoribus, qui recipiant:

Decoct. polypod. Epith. Senæ

Elect. lenit. drach. vi. vel. vnt. i.

Ad elect. ros. vnc. iij.

Ol. tantund. M. f. clyst.

Si Inflammatio sit in cibus, sapius diuretica sunt miscenda & administranda, atque ideo si præbendum, sit serum, quod valde probatur, fiat diureticum: infundantur illo Agrimon. Pentaph. Capil. Vener. radi. ces filicis, gramin. Misceantur emulsionones seminum frigida; aut si non adsint serū, fiant decoct. herbarum prædict. compositatum. Sicuti autem in partis Simæ Inflammatione si cet conueniant expurgantia, non tamen prorsus negligenda sunt diuretica, ita in Inflammatione partis cibbe licet magis diuretica conueniant, non sunt, tamen negligenda, quæ aluum subducunt molliorem.

In Statu audacter ad exteriora digerentia veniendum, ad fomenta ex decoct. melilot. anethi, chamomeli, seminum lini, scenugraci, cymini, pulegii, orig. thymis, aut ad emplastra, maximè, quod sit ex meliloto:

Intrinscus verò pro parte cibus sunt eligenda calida diuretica, ut est apiumidaucus, &c. Sicut in parte Sima laborante opus est diureticis: tunc fortioribus licet vii Rhabarb. & Agarico; nam Gal. 13 meth. 1 s. utebatur etiam Elleboro: neq. improbo elleborum, aut aliud medicamentum in cibo. Dabat enim Gal. ellebori in pusana, & a quibusdam accusatur, sed perperam.

Nam hoc medicamentum in pusana minus

calefacit, facilius ad Iecur perducitur, vasa ipsa permeat, & dum attrahit humores, ab Inflammatione præseruat, quia leuis pusana humiditas partes illas humectat.

Illud quoque hoc in loco obseruandum cuius meminit Galen. loc. cit. hoc tempore statim nunquam omittenda esse adstrictoria. Pugnatur quidem hæc intentio & obseruatio cum intentione & operatione communi omnium Inflammationum; nam in statu solis digerentibus vumur, sed ratione habita officij Iecoris, semper necessaria sunt adstrictoria, ut conseruetur robur partis:

atq; ideo hoc tempore admiscetur absinthium, spica, aut quid tale. Et quod ad victus rationem pertinet, sicuti in principio, & augmento victus debet esse tenuissimus, imò tenuior, quam in Pleuritide, quandoquidem cum totum alimentum per Iecur transeat, Pleura autem illam recipiat tantū alimenti portionem, quæ pro sui nutritione est necessaria; ita maior est error, qui committitur in Iecoris Inflammatione, quam qui in Pleuritide:

Itaque si vires consentiant, aut sola pusana, aut sola panarella cum mulsi, sem. melonum vsq; ad septimum sunt deuendū. Si cadant vires, ouum quandoq; porrigendum, aut cochlear. destillatū ex pullo. Potius verò sit, aqua hordei, aut alia destillata; sed in statu, quando est scopus Inflammationem digere, cibus debet quidem præberi exiguus; sed tamen poteritis patientibus præbere vinum: præcipuè autem in Inflammatione partis Gibbe & ratio est, quia vinum est valde diureticum, maxime album, & minime dulce, aut crassum. Et cū hoc tempore Galen. proponat diuretica, quæ sunt calida vsque ad tertium gradum; multo magis potest conuenire vinum album tenue, & in moderata quantitate exhibitum.

Curatio Abscessus.

Sed si Inflammatio videatur in Abscessum abiisse, omittenda sunt digerentia exteriora, omittendum est vinum, relinquenda omnia purgantia, omnia diuretica, sed liberaliter nutriendi sunt. Nam ex copioso assumpto cibo calor naturalis augeatur, & facilius sanguis in pus mutatur.

Adiuuanda tamen est suppuratio extrinscus imposito emplastro de meliloto cum additione buiuri recentis, & oxungie suille; intrinscus autem summo mane præbendum est iusculum pingue, cui ipsoxerit malua, althæa, passula, caryca.

Et vbi facta sit suppuratio, distrumpendus est abscessus, si exterius appareat, phlebotomo, aut ruptorio si non appareat, saltem compressione, agitatione ac motiones illius partis: Vbi distrumpitur Abscessus, videndum est, quo natura tendat; nam per illum expurganda locum est sanies, ad quem natura inclinatur. Vidi aliquando Abscessum Iecoris, in quo transmissa est materia ad ventriculum, ut is patiens vnica die lib. x. puris excreuerit. Adiuuandus ergo est vomitus, si ad Ventriculum materia tendat; Si ad intestinis prorepat, vitendum Clysteribus, aqua Testutiana, aut aliis medicamentis melle

ros. commistis. Abstergendum deinde est Vlcus A
aqua hordei, aut sero caprino, aut aqua aliqua me-
dicata, qualis esset B. Virginis, aut Calderiana mi-
sta cum melle rosato. Loco istarum potest etiam
accipi aqua virgæ pastoris, aq. siliquar fabarum:
possunt fieri decoct. ex amygdalamaris contusis,
ex cruo, lupinis, corticibus fabarû. Quibus omnibus
admiscetur mel. ros. simplex. Hæc omnia deter-
gunt, & vlcus mundant. Quod deinde siccatur
aut adhibitis aquis falsis, & aluminosis, aut de-
coct. rosar. pilosellæ, plantaginis, consolidæ, myr-
tillorum cum pulvere Boli Armeni, Terræ Sigillæ B
te, Lemniz, cornu cerui vsti, santal. rubcorum.

DE FLUXU VIRULENTO SEU VENE- NATO. Cap. XXV.

INter tam varias Fluxionum differentias, nulla
est, quæ maiorem Medico aut ignominiam,
aut dignitatem, atque vtilitatem comparare pos-
sit, quàm Fluxus venenatus. Ignominia quidem,
quia si communiter tractetur, omnes ex inopina-
to moriuntur. Dignitatem, & lucrum, si debito
modo curetur. Non est autem Fluxus Venenatus
specie aut forma distinctus à reliquis iam proposi-
tis, sed causa tantum, & more Causa, quia est ve-
nifica: More, quia malignus est: Idcirco licebit
vobis affirmare Fluxum hunc Veneficum esse cu-
iuscunq; generis & speciei. Potest esse Lienteria,
Diarthra, Dysenteria, qualem nunc in Vngaria
vagari audio, & Fluxus Hepaticus, & in genere,
& in specie. Hinc Gal. 4 aph. 21 & lib. de atra bi-
le c. 2. mentionem faciens illius Fluxus, qui vaga-
batur in pestilentia sui temporis, inquit extre-
mentum fuisse vel flaua, aut rufa, tandemq; nigra,
& 13. in 3. Epid. 17. cum scribit Fluxum Colli-
quatum esse proprium pestilentium, per Colli-
quatum intelligit Colliquationem humorum,
ichorum, carnis, & pinguedinis, cuius etiam me-
morat 8. de comp. per loc. 6 & 3. de caus. symp. 2
& 5 de loc. aff. 7.

De Causis.

Hic igitur humor & Fluor habet pro proxi-
ma causa maleficam qualitatem seu proprie-
tatem aut toti corpori, aut illi parti inimicam, vnde
incipit. Ideo potest hic Fluxus vel à toto corpore,
vel à iecore, vel liene, ventriculo, aut cerebro,
vel ab intestinis originem habere prout malefi-
ca hæc proprietas huic vel illi parti aduersetur:
Hæc verò proprietas interdum à prauis succis
intra corpus generatur, interdum ex morfu ve-
nenato inducitur, quandoque ex remediis dele-
teriis assumptis, vel ex pestilenti aere indicitur,

Signa.

Cognoscitur facillè, atque ex his potissimum.
Breui admodum vites omnes deiecit, cadit
appotentia, excrementa, quæ effluunt, sunt valde
foetida, aeria & mordacia, cum dolore & labore
excreta, frigescent extrema, liuet totum corpus,
pulsus sunt interdum tardi, languidi, inæquales,

superuenit timor sine causa, palpitatio, lipothymia,
sunt patientes ad motum valde imbecilles,
vigiles, & interdum delirantes.

Prognostica.

Perniciosissimus est hic Fluor, plurimos necat
4. aut 7 die, aut ad summum 14 Igitur, vt di-
xi, summa opus est diligentia.

Curatio.

IN curatione igitur duo sunt notanda: 1. eo
omnia, quæ ad Fluxum spectant ab omni veno
no separatim 2. venenum ipsum respiciendum.
Quid agendum sit pro curandis Alui Fluoribus abs-
que veneno, supra dictum est abundè. Sed ad expu-
gnandam hanc luem veneficam, duobus solum
est opus auxiliis. Attrahentibus in cutem, & Alter-
rantibus, nil his est præstantius: Primo, quia sic
decens reuulsio ab intro ad extra. Secundo, quia
attrahitur venenum in partem ignobilem, in cu-
tem scilicet. Idcirco nullam aliam proposuit curan-
dorum venenorum rationem Gal. lib. de art. cõst
19 & 5 simpl. 8 quàm per attrahentia, & alteran-
tia. Sed dicet quis: Si in Fluxibus curandis adfune-
scopi desumpri à materia, à causis, & affectionib.
absq; veneno: præterea verò habemus ex alia par-
te scopos à veneno desumptos cuiusnam primo in-
cumbendum? Opus est hac in re contemplari mo-
dum, & morem Fluoris: nam si videatur Fluor ef-
fere velocis motus, id quod docebit constitutio, &
præterea sit valde malignus, statim pugnandum
est contra venenum: si fuerit chronicus & minus
malignus, vt det aliquas inducias, primo commu-
nibus scopis satisfaciendum. Demus igitur Fluo-
rem esse acutum, & mali moris, statim venien-
dum ad attrahentia, & alterantia.

Attrahentia, vt docet Gal. loc. cit. vel attrahunt
à tota substantia, vel caliditate: Proprietate sub-
stantiæ, attrahunt omnia venenata: Ita tamen cor-
rigantur, vt sint apta quidem ad attrahendum,
non tamen ad corrumpendum corpus: vnde dicit
Gal. 5 simpl. 18 hæc debet esse media inter ve-
nenum, & corpus. Applicentur igitur hæc atra-
hentia proprietate substantiæ & caliditate, inter
quæ primum locum habent Vesicantia: Scio sta-
tim aliquem dicturum Fluxum posse esse Colli-
quatum, acrem, calidum, quare non licere vt
igneo remodios: sed causa huius Colliquationis in-
quirenda, & calor: nam venenum ipsum præter
occultam qualitatem, & proprietatem, habet et-
iam vim calefaciendi, colliquandi, putrefaciendi,
vt si venenum nõ statim educatur, frustra om-
nia adhibeantur. Igitur etiam in fluore calido &
colliquatio modo sit cū veneno, licet vti Viscer-
tibus, Sinapismis, balneis aq; calide, cui incoqua-
tur malua, bismalu. althea, chamomelū, anethū,
melilotus. Rarefaciunt enim cutem, humectant cor-
pus, & à profundis partibus ad extimas ducunt.
Debilitioribus, qui non sustinent balneum, sũt fric-
tiones, inunctiones ex oleis calorisificis, chamomel,
& aneth.

& aneth addito nitro aut sale. Inungantur etiam A
extremae partes, & Cor, & Perinæum oleo alexi-
pharmaco, ut est illud de Scorpion. Matthiol Cura
virg. aut Mag. Ducis Hetruriz: Vel in huius
defectu accipiantur Theriaca, aut Mithridatum, &
dissoluantur cum portione aquæ vitæ, & illina-
tur locus in capro, & supra claviculas, in regione
cordis & perinæi. Si robustus sit æger, non dispi-
cet sudorem aliquo modo excitare, aut vesicis a-
qua calida plenis, cui incoquatur pulegium, scor-
dium, calament. dictamus, iuniperus, salvia, ros-
marinus, chamomelum, aneth, & melilot, aliq; B
cuiusmodi vel calida, vel relaxantia. Hæc partim
calore attrahunt, partim proprietate substantiæ.

Non displicent alia attrahentia: Cucurbitulæ
scil. vel scarificatæ, vel non, sed in variis partibus
affixæ, brachiis lumbis, naribus, coxis, & cruribus
non autem scapulis, ne in thoracem materia duca-
tur. Alterantia verò sunt pariter vel occulta pro-
prietate donata vel manifesta.

Inter alterantium occultas proprietates quæ-
dam sunt, quæ adherent subiecto calido, alia verò
frigido: Hæc in parte opus erit iudicio Medici,
ut materiam fluentem, causasq; morbos contem-
pletur: nam si omnia ad calidum conspirent, id
quod in Venenatis Fluxibus maiori ex parte ob-
servabitur, agendum alexipharmacis refrigeranti-
bus, ut sunt cornu unicorni, cerui, margaritæ præ-
paratæ, bolus armen. terra Lemnia, aut Silesiaca,
quæ præberi possunt cum succo limonum, aut ci-
tri, aut aranciorum, aut granatorum, aut rhibes:
Sed notandum, quod Fluxu Venenato magna de-
bet esse quantitas remediorum, & sæpius repeti-
ta. v.g. Detur summo mane ante cibum, aut dra-
ch. ii. terr. Lemn. aut margar. præpar. aut cornu
cerui. Succo verò dentur vnc. iij. & vj. & quando
sint egri, simul cum succis detur aqua propor-
tionata vel oxalid. vel oxylapath. vel sonchi, vel
aqua mea cordialis: & bis quous die his utendū,
nam periculum est in mora, ideoq; quam primū
fortibus, & repetitis remediis agendum. Nil præ-
stantius erit aqua mea cordiali.

DE ICTERITIA. Cap. XXVI.

Postulat hic locus, ut de Icteria loquamur,
cum enim fiat Icterus magna ex parte ab ob-
structionibus, & duris tumoribus: duri autem tu-
mores & obstructions relinquantur aliquando
post Inflammationem, rationi consonum est post
sermonem de Inflammationibus, quæ digerun-
tur, vel suppurantur, de Scirrhis verba facere, quæ
interdum inflammationi succedunt: occasione
autem Icteriæ tractabimus etiam de Scirrho le-
coris, Vocatur hic affectus Icteria, vel Icterus,
Morbus regius, vel Arqueus.

Defini- Et nil aliud est, quam *præius totius corporis*
tio. color. Per Colorem triplicem intelligo Flauum,
Nigrum, & Viridem, modò licet propriè sumpta
Icteria sit mutatio coloris in Flauum, ut docet
Gal. 2. de loc. aff. 9. ut ideo Auriginea affectu e-
tiam dicatur, nihilominus impropria Icteria &
Nigrum, & Viridem habet colorem. Nomine
aut *totius corporis* intelligo vniuersam cutem

& oculorum membranas, adnatam, & corneam.
ut propter vitiosum corneæ colorem patientes pu-
tent omnia externa obiecta esse illius coloris,
quem obtinet cornea.

Locus affectus.

Locus præcipuè affectus sunt meatus vesicæ
felleæ: Dico meatus in plurali numero pro-
pter Fallopiū, qui putauit vnicū esse vesicæ
felleæ meatum, contra quam sentiant alii Anatomici,
& ostenderit Andreas Laur. 1. controuers. con-
tro. 3. qui omnes duplicem statuunt ductum,
vnum per quem bilis ingreditur vesicam felleā,
alterum per quem egreditur, & ad duodenum
transmittitur.

Causa.

Causa affectionis est triplex: aut nimia bilis
quantitas, quæ tota in vesica fellea recipi nō
potest, aut est impedimentum viarum, quæ reci-
piunt, vel deponunt bilem ad intestina, aut est ro-
bur facultatis expultricis.

Augetur Bilis v. lra modū vel ex causa inter-
na, vel ex causa externa. Ex interna calore ingē-
ti Hepatis siue cum febre, siue citra febrem ima-
gna tamen ex parte est cum febre, & ea quidem
valida.

Externa causa sunt medicamenta, aut morsus
venenati: Medicamenta quidem duplicem ob
causam bilem augent, vel quia cum sint calida,
iecur calefaciunt, vel quia cum habeant vim ex-
purgandi bilem, non possunt illam expurgare, in
quo casu, ut docet Galen. 8. simpl. 16. medicamē-
tum transmutatur in bilem.

Morsus venenatus id ipsum facit, quando vene-
num sit calidum, ut morsus viperæ, quem facere
Icteriā docet Gal. 5. de loc. aff. 7.

Impedimentum varium vel sit ex obstructio-
ne, vel ex compressione, vel subsidencia, vel con-
niuentia, vel ex adstrictione.

Et obstructio sit à crassis, lentis, & pituitosis
humoribus: quandoque à calculis quos plerunq;
inuentos esse in vesica fellea Ictericorum, docuit
multorum sectio, & huius meminit Antonius
Beniuen. de admirand. c. 3. Cæli. Rhodig. lib. 4.
c. 17. Cardanus 8. de variet. 44. Interdum sit
hæc obstructio à verminibus, qui possunt ex inte-
stinis in ipsum portum felleum se insinuare.

Flarus etiam interdum distendens intestina
meatum occludit. Compressio sit à tumoribus, si-
ue sint inflammationes, siue tumores duri. Et de
inflammationibus satis dictum est.

DE SCIRRHO IECORIS;

Tumores autem Duri, qui Scirrhi vocantur,
aut sunt Exquisiti, aut Spuri. Exquisiti qui
dem sine sensu, spurii verò cum aliquo sensu &
dolore.

Fiunt omnes ex vna ex tribus causis simplici-
bus, vel ex his complicatis. Simples causas
N 2 sunt

Morsus
Viperæ
Icteriā
facit.

sunt exsiccatio, impletio, congelatio; sed congelatio in internis partibus locum non habet. In iecore locum habent impletio, & exsiccatio. Impletio sola in Scirrhis, qui sunt vel ex humore pituitoso, crasso, viscido, & lento, aut ex melancholico, vel ex his commistis, Siccatio sola locum non habet, sed mistam cum impletione.

Ei sunt autem Scirrhi ex siccitate & impletione post Inflammationes, siue adnotia sint medicamenta nimium digerentia, calida, sicca, aut nimium adstrictoria, quæ partes tenuiores exprimunt, relinquuntque partes crassas.

De alijs Ictericis causis.

Fit subsistentia in poris fellis, cum atrophiam patiuntur, sicut fit coniuventia, si præcesserit vlcus; Partes enim vlcera, dum se ipsa tangunt, coalescere consueverunt. Denique adstrictio fit vel ab assumptis, vel admotis frigidis, & stipitibus, ut sunt mespila, sorba, cydonia, granata, & alia id genus.

Fit etiam Ictericia ob robur facultatis expultricis, transmittentis bilem à profundis ad extimas partes,

De Impropijs Ictericis Speciebus.

EX his, quæ dicta sunt de Propria seu Flava Ictericia, potest colligi causa, & locus affectus Nigri & Viridis Icteri:

Causa: Fit enim Niger ex melancholia: Viridis autem ex viridi humore, qui dupliciter generatur, vel ex mixture bilis flauæ cum melancholia, vel ex aduersione bilis flauæ.

Locus affectus in Ictero Nigro, aut est Liens, qui non recipit melancholiam, vel ad ventriculū non transmittit, aut est Iecoris calor exustus, vel obstructio partis sinistæ, & mesenterij, per quas partes melancholia ad lienem non transmutatur.

Signa.

Ictericia est notissima; nec minus facile est species distinguere ex colore Flavo, Nigro, & Viridi.

Distinguendæ sunt causæ, & loci affecti.

Si igitur fiat Icterus ex nimia iecoris caliditate, cognoscitur, quia non modò cutis, & vrina bile inficiuntur, sed etiam intestina, & ventriculus bilioso abundant succo, id quod in obstructione compressione, & alijs causis impediens non contingit, in quibus alui excrementa cinerea, vel albicantia semper sunt. Propterea canina vocantur, quòd emulentur sterco canis comedentis ossa. Accedit, quòd in Ictericia ex nimia iecoris caliditate, adest febris maxima, insignis inappetentia, nausea, oris amaritudo, vomitus, & biliosa deiectio.

In impedimento facto propter obstructiones, aut nulla est febris, aut non vehemens; signa uero humores obstruentes sunt magna ex parte crassi, & frigidi, qui non facile putrescunt. vnde dicebat Galen 8 de comp. per loc. 6. materias obstruentes

A iecur in calidis citius quidē in frigidis serius putrescere. Cognoscitur etiam obstructio, quia paulatim fit Icterus, & sensim augetur, & non est insignis grauitatis sensus, neque dolor: Per quas conditiones partim distinguitur à flatu distendente, & a tumoribus comprimentibus; nam Icterus ex flatu fit subito, & subito etiam recedit. Distinguitur autem obstructio a tumoribus, quia tumor habet sensum grauitatis. De signis inflammationis nihil dico. Iam superius de his dictum.

Signa Scirrhi.

Signa Scirrhi præter pondus sunt hæc. Si fuerit Sin gibba, adest tussis sicca, difficilis spiratio, difficilis decubitus in latus oppositum, iuguli contractio, & nisi Hydrops accesserit (accedit autem ferè semper) ad manum patet, tumor rotundus, circumscriptus, durus, renitens, cum, vel sine sensu, prout exquisitus, vel spurius fuerit. In parte sima cognoscitur ex Flauo Chyloso, de quo supra.

C Materia Scirrhi faciliè colligitur ex temperamento, habitu corporis, ætate, sexu, vita ante acta, vel excrementis per aluum, & per vrinam deductis. Sed maximus erit Scirrhi argumentum diuturnus Icterus cum Cachexia & Hydrope.

Signa Adstrictionis, & relinquarum causarum.

Adstrictionem faciliè cognoscetis, si patienter in Ictericam incurrerint post usum adstringentium.

Subsidentia cognoscitur ex atrophia, coalitu vlcus præcedentis. Denique cognoscetur Ictericia ex robore facultatis expultricis facta, si habuerit conditiones expulsionis criticæ: hac conditiones expressisse videtur Hippoc. 4 aph. 64. vbi ait Ictericam in 7. vel 9. vel 11. vel 14. facta salutarem esse, nisi dextrum hypochondrium durum sit. Vnde in aph. 62. ait Ictericam ante septimam malam esse. Hæc Hipp. sententia sic absolute prolata veritatem non videtur habere, quod & ratione, & auctoritate confirmatur: Ratione quidem; nam si in tertianis febribus aliquando bilis ipsa vtiliter transmittitur in tertio, aut quinto die, cur etiam non poterit Icterus vtiliter fieri ante septimum? Igitur Auerr. 4. collig. 43. ex propria sententia, & Auenzoar. ait: In suis regionibus Ictericam ante septimam esse salutarem, quod videtur audire Nicol. Florent. serm. 5. tr. 6. c. 4. Et Brasauol. cum. 62. 4. part. aph. Imò idem Hippoc. 4. acut. 8. ait Ictericam ante septimam cum Rigore factam salutarem esse. Vt concilietur hæc contradictio nil melius facere potest, quam hæc additio Rigoris, scilicet facta ab Hippoc. loc. cit. nam vbi Ictericia fit cum Rigore, est argumentum bilis non admodum crassæ, nec alteri humori commiste, sed synceræ, tenuis, & velociter motæ. Dicebat. n. Galen. 2. de symp. caus. 2. Rigorem fieri ex tali bile tenui, & velociter mota: cum ergo talis fuerit, potest morbum solvere, quia potest esse concocta ante septimum

Sed

Excrementa alui idæ ricorum similia canum.

Hipp. cum Auerr. conciliatur.

Sed quoniam communiter bilis illa, quæ facit A
Ictericam, solet esse crassa, ut propter crassitiem
non possit extra cutem pelli, ut docuit Gale. 5. de
locis 7. in fine, & quatenus crassiuscula non po-
test concoqui ante septimum, ideo non est vilis;
sed illa, quæ Rigorem facit, tanquam tenuior,
vulter transmittitur.

Signa locorum affectionum.

Loci affecti in Ictericis sic distinguuntur: Cū
fuerit Niger Ictericus, si fiat vitio Lienis, Ictē-
rica est magis nigra, quam si fiat vitio Iecoris
tantum; Item Lien est humidus, vel obstructus. Si
sit Ictericus Viridis, distinguitur illa, quæ ex fer-
uore Iecoris, sit ab ea, quæ sequitur affectum &
Iecoris, & Lienis; quia si sit ex Iecore tantum, ad-
derunt signa febris Iecoris, & inflammationis
quando autem sit ex utroque membro, potest es-
se Ictericus sine febre; & in illa prior affectus est
acutus; in hac secunda chronicus. Prior Ictericus
est usque adeo lethalis, ut ad summum 14. inter-
ficere possit; Secunda verò concomitatur inter-
dum toto vitæ tempore; ut etiam insanabilis illa
est, quæ sit ex Scirrho consummato, quæ sequitur
lapidem in folliculo bilis contentum, quæ produ-
citur ex coalescentia, seu carne adnata, & ex fol-
liculi atrophia.

Quæ sit critico modo, salutaris est, & magnos
etiam morbos subleuat.

Questionis explicatio.

Vtrum autem salutaris sit tantum post septi-
mum, an etiam ante septimum, superius di-
ctum est. Dictum enim interdum ante septimum
salutarem esse posse, dummodo syncera fuerit bi-
lis, non autem puritatis mista, & cum vitium robo-
retur enim etiam ante septimum interdum vo-
mitu, & deiectione critico modo expellitur: Igitur
per modum crisis Auriginosum affectum ef-
ficere valet.

Obiectio.

Ne vos perturbet Galen. auctoritas 1. in 3. e-
pid. 1. Vbi ait, nullum abscessum, neque
etiam Auriginosum, ante concoctionem saluta-
rem esse.

Solutio.

Vera enim est hæc sententia de iis omnibus
affectibus, qui iudicantur per abscessus, vel
per excretionem abscessui similem. Abscessus enim
iudicant morbos longos, & ex frigidis humori-
bus factos: at Ictericus non debet propriè nomi-
nari inter abscessus.

Instantia.

Scio quidem posse aliquem cum Galeno dice-
re, ideo numerari inter abscessus, quia sit ex
bile crassa cum puritatis mista; si enim esset sine
crassa, excerneretur per cutis meatus, non autem
retineretur sub cute.

Responsio.

His enim respondeo, bilem retineri sub cute,
ut faciat Ictericam tres ob causas; vel ex
natura crassioris bilis ob puritatis missionem; vel
ex densitate cutis; vel ex infirmitate facultatis
expultricis. Si igitur fiat Ictericus ex materia crassi-
tate, vera est Hippoc. & Gal. sententia, ante septi-
mum malum esse, quia materia non potest con-
coqui ante septimum; sed si bilis sit syncera, re-
tineatur tamen ob cutis densitatem, vel quia fa-
cultas non possit illam in vaporem agere, tunc
sit Ictericus ante septimum salutaris, quia materia
potest esse concocta, licet expultrix facultas, vel
ob sui imbecillitatem, vel ob vias impeditas, non
possit illam per cutis meatus educere.

*Alia
Questio
declara-
tur.*

Alia Questio declaratur.

Scribit Hippoc. 5. aphor. vlt. Ictericos non esse
flatulentos.

Qui locus maximam variis intulit ambiguita-
tem: Ego propria experientia id testari possum,
me multos Colica vexatos ex flatu abundantia
vidisse factos Ictericos, & recedente Ictericis i-
terum laborasse Colica, ita ut Ictericus sanaret Coli-
cam, & hæc illam, idque vnicuique die. Obseruaui
enim in quibusdam patientibus, quibus dolores
Colici durarunt 10. vel 12. dies, Ictericus super-
uenisse. Post 3. aut 4. diem à Colica, & per illum
diem patientem fuisse leuatum, sequenti die re-
deuntibus doloribus, cessabat Auriginosus color,
& sic vicissim vidi factum in eodem agro ter, aut
quater. Ex quo inveni causam (ni fallor) quare
dixerit Hippoc. Ictericos non esse flatulentos; nam
si superueniente Ictericis cessabat dolor Colicus ex
flatu productus, igitur desinebat flatu; igitur ve-
ra Hippoc. sententia Ictericos non esse Flatulentos.
Querit aliquis, quæ sit causa, cur Ictericis non sint
flatulosi, aut cur Colica correpti euadant Ictericis
& statim liberentur. Ad primum respondeo, re-
quiri ad flatus generationem duplicem causam,
Materiam, & Efficientem. Materia est puritatis, aut
melancholia. Efficiens est calor modò modera-
tus, modò immodicus; tunc enim immodicus
calor flatum generat, cum multa suppetit puri-
tosa materia. Hinc dicebat Gale. 1. 2. meth. 8.
in Doloribus Colicis remedia calida, si inueniant
multam materiam, flatum & dolorem augere.
Bilis igitur si ad intestina mittatur, suo calore co-
piosum eleuat flatum, si retineatur in Iecore, nul-
lam; hinc superuenit Ictericus, & desinit Dolor
Colicus.

Si queratur: Cur retinetur hæc bilis in Iecore,
ubi adest Colica ex flatu,

Respondeo: Vbi dolor Colicus est vehemens,
distenditur non tantum colon, sed etiam duo-
denum: at in duodeno est matris bilem ad inte-
stina deferens; ubi distenditur intestinum, meatus
occluditur, sicut etiam distenta vesica urinaria,
occluditur vesicæ meatus, quo occluso succedit
Ictericus. Hoc succedente non fluit bilis, non ge-
neratur nouus flatu, prior digeritur, & sic dolo-
res leuantur. Interim duodenum intestinum

subsidet, quia non amplius distenditur: hinc de A
nuo bilis transmittitur, & sic cessat Ictericus, &
denuo succedit Colices.

Curatio Icteri.

Ictericæ curatio distinguenda est in duas par-
tes: in prima de Ictero Symptomatico in se-
cunda de Critico agendum est. In Symptomatico
tria sunt agenda: primo superandi sunt morbi,
ex quibus fit Icterus: secundo expurgandi humo-
res illorum morborum causæ: tertio educendus B
humor in cutem diffusus, Icterus faciens.

Curationis exordium a causis sumendum, in
qua parte moneo, ne quosdā Recentiores audia-
tis, inter quos est Rondelet, qui in omni Ictericæ
respicit unicum humorem biliosum, licet loquatur
de curatione affectus, & causæ facientis Icte-
rum. Non placet hoc consilium, quia si Icterus fiat
ex nimia iccoris caliditate, laudo quidem, ut om-
nia medicamenta unicam bilem respiciant: idip-
sum quoque agendum si Icterus sequatur inflam-
mationem, sed cum Obstructi, vel Scirrhus non C
exquisitus sit in causâ Ictericæ, ante omnia cras-
sus ille humor purgandus, qui obstructionem,
vel tumorem facit. Hanc esse Galeni sententiâ
potestis colligere ex lib. de purg. medic. facult. &
melius lib. de natur. facult. cap. 13. ubi dicit, me-
dicamentum ad Ictericos purgans bilem non de-
bere exhiberi ante purgationem illorum humo-
rum obstructionem facientium, & propterea an-
te omnia vitandum esse abstergentibus, inciden-
tibus, attenuantibus, ut viæ aperiantur. Igitur in
præsenti casu dum materia sit crassa, vitandum D
vomitorijs, nec iis leuibus quidem. Licet enim
ascendere ad florem genistæ, ad succum rapha-
dis, ad puluerem radicis asari, cum oxymelle, & iure:

Clystere etiâ sint fortes, qui recipiant aut hie-
ram vel simplicem, vel diacoloquintidos, mel, ro-
sat. & decoctiones detergentes ex utraq; Aristolochia,
Centaurio, semine cartami, atque alijs, de
quibus dicendum in tractatu de Colica.

Medicamentum etiâ sit phlegmagogum,
sed ut supra dictum est, paulatim & sensim, do-
nec obstructiones superentur. Et quod alias dixi E
icterus dico, vicissim sunt præbenda purgantia,
& lenientia.

Inter illa, quæ valenter deobstruunt, omnes Scri-
ptores laudant aquam destillatam ex raphano.
Potens quidem est hæc aqua, sed maximè vidi
experimentum in ipso succo, quem Ictericus qui
dem iam factus hydropicus accipiebat ad vnciâ
singulo mane, & sanatus est ab Ictericâ antiquis-
sima, & contumacissima; cui succo si admisceatur
vnciâ oxymel vel simpl. vel compositus, aut scyllit.
erit fortius. Laudatur secundo loco pulvis Erina F
cii terrestris, cuius meminit Gal. 1. 1. simpl. Da-
tur drach. i. vel ii. in aq. stillat. aut cuscute, aut car-
dii benedicti, aut menthastri, aut chelidonis,
quam aliqui ceteris præstantiorem putant. Hol-
lerius ait, se maximum vidisse experimentum in
pulvere lumbricor. terrestr. cuius supra memini.
Datur etiâ drach. i. vel drach. ii. Fortissimè etiâ
sunt pilulæ de bellio, vel de opopanace intelligo
simplices, v. g.

Recipe opopon. aut bdell. scrup. ij.

Fiant pil. & dentia cum aq. stillat. dicta. vel
raph. vel chelidon.

Si velis componere has pilulas, erunt fortiores.

Recipe myrrh. Opop. Bdell. an. drach. i.

*Limatur. chalyb. præp. cum acet. drach. i. s.
spic. Cal. arom.*

Radic. Ireos an. drach. ij.

Puluerizentur & cum succ. raph. s. massa pil.
Dosis scrup. i. vel drach. i.

Verfabat in curanda Ictericâ ex Obstructio-
ne, & hætenus dictum de auxilijs pharmaceuti-
cis tamen purgantibus, quàm aperientibus in-
ternis. Nunc pauca quædam supersunt de exter-
nis; phura autem de phlebotomia.

Quod autem ad Externa remedia spectat, ea
conueniunt, quorum facta est mentio de Fluxu
hepatico, siue sint fomenta, seu emplastra, seu o-
lea, seu cerata.

De sanguinis missione in Ictero ex obstructione.

Quod pertinet ad sanguinis missionem, licet
videam hoc tempore in omni Ictero venæ
sectionem probari, hoc tamen præceptum nun-
quam inuenio à Galeno relictum fuisse. Liber e-
nim de Ictero Gal. inscriptus, in quo venæ sectio
probat, spurius est, nec albi (quod sciam) pro-
curando Ictero phlebotomiæ meminit, sed purga-
tionis tantum, ut patet primo de natur. facult. c.
13. & lib. de purg. medic. facult. Accedit, quod
cum idem Galenus 4. de tuend. valet. 4. genera-
lia dederit præcepta; in cacochymia sanguinem
non esse mittendum. Icterus sanè insignem vide-
tur præ se ferre cacochymiam: Adde, quod si I-
cterus fiat vel ex obstructione crassorum, lento-
rum, ac viscidorum humorum, vel à Scirrho co-
mpimente, vel à coalescentia, coniuuentia, aut lapi-
de Vesicæ Fellea contento, nunquam phlebotomi-
a curabitur.

Scio obstructiones, quæ ex sanguinis copia fi-
unt, phlebotomiâ superari; sed obstructio crasso-
rum humorum nunquam secta vena curari po-
test. Ad hanc respiciens Gal. 2. meth. 14. dicit. Ve-
næ sectionem nec putredinem, nec obstructionem
sanare. Cum igitur ita res sit, non sunt vulgares
medici imitandi, ut quibuscumque Ictericis statim
phlebotomia administraretur, sed diligenter mor-
bus, & causâ contemplanda. Causâ quidem;
nam si multus, & crassus sanguis abundet, qui vel
obstructionem augere potest, vel calidam iccoris
intemperiem, aut inflammationem facere, vel
augere, statim aperiatur vena semel, bisue. Si vi-
res non sustineant sectionem venæ maioris, aperi-
tur saluatella, vel hæmorrhoides. Quod verò ad
affectum spectat, si sit calida iccoris intemperies
inflammationis initium, hanc etiâ ob causam
statim aperiatur vena.

At si non adsit plenitudo, nec legitima, nec
spuria, & morbus ipse sit vel Obstructio ex cras-
sis humoribus, vel à Scirrho compressio, vel Coa-
litus, aut Coniuuentis, aut lapis, abstinendum à
venæ sectione,

Non improbo hac in parte quorundam consilium, qui in obstructione crassorum humorum laudant phlebotomiam, ubi iam lenti, & crassi humores attenuati, & deterfi fuerint: igitur potius in morbi progressu, quam in principio.

Quod si Icterus factus sit ex remediis, aut alimentis adstrictorij, & purgatio & phlebotomia erit superflua. Aperientia sunt suspecta. Tota curatio, vno verbo, consistit in pinguibus & dulcibus.

Dubium.

Videtur hæc curandi ratio valde contraria esse ipsi Ictericæ, quæ maxima ex parte attenuantibus, & incidentibus indiget. Pinguis vero & dulcia potius incrassant & obstruunt.

Solutio.

Est tamen hoc Galeni consilium r. de tuend. san. 14. Et rationi consonum est; nam quæ adstricta sunt à frigidis, siccis, & stipicis, dilatantur calidis humidis; atq; emplasticis, quali sunt dulcia, & pingua; igitur in hoc casu nihil aliud agendum, quam præbere summo mane aut ius pingue, aut cum butyro, in quo malua & althæa coquantur, addita modica spica pro conservando iecoris calore, & portione sacchari.

Ad proportionem cibi omnes respondeant.

Quod si facta sit Ictericia ex Coniuentia, ob siccitatem caliditatis coniunctam, eū eodem Gal. loc. cit. vitendum frigidis & humidis, qualia proposita sunt pro intemperie calida sicca iecoris, serum caprinum cum emul. sem. frigidorum, lac asinum &c.

Quod si ad huius suspicio Coalescentiæ ex carne adnata, insanabilis putatur affectus: si tamen recens fuerit, interdum superatæ frequentij vsu succi limonum, addito pulvere totius cerui.

Si fuerit Lapis in vesica fella, est etiam insanabilis nil tamen oberis, experiri aliquam ex illis aquis, aut succis, vel aliis medicamentis, quæ putantur lapidem frangere posse. Si enim frangunt lapidem renum, etiam vesicæ fellæ calculum infringent.

Quod si calida iecoris intemperies fuerit Ictericæ causa, hæc erit alteranda, vt supra dictum est, siue cum, siue citra inflammationem. Hoc tantum moneo, non esse accipiendum illorum consilium, qui exterioribus remediis actu frigidis & adstrictorij vtuntur supra iecur; nam impediunt transitum bilis à iecore ad totum corpus, sicque erysipelaceum affectum pro intemperie excitabunt.

Quod si bilis augeatur propter qualitatem venenatam, sine morbo institutum sit venenum, siue intrinsicus assumptum, curandi ratio in alexipharmacis posita est: Ita tamen, vt si assumptum fuerit venenum, vomitu statim deiciatur multo oleo exhibito, vel communi, vel amygd. dulc. ad vnc. viii. vel x. deinde statim præbeat Theriacum, & alias antidoto; nam & Galen. 5. de loc. aff. 7. serum Imperatoris curauit Ictericum propter viperæ morsum exhibita Theriaca. Consulo

Autem, vt temperetur medicamentum conferua rosarum, vel violarum, aut superbibatur serum caprinum, vel aqua stillantia frigida. Quidam laudant admisionem succorum adstringentium. Theriaca, aut succum granat. vel berberis, vel rhibes: sed hæc adstrictoria non laudantur; prohibent enim, quo minus alexipharmacum in totum corpus distribuatur.

Superatis igitur iecoris morbis, tunc accedendum ad vitularum cuti colorem superandum, quod sit medicamento aut cholagogo, aut externis remediis sensibilibus & insensibilibus vacuantibus. Quod spectat ad remedium purgans, modo vires consent, potest eligi validum; sic enim dicebat Gal. lib. de purg. med. facult. & 1. de nat. fac. 13. Superatis morbis Iecoris, vnicō remedio Ictericam sanari posse. Igitur aut deus hoc medicamentum.

Recipe elect. de succo ros. drach. iij.

Diacathol. vnc. i.

M. f. boli.

Aut si potionem malit:

Recipe rhubarb. elect. drach. i. sem.

C Infundantur in ser. capr. aut aqu. cuscute. Facta expressione, adde

syr. ros. sol. vnc. iij.

Elect. de suc. ros. drach. i. f. M.

Exteriora auxilia, quæ sensibilibus vacuant, sunt aut cucurbitulæ, aut cornicula scarificata, aut sudatoria, siue humida, siue sicca. Laudo tamen humida; maxime balnea deterforia. Immergatur corpus in balneum alteratum lupinis, hordeo, furfuribus, lapathio, eruo, amygd. amaris, malua, chamomelo, anetho, & ex his confricetur cuti. Laxant enim poros, detergunt, & cutim mundificant.

Idem faciunt insensibilibus frictione asperz, Inunctiones ex oleo chamomel. anethino, admixto salis modico. Et pro capite & oculis conueniunt masticeæ, sectio venæ sub lingua, & faciei lotiones ex aqua, & aceto, in quibus prædicta sibi ebullierint.

Putant aliqui superari Icterus sola inspectione Regiæ Auis, Charadrius dicte. Alii etiam referunt se vidisse vnica die sanatam Ictericam appposito iecori eo pisce viuo, quem omnes ferè Nationes Tincam vocant.

DE CACHEXIA, ET HYDROPE.

Cap. XXVII.

Inter Ictericam & Hydropem medius est qui dam affectus, quem Græci *Καχξία* vocant, Latini Malum Corporis Habitum, cuius causas & curatione iam non propono, quia coincidunt cum Hydropis curatione & causis; nil enim aliud est Cachexia, quam Hydropis initium, & propterea, quatenus est initium Hydropis, est tumor quandoque totius corporis, sed minor, quam in Anasarea; interdum est tumor pedum, & faciei tantum, vt in Ascite, & Tympanitide, inchoantibus. Habet tamen Cachexia præter tumorem etiam vitiatum cutis colorem diuersum pro diuersitate Ictericæ. Datur enim cum colore albo, cuius meminit Galen. 1. de alimen. facult. 8

Datur etiam Cachexia cum colore flauo, viridi, A
liuido, & nigro, vt docuimus in cap. de Ictero. Sed
præter colorem, & tumorem habet Cachexia alios
quoque affectus cutaneos, & externos, vt impetigi-
nem, antiquam scabiem, vlcera phagedenica, præ-
cipuè in crucib. aut crustosa, venas varicosa, gingi-
uas corruptas, malicq; olentes, & corruptum san-
guinem, & ichorem cructantes, vt ideo Cachexia
cum liuido, ac nigro colore, & prædictis affectibus
minimo illum imitetur affectum, quem Baldui-
Konseius, & Ioan. Gell. & Salomon Albertus de-
scripserunt sub nomine Scorbuti, quem referunt B
ad magnos Hippocratis Lienes, de quibus memi-
nit 2. de morbis.

Causæ.

Causæ, vt dixi, cuiuscunque Cachexia sunt cõ-
munes Ictetis, & Hydropi. Igitur cum de
Ictetia satis dictum sit, ad Hydropem descen-
damus.

De Hydropis Ascite Exquisita.

Hydrops aut Propriè, aut Impropiè sumitur
Propriè est tumor ventris inferioris ex hu-
more seroso, genitus ob Iecoris refrigerationem.
Dixi hæc esse propriam Hydropem, cum Hydrops
ab aqua denominationem sumat. Igitur ille tan-
tū erit Hydrops proprius, in quo colligitur, aqua
ad Tympanitidis differentiā, in qua colligitur fla-
rus, & Anasarca, in qua totum corpus intumescit
ex pituita. Colligitur id ex Gal. lib. de atr. bil. c. vi.
& 4. aph. 1. qui Tympanitidem ait, ob tumoris
similitudinem, quam cum Ascite habet vocari
Hydropem, cum tamè proprius Hydrops sit aque
collectio. Ceterum dicta definitio non modò ex-
plicat præcipuum Hydropem, sed etiā præcipuū,
qui has tres præcipuas cõditiones continet. Prima
vt materia tumorem faciliè sit simplex aqua. 2. vt
locus, in quo cõtinetur, sit inane spatium illud in-
ter intestina, & peritonæum. 3. vt hæc aqua gene-
retur in Iecore vel primariò, vel secundariò refri-
geratio. Si igitur detur Hydrops aliam materiam
continens, vel sit in alio loco, vel sine refrigeratio
ne Iecoris fiat, erit impropius & spurius. Refri-
geratio autem Iecoris cū vel primariò, vel secundariò
fiat, si fiat primariò, quatuor modis contingit,
1. vel à frigore positivo, siue sit aque potus, aut
niuis, vsus olerum, & fructuum frigidorum, fre-
quens vsus opiatorum remediorum, siue frigidi-
tas extrinsecus accesserit ex aqua, aere, aut niue,
aut fomento frigido Iecori adhibito. 2. vel ex suf-
focatione: hanc Hydropis speciem significauit
Hipp. quando 6. aph. 12. scripsit Diuturnas curati
hæmorrhoidas, nisi vna quæpiam seruetur peri- F
culum aquæ inter cutem, vel tabes impendet. Me-
minit etiam Gal. partim in eodem com. partim 2
de nat. fac. 7. vbi docet, ex suppressis hæmorrhoi-
dibus, ac mensibus suffocato calore Hydropem sub-
sequi. 3. vel refrigerato calore propter alterius
caloris præsentiam nauuam humiditatem ablu-
mentis, sicut inflammatione Iecoris in ardentis-
sime, & malignis febribus contingit. Huius me-

minit Hipp. 1. prog. 11. & 12. Gal. in commento.
Ibi enim fit sermo Hydropicorum ex morbo a-
cuto, & Iecoris inflammatione. 4. vel sit ex refri-
geratione, post immodicas vacuationes vel san-
guinis, vel alterius generis Gal. 2. de nat. fac. 8.
Hipp. 4. in 6. Epid. 1. dum ait, post sanguinis ex-
citationes Aquam inter cutem succedere. Fiunt
hæc omnia refrigerato Iecore primariò.

Secundariò verò refrigeratur, cum aut Pulmo-
nes refrigerati sunt, & Hydropem patiuntur. Da-
tur enim Hydrops Pulmonis, vt dictum est. Indu-
citur etiam frigiditas refrigerato Ventriculo, In-
testinis, Mesenterio, & Liene. Vnde Lien refrige-
ratus & Scirrhus, etiam si propria ratione citra
Iecoris vitium non faciat Hydropem, vt docet
Gal. 4. de præfag. ex puls. c. 9. tamen communica-
ta Iecori affectione succedit Hydrops ipsi Lienis
Scirrhus, vt Gal. ait 6. de loc. aff. 1. Vide Gal. 3. de
caus. symp. 1 & 5. de loc. af. 7. & 4. acut. com. 111
Et si quis ambigit de illa Hydropis specie, quæ sit
ex morbis acutis, legat Auicem. 1. 3. trac. 4. c. 13
Auer. 3. collig. c. 21. & Cardan. com. ad 2. progn.
sup. 12 & 3. tex. Al. Trall. lib. 9. ca. 3. Nicol. Flor.
Sermion. 5. tr. 4. c. 25.

Si quis querat modum, quo colligitur hæc A-
qua, breuiter dico: In Hydropis legitimo colligi-
tur per transudationem; quando enim sero sa
humiditas copiosa in Iecore genita peruenit ad
gibbam Iecoris, antequam ingrediatur emulge-
tem, vaporis modo transudat extra Iecoris mē-
branam, sicq; in Abdomen secedit.

De Hydropis Ascite Spurio.

Spurius Hydrops tripliciter dicitur: ratione
Materiæ, Loci, & Causæ: ratione Materiæ,
quia interdum simul cū Aqua adest etiam Flatus
& hoc fit plerumq; secundo, quia interdum in ea
parte continetur Pus propter magnum aliquem
abcessum: interdum fit ex Sanguine, & est calus
rarior. Hoc fit disrupto aliquo magno vase, in par-
te gibba Iecoris, vt docet Columbus lib. 1. 5. con-
firmat Vesal. lib. 5. c. 9. Deniq; sit Hydrops Spuri-
us ex humorum colliquatione, cum scilicet per
febres ardentes colliquantur, & serosiores, & hu-
mores, qui in venis sunt, in Abdominis capacita-
tem secedunt. Hæc Colliquatio interdum facit
Fluxū alui, de quo dixi; interdum copiosos vrine
fluores; interdum tendit in hanc capacitatem, &
sit Hydrops mistus ex seroso humore, ex pingue
dine, & aliis colliquatis humoribus. Huius Hy-
dropis meminit Galenus 3. de caus. sym. cap. 2,
in fi.

Spurium Hydropem ratione loci factum du-
pliciter intelligo; aut enim Spurius est quia
fiat Aquæ congregatio in aliis locis, quàm in Ab-
dominis capacitate, vt in Capite, vbi sit Hydro-
cephalus, aut in Pulmonibus, vel Vtero, vel Scro-
to: interdum in aliis determinatis locis: vn-
de Mont. conf. 163, viderit Hydropem in Bra-
chio, & Gutturæ. Alter Hydrops Spurius ratione
loci est is, in quo materia Aquosa continetur in
Abdo-
nis.

Abdominis capacitatem, sed vesicis quibusdam includitur, quas Graeci *σάκκας* vocant. Harum meminit Galen. comm. 5. 5. 7. aphor. earumdem meminit Aretæus 2. de caus. & signis diuturnorum. Fernel. 6. path. 3. Cordus com. 5. ad i Hipp. de morb. mul. Atq; sectione corporum, & propria inspectione hoc observavit Vesal. lib. 5. cap. 9. in muliere Augustana. Tertio datur Hydrops Spurius, quia Aqua colligitur absque refrigeratione Iecoris.

Causæ autem sunt quatuor: Primo quia immodicè augetur serum in corpore, vel ex nimio potu, vel ex usu olerum, & fructuum frigidorum. Secundo, quia serosa humiditas non potest transmitti ad renes, non transmittitur autem, vel quia pars Iecoris gibba sit impedita, aut à Scirrhuso tumore, aut insignis obstructione, vel aliquo lapide circa initium venarum emulgentium con- crescente: aliquando autem non transmittitur, quia Iecoris membrana vel disrupta est, vel rimis featet, per quas ichor facile in capacitatem Abdominis transit: Fit ruptura ex ulcere: Rimæ verò ex ingenti siccitate: Interdum & vena disrupta non bene coalescens præbet hunc ichori adiuturum, quas causas novit Fernel. loc. cit. qui in hoc tantum est damnandus, quod putavit vel omnem Hydropem, vel saltem plures hoc modo fieri disrupta scilicet membrana, aut rimosa existente, vel vasculo imbecilli, cum tamen rariores sint hæ causæ & omnium frequentissime colligantur Aquæ per transsudationem.

Itaque neque illos audio, qui dicunt, transfundi Aquam ruptis vasibus umbilicalibus: nam, ut optime docet Andreas Laurent. lib. 1. c. 8. experientia comprobatum est, sectis, aut ruptis vasibus umbilicalibus, quæ & Iecur & vesicam suspendunt, cō- cidere has partes, & mortem statim subsequi. Tertio colligitur etiam Aqua sine refrigeratione Renibus serum non recipientibus, vel quia nō attrahunt, vel quia Obstructi, aut Scirrhusi, aut Calculo affecti sint. Interdum potest etiam fieri Hydrops non transmissio sero ad venas, & ambitum corporis. Hactenus de omni differentia, & specis Hydrops Ascitis.

De Tympanide

Defini- tio. Tympanites autem est etiam tumor ventris inferioris ex Flatu, si de Legitimo Hydrope sit sermo. Nam Spurius Tympanites simul cū Flatus Aquam habet admistam. Hic Flatus in Exquisito Hydrope continetur in Abdomine, & generatur ex caloris imbecillitate Iecoris, & Vetriculi. Tympanites Spurius datur, in quo omnino Intestina Flatu extenduntur, nil humoris continentia propter Vermium copiam, qui surripiunt alimentum. Hunc Hydropem observavi in Nobili Patavino decem annorum, qui statim mortuus est cum tumore ventris Tympanitidem æmulante, & secto corpore omnia intestina Flatu erant plena citra vlla excrementa: In Ventriculo autem 33, vermes conspecti sunt, & multi sequipedales.

Signa Ascitis Exquisitis.

H ydrops Ascites facile cognoscitur ex Ventris Tumore cum fluctuatione, insigni gravitate, cū crurum & pedum œdematolo tumore.

Si fiat ex causis refrigerantibus, aut nulla, aut modica est sitis, adest cibi appetentia, carè febre, urinx crudæ sunt, propensique sunt ad somnum. Sit refrigeratio sit ex suffocatione, retenti sunt menses, aut hæmorrhoides, & alix id genus excretion- nes; & sicut ex refrigeratione positiua sensim fit Hydrops, sic suffocatione subito fit, ut ex Inflammatione: sed in Inflammatione adest febris acuta, & alia à nobis proposita signa, cum ageremus de Iecoris Inflammatio. Quæ etiam proponuntur à Gal. tanquam Hipp. interpreti 2. progn. 2. c. 3. Vbi proponit Hippocr. signa Hydrops ex Inflammationis partis Simæ Iecoris. In textu a tria propria Inflammationis partis Simæ Iecoris. In text. proponuntur signa Inflammationis partis Gibbæ Iecoris.

Quod si fiat ex Inanitione, præcesserunt causæ inanientes, immodici sanguinis fluores diuturni alui fluxus, vomitus &c. Corpus extenuatur, & fere tabidum redditur.

Signa Ascitis Spuriæ.

Q uod si Hydrops sit Spurius, & primo ratione materix, quia mista sit aqua cū flatu, minor est gravitas, & venter percussus fluctuat cum sonitu, crura intumescunt tumore melliores, quia pressus cedit, ac citò reuertitur. Si materia sit putulenta præcesserunt signa inflammationis, quæ transierit in abscessum. Si fuerit sanguinea, nulum habeo eidentius signum, quàm quod proposui in enarratione historix præcedenti lectione, quod scilicet momento temporis corpus plenum sanguine, & sine vilo ventris tumore, in hydropem incidat exinanitis venis, corpore tabefacto. Si fiat ex colliquatione materix congregatio, præ- cessit febris maligna sine fluxu colliquatio, & sine urinis crassis, & copiosis, factusq; est hic quoque Hydrops momento temporis. Gal. 3. de caus. sympt. 2. Cognoscetis autem contineri materiam in capacitatem Abdominis, sed Vesicis inclusam ad differentiam illius, quæ nō habet Vesicas, duobus signis: Vbi adsunt Vesicæ, Tumores sunt inæquales, etenim Vesicæ sunt multe, neq; omnes eiusdem magnitudinis. 1. Vbi adsint Vesicæ, si Hydropici stent, inferior abdominis pars prope pubem non admodum intumescit, imò magis intumescit superior: si Aqua si extra Vesicas, Tumor est æqualis, & si stent patientes, pondus augetur in infernis Abdominis partibus.

Spurius Hydrops ratione causarum sic cognoscitur: Si factus sit ex nimio potu, vel usu fructuum, & olerum, facile ex relatione hoc poterit comparari: Si retineatur serum ex scirrhuso, aut obstructione Iecoris ante hydropem, aderunt signa obstructionis, & scirrhi, de quo suo loco: & in ipso Hydrope adest tussis sicca, & difficilis spiratio, comprimente tumore septum transversum & pulmones. Si rupta sit Iecoris membrana, præcessit ab-

fit abſceſſus vel vlcus. Si ad ſint rimæ, præceſſerūt A
cauſæ exſiccantes ipſum Iecur, inflammationes
et yſipelata, febres ardentes Pariter ſi aliquod vas
ſit ruſum, vel umbecillum, præceſſit vel vomitus,
vel deiectio cœcæ: Si Renes ſint in cauſſa, co-
gnoſcetur, quia vel ſuppreſſa, vel magna ex parte
impedita eſt miſtio, veſica tamen tumida non e-
xiſtente. Quodd ſi vitio totius corporis id fiat, vel
denſatum, vel adſtriſtum eſt vniuerſum corpus
à cauſſa frigida, vel medicamento adſtriſtorio.

Signa Tympanitidis.

Tympanites facile cognoscitur, quia percussus venter resonat in modum typani, pedes intumescunt, sed flatuoso, tumore, qui pressus cedit, sed foueam non relinquit. Sunt præterea hi melius colorati, non febricitant, palpitaciones patiuntur, ruginisque, & extensiones validas.

Prognostica singulorum.

Est omnis Hydrops periculosus, sed Tympanites in hoc tantum creditur periculosior Ascite, quia non curatur se Sectione: In reliquis Ascites multo periculosior est: imò verò qui fit ex Scirrho confirmato ex membrana iecoris disrupta, aut lapide impediēte transitum feri ad renes, est prorsus insanabilis. Periculosus est Hydrops, cui superuenit Tussis, ut docuit 6. aph. 35. & 7. aph. 49. quia communicatur Aqua Pulmonibus aut quia propter augmentum Iecoris tumorem pulmones comprimuntur. Fluxus tamen alui Hydropicis superueniens salutem afferre consuevit, si credimus Hipp. 6. aph. 14. Dico, si Hipp: credimus, quia nō omnis Fluxus Hydropicis superueniens est utilis, sed aqueus tantum; nam si fiat fluxus vel biliosus, vel chylosus, argumentum est obstructionis, & imbecillitatis Iecoris.

Curatio Ascitis Legitimi.

Versabor in praesentia in curando Ascite Legi-
gimus, qui scilicet ex Aqueo humore produci-
tur: nam de Purulento haecenus dictum est oc-
casione curationis abscessuum. De Sanguineo ni-
hil est dicendum tanquam deplorato affectu. Le-
gitimus itaque Ascites duo requirit auxiliorum ge-
nera: quidam Aqueum humorem educunt; alii
morbos sanant: dicendum primum de evacuanti-
bus Aquam: haec sunt Chirurgica, vel Pharma-
ceutica.

Et Chirurgica quidem sunt aut Scarificatio,
aut Veficatorium, aut Setaceum, aut Cauterium,
aut Paracenteſis.

Scarifica
tions.

Scarificatio quidem ex sententia Asclepiadis
proponitur tantum circa furas prope malleolos :
iubet tamen vt profundæ sint, sicut & venæ sectio
vt commodè vniuersa Aqua sensim euacuari pos
sit. Quòd si propter nimiam profunditatem ni
mis copiosè Aqua educatur, tunc vulnuscule li
nimento aliquò obturanda, & bis in die aperien
da. Ceterum Leonides, referente Aetio, concurs
um Hippocreat Scarificationes non modò cir

ca furas, sed etiam circa femora, & scrotum, & brachia. Alex. Ben. lib. 15. de curand. morbis, cui alij quoque adherent, laudat has Scarificationes supra ventrem sub umbilico in eodem loco, in quo fit Paracentesis. Multiplici experimento comprobatum est Scarificationes istas mitigare

Eadem est ratio Vesicantium, & Cauteriorum. Vbi enim tumor cedematosus non sit magnus, & calor innatus validus, valde profunt & Vesicantia, & Cauteria cruribus & coxis adhibita, sed in infirmitate caloris hæc quoque transeunt in gangrenam.

Quod pertinet ad Setaceum, infigi solet Seta-
cium in Scroto, quando Aqua fuerit repletum. *Setaceū.*
Sic enim paulatim tota Aqua educitur.

Idem dico de Paracenticis, quæ potest fieri in
tribus locis: In Scroto, quando fuerit tumidum. *Paracen-*
In Umbilico, quando promineat: Prominet autē *tesis.*
aliquando, ut non modò secari in extremitate, sed
etiam facilius ligari possint, ut expediissima
sit hæc sectio, & via ducendi aquam in Hydro-
pici, quando adsit Umbilici dilatio. Tertius
locus est sub Umbilico per quatuor digitorum
regionem musculorum rectorum.

Disputarunt antiqui, ut potestis legere apud
Cælium Aurelium, 3. pass. card. c. 8. Virum debe
ret fieri hæc Sectio. Rationes hinc inde multas
debent. *An fieri*
sunt, sed pro parte negativa, cui adhibebat Euse
bius, & Tettalus, infirmæ admodum sunt, facile
solui possunt. Soluuntur autem, si in Sectione
illæ sentiantur conditiones, quas assabre descrip
sit Ambrosius. Paræus lib. 7. sui mag. operis. acp.
12.

Prima est: ut non Secentur deplorati, ac uè fe-
bricitantes, valde imbecillies, Scirrhus lecoris ex-
quisito tentari. Si non sunt secandi. *Conditio-
nes seruã
da in Pa-
racent.*
Præterea, dum fit Sectio, debet fieri ex opposi-

Præterea, dum fit Sectio, debet fieri ex opposito partis magis affectæ: Si Iecur sit magis affectum, fiat Sectio in parte sinistra: Si Lien primò affectus fuerit, magis secetur pars dextra.

Aquam neque totam simul, neque maxima
copia euacuabimus; nam vt dicebat Hipp. 6. a-
ph. 27. Qui vryntur, aut Aquam inter curem &c.
Cuius rei experimenta habentur apud Brasauel.
in comm. huius loci, apud Arnaldum Villanouā.
3. Breuiat. c. 30.

Cetera attinentia ad hunc modum incidendi
legatis apud Parzum.

Educitur autem Aqua pharmaceuticis auxilijs sensibilibus, & insensibilibus. Sensibilibus aliquando per Vomitus, frequentius per Aluum, nonnunquam per Urinas.

De Vomitu exstant aliquot exempla, præsertim Vomitus
ap. Forest. lib. 1. g. obser. 29. cuiusdam Hydropici,
qui mari iter faciens, superueniente vomitu, sana-
tus est. Actius quoque procurando Hydropes Vos-
mitoria,

mitoria propolui. Mihi profectò sunt aliquo modo suspecta validiora Vomitoria: Primò, quia si Vomitus ex voto non succedat, posset disrumpi peritonæum: Posset quoque impetus Aquæ superiores partes petenus suffocationem inferre. Nā in Hydropicis, ubi est ingens Aquæ copia, pulmones & septimum transversum usque adeo angustantur, & ad superiora ita comprimuntur, ut nullus amplius videatur thoracis locus.

Euacu-
antia.

Itaq; melius est, ut euacuetur Aqua per aluū. B
Euacuatur à tribus modis: Vel assumptis, vel Clysteribus injectis, vel linimentis exterioribus.

Assumpta multa proponuntur. In primis autē pro agrestibus celebratur succus sambuci, vel florum, vel corticum radices: succus ireo, vel radices recentis, vel florum: dosis est vnc. ij. Quidam probant Gratiolam vocatam: datur in pulvere ad vnc. sem. cum vnc. ii. vini & scrup. i. cinnamomi. Alii eodem modo præbent sem. ricini, vulgo vocatur Girasoli. Alii multum confidunt in Peplo, quod vulgo dicunt Esulam Rotundam. Laudant quoque lac Tithymali ad 7. guttas in 7. sicubus, vel carycis. Est medicamentum Hipp. 4. acut. Alii laudant Thymelæam, vel Chamelæam, quā Arabes vocant Mezeron: Sunt hæc præstantissima: sed tandem nil præstantius Elaterio. Idcirco ego hoc frequentissimè vtor: dantur grana duo, vel tria illius Elaterij, quod extrahitur ex Cucumere per simplicem punctiōem, nam succi expressi ex Cucumere dantur etiam gran. vi. vel vii. sed extracti per punctiōem duo vel tria grana satis superque purgant. Permiscantur in scrup. i. vel ii. pilul. alephang. Datur singulis tribus, vel quatuor diebus, & intermedio tempore ad præparandas vias, ad roboranda viscera potest exhiberi oxymel scylliicum, syrup. de quinque radic. simul cum duabus pil. hoc modo confectis.

Recipe trochisc. Cyboid. drach. ij.
de rhabarb.

de eupat. an. drach. i.

Cum syr. de ꝑ. rad. Formentur pil. 12. & de-
aurentur.

Sic paulatim Aqua educitur, & viæ exobstru-
untur, ac viscera roborantur.

Quemadmodum in robustis corporibus pur-
gatur Aqua per Ventrem assumptis medicamen-
tis, ita in minùs validis educi potest aut Extrinse-
cus admotis, aut Clysteribus.

Extrin-
seca.

Quæ Extrinsecus adhibentur, sunt vel Simpli-
cia, vel Composita. Inter simplicia sunt variz Ti-
thymalorum species, succus Ebuli, succus Meze-
rie, succus Cucum. Agrestis, Ireos, & Sambuci.
Componuntur autem medicamenta vel ex his
succis, vel ex pulueribus harum plantar. addita
Colocynthide, Agarico, Scammonio. Excipiuntur
autem melle, vel felle taurino.

Clyste-
res.

Clysteres pariter componuntur vel ex decoctis
harum plantarum, tithymali, peplo, siue esulæ ro-
tundæ, sambuci, & aliorum iam dictorum. Con-
uenit autem omnium maximè in Hydrope usus
medicamentorum per Urinas purgantium.

Diureti-
ca.

Multa Diuretica proposuimus in tract. de Icte-
ritia, & Obstructione, quædam adiungā efficaci-
ora. Sunt autem Composita, aut Simplicia: inter

A composita est Dialacea, & Diacureuma: datur
drach. i. ex vino aliquo odorato, vel simplici, vel
alterato cum radicibus quibusdam, Diureticis.
Præstantissimum putatur oleum destillatum ex
baccis Iuniperi: dosis drach. sem. vel scrup. ii. in
eodem vino, aut decocto Diuretico. Scribunt qui-
dam, casu inuentum esse, puluerē Bufonis terre-
stris seu Rubetæ Hydropē sanare. Cum enim mu-
lier quædam proprium maritum eustinguere tē-
taret diuturno Hydrope laborantem hoc puluere
exhibito, bis tantum superueniente vrina copiosa
illum integræ sanitati restituit. Hoc quidē scio,
& experientia cōprobapi, Lacertas Virides, quas
vocat Stelliones, exsiccatas, & in puluere exhibi-
tas liberaliter urinas mouere. Omitto Lumbri-
cos Terrestres, & carnē Erinacei Terrestre sicca-
tam, & puluerizatam, cuius mentionem fecimus
in superiorib. locis. Valet etiam summopere ex sen-
tentia Dioscoridis vrina impolluti pueri. Arabes
probant vrinam Cameli, sed materiæ auxiliōrū
iniecundæ destillari possunt. Itaque si quis in Vri-
na pueri infundat radices diureticas apij, petroseli-
ni, feniculi, asparagi, Ruscii, præterea asari, si sim-
brij, &c. destilletq; in alembico, & præbeat vnc.
ij. videbit optimum experimentum producen-
do sero. Inueni in libello manuscripto mei Auū-
culi, ad Hydropicos tanquam secretum proposi-
tam esse aquam destillatā ex omnibus viscerib.
castrata tamen, ut omnia intestina primū di-
ligenter emundentur, deinde verò admisceantur
diuretica proposita. Hæc aqua potest quidem vni-
cuique Hydropi prodesse, maximè verò illi, cum
quo febris coniuncta est, macielque totius corpo-
ris. Omitto oleum ex calchano, oleum ex am-
moniaco, quorum antea memini. Auctor libri 4.
acut. t. 12. ad Hydropicos laudat tres cantharides
exhibitas, abiectis tamen alis, & pedibus: Galenus
tamen in comm. vocat eos temerarios, qui vel
vriuntur solo ventre abiectis alis, & pedibus, vel
vriuntur pedibus, & alis, abiecto ventre: inquit e-
nim, priores excitasse abscessum, vltimos acces-
sum, cui mors successit. Hoc scribit Galenus, quia
existimat, vnam partem esse alterius antidoti, ut
propterea interius integræ exhibeantur cantha-
rides, ne vesicam exulcerent, & abscessum faci-
ant. Hoc docet Gal. 2. de antid. 7. ubi addit, anti-
dorum cantharidum esse Terram Lemniam, vel
nucleos pini. Recentiores quidem, inter quos est
Guido de Gauliaco, ad deuitandam exulceratio-
nis suspicionem præbet cantharides exustas, & in
cinerem versas, qui subiungit, gummi ceraforū
esse antidotum, cantharidum. Dantur duæ, ad
summum tres, vel in iure vel in vino aut simul
cum gummi cerafi, vel cum terra Lemnia, aliquo
liquore excepta. Hæc de Diureticis.

Puluis
Bufonis.

Urina
Pueri im

Cantha-
rides.

Insensibiliter autem educitur materia Hydro-
picorū Sudoriferis, aut Linimentis, vel Fomentis,
Oleis, Emplastris, & Ceratis. Quoad Sudorifica,
sunt stufæ communes, balnea aquar. calid. deco-
cta ex herbis calotif. Iuniperi, calamentho, origi-
no, scordio, dictāno, alijsq; id genus. Proponunt
nonnulli, tūquam efficacissimū remediū, ut paue-
res super tabulam positi imponantur in furno post
extractum panem, ita tamen, ut caput sit extra
furnum.

Insensi-
biliter
Vacuan-
tia.

turum. Laudatur etiam, modus sudandi per ve- A
ficas bubulas, aut porcinas, aut cucurbitulas ma-
gnas decoctis sudorificis repletas. Digerunt aquâ
insensibiliter primum quidem emplastra, confe-
cta ex cochleis contusis cum suis testis. Scribit
Aetius, hæc ventri Hydropicorû adhibita non au-
tea cadere, quàm totam absumpserint Aquam.
Ego summopere laudo, ut istorum corpora impo-
nante usque ad regionem thoracis in magno
tritici acervio optime exsiccat: Dicebat Gal. 1. de
nat. facult. 14. fortiolem esse vim tritici ad Aquâ
attrahendam, quàm sit ipsius solis. Dantur & alia B
paratu facilia, inter quæ est sterco caprinum v-
rinapueri exceptum, & mistum cum sinapi, pipe-
re, pyrethre, cymino, semine rutz, bacis lauri cõ-
tusis, & in pulverem redactis. Laudant nonnulli
spongiam aqua calcis imbutam. Moneo, Audi-
tores, hoc medicamentum propter vim caloricâ
& siccantem usque adeo indurare partes cutis,
ut etiam si aliquid ab initio absumatur, progres-
su temporis tamen humoris digestionem & re-
solutionem impediant, & prohibeant. Atq; ideo
Medici ante usum digerentium laudant, ut dili-
genter totus venter confricetur ad rarefaciendâ
cutem, & aperiendos poros. Et ego hoc facio nõ
simplici calido linteo, sed oleo illo resolutivo,
quod conficitur ex radice bryoniz, cucumenis syl-
vestris & ruta: Affundo partem olei calidi super
media abdominis regionem, & iubeo, ut confricet
totam abdominis regionem per quartam horæ
partem, deinde adhibeo aliquod emplastrum
digerens. Si quis voluerit vii Cerato, poterit sic
componere.

Recipe Resina pinea vnc. i.

Ammoniæ.

Bdellii an. vnc. sem.

Sulph. ignem non experti, i. e. nigri.

Alum. an. drach. iij.

Sinap. Euphorb. Pip. an. drach. ij.

Dissolu. gummi cum vino opumo, adduntur
pulveres & resina, & cum cera f. Ceratum.

Hæc quidem valent potissimum ad educendâ
insensibiliter Aquam.

Flatus Digerendi Modus.

Pro Flatu educendo magis conveniunt sac-
culi parati ex sequentibus pulueribus.

Recipe Cymini. vnc. ij.

Anisi, Feniculi an. vnc. i. sem.

Dauci, Seseli an. vnc. sem.

Bacc. lauri sem. rut. an. drach. vi.

Pip. Pyret. Sinap.

Sulphur vini an. drach. ii.

Puleg. siccat. Calamenth.

Spic. Absinth. an. M. f.

M. f. pulveres imponentur sacculo, & ven-
tri applicentur. Humidum Fomentum sit pa-
retur.

Recipe Fot. malv. rad. alth. an. M. ii.

Sem. Lin. Fanugr. an. vnc. iij.

Flor. Chamomel.

Aneth. Melilot. an. P. i.

Anis. Fenic.

Bacc. Lauri, Rut. an. an. i.

Fiat decoct. in suff. vini quant. Facta ex-
press. seruetur decoctum profomento.

Ratio curandi Morbos, qui gignunt Hydropem.

PRO sanando Ascite non tantum causæ incu-
bendum materiali, sed etiam effectrici, mor-
bis scil. propter quos Aqua colligitur. Tamen si ve-
rò ferè omnium inualuit opinio, Hydropem cal-
idis remediis tractandum, quod fiat ex intempe-
rie frigida, tamen aliter nobis faciendû, & consi-
derandæ sunt refrigerationis causæ; nã si fuerit
frigidity positiua, audacter calefaciendum The-
riaca, Mithridatico, Trochiscis Cypheos, lure gal-
li antiqui, repleti herbis, seminibus & aromati-
calidis, Rotulis ex aromatico rosato. Caryophyl-
lato, ex Diagingibere, olei destillati ex cinamo-
mo, ex caryophyllis, vinis medicatis, ut maluat-
ico, in quo infundatur absinthium, caryoph. cina-
momum: vno verbo omnia calida & sicca con-
ueniunt, ut non defuerint, qui aquas etiam ther-
males intrinsecus dederint: & nunc audio miri-
ficè celebrari Spadenses aquas. Ego verò, quod
ad potum aquarum thermalium spectat, valde ti-
midus essem, propter timorem ne retinerentur.
Quidam proficiunt, se Hydropicos curasse solo
rhabarbati usu singulis diebus cum passulis ma-
sticati. Si hoc medicamentum non moueat al-
uum, est valde vtile. Nam iecur calefactum, & siccum
obstructiones aperit, & visceri robur addit ad im-
gendo. Quod si expurgat bilem, ut notat Auic.
tollit frænum ipsi Aquæ, quod deinceps lecte
magis refrigerat. Ideo prohibet Auic. in Hydrope
usum medicamentorum bilem expurgantium.

Quod si frigiditas fiat ex suffocatione, occur-
rendum causæ suffocanti, euacuatione scilicet
quandoque sanguinis per sectam venam, vbi re-
center suppressi sint menses, vel hæmorrhoides.

Vbi inflammationis adsit suspicio conueniunt
refrigerantia ex sententia Auic. quem plurimi
sequuntur quinimo idem in causa calida pro-
bat usum granat. aq. al. KeKeng. serum lactis,
aliaque id genus frigida. Conueniunt hæc in prin-
cipio Hydropis ex inflammatione; non autem in
Hydrope confirmato post inflammationem; ne-
que debent syncera exhiberi, sed roborantibus
commista, absinthio Pontico, spica, trochiscis de
rhabarb. de eupatorio, quorum dentur scrupuli
ante serum, vel illas aquas frigidas, aut detur ro-
tula vna Diarrhodonis Abbatis.

Quod si refrigeratio fiat ex pabuli defectu, ex
siccitate, cum suspitione febris hæcticæ, tunc con-
ueniunt humectantia: Et ni ego fallor, cum A-
uic. in Hydrope lac camel. & caet. commenda-
uerit sine distinctione; existimo resperis-
se illum ad hanc Hydropis causam, ad defectum
caloris, ex defectu humidi substantifici. Igitur si
nobis occurrant Hydropici hæctici, sicuti occur-
rent post euacuationes Aquæ, audacter præbeatis
lac caprinum, vel asininum; nam camelatum nõ
habemus. Aliquando faciatis lac deiectionum, ad-
dito

ditio Elaterios inter dum Diureticum additis aliis A
diureticis: inter dum simplex præbeatursita tamē
ut non corrumpatur in ventriculo, admisto scilicet
mello, aut saccharo, aut modico salis, vel præben-
tes ante lac scrup. i opoponacis.

De Scirrho Iecoris, & Obstructione nihil di-
co, quia partim dictum est, partim dicemus in
tract. de Scirrho Lienis.

Videtur ratio.

Medicamentis proportionē respondeat vi-
tus ratio: nam in frigido posiuuo conue- B
nit maluatium, vel aliud generosum album, in
paucā tamen quantitate: Eligantur potius eucul-
la, quam alie carnes, & repleantur ventres auicu-
larum petroselino, aniso, cinamomo, pipete, Scri-
bit Nicol. Flor. sem. 5. tract. 5. c. 25. se quendam
Hydropicum vidisse sanatum vsu Alaudarum,
quibus frequenter cum petroselino vescitur,
modico maluatico contentus.

In ceteris causis cibis & potus debent propor-
tione respondere medicamentis.

De Leucophlegmatiam, seu Anasarca.

Sed quod ad Leucophlegmatiam spectat, quæ
ὀσσοφληγιδιον ανασαρκα, & οσσοφληγιδιον dici-
tur: Hæc, si Gal. & sequacibus credimus, vnica
est, tumor scilicet œdematosus vniuersi corporis,
3. de caus. (symp. 2. Telis est, ait, Leucophlegmatia
toti, quale œdema vni parti. Sed si ad Aretæum
respicimus, hic tumor vniuersi corporis est
duplex. Vnus quidem est ex pituita iam exposi-
tus, quem ipse vocat Ἀδικοφληγματιαν: Alter ex
sanguine colliquo, & conuerso in ichorem quæ D
dam tenuem, cuius ratione totum corpus intum-
escit tumore flaccido, modo nigro, modo subli-
uido: Vocat hanc speciem Ἀνασαρκα.

Gal. 4. acut. 1. 1. 1. improbabillos, qui quatuor spe-
cies proposuere Hydropis, atque Leucophlegma-
tiam ab Anasarca distinxere. Sed tamen vnus ho-
mo cuncta non videt. Ego libenter Aretæo adhæ-
reo, qui ante triennium habui nobilem muliere
Asylanam, laborantem hoc Hydrope liuido, sub-
nigro, cum tumore totius corporis, & duob. vlce-
rib. phagedenicis circa vtrumq; malleolum, anti-
quis & maximis, ex lienis scirrho cum imbecilli-
tate Iecoris. In hoc tamen differo ab Aretæo, qui
puro, hunc nigrorem, vel liuiorem totius corporis
non fieri, vel non semper fieri ex colliquatione:
quandoquidem si ex colliquatione fieret hic affe-
ctus, esset cum febre ardente; at verò hæc patiens
quam ego vidi, laborabat hoc Hydrope absq; fe-
bre; itaque existimo illius causam duplicem esse:
Imbecillitatem alteratricis, atque etiam retentri-
cis carniū, & vasorum totius corporis, est intem-
peries alteratricis carniū quia non concoquunt
alimento, ideo redditur tenue & aqueum, est
imbecillitas retentricis vasorum, quæ tunc sangui-
nem tenuem continere non possunt, hinc effun-
ditur extra venarum officia in substantiam car-
neam eodem modo, quo fiunt effusiones, siue
Ἐκχυματα, de quibus Galen. lib. de tumor præ-
aut. c. 18. meminit.

Causæ.

ITaq; cum tot sint differentie Leucophlegma-
tiæ certum quoque est, causas esse diuersas:
Nam in priore, quæ alba est, generatur pituita in
corpore, vel ex intemperie frigida, vel ex sangui-
ne pituitoso confluente. Confluit verò pituito-
sus sanguis, quia in iecore talis producitur ex in-
temperie pariter frigida. Frigiditatis causas iam
intellexistis in Ascite.

In altera specie nigra adest quidem refrigera-
tio totius corporis, vbi nulla adfit febris; potest
tamen aliquando contingere, id quod scribit A-
retæus, ut ex febre ardente colliquetur sanguis.
Et sicut colliquatio, ut docuit Gal. 3. de caus.
symp. 2. aliquando tendit ad intestina, quandoq;
facit Ascitem, nonnunquam tendit ad vrinas; ita
aliquando potest retineri in toto corporis ambitu
& facere hanc Anasarcam Nigram. Ego tamen
maiori ex parte puto hoc fieri ex impuro sangui-
ne, partim melancholico, partim ichoroso. Me-
lancholico, quia non potest recipi in liene scirrho
obdurato. Ichoroso verò, quia iecur à copioso af-
fluxu & qualitate humoris melancholici refri-
geratum est.

Signa:

IN proponendis Leucophlegmatiæ signis bre-
uis ero: quandoquidem diagnostica ex dictis
patent. Quando enim vniuersus corporis ambitus
œdematis formā suscepit est Leucophlegma-
tias albus. Quando autem color sit liuidus est
vel niger cum tumore totius corporis, constituemus
Hydropem Leucophlegmaticum, quem A-
retæus Anasarcam vocat.

Cognoscetis autem, hunc Hydroper fieri ob
intemperiem ambitus totius corporis, si nulla sit
affectio circa imum ventrem, nullum sit Ascitis
vel Tympanitis signum, & initium. Quod si cō-
iungatur principium Ascitis cum Leucophleg-
matia, certū est argumentum fieri tunc Hydro-
pem vitiō Iecoris vel primariō, vel secundariō lēsi.

Prognostica.

ITaque sicut, quando Leucophlegmatias sit ex
intemperie totius corporis absque vitio Ieco-
ris, omnium facillimè curatur, ut Arabes hac in
parte recte senserint, hanc speciem Hydropis cē-
teris leuiorem, & tutiorem esse; ita quando ex vi-
tioso Iecore ortum duxerit periculosus est affe-
ctus, imò omni Hydrope periculosior. Hanc ob
causam scripsit Hipp. 4. acut. 1. 1. 1. Leucophleg-
matiam si fieri aggreditur, statim interficere. Sed
Gal. hæc vtrba (si fieri aggreditur) sic explicat;
si progressus sit morbus, quasi dicat Gale. si cum
toto corpore bmul patiatur Iecur.

Curatio.

Huius affectus curatio posita est, ut Ascitis
sanatio, in materiæ euacuatione, & alteran-
da frigida intemperie. Materiæ euacuatio & vel
chirurgia, vel pharmacia. Chirurgia quidem in
illa

illa specie, quæ fit ob menses & hæmorrhoides, tentata, in qua licet venam secare, inferiorem tamen, ut docuit Galen. loco citato comm. 111. 4. acutorum, qui hoc accepit ab Hippoc. in illo text. Est verò tunc tantum facienda sanguinis missio, cum calor est suffocatus, non autem dissolutus. Præterea in principio, non autem vel in incremento, vel in statu affectionis. Hoc tamen tempore expedit ut purgationibus medicamentisq; insensibiliter euacuantibus & digerentibus. Purgationes sint per vomitoria, & ea quidem valida neque enim in hoc casu peritonæi disruptio imminet. Medicamenta pariter aluum subducen-
B
tia, crassam pituitam respicere debent, non aquæ-
am materiam.

Itaque si vires consent, non improbo gran. iij. vel. v. antimonii. Laudo quoque radicem Bryoniae, cuius usu deploratissimum Hydropicum vidi sanatum. Sanavit autem illum mulier exhibendo pulverem bryoniae in placenculi quibusdā oleo fixis, dabatque drach. i. pulueris. Incoquebat hæc mulier etiam Bryoniam in oleo, & præbebat vnc. ii. huius olei. Excitato vomitu & deiectione ventris, hic pristinae sanitati est restitutus. Ego verò ubi calor sit imbecillis abstineo à fortioribus medicamentis, & sic curationem instituo, qua ratione plurimos Leucophlegmaticos sanavi. Primò præscribo has pilulas.

*Recipe pil. aggregat.
de hier. cum agar an. drach. i.
alephang. drach. ii.*

Cum syr. de Agrimon. f. pil. 12. & deaurentur.

Harum pilularum exhibeo drach. i. alternis diebus. Die autem intermedio præbeo duas ex
D
sequentibus.

*Recipe trochisc. Cyphoid. drach. ii.
de Rhubarb.*

de Eupator. an. drach. i.

cum syr. de 3. radic. f. pil. xij. & deaurentur,

Post pilulas statim præbeo hunc syrupum.

Recipe Syr. de quinq; radic.

Syr. Bizant. cum acet.

de absynt. an. vnc. sem.

Decoct. absint. spic. menth. sicc.

cucut. pulg. orig. vnc. iij.

M. prosyrupo.

Ubi satis superque corpus expurgatum fuerit, ad Exteriora transeo, quæ materiam inibi existentem digerant quorum multa sunt, ut inunctio ex oleo rutaceo, irino, costino, chamomelino cui admiscetur vinum aromaticum, & aqua ardens, & pulueres calidi hunc in modum,

Recipe Olei rut. de cost.

Chamomel. an. vnc. i.

Aq. ardent.

Vin. arom. an. i. sem.

Sinap. sulphur.

Alumin. an. drach. i.

Bull. simul ad consumpt. vini, & aq. & hoc oleo confricentur membra tumida.

Idem præstabit oleum chamomelin. multo sale commistum. Fortius erit lutum aliquod digerens, aluminosum, nitrosum, & salsum, qualia sunt

montis Ortoni, & S. Petri. Nihil fortius est arenatione, & insolatu, ut scilicet sepeliantur corpora Hydropicorum in arena maris usque ad regionem thoracis. Si cui minus placeat hoc remedium audiat Nicol. Florent. qui in eundem usum accipit cineres: & sanè hi quoq; valentissimè exsiccant. Non improbantur balnea aquæ thermalis in quorum defectu accipi poterit aqua marina, vel communis, sed alterata sulphure, sale, alumine, cineribus quæcunque, herbisque calidis, origano, dictamno, uni peto, lauro, salvia, roremarino. Interim roboranda sunt viscera: Et si quidem Iecur fuerit refrigeratum, ita calefiat, sicut docuimus in hesternâ lectione.

DE SCIRRHO LIENIS. Cap. XXVIII.

Quod si factus fuerit hic Hydrops ex Scirrho Lienis hic sanandus est. Fit autem Scirrhus vel post inflammationem, vel incipiendo. Post inflammationes quidem, si nimium digerentibus, & exsiccantibus tractata fuerint; Incipiendo sit vel ex melancholica materia naturali, vel ex adusta, vel ex pituita, vel pluribus humoribus mixtis. Hinc Hipp. lib. de inter. aff. 3. constituit Scirrhusi Tumoris differentias pro diuersitate materis, ex qua fit Scirrhus.

Signa.

Neq; verò difficile est hunc tumorem aut cognoscere, aut distinguere; nam est usque adeo magnas aliquando, ut totam Abdominis regionem complectatur, & ut dicebat Aretæus, inferat suspitionem affecti peritonæi. Adest præterea tussis sicca, pondus maximum, difficilis decubitus in utramque partem quidem, sed maximè in dextram.

Exquisitus, præter insignem duritiem, sensu caret; Neq; nos decipiat sensus cutis superpositæ, cuius ratione unusquisq; in ea parte compressus sensum retinet.

Distinguuntur autem causæ sic inter se; nam si fuerit inflammatio præcedens, præfuit etià febris maxima, dolor in parte sinistra, sitis, pulsus durus, & frequens. Si fuerit materia melancholica naturalis, adest timor, & metus continuus, nisi successerit Hydrops; ubi enim Hydrops Scirrhus succedit, quantum sit ratione Scirrhi, non sit amplius melancholia. Aqua enim prohibet quo minus nigri vapores generentur, & eleuentur. Corpus in hac causâ sit lucidum, nigricans. Idcirco nigra Ictericia laborant. Si sit melancholia adusta adest similiter timor, & metus, sed cum aliqua tixâ & furore. Cutis totius corporis vel impetigine afficitur, vel vlceribus variis, vel liuoribus, gingivæ computrescunt, & eroduntur, sanguinem putridum euomunt, anhelitus feret, sinitq; frequen-
F
tes sanguinis eruptiones rarissimæ, & admirandæ, non modò ex ore & naribus, non tantum per inferiorem ventrem, sed etiam per vrinas, & quod
N.B. Hi
florias
admiran-
das.

magis est, per aliquas corporis partes, in quibus nullum est foramen, exeunte sanguine per poros illius partis. Ego tres obseruavi notabiles historias. Vnam in quodam nobili Patavino, cui sanguis exercebatur ex Umbilico. Alteram pariter

in Nobili Patavino, qui hanc habebat effluxione per scrotum Tertiam in Nobili Germano, cui excernebatur sanguis per ligamentum illud, quod est sub glande pudendi. Et isti omnes laborabant Scirrhus Lienis ex denso humore cum signis propriis ad differentiam illius, qui fit ex humore pituitoso in quo corpus laborabat Leticophlegmatia vel alba Cachexia cum sopore, urinis crudis, atque aliis signis abundantis pituitae.

Prognostica.

Est quidem omnis Tumor Lienis magnus morbus, sed Scirrhus Exquisitus insabilis est: non exquisitus aegre admodum sanabilis, & plerumque ad Hydropem deducit, non quidem propria ratione 4. praesag. ex puls. 9. sed communicata Iecori affectione 6. de loc. aff. 1. deducit quoque totum corpus ad tabem. Hipp. de loc. in hom. 2. quo accepit Gal. 2. de nat. fac. 9. Vbi Lien efflorescit, ibi corpus contabescit.

Fiunt autem excretiones quaedam in Lienosis aliquando criticae, aliquando symptomatice; fiunt autem vel per alvum, vel per fluxum sanguinis nativum. Dicebat Gal. & cum eo Hipp. 6. aph. 48, Alui fluxum splenicis supervenientem salutarem esse, addatis vos, nisi modum excefferit, nam diuturnus & copiosus, est periculosus, & lethalis, ut docuit Hipp. 6. aphor. 48. Quod ad fluxionem sanguinis pertinet, certum est fluxiones illas, quae fiunt per loca indecentia, de quibus memini in lectione praeterita, symptomatice esse omnes, & nullius frugis. Quae vero fiunt per locos decentes, si modum servaverint, iuvare possunt. Hinc dicebat Gal. 6. in 6. Ep. 8. haemorrhoides sanare Lienem induratum. Fluxus etiam ex naribus, dummodum sit ex parte sinistra, utilis est, qui vero ex opposita, noxius est, doctissimus Hipp. 3. protreth. 33. & 2. in 6. Epid. 12. & 13.

Quod dicit Hipp. 2. in 6. Epid. 42. Destillationibus tentatos minus Lienosos fieri, sic Galenus interpretatur, de illis tantum esse intelligendum qui totam expurgant humorem colluivem per caput. Etenim fieri potest, ut pars huius destillationis in Lienem decumbat, & Scirrhum faciat. Et ego saepe plurimos vidi Scirrhus laborantes destillatione pariter tentatos: imò vero hodie habui exemplum cuiusdam puellae, quae & destillatione & Scirrhus lienis simul tenebatur.

Curatio.

Transco igitur ad curationem 3. Pro curando Lienis Scirrhus primò versabimur in fonte chirurgico, mox in pharmaceutico, & dietetico.

Quod ad Chirurgiam Gal. lib. cur. per sang. miss. c. 16. laudat sectionem venae, miraturque antiquos, qui in hoc affectu eam omitterent. Ego virumque fieri posse existimo, quum enim scirrhus iam totum corpus vitauerit, ad sitque principium Cachexiae & Hydropis, praetermittenda venae sectio, imò vero quævis sanguinis missio. Vbi reliquæ corporis partes integrum servant robur, secunda est vena in cubito sinistro, si vires con-

A stent in manu sinistra, si minus firmæ fuerint. Neque verò vos decetreat ratio quorundam doctissimorum virorum, qui dicunt, vires magis decipi ex sectione saluatellæ, quam ex secta cubiti venæ, quia propter facultatem aquæ calentis dissipatur spiritus. Etenim dissipantur magis spiritus, ubi secatur amplum vas, quam ubi seccatur minimum. Accedit quòd non necessario mittitur sanguis ex saluatella in aqua calida. Gal. 3. de anatom. administ. c. 5. dum ex aliorum sententia laudar hanc venæ sectionem, ait, tamdiu vas esse detinendum apertum, ut sanguis ultra non procedat, sed paulatim desinat, seu deficiat. Id verò fit sine aqua calida, & propterea lib. cur. p. sang. miss. 26 non ampliùs ex aliorum sententia, sed ex propria scribit Gal. aquæ Splenicis conferre saluatellam sectam, atque venam in cubito. Neque vos decipiat text. Latinus, qui legit negativè, nam Græcos codex caret negativè. Sed qui voluerit plura de hac disputatione, legat Hieronymum

B Araldum: Item Ioseph, Valdamium.

Praeter sectam venam aperiendæ sunt hæmorrhoides, cum, ut antea dixi, tantopere iuvent induratum lienem.

Et, ut me expediam à fonte chirurgico, in hac classe sunt quoque Vesicatoria mirificè commendata ab Aetio & Paulo. Apertæ autem diu detinendæ sunt vesicæ, & cum ocludantur, nondum sublato Scirrhus, denuo repetenda vesicantia.

Id ipsum dico de Cauteriis, quæ non modò affigenda sunt, ut còmuniter fieri consuevit in crucibus: Sed in Liene indurato nil præstantius, quàm inurere in 4. aut 5. locis super ipso liene. Proponuntur visiones ab ipso Aetio, Ego illas libenter suadeo, qui propria experientia omnium utilissimas comprobavi. Omitto quædam leuiora, quæ postq̃ videntur superstitiosa, ut est incisio venæ post aurem sinistram, & illitio lienis cum sanguine illo educto: est remedium Archigenis propositum à Galen. 9. de compos. loc. cap. 2. Omitto nunc etiam periculosissimam illam aportionem, qua utebatur religiosus quidam proximis annis Patavi, cuius meminit Cardanus 8. de variet. 44. Est autè appositio securis acutissimæ super charta quandam Lienis apposta, quæ securis percutitur malleo ligneo fortissimo, neq̃ tamen cutis inciditur.

Pharmacia.

Sic leniatur alvus.

Recipe Syr. de polypod. vnc. iiii.

mell. ros. solut. vnc. ii.

decoct. cord. cum drach. ii. sen. q. s. M.

Præparentur humores triduo hoc syrupo:

Recipe Oxym. comp.

Syr. bizant. cum aceto.

de beton. an. vnc. i. M.

Post tres dies vtantur hac purgatione.

Recipe Cort. alleb. nig.

Agar. trochist. an. drach. i.

Infund. in decoct. cordial. F. express. addo

Syrup. de polypod.

mell. ros. solut. an. vnc. ii. M.

Postea præbeo hos syrup. compos. alternatim; Primum quidem.

Recipe

N. B.

Vesicatoria;

Cauteria;

Remedia temeraria;

Dena
Sclia.

Recipe Syrup. de quinq. radic.

bizant. cum aceto.

oxym scill. an. vnc. sem.

Decoct. cortic. radicum capparis.

Cetrach. Agrimon.

Myrica Meliss. Fum. vnc. ij. M. pro syr.

Sequenti die hunc accipiant.

Recipe Syr. de pom. comp.

de fumo terr. compos. an. vnc. i.

Decoct. Epithy. Mesu. vnc. iii. M. pro syr.

Accipiunt isti per 2. dies. Et interim Licet ad mouendum est medicamentum emolliens, quod

possit sic parari.

Recipe Mucilag. rad. alib.

Sem. lini an. vnc. ij.

Puluer. Bryon.

radic. cyclam.

cucum. syluest. an. vnc. ii.

Farin. sem. lin. vnc. ii.

Ol. de Capp. Pingued. gall.

Axung. suis. an. vnc. i.

Aceti parum. M.

Ab solutis Syrupis si corpus sit validum repetenda est potio cum elleboro nigro: Sin minus, praebeandum est ius aur. galli, anuqui, aut columbi in cuius ventre incoquatur Epithymum, Sena, Polypodium cum alijs herbis in priore Syrupo descriptis, & ante Syrupum conuenit praebere medicamentum aliquod attenuans incidens, & aperiens. Ea facile parabilibus esse illud:

Recipe Chalyb. preparati cum aceto.

Ammonica an. drach. sem.

Pulu. citrach.

Tamarisc. an. scrup. ij.

M. & cum aceti. scyll. f. pill. viii. aut boli iv. & praebeantur ante Syrupum.

Quidam laudant splenem a scelli, vel equi exsiccatum, & puluerizatum ad drach. i. siue ii. vel simpliciter, vel cum puluere tamarisci, aut cum chalybe, aut corymbis, seu ramis hedere. Vide Gal. 9. comp. loc. cap. 2. Ego vero cum toties expertus fuerim meum electuarium ex chalybe illud vobis communicabo. Moneo vero vt post emollientia exteriora vtamini fortioribus attenuantibus & digestentibus, vt sunt suffumigia ex lapide molari seu pyritide, insperso aceto, in quo bulliesint, Bryon, Cucumer syluestre, Althæa, Myrtha, radix ebuli, semina lini. Et post suffumigium adhibeatur hoc Ceratum:

Recipei. Ammon. Bdell. an. vnc. i.

Sinap Piper.

Myrtha Cetrach. } an. drach. i.

Cort. rad. Capp. }

Dissolue gummi cum aceto: addantur pulueres cum Resina & Cera. f. Ceratum.

Electuarium est tale.

Recipe Fol. sen. vnc. ij.

Epithym. Polyp. an. vnc. ij.

Tamarind. vnc. i. sem.

Myrobal. omnium vnc. i.

Pulp. stor. Cass. vnc. ij. sem.

Bull. hæc in aqua Borræg. Agrimon. & Cetrach. an. lib. ii. vsq; ad consumpt. mediet. deinde coloraturz adde Sacch. sin. lib. ii. bulliantq; simul in

A prædicto decocto vsque dum crassecat, in fine adde sequentes pulueres.

Mastic. Rub. tincl.

Rasur. ebor. Clycyriz.

Fenugr. Capil. Vener.

Calam. arom. Anisor.

Fenic. Siler. montan.

Nigel. Petrosel. Eruc.

Uruc. LaBuc. Endiu. an. drach. ij.

Schenanth. Eupator.

Tamaris. sem. portul.

Nuc. mosc. Macis.

Cinnam. Caryoph.

Spic. nard. an. drach. i.

Limatur. chalyb. sem. lin. vnc. i. sem.

M. f. Electuarium.

Dosis est à drach. i. vsque ad iiii. ex vino alio quo albo, & post electuarium adhibendum est exercitium aut in imbecillioribus corporibus frictio super Lienem.

DE MORBIS INTESTINORUM.

AC PRIMUM DE VOLVULO.

Cap. XXIX.

I Am sermonem meum conuerto ad Intestinorum vitia: Cum enim de varijs fluxionibus antea fuerit sermo, in præsentia Intestinorum vitia proponemus Volvulum, Colicum & Lumbricos. Incipiemus autem à Volvulo, qui Grecis Είλεος dicitur, Arabibus passio Uicæ; Latine Intestini Tenuioris passio.

Differentia Volvuli.

I Multiplicata erit hæc tractatio, nisi distinctio quædam adhibeatur. Idcirco ante omnia illud notandum, Volvulum duplicem esse, vnum Legitimum, alterum Spurium.

Legitimus est integer, alui adstrictio, dolorosa, & laboriosa, ex Ileci Intestini tumore. Dicitur integra adstrictio, quia ipæ hac passione nihil prorsus per inferiora excernitur, tamen si acris clyster imponatur, vt docuit Gal. 7. aphor. 10. Dicitur dolorifica, & laboriosa, quia vt scribit idem Gal. 6. aph. com. 44. & 1. in 3. Ep. 6. hic affectus habet connexum dolorem & intestinorum tormina, ac vomitionem ipsam. Multa alia conueniunt Volvulo symptomata, de quibus meminit Hippocr. & Galen. 7 aphor. 10. vt vomitus secum desipientia, cõuulsio. Addebat idem Hippoc. 1 in 3. epid. 6. refrigerationem extremorum, sed hæc rō sunt pathagomica lla, sed constituunt Volvulum lethalem. Locus affectus est Ileon intestinum, vt voluit Gal. 6. aphor. 44 & 3. de caus. sympt. 2.

Causa Legitimi Immediata.

Causa proxima est aut. eiusdem intestini inflammatio, aut abscessus, aut tumor scirrhusus. Aliam non videtur cognouisse Gal. causam, propter quam integra conueniatur alui constri. ctio, quam tres iam proposuiss. Ratio est, quia verba facis de Ileco Legitimo in Spurius alias habet

bet causat. Ego tamen Legitimum Voluulū aliā quoque causam habere inuenio, nempe tenuioris intestini prolapsus in serotum propter rupturā peritonei. Hic Voluulus si quis alius est omnium maxime lethalis, si quam primū intestinum in proprium locum non reponatur. Haecenus de Legitimo.

De Voluulo Spurio, & quos modis talis dicatur.

Spurus Voluulus multis modis potest dici talis. Primò ratione exeuntium, quia alius non sit omnino adstricta: idcirco Hippocrat. 2. in 3. Epid. §. dum refert casus mulieris Voluulose, scribit paucas fuisse defectiones etiam si quidam existiment legēdum esse (nullas.) Est quoque Spurius ratione symptomatum, quia neque dolor ad est, neque tormina, neque Vomitus. Hoc docuit Galen. in comment. 7. part. aphor. 1. o. qui inquit Vomitus non consequi omnem Voluulum, sed periculosum duntaxat. Deficit etiam dolor, quia si neque adsit inflammatio, neque humor acris, neque flatus distendens, supprimuntur feces absque doloribus, & torminibus. Tertio est Spurius ratione loci, nam potest fieri hæc adstrictio ob vitium intestini vel colli, vel recti. Hinc Galen. 2. in 3. Epid. §. videtur sibi contradicere, qui concedit posse Voluulum fieri, & in tenuibus, & in crassis intestinis, quod negauerat in comment. 44. aphor. 6. part. sed ibi loquitur de Spurio: & propterea 3. aphor. 22. ubi loquitur in vniuersum de omni Ileo, inquit, fieri ex inflammatione intestinorū, neque tamen dicit illa tantum esse tenuia. Denique est Spurius ratione causæ, quia hæc extremorum mora potest fieri non tantum ex inflammatione, abscessu, & scirrho, quemadmodum Legitimus, sed sit vel ex facultate læsa, vel impedita, vel ex errore externo.

Causa Spurius tertio modo accepti.

Facultas, quæ ladiitur, vel est expultrix, vel retentrix. Expultrix ladiitur ex intemperie vsque adeo frigida, ut iam sensus stimuli sit subleuus. Ladiitur quoque ubi vsque adeo laxa, & humida sunt intestina, ut constringi non possint. Si enim non constringuntur, feces non comprimuntur, atque ideo Gal. §. in 6. Epid. 28. qui agnouit intestina ideo expellere, quia constringuntur, loco facultatis expultricis meminit facultatis constrictoris: quando enim hæc suo non fungitur officio retinere excrementa.

Retentrix quoque facultas est causa retentionis excrementorum, ubi nimium suo officio fungitur propter frigiditatem, & stecitatem, quæ sequitur adstrictionem, siue frigoris externi siue ciborum & potuum, quæ pariter facultatem obtineant adstrictoriam.

Impediuntur hæc facultates aut compressis intestinis, vel constipatis, vel obstructis, vel coalescentibus, vel subsidens. Compressio sit à tumoribus paruum vicinarū, Hac ratione Mesenterij, Pancreatis, Omenti, Vesicæ, Vteri, Renum ma-

gni tumores compressis intestinis excretionem retardant. Et quamvis Galenus in comment. 44. ad hor. 6. part. non videatur accipere ex tumore, vel cicæ, vel vteri Voluulū fieri, loquitur tamen ibi de Voluulo tūm Legitimo, neque enim negat, quod experientia docet, hos tumores excretionem alui motum retardare. Constipatio fit à tumoribus in ipsismetunicis intestinorum factis. Obstructio verò fit à materia, quæ est in cauitate intestinorū, quæ est aut sex indurata, aut lapis, aut lumbricorum copia, aut flatus extendens cum pituita crassa. Subsidens fit aut ex intestini siccitate, aut ex refrigeratione insigni, aut ex nimia adstrictione, de qua antea dixi.

Coalescentia verò fit post intestinorum vlcers parte vnius intestini adherente alteri parti.

Error externus est aut nimia medicamentorum, aut alimentorum acrimonia, aut defectus acrimonia. Est nimia acrimonia, quando in intestinis inferioribus adest vlcus valde sensibile, ad quod si perueniat facultas vel cibi vel medicamenti acris, statim constringitur intestinum, & sicuti tunc signaturalis excretio, cum superior intestini pars constringitur, sic è conuerso, quando constrictio incipit ab intestino inferiore, omnia per superiora reiciuntur, ut propterea scribat Galen. 3. de caus. sympt. 2. Clysteres aliquando vomitu eiectos. Et Matth. de Grad. 2. part. com. ad 9. lib. Rhal. in cap. de Ileo scribit se vidisse Voluulosum quendam, qui non modò clysteres, sed etiam suppositoria filo alligata sursum trahebatur, & vomebatur.

Alter externus error, propter quem excrementa alui retinentur, est defectus acrimonia, vel in humoribus, vel in alimentis. In humoribus quidem, si bilis à vesica fellea in duodenum intestinum non transmittatur. In alimentis autem, quando non accipiuntur salsa, acris, aromaticæ, sed duntaxat insipida, oleosa, & pinguis. Ex quibus dictis iam licet colligere, & mediatas quasdam causas, & solutiones quorundam problematum.

Causa Mediate.

Cum dictum sit inter ceteras Voluuli causas esse induratas feces aliquando etiam lapidasas: hæc impansa siccitas duplicem habet causam, videlicet aut vsum ciborum potionum, & medicamentorum exsiccantium, aut intemperiem, quæ est vel in intestinis, vel in iecore, renibus, & toto corpore. Et in intestinis quid est calida, & sicca, agitque exsiccando; in iecore autem renibus, & toto corpore est quidem calida, sed agit attrahendo tenuiorem, & humidiorē excrementorum partem, hinc mictio, & sudor abundant, ut propterea dixerit Hippoc. §. aphor. vlt. Mictus plurimus paruam significat egestionem; nam excrementis exsiccatis alius redditur pigræ.

Solutio quorundam Problematum.

Ex his potestis colligere solutionem cuiusdam quæstionis, cui occasionem dedit Hippocrat. 2. aphor.

2. apor. 20. cum inquit: Quibus aluus in iuuentute lubrica, in senectute siccescit: contra verò, quibus in iuuentute adstricta est, in senectute humescit. Patet solutio ex dictis. Nam iuuenes ideo aluum habent lubricum, quod bilis multa continuò defluat ad intestina: ingrauescente aetate, deficit calor & bilis, ideoque aluus adstringitur. Contra in iuuentute aluus plerumque est adstricta propter iecoris, & renum caliditatem, quæ humidiores fecum partem absumit: in senio deficit calor, & non sit tanta siccitas, ideoque aluus est humidior.

Patet etiam solutio alterius problematis, Cur scilicet cum reperiuntur tot viri & mulieres, quibus aluus adstringitur per 10. 12. 20. & plures dies, non tamen omnes vomitum tententur, imò pauci, & illiquidem potissimum circa quartum aut quintum diem à suppressione alui, ut in Legitimo Voluulo contingit.

Causa huius problematis triplex est: Locus, affectio, & materia. Locus, quia si intestina tenuia sint affecta, vomitus facillime succedit: proxima enim sunt ventriculo, & cibis acceptus, & potus cum non possit transire citò, cogitur retocedere; sed si crassa intestina vitiantur, non usque adeo facilis est vomitus. Secunda causa est affectio: nam si intestina laborent aliquò affectu, cum quo ad sit torpor, & stupiditas, siue sit frigida intemperies, siue paralyxis, siue fex dura, aut lapsa, vel coarctata, vel scirrhosa, aut atrophica, non necessarìo sequitur vomitus. Sed quando sensibilis sit affectus, tum excrementa affectionem irritant, coguntque intestinum ad constrictionem, cui subsequitur impulsio ad superiora, vti vos docui ex Gale. 3. acut. 3. de caus. sympt. 2. Tertia causa est materia; nam si sit mordax, excitat vomitum, si caret morfu, nullus est vomitus. Id ipsum dico de copia; nam ubi multa congeriuntur excrementa, sua mole & pondere cum per inferiora deijci non possint, irritant, & expelluntur per superiora: Non irritant, si pauca sint.

Obiectio.

Sed video ingeniosum aliquam dicturum; Vbi aluus adstringatur per 20. & plures dies, nūquid multa sint excrementa? Et tamen vomitus non necessarìo sequitur.

Solutio.

Ideo non necessarìo multa esse, quia plerumque colliguntur excrementa, transeunt in urinas, & sudores, & spūm, ut propterea ego aliquò obseruari, qui singulis octo diebus semel tantum, & parum deiecit: perpetua destillatione, & frequenter spuria angina tentatum.

Signa.

Signa Voluuli seu Ileii ex dictis patet, & Legitimus quidē cognoscitur ex retentione excrementorum, integra quidē post primos dies; nam primis diebus aliqua portio coacta excrementorum, quæ in inferioribus intestinis continetur,

educi potest. Atque ideo Hippocr. 2. in 3. Epid. 6. in casu illius mulieris Voluulose refert excrementa fuisse pauca: Vomitus adest, dolor, tormina, & febris acuta sūm, & progrediente morbo, refrigeratio extremorum, sudor totius corporis, murrus fecum, conuulsio, & delipentia, febris anhelus, eructationes flatus, & vaporis exoritur ex toto corpore. Sunt hæc signa Legitimi Voluuli ex inflammatione.

Signa Spurij.

Spurius autem qui sit ex intemperie frigida, & paralyxi cognoscitur, quia nullus est, excrementorum stimulus, nulla est deiectionis cupiditas, tamenam si excrementa usque ad anum intestinum descendunt, nullus est vomitus, nec dolor, nec sitis.

Quod si ad sit torpor, scirrhosus tactu percipitur, si fex sit indurata, aut præcessit, vsus siccantium, aut adest caliditas, & siccitas intemperies, murrusque plurimus ac sudor, & quæ educturæ caprinum sterces emulantur.

Quod si fiat ex defectu bilis, excrementa sunt cineritia, & ex nimio morfu, adest vomitus, qui dolorem sequitur, & intestinorum tormina.

Coarctationis, & Atrophie signa, non propono, quia casus sunt insanabiles.

Prognostica.

Insanabilis etiam antiquus scirrhosus, periculosissimus autē est Voluulus ex inflammatione, qui plerumque in septimo, aut quarto interficiat, præcipue verò, si stercus euomatur, aut sequeat anhelitus, & restus, vel ambitus totius corporis, vti docuit Gal. in 3. prophet. 66.

Curatio.

Prætermisiss Voluuli causis insanabilibus, coarctatione, scilicet atrophica, scirrhosa; exquisito, siue confirmato, versabor in præsentia in quatuor præcipue causis: inflammatione, scilicet, humilibus acerbis, & venosicis, prolapsu intestini, & fecum duritie.

Et quod pertinet ad inflammationem, necessarium est partim quidem ad morbum, & causam respicere; partim verò ad symptomata, &c.

Quod igitur ad morbum, & causam pertinet, tractatur inflammatio circa initia reuellentibus, & repetitiuientibus. Inter reuellentia primum locum obtinet vena sectio. Arabes consulerunt, ut vena sectio fieret ex pedibus & brachijs. Mihi magis placet, ut in magna plenitudine seceur potius viraque superior vena dexteri, & sinistri lateris. Præ ceteris post sectā venā laudo hirudines venis sedalibus appositæ. Hæc, si sanguinis missio non tantum reuellit; sed etiā à parte inflammata educit. In eundē vñm cucurbitulæ conueniunt searifica- tæ, & non scarificatæ infernis partibus affixæ, & actiones, ligaturæ, vesicantia, balnea aquæ calidæ. Balneum verò toti corpori administratum, nimirum laudeo, tamen si Ronsdeletus illud proba- uerit.

uerit. Nam frigidum intropellit humores, Calidum fundit & colliquat, illosque ad locum affectum procliuus reddit, ut etiam notauit Gal. 12. method. cap. 1.

Ad reuulsionem faciunt etiam Clysteres, ut excrementa in crassis intestinis contenta educantur, & à loco inflammato retrahantur. Laudant nonnulli acres clysteres. Dicunt enim inflammationem, quæ est in superioribus intestinis exacerbari non posse, sed decipinatur; nam in Voluulo cum motus intestinorum incipiat ab inferioribus ad superna, ut propterea aliquando, sicut notauit Math. de Gradib. etiam suppositoria vomitione reddantur, verendum etiam est, ne clysteres ascendunt, quod docuit Gal. aliquando etiam fieri 3. de caus. sympt. 2. sint itaque molles & inflammationem incipientem respiciant. Propterea fiat decoctio ex plantag. hordeo, malua, violis: addatur decoctioni oleum viol. cassia extracta, & inter mittatur vsus sacchari, & mellis.

De Vomitoriis videtur aliqua dubitatio. Nam si voluulus inter reliqua symptomata habet vomitum illum lethalem, stercoreis scilicet non videtur vomitus irritandus.

Conuenit tamen circa initia inflammationis tantum, quando scilicet, in ventriculo, & superioribus intestinis multa sint collecta corrupta, atque acris excrementa, quæ ad inflammationem transmitti possunt; nam si humores in his primis viis non redundauerint, periculosus est vomitus.

Et ne idem pluries repetere cogat, eadem erit curatio Voluuli facti ex humoribus acris; Nam si in ventriculo, & intestinis propter praua alimenta, aut medicamenta fuerint congregati, hi quoque vomitu sunt purgandi. Quod si fluat à Iecore, vel toto corpore, reuellendi sunt, ut antea docuimus.

Vomitoria verò debent esse placidissima, & epicrastica. Idecirco nihil melius aqua horð. & oleo amygdal. dulc. Aqua etiam simplex tepida mista cum oleo communi pro pauperibus erit utilis.

Si acris hæc qualitas fuerit posita in materia venenosa, laudat Aet. Theriacam post vomitum, cui adherent omnes posteriores. Ego verò Theriacam, aut alia alexipharmaca tunc tantum laudo, cum venenum fuerit frigidum. In calidis enim venenis vitari potius laetæ, aut sero misto cum aqua aceti, cum terra Lemnia, aut alio alexipharmaco, sed refrigerante. Hæc de reuulsionem.

Repellentia medicamenta sunt externa, & interna. Extrinsecus commodè loco dolenti apponitur aut lana, aut spongia vino acerbo, & oleo, vel rosaceo, vel violaceo, vel melino, seu de cyntonio imbuta, aut parabitur succum plantaginis, lactuca, semperuiui, admisto modico aceti, & per linteos, aut spongas aptabitis loco inflammato.

Intrinsecus obueniunt & Clysteres, & Assumpta, quæ facultatem habent reprimendi. Sint facti Clysteres ex succis, aut liquoribus iam dictis excepto aceto. Per Os circa initia præbeatis serum caprinum alteratum foliis plantaginis, portulacæ rosatum: Conuenit saccharum rosatum.

In augmento addenda sunt quædam Digerentia, ut Chamomelum, Anethum, Melilotus, semen lini, fœnugræci. In fomentis externis, & internis medicamentis, in statu vtendum digerentibus. Extrinsecus emplastro ex meliloto. Intrinsecus autem iure aliquo, aut columbi, aut pulis, in cuius ventre bulliant passulæ, caryæ, pullegium, fœnugræcum, chamomelum & alia id genus digerentia.

Pro Symptomatis aliqua etiam sunt agenda, & quia feces retinentur in principio inflammationis, satis est medicamenta frigida, & inflammationem reprimentia præbere: Talia erunt cassia, diaprunis simp. & sine scammonio, diasebestæ simp. syrupus ros. solut. serum caprinum. In maxima copia. Vbi vera inflammatio est aucta, hæc nihil profunt, fortioribus est agendum. Conuenit itaque aut Electuar. de succo rosar. vel Electuarium rosatum Mesue ad vnc. sem. cum drach. iij. cass. siq. aut etiam conuenit oleum amygdal. dulci cum granis iij. vel v. diagridij in modico sacchari rosati, aut in conferua ex cytoniis, aut accipiat Diaprunum cum scammonio.

Licet enim in hoc casu omnia potius tentare, quam permittere ut feces per superiora educantur. Idcirco licet etiam ascendere vsq; ad Antimonium, & Elaterium, quæ in modica quantitate ad iij. vel v. grana in vino, in quacunque materia patienti præberi possunt.

Nec quisquam obiciat, Inflammationem prohibere hæc; nam inflammatio facta tractatur calidis, & digerentibus. Itaque hæc, quanquam calida, non obstant, & plus nocet copia excrementi retenti, quam medicamentum si purgauerit. Idcirco non de fuere celebres Medici, qui in deploratis his casibus in usum acceperint hydrargyrum, quod suo pondere quam primum aluum ipsam mouet. Eandem ob causam clysteres atq; hoc tempore conueniunt, & ratione dolorum licet vi emplastro extrinsecus, confecto ex farina seminis lini, mucilagine althææ, oleo amygdalarum dulc. butyro, & luteis ouorum. Et quando aluus non respondeat medicamentis propositis, huic emplastro addetis medicamenta, quæ aluum subducunt. Succum bryoniæ, succum cucumeris sylvestris colocynthidem, & alia in tract. de Hydrope dicta. Hac ratione tractanda est inflammatio etiam in testini in scrotum prolapsi.

Quò tamen si fuerit absque inflammatione, & duritie, statim reponendum est, addito cerato constrictiuo & conuenienti subligaculo. Si sit induratum, emolliatur fomento calido ex decoct. maluar. althææ, sem. lini, fœnugræci, chamomeli, & meliloti. Et si fuerit repletum statu apponantur flatum digerentia, ut cuminum, anisum, ruta bacæ lauri, seseli & alia id genus.

Quando Ileos ex induratis fecibus factus sit, primum quidem emollientia, deinde verò euacuabilia sunt administranda; sed quia, ubi multum feces fuerint induratae, ut quasi in lapidem transierint, emollio necessitati satisfacere non potest: in eo casu accipiendum Hippocratis consilium 2. de morb. propositum, ut scilicet per sollem fabilem in recto intestino impos-

suum inflentur & dilatentur intestina; statim vero post inflationem injiciatur Clyster emolliens.

Recipe Ol. comm. vel amygd. dulc. ꝑnc. viij.

Decoꝝ. malv. alb.

Sem. lin. Chamomell. lib. i.

Butyri ꝑnc. iij. M.

Studendum autem, ut clysterem detineant; propterea consulit Hipp. ut inferius orificium lana obrueretur, deinde in Balneum imponantur, siue balneum sit ex aqua emollientibus alterata, siue sit ex oleo.

In imbecillioribus autem sufficit ventri apponere vesicam bubulam oleo, & decocto emolliente semiplenam, aut emplastrum emolliens.

Si sponte emollitur feces deiciantur, nihil aliud agendum, sin minus, aut acri Clystere, aut medicamento forti utendum. Horum formam partim proposui, partim vero proponam in sequenti tractatione de Colica.

Sublatis fecibus, studendum ne iterum inducantur, id autem fiet sublatis causis: & si causa frigida fuerit, & siccitas propter usum scilicet adstringentium conueniunt oleosa, & pingua in cibo, & medicamentis. Ut ego aliquando simile curavi sipticritatem præbendo singulis diebus.

Ol. amygd. dulc. ꝑnc. i.

cum sacc. fru. ꝑnc. sem.

Sed in eundem usum facit Cassia, manna, lac cum saccato, serum, & alia id genus.

Quod si pigra sit aluus propter defectum bilis aperiendæ sunt obstructions meatus fellei, atrahenda est bilis ad intestina. Nil præstatius in hoc casu usu frequenti rhabarbari. Eo uti possunt patientes, aut puluerizato & admisto cum modico Cinamomi & Saccari. hoc modo.

Rhabarb. drach. i.

Cinam. gr. v.

Sacch. drach. sem. Detur in vino aut iure:

Aut possunt masticare Rhabarbarum cum passulis.

Quod si nimia lecoris caliditas feces exsiccet agendum refrigerantibus, & humectantibus, interius, & externis, scito aquis, succis balneo poulticatum aq. dulcis.

Denique si pigra sit aluus, propter nimiam frigiditatem, & quasi paralytin, calefacienda sunt intestina medicamentis fortissimis, Theriaca, & Mithridata, Castoreo, Oleo ex Calchato ad v. vel vi. guttas exhibito, vel in iure, vel in vino albo odorato. Reliqua prosequemur in tractatu de Colica.

DE DOLORE COLICO. Cap. XXX.

Hanc affectionem vocat. Celsus lib. 4. ca. 13. Passionem Intestini Plenioris: ante Celsum ignoro utrum aliquis Medicus Colici Doloris mentionem fecerit. Hoc quidem scio apud Hipp. nullibi Doloris Colici mentionem esse factam. Video propterea Celsum lib. 4. ca. 13. dixisse, Dioclem Charitium affectionem Intestini Tenuioris vocasse: cuius vocis quoque meminit Gal. 6. loc. aff. 2. dixit; Voluulum nonnullis Chordapsum vocari: Passionem vero Crassioris Intestini, Coli scilicet inquit, Dolorem vocari: Ileum

alii vocarunt *χρόνος*: Sed quicquid sit de nominibus, Colicus Dolor est tristis sensus intestini. Defini. Coli cum retentione excrementorum, & quatenus haec affectio habet excrementa retenta, conuenit cum ileo, cuius retentionis causas iam retulimus neque illas repetam.

Locus affectus

Nomine autem Coli Intestini Dolentis intelligo membranas ipsas, tam internas, quam externas.

Causa:

Et hic Dolor ex solutione unitatis. Soluitur autem unitas à pluribus causis; propterea etiam plures sunt Doloris differentiae. Aliquando est flatu vel cauitate contentus, vel membranis inclusus: quandoque est humor multus, aut sex copiosus; nonnunquam humor acris, & mordax, vel falsus, vel biliosus: sunt aliquando vermes; nonnunquam Lapis inuentus, colicos dolores acerbissimos effecisse legitur. Auctores sunt Fernel. lib. 6. pathol. 10. Anton. Beniuen. de admix. cap. 9. Hollerius in schol. ad cap. 4. 1. de morb. inter. Est nonnunquam Inflammatio: Sed hac diximus in cap. de Voluulo siue de Ileo. Istæ materiz que Dolorem faciunt, vel generantur ex cruditate ventriculi, vel colliguntur, vel quia adstringitur aluus, vel quia transmittuntur, vel à capite, vel à toto corpore, vel ab alia parte determinata.

Signa

Videtur quidem hic Dolor cogniti facilis; est tamen difficilis. Habet enim maximam affirmativam cum doloribus Renum, ut propterea confiteatur Galenus 2. de loc. aff. 4. se dolorem Colicum existimasse esse Nephriticum. Sic tamē distinguuntur: Dolor Colicus aliquando est supra regionem rerum, habet vomitus potius simplices, quam varios, aluus medicamentis, aut clysteribus non respondet, & si quæ excernuntur spumosa sunt, quasi bouina stercora, & aqua supernatant; mobilis est aliquando Colicus Dolor: Contra vero in Nephritico vomitus sunt varij, pituitosi, biliosi, nonnunquam sunt supra umbilicū, & exiniectis clysteribus, deiciuntur feces naturales, nec tamen subleuantur patientes, præterquod quod ab initio tenues emittunt urinas, postea vero crassas, & fabulosas.

Causæ Doloris sic distinguuntur: Si fuerit flatu Dolor est tensus, murmuraciones & rugitus multi venter est inflatus, & percussus resonat in modum tympani.

Si fuerit pituita, facile cognoscitur ex habitu, & temperamento patientis, ex vita antea, ex urinis, crudis alui excrementis, spumosis albicantibus, &c. vitreis viscidis: in quo casu proprie ita etiam Doloris humorem docet. Est enim dolor, ut docet Galenus 2. loc. affect. 1. perforatius

visus. Dicunt patientes se quasi palum quendam A intestino infixum sentire. Et hæc doloris species illa est, quæ Galenum decepit; nam dolor hic vsque adeo fixus speciem calculi præ se ferebat.

Si dolor sit ex biliosis humoribus. Dolor est mor dicarius, adest sitis, amaritudo oris, alui excrementa sunt biliosa, quandoque febris adest, præces sit vsus aut dulcium, siue sint saccharata, siue mellita, aut acrium, & aromatum.

Prognostica.

Hic affectus multiplicem habet exitum, nam qui sit ex flatu aliquando desinit in Hydropem. Est sententia Hippocratis 4. aphorism. 11. Diurni dolores circa umbilicum in Sicco Hydrope desinunt. Qui sit ex flatu, vel pituita superueniente febre sanatur, ex eodem Hippoc. 6. aphor. 40.

Petratur quandoque in Paralyfin. Hoc notauit inter ceteros Paul. Æginet. lib. 3. ca. 18. & lib. 3. c. 43. 13. Post Æginetam Recentiores pluri mi illud ipsum obseruarunt: Et tamen Paulus existimauerit illam Colicam, quæ desinit in Paralyfin ex biliosa materia fieri. Recentiores tamen inter quos est Eras. lib. 4. suarum disput. cont. Theophrast. Paracels. existimauerunt, fieri ex pituita colliquata, & attenuata, quia hic affectus frigidis regionibus, vt Germaniæ, & Britannię communis sit. Denique desinit hic affectus in Arthriticam: quinimo mutuo aliquando se excipiunt hæc passionis Arthritis transit in Colicam, & Colica in Arthritidem. Hoc docuit Hippoc. 4. in 6. Epid. 3. Ex quo loco etiam si non colligatur nomen Colicæ, colligitur tamen affectio. Nam scribit Hippocrat. ille in colum dolebat superueniente arthritide melius habebat.

Curandi leges:

Procurandis Colicis occurrendum est & causæ & symptomati. Cum autem Causa sit vel calida, vel frigida: De calida nihil amplius dicam in præsentia; tota enim hæc curatio colligitur partim ex curatione Voluuli ab inflammatione oborti, partim verò ex iis, quæ dicta sunt de intestinorum torminibus, siue incipiente Dysenteria hoc vnum in præsentia repetere sufficiat: Colicum Dolore refrigerantibus quandoque tractari, idque fecisse Gal. 12. meth. 7. qui adolescentem Colica biliosa tentatū sanauit pisana, succo granatorum, aliisque refrigerantibus, & adstringentibus. Id ipsum colligere licet ex Paulo lib. 3. c. 43. qui Colicam proponit Epidemicam in conuulsionem aut paralyfin desinentem, quæ feliciter curabatur frigida potu, intybo, rیحorio, vno verbo, refrigerantibus.

Transco igitur ad frigidam materiam, quæ vel corpulenta est, vel flatuosa. Et corpulenta quidem, siue vitrea sit, siue mucosa, & crassa, sanatur attenuantibus, incidentibus, absterforiis, euacuantibus, caloricis & siccantibus. Flatuosa verò digerentibus,

Circa vsum Attenuantium accipiendum est Galeni consilium 12. met. 7. ne scilicet, præsentē copiosa materia valida attenuantia, vel intrinsecus vel extrinsecus omnia accipiantur.

Nam humorem attenuatum in flatum vertunt, sicque dolorem augent. Hanc ob causam in consulationibus meis sæpe dixi flatum à colore fieri non modò magno, sed etiam imbecillie, g. si pituita multa abundet; tunc enim flatus gignuntur, sint itaque attenuantia Oxy-mel, vel simplex, vel compositum, admisto etiam scillitico, syrupo de betonica, de mentha. Præbeantur verò hi syrapi sine diluto; nam si dilutum ex caloricis conficiatur flatum augebit.

In Clysteribus pariter admiscendum mel rosat. ipsum oxy-mel in eundem finem, & quando morbus dat inducias per duos, vel tres dies administranda sunt hæc præparantia: postea verò euacuandus est hic humor.

Euacuatur autem feliciter aut vomitoriis aut clysteribus. Vomitorium verò sic paratur:

Recipe Pulv. rad. asar. drach. i.

Oxy-mel. vnc. iij. M.

Præbete in Iuris vnc. vj. vel vnc. viij.

Sit Clyster talis:

Recipe Pulp. colocynth. in petitiā ligat. drach. i.

Flor. chamomel.

Aneth. Mellilot. an. P. i.

Puleg. Rut. Calam. lib. an. M. sem.

f. decoct. secundum art. facta express.

Recipe Præd. decoct. lib. i.

Hier. pro clyst.

Benedict. an. vnc. sem.

Mel. ros. Ol. rut. an. vnc. iij.

M. & f. clyster.

Possunt quoque medicamenta præberi per Os & si humor Leuioribus possit educi laudo supra modum, vt fortia dimittantur. Experiamini itaque vitrum sola hiera simplex, & mel ros. solut, possint id præstare.

Dabitur ergo Spec. hier. vnc. sem.

cum mell. ros. f. boli.

Deinde superbibatur Mell. ros. solut. vnc. vj.

Dissol. cum portione Iur. alterati cum sem. cit.

Sed quia difficilimum est Colicos Dolores patientes leuioribus purgare, idcirco ad Fortia deueniendum.

Scio quidem Leonhardum Fuchsin 2. paradox. parad. 14. improbasse purgantium vsum in Colica, forte quia vidit Gal. 13. meth. 1. prohibentem medicamenta purgantia in intestinis laborantibus: præterea, quòd videat eundem Gal. 12. meth. c. 7. in Colica vsum fuisse hiera tantum picra ex simplici aloë & aromatibus facta, additque neque Paulum, neque Aetium aliis medicamentis vsos quàm mitioribus & recentiores hunc purgantium vsum ab istis communiter vocatis Practicis accepisse.

His non obstantibus existimo aliquando purgantia valida esse necessaria; nam in Colico dolore duo hæc plerunque connectuntur Dolor, & Alui adstrictio insignis, vt neque clysteres validi, neque Lenitiua etiam si copiosa possint aluum subducere. Quid igitur tunc agen-

O 3 dum?

dum? Estne expectandus Voluulus? Si in Voluulo, in quo vires sunt imbecilliores, nemopurgantium vsum recusat, cur in Colica, vt præseruetur patientes à Voluulo, non conuenient purgantia? Profectò conueniunt, sed in materia frigida. Deceptus est Fuchsius, quia fortè legit Pauli, & Aeti, tantùm sententiam de materia calida, nõ frigidâ; nam Paulus loquens de frigida proponit Cataplasia, Euphorbium, Scaramonium accipientia. Aetius in eodem casu laudat hierâ Archigenis. Quomodo ergo asserit Fuchsius Pauli, & Aetium nunquam in Colica purgantia adhibuisse? Quod etiam subiungit hunc vsum esse à Practicis acceptum, ostendit illi aut non legisse, aut oscitanter legisse Arabes, apud quos omnes inuenientia probari Diaphanicon, Electuarum Indum, huius magnas pilulas purgantes, validas Itaq; accipienda sunt purgantia. Et ego, vt ingenue dicam, vno die plures Colicos seruavi medicamento sequenti.

Recipe. Diaphan. vno sem.

Spec. hier. vnc. ij.

M. & cum sacco. f. Poli.

Non tamen improbo illos, qui admiscunt aut cum oleo amygd. dulc. aut amar, trochiscos Al-handel ad gr. v. vel vj. aut præbent pilulam ex his confectam: postea dant vnc. iiii. olei amarat. & vnc. ii. dulcium. Quod si ad euitandam fluxus suspicionem accipimus Rhasis consilium, vt scilicet purganti medicamento aliquid opij adijciamus, hoc non improbat. Exempli gratia: Si volueritis præbere diaphanicum, cum hiera addatis Philon. Rom. an. recentis Theriacæ drachm. sem. Hæc autè purgatio aliquando pro dolorum magnitudine, & cūmacia secundo, & tertio est repetenda, interpositio duorum dierum, vel triū interuallo, quo tempore clysteribus & preparantibus est agendum.

Euacuata magna ex parte materia, flauis est discutiendus. Discutitur internis, & externis. Ex internis assumptis nihil præstantius Electuariò ex baccis lauri datur vnc. sem. Hera simplex, si quotidie ad drach. j. ex vino aromatico bismuthio etiam alterato accipiantur, multum prodest. Inuat Diacymnium, Diatriopiperon, Aromaticum rosatum, Theriaca antiqua. Pro agrestibus allium summopere facit, laudaturq; à Galeno in illo 12 meth. cap. 8. Omittit ius galli antiqui, cuius mentionem feci in super. lect.

Imponantur suppositoria, quæ sic parentur.

Recipe Cymn. anif. dauc. an. drach. sem.

Spec. hier. drach. i.

Mell. q. s. m. f. supposit.

Fortius agunt Clysteres, qui sic componuntur:

Recipe Semin. cartam. vnc. sem.

Cymn. Anif.

Fenic. Dauc. Sefel an. vnc. i.

Sem. lin. fenugrec. an. vnc. ij.

Ruc. Bacc. lauri an. drach. vi.

f. decoct. f. art. deinde

Recipe decoct. dicta lib. i.

Hier. pro clyst. drach. vi.

Elect. de bacc. laur. vnc. sem.

Ol. rut. laur. an. vnc. i. M.

A Loco decocti quidam, & benè accipiunt vinū maluat. alii vinam pueri, & profectò iuuat. Quādoque mitificè iuuant Clysteres, aut ex solo oleo vel rutac, vel laurino, aut addito castoreo, pipere, pyrethro ad drachm. i. pro singulo. Extrinsecas multa proponuntur. Mihi hæc sunt familiaria. Primum quidem fomentum ex fuscis milia riis, calfactis in vino odorato. Est medicamentum facile parabile, & præstantissimū, quo vnico, vt ingenue dicam, Colicos ex statu curare conueni. Feliciter quoq; adhibetur calidus cinis in scutella linteo contexta. Valet mitificè cucurbitula magna vmbilico appositâ, quam dicit Halen. in illo 12 meth. cap. 8. effectum facere in cantationi similem. Sunt quoq; fomenta humida ex decoctis similibus illi, quod proposui pro clystere. Sed inter cetera vidi etiam momento temporis Dolores curatos ex glomere filicrudi calentis impositi ipsi ventri. Sed qui plura voluerit aduersus flatuosam materiam legat Gal. 9. de comp. per loc. c. 4. à quo accepit Aet. & Rhasis.

C

De Symptomatis, hoc est Doloris ipsius per se curatione.

Symptoma, vt symptoma. Dolor scilicet, tribus modis superari solet: Anodinis, stupefacientibus, & agentibus à tota substantia.

Inter Anodina sunt fomenta, quæ per spongas, aut vesicas bubulas ventri adhibentur ex decocto malix, altheæ, chamomeli, meliloui, semine lini, & fenugreci, aut ex oleis chamomelino, amygdalino, & anethino. Adhibeantur quoq; omenta his oleis imbuta. Fiunt etiam snagia ex ouis, butyro, & oleo camomelin, vel anethino.

Fortiora adhuc sunt balnea totis corpori adhibita, herbis & prædictis seminibus alterata.

Fiunt quoq; emplastra ex farin. seminis lini, fenugreci, addito butyro, pingued. anatis, anseris, atq; oleo amygd. dulc. & chamomelino.

Si hæc non iuuent tunc stupefactoria conueniunt. Et de calida quidem materia nulla est dubitatio. De frigida existimant quidem Græcos in frigida materia opiata non admisisse; sed, ni fallor, decipiuntur; quando enim Gale. 9. de comp. med. per loc. c. 4. commendat Philonis compositionem, inter cetera inquit, illam recipere medicamenta, quæ crassos, & viscidos humores incidere, & attenuare possunt, atq; ideo Colicis omnibus opitulari; calidi enim humores attenuantibus, & incidentibus non egent. Itaque si vehementia Doloris urgeat, etiam in frigida materia ad opiata confugiendum est. Vult Galen. 9. de comp. loc. ca. 4. 12 meth. 8. opiatis & intrinsecis, & extrinsecis, & assumptis, & impositis, vel iniectis in sedem.

F

Assumuntur autem vel scrup. ii. vel drac. i. Philon. Rom. loco iam cit. descripti, aut tantundem theriac. recentis. Fit quoque suppositorium ex lana, quæ imbuitur spa, in qua dissolutum sit opium, aut fiunt clysteres, qui recipiunt decoctum papaueris albi, hyoscyami, mandragoræ, aut

in

in decocto, præcedit. descripto, dissoluitur opij A gran. ij. vel iij. aut drach. sem. Philo. Rom. aut recē ris Theriac. Ceterum sicut in causa calida opia- ta sanant symptomata, & causam, quia calidum succum refrigerant, & tenuem, ac mobile inra- sant, & immobilem reddunt, ita frigidam mate- riā laxant, & ad excretionem ineptam efficiunt. Itaq; statim corrigēda opij malitia epoto Castoreo ad drach. i. vel in potu vel in clystere.

Exuriscus umbilico apponi possunt hæc o- B piata, succo tamen Limonum, vel aceto acerrimo permista.

Neque prætermittantur illa, quæ à tota sub- stantia prodesse creduntur, ut est intestinum Lu- pi alligatum, vel ad drach. i. in pulvere exhi- biri. Laudatur quoque eiusdem Lupi sterces ex- siccatæ, & puluerizatum, & coxæ appensum, aut accipiantur ossa, quæ in eodem stercore reperiuntur. Laudant alij Galeritam vocatam v- nam, & in cinerem redactam ad drachm. i. Plu- ra vide apud Aetium, & Gal. lib. 9. comp. loc. 4. & C Holer. cap. de Colica.

Videtur Ratio.

Quod ad vidum spectat, hoc tantum mo- neo: In Colica ex succis biliosis tenuem vidum obesse, qui alioquin in frigida materia est apprime necessarius.

DE LUMBRICIS. Cap. XXXI.

Lumbricos inuenio Galen. aliquando Ελμινθες vocasse, nomine scil. communi ad Longos, & Latos Lumbricos, ut 13. meth. 17. & 19: ali- quando autem Helminthos nomine solum Tere- tem intelligit Vermem.

Differentia.

Antequam Vermium naturam & causas ex- plicem, quàm breuissimè eorum differenti- as vobis proponere decreui, ut sine difficultate apud Arabes & Græcos versari possitis. Quandoquidē si ad Hippoc. & Celsum respiciamus duæ sunt differentiæ; si ad Galenum tres; si ad Auic. modò tres, modò quatuor. Facile componuntur Scri- ptores. Vermium duæ sunt differentiæ; alii enim sunt Longi, alij Lati dicuntur, de quibus Hippo- cr. quarto de morbis. Hos Latos Hippocr. 3. A- phor. 26. vocat Ασκαρίδας, ita ut Lati, & Ascarides apud ipsum sint vna species: sed isti Lati ali- quando includuntur membrana, nonnunquam sunt disuncti, & nulla inuoluti membrana. Quā- do membrana inuoluuntur, hæc membrana ali- quando circumdat omnia intestina, & isti Vermes sunt exportecti secundum longitudinem huius membranae, ita ut videatur vnus morsu alium completi, & sic constituunt vnum corpus, quod aliquando excedit longitudinem 7. & 8. & 10, & 12. & plurium cubitorum. Et ego semel vnū vidi, qui decem cubitos excedebat.

Imitatur autem hic Vermis in figura & longi

tudine & planicie vittam, ut propterea vocetur Græcis hic Vermis sic compositus modò Taurina modò Κίρμα, modò Ελμινθες πλατεία idest Lum- bricus Latus, qui non differt à prioribus Ascaridibus, nisi quatenus illi Ascarides sunt sine me- brana, & disuncti, isti verò includuntur in hac membrana, & mutuo se tangunt. Gal. 3. aphor. 26. tertiā adiunxit Lumbrici speciem, sicuti & 14. method. 17. 18. & 19. Aliquando hic Latus Ver- mis dirumpitur, & excernuntur per intestina frustula, quæ æmulantur semina cucurbitæ. Nam Vermiculus inclusus est in portione membranae, propterea videtur quarta species Vermis, quem A- rabes vocant Cucurbitinum, at non est quarta species, est Lumbrici Lati portio, & Lumbricus Latus conflatus ex membrana & Ascaridibus: Propterea sicuti dicebam duæ tantum primæ sūt Vermium differentiæ, quæ tamen & tres, & qua- tuor dici possunt. Dixi primas, quia Vermis Lon- gus multas habet sub se specialissimas species. Dantur enim Vermes Longi, qui habent pedes; alij villosi sunt; quidam habent caput cum cor- nibus, ut potestis legere apud Marcel. Donat. lib. 6. ca. 26. Hieron. Taurinum in suo de Lumbric. ca. 13. Trincauel. lib. 9. ca. 10. Ant. Beniu. lib. 9. de ad mirand. cap. 2.

Vermis
Cucurbiti-
nimus.

Causa.

Lumbricorum propositæ differentiæ suas ha- bent causas, & generationis locos, tam in ge- nere, quàm in specie. In genere quidem Vermium sunt causæ materiales, & efficientes.

Materialis quidem putrida pituita, non quidē mucosa, aut vitrea propter insignem frigiditatē, neque acida propter eandem causam, quicquid in oppositum sentiat Nicol. Flor. & alij, qui ex a- cida pituita Paruos Vermes gigni putant. Id au- tem faciunt, quia cum putent, sed falsò, ut dictū est, quatuor esse Vermium differentiæ, (Volunt enim vnamquamque ex propria pituitosa mate- ria oriri) quatuor constituunt pituitæ species, Inspidam, Dulcem, Salsam, Acidam, ex qui- bus quatuor etiam inquirunt fieri Vermium species: sed sicuti falsum est plures esse quàm tres Vermium species, ita falsum est ex acida pituita Vermiculos gigni.

Causa efficiens est calor triplex. Innatus partis seu loci Putredinalis, Qui educitur ex materia pu- trescente, & Ambientis, qui cælestis dici potest. Causam omitto finalem; dixit enim Auic. ideo genitos esse in corpore Vermes, ut superfluitates intestinorum absumerent, & corpus à putredine vindicaret. Locus sunt Intestina. Non inficior etiam in ventriculo gigni posse: & quamuis Ga- len. 7. de loc. aff. 5. locum generationis Vermium dixerit esse Intestina, & 2. acut. 54. 24. ait ex in- testinis in ventriculum ascendere, loquitur de hac triplici Vermium specie; non tamen negat, quin Vermes alterius formæ, & figuræ & in ventricu- lo, & in aliis plenisque corporis partibus gignantur, ut ipsamet docuit experientia.

In specie: Vermes, qui Flauī sunt, ex matria pi- tuitosa bili commixta oriuntur, sicuti Nigri ex permissione succi melancholici, Rubri ex parti-

Causa fi-
nalis Ver-
mium ex
Auic.

ripatione ichoris sanguinei Villoſi ex admuſione pinguis, & vinctuoſæ materiæ, de quibus in lib. de Plica. Hac verò ratione facilè conciliatur Oriſus cum reliquis Medicinæ ſcriptoriſus; ipſe enim ſolus cenſet ex materia bilioſa, melancholica, & ſanguinea Vermes gigni. Si arbitretur abſque pituitæ fundamento Vermes gigni poſſe, decipitur: ſed ſi id tantùm velit miſceri alius humores cum pituita, non eſt à ratione alienum.

Locus etiã facit vermium diſtinctionem; nam Parui in recto inteſtino generantur: id ſit, vt ſcribit Auic, quia putreſcens materia ob continuum excrementorum exitum in multas diuiditur particulas, tot verò ſunt Vermes, quot ſunt particulæ humoris putreſcens diſtinctæ. Latus Lumbricus ſit in inteſtinis craſſis in tota coli longitudine. Eius tamen generatio eſt ex membrana inteſtini interiore ſeparata, & abraſa, vt voluit Hipp. 4 de morb. cui adhæren: Paul. & Aet. ſed gignitur illa tunica ex pituita inteſtino adhærente, & paulatim extirpata.

Teretes Lûbrici in gracilibus inteſtinis producantur, atque ideo facilè ventriculũ petunt. Horum numerus oritur. Auic. auctore, ex ſeparatione materiæ putreſcentis. Fit autem hæc ſeparatio propter iecoris attractionem, ſicut enim quotidie chylus pituitoſus generatur, ita quodidie iecur partem huius chyli ad ſe trahit (loquor autem nunc de crudo & pituitoſo) portio autem in inteſtinis remanet, quæ putreſcens in Vermem tranſit.

De Cauſis Mediatis.

EX his colliguntur cauſæ mediatæ: Vel enim augent pituitam, vel calorem, ſed putredinalem. De augmentibus pituitam nihil dicam in præſentia; omnes enim cauſæ, quas diximus ventriculi cruditatem parere, ſiue ſit intemperies frigida, ſiue morbi inſtrumentarij & communes, ſiue externus error in cibo & potu, & aliis rebus nõ naturalibus, dum pituitam augent, poſſunt Vermes etiam generare, ſi calor putredinalis accedat. Idcirco in pueris à dentitione ad pubertatem pluſimi ſunt Vermes, quia augetur cruditas, & propter abundantiam calidi humidi facilè putreſcit. Hinc dulcia, & pingua putantur vermes gignere, non quòd propriè hæc ſint materia (quanquã, ſi in multa copia accipiantur, poſſunt euadere materia) ſed quòd magna ex parte ad Vermium productionem concurrunt, vt quæ augent calorem humidum putredini idoneum. Idcirco in febribus etiam putridis facilè gignuntur vermes: Ipſi tamen non generant, quicquid hæc dere ſcribat Hippocrat. 4. de morbis, qui Lûbricos teretes parere ſcribit.

Signa.

IN proponendis Vermium ſignis vniuerſalia omittam, & in ſpecificis ſolum verſabor: Qui enim habet ſigna ſpecierũ, habet etiam generis.

Lumbrici igitur Parui cognoscuntur ex titillatione, & pruritus, ex tenefmo, quem circa rectum inteſtinum faciunt. Pruritus eſt quandoq; ita in-

gens, vt etiam animi deliquium vel conſulſio inferat: Apparent verò in excreis ſecibus illi Vermiculi plerunque.

Latus verò Lumbricus cognoscitur ex ingēuſame, quæ ad differentiam ſamis facta ob humores acidos, nõ habet vomitum connexum à cibo, & ad differentia illius, quæ ſit ab inanitione corporis, eſt ſine corporis macie. Hi igitur cibi maximã portionē ingerunt neque euomunt, neq; grauitatē, aut anxietatem villam ſentiunt; imò paulò poſt aſſumptum cibum iterum elurunt, pluries in die comedunt, & niſi comedant, in animi deliquium incidunt, dicuntque ſentire grauitatem & anxietatem circa Iecur, Ventriculũ, & Renes.

Vermes autem Longi cognoscuntur ex multiplici animahum, vitualium, & naturalium functionũ laſione. Læduntur functiones animales, quia ſunt conuulſiones, epilepſia, ſomni profundi, deliria, quandoque ſomni perturbati, vt in ſomno quandoque ſurgant, clament, nonnunquam dentibus ſtrideant, labium verò movent, quali cibum aſſumerent; oculorum palpebræ in dormientibus ſunt ſemia perterriti, tinnitus aurium, facies mutat colores; quandoque valde rubent maxillæ, paulo poſt pallescunt; dormientibus ſalua exſiccatur; vigilantibus ex ore profluunt: pulſus ſunt valde parui, & inæquales, myuri, ſeu deficientes, cordis palpitationes ſunt, lipothymia, ſyncope; adelloris fœtor, inappetentia, nauſea, vomitus, ſingultus, dolor, & anxietas, venter totus inflatur in modum tympanitidis, & ſicut in Lumbrico Lato quæ deliciuntur, liquida, & ſpumofa ſunt, ſic in Lûbrico Tereti exſiccata apparent; imò aduſtringatur: numeroſi enim Vermes excrementa omnia aſſumunt, & quia nauſeam & vomitum paſiunt, patientem non permittunt vj alimento,

Prognoflica.

ETHac de cauſa multi moriuntur: aliquando ſit, vt vermes ex alimenti deſectu non tantũ aſcenderint ad os ventriculi, imò ad gulam vſq; vt per os & nates exierint, ſed etiam interdũ, teſte Paulo, & Trincauelio, quod & ipſe obſeruauit in quodam puero Veneto, perforant totam abdominis regionem, & per illam excernuntur partē aliquãdo tamē pauci, & minores, vt ſcribit Auic, iuuant corpus, quia ſuperfluitate abſumunt, ſed hoc dictum intelligendum eſt extra febres. Nam in febribus, ſi in principio appareant, ſunt ſigna inſignis malignitatis, fugiunt enim à malignis humoribus, & tunc viui excernuntur; in augmento verò mortui educi conſueuerunt, & illi ſunt inſignis malignitatis indicia, quæ ponit ipſum Vermem extinguere; ſicque conciliantur inuicem Paulus & Aetius: Paulus enim, cū quo ſunt Arabes, ſcribit Vermes mortuos eſſe deterius ſignum, quam viuentes, Aetius ſcribit oppoſitum. Conciliantur, vt dixi, quia intelligendi ſunt de varia temporum excretionē; nam ſi in declinatione morbi educantur, bonum eſt ſignum, vt decuit Hipp. 2. progn. 17:

Præfatio.

Dum sermonem conuerto ad materiam medicam, loquar primum de præfervatione, deinde verò de curatione. Præfervatio a Vermibus in duobus est posita: Primo quidem in celebranda optima coctione. Secundo in abluendis detergendisq; pituitosis excrementis, quæ in intestinis colliguntur: Primum caput aliàs copiosè, mi fallor, absolvimus. De secundo dicam pauca. Eligenda sunt in alimentorum usum, quæ pituitam incidunt, & detergunt. Inter hæc est primum panis à fursutibus non probè mundatus, syntomitus propterea vocatus, sale, & feniculo conditus, sunt omnia salita, præcipuè verò oliuæ, & cappares, acetum omnibus modis convenit in æterariis, & condimentis, sicut & alia acida, ut succus limonum, & aranciorum. Idcirco convenit, vel syrupus acetosus, vel iulep acceptosum: In eundem usum faciunt acria, præcipuè verò coepam illam Ascolonium vocatam. Omnes Medicinæ scriptores laudant etiam usum sinapis, dummodo febris non ad sit. Cætera, quæ ad victum pertinet, possunt colligi ex capite de Cruditate.

Curatio.

Transeo iam ad curationem. Distinguitur curatio primo ratione loci, & specierum Vermium.

Nam Patui Ascarides, qui sunt in intestino recto, curantur potissimum infusione, illitione, & suppositoriis. Infusio fit in lacte: Illitio fit ex butyro, aut simpliciter, aut melli commisto: Suppositoria sunt pariter vel ex melle, vel ex butyro. His enim dulcibus, & vinctuosis libenter adharēt vermes. Fortius est suppositorium ex Larido: Quidam laudant etiam suppositoria facta ex resina aliqua, aut visco, ut Vermes abhorreant.

Latus Lumbricus curatur medicamentis euacuantibus, aut tantum interficientibus. Euacuantibus quando non ad sit fluxus alui: Interficientibus cum adest fluxus. Euacuantia sunt vel Clysteres, vel Medicamenta. Clysteres in Lato Lumbrico debent esse acres, & valentissimi contra quæ fieri oportet in Longis Lumbricis, qui à Clysteribus acerbis irritati ventriculum petunt, & prava inferunt symptomata. Sed in Lato Lumbrico nulum est periculum: Idcirco fiant clysteres ex decoctis interficientibus, & educantibus Vermes, gratia exempli potest fieri Clyster talis:

Recipe Lupin drach. i.

Distamn. alb.

Scord. Cret.

Absinth. marin. an. M. 1:

Marrub.

Hyssop. Matricar.

Colocynth. in petitis ligat. drach. i.

f. decoct. a. & facta express.

Recipe dist. decoct. lib. i.

bier. diacolocynth. drach. ij.

Mell. ros. Ol. camon. an. drach. iij. M.

Quæ assumuntur, debent quoque valida esse; neque enim Latus Lumbricus ad dulcia moue-

A rur aut à lenientibus educitur. Conveniunt itaque hiera magnæ, pilule fortes de hiera cum agathico, cochis, & alia electuaria, quæ Colocynthidè recipiunt. Quidam habent pro secreto huic pulverem.

Recipe rad. filic. fæmin.

Costi amari an. drach. ii.

Corallina. quæ est muscus marinus.

Matricar. Scord. Cretici.

Distaman. alb. Absinth. marin. an. drach. i.

Aloes Turbith. an. drach. f.

Colocynth. drach. ij.

Pulverentur omnia, & addatur saccharum ad pondus omnium. Huius pulveris ratione ætatis detur drach. sem. vel drach. i. vsq; ad drach. ij. aut in bolo excepto pulvere cum melle, aut in vino, vel iure.

Sed si alui fluxus adsit, neque clyster, neque medicamenta hæc locum habent. Idcirco tunc tantum agendum vel euacuantibus, quæ fluxum non augeant, vel interficientibus Vermes. Quæ euacuant præsentē fluxu absque periculo sunt aquæ thermales, præcipuè salitæ, siue rectucianæ, seu id genus alia. Iuvant & aliæ sulphuratæ, aluminosæ, & nitrosæ; neque enim tantum subducunt, verum etiam propter aquæ copiam Vermes intestino adherentē emolliunt, & separant, quod si aquarum copia non adsit, agendum interficientibus.

Quæ interficiunt, amara sunt vel acria, vel austera, vel salsa, vel acida. Sed in Lumbrico Lato, in quo pituita multa abundat, nihil melius amaris. Gal. 14. meth. ult. ad Lumbricum Lati laudat silicem fæminā. In eundē usum faciunt amygd. amara, præcipuè perficorum, absinth. illud marinum, scordium, costus, & alia quæ proposui in pulvere.

Ad Lumbricos Teretes conveniunt pariter vel euacuantia, vel interficientia, & hæc omnia vel sunt interna, vel externa.

Nota.

A Nte omnia illud moneo non placere mihi illud Galeni, & aliorum consilium, ut Vermes Teretes primum interficiantur, postea educantur; siam, ut intellexistis, quæ interficiunt, aut amara sunt, aut acria, aut acida, & austera. Itaque amara, & acria suo calore ledunt, & Vermes ita necatos in putredinem agunt, qui etiam sponte sua putrescunt: austera & acida pariter adstringunt, in Vermibus autem adstrictione non est opus, si alius vltra modum non fluxerit. Sed concedamus amara, & acria Vermes interficere, & nō officere; nonne melius est, si id fieri possit, quam primum Vermem educere, quam illum necare, & postea medicamentum exhibere, quod illū educat? Dicunt isti: ubi mortuus est, facilius educitur: hoc plerumque falsum est; nam euacuatio per tria medicamentorum genera fieri solet, aut per quædam dulcia, & lenientia; aut per agentia à tota substantia; vel per purgantia valida. Lenientia dulcia mortuos Vermes non educunt, dulcia ideo educunt vermes, quia alliciuntur, & simul cum

cum esca illa dulci, quae alui soluit, educuntur. A Quae agunt à tota substantia indiscriminatim, & viuos, & mortuos ducunt. Validiora autem purgantia sunt amara, ita ut vno & eodem tempore & interficere, & subducere possint. Frustra ergo praemittuntur purgantia necantibus.

Quae ergo leniendo subducunt sunt Cassia, Manna, Mel ros. sol. Diaprunis. Sed praeter ceteris omnibus celebratur Diaebeften, & experientia comprobatum est his fructibus, quos Myxaria vocant, vermes summopere delevari: eandem ob causam nonnulli concedunt oleum amygd. dulc. B quod lubricando agit.

Quae agunt à toto substantia sunt Cornu ceruinum, Cornu unicornu, Terra lemnia, Lumbrici terrestres exsiccati, & puluerizati.

Purgant autem electivè Agaricus, Turbith, Colocynthis, Bryoniae radix, Cucumer sylvest. quae omnia aliquando sunt necessaria ad debellandos multos, & malignos Vermes. Possunt autem in pueris parvis haec saccharo involui: propterea nunc in usu est semè fantonici saccharo incrustatum. Possunt etiam eodem modo saccharo condiri semen brassicae, Corallina seu muscus marinus. Ego etiam pueris pituita abundantibus feliciter plerisque exhibere consuevi trochiscatum agaricum in placentulis saccharo confectis. C vel cum iulep acetoso. His etiam pueris possunt propinari in panatella pilulae paruae ex aloe, aut rhabarb. in iisdem placentulis.

Sunt qui existimant Argentum viuum Vermes subducere multò melius, quàm alia medicamenta.

Plebeiae mulieres vruntur etiam & feliciter duobus cochlearibus lixiuii, & vno olei omphacini, & multum iuvat ad subducendos Vermes.

Clysteres in his casibus semper debet esse molles, sine oleo, & sale, sed duntaxat ex lacte sacc. & buryro. Quod si adsit fluxus alui, cum euacuatione non conveniunt, utendum, ut dixi, interficiendis: & si febris adsit praetermittenda actia, & amara, eligenda verò acida, & austera, ut succus limonum, citri, arantiorum, rhibes, granatorum, rosarum, rhois rubri, semen plantaginis, & ea, quae agunt à proprietate.

Denique extrinsecus quoque conveniunt interficiendis, & subducentia, siue sint epithemata, quae fiunt ex foliis Persici, & Absinthii conspersis aceto acerrimo super tegula calente, aut sint linimenta: Horum multae sunt formae, sed unica mihi familiaris.

Recipe Myrrhae, Aloes an. drach. j. f.

Fell. bouin. Succ. limon.

vel Acet. aterr. an. q. f.

M. & fiat Linimentum.

Imponatur autem & in parte ventris anterioris, & circa duodecimam spinæ vertebam. Omitto Theriacam oleum Monachorum S. Iustini, & alia apud auctores.

DE PROCIDENTIA ANI.

Cap. XXXII.

Cum de Intestinorum affectibus haecenus dictum fuerit, antequam ad Renū, & Ve-

sicae affectiones descendam, decreui eos affectus explicare, qui Ani vocantur.

Cum autem circa hanc partem musculi sint, & venae, idcirco varia contingunt symptomata, & morbi, alii proprii musculorum, alii venarū, alii totius partis. Ad musculos pertinet Procidentia Ani seu intestini recti, siue exitus Ani, & Inuoluntaria secum excretio. Ad venas verò duo affectus, alter spectat ad nimiam sanguinis excretionem, alter ad nimiam sanguinis retentionem. Ad totam partem pruritus, rhagades, condylomata, thymi, fici, aliaque vlcerata & fistulae, de quibus nolo prolixius disserere, partim quod in tractatu de Morbis Muliebribus de quibusdam dicatur, & quod potius ad chirurgum pertinet, & denique quia restant absoluerendi alii affectus, qui sunt maioris momenti. Itaque in praesentia agam de Ani exitu, & de affectibus Venarum Sedalium.

Quantum ad Procidentiam, est morbus in situinam Intestinum ipsum excernitur extra proprium locum, & pro arbitrio non potest introritti. *Procidentia Ani quid.* Est ergo Procidentia Ani inuoluntarius quidam exitus, & impedita retractio intestini ob imbecillitatem. Hoc vitium fit musculorum affectu, qui duo sunt in Intestino Recto, & ij quidem recti, quibus demandatum est hoc officium. Vbi hi sunt aliquo modo affecti, contingit hic affectus, afficiuntur paralyti, imbecillitate, & aliquo tumore.

Paralytis potest contingere in vertebis, & ipsismet musculis affectis. Gal. lib. 1. loc. aff. 6. in fine inquit, contigisse puero, qui viebatur artificio piscandi, &c. Fit etiam imbecillitas ex aliquo affluxu humoris pituitosi, & in pueris frequentissimè. Ex tumoribus denique, dum extendunt musculos, sunt in causa, ut vbi intestina extra missa sunt, indurentur musculi, ut non possint intrare rursus. Habuistis naturam & causas. *Causae.*

Quantum ad Exitum Inuoluntarium excrementorum, propriè pendet ex vitio musculi orbicularis, quem sphincterem vocant. Potest similiter vel paralyti affici, vel imbecillitatem incidere, vel vlcus acquirere. Paralytis patet ex causis iam propositis: similiter imbecillitas contingit propter intemperiem patris, affluxum humoris pituitosi: tertio causa magni momenti, quando non potest retrahere. *Causae exitus inuoluntarii excrementorum.*

Cum ergo haec sint causae, ad Signa me conuerto: Sunt unicuique conspicua. Si fiat propter paralytin, ceruissimum est in hoc calu nullum esse excretionis sensum, nec caloris, nec acrimoniae. *Signa.*

Si propter consensum vertebrae, praecessit ictus, aut alia violentia externa, & simul cum lésione huius partis aderit etiam laesio in omnibus propinquis.

Si fiat propter affluxum humoris pituitosi, cognoscitur, quia intestinum, vbi foras propendit, laxum est, repletum mucore pituitoso, & facile introritti. Si propter aliquem tumorem, tactu & visu deprehenditur. Si inflammatio, dolor insignis cum rubore: si absque inflammatione, non admodum insignis, & absque rubore. *Quan-*

Quantum ad inuoluntarium exitum excrementorū: paralyfin cognoscetis propositis signis; imbecillitatem, quod excrementa quidem retinentur, sed vix tamen: Vbi soluta vinitas intestini, minimè retinentur excrementa. Si præcessit fractura, patientes referent. Si exulceratio, notè apparebunt.

Prognos. Omnes isti affectus sunt difficilis curationis. Procidencia, quæ non potest amplius intromitti, difficilior, quam quæ potest. Exitus excrementorum inuoluntarius, quando sequitur fracturā, aut incisionem, est prorsus lethalis. Qui verò ex molliiæ, aut humiditate, omnino potest curari.

Curatio. Curatio igitur varia est pro varietate causarum.

Quantum ad paralyfin, paucis me expedito, quia pertinet potius ad tractatum de Paralyfi proprium. Si resolutus sit musculus sphincter, seu alii duo glandibus est agendum ex castorio, sinapi, sagapeno, euphorbio. Exempli gratia.

*Recipe sinapi drach. ss.
euphorb. gr. vii.
castorij
pipenis an. scrup. j.
Mellis scyllit. q. s.*

M: fiat suppositorum.

Poterit tungi hoc suppositorum aliquo oleo ex castoreo, ex piperibus, vel aliqua portione mithridati, aut theriaci.

Incisiones ex aquis thermalibus etiam prosunt.

Si facta sit propter nimiam corporis humiditatem, habita totius providentia, oportet deuenire ad localia, quæ habent vim calefaciendi intestina, intromittenda rursum, & prohibenda, ne rursum labantur, vt

*Recipe absynth.
menthe an. M. j.
rosarum M. ss.
coriandri preparati vnc. ij.
garyophyll. scrup. j.
myrrhe
thuris an. drach. ss.
gallarum non perforat. drach. ij.*

Bulliant in vino nigro austero, & fiat expressio: foueatur intestinum huiusmodi lotionē, & postea intromittatur hac ratione.

Accipiantur flor. raphi barbari M. j. ligentur isti in syndone, & bulliant in s. q. aut vini prædicti, aut etiam aquæ electæ. Postea ea ipsa syndone potenter paulatim intestina intromittere, & denique statim spongiam in vino austero, cum herbis propositis decocto, vel in senquēti, quod magis est, imbutam adhibere, vt

*Recipe fol. labruscæ
rboris rubri an. M. j.
caput glandium
nucum expressi an vnc. ij.
corticum granat.
hypocistid. an. M. ss.*

bulliant in vino austero, & expressio, spongia intingatur, & apponatur sedi.

Vt corroboretur intestinum, conuenit suffragatio ex seq. puluere

Recipe cortic. pinearum vnc. j.

myrrhe

thuris

picis colophonis an. vñ. ss.

pulueriscentur omnia; & hic puluis super prunas mittatur, & circa podicem recipiatur. Vtuntur nonnulli senecta serpentis exsiccata, & puluerisata, ex sententia Aetii.

Si prolapsum sit intestinum propter inflammationem tumorum, reuellentia & molliencia conueniunt.

Quantum ad reuulsionem, sit per venæ sectionem, cucurbitulas scarificatas, & non scarificatas, & per tenuem victum.

Foueatur pars hoc decocto,

Recipe fol. malue M. ss.

bordei p. j.

rad. altheæ vnc. j.

sem lini vnc. iij.

bulliant in s. q. aquæ ad consumptionem mediæ, & fiat expressio, s. fomentum.

Nimiam tamen refrigerantia, & astringentia in hoc casu non conueniunt: Sufficit vti anodyno, & mediocriter refrigerante, sale fuit propositum.

Quinimo linimentum huius conditionis,

*Recipe mucilag. psyllij
sem. cydo. an. vnc. j. ss.
olei amygd. dulc. vnc. ss.
viol.*

pinguedin. gallinæ an. vnc. ss. M.

Vbi facta sufficiens emolliitio, & ratione, quæ proposui, Intestinum intromittatur. Itaque de hac re sufficiant hæc: Nam quæ ex fractura, vt supra dictum, est insanabilis: Quæ verò non, huic infessio in aquis thermalibus potest magnum cōmodum præstare, nec solū infessio, sed & potius harum, quibus solis nuper sanavi quendam religiosum.

DE HAEMORRHOIDIBUS.

Cap. XXXIII.

Venio modo ad alium affectum, qui pertinet ad venas. Venæ Sedales Hippoorati & antiquis Mariscæ vocantur. 3. in 6. epid. text. 37. quanquam & Hæmorrhoidales vocantur, potius ab affectu, quàm propria substantia. Huiusmodi venæ duo affectuum genera incurrunt, nimiam sanguis effusionem, & nimiam huiusmodi retentionem.

Propterea apud Aetium duæ Mariscarum differentia inueniuntur, quarum alias vocat cæcæ, alias apertas. Per cæcæ intelligatis, quæ in tumorem eleuantur, per apertas, quæ sanguinem copiosum effundunt.

Omnes istæ venæ excitari solent ex aliqua sanguinis fluxione in apertis, sanguis ipse, qui fluit, excernitur. in cæcis, retinetur. Qui confluit sanguis, aliquando est sanguis pituitosus, melancholicus, naturalis, mixtus ex rubro, naturali, & melancholico.

Vbi confluit absque excretionē, constituit quatuor differentias, in quibus nihil excernitur.

Primas

Mariscarum due differentie.

I hemorrhoides quatuor differentie.

Primas vocant Hemorrhoides Vesicarias, secundas Morales, tertias Verrucarias, & quartas Vuales. Sumserunt has denominationes apud Arabes ex colore, & forma, quam contrahunt. Nam in prima specie tument iuxta vesicularum piscium. Secunda est, quae vocantur Morales, quae sic dicuntur propter figuram, & colorem mori. Nam amulantur fructum mori nigri, & excitantur ex sanguine naturali. Tertia est Verrucalium. Illae excitantur ex fluxione sanguinis atrii, melancholici, sunt minores, quam Morales. Quarta differentia est Vualium, quae amulantur grana vix rubra, partim ex naturali, partim ex melancholico sanguine. Itaque sunt Hemorrhoides coecae in hac differentia quadruplici.

Quod si excernatur sanguis, nominantur venae apertae. Excernitur autem per anastomosis, vel per diarethesin: non dico per diaporesin excerni. Anastomosis fit vel ex Quantitate, vel Qualitate sanguinis, vel utraque causa.

Ex quantitate, quando nimium abundat sanguis in corpore. Gal. in libr. de ven. sect. adu. E. talis sit. ca. 5 in fi. praeterea etiam sect. 5. aph. 33 ubi scribit Hippocrates, mensuris deficientibus sanguis ex naribus fluens, bonum: Inquit Gal. in comm. quod quidem sit necessarium eum, qui singulis mensibus euacuatur, sanguinem, &c. vide locum, non est sermo de excretionis sanguinis melancholici, sed illius, qui solet excerni per menses.

Fit etiam ex prava qualitate, quando sanguis est valde adustus, biliosus, melancholicus, vel nimis aqueus.

Remotiores causas potestis sponte intelligere. Ex quibus patent etiam loca, per quae hic sanguis excernitur: Nam potest excerni per tria genera venarum: vnum pertinet ad ramum venae cauae, alterum ad venae portae, aliud ad venae portae, quae iam inserta est in lienem.

Quod ex vena caua, patet ex sect. 5. aph. 22. lib. de ven. sect. c. 5, sed clarius ex sect. 6. 11. 12. 21. lib. 2. ad Glauco. c. 8. & lib. 6. de loc. aff. c. 1.

Aliquando tamen potest fieri, ut hic sanguis non possit permeare iecur, teste Galen. lib. 3. de caus. sympt. c. 2. Tertio loco per ramulum descendente in intestinum rectum, cum. 6. in 6. epid. text. 8.

Ex his quae dicta sunt, satis constat, statim esse Hemorrhoidem, & coecum, & apertum differentias, quarum aliae desumuntur à figura ipsarum, si de coecis sit sermo: aliae à substantia sanguinis, à loco, per quem excernitur, & causis propter quas, si de fluentibus.

Ex his etiam alia colligitur differentia Hemorrhoidum: aliae sunt verè symptomatice, aliae propriè criticae. Communi autem nomine etiam symptomatice dici possunt, quam rem alias etiam explicavi ex Gal. lib. de symp. differ. cap. vlt.

Et propterea hac ratione omnis fluxus sanguinis hemorrhoidum potest dici symptomaticus toto genere praeter naturam: sed tamen ut plurimum contingit, fluxionem quae dicitur symptomatica, secundum totam qualitatem esse criticam ratione temporis.

His sic statutis de differentiis, venio ad signa. Signa coecarum. Hemorrhoidum coecarum aliae sunt externae, aliae internae. Externae propriis oculis cerni possunt, ubi squamis piscium similes appareant ex sanguine bilioso; Vbi verò fuerint internae, deprehenduntur primo ex dolore, secundo ex difficultate egerendi feces, praeterquam quod si clysteres inficiantur, vel digitis tumor deprehendatur.

Apertae Hemorrhoides deprehenduntur quidem ex sanguine fluente, sed quia fluit aliquando ex intestino recto, aliquando ex aliis, ut thymis, oportet aliquam differentiam proponere. Si ex intestinis excernatur, fit semper cum aliqua excoriatione, & maximis torminibus, & non effunditur in magna copia. Contra ubi sanguis est Hemorrhoidalis, semper est excrementis permixtus; Aliquando verò fit ut post excrementa aperiantur venae sedales, & sic sanguis succedit. Si ex thymis, in tali casu vobis insipientibus partem manifestè apparebunt, huiusmodi excrescentiae, in cacumine sunt crassiores, in profundo tenuiores, exit magna sanguinis copia.

Oportet etiam distinguere causas huius excretionis. Si enim excernatur per diarethesin, semper aderunt etiam fluores mordicativi, & simul cum sanguine excernitur portio sanior.

Vbi nihil tale accidit, & sanguis sit floridus, signum est, quod per anastomosis. Praeterea cognoscetis, quod per anastomosis, ex insigni corporis plenitudine.

Cognoscetis autem excretionem fieri ex illis venis, quae ortum ducunt à vena caua, quod sint magis interiores, quam quae à vena portae, & hinc fit, ut sanguis, qui confluit ex liene, vel vena portae, constituat potius Hemorrhoides coecas.

Cognoscetis etiam affectiones, propter quas excernitur sanguis; nam si admodum atrox, contumendum est maximam copiam adesse, iecoris caliditatem, & obstructionem.

Quod si pituitosus, aqueus, & tenuis, ex vitata alteratrice facultate iecoris, & aliquando etiam totius corporis.

Si excernatur sanguis propter insignem acrimoniam, est valde ruber, & excernitur cum rubore, & subitò, & omnes habent iecur praecalidum, habitum corporis gracilem, & multa abundant bile.

Quantum ad signa, quae distinguunt sanguinè criticè excretum à symptomatico, duo sunt praecipua, tolerantia patientis, & excretio humorum, quae est proportionata humoribus in corpore redundantibus.

Prognostica alia sunt ad bonum, alia ad malum. Ad bonum desumuntur ex sanguinis qualitate, si excretus fuerit valde nigricans, ferulentus, solet potius prodesse. In hunc sensum Hipp. sect. 6 aph. 11. Hemorrhoides superuenientes infans, & nephriticis curant. Circa nephritin est dubitatio, nunquid reuera voluerit nephritin, an phrenitin, ut alii legunt. Ego non inficior, Hemorrhoides superuenientes phreniticis, magnū posse afferre iuuamen: sed posse de nephriticis intelligi, ratio persuadet; nam venae sedales renibus admodum sunt propinquae. Videte Hollerium in schol.

in scol. de Hemorrhoidibus.

De melancholicis certum est ex lib. 6. de loc. aff. c. 1. & multis aliis. Possunt etiam alios morbos curare, unde Hippoc. 3. in 6. epid. text. 37. eos, qui Mariscis tentantur, à multis morbis immunes esse asserit.

Quando huiusmodi fluxio est immodica, magna affert incommoda, Gal. libr. 2. de nat. fac. c. 8. si verò hæc tam graua mala non succedunt de-colorati. Et hæc sunt prognostica ab Hemorrhoidibus cæcis, seu retentis.

Nam ubi ex consuetudine fluxerint, & postea claudantur, magna mala infuerunt: succedit enim aliquando tabes, aliquando hydrops sect. 6. aph. 12. Succedit autem hydrops ob nimiam caloris suffocationem.

In curatione primum versabor circa cæcas, deinde circa apertas, Quantum ad cæcas, cum sanguinem copiosum, aliquando etiam prauum contineant, necesse est eum aut reuellere, aut de-ruare, aut ab ea parte euacuare, & expiare ab illo succo, qui illum efficit: deinde vitium, per quod fit hic sanguis, corrigere.

Quantum ad primum in huiusmodi casu considerandum in primis est, numquid huiusmodi cæcas Hemorrhoides necessarium sit prouocare, an sanguinem istum repellere, & reprimere. Ex vna parte multi, auctoritate Hipp. sect. 4. aph. 15. moti, existimant minimè conuenire apertionem. Scribit Gal. in fin. non esse assuefaciendum eis, quæ sit per Hemorrhoidas, euacuationis, ex quo videtur colligi, quod dictum est. Sed tamè ex alia parte certum est, naturam hunc sanguinis copiosum per has partes euacuare. Primum est auctoritas Gal. qui sect. 5. aph. com. 3. inquit, nō sanguinis euacuationē per nares tantum, verum etiam quæ per Hemorrhoidas sit bonam esse. Similiter in lib. de ven. sect. adu. Era. libr. c. 5. & lib. 9. meth. med. c. 5. ubi proponit curationem synochi, in qua necessarium est sanguinem copiosum euacuare, inquit Gal. antequam euacuetur sanguis per venę sectionem, esse perpendum, nūquid Hemorrhoides fluant.

Itaque in maxima sanguinis plenitudine, est contentus sola sanguinis euacuatione, quæ sit per Hemorrhoides. Ergo ubi natura habet aliquam ad hanc partem propensionem, dum abundat sanguis, ego consulo, vt mittatis ex hac parte. Auctoritas supra allata non est contra nos. Cum sermo est de assuetudine, non de vna, sed pluries repetita est intelligenda: Itaq; statim si mittēdū sanguinem aliquando per has partes. Dico aliquando. Si enim contingat, hunc, in quo fit huiusmodi sanguinis effluxio, periculum incutere nimis excretionis, in tali casu minimè consulo, mittatis per hanc partem, sed regellatis. Sed quando hemorrhoides nunquam talia intulere pericula, hydropem scilicet cachexiam, &c. potest fieri, vt sint adiuvandæ.

Adiuuari autem possunt variis modis, primo secta vena inferna, vel cucurbitulis scarificatis partibus infernis adhibitis. Alter modus est per quasdam frictiones. Possunt enim fricari hemorrhoides omnibus rebus asperis, folio ficus,

A. buglossæ, parietariæ, linteolo asperæ: aperiantur etiam quibusdam linimentis: & hic modus est facilior, possunt adhiberi illinationes. Linimentum potest fieri ex felle aliquo vel bubulo, vel taurino: cum oleo confectum ex amygd. dulc. Item ex succo capæ cum isto oleo vel cum felle. Item colocynth. infusa in ol. amygd. amar.

Si his non aperiantur, quidam solent aperire phlebotomo, sed existimo, quod melior modus sit per hirudines.

Sed si contingat istas hemorrhoides admodum dolere, vt non possint tractari remediis apertionibus, propterea tantum dolori consulendum est. Multa sunt: aliqui accipiunt medullam panis, & intingunt lacte, aliqui in iure pingui, & apponunt tepidum, aliqui accipiunt maluam coctam in oleo amygd. dulc. alij imponunt caput lactis, & immiscet aliquando aliquam portionem lithargyri vel cerussæ. Sed his prætermisiss, habeatis linimentum, quo ego vtor: felicissimo cū successu, vt

Recipe mucilag. psyllij

sem. cydon. an. vnc. j.

ol. de chrysomel. vel ros. completi vnc. ij.

pingued. gall. vnc. ss.

vitell. ouor. nr. ij. imponantur in

mortarium plumbeum, agitentur cum pistillo plumbeo per tres horas sub sole, & f. linimentū. Habet vim emolliendi, sedandi dolorem, & ex parte Hemorrhoides exsiccandi.

Hactenus de aperiendis cæcis Hemorrhoidibus fuit sermo, nunc de illis prorsus occludendis.

Si sanguis ex Hemorrhoidibus moderate fluat, & talis qualis debeat, nullo eget auxilio: Si autem nimium exsuperet, contra.

Quantum ad naturalem sanguinem, impediri potest remediis reuellentibus, refrigerantibus, incrassantibus, stupefacientibus, tam externi, quā interni.

Reuellentia multa sunt, in primis venę sectio ex vena superiore cubiti, vel ex secta saluatella, quod mihi magis probatur, prima die ad vnc. ij. vel ij. sequenti ad totidem.

In hac classe sunt cucurbitulæ scarificatæ, & non scarificatæ, scapulis, & lumbi, interdum ipsi iecori, & heni, aut vtrique parti, appositæ. Ligatura, quineuam supernaram partium, & frictiones.

Quantum verò pertinet ad remedia refrigerantia, ista sunt instituenda, quando effunditur sanguis ex Hemorrhoidibus, naturalis tamen, & benignus, propterea decoctum ex portulaca, plantagine, polygono, equisetis, mille folio, endiuia, soncho, epatica, &c. Omnes istæ decoctiones, quia refrigerant & sanguinem incrassant, prosunt. Si addatis altringentia, vt myrtos, tolas, cortices granatorum, shoen rubrum, gallas, &c. magis erit ad rem. Vbi autem hæc non proficiunt, efficaciora sunt pulueres, & pilulæ ex adstringentibus cum aliquo ex decoctis propositis, pulueres boli Armeni, terræ sigillatæ, imo omnes alix terræ possunt vsum adstringendi præstare, illarumq; dosis erit a scrup. j. vnc. j.

Linimentum.

Quomodo occludenda hemorrhoides fluentes.

Reuellentia.

Remedia refrigerantia.

Simi-

Similiter trochisci confecti ex huiusmodi ter A
ris, spodio, carabe, cum succo aliquo proposito in
pilulas redacti. Poteritis etiam accipere conser-
uam rosarum, ex cydoniis, sorbis, & addere ali-
quos pulveres ex adstringentibus: quinimo syr-
de ribes, myrinus, rosatus, de rosis siccis, de por-
tulaca cum decoctis prædictis.

Vbi verò neque hæc sufficiant, ad opiata est
deueniendum, ut philonium ad drach. fl. requiẽ
Nicolai a scrup. j. ad drach. j. istis addenda, quæ B
habent vim incrassandi sanguinem, ut oriza, ali-
cassia conquantur in aliqua aqua naturali ferra-
ta. Laudo etiam, ut in acetarius utantur portula-
ca sine aceto tamen, loco cuius accipiat ompha-
cium.

Ad victus rationem pertinent omnia, quæ ha-
bent vim incrassandi, ut sunt cerebella, pedesque
animalium gelatina vocata.

Externa

Exterius inungendæ partes, quæ ad lumbos, &
renes pertinent, refrigerantibus, & adstringenti-
bus; mihi placet ut æger perpetuò super dictas par-
tes contineat lintea madefactos in succo por-
tulacæ cum aceto & pulueribus adstringen-
tibus.

Localia sunt varia: In primis fomenta ex de-
coctione rerum adstringentium in vino aliquo
admodum austero, cui incoquatis ea omnia, de
quibus paulò ante memini. Præterea cortices
nucum inglandium, capulas glandium; imò pos-
sunt ipsi pulveres inspergi venis, sanguinem ef-
fundentibus. Laudo illud Galeni libr. 5. meth.
med. capit. 4. quod conficitur ex thure, aloë, al-
bum. oui; ut accipitur thuris drach. j. aloës drach.
ij. pulverisantur & subiguntur albumine oui, ex-
cipiuntur pilis leporinis, & imponuntur Et si pri-
us utamini lotiones, erit adhuc efficacius.

Si non proficiant, veteres efficaciora propo-
nunt, vitionem scilicet & sectionem: vitionem igne
actuali & potentiali. De hoc modo sermonem
habuit Hippocrat. seu auctor libri de Hæmorrhoi-
dibus circa principium, potestis locum legere.

Sed quando etiam hæc operatio nihil profice-
ret, non præter rationem esset, ubi Hæmorrhoi-
des externæ, & valde apertæ, si ignis etiam eidẽ,
quæ fluit, adhiberetur.

Uti.

Ducor in hanc sententiam, quia video, Hip-
pocratem eo loco & posteriores Medicos viros
esse medicamentis escharoticis, flore æris vsti,
melantheria, chalcitide, recentiores arsenico rubro
aqua illa fortissima, oleo sulphure, chalcantho
&c. Si itaq; hæc profunt, pari ratione proderit
& ferramentum ignitum.

Quod dixi de vitione, dico etiam de sectione,
quanquam à nullo hanc factam viderim: supe-
rioribus temporibus, nempe ipsius Hippocratis,
erat frequentissima.

Est dubium, utrum in secandis, vel vrendis
hæmorrhoidibus omnes debeant prorsus claudi,
vel una relinquende, quia Hippocrates sect. 6.
aph. 12. inquit, diuturnas sananti hæmorrhoi-
des, si non una seruetur aperta, periculum est fu-
turæ hydropis, aut tabis. Cui sententiæ adharren-
tes Gal. Paulus Aegineta, & omnes Arabes exi-
stima: uni, quod non ex toto supprimendæ. Unus

Aetius inter omnes aliter interpretatur, & omnes
intercipiendas contendit, ac propterea auctori-
tatem Hippocratis sic interpretatur: Si patiens non
mutet victus rationem, congruum est, aliquam
ex Hæmorrhoidibus relinquere apertam. Verum
si prorsus mutet victum, omnes sunt supprimen-
dæ. Legatis Hippocratem: 4. acut. in com. vlc.
proponitur curatio Hæmorrhoidum, ubi aperu-
simis verbis scribit, unam esse relinquendû &c.
vide locum.

In hac tamen difficultate dico, ubi sanguis,
qui excernitur, sit naturalis & probus, in hoc ca-
su existimo considerandum, num, patiens ex
mutata victus ratione, possit moderatum san-
guinem generare, nec ne. Si possibile, possunt
Hæmorrhoides omnes adstringi, nulla omnino
relieta. Sed ubi excernatur sanguis vitiosus, pro-
diens ex insignis complexionis vitio, difficile est
omnes reprimere atq; insigni corporis noxa i
Talis ergo erit curatio Hæmorrhoidum, ex san-
guine copioso, seu benigno.

Si effluat melancholicus, biliosus, aqueus, ne-
cessariû est, corpus ab hoc vitioso succo ex purga-
re, & ideo à sanguine melancholico, melanco-
liam educere.

Sed adest difficultas, quandoquidem fluenti-
bus Hæmorrhoidibus, ut vires aliquo modo deii-
ciant, si præbeas medicamentum, periculum est,
ne sanguis maioris copia profluat. Ideo quidam
ex Hippocr. sect. 6. aph. 47. de promunt, non so-
lùm aloë, sed omnia medicamenta posse Hæ-
morrhoides aperire, & per consequens etiã me-
lanagoga. Ideo idem Hipp. 4. acut. text. 11. in-
quit, & lege locum.

Sed tamen, cum non possint curari, nisi emen-
detur huiusmodi vitium, est necessaria euacua-
tio. Verum quia fieri potest per benigna & effica-
cia, consulo ut adstringentia eligatis, præsertim
in principio, ut sunt myrobalani cum cassia.

Facta hac expurgatione, est deueniendum ad
ea, quæ possint vitium corrigere, propter quod
hic sanguis prauus generatur.

Ideo curatur vino, theriaca, castorio, omnibus
deniq; medicamentis calidis & siccis.

Idem dico de medicamentis instituendis pro
pituita & bile.

Quæ sit ex sanguine pituitoso, requirit loca-
lia corroborantia, & exsiccantia Hæmorrhoides.
Accipiant vinum generosum, saluiam, mentham
hyssopum cum aliis adstringentibus.

Et hæc de vitii Intestinatorum, & Ani dicta suf-
ficient. Sequuntur affectiones Renum, & Ve-
sicæ.

DE RENVM ET VESICAE AFFECTI- BVS. Cap. XXXIV.

Frequentissimos, & ægrè admodum sanabiles
Renum, & Vesicæ affectus pertractandos su-
scipio, quos omnes ut breui methode perstringa
ad Vitam Mictionem referam, seu redigam,

De Adhione Depravata.

Visitur autem Mictio vel quia depravata est, vel quia subleata, aut diminuta. Depravatur autem Mictio vel ratione Substantiæ, vel ratione Quantitatis, aut Temporis, aut Modique; Symptomatis, aut Locis.

Ratione Substantiæ, quando excernitur Urina vel cruenta, vel purulenta, carunculis & squamulis referta, vel arenosa, & cum calculis, aut cum pilis, aut vermibus, aut alia substantia consimili.

Ratione Quantitatis, quando plus excernitur, quam oporteat, nam si minus excernatur ad diminutam pertinet. Mictionem, non ad depravatam.

Ratione Temporis, quando debito tempore non retinetur.

Ratione Modi, quando excernitur guttatim.

Ratione Symptomatum, quando educitur cum suavitatis dulcoris, & ardore.

Denique ratione Locis, quando eliacuatur per aliud foramen, quam per illud, quod est in glande.

Maxime expedit in presentia a prava Mictione ratione Quantitatis, & Temporis, & Modique.

DE DIABETE Cap. XXXV.

Mictio Depravata ratione Quantitatis, & Temporis potest sub Diabetis nomine comprehendere, dum modo duplicem constituamus Diabetem: Legitimam unam; Spuriam alteram.

Est autem Legitima Diabetis excretio rei potulenti, prorsus non mutata in Odore, Colore, & Sapore per vias longas.

Spuria Diabetis, quam Arabes Multitudinē Urinæ appellaverunt, est excretio urinae in tanta copia, quæ longè superat quantitatem rei assumptæ humide.

Causa legitima.

Vera Diabetis sicut optime Galenus docuit de locis aff. cap. 3. ex facultate Renum attractrice importune opus suum efficitur; Leditur tamen subinde etiam attractrix venarum totius corporis, iecoris, & oris ventriculi. Leguntur etiam expultrix, & retentrix Renum.

Porro leditur primo, & per se facultas attractrix; nam ut fiat Diabetis, requiritur hic ordo, ut Renes importune fugant ferositatem in venis contentam; venæ iam exsiccatae attrahunt à iecore, iecur pariter inanitum fugit ab ore ventriculi. Os tandem ventriculi exsiccatum multā requirit potionem, quam assumptam statim dimittit in Renes, non quod primo, & per se lesa sit retentrix ventriculi, & intestinorum, nā si adesset vitium retentricis, fieret Lienteria. Est enim, ut dicit Galenus cit. Lienteria, nō tantum cibi, quantum potus non mutatur deiectione. Si ergo res potulenta ita

sim ducitur in Renes, & emittitur per longum, nō est referenda causa in lubricitatem ventriculi, & intestinorum, sed in importunam iecoris, venarū & renum attractionem. Idcirco hæc affectio cum prius incipere videtur, est iam in statu. Quando enim potus immutatus educitur, multo antea venit totius corporis, & iecur fuerant inanita, & exsiccata. Sed ipsi patientes non possunt principium, & augmentum cognoscere, quia hæc attractio est opus naturale, & dum sit in venis, iecoris est sine sensu indigentia; propterea corporis molestiam non inferit. Contra quā in Lienteria contingat, quæ non potest esse in statu, nisi cognoscatur principium; est autem principium à colica affectione, & ab humida excrementorum deiectione.

Attractrix Renum importune fungitur suo officio propter solam caliditatem, vel cum materia, vel sine materia. Idcirco Avicenna in hac in parte non recipio, qui Diabetem fieri scribit ex frigida Renum intemperie, retentrice facultatem debilitante; nam ubi sit tanta frigiditas, quæ retentionem vitiat, desinit omnis attractio: at sine attractione nunquam fit vera Diabetis. Leditur autem cum attractrice expultrix, quia irritatur, lœnuitur autem vel à copia tantum, vel à copia & acrimonia rei potulenti, sicut attractrix lœditur, vel ex intemperie absque materia, vel cum materia salsa, vel biliola in Renū substantia imbibita, & impacta, siue hæc fluat ex iecore, aut à capite, vel cerebro, aut à toto corpore. Retentrix autem debilitatur, quia & venæ emulgentes, & Vasa Urina propter seri copiam ampliantur.

Causa spuria.

Spuria Diabetis est Mictio admodum copiosa, atque ideo fit ex errore in cibo, & potu. Est autem error vel in quantitate potus, vel in qualitate, ut cum bibuntur vina admodum diuretica, aut aquæ consimiles, aut cum cibi sunt admodum ferosi, aut diuretici: Augetur quoque, vel suppressa alui excretio, vel constipato corporis ambitu, vel colliquatis ichoribus, & humoribus in toto corpore, aut denique ex nimia iecoris refrigeratione. Et hoc animadvertitur, quia à nemine possumus esse, quod sciamus, iecore refrigerato Diabetem fieri. Ratio persuadet nam si fiat Hydrops, cur non possit fieri Diabetis? Quando iecur aquam gignit, non est semper necessarium, ut illa transmittat in capacitatem abdominis, & Hydroperu Ascitem efficiat; potest transmittere ad Renes.

Hinc puto Galenum, & alios vocasse hunc affectum *ispore* ut *quida* i. Hydroperu ad mactulam; quāquam alii veram Diabetem à nimia siti *Asphaxia* vocant; alii à nimio potu *Siphonem*.

Signa.

Ecillimè distinguunt Spuria Diabetis à Legitima; nam in Legitima præterquam quod excernitur

cernitur potius in odore, colore, sapore, immutatus: accedit etiam corporis arefactio, & sitis immodica. In Spuria Diabete, Urina, aut colore obtinet proprium, aut saltem est aqua: & si fiat ex errore in cibo & potu id habebitis ex relatu patientis: sic etiam sit fiat ex aluo adstricta, aut ex suppresso sudore. Quæ verò sit ex colligatione primo quidem cognoscitur ex febre, deinde ex urinis crassis, & oleosis. Quæ sit ex refrigeratione iccoris, habet signa Hydropis.

Prognostica;

Vera Diabete est semper periculosa deducitque patientes, vel ad febrem marasmoden, vel saltem ad marasmodum senilem sed eos, qui temperanter bibunt, deducit etiam ad iccoris obstructions insignes, fluxus hepaticos vniuscusque speciei, & tandem in iccoris inflammationes, ut ego obseruavi in quodam nobili Veneto, qui hoc morbo laborauit, qui cum multum supra modum biberet, citò omnia excernebat: tandem ex hoc morbo quem diuturnum satis habuit, obiit anno aetatis suæ 43. Laborauit autem toto vitæ suæ tempore hoc morbo; nam in prandio bibebat tringinta quatuor phialas vini.

De Urina Incontinentia.

Quia maximam habet cum Diabete affinitatem Urinæ Incontinentia idcirco antequam curationem Diabete aggrediar, paucis incontinentiæ Urinæ causas aperiam. Nunc autem Incontinentiæ nomine illam tantum complector, quæ sit sine acrimonia.

Differentia, & Causa.

Est autem duplex: Quædam Nocturna tantum, quædam Diurna & Nocturna. Prior pueris familiaris esse solet, & ex somni dūtaxat profunditate proficiscitur; in quibusdam verò adultis, sequitur musculi constrictorii imbecillitatem. Imbecillitatis causæ sunt intemperies frigida & humida. Quod si incontinentia sit Diurna, & Nocturna, quandoque sit ex primaria Vesicæ lésione, quandoque ex secundaria. Primaria est eiusdem musculi intemperies proposita, de qua meminit Gal. 4. de loc. aff. 4. cuiusdam Piscatoris exëplo, qui ex mora in aqua frigida in Urinæ Incontinentiam inciderat. Quandoque sit ex paralyti, aut ruptura eiusdem musculi, siue sit propter vulnus relictum ab extractione calculi, siue propter vlcus erodens.

Quæstio.

Dubium est: Virum laxatis fibris transuersis corporis Vesicæ fiat Urinæ Incontinentia,

vel ne? Ego cum Laurentio sum, qui censet hæc fibrarum laxitatem ad Incontinentiam facere. Frustra enim constitutz essent, nisi ad retinendam Urinam facerent, idque consilid fecit natura, ne rupto, aut resolutio musculo constrictorio tota simul fuere Urina; nam eisi finat resolutio musculo; retinetur tamen aliqua pars, si fibræ proprium robur conseruent: Per consensum, & secundario emittitur Inuoluntariè Urina, vbi Vesica comprimitur, vel à luxatione vertebrarum, vel à tumore hæmorrhoidum, intestini cæci, vici, & abdominis.

Signa Causarum.

Cognoscitur facillè affectus; & causæ sic distinguuntur: si sit intemperies, excernitur quidem Urina Inuoluntariè, sed aliqua ex parte retinetur, neque abolitus est excretionis sensus.

In paralyti effluit sine villo sensu.

In ruptura ita excernitur. Inuoluntariè, ut patitèntes sentiant illam proximè exeuntem, sed non possunt retinere, præcessuque incisis propter calculi suspicionem.

Compressio si fiat, oportet obseruare virum laxata sit vertebra: virum adfit, tumor, vel dolor circa rectum intestinum, aut circa vterum, & infimam abdominis regionem.

Prognostica;

Hæc incontinentia si paralyti & rupturam sequatur, insanabilis est: quæ verò sequitur intemperiem non difficilè curatur.

Curatio Diabete.

De materia & auxiliis nunc dicam, primò: quæ de Vera Diabete erit sermo. In qua parte cogor recedere à Græcorum omnium, Arabum, & Recentiorum sententia. Primum quidem certum est distribui hanc Diabete causam in euacuationem, reuulsionem, alterationem, & constrictiorem.

De Sectione Vene.

Quod ad euacuationem & reuulsionem pertinet, scribunt omnes, si morbus sit in principio, secundam esse venam; sed iam dictum est ex sententia Gale. 6. de loc. aff. 3. hunc affectum quādo nobis videtur principio, esse iam in statu, & cum est in statu, totā humiditatem serosam, quæ in venis, iccore, & ventriculo continebatur, iam esse assumptam; alioquin neque sitis, neque attractio rei potulentæ impetruatur fieret. At verò in hoc casu corpus iam est gracile, & siccatum:

Sanguinem mittere venis iam exsiccatis consulum esse non duco. Neq; quis obiciat: Euacuato sero relinqui sanguinem in venis. Fateor relinqui sanguinis portionem: sed ubi deficit serum, necessarium deficit & sanguis: nam serum ideo admiscetur sanguini, ut illum in omnes corporis partes distribuatur: tolle serum, tollitur distributio. Adde quodd cum magna pars sanguinis fiat ex repotulenta, si id, quod bibimus, statim excernitur per lotium, non potest verum in sanguinem.

Itaque in Vera Diabete nunquam conuenit sanguinis missio, quicquid sentiant alii.

De Vomitu.

Proponit Aetius in presenti casu Vomitum factum post largam aquæ potionem statim ab ipso potu. Hæc operatio mihi nullius frugi videtur. Quid confert hic potus statim assumptus & reiectus, nisi ut os ventriculi refrigeret, & humectet, deinde, si quis est, humorem euacuet: sed affectionis essentia, & origo non est in ore ventriculi. Iam vos docui ex Galeno Renes esse illos, qui liquorem appetunt, & importunè trahunt, os ventriculi ex accidenti, & secundariò afficitur: itaq; hic Vomitus nihil iunabit partem affectâ.

Si quis dicat: In ventriculo falsam pituitam contineri, quæ in Renes delapsa affectionem augeat: In eo casu vomitum admitto; de hac autem re Aet. ne verbum quidem.

Si quis dicat: hunc Vomitum reuellere etiam biliosum humorem à Iecore in Renes fluentem, nihil dicit: nam potus frigida statim eiectus non potest bilem à Iecore in Renes fluentem reuellere, vel in ventriculum ducere, & expurgare.

Itaque unico casu excepto, cum scilicet abundantur pituitæ falsæ est in ventriculo. Vomitus hic non probatur. Dixi (hic Vomitus) nam si vitamur aliquo Vomitu appropriato ad attrahendos humores in ventriculum vel falsos, vel biliosos, ut diuertantur à Renibus, hoc facillè cõcedo. Idcirco vel aqua hordei cum succo raphani, vel cum puluere asari, vel simili probatur.

De alijs Auxilijs Euacuantibus, & Reuellantibus, &c.

In eundem usum laudo clysteres, & medicamenta aluum subducentia, sed benigna, ut ex reuacuat corpus magis exsiccetur. Talia sunt cassia, tamarindi, manna, syrupus, & mel rosat. solat. diaprunis, diacatholicon, electuar. lenitiuû, & alia huiusmodi: Aretæus hanc sententiam Aetius, & Arabes accipiunt. Laudant quoque usum medicamenti Sudorifici, ut diuertant materiam à Renibus in corporis ambitum. Sed hæc quoque operatio mihi suspecta est: etenim vel in corporis ambitum ducere volunt serositatē iam in Iecore contentam, aut rem potulentam nuper ebibitam: Serum perfectum in Diabete non potest educere, quia in venis non adest, cum sint exsiccata, in Iecore non sit, igitur utrahent rem

immutatam potulentam scilicet. In Iecore enim serum non retinetur, sed multo deterius est. portiones immutatas distribui in omnes venas, & totum corporis ambitum, quàm statim per lotium educi.

Itaque hæc operatio Sudorifica mihi suspecta est. Quod pertinet ad Diuretica seu urinas mouentia, consentiunt omnes nullo modo, quæ urinas mouent in hoc affectu conuenire, neque frigida, neque calida. Sed si sunt affecti Renes falso & acri humore imbuti, qui fieri potest, ut impacta materia expurgari possit, nisi medicamentis urinam mouentibus vitamur: Prohibet quidem Galen. 13. method. cap. 11. ne in affectis Renibus moueamus Urinam: sed hoc tantum intelligit, non esse ducendos humores, qui albi sunt, in illam locum. Nullibi tamē docuit, impactum humorem per eundem locum non esse ducendum.

Itaque præmissa reuulsione, & euacuatione per aluum quadam Diuretica frigida, & humida, subinde absterforia, & epicerastica conueniunt. Sunt hæc primo serum lactis, in quo, ubi opus est abstersione, incoquatur hordeum cum cortice capparis, & siliquæ fabarum: si opus sit maiore abstersione, addatis etiā amygdalas amaras, aut lupinos, aut eruum; nam hæc valenter deterguunt. Facta deterfione, opus est & refrigerare, & demulcere humoris acrimoniam, id præstat usus lactis asinini. Post usum lactis conueniunt quoque frigida, & adstrictoria, ut vasa dilatata adstringantur, quales sunt aquæ ferratæ, aquæ destillatæ ex polygono, symphyto, consolida, portulaca, plantagine, aut ex decocto rosarum, acaciæ, myrtillorss, aut ex succis granatorum rhibes, berberis. Hæc proponuntur quidem ab Arabibus, sed sine distinctione, quæ tamen si tunc exhibeantur, cum Renes materiam adhuc vitiosam continent, affectum augebunt, non autem curabunt.

Notandum.

Denique moneo de Cydoniis, quod est memoratu dignum: Scribit enim Auic. Diabetem facere, & tamen frigida sunt, & stiptica; neque apud ullum inueni scriptorem, Cydonia habere hanc facultatem, nisi apud Ioan. Pascaliū, qui scribit in sua methodo de curandis morbis ca. 50. Alfonsū Neapolita. Regem per usum Cydoniorum in Diabete incidisse. Conueniunt & balnea aquæ dulcis, & linimenta super Renes, quæ habent vim refrigerandi.

Et cibi frigidi, & crassioris succi, ut alyca, & oriza, pedes, & cutes animalium, & cerebrum; vno verbo in crassantia.

Contra verò in Mictum Inuoluntario propter refrigerationem Vesicæ & musculi, conueniunt infusiones in aquis thermalibus, aut fomenta ex vino generoso, in quo bulliant calamentum, origanum, thymus aliqua portio sinapis, & castorei, fiatque inunctio post fomentum ex oleo casti, no theriacæ admixto.

Inter Pravas Mitiones est quoque Purulenta, & Cruenta; Vtraque verò fit aut ex Renibus aut ex Vesica. Nomine autem *Renum* complector etiam Vasa Urinaria, & Seminaria. Nomine *Vesicae* & corpus Vesicae, & Collum, & Penem complector.

Aliquando autem fit ex partibus supra Renes ut icore, liene, thorace, venisq; totius corporis: Hoc docuit Gal. 6. de loc. aff. 4. confirmantque posteriores Medici plures, ut Marcellus Donat. B lib. 4. histor. mirab. c. 25 Huler. & alii plurimi. Pus enim urinae mistum duas ob causas excernitur, vel rupto abscessu, vel facto ulcere, & sicuti abscessus plerumque sequitur inflammationes; ita vlus fieri consuevit vel ex calculo, vel ex humoribus acerbis, & falsis, vel ex assumptis cibis, potionibus, & medicamentis id genus, ut propterea scribat Matth. de Gradib. 9. ad Almanfor. par. 2. commen. 18. se quendam vidisse ex immoderato alii usu in ulcerationem Renum incidisse.

Sanguis autem vel excernitur per diapedesin C vel per anastomosin, vel per rupturam, aut colliquationis modum, aut denique per erosionem, de qua iam dictum est. Diapedesis fit aut aperto aliquo vase minore propter tenuitatem, & raritatem vasis, aut fit propter eiusdem sanguinis tenuitatem.

Fit verò sanguis tenuis, ubi icur fuerit infirmum gignatque ichorosum sanguinem. Renes pariter infirmi ob intemperiem frigidam, dum non segregant serum à sanguine urinas istas emittunt, quae loturam carniū amulantur. Huius affectus meminit Galen. 6. de locis aff. c. 13. Et quamvis Fernel. lib. 3. sup. pathol. c. 13. nunquam putaverit sanguinolentam reddi Urinam ex infirmitate altera tritice icoris, nisi etiam Renes sint affecti: nihilominus ratio est in oppositum; nam sicuti illis intestinis fit fluxus hepaticus lotiuus; ita illis Renibus potest fieri Urina, quae loturam carnis amulatur. Hinc puto docuisse Galen. 1. ad Glau. 7. in quotidianis exquisitis, in quibus copia pituitae in toto corpore redundat, Urinas aliquando rubras esse, non aliam ob causam, ut consideravit Martin. A K A K i a in com. eius loci, quam E ob infirmitatem altera tritice icoris non separato sero à sanguine.

Anastomosis fit magno aliquo vase aperto, vel à sanguinis copia, vel ab acrimonia, vel ab utraque causa.

Ruptura fit vel à causa externa, vel interna, Externa est casus, percussio, vulnus, saksus, Interna est status copia, sanguinis imperius.

Colliquatio fit à causa calida, vel cum inflammatione, vel citra.

De causis erodentibus iam dixi: idcirco ad signa conuertere sermonem oportet.

Signa.

Primò distinguendum est Pus, & Sanguis ex locis supra Renes constitutis exentia, ab ex-

cretionem facta ex Renibus, vel infra Renes.

Primum quidem si Pus & Sanguis ex locis supra Renes exeat, aderunt signa istius loci affecti. Nam si thorax fuerit, praecessit pleurisia, vel peripneumonia, vel adest empyema: si fit icur, praecesserunt pariter signa inflammationis, & abscessus icoris. Quando autem effluit sanguis, vel ex icore, vel toto corpore, habet quosdam determinatos circuitus modò mensium, modò hebdomadarum, corpus est plenum, suppressi sunt menses, euc haemorrhoides, & sanguis excernitur est adeo Urinae mistus, ut non subsideat.

Quòd si fiat ex Renibus Puris aut Sanguis excretio, permiscetur quidem Pus, & Sanguis cum Urina, sed paulò post mitionem, utrumque hoc corpus subsidet: praeterquam quod si Pus ex Renibus excernatur, aderunt signa abscessus, vel ulceris Renum.

Sunt autem signa abscessus grauitas, & dolor circa lumbos, horror quidam, febris lenta. horis vespertinis exacerbata, & dum tumpitur abscessus, multum puris effluit ad differentiam vlceris, & hac expurgatio menses, & annos durat sine interuallo ad differentiam Puris excreui ex partibus supra Renes.

Quòd si fiat ex vlcere, adest dolor maximè ab usu acrium, & solidorum. Pus est mistum magna ex parte cum Sanguine, interdum tamen nec Sanguinem habet admistum, neque praecedentem. (potest enim Pus excerni vlceratis Renibus non praecedente Sanguine) Gal. 4. aphor. 75. scribit in Renum exulceratione tunc demum excerni Sanguinem, cum vas aliquod magnum, aut Renum cauto fuerit erola; sed in superficiali abrosione si quid sanguinis excernitur, non statim necessariò per lotium purgatur: potest igitur in Pus verti antequam educatur. Sed praetera vlceris Renum certum est signum, cum Urina caruncularum ejectio, quas scribit Gal. loc. cit. se nunquam vidisse; primo tamen de loc. aff. & sexto eiusd. 4. concedit illas cum lotio excerni posse.

Si Pus excernatur ex Vasis Urinariis, in modica admodum copia educitur, & dolor est insignis pertingens ab ilio ad pubem usque.

Si vlus sit in Vesica, sanies quae excernitur, statim post mictam Urinam subsidet, & valde foetida est, habetque aliquid mucoris, & squamulæ, quæ sunt vesicae portiones, simul cum Pure excernuntur, & dolor ad pubem pertingit. Hæc vidit Hipp. 4. aph. 81.

Si ex Collo Vesicae Sanguis vel Pus effluat, semper praecedat urina, & quando ex collo vesicae egreditur, maximum facit in principio mitionis ardorem, rubicundus est.

Qui fit ex Pene, effluit etiam citra mitionem; maximè verò exacerbatur tempore coitus.

Denique qui Sanguis educitur è vasis semina libus non nisi post immodicam Venerem apparet.

Hæc sunt signa distinctiua lucorum, & demòstratiua Vlceris cuiusque partis, iam facile apparent signa Diapedesis, Rupturae, Anastomosis, Colliquationis.

In Diapedesi Vrina est s. milis lotura carniū, A
& si fiat ex imbecillitate le. vis est tenuissima,
& post mictionem non subsi. et.

Si fiat ex Renibus, non est adeo tenuis, & sub
det. Hipp. 4. aph. 76. 77. Gal. ibidem in comm.

Si sit Anastomosis, cognoscitur ex plenitudine
corporis, amplitudine, & tensione venarum, &
quia excretio est cum iuuamento suppressi sunt
menfes, vel hemorrhoides, vel membrum ali-
quod est muulatum. Vnde Arateus 2. de causa &
signis diuturno. tertio. in his casibus retentionem
vrine cruentæ varia parere symptomata, vt mor- B
bum comitialem, &c.

Si fiat ex Ruptura, quando hæc habeat causas
extrinsecas, facile cognoscitur. Si causa sit in-
trinseca signum ruptionis proposuit Hipp. 4.
aph. 78. Quicumq; sponte Sanguinem Min-
gunt, his in Renibus vena rupta est. Gal. in com.
illud (sponte) interpretatur (repente) Nam re-
uera in nulla alia causa, aut modo sanguis mul-
tus effluit nisi interrupta vena. Rumpitur autem
repente. Idcirco igitur scribit Hipp. Qui sanguine
repente, &c.

Colliquatio cognoscitur ex vrina crassa pin-
guetudini mista, obscura, quæ in fundo, vt notat
Gale. 4. aph. 76. habet sanguinis portiones exsic-
catas, & induratas instar granorum orobi, aut
erut, & adest insignis calor circa Renes, aut
febris ardens,

Prognostica.

E Stque pessimum hoc vitium citò interficiēs
sicut alie omnes causæ præter anastomosi
potius chronicæ sunt; & viscera depaſto Renum
corpore insanabilia fere sunt. Ex ruptura magnū
imminet periculum propter sanguinis grumos,
qui circa vesicam concreſcunt; nam & Vrinam
prohibent, & ipsi grumi venenatam acquirunt
qualitatem. 6. de loc. aff. 4.

Curatio.

C Vratio Mictus Sanguinis & Puris varia est
pro causarum varietate. Si gitor fluxerit
Sanguis per diapedens, & ex apertione minoris
vasis ob intemperiem calida, curatur refrigeran-
tibus & adstringentibus. Galen. 5. meth. 6. de hac
meminit: Talia autem sunt aqua, aut succus po-
lygoni plantaginis, portulacæ, rosarum, rhois ru-
bri, hypocistidis, &c.

Si diapedes ex refrigerato Iecore, aut Reni- F
bus fiat, eadem est curatio quæ Hydropis ex in-
temperie frigida. Oportet enim serofum humo-
rem purgare, vel aluo, vel sudore; deinde Iecur,
Renesq; calefacere, pro qua re vide tract. de Hy-
drope.

Si fluat Sanguis per anastomosi, videndum

an fluor sit criticus, an symptomaticus: si illud,
vtrum habeat circuitus necne; si sit criticus, &
circuitus non aderit, permittendum est opus na-
turæ; interdum enim vtiliter Sanguis per hos lo-
cos expurgatur, vt etiam Pus, vt docet Gelen. de
Pure in Thorace contento 6. de loc. aff. 4. Si ha-
beat circuitus, tempore quidam accessionis non
est impediendus hic Sanguinis motus; nam, ait
Aretæus 2. de signis & caus. diuturn. 3. ex huius
Sanguinis adstrictione sequitur lumborum do-
lor, grauitas, dolor capitis, epilepsia &c. Consulo
tamen, vt interualli tempore omni ingenio ten-
etis Sanguinem hunc, aut reuellere, aut deriuare,
minuere, partes tam mittentes, tum suscipiens
res refrigerare, & adstringere; nam Sanguinis
per Vrinæ purgatio, licet sit critica, est tamē peri-
culosa. Potest enim hic Sanguis circa Vesicam
in grumos abire, & præter alia mala symptoma-
ta, ischuriam inferre.

Igitur ad reuulsionem conuenit venæ sectio
in cubito, cucurbitulæ partibus superius affixæ ita
cum scarificatione quàm sine scarificatione, liga-
tura, frictions, lotiones magnæ aqua calente sa-
dæ.

Ad deriuationem conuenit Hirudines appo-
nere venis sedalibus.

Vena
Sectio.

Cucur-
bit.
Hirudi-
nes

Quæstio.

D Vbium est: Vtrum in sanguinis Mictum
propter suppressos menses liceat venam in
pedibus secare? Videretur, quod sic; nam secta ve-
na inferna menses iuuat; ex alia tamen parte
trahit ad Renes & Vesicam, consultum enim nō
est Sanguinem ducere ad locum affectum.

Ego sic rem decerno: Vbi vterus magnū ha-
beat floris obstaculum, obstructionem veterem
scirrhosum tumorem, vel callosum, nunquam ape-
riendæ sunt venæ infernæ in suppressis mensib.
Sanguinis enim cum ad inferiores partes irrupe-
rit, effluet potius per patientes loco, Renes scilicet
& Vesicam, quàm per obstructos, compressos, &
densatos. Si possit Medicus aliis medicamentis
vteri impedimenta superare, tunc sectio inferna
rum venarum conuenit: Sublatis enim impedi-
mentis facile sanguis ad consueta redibit vias
& venas. Vbi enim non possunt tolli impedimē-
ta, laudo vt ipsis venis hemorrhoidalibus Vteri
sanguisuge affigantur.

Ad euacuationem illam conueniunt quæ au-
minuunt plenitudinem, aut tollunt humores a-
cres, qui sunt causa apertionis venarum. Tollitur
plenitudo & per se, & per accidens. Per se cum
sectis venis, vt dictum est, tam medicamentis
purgantibus, quæ varia sint pro temperamenti
varietate. Minuitur verò per accidens tenui, &
attenuante viâ ratione.

Igitur in Anastomosis ex sanguinis copia inter-
dicuntur omnia dulcia, multi alimenti, vt carnes,
oua, & grossum vinum: Conceduntur autem pi-

sces humidi, fructus, olera frigida, aquæ chaly- A
beate potus.

Si humores sint acres, euacuandi sunt refrige-
rantibus cassia, tamarindis, Syreppo ros. solut. se-
rodec. Refrigerantia in crassa sunt idem serum,
aquæ distillatæ, sonchi, endiuiz, nymphaeæ, plan-
taginis, aquæ medicatæ minerales, ferrea.

Extrinsecus conueniunt balnea ex aq. dulci,
aut simplici, aut herbis frigidis alterata, aut somē-
tum ex succis semperviuui, solatri, plantaginis, por-
tulacæ admisto aceto. Debent hæc omnia frigida B
administrari. Nam omnia medicamenta frigida
sunt calefacienda exceptis iis affectibus, in qui-
bus sanguis aut fluit, aut fluxit. Adstringentia
iam dicta sunt in diapedesi: Nunc autem for-
mulas quasdam proponam ut modum admini-
strationis habeatis.

Poteritis ergo medicamentum sic componere;

Recipe Succ. hypocis. densa. drach. ij.

f. boli deaurati. Dein

Recipe aq. pol. ig. plantag. an. vnc. iij. misce

Dentur primo boli, mox aquæ bibantur. Aut.

Recipe Crochis. de charab. drach. i.

cum succ. plantag. f. pil. 3. de aurat.

quibus superbibantur dictæ aquæ: aut

Succ. aquiset. plantag. an. vnc. i. f. M.

Idem præstabit pulueris lapidis hæmatidis
vnc. i. cum succis vel aquis propositis. Ex facile
parabilibus est puluis mori rubri immaturi, florū
granatorum, cubebatum, glandium, corticum o-
uorum, abiecta interiore pellicula. Horum qui-
dus ad drach. i. exhibitum cum aquis vel succis D
valentissimè adstringit.

In Fluxu Symptomatico etiam fluxionis tem-
pore agendum, atque ideo omnia reuellentia, de-
ruiantia, euacuantia, & alterantia tam interiora,
quàm exteriora conueniunt, ut supra de his me-
dicamentorum generibus est dictum. Hoc vñ
notandum, cuius Gal. 4. meth. 6. meminit, ne fri-
gida exteriora parti læsæ adhibeantur corpore
ad huc pleno; sanguinem enim ab externis locis
ad internas partes pellunt, & fluxiones augent.
In reliquis eadem est curandi ratio, quæm nu-
per proposuimus.

In Ruptura opus est etiam reuulsione, & deri-
uatione: postquam conueniunt agglutinantia tam
interna, quàm externa;

Intrinsecus præberi poterit hoc medicamentū:

Recipe Tragacant. gum. Arab. an. drach. i.

Farin. amygd. drach. ij.

Succi consolida.

mille. fol. an. q. s.

Formentur boli & dentur drach. ij.

Postea superbibant patientes eiusdem succi

con solidæ, aut mille folii, aut equiseti vnc. iij.

Extrinsecus conuenit hoc genus linimenti,

Recipe Farin. volatil. molendin.

Fulig. furni. an. vnc. i.

Boli armen. sang. drac. an. drach. ij.

Album. ouor. n. iij.

Succi consolida.

portulac. an. q. s.

plantag.

M. Est sapius probatum.

Denique si fluat Sanguis, vel Pus propter vlcus,
primum est vlcus abstergendum, deinde siccan-
dum, & cicatrice implendum: Et si causam ha-
beat, causa tollenda est siue sit calculus, siue hu-
mor acris, & salus. Vlcus quod est sine causa, il-
lud est, quod relinquitur post ruptum abscessum:
Hoc quia est sine dolore, & valde sordidum, ab-
stergentia valida requirit: idcirco præmissa cor-
poris purgatione vniuersali statim transeundum
ad valida absterforia.

Recipe Hordei non decort. lib. f.

Amyg. amar. lupin. an. vnc. f.

Caryc. ping. an. viij.

Cort. rheb. drach. ij.

f. decoct. ad consumpt. medietatis, deinde.

*Recipe prædict. decoct. vnc. vi. quando vl-
cus sit in Vesica, aut vnc. iij. cum fuerit in Re-
nibus.*

Mell. ros. simp. vnc. ij. vel vnc. i. f. Misce.

Vbi Vlcus sit in Vesica, non modò augetur
dosis decocti; verum etiam per syringam iniici-
untur absterforia medicamenta; sed tentandum
prius est, ut Vesica ab Urina purgetur, & quàm
paucissimum bibendum est sique potus semper
absterforius, saltem aqua hordacea. In Vesicam
verò consulto. Auiæ ut ad absterforionem etiam li-
xiuium ex cinere quercus paratum iniiciatur.
Hæc verò faciendâ quando Vlcus sit sine dolore.

Quod si fiat ex Calculo, oportet primo Cal-
culum superare medicamentis, quæ illum edu-
cunt, qualia sunt lapis Lycitis, lapis Iudaicus,
vitrum combustum, & lithospermum. Non con-
ueniunt illa, quæ erodunt lapidem, quia erodūt
& vlcus: Neq; conueniunt vera Diuretica, quia
calida & sicca in tertio Vno verbo illa conue-
niunt, quæ vias laxant, acrimoniam temperant,
& minores Calculos subducunt. Tale est deco-
ctum ex capillis veneris, ex agrimonia, ex plāta-
gine, ex halicacabo, &c. de quibus suo loco, &
infra.

Si sint humores acres, agendum absterforij,
& epicrasticis, & nihil præstantius lacte, aut e-
quin. aut asinin. aut camelino. Probatum & serū
cum emulsione frigidorum. Probantur & aquæ
destillatæ ex siliquis fabarum, ex semine malux
ex semine alkekenge: Imò verò ipsæ emulsiones
seminum frigidorum, & maiorum, & minorū
ad vnc. iij. & iiii. mirificè conferunt: Deinde con-
solidandum vlcus, vbi adsit copia aquarū ferrata-
rum, quales sunt Villenses Calderianæ, Nostræ
Pataunæ Virginis, &c. nil præstantius istis: In de-
fectu istarum confugiendum ad aquam stillatit.
plantaginis, portulacæ, nymphaeæ, solatricum tro-
chiscis de spodio, terra sigillata, de carabe.

Quia aliquando in his Vlceribus Ardor Urinæ
est vsq;

est vsq; adeo ingens, ut patientes nunquam somnum capere possint, coganturq; sapissime minge-
re, in eo casu ad demulcendum ardorem, & do-
lorem, qui fit potissimum ex Ulcere Colli Vesi-
cæ, conuenit exterius hoc emplastrum.

Recipe Mucilag. sem. mala. psyll. an. drach. ij.

Ol. ros. compl. vnc. iij.

Succ. plantag.

Emuls. sem. papa. alb. an. vnc. ij.

Farin. bordei M. l.

Lactis q. s. M. f. emplastr.

Intrinfecus verò per syphonem iniiciatis emul-
sionem eiusdem papau, albi cum oleo viol. & ne-
pharino.

De Praua Mictione ratione Substantie.

Praua etiam dicitur Mictio ratione Substan-
tiae, quando in Vrina, aut pili, aut vermes, aut
gypsea, vel crystallina quadam materia educitur
aut deniq; cum Arenulis, aut Calculi apparent.
Primum affectum Graeci *πρωκτισμ*, Latini Ca-
pillitium vocant, eo quòd in Vrinis pili apparent
qui capillorum longitudinem emulantur.

Horum materiam celsus Gale. 4. aph. comm.
76. esse succum pituitosum tantum. Fernellius ta-
men, cui adhæret Christoph. Vega in còment.
de vrin. c. 4. vult esse materiam quoq; seminale.

Idcirco etiam de loco est aliqua controuersia;
nam Gale. loc. iam cit. concors cum Hipp. in illo
aphorism. vult gigni hos pilos in Renib. 6. loc. affe.
3. mutauit sententiam, & dicit produci in venis.
Actuarius, cui hac in parte adhæreo, lib. 1. de v-
rin. c. 1. inquit fieri in Vasis Vreteribus. Ferneli-
us autem, & Vega, qui existimant fieri etiam
ex semine, dicunt quoq; gigni in Vasis Seminariis.

Causa efficiens est calor exsicans, & conden-
sans vel pituitam, vel seminalem materiam.

Vermes autem, quos per Vrinam eductos ego
aliquando vidi longos admodum in quodam
Clarissimo ex Familia Cornelia, habent eandem
materiam cum pilis, sed à calore partim putrido,
partem natiuo, & coelesti in animal viuum con-
uersam.

Gypsea substantia, qualem ego semel vidi in
quodam religioso quotidie excretam in ea copia,
ut ipse posset efficere 4. & 5. pilulas magnitudine
illarum, quæ scrup. i. pòderare solent, albissimas,
habet pro materia gypseam pituitam, quæ ali-
quando in nodosa arthritide apparere consuevit.

Materia autem, quæ crystallum emulatur est
pituita vitrea.

DE ARENULIS, ET CALCULO.

Cap. XXXVI.

Transeo iam ad Arenulas, & Calculum. Are-
nulæ vel sunt in Renibus, vel Vesica: Vtraq;
verò habent suas causas, materiale, & effici-
uam, tam proximas, quàm remotas. Dicam pri-
mum de Arenulis Renum.

Harum materia proxima vel est externa, vel
interna. Externa est porus aquæ sabulosa, aut v-

sus conchiliorum, sabulum in se continentium.
Interna causa est vnusquisq; humor in corpore
consistens, bile & melancholia non exceptis. Na-
est bilis, & melancholia syncera in magnum nò
possint transire Calculum; possunt tamen exuri
& in cineres verti, qui deinde nihil aliud sunt,
quàm Arenulæ: Crassior enim cinerum pars Are-
nularum formam continet, leuior, & tenuior nò
quidem sub sidet, neque fundum petit, sed circa
fundum in modum corporum atomorum innat-
at. Hinc experientia obseruabitur per febres po-
tissimum circa finem, & hæc corpora atoma, &
Arenulas apparere.

Itaque harum causa efficiens semper est calor
exurens.

Locus autem quandoque sunt veng. ut pluri-
mum Renes.

Lapis autem in Renibus concreuit, aut minu-
tis his Arenulis concretis, aut primo & per
se ex disposita materia. Coniunguntur Arenulæ,
& quia retinentur in Renibus, & quia glutinosum
habent succum, illas inuicem connectentem. Re-
tinentur in Renibus, vel ex causa naturali, vel nò
naturali, vel præter naturam. Naturalis est angus-
tia ipsorum Renum, & Vasorum Vrinariu, quæ
est in causa, ut morbus fiat hæreditarius. Nò na-
turalis est durities, & siccatio in Renibus, & Va-
sis Vrinariis contracta propter senium. Hinc
Gal. 1. de tuend. val. 8. & 3. aph. vlt. Lithiasin in-
ter seniles affectus connumerat. Causæ præter na-
turam sunt intemperies frigida, humores omnes
comprimentes, obstructio, coalescentia post vlcus
vasorum, atrophia.

Agglutinatio in Renibus &c. retentis Arenu-
lis fit ab humore viscido.

Hic quoq; suas habet mediatas causas, quarum
alix humorem generant, aliæ illum ad Renes de-
ducunt, quædam deductum retinent. Generant
verò intemperies vel frigida, & humida, sine sic-
ca ventriculi, & cerebri, vitiaque coctio propter
errores externos. Inter quos præcipui sunt cibi
crassum, & viscidum succum generantes, ut ca-
seus, lacticia, placenta, pisces crustati, cartila-
ginei, partes animalium cutaneæ, & cartilagineæ,
vñus leguminum, fabarum, præcipue porus vini
crassi dulcis, aque impuræ.

Vnum hac in parte, quod mirabile videtur, si-
lentio præterire nolo, aquas nonnullas quæ extra
corpus nunquam gignunt Lapides in potu acce-
ptas statim in Lapides concrevere. Eas verò quæ
extra corpus Lapides gignunt durissimos in potu
assumptas Arenulas mundare, & Lapides sanare.

In prima classe exempli gratia est Aqua Padi
In secunda classe Aquæ Thermales plurimæ. Cau-
sam esse puto, quòd aquæ Lapidem generantes nū-
quam illum gignant nisi retineantur: Retinen-
tur verò cum corpus inueniant foraminibus ple-
num: talia autem sunt putrescentia corpora.
Vbi igitur aquæ istæ Lapidosum succum conti-
nentes in foramina illa intruduntur, & retinen-
tur, totum corpus saxum reddunt. Hinc licet
ynicuiq; videre folia putrida, fructus, & vermes

lignaue marcida in saxum conuersa: Imò verò A
in humanis corporibus inuentus est aliquando
Ren in Lapidem conuersus propter hanc causã.
Quòd si non retineantur aqua ista, tenuis sunt
substantia, præterlabuntur, secumque Arenulas
ducunt. Aqua verò, quæ extra corpus Lapidem
non faciunt, sunt crassa subtilis: & lutosaque ma-
teriam continent, quæ extra corpus propter aquæ
frigilitatem, & humiditatem exsiccati, & in Lapi-
dem versi non potest. In humano autem corpore
pars tenuior percolatur crassior remanet, & à ca-
lore siccata in lapidem vertitur.

Causæ, quæ mouent materiam ad Renes sunt
vel impellentes, vel attrahentes, vel suscipientes.

Impellentes sunt omnia calidissima verò om-
nia tum propria, tum impropria Diuretica: Im-
propria intelligo frigida. Attrahunt verò calor,
& dolor Renis. Suscipiunt denique Venæ Emul-
gentes iusto ampliores redditæ, siue à natura, siue
propter immoderatum potum, vsumque frequen-
tem Diureticorum.

Retenta igitur hæc materia glutinosa in Re-
nibus si inueniat arenulas illas simul iungit, hinc
que sit Calculus. Si verò adsint Arenulæ, hæc
ipsa materia à calore Renum siccata in Calculum
transit.

Est autem materia hæc viscida aut pituita, ut docuit Gal. 1. in 6. Epid. 6. Sunt autem pus
& pituita vel syncera, aut aliis humoribus mista
ut melancholia, bilis, ac sanguis, ut propter hanc
causã Lapides alij sint coloris fuscii, alij flauii, alij
rubri. Non quòd sola melancholia bile, aut san-
guine possit concreescere magnus Calculus; sed
quia humor viscido varia mistione miscetur. D
Dico, varia mistione, quia quandoque præualet
humor siccus ipsi glutinosus, & tunc materia La-
pidis dicitur lutosa, aliquando præualet pus, aut
pituita ceteris humoribus, & tunc proprie dicitur
succus crassus.

De Arenulis Vesicæ.

Non dissimili ratione generantur Arenulæ & E
Calculi in Vesicâ; aliquando enim Arenulæ
in Renibus genitæ, aut in potu, & cibo assumptæ
transplantantur in Vesicam; aliquando verò pri-
mario illis concreescunt. Id quidem negauit Fer-
nelius, qui existimauit, nullam esse primariam ge-
nerationem Arenularum in Vesicâ, sed prima ru-
dimenta ex Renibus esse; deinde verò paulatim
succrescere vitiosum humoris viscidum illis Are-
nulis, & sic magnum fieri in Vesicâ Lapidem. Sed
explosa est hæc sententia, & summa cum ratione
à Rondelet. 1. de morb. intern. c. 42. ab Holler. F
in schol. ad c. 48. lib. 1. de morb. internis.

De Lapide Vesicæ.

Vesicæ lapis non vnico tantum sit modo, ut
cenfer Fern. 6. pathol. c. 13. sed. itibus præci-

puit: Vnus est, quando ex Renibus aliqua Are-
nula crassior in Vesicam succedit, & descendit,
cui paulatim viscidus humor succrescit, & iuxta
positionem partis post partem in magnum transit
Calculum. Et hæc est Fernelij sententia.

Secundus modus est multis Arenulis, siue ex
Renibus decidentibus, siue in Vesicâ genitis ma-
teria aliqua viscida exceptis, & conglobatis.

Tertius modus est ex materia crassa, siue illam
luto similem esse dicamus, siue crasso succo; sit
inquam Calculus ex hac materia in Vesicâ re-
tenta & exsiccata. Retentionis causa est triplex:
Angustia orificij Colli Vesicæ: Concauitas eius-
dem, & Frigiditas. Angustia Colli Vesicæ est cau-
sa propter quam facilius in Viris, quàm in Mu-
lieribus, & magis in homine, quàm in brutis a-
nimantibus Lapis generetur. Mulieres enim rariò
admodum Calculum congregant propter Colli
Vesicæ breuitatem, & latitudinem.

Eandem ob causam scribit Arist. 10. problem.
42. problem. humanum genus Calculo esse obno-
xium; non autem bruta animalia, eo quòd orifi-
cium Colli Vesicæ in homine angustius sit; &
quàm in Galen. 3. in 6. Epid. 15. hanc reproba-
se causam videtur, qui scribit, in Pueris Calculum
vesicæ non fieri, quòd Orificium Vesicæ an-
gustum habeant.

Intelligendus est Galenus non absolute, sed
in comparatione ad Viros, quasi dicat, Pueros non
ideo Calculo laborare quòd Orificium Colli Ve-
sicæ magis angustum habent, quàm viros, non ta-
men negat quin absolute humano generi angus-
tum fuerit constitutum. Cervicis Vesicæ Orifi-
cium.

Secunda causa est Concauitas; nam cum mu-
ta sedeat materia in Vesicâ propter sui ampli-
tudinem, necessarium est etiam partem aliquam
semper retineri, quæ verò crassior facilius reump-
tur, quàm tenuis.

Tertio causa est Frigiditas; Frigiditas enim Ve-
sicæ est causa, quare substantia illa ex sero, &
crassis humoribus permista, quæ à Renibus in
Vesicam tota simul confusa transit, segregetur;
nam si utis ubi calor abundat, confunduntur, &
commiscentur crassa corpore cum tenuibus, ita
evanescente calore, quod crassum est subidet,
quod tenue, superstat. Hinc ratio, cur in Pue-
ris frequentissime fiat Calculus Vesicæ, rarissime
autem Renalis manifesta est. Scribit autem: Car-
danus comm. 26. 3. aphor. se in Puero semel tantum
Renalem Calculum obseruasse. Ratio est, quia
cum Pueri abundant calido innato, Renesque ha-
beant molles, tota illa crassa substantia, quæ ad
Renes transit sero permista faciliè per partes illas
molles ad Vesicam tendit, contra quàm in Viris
contingat, ut in superioris lectione docuimus. Cui
verò est in Vesicâ propter loci frigiditatem, ut do-
cuit Gale. in 6. Epid. 15. separatur crassum à tenui,
& tenue mingitur, crassum verò in Calculum abit.
Hinc scribit Hippocr. loc. cit. post Mictum Pueris
Con-

Concretio; quasi Calculum dicat fieri ex materia crassa, quæ in Vesica relinquitur post Mictionem partis tenuioris. Ex quo discursu, Auditores, potestis colligere, non fuisse Galeni sententiam, ut quidam existimant, Lapidem in Vesica fieri à frigiditate tanquam à causa exprimente tenuiorem humoris partem, & crassam relinquere: hic enim est effectus frigiditatis positiue ingentis, qualis in viuente corpore non adest. Frigiditas ergo Vesicæ ad separationem materię, & retentionem eiusdem facit non autem exsiccationē.

Exsiccatur hæc materia à causa calida, ut abunde docuit Hippocr. t. 1. com. 2. de natur. human. & confirmat Gale. in comm. 13. eiusd. lib. in fin. Et hæcenus de causis immediatis tam materialibus, quam effectiuis.

De materialibus mediatis dictum est in præcedentibus lectionibus; nunc de mediatis effectiuis. Sunt autem illæ, quæ calorem Renum & Vesicæ augent; sunt cibi, & potus acres, salsi, amari, aromatici, motus, Venus, balnea aquæ calidæ inunctiones, fomenta, & emplastra, somnus, seu decubitus in dorso. Vt omniam causas præter naturam, inflammationes scilicet, & alia id genus.

De Differentijs Calculorum tam in Renibus, quam Vesica.

Differentiæ Calculorū varix sunt, partim de sumptæ à quantitate continua, & discreta. Continua, quia alii sunt lapides magni, alii parui, alii mediocres. A' discreta, quia quandoque unus est, quandoque plures, duo, aut tres.

A' Colore, quia alii sūt fusci, flauī, rufi, cinerei.

A' Figura, quia nonnulli sunt triangulares, aut cum multis radicibus, nonnunquam oblongi, aliquando rotundi, quidam durissimi sunt, alij friabiles.

Quoad Locum, ex his, qui in Renibus sunt, alii in cavitatē, alii in Renum substantia impinguntur. Ex his, qui sunt in Vesica, nonnulli in cavitatē Vesicæ, alii in Collo, quidam in medio canali, nonnulli impacti in eiusdem colli Vesicæ carnosæ substantia.

Calculi Renalis signa Diagnostica.

Signa Renalis Calculi proponuntur, ab Hippoc. t. 1. in 6. Epid. 6. Horum vnumquodque nihil per se concludit. Primum est Dolor; at Dolor fit etiam ex flatu, inflammatione, & vlcere. Secundum est Vomitus præsertim à cibo; sed Vomitus nō semper in Calculosis succedit, sed tūc tantum, cum membrana Renū distenditur, aut irritatur; tunc enim fit Vomitus compatiēte ore, ventriculi, propter communes nervos sexu coniugationis. Tertium signum, Emissio Arenularum addatis rubearum ad differentiam Arenularum Vesicæ, quæ albæ sunt, hoc quoque signum fallax est, quia, ut docui in præcedente lectione, quædoque emittuntur Urinæ arenam in se continentes propter solam vñsignem humorum in venis

factis: accedit quod plerumque Calculus adest, & tamē Arenulæ non minguntur, vel quia Calculus genitus sit ex pure, vel quia substantia crassa, quæ non potuit Renes transire, statim in magnū Lapidem fuerit conuersa: Quartum signum est *Missio Cruentæ*: Sequitur hæc Mictio ad Calculū tantum aspersum. Leuigati enim Calculi Mictū non efficiunt Cruentur. Quintum & vltimum est *Stupor cruris*. Hic Stupor nō fit in omni Calculo, sed duntaxat magno, atque illo, qui vsque adeo Renes extendit, ut nervos, & musculos cruris motorios comprimat.

Addunt nonnulli Dolorem Testiculi ea parte, qua Lapis est. Quidam etiam fieri dicunt *Lotij suppressionem*: Non autem supprimitur, nisi Renes ambo magno laborent Calculo. Itaq; plura simul contemplanda sunt signa: & si vir assuetus Arenulas emittere non amplius illas reddat, doloremq; ille incidat, cum aliis signis propositis, tum certum est Calculi signum.

Signa distinctiua.

A B hoc autem, qui est in Vreteribus, Renalis Calculus sic distinguitur; quia hic prohibet, quo minus patientes flecti possint: at lapis Vreterum prohibet erectionem corporis: præterea dolor ex Calculo in Vreteribus est longè maior, & exorditur ab illo, & ad pubem tendit, neque diu perdurat.

Calculi in Vesica signa Diagnostica.

Lapis autem in Vesica habet alia multa signa, sed valde dubia. Proponitur *Frequens Mictio*: at Frequens Mictio potest etiam fieri ex vlcere, aut ex acrimonia humoris, vel eiusdē falsedine. Si proponatur *Difficultas Mictiendi*, difficultas ex alijs multis fit causis ut grumo sanguinis pure, materia viscida, carne adnata, præterquam quod maior Calculus non facit urinæ suppressionem; non enim magnus Calculus facillè ascendit, & si ascendit, non potest ingredi Collum Vesicæ. *Missio Arenularum* proponitur ab Hippoc. 4. aphor. 3. 9. tanquā signum Lapidis Vesicæ. Hoc quoque, tunc veritatem continet, cum assuetus ad Mictionem Arenularum, quæ albæ sunt, nō amplius illas mingat, sed tenues reddat urinas: & si puer fuerit, habebit illa signa, quæ proponit Gal. 1. de loc. affect. 1. ut scilicet scalpant frequenter glandem pudendi: quasi pruritu tententur, ut propterea facillè, & frequenter illis erigatur pudendum, sed paulò post flaccescat, & si Calculus sit minor, supprimitur urina. Et suppressionis causam fuisse calculum cognoscetis experimēto a Galeno proposito, ut scilicet pueri supino ventre collocati, & elatis cruribus agitentur: si post agitationem expeditè mingant, certum est Calculum fuisse impedimento, sin minùs syringa deturbandus est calculus: & ipsamet syringa

in Vesicam imposita maiores etiam Calculi facili-
le sentiuntur, dummodo non sint multo mucos
oblit, aut membrana obducti, in quibus casibus
nihil valet siringa; Cognoscuntur autem
ex gravitate, & praecipue dum scalas ascendunt;
& si sedant, & percutiant pedem ad terram, sentiunt
pondus circa Vesicam. His quoque aliis
est adstricta, & adest ani procidentia; & in pueris
immisso digito in anum calculus facile sentitur.

Prognostica Singulorum.

EX Calculis, Renales Parui minus periculosi
sunt quam magni. Contra vero Calculi Vesicae
quo maiores eo facilius curantur, & minus
periculi continentur magni, qui in Renibus
sunt extrahi non possunt, tametsi Ambros. Parvus
lib. 24. sui magni operis c. 19. scribat sagittarium
quendam Renali Calculo tentatum, & morti
damnatum experiundi gratia apertum esse in
loco è directo doloris, ac feliciter curatum: Sed
est rara avis: Minores autem Calculi Renales
non difficili negotio atteruntur, & dissoluntur.

In Vesica autem difficillime, & cum Parui fuerint
frequentius Collum Vesicae ingrediuntur, Urinam
prohibent, ulcera, & dolores, atque ardores
ingentes inferunt; maiores vero quiescant in fundo,
vel si aliquando ascendant, Urinam non prohibent,
atque ideo, ut antea dixi, minus molesti sunt, quam parui.
Hanc ob causam non libenter accipio Pauli sententiam,
qui lib. 6. c. 6. scribit eos, qui magnum habent Vesicae
Lapidem sectionem melius sustinere, quam illos, qui habent
parvum, eo quod illi, qui magnum habent Calculum
doloribus & inflammationibus frequentibus sunt
assueti. Ego experientia observavi, & ratio illud
persuadet minores calculos plus irritare Collum
Vesicae, plus molestia inferre, quam maiores. Imò
vero maiores aliquando multo mucos oblici adherent
Vesicae, ut propterea una ex parte magis periculosi
sint, altera ex parte minus periculosi. Periculosiores
sunt, quia extrahi non possunt, nisi laceretur vesica:
minus periculosi sunt, quia immobiles iacent, ideoque
ex concussione neque pruritus, neque frequentem mictionem
faciunt, neque amplius Urinam impedire possunt, ut ego
duplici experientia probavi in duobus Venetis
Clarissimis, quorum uterque diuturno vexatus
Vesicae Calculo cum multis, & grauibz symptomatibus,
adhaerente eodem Calculo ipsi Vesicae vitam per
multos annos sine molestia duxerunt.

Calculi. Prophylactica, id est Praeservatio.

Auxilia sunt duplicia: Praeservatoria, & Curativa.
Versabimur autem in praeservatorijs primo.

Praeservandi ratio in hoc est posita, ut succus
crassus, & viscidus vel non gignatur, vel si gignatur,
ad Renes & Vesicam non descendat; vel si transeat
non retineatur, vel si retinetur in Calculum non concre-
scat.

Ne materia crassa generetur, tentanda sunt
auxilia, & pharmaceutica & dietetica.

Pharmaceutica sunt omnia calorisifica & siccantia,
quae cerebrum, & ventriculum confirmare possunt,
& ad optimam coctionem faciendam aptissimum faciunt.
Tales sunt, aquae medicatae plurimae, magna antidoti, decocta ligni, salsa &c.

Quoad dietam, Aer est eligendus pariter calidus,
siccus. Exercitatio, Somnus, Venus, Cibus, & Potus
debent esse moderatissima. Fugienda autem sunt
omnia illa, quae crassum augere succum diximus,
ut caseus, lactinia, pisces, placenta, legumina,
partes animalium cartilagineae, & cutaneae,
vina dulcia, nigra, & crassa, aquae turbidae,
& sabulosae.

Ut vero prohibeamus ne materia genita transeat
ad Renes, ad alios locos est revellenda; omnium
vero maxime ad Vomitus, & profecto nihil
invenientis apud Medicorum scriptores magis
celebratum ad Praeservationem lapidis, quam est
Vomitus ipse, qui in his, qui temperanter vixerint
bis tantum in mense fieri debet post cibum: in
intemperantibus debet fieri, & semel, & bis in
hebdomada. Diuertitur quoque ad intestina, &
per clysteres, & per medicamenta.

Clysteres hoc tempore Praeservationis sint minime
calidi; nam ex calore Renes quoque incallescunt,
& materiam attrahunt: non sit tamen usque
adeo leues, ut ad se materiam trahere non possint:
idecirco fiant ex decocto malvarum, hordei cum
vino, iii. mellis rosati, & drachma. Ele-ctuarij leniui,
aut vino sem. benedictae vel diaphaniconis.
In magno Renum fervore cum vino cassiae extractae,
& vino. iii. olei violacei.

Quoad medicamenta debent Nephritici habere
aliquod medicamentum familiare, quo excrementa
per intestina ducantur. Nam qui alius habent
lubricam, & Diarrhaeis vexantur, Atrabili, &
Calculo non laborant. Itaque utantur frequentius,
aut melle rosato solut. ad vino. iii. vel. v. aut
pilulis vel mastichinis, vel de hiera cum agario,
vel de agarico Mesues, vel aggregatiuis, dummodo
non componantur vel pilulae, vel alia medicamenta
cum Diureticis. Hoc dico, quia plures hoc tempore
sunt, qui habent formulas quasdam medicamentorum,
quae alium subducunt, & simul diureticam ob-
tinent facultatem.

Quando est sermo de medicamentis materiam
diurentibus, nullo est opus diuretico.

Et propterea illi etiam male agunt, qui praeservationis
tempore, & ad revulsionis scopum utuntur cassia.
Cassia enim deiectoria est, & diuretica; propterea
in hunc finem diuertendi non est accipienda.

Et in hac parte accipio Valeriolae sententiam,
qui lib. 6. Enar. Med. enar. 9. damnat usum medicamentorum
diureticorum, purgantibus adiutorum

Nota cautionem.

florum pro hac intentione.

Diuertenda quoque est materia, potissimum si ex capite defluerit, ad os nares.

Cauteris.

Cauteria vel in occipite, vel quod magis est in brachiis infixa consulo, ut, quando cetera non profunt, retrahatur materia ad articulos. Facillimus enim est transitus doloris Nephritici in Arthriticum, & Arthritici in Nephriticum, est que minus malum Arthritide tentari, quam Nephritico. Dolor enim Articularis propter molestiam in vitæ discrimen non adducit, sed Nephritis, & Vesicæ Calculus propter multos labores, & eos quidem indeficientes, multos patientes necant: itaque diuertatur materia ad Articulos frictionibus, balneis, frequentibus inunctionibus calidis, sinapismis, & vesicantibus.

Victus Ratio.

In eundem usum debet institui victus ratio, in qua sit hoc commune præceptum, ut nullo vtiatur Diuretico neque proprio, neque improprio.

Notandum.

Sunt qui præcipiunt frequentem usum raphani, petroselinis, feniculi, vini albi, vno verbo omnium diureticorum. Hæc præseruationis tempore, quando materia non fluxit ad Renes perniciolosissima sunt. Si iam fluxerit (id quod declarat grauitas Renum, & dorsii, vrinaque crassiores) consultum est diureticis vti.

Therapentica Calculi, id est Curatio.

Sed in eo casu, dum curare volumus, & materia iam decidit, Diurencis præmittatur reuel lentia, siue Vomitus, siue Medicamentum, aut Clyster, posteaque, si Renes sint valde calidi, agendum medicamentis euacuantibus humorem per urinam, quæ frigida sint, ut sunt emulsio seminum frigidorum, aqua plantaginis, alkeKengi, seu solani, haliacabi.

Si materia sit valde crassa, & frigida, eligenda sunt potius calida, sed non tantum siccantia, verum incidentia, ut est Ozymel scilliticum ad vnc. i. sem. cum decocto pollij montani, saxifragæ, ononidis, chelidonis, matricariæ, & aliorum, de quibus dicam infra. Hæc quoque faciunt ad euacuandas Arenulas, si quæ fuerint genitæ, præcipue vero quando illa admisceantur, quæ vias dilatare possunt, ut est decoctum ex folijs, seminibus, & radice altheæ, & maluarum addito butyro.

Quod si caliditas ea sit, quæ humorem exsiccet potius, quam natura crassi & lenti humoris, fugienda sunt hæc calida, & omnia attenuantia,

A & potius refrigerandum est corpus, & Renes.

In hoc casu conuenit venæ sectio vel ex Cubito vel ex Pedibus: ex cubito ad Reuulsionem; ex se. t. Pedibus ad Deriuationem. Conuenit alteratio per aquas thermales frigidas, ferratas scilicet, vel per serum caprinum, vel per emulsiones iam dictas, aquasque stillatitias plantaginis, florum nymphæ, alkeKengi.

Extrinsècè quoque Balnea in hunc usum veniunt, quæ frigida, vel emplastra, vel linimenta ex succis semperuiui, nymphæ, portulacæ, plantaginis, aut inunctiones ex vnguento rosato, vel infrigidante, vel Gestationes super dorso ex ipsius met folijs nymphæ. Hæc, ut dixi, tunc administranda, cum Renes pleni non sunt, sed tantum alterare calidam intemperiem cupimus; nam si addit grauitas in dorso, aut dolor aliquis, signum materiæ præsentis, hæc frigida non conueniunt.

Medicamenta à Medicis scriptoribus proposita pro Calculosis sanandis non modò multiplicia sunt, verum etiam vsque adeo contrarium inter se faciliatum, ut quando sine distinctione proferuntur, facillimum sit inexpertum medicum in illorum administratione peccare.

Itaque non expectetis à me in præsentis lectione ingentem medicamentorum syluam, sed accuratam tantum distinctionem omnium.

Pro sanandis Calculis duo sunt præcipue scopi unus ut Grandior Calculus vel atteratur, vel molliatur: Alter, ut iam Paruulus, vel mollitus, & attritus quamprimùm educatur. Totam hanc doctrinam paucis comprehendit Hipp. I. in 6. epid. 6. illis verbis: Quiescere non conducit, sed mouere cibis non replere, sed iuuenes veratro purgare, populem seccare, urinarijs mundare et tenuare, molliare.

Loquemur primum de Attenuantibus, quæ duorum generum esse putantur: Quædam enim atterunt Lapidem in superficie, quia cum aspera sint cortici exteriori lapidis confricata illum abradunt & comminuunt. In hac classe reponuntur, Lithospermum, Lapis Iudaicus, Vitrum combustum, Cortex oui, ex quo iam ortus sit pullus, & alia id genus aspera. Hæc ut ingenue dicam, mihi nullius videtur frugi, quandoquidem si vsque adeo aspera ad locum lapidis perueniant, ut ipsum possint erodere, multo facilius erodant Venas, Iecur, & Renes, præterquam quod hæc vsque adeo comminuta, & in puluerem redacta exhibentur, ut non possint sua asperitate durum Calculum corrodere: Hæc itaque imaginaria mihi videntur. Sunt alia atterentia tendium pertium, quæ poros, & angustos Lapidum meatus penetrare possunt; Penetrando autem vnam partem ab alia diuidunt, valentque hæc potissimum in Lapide genito, & conflato ex multis arenulis; facili enim hæc attenuantia se insinuant inter Arenulam, & Arenulam, & sic Lapidem dissoluunt. Talia sunt quam plurima temperata, de quibus meminit Gal. s. simpl. 13. Inquit enim ea, quæ callos, & Renum durities attenuare debent, moderate calida esse debere, ne nimio calore humorem exsiccet, corpusque magis

gis indurent Talia sunt radix asparagorum, bru-
fici, graminis, pentaphylli, capilli veneris, terebin-
thina, mel aut simplex, aut saltem in oxymellite
vel mulla, vel alia ratione præparatum.

Molliunt autem Lapidem omnia humida,
dummodo sint tenuium partium. Non est ne-
cessarium, ut quæ molliunt sint frigida humi-
da; nam etsi Aristot. 4. meteor. voluerit ea, quæ
indurantur à calido sicco, molliiri debere frigidis
humidis, nihilominus frigiditas non est necessa-
ria, quia calor, qui exsiccat, iam euauit, & cor-
pus durum est redditum: quod actu exsiccatum
est, actu quoque humidandum, siue humen-
dauo fiat cum materia humida, siue temperata;
non tamen omne humidum molliit Lapidem,
sed illud tantum, quod tenuium est partium,
atque ideo arctissimos Lapidis poros ingreditur:
Talia sunt quædam simplicia, & ea frigida, suc-
cus limonum, citri aranciorum, oxalidis, & ace-
tum. Alia verò à Medicis componuntur, & iure
optimo. Vbi enim non possint omnes istæ intè-
riones in simplici medicamento reperiri, debent
simul coniungi. Itaque parantur aquæ variæ,
quæ recipiunt medicamenta tenuium partium,
atque simul humida, ut penetrare possint, & mol-
lire. Talia inuenietis apud varios varia. Ego ta-
men vobis descriptionem dabo illius aquæ, quæ
vtror feliciter ad frangendum lapidem, & propri-
um de illa bis exprimentum feci.

Recipe succi raphani lib. ij.

limon. lib. ij.

acet. alb. lib. f.

Succ. pimpinel.

beton.

Saxifrag.

Parietar.

fruct. alke. Kang.

alib. arbor. an. vnc. vi.

Rad. petrosel.

Fenic.

Acori.

Enul.

Beton.

Agrimon.

Gentian.

Ireos.

Florent. an. vnc. f.

Sem. cucumer.

Petros. Macedo.

Portulac.

Ocymi.

Caryophyllat. an. vnc. f.

Fol. & flor. viol.

Thapsi barbati.

Scolopend.

Bugloss. an. M. f.

Infundantur infundenda in prædictis liquo-
ribus in quibus dissoluantur.

Mell. despum. lib. ij.

Et omnia deinceps ponantur in alembico &
destillantur.

Ego, auditores in eadem destillatione ponere

solebam Therebinthinam, sed quia oleum there-
binthine supernatabat, & qui accipiebant in pri-
mis diebus habebant totum oleum, Ego nunc
temporis præbeo aquam separatam ab vnc. ij. ad
vnc. iij. cum drach. f. vel vnc. i. olei ex Therebin-
thina. Aqua ista, ut potestis videre, non tantum
est composita ex attenuantibus, & mollientibus,
verum etiam ex his, quæ augent serosam humi-
ditatem, & quæ illam secernunt à sanguine, &
quæ dilatant vias, ut facilius Calculus egrediatur,
quæ omnia sunt necessaria, quia ubi serum non
sit multum, aut vix adstrictæ, difficilimum est
Calculum exire. Paucis ergo intellexistis, quibus
arteri aut molliiri possit Lapis.

Loquamur nunc de illum educentibus. Edu-
citur Lapis medicamentis, & externis & internis
externa aut illum attrahunt à Renibus in Vesicā
aut vias dilatant. attractio fit aut manu inuncta
oleo aliquo calido, quæ incipiat fricare locum
dolentem, & paulatim descendens vsque ad pu-
bam. Idem præstant cucurbitulæ pari ratione
appositæ, ut scilicet primo apponantur loco do-
lenti proximè, & sicut descendit dolor ita de-
scendat cucurbitula. Multum certe præstat hoc
remedium ad mouendum Lapidem. Hoc facit
omnis corporis motus, ambulare, equitare, vehi-
cullu, fodere, & remigare. Illuc Hipp. Quiescere
non conducit, sed mouere.

Quæ Vias dilatant, sunt emplastra confecta ex
parietaria, ex malua, althæa, ex seminibus lini co-
ctis cum butyro, oleo amygdalarum dulcis, plus
guedine anatis, & anseris. Idem præstant omnia
pariet oleo amygdalino, pinguedine & butyro
illita; Et si angustia augeatur ex flatu admiscen-
dum est oleum chamomelin, anethin, rutaceum.
Si augeatur ex humorum crassitie, addenda sunt
ea, quæ attenuant, ut succus raphani, feniculi,
apii. Facienda fomenta, quæ vel per spongas, vel
velicis loco dolenti admoveantur, quæ recipiant
decoct. maluæ, althææ, seminum lini, & fenugre-
ci, polij, montani, saxifragiæ, ononidis, parietaria-
riæ, eringij, pulegij, nepitæ, raphani, & radicem
diureticarum.

De Balneo.

EX his quoque Balneum parari potest, in quo
sedant patientes vsque ad umbilicum, quod
maximè valet ad digerendos flatus, atque ad at-
tenuandum humorem, sicuti balneum ex sim-
plici oleo, vel vesicæ eodem, imbutæ Renibus, &
Vrinariis Vasis adhibitis plus valet ad dilatan-
das vias.

Ad hunc scopum valent quoque venæ sectio
in pede, cucurbitulæ, & frictions partium in fer-
narum. Hæc enim omnia Lapidem mouent.

Intrinsicus autem exhibenda sunt illa, quæ La-
pidem propellunt, & vias dilatant. Propellunt
Lapidem omnia vomitoria, omnia, quæ sternu-
tamentum mouent, omnes clysteres validi, &
modi-

medicamenta deiectionis. Hinc Hippoc. iuuenes veratro purgandos esse. Dum enim sit ille conatus vomendi, compressis partibus, ubi est Calculus fit eiusdem compressio. Subducta autem alio excentes humores per intestina propter loci vicinam pariter mouent Lapidem, sed propter aliam causam iuuant quoque hæc purgantia, quia scilicet primo diuertitur materia, & sic nouo humore non affluente, Lapis facilius educitur: deinde verò inanitis intestino, & vasis ipsius amplius habet Calculus spatium ad exeundum, quàm ubi & venæ sunt turgidæ & intestina repleta, hinc fit, ut Doloribus Nephriticis tentari à clysteribus alui fecese ducentibus mirifice iuuentur: quia Lapis non compressus minorem facit dolorem. Denique impellendus est Lapis diureticis, quibuscumque siue proprijs, siue improprijs. Impropria appello ea, quæ augent serosam humiditatem in corpore, aut ipsamet serosa sunt, ut propter quantitatem serosæ humiditatis per Loca Vrinaria transeuntis Lapidem secum ducant. Hinc factum est, ut semina melonum, & alia omnia semina frigida, & plantaginis, imò, ut scribit Aetius, portulacam quoque & serum multum, & aquæ thermales plurimæ quotidianam experientia videamus. Arenulas, & Calculos secum educere. Id ipsum faciunt ex acidendi yeta Diuretica quatenus scilicet separant serum à sanguine ut Galen. 5. simpl. 13. & sic Renes ipsi multum attrahentes serum vna cum sero Lapidem excernunt. Hinc Hipp. Vrinarijs mundare.

Omitto ea, quæ existimantur à proprietate iuuare, ut est sanguis hircinus præparatus: sanguis vulpinus præparatus: conium leporis vltimum, & in cinerem reductum: Auis Trostragolus. Lapis Lincis, Iudaicus, & alia plurima. Auis autem Troglodyns communiter Tremulus vocatur. Vbi verò Lapis magnus in Vesica, sectione opus est, de qua ne verbum, quia hoc Chirurgis relinquo.

**DE STRANGURIA, DYSURIA,
ET ISCHURIA. CAP. XXXVII.**

Mictionis Vitia, quæ nobis adhuc tractanda supersunt, vnico excepto ad tria capita rediguntur: imò verò ad duo omnia reduci possunt. Ad tria quidè videlicet ad Stranguriam, Dysuriam, & Ischuriam. Ratio autem est, quia Dysuria, ut notauit Gal. in com. 48. 7. par. aph. significat duo: Ardorem scilicet, vel Dolorem in emittenda Urina, & difficultatem. Itaque quatenus significat Ardorem, vel Dolorem potest reduci ad Stranguriam, & quatenus Difficultatem ad Ischuriam. Hinc Gale. 6. de loc. aff. 4. & 3. de caus. sympt. 2. Dysuria non meminit etiam si Vitiatæ Mictionis discretias omnes exponere profiteatur.

Est igitur Stranguria Mictio praua, & ea quidè duplex. Vna quidem in qua frequenter, & parum mingunt patientes, cuius meminit Gal. 5.

aph. 8. aut est Urina guttatim effluens, idque fit dupliciter: Vel inuoluntariè, vel volentibus nobis mingere tantum. Si inuoluntariè fiat, reducitur ad Urinæ Incontinentiam, si tunc tantum, cum quis per electionem mingit, ad Stranguriam pertinet. Ischuria nihil aliud est quam Urinæ suppressio vel integra, vel imperfecta. Dixi ad hæc discretias ferè omnia Vitia redigi. Excipio enim prauam Mictionem ratione Loci, cum scilicet quispiam non mingit per glandis foramen, sed aut per foramen in pene factum, ut vidistis superioribus diebus in puero, aut per foramen in collo Vesicæ, aut per pubem, vidi ego nobilem Venetam, quæ mingebat per vterum facto vlcere, & fistula ab vna in aliam partem.

**De Mictione per Locos, & partes huius
Excretioni non destinatas.**

De hoc Affectu pauca sunt nobis dicenda, quandoquidem si foramen glandis ià sit occlusum non simplici membrana, sed excrecente carne obductum, curatio omnino impossibilis quicquid dicant illi de incisione, de perforatione facta ferro ignito. Sunt omnes fabulæ: nam qui proposuere, vel non sunt experti, vel si experientiam fecere non bene res successit. Vbi verò apertum sit foramen, spes est salutis, incumbendum est sanationi vlcis, vel fistulæ, per quam excernitur Urina, & profecto diligente Chirurgi bene procedit hæc operatio. Et ego duos vidi, qui foramen habebant in inferiore parte pudendi, per quod mingebant, ambos sanatos. Fuerunt hi Illustrissimus felicitis memoriz Iacobus Malatesta, alter Illustrissimus Andreas Mocenicus, qui adhuc viuit. Operationem chirurgicam non propono, sed statim transeo ad Stranguriam, & Ischuriam.

Causæ Stranguriæ

Et Stranguria vel ex errore externo, vel ex morbo Vesicæ. Error Extremus est Urina, vel acris, vel multa. Acris vel propter bilem admistam, vel propter pituitiam salisam, vel denique ob materiam purulentam: hinc Hippoc. 5. aph. 8. Stullicidium Urinæ fieri scabit Renibus purulentis. Ex copia fit Stullicidium, vel criticè, vel symptomaticè. Criticè expurgante natura humorum colluitem per urinas, de qua Stranguria loquitur Hippocrat. 2. in 1. Eph. 8. quando inquit Urinæ Stranguriolæ non Nephriticæ. Et in tex. 41. eiusdem libri loquens de ægrotis illius constitutionis, inquit eos sanos factos, quibus Stranguria successisset. Fit & ex morbo Vesicæ. Morbus autem vel est essentialis, vel per consensum. Essentialis est vlcus, inflammatio abscessus inæqualis intemperies, & status distendens. Hæc omnes

omnes causæ faciunt Mictionem, vel paulatim, A
& frequenter redditam, vel stillatim, sed cū ma-
ximo dolore, ut propterea aliquando connume-
rentur inter causas Doloris, seu Ischuriz, ut 7.
aphor. 48. Aliquando inter causas Stillicidij, ut
3. aphor. 16. Per consensum verò fit Stillicidium
Vrinæ compressa Vesica ab Vtero, vel Intestino
recto inflammato, vel alio tumore effecto. Vtrius-
que causæ meminit Hipp. 5. aph. 8.

Causæ Ischuriz.

Ischuria verò, quæ est Vrinæ Suppressio, dupli-
citer fit, vel vacuâ vesica, vel plena. Si vacua
est Ischuria impropria, ut notauit Gale. 3. de caus.
sympt. 2. Cū enim retinetur lotium, vel vitio
Emulgentium, vel Renum, vel Vreterum: & cau-
sa retentionis est, vel attractrix facultas harū par-
tium extincta, vel sopita propter frigidam intem-
periem: vel est morbus in via, siue obstructio, aut
coniuuentia, aut compressio, aut coalescentia; &
siue obstructio fiat à Calculo, pure, pituita, crassa
grumo sanguinis, vel carne adnata.

Quod si retineatur Vesica plena, tunc propriè
dicitur Ischuria. Retinetur autem, vel extincta
facultate Vesicæ sensitiva, propter nervorum, qui
in corpus Vesicæ inferuntur, paralytin. Dico ner-
vorum, qui in corpus Vesicæ inferuntur, non in
musculum constrictorium, quia ut docuit Gale-
nus 6. de loc. affect. 4. illius nervi resolutio est cau-
sa Incontinentiæ Vrinæ. Cū autem Vesicæ cor-
pus amittit sensum, ut idem explicat loco citato,
non sentit Vrinæ copiam, quam in se continet,
idecirco nunquam movetur id illam reddendā.
Aliquando amittitur facultas constrictoria Vesicæ
nimium distentis fibris ipsis, constrictorem
efficientibus: id verò contingit, ut Galen. loc. cit.
ipsi, qui ultra modum Vrinam retinere voluerūt,
vel quod essent in conuiuio, vel alio in loco. Re-
tinetur etiam quandoque propter morbos in via,
qui sunt illimet, de quibus antea mentionem fe-
ci, obstructions, humores:

Signa Stranguriæ, & Ischuriæ.

Isti affectus ex dictis facile dignoscuntur, sed
causas affectionis, & loca distinguere oportet.

Si fiat Stillicidium ex Vrina biliosa, præterquā
quod aderunt signa temperamenti calidi, & sicci,
Vrinæ quoque erunt rubra, aut subrubra, admo-
dum splendidæ, & contentum simile habebunt.
Inaequale verò faciunt Vrinæ Stillicidium prout
modo plus, modò minùs biliosi humoris, illiusq;
vel acrioris, vel minùs, acris cum Vrina misce-
tur.

Pituita falsa tanquam crassa, & viscida facile
dignoscitur, quia in fundo residet, & sublata ali-
quo ligno tota simul eleuari potest, ad differen-
tiam puris, quod residet quidem in fundo, sed

magis album est, quandoque etiam sanguini cō-
mistum, neque sibi ita cohzrens.

Multitudo feri si faciat Stranguriam facile
distinguitur à priore; nam in priore Vrina gutta-
tim excernitur: in multitudine feri sæpe mingunt
patientes, sed non multum: & si multitu-
do sit ex colliuatione, adest febris ardens, &
pinguedo supernatat. Si fit purgatio vniuersi cor-
poris, adest quidem febris, sed colliuatua, &
excretio fit cum tolerantia, & febris imminu-
tione.

B Quod si Stillicidium fiat ex Ulcere Vesicæ, ita
habuistis signa.

Si ex Inflammatione, adest dolor continuus,
calor ingens circa pubem, rotundus tumor in ea-
dem parte, difficilis excrementorum alui deie-
ctio, refrigerata extrema, febris continua quidem
sed quæ eodem die multas habet exacerbatio-
nes, & horrores: toties enim videtur horror inua-
dere, & febris augetur, quoties nouum confluit se-
rum in Vesicam. Confluit autem sapius in Vesicam
inflammata quam non inflammata. Lo-
ci enim calor ad se trahit pluries, itaque exacer-
bari videtur.

C Abscessus cognoscitur ex præcedente inflam-
matione, quæ usque ad septimum diem resolu-
i non potuit, imò verò eo tempore nouos habuit
horrores & febris incrementum, sicuti quando
desinit in tumorem durum, tumor persistit, sed
indolens; impedimentum tamen augetur.

Flatus facile cognoscitur, quia si comprima-
tur locus Vesicæ, rugitum & flatum sentiunt pa-
tientes in tota ab dorsinis regione, & à flatum
digerentibus subleuantur.

D Inaequalis Intemperies difficilis est cognitu:
Si deficientibus signis allarum affectionum qui
spiam stillatim mingat, & cum dolore, referen-
da est causa in inaequalem intemperiem.

De tumoribus Vteri, & Intestini hoc tantum
dico, quod hac ratione possint deprehendi nam
si tumor sit in Recto Intestino, quando patientes
decumbunt in latus, melius mingunt, quam in
dorsum; sicuti si Vteri sit tumor melius propi,
quā spuni mingunt. Alia signa in aliis locis videatis.

E Multum interesse signa proponere distincti-
ua suppressi Lotii Vesica Vacua, vel potius Re-
pleta.

Vbi enim Vacua sit Vesica, tangenti pubem,
locus apparet flaccidus, & inanis, nullum adest
Vrinæ irritamentum, & si quis Syringam impo-
nat, frustra imponit. Præterea serum illud supra
Renes retentum febrem efficit continuam cum
sopore, nausea, vomitione, halitui, ventris flu-
atuatione, sudore fetido, & cachexiæ initio.

F Quod si causa suppressionis supra Renes fue-
rit Inflammatio, febris est acuta, dolor ingens,
qui non modò ad dorsum pertingit, verum &
Vreteribus, & Vesicæ communicatur, testiculus
paris inflammatione contrahitur, stupor cruris quā-
doque succedit, quādo scilicet Inflammatio ver-
git potius ad musculos exteriores, quā ad par-
tes interiores. Lotium antequam supprimatur,
rufum,

rufum, & rubeum redditur, cui supernatat pinguedo: & ad differentiam pinguedinis supernatantis propter colliquationem totius corporis, ut docuit Galen. 7. aph. com. 3. concors cum Hippo. loc. cit. multa excernitur simul. Nam in colliquatione ex toto pauca, & paulatim decedit. Ceteras causas colligere potestis ex haecenus dictis de Mictus Sanguinis, & Puris, de Capillitio, ac de Renalibus Calculis. Quod si fiat propter Infirmitatem attractricis facultatis, paulatim fit Suppressio Urinae, lorium est tenue, & crudum, insignitum est refrigeratio circa Renes.

Quod si Vesica sit plena, facillime deprehenditur ex tumore rotundo, & quia, excepta Suppressione facta propter nervorum Paralytin, iritantur ad Mictionem; nec tamen actionem exple-re possunt. Dixi excepta nervorum paralyti, quia in hoc casu Vesicae neque pondus, neque actionem Urinae sentiat; ideo si quis manu comprimat Vesicam, Urina excernitur.

De signis Inflammationis iam dixi.

Quod si sit Obstructio, vel ex Grumo Sanguinis, vel ex Pure, vel ex Crassa Pituita, vel ex Calculis, cognoscetis, quia Suppressio subito fit, & sine febre, & imposita syringa non modo tollitur impedimentum, verum etiam cognoscitur causa obstruens; nam ipsi syringae adhaeret, vel sanguis, vel crassa pituita, vel pus, quae etiam simul cum Mictione excernuntur.

Si fuerit Caro, praecessit vlcus, praecipue illis, qui gonorrhoea venerea laborant, & syringa ipsa caro facile deprehenditur.

Prognostica.

Sunt omnes istae affectiones, & causae magni momenti: Et si Urina Supprimatur Vacua Vesica paucissimi evadunt, nisi quam primum lorium educatur. Ego duos vidi: unum Monialem, alterum Nobilem Venetum, quorum prima undecima obiit, alter quarta die.

Quod si Supprimatur Plena Vesica, minus malum est, nisi Vesica Abscessu, aut Inflammatione laboret; tunc enim syringa locum non habet; nam si in Vesicam inflammata syringam imponatis, inflammationem augebitis. Idcirco primo lib. de loc. aff. 1. cap. in casu simili scribit se ab impositione catheteris, id est syringae abstinuisse.

Si fuerit Abscessus (res experientiam observata, quam tamen scriptam a nemine inuenietis) ubi imponitur syringa in Abscessu Vesicae, ingreditur syringa inter membranam, ubi factus est abscessus, & sic nihil excernitur: non Pus, quia ingredi foramen non potest: non Urina, quia syringa non pervenit ad concavitatem Vesicae.

Curatio.

Transeo ad Curationem: & quia ex iam declaratis de Mictione Sanguinis, Puris, Are-

nularum, & Calculorum facile potest haberi curatio Suppressionis Urinae ex Calculo, pituita, Pure, & Sanguine. Ex his quae diximus de Mictu Involuntario patet curatio Suppressionis Urinae ob Paralytin, vel Refrigerationem Vesicae, & Renum: idcirco in praesentia versabimur in Inflammatione Renum, & Vesicae, & in curanda Ischuria ex grumoso sanguine.

DE INFLAMMATIONE RENUM ET VESICAE. Cap. XXXVIII.

Inflammati igitur Renum, & Vesicae habet quaedam remedia communia; quaedam vero propria. Communia sunt, quae ad Reuulsionem & Derivationem pertinent; Propria sunt localia.

Ad Reuulsionem pro utroque loco inflammato facit Venae Sectio in cubito dextro, vel sinistro, prout dextra vel sinistra pars magis laboraverit: Et quamvis Avicenna videatur voluisse, sinistram basilicam in his casibus semper esse secundam eo consilio, ut docuit Nicol. Florent. ne materia in iecur trahatur, sunt nugae; nam sectio venae in cubito non trahit materiam in Renibus existentem, multo minus in Vesica, sed prohibet, quo minus sanguis fluat in eum locum. In quem usum faciunt cucurbitulae scarificatae, vel non scarificatae humeris, & brachiis appositae, frictions, ligaturae supernatum partium, maxime vero Vomitus, qui in hoc casu quotidie, donec in inflammationis augmenti signa adsint, tentandus est. Potest & reuellere usus hirudinum ad haemorrhoides, vel vno verbo, sanguinis missio per venas sedales, seu fiat fructione aspera, seu alio ingenio. Hinc ait Hippocr. 6. aphor. 1. 1. Nephriticis haemorrhoides superuenientes bonum: sed & clysteres ab initio refrigerantes ex decoctione hordei, violarum, & plantaginis cum cassia & oleo viol. misce valent, sicuti etiam medicamenta aluum subducentia facultate frigida, ut cassia, thamarindi, syrupus rosae, solut. diaprunis simplex &c.

Ad Derivationem facit venae sectio in poplite. Hinc Galen. 1. 3. meth. 1. 1. loquens de Inflammatione facta, cui convenit derivatio, huius tantum sectionis venarum infernarum mentionem facit, sicuti etiam in 6. partic. com. 36. & 7. part. aphor. cum. 48. Vbi illa verba Hippocr. *secare vero inferiores venas*, interpretatur in Affectibus Renum secandas esse venas inferiores, sed, ut dixi, loquitur de Derivatione tantum: nam lib. de rat. cur. per sang. misce. cap. 14. scribit Renes iuvare secta vena, & superna ad Derivationem. Haecenus convenit Inflammatio Renum cum Inflammatione Vesicae in auxilijs.

Quod spectat ad Localia in quibusdam differunt: primo in externis; Vesica enim inflammata etiam circa initia non admittit impense frigidum: est enim corpus frigidum, facile stupefcit, & si prae-

si prius impedimentum facultas etiam contra-
ctoria stupeſcat, actum eſt de mittendo lotio.
Quod ſi retineatur, Inflammationem auget, ſed
nec acutum Veſica ſuſtinet, cum nerua ſit, ut ſu-
ſtinent Renes. Ideo ſatis eſt circa initia loco
dolenti imponere linteum oleo violato, aut roſa-
to completo imbuium, admiſto ſucco limonum.

Pro Renibus autem poteſtis parare linimentum
ex ſucco ſolau, temperuiui, plantaginis, portula-
cae cum aceto: Conuenit unguentum inſrigidans
Gal. roſatum Meſues, admiſtum ſuccis iſtis.

Præterea differunt in materia interna, quia ubi
Veſica ſit Inflammata, augenda eſt quantitas li-
quoris, quia exhibentur ad refrigerandam partem
Inflammatam: Sunt autem emulſiones ſeminum
frigidorum, vel maiorum, vel minorum, prout
inflammatio magis legitima, vel ſpuria, eryſipe-
latea, tempusque anni ætas iuuenilis, & tempera-
mentum calidum, ad ſuſtinenda maiora frigida
ſufficere poſſunt. In quo caſu ſemina iſta diſſol-
uenda ſunt cum aquis ſtillatit. plantaginis, ſolani
nymphæ, ſemperuiui, & violarum. Conuenit ſe-
ſerum his herbis alteratum, aut emulſionibus ad-
miſtum; conuenit aqua hordacea. Scribunt A-
rabes, in Veſicam Inflammatam iniciendos eſſe
per ſyringam liquores iſtos frigidos; ſed ſi non
licet ſyringam imponere, ut educatur Vrina, mul-
to minus licebit hos locos irritare, ut liquores in-
iciantur, quos ignoramus; an ingredi poſſint
nec ne, & ſi ingrediantur, an educere poſſint, nec
ne. Itaque ab his abſtinendum.

Sed dicit quiſpiam. Præceptum illud, exhiben-
dorum medicamentorum, quæ ad Renes & Veſi-
cam pertingunt, partibus iſtis inflammatione af-
fectis eſſe contra Hale; qui 13. meth. cap. 11. præ-
cepit diuertendos eſſe humores à Renibus, &
Veſicas inflammatis; non autem eo ducendos:

Sed nihil concludit hæc ratio: Loquitur Gale-
nus de Veris Diureticis, quæ duplici nomine læ-
dunt. Primo, quia calida & ſicca ſunt. Secundo,
quia ſeparant ſeroſam humiditatem, quæ in venis
reperitur, illamque in Renes deducunt: Hæc verò
ſeroſitas acris eſt, ſecumque acres ducit humo-
res, hinc valde noxia. Sed hæc frigida relata vtro

quearent in commodo, Inflammationem de-
moleſcere, & ſerum in venis augere, idque alterari.

In augmento tam intrinſecus quam extrin-
ſecus addenda ſunt digerentia.

Intrinſecus capillus veneris, cymbalaria, poly-
tricum, pentaphyllum, radix graminis.

Extrinſecus oleum chamomelæ, aut anethi. vel
fomentum ex roſis, plantagine, addito anetho, &
chamomelo.

In Statu, ſi Inflammatio ad Reſolutionem ten-
dat, extrinſecus viendum fomentum non modò
ex pulegio, chamomelo, anetho, & meliloto, ve-
rùm etiam calamentho, origano, ſiſymbrio, po-
lio montano, ſcœnugæco, lini ſeminibus. Conue-
nit emplaſtrum de meliloto.

Et intrinſecus omnia verè Diuretica calida, &
ſicca intertio.

Quod ſi in Abſceſſum tranſeat Inflammatio,
ſuppurantia ſunt adhibenda, quæ parantur ex ra-
dicibus alithææ coctis, & per cribrum traſmiſ-
ſis, ex folijs maluæ coctis, & contuſis addita fa-
rina ſeminum lini, pinguedine anatis, & anſeri-
na, & ſapa, aut decocto alithææ, maluæ, ſcœnugæ-
co, & ſeminum lini.

Diſruptio abſceſſu, quid agendum docui in
tractatu de Mictu Puris.

De Grumo Sanguinis.

Denique in Retentione Urinæ ex Grumo Sa-
guinis, ſi fuerit ſupra Veſicam, diſſoluen-
dus eſt Hæmus illis iſtis rationibus, quæ putan-
tur Lapidem confringere; nam quæ Lapidem
molliunt etiam Grumos attenuant, ut

Succus limonum

Oxymel ſcilliticum

Acetum ſcilliticum

cum decoctione radicum diureticarum.

Si fuerit Grumus in Collo Veſicæ, aut deur-
bandus per ſyringam, aut attenuandus iniecto
pariter oxymelle ſcillitico, vel limonum ſucco
cum prædicto cecoco.

Finis Pars Secunda:



HERCVLIS SAXONIÆ


PRÆLECTIONVM PRATICARVM

PARS TERTIA

IN QVA AGITVR DE AFFECTIBVS MVLIERVVM.

DE VITIIS CONCEPTIONIS.

Cap. I.



DE Mulierum affectionibus priuatim apud vos verba faciam, auditores nobilissimi, omittis inutilium questionum disputationibus quæ de seminis officio, facultate, ac generationis loco inter Philosophos ac

Medicos excitantur. Illud vnum proponam, ut vos ipsos tam in arte cognoscendi, quam mulieres affectus curandi doctos facere possim.

Idcirco cum mulieribus a natura vterus singulari sit datus, singulares consequenter ex hac parte sentiant affectiones, quæ tamen plurima sint, motu scilicet ac symptomata, nobis, quibus est resolutiua methodus, placet a symptomatis in coare, ab his verò ad morbos transibimus.

Quoniam enim symptomata sint omnino plurima, quæ tamen ab actionibus desumuntur læsis, omnium sunt præcepta.

Actiones autem vteri ac ceteris omnibus partibus segregata, & consequenter peculiare dux sunt, conceptio scilicet & partus. De conceptionis vitis primum dicam, mox verò & de partu vitio.

Conceptionis vitia sunt in triplici differentia; nam aut imminuitur, aut tollitur concipiendi facultas, atque hic affectus communi nomine sterilitas vocatur: Aut deprauatur conceptio, ad quam pertinent mola, & prodigiosa ac portentosa omnes conceptus.

DE STERILITATE.

Cap. II.

Quid sit sterilitas. **Q**uod pertinet ad sterilitatem, est difficultas, vel impossibilitas concipiendi in muliere

A per ætatem disposita, semen recipiente ex virili concubitu.

Dixi, difficultatem & impossibilitatem, ut non illas tantum comprehenderem: quæ nunquam concipiunt, sed & illas, quæ ægre, & cum difficultate.

Addidi, in muliere, ut excluderem hoc tempore sterilitatem ex parte seminis virilis.

Per ætatem disposita, quando quidem neque ante 13. annum, neque post quinquagesimuma sterilitas dici potest, quoniam mulieres non concipiunt. Non ignoro quidem puellarum referri historias, quæ nono suæ ætatis anno conceperunt, ut legitur apud Sauonarolam lib. 6. suæ practicæ rubric. 6. cap. 21. & apud Sylium in com. de morbo muliebri, cap. 1. Scio, pariter legi apud Plinium lib. 7. cap. 14. Corneliam Volusiam Saturninam post annum 62. peperisse: Quinimo Valerius de Taranta in suo Philonio lib. 6. cap. 12. sexagesimo septimo ætatis anno aliam peperisse scribit. Ceterum hæc quasi portentosa, & extra naturæ ordinem fiunt.

Addidi in muliere semen virile recipiente, per semen intelligens quidem tam virile, quam muliebri. Neque enim Aristotelis sententiam accipio, l. 1. de gen. animal. c. 20. ubi semen mulieribus esse negauit. Iis enim inesse semen aliquam formatricem præditum, vasa ostendunt seminalia, & præter ea testes & delectatio in coitu, nocturna pollutio, alba materis effusio, ac symptomata ex semine retento producta. Non tamen volo, usque adeo necessariam esse ad concipiendum muliebri seminis effusionem, ut etiam sine hac non possint concipere. Nam præter Aristotelis testimonium l. 1. de gen. animal. c. 19. & lib. 2. de gen. animal. c. 4. ego quoque profiteor, me a mulieribus fide dignissimis accepisse, conceptum illis absque vlla delectatione factum esse.

Itaque, quoniam hæc duo videantur inter se pugnare, ad conceptum concurrere quoque semen muliebri, conceptumque fieri absque seminis muliebri

Mulier habet semē.

liebris effusione, non pugnant tamen. Nam si aliquando contingat, ut mulier, vel simul cum viro, vel paulo ante, vel post semen non effundat, sit tamen, ut ipsummet semen virile iam vteri partibus inherens, semen muliebri etiam absque delectatione petinde ad se trahatur, sicuti etiam sanguinem trahit.

Itaque semen utrumque concurret, neque tamen in mulieribus pollutio, & delectatio in ipso concubitu, est necessaria.

Dixi etiam semen recipientem ex virili concubitu, vellellet Auerthois fabulam illius mulieris, quæ prosterbatur se in balneo aque calidæ ex relicto semine concepisse: fabula est: Potuit quidem mulier in balneo concipere, sed ex congressu. Achac ipsa particula euellendam quoque eorum sententiam volo, qui putant ex incubis demonibus mulieres non modo compressas fuisse, quod apud D. Augustinum, & D. Thomam est certissimum, sed etiam prægnantes relictas esse: hoc tanquam impium & à religione alienum ego prorsus reicio, hac in parte Iacobi Ruthi sententiam secutus lib. 5. de hom. gen. c. 6. quamvis sciam historias non deficere earum mulierum, quæ cerro putarunt se ex demonibus concepisse, quarum partus omnino suppositiuos fuisse putandum: quandoquidem neque ex demonibus semen excernatur, & si alienum semen susceptum in vuluam ad concipiendum inferre possent, multa sane mala & incommoda, alioquin minime concedenda, succederet.

An ex demonibus fieri conceptio possit

Talis igitur est sterilitas. Cuius causæ aliæ sunt. Causæ immediatæ, aliæ Mediatæ. Immediatæ facile patebunt ex conceptionis definitione, quæ a Galen. no. l. 1. de sem. cap. 4. his verbis est prodita; Conceptio est comprehensio seminis in vtero (addatis causam finalem) ingenerationem hominis. Per comprehensionem scilicet seminis ex ceruice in vteri cavitatem, eiusdem retentionem, distributionemque ad singulos vteri parietes.

Causa sterilitatis im- mediata Quid co- sequitur.

Comparabat Galenus materiam seminis illi materiam, ex qua conficiuntur bellaria, vel crustula, vel placentula: Vterum vero illi ferro ignito, super quo extenduntur & fiunt. Sic semen, ut conceptus fiat, distribuitur in singulas vteri partes, & quasi placentula in membranam concrevit, & consequenter apponitur singulis venarum & arteriarum orificiis, ut propterea possit & semen muliebri, & sanguinem attrahere: id hoc potest facere, clauso, vteri ore, spiritus in semine inclusus, incipit huc atque illuc moveri, partemque seminales effingere, hincque est conceptus.

Itaque steriles erunt illæ mulieres, quæ non possunt semen effusum in vterum trahere, aut attractum retinere, aut retentum distribuere ad singulas vteri partes.

Mulieres steriles.

Quod si distribuatur, & alimentum non possit attrahere, hac etiam ratione conceptus non fit. Et hæc sunt causæ immediatæ.

Mediatæ vero sunt illæ propter quas semen in vterum trahi non potest. Hæc autem facultas fru-

Causa sterilitatis mediata

stratur suo officio aut propter imbecillitatem, aut propter impedimentum.

Imbecillitas sequitur omnem vteri intemperiem, siue sit naturalis, siue aduentitia.

Impedimentum est aut in collo vteri, aut in ore nempe caro adnata, callus, coalescentia vel naturalis, vel relicta post vlcus, membrana, tumor vel febrilifolus, vel alterius generis: naturalis oris vteri contractio, eiusdem ad latera distorsio, denique compressio a nimia pinguedine facta, auctore Hippocr. sect. 7. aph. 46.

Attractum semen non retinetur vel ex imbecillitate facultatis, vel ex impedimento, vel ex impedimento, vel ex obiecto. Et imbecillitas quidem intemperies, ut dixi, sequitur, præcipue vero humidam. Impedimentum erit ex tumoribus in corpore vteri, ex vlcere eiusdem, ex cicatrice relicta post vlcus, quæ nimiam in parte reliquit leuitatem. Oportet enim ad hoc, ut vterus retineat, illum aliquam habere asperitatem, & quasi plicas. Idcirco cicatrix vlceri superinducta ob nimiam leuitatem, retentionem prohibet. Idipsa facit oris vteri laxitas, siue sit naturalis, siue contracta ex partu difficili, ex abortu, ex manibus obstericis, aut speculo intromisso.

Denique ex obiecto non fit retentio, si semen sit vitiosum, acre, & vtero insensum.

Non fit etiam distributio, aut ex infirmitate facultatis alteratricis vteri propter morbos iam dictos, aut quia semen sit liquidius.

Vitimo loco non attrahitur sanguis ad vterum, quando vel deficiat ob atrophiam, vel ob alias purgationes per nares, aut per hæmorrhoides, vel ex inedia, aut quando impediti sint loci ex tumoribus & obstructionibus, vel quando vitiosus & impurus fuerit sanguis.

Hæc sunt potiores sterilitatis causæ, de quibus omnibus singularem nobis est agendum: nam causas istas superare nihil aliud erit, quam methodo resolutio singuli singulos vteri morbos inuenisse, & methodo curasse.

DE MORBIS, OB QUOS SEMEN VIRILE IN VTERUM NON RECIPITUR. Cap. III.

UT autem singulas sterilitatis causas, & tractare, & congruis remediis superare possimus, ad tria capita omnes illas redigam: quorum primum continet omnes affectus, propter quos semen in vterum recipi non potest: Secundum illos continebit, propter quos receptum semen non retinetur: Tertium versabitur circa illos morbos & symptomata, propter quæ semen retentum infecundum euadit, vteri parietibus non adherens in seipsum non conuertitur. Et in prima classe multum tractabuntur, & ceruicis, & vteri morbi. Siquidem semen non recipitur in vterum, si coitus exerceri commode non possit: non potest autem, quando vteri ceruix, aut contracta, aut

aut obstructa, aut coalescens fuerit. Si constringatur, affectus iste Græcis, ut Paulo *lib. 6. capit. 72.* & Gal. *lib. 9. de comp. med. sec. loc. c. 6.* dicitur *φίμωσις*, qui sane est duplex, naturalis scilicet & aduentitia. De utraque paulo post dicam. Constringitur præterea ex fissuris in conformatione aliqua existentibus; Græci *φύσας* vocant; *κονδυλώματα* etiam verrucae, & *ἀποχέιδες*, atque intumescences hæmorrhoides idipsum præstant.

Obruant etiam meatum inflammationes, atque illæ potissimum, quæ iam in scirrhum transierunt.

Sunt præterea alij duo affectus, nympha scilicet & cauda. Nympha Græcis dicitur *κλειτορίς*, estque vitium non modo inuenustum, verum etiam conceptioni incommodum.

Coalescentia similiter, quæ sit ex ulceribus perperam curatis, sterilitati etiam una ex præcipuis causis esse solet; quod facit etiam nimia oris vteri apertio.

Denique non recipitur semen in uterum ob nimiam vteri frigiditatem.

DE PHIMOSI. Cap. IV.

Causa phimosi ascitia. Itaque hac in parte agemus de Phimosi, rhagadibus, verrucis, & thymis, condilomatibus, nympha, & cauda, tumoribus induratis, coalescentia, vteri distorsione, & frigida intemperie. Incipiam a phimosi, quæ duplex cum sit, ascitia, & naturalis; Ascitia sit ex causis externis, ex usu medicamentorum adstringentium, ut decocto pinearum, rubei, myrtillorum, quibus utuntur obstetrices, ut iam deploratas virgines iterum ostendant, sed facile curatur. Igitur de causa hac nihil aliud dicam. Adstringitur ex causa ascitia etiam, quando post inflammationes, aut ulcera, vel tumor, vel calor adnectitur, aut coalescentia, de qua dicam postea.

Causa naturalis. Naturalis autem sit ex membrana; vocatur istæ mulieres, teste Aetio *lib. 16. c. 93.* non perforatæ, nihil aliud est hoc vitium, quam suberescens quadam membrana, atque illa quidem eodem Aetio, vel prope summa cervicis vteri labra (intelligetis autem ultra foramen vesicæ, alioquin enim mingere non possent) aut sit in media cervicis vteri parte, aut prope os vteri. Hæc est mea sententia, quicquid sentiant Arabes: ac communiter obstetrices hymen siue hymeneum vocant: non tamen in omnibus virginibus reperitur, imo in paucis, & monstrosa potius illæ sunt vocandæ, quæ talem membranam habent, quam quæ sine hac sunt. Testes huius rei sunt præstantiores rei anatomice professores: Vesal. *lib. 5.* Columb. *lib. 10.* Ambros. *lib. 23. cap. 42.* Andr. Laurentius *lib. 2. hist. mir. c. 15.* & alij complures huius rei indagatores, qui unam vel alteram, ex centum septem cum hac membrana inveniunt.

Itaque cum hæc membrana sit monstrosa, habet tamen latitudinem aliquam: nam quædam est in medio perforata, alia nullum habet foramen. Et siquidem perforata menses debito tempore effluunt: Si tamen concipiant, tempore partus maximo vitæ periculo pariunt. Posse autem illas con-

A cipere, quanquam sint obturatæ, docuit Aetius *lib. 16. cap. 92.* Quod si foramen non adfit, summum imminet periculum tempore eruptionis mestrux. Sanguis enim in vteri cavitatem effusus maxima infert symptomata; quod scribit Arist. *lib. 4. de gen. animal. cap. 4.* & confirmat Paræus ex sententia Ioannis Vueri *lib. 23. qui est de gen. homin. capit. 43.*

Huiusmodi affectus occultam satis habet notitiam; siquidem non possunt innotescere, nisi aut mensium, aut coitus tempore: quandoquidem, ut dictum est, vel menses non erumpunt, vel coitus perfici non potest.

Ceterum ad membranam dignoscendam, non satis est, menses non erumpere: nam plerisque non habentibus membranam, menses deficiunt, sed oportet symptomata ea superuenire, quæ sanguinem iam in uterum effusum, retentum tamen demonstrant; talia sunt tumor vteri, qui ementitum præ se fert conceptum: dolor lumborum & pubis, cibi fastidium, vomitus, febris, ingens præfocatio vteri, sudor frigidus, ut aliquando auctore Auic. partes extremæ lividæ evadant.

Cognoscetis autem membranam esse in summa cervicis vteri parte, & ita non modo conceptus, & menses impediri, verum etiam coitus; præterquam quod diligenti inspectione patebit.

Quod si in media sit parte, conceptum similiter adimit & menses, coitum vero non prorsus.

Si prope os vteri, tollit conceptum & menses, coitum non.

Illud tamen observandum hic est, mulieribus etiam *φίμωσις* patientibus, menstruas aliquando fieri purgationes, non tamen ex vtero, sed venis cervicis vteri hæmorrhoidibus dictis; & sic sciatur phimosi ex causa naturali.

Quod si præter naturam, ut tumor durus post inflammationem, præcessit inflammatio, & tumor digitis pressus facile percipitur. Si fuerit caro adnata vel coalescentia, necessario præcessit vlcus, cuius signa suo loco audietis.

De curatione phimosi, quia tota chirurgica est, & optime explicata, partim a Paulo, *lib. 6. ca. 72. partim ab Aetio lib. 16 cap. 93.* a quibus acceperunt Auicennas, & ceteri omnes, ego nihil dicam, sed ad eos vos remitto.

DE RHAGADIBUS ET CONDYLOMATIS. Cap. V.

Transibo itaque ad alios affectus, quos dixi conceptum impedire: & primum quidem ad rhagades & condylomata. Sunt rhagades, ut dixi, *scissura cervicis vteri cum maxima constrictione ex humoribus falsis & nitrosis illuc confluentibus.* Condylomata sunt *plicæ seu rugæ interioris tunica vteri in tumorem durum elevata:* Ideo ex sanguine partim melancholico, partim pituitoso productæ; ut non defuerint, qui putarunt, ut Ioannes de Vigo, condylomata posse inter hæmorrhoidum species connumerari.

Ex his duobus affectibus condylomata curantur emollientibus, moderate reprimentibus, &

Signa.

Signa membrana.

Signa non naturalis.

Curatio.

Quid rhagades.

Quid condylomata.

Curatio.

Q

refri-

refrigerantibus: Rhagades emollientibus, moderate reprimentibus, & siccantibus.

Idcirco in condylomate conuenit adhibere vel infessionem, vel spongiam imbutam in decocto altheæ, maluæ, sem. lini, plantag. fœnugræci, parietar. &c. & post fomentum vtantur pessatio hoc linimento intincto;

Linimen-
tum pro
condyla-
matis.

℞. mucilag. sem. malu.
psyllij an. onc. j.
pingued. anser.
anat. an. onc. β.
ol. ros. onc. j. β.
vitell. ouor. nr. ij. M. f. linim.

In rhagadibus autem licet vii fomento ex decocto scabiosæ, fumariz, lupulorum, rosarū, maluæ, & altheæ, hordei, lapatij &c.

Post quod vtamini hoc linimento;

Linimen-
tum pro
rhagadib.

℞. lytharg subtil. pulueris, onc. β.
ceruss. in aq. ros. lotba dr. ij.
ol. ros. complet.
succ. vermiculor. siue semperuini minor.
an. q. s. M. f. linimentum in mortario plumbeo; agitetur cum pistillo plumbeo.

DE VERRUCIS. Cap. VI.

Sed si impedimentum sit ex verrucis, siue thymi sint acrochordones, vel verruæ peniles & minores, siccantibus sunt curandæ; inter quæ est auripigmentum, puluis Sabinæ, aut simplex, aut mixtus cum portione stercoreis bouini recētis. Idem præstat succus cucumeris syluestris, lacti thymali &c. Fortiora sunt oleum ex chalcantho, ex sulphure, aqua fortis, capitella vocata, &c.

Dum tamen hæc aguntur, partes circumstātes oportet munire aliquo defensiuo idoneo, vt succo portulacæ, aut oleo.

Quod si maiores fuerint, curantur solo instrumento chirurgico, incisione sc. ligatura, atque igne actuali; quam tamen curationem ego hic non recensēbo, quia a scriptoribus, vt dixi, recte ac integre fuit tradita, quos consulere poteritis.

DE NYMPHA ET CAUDA.

Cap. VII.

EX affectibus, qui ideo sterilitatem faciunt, quia seminis attractionem prohibent, remanent adhuc nympa & cauda, coalescētia, tumor durus, mala vteri situatio, obduratio a pinguedine, & deniq; frigida vteri intemperies, de quibus singulatim agēdū. Et primo de nympa & cauda.

Nympa
quid.

Est igitur nympa incrementum præter naturā cuiusdam partis in extremitate superiori pudendi muliebris, quam Auicennas *sen. 2. l. 3. ca. 2. virgam* vocauit, Albucasis *2. chir. ca. 71. tentiginem* dixit posteriores Anatomici, nescio quam ob causam, partem hanc, tanquam ipsis incognitam, omiserunt. Fallopius inter neotericos, primus hanc partem antiquis cognitam iterum dilucidauit, vt videre est apud illum *in suis observationibus anatomicis*, vbi agit de pudendo muliebri, vocatque

A hanc partem κλητορίδ, vel κλητορίδα, vt propterea satis mirari non possim Columbū, qui *lib. 11. seipsum* profiteatur huius partis inuentorem, cum tamen ante illum Fallopius etiam, & ante illum antiquiores huius partis naturam & vsum inuenierit. Est enim hæc pars sicuti & pudendum virile partim quidem membranosa & cartilaginea, partim etiam musculosa, habetq; in extremo glādem, & in mulieribus ad Venerem incitatis perinde ac viris erigitur. Hæc itaque nonnunquam in magnam excrescit molem, vt non desint mulieres, quæ viri officium quandoque subire possint, quas puto proprie fricatrices antiquitus fuisse vocatas.

B Cauda vero est *carnis incrementum præter naturam, quod os ipsius vuluæ occupat*, & aliquando in tantam excrescit molem, vt quasi cauda extra prominat.

Distinguuntur hæc duo inter se, quia & cauda *Quomodo* vniuersum fere foramen occupat, est tota carnea, *nympa a* non erigitur, delectationem non infert, & tota est *cauda dis-* præter naturam. Nympa vero, vt dixi, quando *ferat.* fuerit parua, naturalis est, omnibus contingit, & in superiore tantum vuluæ parte reperitur, atque ea quidem interna prope orificium meatus vrinarij, vbi labia inuicem committuntur.

Tota curatio est chirurgica & exacte descripta, *Curatio.* partim a Paulo *lib. 6. capit. 71.* partim ab Ælio *4. tetrab. 4. cap. 103. & 104.* a quibus accepit Albucasis *2. chirurg. capit. 71.* Itaque ad hos consugiatis auctores.

DE COALESCENTIA.

Cap. VIII.

Quod pertinet ad coalitum, hic vel est Integer, vel Non integer. Vbi integer est, scalpello est diuidendus, deinde tenta statim imposita tentandum, ne labra iterum coalescant.

Quod si aliquod relinquatur foramen, quamquam angustum, imponenda sunt illa, quæ paulatim foramen amplius reddant: hoc præstant spongiæ siccæ in modum turundæ impositæ, radix gentianæ, medulla cannæ ex soncho. Possunt etiā fieri fistulæ ex stanno vel plumbo, quæ, vbi caro fuerit duriuscula, corrodentibus illineantur medicamentis, vt paulatim caro ipsa absumatur. Hanc ob causam conuenit fistulam illinire vnguento *D* Egyptiaco, aut conficere linimentum tale:

℞. auripigm. dr. ij.
lapid. sarcophagi dr. j.
mell. q. s. M. f. linim.

Linimen-
tum.

Si cruenta reddatur pars, blandioribus linimentis vtendum ex seuo hircino, & cerussa, & oleo rosaceo compositis, tum ad corrodētia redeundum, ita tamen, vt fistulæ indices crassiores, & ampliores reddantur.

Quando autem foramen debite fuerit amplitudinis, siccantibus & cicatrificantibus vtendum, de quibus in tractatu de Vlceribus vteri dicam.

DE TREMORE VTERO. Cap. IX.

Quod si tumor durus muliebri pudendum occupet, pelli sunt imponendi ex seuo, butyro, medullis, atque oleis emollientibus confecti, Forma pelli poterit esse talis;

sem. malu.

lini an. dr. ij.

butyri recent.

seui bircini an. q. s. dissoluantur hæc in olla noua, & additis seminibus fiant pessaria s. a.

Fiunt autem hæc pessaria hunc in modum, formatur ex papiro forma pessarij, deinde imponitur papitium in aquam frigidam, calens vero materia projicitur in illam formam; nam sic coagulatur in formam pessarij.

Qui ignorauerit hunc modum, poterit pessulos conficere ex lana, aut lino, & emollientibus illinire, vel adipe anseris, anatis, mucilagine psyllij, & sem. malu, oleo amygdalino &c, sic enim paulatim tumor ille emollietur,

DE NIMIA PINGVEDINE.

Cap. X.

Sterilitatem ex nimia pinguedine obortam curabit corporis extenuatio, Extenuabitur corpus purgationibus, sanguinis missione, exercitio, frictionibus, inedia, vigilijs, curis, & denique confectionum excrementorum euacuatione,

DE MALA VTERI SITUATIONE. C

Cap. XI.

Quod si fiat sterilitas ex mala vteri situatione, hunc affectum vocat Auicennas vteri declinationem, Paulus capit. 77. auersionem, vel declinationem. Quæ declinatio fit, vel in latus dextrum, vel in sinistrum, ad posteriora & anteriora; fit quoque ad superiora & inferiora, sed de his loquimur infra; nam pertinent ad alias causas.

Causa.

Mutationes autem propositz propriæ seminis receptionem impediunt.

Malæ huius situationis causa nulla est alia, quæ eorum ligamentorum repletio, ad quam partem vterus inclinat. Ideo dicebat Aëtius, declinationis vteri ad partem dextram causam esse repletionem vasorum, quæ ad iecur pertinent; alterius vero ad sinistram repletionem vasorum lienis. Vtunque sit, siue repleantur vasa tantum, siue vasa & ligamenta simul certum est, his in vna parte repletis, siue cum inflammatione & tumore, siue citra ea, vterum in eam partem inclinare, quod docuit Gal. lib. 6 de loc. aff. cap. 3.

Et mediata huius repletionis causæ magna ex parte sunt menses retenti.

Signa.

Facile cognoscitur mala vteri situatio, nam perita obstetrix digito imposito os vteri distortum inueniet.

Ceterum sine hoc experimento cognoscetis vterum in dextram, vel sinistram inclinare partem, quia mulier cogitur in eo latere claudicare, in eaque

A parte frigiditatem, stuporem, torporem ac tremorem sentit, Quinimo, quod ego propria experientia obseruaui, non tantum crus, verum etiam humerus & brachium eiusdem lateris tremore & stupore laborant. Quod si inclinet in partem posteriorem, faeces supprimuntur, aut difficulter egeruntur; desiderium tamen eiiciendi est fere perpetuum, & tunc deterius habent, cum sedent, aut supinæ decumbunt,

Quod si declinet ad partem anteriorem, tumor apparet in regione pubis, vrina supprimitur, vel cum difficultate emittitur.

Est affectus magni momenti: nam præter sterilitatem, infert etiam vteri præfocationem, & aliquando ad suppurationem tendit, ut propterea Hipp. sect. 5. aph. 47. scripserit, si vterus in coxam inclinatus suppurauerit, emmorum esse necessarium, per Emmorum intelligens id, quod nostri chirurgi turundam linimento obductam ex filo vel lintheo paratam vocant: Nam *εμμοτον* Græce nihil aliud significat, quam linimentarium, quasi dicat Hipp. vlcus esse vsq; adeo profundum & fistulosum, ut egeat eiusmodi longo linimentario, quod optime intellexit Galenus, quanquam doctissimus Mercurialis, præceptor meus, & alij ante illum perperam Gal. accusauerint, quasi Hipp. sententiam hoc modo non intellexerit,

Prognosis.

Sed iam ad curationem accedamus.

Curatio.

Curatur hic affectus primum quidem vniuersali totius corporis purgatione, in qua, etiamsi menses essent suppressi, ego cum Aëtio venio in hanc sententiam, conferre ante omnia venæ sectionem, quæ ex partibus fiat superioribus; hac enim ratione fit retractio humoris fluentis a parte. Deinde vero secunda etiam sunt venæ inferiores, partis tamen oppositæ illi, ad quam vterus inclinat. Quinimo eidem parti apponendæ sunt cucurbitulæ, adhibendæ frictiones & ligaturæ, inunctiones calidæ, dropaces, & sinapismi: Tentandum quoq; digito obstetricis paulatim os vteri invertere; illiniatur autem digitus ol. amygdalino, in quo dissoluatur moschus. Apponatur quoq; cucurbitula in inguine opposito partis retractæ.

Vena sectione.

Affectu autem parti apponantur fomenta digerentia ex pulegio, conyza, satyria, calamentho, diptamno, valeriana cum seminibus scæni graci & lini. Adhibeatur ceratum ex galbano, & serapino, admixtis costo, galanga, & pipere.

Et si vterus declinet ad posteriora, consulit Aëtius, ut obstetrix imposito digito in anum oleo aliquo intincto vterum propellat ad anteriora, quod ipsum faciet pessarium, & clysteres frequentes non modo in intestinum, verum etiam in vterum iniecti, qui omnes debent esse calidi & digerentes. Sed quia horum syluam habetis infra, propterea de hoc affectu finem faciam.

De Frigida & Humida Vteri Intemperie, deq; eius Hydrope & Inflatione. Cap. XII.

Frigida & humida vteri intemperies oibus quidem huius partis facultatibus est noxia, maxime vero attractrici: Idcirco de hac tanquam illa, quæ

sterilitati est admodum insensa, accurate nunc dicendum est. Nomine autem frigide & humide intemperaturę cum Galeno in *com. apb. 62. sect. 5.* intelligimus excedentem: nam moderata, si semen virile calidius ac siccius exceperit, fecunda euadit: excedens vero nulla ratione a virili: semine emendari potest. Est autem potissimum talis, quando multam habuerit pituitosę materię copiam, quando etiam vterus, vel hydropes, vel inflatione fuerit affectus.

Et quanquam hydropice mulieres fuerint in quibus vtero gerentes: Hæ aut non laborant hydropes ex vtero, aut si fuerit hydrops vteri conceptus ante hydropem fuit factus. Posse autem hydropicas mulieres vtero gerere, docuit me præteritorum mensium historia: nam curani mulierem iam triennio hydropicam, ascite potissimum laborantem, quæ præter cetera omnia remedia septies absque noxa elaterium accepit ac sustulit, & tamen duobus mensibus ab absoluta purgatione puellam enixa est viuam, & debito tempore in lucem editam.

Quid hydrops vteri. Hydrops igitur vteri nihil aliud est, quam tumor ex aqua in vtero contenta. Continetur autem hæc aqua, *Ætio auctore 4. tetrab. quarto capit. 79.* Et ratione non in ciuitate vteri; quicquid enim sentiat Mercurialis, impossibile est, aquam in ciuitate vteri contentam, ore adhuc patente nulla ratione excerni. Verior est *Ætij* sententia, illam in membranis, seu vesicis quibusdam contineri, quasi in proprijs folliculis, sicuti etiam plerumque continetur in alijs, ex peritonæo hydropes laborantibus.

Causa generationis hydropis. Generationis causa est, vel potus aquæ, vsus celerum & fructuum, menses suppressi, in mulieribus potissimum frigidioribus: In illis etiam, quibus vrina, aut sudor, aut vomitus præter consuetudinem sunt retenta.

Quid vteri inflatio. Vteri autem inflatio tumor pariter est vteri ex flatulenta materia, quandoque in tunicis, aliquando in capacitate contenta.

Scio autem aliquem statim dicturum, si continetur flatus in vteri capacitate, & non excernitur, cur etiam aqua contineri non poterit? Dicam hac in re vobis meam sententiam, atque vnus affectus causam vobis aperiam, quem, ni fallor, nemo ante me cognouit. Noui ego duas nobilissimas mulieres Patavinas, ambas temperamenti pituitosi, quæ cum in euentum cõceptionis suspectum incidissent, inflatione ventris tentari cõpere, aucta est inflatio in modum conceptus vsque ad nonum mensem, nono mense incipientibus partus doloribus vocatæ sunt obstetrices, aduenientes, partus hora grandes erumpunt flatus, venter detumescit, partus denique fuit ipse flatus. Puto in his casibus illud contigisse, quod aliquando scribit Gal. in *Aristot.* ut probet, semen virile materiam esse factus, inquit Gal. si semen virile non esset materia factus, ergo retentum in vtero conuerteretur in flatum, extensiones, & dolores excitaret. In istis mulieribus hoc Galeni argumentum locum habet, semen retinetur, sed propter nimiam vteri, frigiditatem, & humiditatem non potest esse fecundum: interrim clauditur os vteri, quasi factus sit conceptus, mittitur materia ad vterum, quæ tanquam pitui-

tosâ continuo in flatus cõuertitur: Sic in dies vterus magis intumescit: tempore partus aperto vtero flatus erumpunt. Sed audiat aliam rem mirabilem in hoc casu: flatu iam euacuato nobiles istæ mulieres antea infecundæ statim conceperunt, & post nouem menses peperit vtræque filium, aliam nõ puto huius fuisse causam, quam, quod ex diuturna, oris vteri occlusionē calor naturalis validior redditus, vniuerso iam flatu euacuato vterum reddiderit calidiorem.

Sed quicquid sit de hac re, certum est, flatum in capacitate vteri retentum occluso ore vteri retineri, occlusionis causam esse, vel iam dictam, vel, ut voluit *Ætius*, ætuum sanguinis, vel crassam pituitam, vel callum, aut carnem, vel distortionem, aut aliam similem causam.

B Omnia hæc mala habent easdem causas, ac ferè eadem signa. Nam hydrops vteri cognoscitur ex tumore cum fluctuatione declinante potissimum muliere in latus, vter in eam partem secedit, suppressi sunt menses, color faciei est pallidus, oculi subtumidi, quinimo & crura & coxæ cedematoso intumescunt tumore. Signa causarum ex patientis relatione innotescunt.

Inflatio similiter ex tumore cognoscitur. Sed nõ fluctuante, potius rugiente, ac si percutiatur vter, resonante, crura & coxæ, faciesque ipsa non intumescunt, sed aliquando palpitaciones hinc inde discurrentes apparent, ad hæc consequitur ea signa, quæ frigidam & humidam vteri intemperiem testantur, videlicet coitus abominatio, fluxus mensium alborum, sitis carentia, sputi abundantia, somnus, torpor, & ignauia, menses deficientes, aut si appareant decolores.

Curandæ omnino sunt quam primum istæ affectiones, & ad arcendam sterilitatem, & ad comparandam mulieri vâletudinem, quæ alioquin per hos affectus absque vitæ periculo esse non potest. Curabitur autem, si ante omnia & vniuersum corpus, atque adeo ipse vterus expurgetur. Secundo, si singulæ partes calefiant & siccantur: Tertiò, quod pertinet ad sterilitatem, & exhibeantur agentia a tota substantia.

Vniuersalis purgatio fiet hunc in modum:

℞. spec. hier. simpl. dr. iij.

el. lenit. dr. vi.

diaphanie. dr. ij. M. & cum sacch. f. bol.

Bolus purgans totus.

Aut poteritis præbere *dr. ij. spec. hieræ*, & statim

D post hunc potum

℞. mell. ros. sol. onc. iij.

mann. el. onc. ij.

aq. rorism. q. s. M. f. potio.

Potio.

Præparandi sunt primo humores, qui in primis vijs sunt idcirco absque dilutis, ut

℞. oxymel. compos. onc. j.

syr. de mentb. onc. β. M.

Syrupus præparatus.

De sanguinis missione aliqua videtur dubitatio: nam, Paulo & *Ætio* exceptis, ceteri omnes in frigida & humida vteri intemperie venæ sectionem prohibent: nihilominus si humiditas & frigiditas non sit naturalis, sed aduentitia, ex infusione in aquis frigidis, aut ex aere frigido, vel cibus & esculentis frigidis inducta, totum

Sanguinis missio.

totum vero corpus a natura calidum & humidum sit constitutum, in hoc casu ad reuulsionem humorum fluentium, & ut calida medicamenta tutius admoveantur, vena superior secari potest.

Facta præparatione purgandum est corpus hoc medicamento,

*℞. biera Pacbi, vel diacolocynth. dr. ij.
el. lenit. onc. β. M. & cum sacch. f. boli.*

Syrupis deinde iam propositis addendæ sunt decoctiones. Neque vos perturbet Hippocratis auctoritas 3. acut. 39 qui inquit, acetum vero esse inimicum, ut propterea desistat ab oxymelle, vel simplici, vel composito: acetum enim vtero iam exsiccatum est inimicum, humentiori vero & pituita referto, non est inimicum. Dabitur ergo hunc syrupum,

*℞. oxymel. scyllit.
compos.
syr. de cortic. citri. an. onc. β.
decoct. artemis.
senecionis
puleg.
satureie
calament.
dictam.
origani onc. iij. M. pro syrupo.*

Interim habenda est ratio consuetudinis mulierum. Nam si vomitum habeant consuetum & facilem, vomitibus sunt purgandæ, vel a cibo, vel ab accepto oxymelle, & radicularum decocto.

Quod si facile non possint euomere, repetenda est proposita purgatio.

Post vniuersales has purgationes vterus singulatim, siue pituita, siue aqua, aut flatu sit refertus, erit expurgandus.

Ut autem pituita ex vtero educatur, sic est procedendum. Primo quidem ad crassos humores attenuandos, decoctio talis est paranda, cuius sumus, vel per cannam, per arundinem, vel per fistulam stanneam, aut plumbeam in vterum recipiatur;

*℞. puleg.
calamentb.
origan.
thymi
satureie an. M. j.
rad. tibymal. p. j.
colocynth. interior. onc. β.
cymen.
anis. an. onc. j.*

euphorb. onc. ij. f. decoct. in f. q. aut aquæ thermalis, aut salis, aut vini albi, & facta expressione f. suffumigium.

Ex hac ipsa decoctione poterit fieri clyster vterinus, accipiendo prædicti decocti onc. iij. oxymel. simpl. aut scyllit. onc. j. Ab imposito clystere statim imponendum erit pessarium hoc,

*℞. euphorb.
sinap. an. onc. β.
pulp. colocynth. dr. j.
salis scr. β. excipiantur aut melle, aut pulpa caricarum optime contusarum, aut succo cyclaminis. Hoc pessarium debet in vtero diu re-*

tineri, nisi tamen mordacitatem inferat, in quo casu lacte, aut ol. amygd. illinendæ sunt partes muliebres, tam diu in his insistendum, quam diu appareant signa pituitæ in vtero abundantis.

Quod si in vtero potius aqua contineatur, ut in hydrope, ad hydropem expugnandam, fortioribus medicamentis opus est. Et primum quidem circa vniuersales purgationes, præter hieram diacoloc. conuenit etiam vsus elaterij. Exempli gratia, *℞. spec. bier. simpl. dr. j. elater. gr. iij. M. f. boli.* conuenit vomitus vel Post, vel Ante cibum. Dicebat Aetius 4. tetrab. 4. ca. 30. in multa humiditatis abundantia vomitum mulieribus, etiam ante cibum, excitandum. In hydrope ergo vomitus parabitur. Ex vomitu autem, præter euacuationes, iuuamentum aliud quoque maximum expectatur, quod scilicet si aqua intra vesicas vteri contineatur, ex impetu vomitus disrumpuntur vesicæ, ut facilis deinde fiat excretio. Præter vomitum autem & expurgationem, conueniunt etiam diuretica & sudorifica, & inter cetera probatur mihi bolus iste;

*℞. cerebintb. Laticina onc. β.
sem. cimini
apij
sanic. an. dr. j. M. f. boli.* accipiantur singulo mane quatuor horis ante cibum. Placet quin etiam ius columbi, in quo ebullierint radices apij, petroselinij, sceniculi, rusci & asparagorum. Præterea vero pulegium, carduus benedictus, dictamnus, &c. sudorifica: fiantque frictiones calidæ & validæ. Administrentur Laconica & suffræ.

Interim autem aqua ex vtero, sequentibus euacuetur medicamentis, & primum quidem clystere, ut

*℞. rad. tibymal.
mezereon. an. p. j.
cortic. interior. samb. vel illius flor.
rad. bryon.
cucum. syluest. an. p. β. bull. in f. q. vini, aut aquæ thermalis,
vel salis, & facta express. ℞. dicti decocti onc. iij. f. clyst. vter.*

Ab iniecto clystere imponendum est huiusmodi pessarium:

*℞. cocconidij gr. vj.
elat. gr. iij.
euphorb.
sinap. an. scr. j.
mel. q. s. M. f. pessarium.*

Interim quoque inungendus est vterus oleo illo resolutiuo, quod, ut alias docui, fit ex radice bryoniz, cucum. syluest. & ruta: Inunctio autem facienda est saltem per mediam horæ partem, confricando continuo vteri regionem, semper nouum affundendo oleum. Sic quoque aqua, si in vesicis contineatur, facile poterit excerni: Et ut facilius succedat, laudo, ut hæc operatio fiat plena adhuc vesica. Quinimo, si possent mulieres sustinere, congruum esset eo ipso tempore clystere imponere ex decocto paulo ante descripto, quandoquidem distenta vesica & intestino, & compresso abdomine, tandem aquam erumpere est necessarium.

Expurgata aqua & flatu, incumbendum deinde

Ratio expurgandi aquam ex vtero.

Bolus.

Vomitio.

Bolus diureticus.

Clyster vterinus.

Pessarium.

immo?

est medicamentis siccantibus caloricis, atque à proprietate fecunditatem conciliantibus, quæ etiam flatus discutiunt, & idcirco vteri inflationem sanant. Sunt hæc interiora & exteriora. Dicā primum de localibus, mox de internis.

Localia.

Localia sunt fomenta, infusiones, euaporationes, suffumigia, pessi, cerata, emplastra, inunctiones, cucurbitulæ, sinapismi, & dropaces.

Fomenta autem, infusiones, & euaporationes possunt fieri ex vna eademque materia, quæ erit talis.

℞. *pbu seu Valeriana*

meu

calamentib.

artemis.

senecion.

saturne.

puleg.

dictam. an. M. j.

anif.

fenic.

dauc.

sesel. an. onc. ij.

cymin. onc. j. incidenda incidantur, terenda terantur, bul. in *f. q. aq. thermal. vel salsa, vel vini*, f. fomentum, infusio, vel euaporatio.

Iuuant quidem etiam aquæ thermales simplices, sulphuratæ potissimum, & aluminosæ, his tamen additis sunt fortiores.

Olea accommodata sunt, ol. rutaceum, cheirinum, liliorum alporum cum aromatibus. Ceratum sit tale;

Ceratum.

℞. *Galban. onc. β.*

castor. dr. ij.

costi

galang.

zodoar. an. dr. j.

sinap. dr. β.

cera

resine an. q. s. M. f. ceratum.

Cui si addatis maiorem portionem sinapi, ac præterea piper & pyrethrum, euadet dropax.

Si etiam accipiatis caricæ contusas & misceatis cum sinapi, conficietis sinapismum, qui vtero erit utilis.

Suffumigia.

Suffumigia autem ex siccis fiunt pulueribus, quæ administrari quidem possunt in vtero frigido & humido, non tamen statibus multis referto, si ætio credimus, *tetrab. 4. serm. 4. cap. 78.* Ratio, ut puto, est, quia suffitus aromatum petit caput. Vbi autem multi sunt flatus, simul cum suffitu, etiam flatus ascendunt, imminet vertigo, vel aliud maius malum.

In inflatione ergo vteri abstinendum a suffumigijs. Parantur autem in hunc modum;

℞. *thur.*

myrrha

lign. aloes

cyper. an. dr. j. terantur ac excipiantur

styrace liquida, & fiant formulæ dr. j. quarum vna super prunis locis muliebribus subdatur.

Possunt etiam fieri cum trochiscis ex *gall. mosch. cum trochisc. cyphoid. &c.* Qui voluerit habere

A simplex, poterit quoque ex tēpore parare pulueres myrrhæ, thuris, cinnamomi, & garyophilorū. Conueniunt etiam pessi in inflatione quidem tales;

Pessariū.

℞. *nitri*

cymini

anisorum

ameos an. dr. β.

styr. de artemis. q. s. M. f. pessar.

Quod si scopus fuerit potius calefacere, pessi erunt tales;

℞. *costi*

cassia lignea

carpobalsam.

cinnamomi

charyoph. an. dr. β.

moschi

ambr. an. gr. iij.

styrac. liquida q. s. M. f. pessi parui, qui pro diuitibus sunt præstantissimi.

Pro pauperibus potestis dimittere moschum, & ambram, & pulueres melle excipere.

Intrafeta.

Intrinfecus autem conueniunt quidem omnia calorifica & siccantia, sed quæ etiam a proprietate substantiæ fecunditatem iuuant. Inter hæc sunt aquæ thermales, & apud nos celebres & fructuosæ Apponienses nostræ in agro S. Petri, Immutinenses aquarij nuncupatæ præstantissimæ habentur.

Præter has est decoctum gallinæ obstetricibus vscatissimum, recipiunt pinguem gallinam cui feceratam, in ventrem eius ponunt nucem moschatam, zinziber, galangam, cinnamomum, garyophyllum & piper, coquunt ad perfectam carnis coctionem, facta forti expressione præbent huius iuris quotidie onc. viij. vel viij.

C

Celebratur etiam vsus aureæ Alexandrinæ ad dr. j. vsusq; mithridatij, valet illud vinum hypocraticum, & apud omnes celebratur illud, quod vocatur muscatellum, mihi tamen magis placet rubeum quam album, hoc dico, quia muscatellum est album.

Valent quoque rotulæ variæ, ut diagalanga, diaspoliticum. Et denique ex iuuantibus a tota substantia est coagulum leporinum, & vterus leporinus siccatus, & in puluerem reductus, datur dr. j. singulo mane ex vino odorato: hæc conserua habetur etiam pro secteto ab obstetricibus;

A tota

substantia

innantia.

℞. *conseru. fl. vorismar. onc. iij.*

ex cortic. citr. onc. ij.

coagul. leporin.

vter. lepor. exsic. & pulv. an. dr. iij.

rad. satyrion. dr. j. M. f. el.

Electua-

rium.

Possunt etiam ex his pulueribus, qui a proprietate conueniunt, fieri electuaria & tabellæ;

De Morbis, ob quos semen receptum non retinetur in vtero: Et primū quidem de Lapide vteri,

Cap. XIII.

P Lerunque sit ut virile semen in vterum quidem trahatur, attractum tamen ad receptionem non retineatur.

Causæ

Causæ vero, propter quas non retinetur, aliæ sunt rariores, aliæ frequentiores.

Rariores sunt, lapis & lumbrici in ciuitate vteri existentes.

Frequentes sunt vteri procidentia, debilitas, paralyfis, oris vteri nimia amplificatio, inflammatio, abscessus, tumor durus, vlcus, & cicatrix, fluxus immodici, aut mensium, aut alterius materię, adhæc gonorrhœa, & mensium stillicidium. De singulis singulatim agetur.

Causa. Et ad lapidem vteri, quod spectat, cuius meminit Aëtius 4. *tetrab. quarto, capit. 98.* fit lapis in vtero ex illis ipsis causis, ex quibus in liene, pulmonibus, cerebro, alijsq; huius generis partibus, concretescente scilicet crasso & viscido humore, partim ex propria visciditate & crassitie, partim ex calore exsiccante.

Signa. Cognoscitur digito imposito in anum. Cum enim vterus intestino insideat, facile digito lapis sentitur.

Curatio. Curatio fit per extractionem, euacuatis primū per clysterem in intestinis facibus, debet autem esse emolliens ex decocto maluarum, althæarum, & semini, addito ol. amygd. imponuntur duo supremi digiti in intestinum, quibus lapis ipse ad os vteri comprimatur, altera manu ventrem ad interiora, reprimere oportet. Vbi iam lapis ad os vteri ipsius expressus erit, vel digitis, vel instrumento accommodato extrahatur.

DE LUMBRICIS VTERI.

Cap. XIV.

Lumbrici quoque in vtero existentes, seminis retentionem impediunt. Hos aliquando excretos ex vtero vidit Garzias Lopius in *sua de varietate lectionum, cap. 13.*

Causa. Generantur autem ex materia etiam pituitosa putrescente.

Signa. Cognoscuntur ex materia exeunte putrida, fetida, pruritu, titillatione matricis, ac seminis retentione in vesica.

Curatio. Exstinguuntur autem iniectis clysteribus in vterum ex decocto graminis, seminis brassicę pulpe colocynthidis, addito succo limonum, oxymelle scyllitico, &c.

DE PROCIDENTIA VTERI.

Cap. XV.

Ceterum frequentiores, ut dixi, impeditæ retentionis causæ sunt aliæ iam dictæ, ut primum vteri procidentia, siue prolapsus, vel descensus vteri.

Fit hic prolapsus quadrupliciter: aliquando descendit vsque ad mediam ceruicem vterus, nonnunquam vsque ad os vuluæ, ut appareat quasi pila, aliquando decumbit in femur, nonnunquam vsque ad genua: Quamquā inter recentiores Mercurialis hoc negasse visus fuerit: Experientia tamen est in oppositum.

Fit huiusmodi prolapsus, vel causis internis, vel externis.

A Internæ sunt aut laxantes, vel impellentes. Laxantes, aut Ligamenta, aut Os vteri. Laxantur ex paralyfi, cōsequenter ex nimia imbecillitate, quod dico propter Aëtium, qui in tribus diuersis capitibus agit de his, de debilitate scilicet in 73. de paralyfi in 75. & de procidentia in 76. cum tamen curatio vnius procidentię, sit etiā curatio alterius.

Fit quoque prolapsus ex vteri nimia laxitate, ab amplitudine, siue naturalis fuerit, siue ex nimio humore, aut humida fluxione contracta, vel ex partu difficili.

Causæ aut impellentes sunt flatus ipsius vteri. Externæ vero causæ sunt extractio secundinæ, aut fœtus mortui, aut lapidis, clamor, ponderis eleuatio, atque aliæ conuulsiues causæ.

B Cognoscuntur facile tres vteri procidentię, videlicet, quæ ad Femur, ad Coxam, & ad Os vuluæ descendit; Quarta autem digitis est exploranda.

Sed quia æmulatur durum tumorem, distinguitur procidentia a duro tumore, quia in procidentia tumor non est semper vno & eodem modo, manere semper in dorso decumbente, tumor non adest: si in ventrem decumbat, tumor adest aliquando maior, aliquando minor, nonnunquam in dextera magis, aliquando magis in sinistra.

Et si fiat prolapsus ex intemperie humida, sit sine dolore, in temperamento humido, constitutione humida, cum fluxu muliebri, præcipue vero materię albæ.

Si ex paralyfi, vterus semper vno & eodem modo est prolapsus, in intemperie aliquando magis & minus prolabitur.

C Si fiat ex amplitudine oris vteri, sit absque dolore, absque fluxu albæ materię, in temperamento etiam calido & sicco: præcessit autem vel partus vnus difficilis, vel plures, vel extractio secundinarum.

Quod si fiat ex flatu, vterus tumidus, & venter percussus resonat, sitque procidentia cum dolore.

Causæ externæ ex relatione ipsius patiens patebunt.

Est hic affectus, non modo propter sterilitatem magni momenti, sed etiam propter mulierum valetudinem & vitam. Præterquam enim, quod frequens prolapsus impedit menses, hystericas infert passionem, aliquando etiam vterum ipsum ad sphacelum deducit. Ideo occurrédū debitis remedijs.

Considerandum autem in curatione ante omnia venit, an procidentia sit antiqua, an recens: Si antiqua, an pendeat extra vuluam vterus, an potius intra vuluam contineatur. Si antiqua procidentia neque vterus extra vuluam propendeat, sed hæreat in orificio vuluæ, veluti pila, in primis molliendus est, secundo, in proprium locum reponendus. Tertio, ad strictorij, & causam amouentibus vtendum.

Emollitur somento facta ex decocto senugiaci, semini, lini, maluarum, althæarum, aut in aqua, si vterus sit calidus, aut in vino dulci albo, si frigidior.

In maiore duritie adhibendum est emplastrum sequens.

℞. far. sem. lini ons. iij.
mucil. psyll.
sem. lini an. ons. ij.

Q. 4 pin-

Empla-
strū emol-
liens.

**Causa im-
pellentes.
Externa.**

Signa.

**Prognosi-
ca.**

Curatio.

pingued. gallin.
anat.

ol. amygd. dulc. an. onc. j.

decoct. supra præscripta q. s. M. f. em-
plastrum.

Vterum manu oleo amygdalino inuncta repo-
nere oportet sensim ac blande, decumbente mu-
liere in dorsum cruribus diuaticatis, ut in proprio
loco retineatur, adstrictoria, repellentia ad supe-
riora sunt administranda.

Adstrictoria dorso adhibentur & vuluæ.

Dorso hoc fiat emplastrum.

℞. album. onor. nr. iiij.

succ. moror. immatur. vel syluest. r.
onc. iiij.

tragac.

amyl. an. onc. β.

farin. volat. molend. onc. ij.

bol. armen. onc. j. M. f. emplastrum,
quod ponatur supra dorsum, in la-
titudine vnius vlnæ.

Vuluæ autem spongiam adhibeatis in vino ru-
bro madefactam, in quo bullierint rosæ, myrti,
acacia, hypocystis, malicorium, balaustia, nux cu-
perffi, & capita glandium.

Potestis pilam vnā ex lana conficere, & in hoc
decocto imbutam in vuluam immittere.

Placet consilium Hippocratis, libro secundo, de
morb. muliebrib. ut accipiat pomum granatum
ex adstringentibus, in medio proferetur, & coqua-
tur in vino adstringente, sicq; coctum indatur lo-
cis muliebribus ad restituendum vterum in suum
locum.

Suffumi-
gia.

Adiuuabunt eandem intentionem suffumigia
ingrata vtero adhibita, ut quod sit ex stercore bo-
uino, caprino vel exsiccato, & super prunas impo-
sito, vel in aceto, aut decocto adstringente ebulli-
to. Suffumigium quoque ex cornu bovino, capri-
no, vel ex ungulis ipsorum præstare potest.

Attrahunt vero vterum ad superna, & retinent
in suo loco odorem gratia, ligaturæ superio-
rum partium, cucurbitulæ mammis appositæ.

In plethoricis venæ sectio & purgatio per aluū
& diuretica, auctore Hippocrate, libro secundo, de
morb. muliebrib. faciunt etiam ad retentionem, &
ad præseruationem, ne amplius procidat.

Et hæc est curatio procidentis vteri, qui adhuc
non sit gangrenatus.

Si vero vterus ita excidit, ut coxæ, vel genu in-
cumbat, & iam gangrenetur, nullum aliud reme-
dium scio, quam ut excidatur totus vterus. Sed di-
cetis, potest ne hæc operatio muliere superstiti
fieri? Potest sane: Præter experimentum, quod
habui Venetijs, vbi quædam ancilla ipsa sibi vre-
rum amputauit, quod in nimis laboribus sæpius
procidisset, sunt quoque testimonia aliorum scri-
ptorum, ut Pauli lib. tertio cap. 72. Aëtii 4. tetrab.
4. cap. 76. Alzarabij tract. 20. cap. 7. Auenzoar. 2.
de istr. tract. 6. cap. 4. Auicenn. 4. in 4. cap. de extra-
ctione sagittarum. Syluij in comm. quos edidit de

Curatio, si
vterus ex-
tra prop-
deat.

AKakia. morbis muliebribus, cap. 7. Nicolai Akak. lib. 4.
de morbis muliebribus, cap. 5. & denique Carpen-
sis in com. de aff. lib. vteri, vbi profert duos casus ex-

A cili vteri procidentis salua patiente, quorum alte-
ra fuit sub patris, altera sub referentis manibus.

DE INFLAMMATIONE VTERI. Cap. XXI.

Si quid est, quod seminis retentionem, & conse-
quenter conceptum prohibere possit, illud sa-
ne est vteri tumor & vlcus. Ex tumoribus autem
tres sunt, qui mutuo se consequuntur, inflamma-
tio scilicet, scirrhus, & abscessus, ut propterea Aëtius
4. tetrab. 4. de hoc triplici tumore in tribus diuer-
sis capitibus, continuata serie mentionem faciat,
ab inflammatione incipiens, deinde ad scirrhum,
mox ad abscessum transiens.

Inflammatiō autem vteri, siue sit legitima, siue

B spuria, id est, siue ex syncro sanguine, siue bilioso,
pituitoso, melancholico, vel atrabilari fieri consue-
uit, aut per modum attractionis, aut per retentio-
nem vel impulsionem.

Et attrahuntur quidem humores, vel ex casu,
percussione, difficili partu, extractione secundina-
rum, aut fœtus mortui, vsu caloris medicamen-
ti, aut dolore vteri.

Retinentur humores suppressis mensibus, aut
puerperis.

Impelluntur autem ex robore partium super-
narum, iecoris, lienis, cerebri & cordis, atq; adeo
vniuersi corporis, præcipue vero, si consueta excre-
tio aliqua, vel ex hæmorrhoidibus, vel natibus,
vel alia consimilis sit suppressa.

C Congeritur materia aut in tunica vteri exte-
riore, vel interiore.

Præterea aut est in fundo, aut prope os vteri,
vel in parte anteriore, vel in postica, quandoque in
latere dextro, nonnunquam in sinistro.

Cognoscitur inflammatio ex dolore, calore, fe-
bre vehementi & ardente, præcipue vero, si fuerit
legitima: Quinimo, si fuerit erysipelacea, infert
dolores vehementissimos, vigilias, deliria, conuul-
siones aliquando. Pituitosa autem & melancholi-
ca inflammatio symptomata habet mitiora.

Si fuerit in fundo vteri, trahitur vterus ad su-
periora, dolor & tumor est circa regionem umbili-
ci.

Si sit in parte inferiore, tumor apparet circa os
vteri, digitoque explorari potest, menses omnino
retinentur. Si fuerit in parte anteriore, superuenit
stranguria, vrinx stillicidium.

Si in posteriore, supprimentur feces, & adest
quasi tenesmus.

Si in lateribus sit, in ea parte, vbi adest tumor,
adest etiam cruris imbecillitas, stupor, refrigeratio,
torpor, & claudicatio.

Est sane periculosissimus affectus, & qui non
modo conceptionem, verum etiam fœtum iam
conceptum, imo matrem ipsam exstinguat. Quā-
quam autem hanc rem sub iudice reliquerit Gal.
sect. 6. aph. comm. 43. vbi quærit, an sit perinde le-
thalis inflammatio vteri sicuti Erysipelas?

Ego doctus experientia testari possum, vteri in-
flammationem, & matri, & infanti esse lethalem,
quia obseruam Venetijs in clarissima matrona,
nem-

Prognosti-
ca.

nempe Principis Ciconiæ coniuge, quæ inflammatione vteri tentata, in 8. mense primo foetum extinxit, deinde vero etiam ipsa interiit.

Salutaris tamen inflammatio est ea, quæ ad resolutionem tendit. Quæ vero in scirrhum conuertitur, tametsi non interficiat, morbum tamen reddit diuturnum. Quæ transit in abscessum, ancipitem habet euentum, ut intelligetis in capite de Abscessu, venio ad curationem. Vteri inflammatio, sicuti & ceteræ inflammationes ab initio tractanda est reuellentibus & repellentibus: Deinde vero partem reuellentibus, partem digerentibus, consequenter deriuantibus: in fine vero solis digerentibus.

Curatio.

Reuellentia.

Vena sectionio.

Quod ad reuellentia pertinet, statim ab initio secanda est vena in cubito, si & rationem, & auctoritates sequi velimus. Ratio primum id persuadet, quia omnis fluxio incipiens est retrahenda a loco ad quem fuit: Ergo in principio inflammationis vteri faciendâ est retractio ad superiora. Probatâ consequentia, quia ex Galeno *lib. de cur. rat. per sangu. miss. cap. 18.* cum membra corporis in duas diuidantur præcipuas partes, in superiora, & inferiora, laborantibus inferioribus, pro reuulsione trahendum est ad superiora: laborantibus superioribus, trahere oportet ad inferiora. Sed vterus est ex partibus inferni, auctore Galeno *loc. cit.* Ergo retractio faciendâ est ad superiora.

Alia ratio est, in inflammatione vteri non sunt mouendi menses; Ergo in principio talis inflammationis secare oportet venas superiores. Probatâ consequentia, quia venæ inferiores mouent menses. Antecedens probatur, & ratione, & auctoritate. Ratione, quia, si moueantur menses, trahitur sanguis ad locum inflammatum, non est necessarium, ut secta vena inferna, sanguis, qui trahitur ad vterum, expurgetur. Quinimo compressis iam ex inflammatione vasis, retinetur. Propterea Aëtius 4. *tetrab. 4. capit. 83. in fin.* inquit, in inflammatione vteri abstinendum esse ab omnibus auxilijs, quæ mouent menses. Sed quid infero Aëtium, habemus Galenum ipsum *lib. 13. meth. med. cap. 14.* qui in inflammatione & vteri, & partium aliarum infernarum, ab initio, inquit, retrahendam esse fluxionem ad partes distantes. Et omnino periculosum esse vtero inflammatione laborante, menses ipsos promouere, vel quouis modo sanguinem ad vterum ducere. Ideo idem Galen. qui in affectibus vteri videtur summo opere diligere sectionem venarum infernarum, ut postea intelligetis, quando opus est reuulsione, inquit, venas infernas non esse secandas, sed potius supernas *lib. de cur. rat. per sang. miss. cap. 19. circa si.* inquit, fluentibus mensibus propter aliquam venarum erosionem, non sunt secandæ venæ inferiores, sed superiores. Pariter fluente sanguine ad excitandam inflammationem, in principio faciendâ est retractio per superiora. Huic sententiæ Galeni adherent Aëtius. Paulus, Auicennas, & reliqui omnes probati auctores. Sed qui querunt modum, proferunt Galen. loca, ex quibus videtur colligi, laborante vtero, secandas semper esse inferiores, aut poplitis, aut malleoli: hoc docet Galen. *lib. 13. meth. med.*

A *cap. 11. lib. de trem. palpit. &c. cap. 5. & lib. de cur. rat. per sangu. miss. cap. 18. & 19.* in affectibus vteri secare oportet venas, quæ habeant cum vtero coniugium, quales sunt venæ poplitis & malleoli: nam qui alias, inquit, secauerit, potius nocebit, quam iuuabit. Iste omnes auctoritates intelligi debent, aut de affectu vteri absque inflammatione, vbi adest scopus prouocandi menses, aut de inflammatione iam facta, in qua scopus est, deriuare, non amplius reuellere. Quod verum sit, videatis Gal. *lib. de lib. 13. meth. med. capit. 11.* in affectu vteri, inquit, in principio capitis trahendum esse sanguinem ad partes ab vtero distantes, neque ducendum sanguinem per locum affectum: In fine vero eiusdem capitis inquit, in affectu vteri secandas esse venas infernas. Putatis ne Galenum fuisse ita barbarum, ut voluerit in eodem capite, sibi ipsi contradicere? In principio loquitur de reuulsione; paulo post, de deriuatione. Quod verum sit, videatis illud *caput 18. lib. de curand. rat. per sanguin. miss.* vbi inquit, renibus affectis, in principio secandam esse venam in cubito; in inflammatione iam facta, secandam infernam. Imo vero inquit, magis iuuatur vterus ex hac sectione, quam renes; at de qua sectione loquitur? De deriuatoria, an de reuulsoria? loquitur de deriuatoria, de illa, quæ facta est in renibus, iam actu inflammatis, in quo casu secamus venas infernas. Quando autem non adest inflammatio, & scopus sit prouocandi menses, in hoc casu ego quoque amplector Galeni consilium, ut sub tempus menstrue purgationis aperiantur venæ inferiores, minime superiores. Dico, *sub tempus menstrue purgationis*, quia alijs temporibus in maxima corporis plenitudine ego sequor Aëtium, ut primo secantur venæ superiores, & sub tempus menstrui inferiores. Est igitur pro reuulsione ab initio secandâ vena in cubito.

Retrahendus etiam sanguis alijs ingenijs, ut cucurbitulis mammis affixis, ligaturis, quando inflammatio facta sit post abortum, post extractionem secundinæ, post largam purgationem.

Sed si fiat inflammatio propter suppressos menses, & quando incipit inflammatio, & tunc etiam immineant menses, res est difficilima, sectio venæ in cubito omnino est faciendâ. Quandoquidem, etsi sanguis retrahatur, is tantum retrahitur, qui propter sui copiam tensiones venarum potest efficere, & consequenter vasa magis obstruere.

D Facta hac missione, & impedito aliqua ex parte fluxu, datur locus etiam mittendi sanguinis per venas infernas. Et ideo, quod pertinet ad reprimentia, de his quoque est dubitatio. Nam sicuti certum est, in inflammatione facta post largam aliquam purgationem, reprimentia conuenire, ita si fiat cum suppressione mensium, imminet periculum, ne constrictis vasis, & sublata prorsus purgationis via, inflammatio augeatur. In hoc igitur casu mihi non placent reprimentia, loco eorum, vtamini anodynis & temperatis. Nam in suppressis mensibus fluxio fit angustatis vijs; & dolore excitato; anodyna igitur dolorem curant, & quatenus temperata vias dilatant.

Reprimentia.

Idcirco extrinsecus laudo iniunctionem factam *Extrifeca.*

cum

cum ol. ros. compl. mixto cum adipe, anatis vel anseris, & ij. vel iij. vitellis ouorum. Et si inflammatio sit prope os vteri, pessarijs hoc linimēto intinctis vtendum. Si sit in alijs partibus, extrinsecus adhibendum est linimentum.

Vbi vero menses non immineant, ad reprimendum humorem conuenit posca, vinum acerbum, in quo ebullierint rosæ, citonium, myrtus, &c.

Digerētia In augmento inflammationis incoquere oportet scænuæcum & melilotum in aqua communi, huic decocto deinceps addere *farinam bordei, scænuæcum ol. ros. compl. & chamomelino.*

Si linimentum non sustineant, poteritis accipere ol. ros. compl. mixtum cum ol. chamomelino & anethino. Ætius laudat etiam & fomentum, & balneum, & euaporationem simul factam ex his, quæ moderate digerant, vt est chamom. aneth. melilotum, scænuæcum. sem. lini.

Progrediente morbo ascendere licet ad pulegium, calamenth. & origanum, vt tandem tota curatio sit posita in digerentibus, inter quæ summo opere laudatur vsus emplastri ex meliloto, aut hoc ceratum,

*℞. ammoniac.
galban. an. onc. β.*

Ceratum. dissoluantur in vino generoso, deinde addo
*myrrhæ
spica an. dr. j.
cer. q. s. M. f. cerat.*

Purgātia. Insistendum interim in deriuantibus medicamentis, per intestina scil. clysteribus, ac purgationibus, per medicamenta leniora, vt est cassia & syrupus rosatus.

Vomitūs. In his vero, quæ sunt faciles ad vomitum, facienda est reuulsio per vomitum. Mouendæ etiam sunt vrinæ, præcipue diureticis frigidis, & tota vitæ ratio sit tenuis, qualis in omnibus inflammationibus.

DE SCIRRHO VTERI. Cap. XVII.

Causa. INFLAMMATIONI, quæ vel nimium refrigerantibus, vel importune digerentibus tractatur, succedit scirrhus, qui tamen, vel ex paulatina congestione, vel ex pituitosi, aut melancholici succi fluxione etiam excitari solet.

Pars affecta. Locus autem, in quo sit scirrhus, est ille met, in quo & inflammatio, pars scilicet vteri superior, inferior, antica, postica, dextra & sinistra, interior, exterior.

Signa. Cognoscitur præterea ex tumore dolente absq; febre, cruditate, grauitate, & refrigeratione, cui successu temporis œdematosus succedit tumor, supprimuntur menses, præcipue, si scirrhus sit interior: nam in exteriore, neque necessario supprimuntur menses, neque necessario impeditur conceptio, sed in septimo, aut octauo mense abortus sequitur. Noui ego ciuem Venetam, quæ laborans vteri scirrho iam multos annos, ter concepit, & in octauo mense abortum bis fecit. Tertia autem vice circa illud tempus extincto sætu, ipsa quoque interijt.

Prognostica. Est propterea affectus & lōgus, & periculosus.

A Curandi ratio posita est primum quidem in totius corporis prouidentia, deinde vero in localibus, primum emollientibus, deinde digerentibus & euacuantibus.

In totius corporis prouidentia, omnibus, si vires constet, necessaria totius corporis purgatio per medicamenta, quæ humorem melancholicum, & præparent & expurgent.

Sectio autem venæ, cuius meminerunt Ætius & alij, non est in omnibus necessaria, sed tantum in illis, in quibus sanguis abundat, præcipue vero melancholicus, siue talis fiat ex iccore generante, siue ex liene non expurgante, in quo casu aliquando secunda est vena dextri lateris, quandoque sinistri, nonnunquam primo dextri, deinde etiam sinistri, prout scilicet. vtrumque viscus tumore & obstructione laborauerit.

Habita totius prouidentia ad emollientia est confugiendum, sunt hæc linimenta facta ex butyro, pinguedinibus, oleo amygdalino, &c. Hoc linimentum mihi maxime placet.

℞. mucilag. sem. malu.

lini an. onc. ij.

pingu. gallin.

anatis

butyr. rec. an. onc. j.

medull. crur. bou.

ol. amygd. dulc. an. onc. β.

cer. par. M. f. linimentum.

Si adhibeatur hoc linimentum superposita lana succida, erit efficacius: Sicuti quoque efficax est illud vnguentum, quod ex pinguedine lanarum confectum officinis æsypum vocatur.

Apud nos celebrantur luta S. Bartholomææ, & S. Helenæ, quæ adhibentur bis in die per horam, vnā vel alteram, postquæ imponi solet simile ceratum, vt

℞. ammon.

galban. dissol. in acet. acerr. an. onc. j.

terebinth. onc. β.

sem. malu. dr. ij.

cer. q. s. M. f. ceratum.

In eundem vsum veniunt fomentum ex decoctis maluarum, althææ, sem. lini, quæ decoctiones etiam in vterum infundantur.

Vbi tumor est interior, & post infusiones, imponuntur etiam linimenta pessarijs illita, de quibus in præcedentibus facta est mentio.

Facta emolliitione digerendus & euacuandus est humor.

Digeritur fomentis, emplastris, ceratis, de quibus in capite de Inflammatione iam declinante verba feci.

Ceterum, quia hæc sunt leuiora, euacuatio sensibilis quandoque est necessaria, talis fit per vesicantia, per cucurbitulas sacrificatas aut ventris, aut lumbis adhibitas, prout humor fuerit, vel in antica, vel in postica parte.

Tandem his non conferentibus, ad actualia, cauteria est deneniendum, quibus ego bis summa cum felicitate in his casibus sum vsus, tres adhibui vsiones sub umbilico, duabus mulieribus vtero laborantibus, quarum vtraque est curata, diu autem

Curatio.

Purgatio.

Emollientia.

Linimentum.

Ceratum.

Digerētia

autem aperta detineri debent vlcera, imposito glo A bulo, sicuti in alijs cauterijs consueuimus.

DE ABSCESSV VTERI.

Cap. XVIII.

Signa.

Ceterum inflammationem non scirrhus mo- do, sed & abscessus consequitur. Cognosci- tur autem abscessus primum quidem. Si inflam- matio præcesserit, febrisque mitior reddita post 14. aut 20. diem grauior reddatur, horrore vel ri- gore superueniente exacerbato dolore ac tumore in maiorem molem aucto, quibus succedunt vigi- lia, dolor capitis, præcipue circa oculorum radices & quasi manuum conuulsio, pulsus admodum parui & fere aboliti.

Signa loci.

Signa loci, in quo est abscessus, sunt communia B signis inflammationis. Desinit abscessus in vlcus: neque enim curatur, quando magnus fuerit, nisi disruptione. Disrumpitur autem aliquando in- partem posteriorem, vt sanies etiam transmittatur per rectum intestinum, quod obseruaui elapso an- no in nobilissima muliere Patauina, in cuius adi- bus ego nunc filiam curandam suscepi.

Aliquâdo expurgatur per partem anteriorem, vt proferet vesicam, in quo casu sanies aut excet- nitur per lorium, quandoque etiam facta fistula vesicæ, & vteri lorium cum sanie expurgatur per vterum.

Et hæc, nobilissimi auditores, non sunt somnia, sed omnia a me experta, præterquam quod etiam ab Aetio referantur.

Aliquando etiam disrumpitur abscessus, & C sanies colligitur in capacitate abdominis inter in- testina & peritonæum, vbi colligitur alias materia hydropis.

Aliquando disrumpitur ad cavitatem vteri in- teriorem, quandoque ad vtrumque locum, sicuti dicebam factum esse in ista nobilissima Patauina, quæ habuit abscessum partim per vteri collum, partim per intestinum rectum.

Prognosti- ca.

Est affectus sane periculosissimus, qui, quando abscessus sit inter tunicam & corpus vteri, facile sanatur. Sed iam depascatur corpus vteri, desinit in vlcus lethale, & nunquam sanabile.

Curatio.

Curatio abscessus, antequam disrumpatur, per- ficitur medicamentis suppurantibus, & abscessum disrumpentibus. Nam illius curatio post disrup- tionem est curatio vlceris, de qua postea.

Suppuratio igitur, & disruptio tentari possunt decoctis & infusionibus, factis in aquis, in quibus ebullierint catiæ, passulæ, liquiritia, malua, bis- malua, & semen lini. Linimentum quoque ex ca- ricis & pinguedine anatis vel anseris, admixto melle & fimo columbino, bene facit ad hanc in- tentionem.

Vtile etiam est medicamentum, quod paratur ex nigro sapone, mixto cum butyro, pinguedine anar. & fimo columbino.

Iniiciuntur etiam in vterum decoctiones simi- les, & imponuntur pessaria prædictis linimentis imbuta.

Extrinse- ca.

Quæ vero extrinsecus adhibetur, aut dorso, aut

pubi, vel vtrique parti applicari debent.

Adiuuanda etiam est disruptio, manu compri- mende regionem vteri, aliqua corporis agitatione, clysteribus, qui non modo recipiant decoctiones iam dictas, verum etiam colocynthidem, aut me- dicamenta id genus. Aetias cap. 86. in abscessu, qui sit sensibilis prope os vteri imposito speculo im- perat sectionem, modum videatis apud illū, dis- rupto abscessu diluendus est locus, si facta sit dis- ruptio ad cavitatem vteri, iniecto clystere ex aqua hordei & melle, ex sero caprino cum melle, ex mulsa, ex aqua chalybeata, cum melle rosato. Fa- cta elutione incumbendum est sanando vlceri, de quo nunc dicere aggredior.

DE VLCERIBVS VTERI.

Cap. XIX.

Differentia

Vlcus vteri multas habet differentias: quod- dam enim est superficiale, aliud profundū aliud internum, aliud externum, quoddam cum inflammatione, aliud citra hanc: Est quoddam depascens, quasi herpes excedens, aliud non de- pascens, est cancerosum, & non cancerosum.

Fiunt omnia hæc vlcera, vel post abscessus dis- ruptos, vel ex nimio & frequenti coitu, præcipue vero infecti seminis lue Venerea ex partu & abor- tu difficili, extractione secundinæ, denique ex flu- xione acri & maligna, gallica, & non gallica, vel ex toto corpore, vel ex iecore, liene, & cerebro.

Cognoscuntur; vlcera ex dolore punctorio cum

Signa.

excretionem aut ichoris, aut puris, vel vtriusque, quandoque cum sanguine, aliquando sine hoc, cū fetore. Et si vlcus sit inflammatorium, dolor est ingens cum febre continua: si sit cancerosum, præ- ter dolorem & febrem adsunt vigiliæ perpetuæ, corpus euadit cachecticum, affectus est diutur- nus, excernuntur simul cum ichore & sanguine, aliquando etiam carnes portiones, id quod ego iam his obseruaui, semel anno elapso in nobilissi- ma matrona, ex familia Lemnaria, cuius carun- colas excretas plures ex vobis viderunt. Alias etiā cum essem iunior, vidi carnem excretam a mulie- re septuagenaria, & cum esset aliqua inter excel- lentissimum Paternum, & me altercatio, post obi- tum mulieris, permittente filio, qui nunc est Me- dicus Venerus, aperto cadauere, inuenta est vteri portio ad magnitudinē oui separata ab vtero reli- quo, simul cum sanguine grumoso.

Si vlcus sit in collo vteri, præterquam quod di- gito explorari potest, & dolor ex iniectis statim sentitur, excretionem etiam puris & sanguinis est fre- quens. Si vlcus sit in corpore vteri, neque dolor adest ex iniectis, neque excretio admodum fre- quens.

Vlcerum, quæ vtero contingunt, quædam sunt superficialia & munda; quædam profunda & sordida, alia cum inflammatione, alia citra eam: nonnulla sunt depascentia & cum fluxione, quæ præprie Néma vocantur, alia sunt citra fluxionem, & depascentia. Denique alia sunt cancerosa, alia vero non. Signa omnium & curatio est proponenda,

Super-

Superficiale vlcus & mundum est sine febre, cum dolore modico, cum fluxione tantum ichoris, non foetida: Contra vero sordidum & profundum emittit pus crassum, multum, & graueolens cum febre lenta.

Inflammatorium autem habet febrem, dolorem, & ingentem calorem connexum, ut propterea mulier nec blandum quidem medicamento- rum contractum sustineat.

Depascens vlcus cum fluxione cognoscitur similiter ex dolore ingente, ex augmento ichoris & putris indies facto, ex fluxione muliebri, siue alba, siue citrina, vitidi aut alterius coloris.

Cæcrosus vlcus est cum tumore duro inæquali, venis turgentibus & nigricantibus, cum dolore ingentissimo, febre continua, linguae perpetua ariditate, vigilijs, mutatione corporis ad cachexiam, quæ omnia sunt communia cancro, etiam non vlcerato.

Vlcerati autem cancri proprie sunt fluxio liquida, ruffa, quandoque cruenta, grumosa, & non grumosa, ichorosa semper graueolens, cui aliquando succedit carnea excretio, ut vobis alias significavi.

Prognostica. Sunt omnia hæc vlcerata mulieribus valde insensa, non quod tantum sterilitatem inferant, verum etiam, quod, ubi profundiora & cæcrosa fuerint, ipsas etiam miserabiliter extinguant.

Curatio vlcis superficialis & mundi. Dicam & breuiter, quid in quacunq; differentia sit agendum.

Si vlcus fuerit mundum & superficiale, solis tractatur siccantibus: & si fuerit in collo vteri, ad siccationem satis erit infessio in aliqua aqua thermali, aut in decocto rhois rubri, myrtillorum, hypocythidis, acaciar, plantaginis, rosarum, malicorij ac prunellorum sylvestrium.

Maneat autem in balneo diuaticis cruribus, elatis genibus, ac demissis clunibus. Inijciantur in vterum per syphones vterinos & ipsa, quando vlcus sit in cavitare vteri: Illud autem vos moneo, ut huiusmodi syphones fistulam habeant vsque adeo longam, ut possit ingredi os vteri. Etenim, injectio in ceruicem, morbo existente in vtero, nullius est frugis.

Efficaciora autem fient hæc medicamenta, si prædictis aquis vel decoctis pulueres adijciantur siccantes, ut est bolus Armena, lapis hæmatites, spodylon, pompholyx, plumbum vstum; lythargyrum, cerussa, carta combusta, de quibus si non omnibus, saltem pluribus meminit Gal. *libr. 9. de comp. med. sec. loc. cap. penult.*

Curatio vlcis profundæ, ac sordidæ. Ceterum si vlcus fuerit profundum & sordidum, ante siccantia requirit detergentia: sit deterfio aut aquis thermalibus, melle rosato commixtis, aut decocto aristolochiar, matricar, scabiosæ, ireos, oliuæ, addito tamen ipso melle rosato.

Facta deterfione similiter ad pulueres siccantes, & decocta proposita est confugiendum. Et si propositi pulueres non videantur sufficere, alij fortiores in eorum substituantur locum, ut trochiscus oliuæ, trochiscus Andronis, Balsionis, dissoluti in vino aliquo austero, cui sint incoctæ herbe, & reliquæ adstringentia iam enumerata. Valet quoque

Manna thuris.

A puluis minutissimus thuris, quem Græci vocant mannam thuris.

Quod si vlcus sit cum inflammatione, incumbendum primo est inflammationi, reuulsionibus factis per vomitoria, per venæ sectionem in cubito, deriuatorijs, per medicamenta aluum subducentia, per diuretica, per hirudines venis sedalibus affixas, ac victu tenui, & eo quidem frigido. Inflammatio deinde singulatim illis medicamentis est lenienda, de quibus diximus superius, postea, veto pus abstergendum, deinde vlcus siccandum & cicatrifandum.

B Sed si fuerit cum fluxione & depascens, fluxionem imprimis auertere oportet, ut nunc dictum est, vomitu, medicamento aluum subducente, diureticis, sudorificis, cauterijs brachijs affixis, purgatione capitis & per os, & per nates; præcipue si fluxio fiat ex cerebro. Exsiccanda quin et est fluxio decocto chinæ aut salis: Et si fuerit Gallica, etiam decocto ligni Indici. Deinde vero localibus agendum. Circa localia, si fluxio fuerit admodum acris, agendum est statim epicærausticis, nempe iniectione lactis, aut muliebris, aut vaccini, potissimum chalybeati, & si adsit sordes, onc. iij. lactis acledere oportet onc. j. sem. mell. rosati. Si sit vlcus profundum, lacti & melli addere oportet dr. ij. pulueris ireos.

C Ceterum si fluxio non sit acris, sed ichor quidam valde humidus, cohibendus est potius siccantibus & actu, & potestate. Dico, *actu & potestate*, quia Ætius in huiusmodi casu consulit, ut iniiciantur pulueres nullo ichori commixti: nam si ichoribus misceantur, neque ita facile sic carent, neque fluxionem compescere possent. Idcirco accipiat ur rubrica, cyminum, lupinum, absinthium, cerussa, & imponantur in linteo attrito, & comburantur vel in ollula, vel sub prunis, puluis deinde in vterum iniiciatur.

D Sed non est ita facile huiusmodi pusverem inpenitiores vteri partes iniicere. Et ego, qui diu & multum laboravi in curando vlcere nobilissimæ matronæ anno elapso, visa difficultate, parauicannulam ferream, longitudinis sex digitorum vtrinque perforatam, quæ aliam excipiebat, ita conuenienter adaptatam, ut in compressione vnus in aliam, nullus aer posset retrocedere. Priorem itaq; ego replebam puluere, deinde imponebam aliâ, quæ habebat ferrum solidum immobile cum stupa, & facta violenta compressione illius ferri in cannulam puluis exussilabatur addistans. Oportet tamen hoc animaduertere, ut, antequam puluis insusilletur, linteolus mundus hinc inde intra vteri partes mittatur, ne in ingressu cannulæ aliqua humiditas in foramen ingreditur, alioquin prohibet, ne puluis possit exire. Hac ratione optime siccari possunt huiusmodi fluxiones.

Siccata fluxione, si aliqua sit sordities, abstergenda est, deinde vero etiam vlcus siccandum. Et quia in vlceribus depascentibus sordes valde adhæret, opus est etiam absterfio validissimo. In hoc casu ego feliciter vsus sum aqua Teturtiana, mixta cum vnguento Ægyptiaco. Qui caret hac aqua, utatur decocto supra præscripto ex aristolochia,

Curatio vlcis cum inflammatione.

Curatio depascentis.

chia, iride &c. neque vereamini vnguentum Aegyptiacum, quanquam recipiat squamam ærismam vt sum pluries expertus, mundat sine morfu.

Post mundificationem siccantia quoque validissima sunt eligenda: & propterea conuenit cum aquis, vel decoctis propofitis etiam puluis præcipitati. Si pessarum possint sustinere, conuenit linimentum ex vnguento rosaceo, & præcipitato in ceruicem vteri inditum.

Quod si volueritis ascendere ad præcipitatum, conficiatis linimentum ex lythargyro; plumbo vsto, carta vsta, cerussa & tutia, lapide hematide, addita cera & modica portione olei rosacei.

Ceterum hæc in ceruice vteri valent quidem, sed si vlcus fuerit in cavitare vteri, qua nam ratione siccabitur? Iniectiones puluerum & liquorum per syphones, infussiones in aquis thermalibus, & decoctis siccantibus probantur quidem, sed non sunt plerumque satis, vtinam sufficerent. In his casibus omni ingenio vt oportet.

*Suffumigia ad vlcera exsic-
canda in
cavitare
vteri.*

Suffumigia ad vlcera siccanda, præcipue vero penitiora sunt præstantissima, sed in ijs rite administrandis neminem adhuc, vt ingenue dicam, puto modum esse assecutum. Accipiat materiam suffumigij, & ponatis super prunas in ollula: Si ollula non habeat operimentum, & præterea longam fistulam, quæ ingressa in vterum fumum ipsum ducat ad vlcus, illud suffumigium nihil præstat. Sed si recipiatur per fistulâ, breui admodum temporis spatio durat. Experiamini cum primum pruna consumserunt, quæ cito consumuntur, fumus nihil amplius agit, scio quidem posse fieri euaporationes ex decoctis siccantibus, quæ diu durant, sed illæ euaporationes, quanquam potentia sicæ cum sint actu humidæ, non perinde profunt, sicuti suffumigia ex siccis. Ego videns hanc difficultatem, parauit aliquando candelam ex cera, thure, ac cinnabari, quam accensam imponebam sub fistula concaua lati oris extra vterum, sed angustioris in vtero, quæ fumum emittebat exsiccantissimum: sed hæc quoque dum esset remota a fistula, fumum emittebat hinc inde. Cum esset sub fistula, ita accendebat illam, vt ab vtero patientis non posset sustineri. Itaque tandem ego animo concepi hoc genus suffumigij teretis & oblongi, quod dum accenditur, flammam non emittit, sed tantum rubescit, quasi pruna, & paulatim consumitur, paulatimque fumum edit, & hoc bene successit. Paratur autem hunc in modum;

℞. styrac. liquid.

calamit.

ireos

thuris an. onc. j.

belsoin. onc. β.

myrrba

croci an. onc. ij.

cinnabar. onc. j. β.

laudan. onc. ij.

carbon. salcis lib. j. M. f. pulueres.

Et cum aqua vitæ formentur formulæ vnus digiti longitudinis, quarum singula accensa, durabitur per horam integram, semper fumum emittens.

DE CANCRO VTERI.

Cap. XX.

Tamet si vteri cancer, siue vlceratus, siue non vlceratus, nullo ingenio ad sanitatem produci possit, in quem sensum scripsit Hipp. *lib. 6. apb. 3.* occultos cancos, melius esse non curare; Curari enim citius intereunt, nihilominus quædam sunt administranda, quæ illum, qui adhuc non est vlceratus, vlcerari prohibeant: exulceratum vero a sordibus expurgent, & humiditatem exsiccent, dolorem denique leniant, præstari hæc possunt, partim totius corporis prouidentia partium etiam localibus.

Totius prouidentia habetur sectis in cubito venis, vbi vires consent, vtriusque brachij, dextri, & sinistri. Aperiendæ etiam sunt hæmorrhoides, excitandi fongiculi in partibus superioribus. Conueniunt frictions frequentes, ligaturæ, cucurbitulæ supernis semper partibus adhibita, vomitus in asuetis, & ijs quæ facile vomunt, semel saltem in hebdomada est imperandus. Interim opus est etiam medicamento, quod frequenter atram educat bilem, tale estiuo tempore est serum caprinum ad lib. j. vel alteram epotum, cui addatur dr. j. epithymi, polypodij, & senæ. Conuenit etiam cassia ad onc. sem. vel dr. vj. bis saltem in hebdomada exhibita.

Hyemæ parari potest Electuarium, quo ego sic *Electuarium.*

℞. epithymi

polypodij an. onc. iij.

fol. sen. onc. vj.

myrobal. indor. onc. ij.

fl. borrag.

bugloss. an. p. j. bull. in f. q. aq. Et facta

expressione, adde prunor. damascen. lib. ij. bull. in prædicto decocto, extrahantur nuclei, & pulpa, per setaceum transmissa, iterum bulliat lento igne in prædicto decocto, addendo fl. cass. rec. extr. onc. vj. vsque ad moderatam consistentiam: postea adde sacchari fini q. s. M. & f. Elect. cuius dosis erunt dr. vj. vel onc. j.

Victus sit humectans & refrigerans: Idcirco *Victus ratio.* conceditur lac & lacticia, conceduntur pisces, fructus humidi, olera frigida. Potus autem sit, vel aqu. hordeacea, vel tenue vinum. Somnus omnino concilietur vel emulsione amygdalarum dulcium, vel semine papauer. albi. Quibus non proficientibus (nam dolores aliquando sunt vsque adeo vehementes, vt non permittant miseras patientes somnum capere) etiam confugiendum est ad opiata.

Quod pertinet ad localia, si cancer nō sit exulceratus, vt prohibeatur exulceratio, conuenit hoc *Localia.*

℞. ol. ros. compl. onc. ij.

succ. solani

plantag. an. onc. j.

ceruss.

lythargyri an. dr. ij. agitentur hæc omnia in mortario plumbeo, cum pistillo plumbeo,

per

Linimentum.

per horas quatuor, fiatque linimentum, quo inungatur locus dolens.

Ad mulcendum dolorem efficacior est malua, aut in lacte cocta, aut in mulla, mixta cum oleo de vitellis ouorum cum rosaceo completo. In eundem usum bene faciunt mucilagines cydoniorum & psyllij, oleo rosaceo commixta, additis duobus vitellis ouorum & si hoc quoque agitur in mortario plumbeo, erit efficacius.

Quod si exulceratus sit cancer, ut recte docuit Gal. *sect. 6. aph. comm. 38.* abluenda saltem est sanies: Idcirco infundendi sunt in uterum, aut serū caprinum chalybeatum, aut mulla facta ex aqua hordei & melle; aut ex aqua ferrata, vel plantagininis, vel portulacæ, cum melle, aut coctis, aut mixtis.

Extrinsecus autem conveniunt illamet linimenta, quæ cerussam, totiam, ac lythargyrum recipiant, si addatis herbam illam Robertianam, puluerisatam, hæc quoque putatur prodesse, sicuti & oleum ex plumbo. Non desunt, quæ utantur linteis mundis, qui semper detineantur in pulvere iteos, Et hæc sufficere volo de vlceribus vteri.

DE ALBIS MENSIBVS.

Cap. XXI.

DE cicatrice, conceptionem impediēte, nihil dico, quia est affectus insanabilis.

Transio ad alios, qui, ut antea dicebam, seminis prohibent retētionem. Sunt autem fluxus muliebri, gonorrhœa, mensium stillicidium, & abundantia mensium. Sicuti enim in terra humida, & aquosa defluunt, ita & in prædictis symptomatibus virile semen non retinetur.

Incipiam a fluxu muliebri, quem Gal. *lib. 3. de caus. sympt. ca. 4.* *ῥίσις* vteri vocauit, mulieres vocant albos menses. Est fere perpetuum ichorum omnium, atq; plurimum humorum profluuium. Dixi, fere perpetuum, quia raræ admodum sunt, quæ aliquam non habent diem ab hac excretionē immunem. Dixi, ichorum omnium, quia, auctore Gale. *l. c.* excernitur quandoque ichor sanguinis, pituitæ, bilis, & melancholiæ. Dixi autem, fere omnium humorum. Nam sanguinem excipio, de quo erit sermo in tractu de Stillicidio, & Abundantia mensium.

Causa.

Causa huius fluxionis, vel est ex parte Vteri, vel ex parte Obiecti. Ex parte vteri intemperati secundum totam substantiam, ut propterea augeat varios istos humores, præcipue autem crudos & pituitosos.

Patitur etiam ratione vasorum, quæ, ut dicit Gal. *lib. de sympt. differ. cap. vlt.* quandoque sunt hiantia, quandoque erosa, ut non possint huiusmodi ichores continere.

Est error in obiecto, quando corpus abundauerit aut ichoribus, aut humoribus, & humores quidem, si fuerint pituitosi, excernuntur vel ex cerebro, vel ex ventriculo, vel ex toto corpore, laborante aut intemperie humida cum frigiditate, in quo casu pituita est acrimoniæ expers: aut cum caliditate, in quo casu retinet acrimoniam.

A Excernitur etiam bilis, & melancholia ex deprauata sanguificatrice, vel ob intemperiem calidam & siccam, vel ob retenta excrementa; præcipue vero ob induratum lienem, vel obstructionē meatus fellei: aut ex qualitate ciborum, potionum & medicamentorum actium.

Ichores similiter, auctore Galeno *l. c.* augentur vel ob vitium alteratricis, vel expultricis, vel retētricis: Alteratricis, quæ sanguinem generet aqueū & tenuem, ut in Cachexia & Hydropē: Expultricis imbecilla, quæ non expellat serositatem, aut ad renes & vesicam, aut ad ambitum corporis: propter vitium retētricis nimium validæ, vel ex intemperie, vel ex renuni, aut cutis adstrictione: nā densata cute & renibus oclusis, serum ad vterum transmitti consuevit.

B Mediatæ causæ pertinent ad ætatem: nam seniores facilius hac fluxione tentantur: ad temperamentum, quia humidiores his subijciuntur, sicuti & otiosæ, crapulis deditæ, ac frequenter oleribus humidis, fructibus, atq; alijs id genus vitætes.

Habetur hic affectus ex sola patientis relatione. Distinguitur autem a gonorrhœa; quia in gonorrhœa materia, quæ excernitur, est magis densa, minime viscida, magis alba, in minori portione excernitur cum maiore patientis incommodo.

Distinguitur etiam a pure, quia pus est magis fetidum, habet quandoq; sanguinem admixtum, & excernitur cum maximo dolore.

Fluxio autem muliebris tunc tantum excernitur cum dolore, cum fuerit vel salsa, vel biliosa, vel atrabilaris, qui quidem colores in linteis apparent, præcipue vero locis, & in umbra siccatis.

C Cognoscetis autem ichorem sanguinis, quia est ruber sicuti lotura carniū: biliosum, quia flauus, & sic de singulis.

Cognoscitur fluxus, qui fit ex vtero primario affecto, quia perpetua est fluxio vnius tenoris, neq; insignis est quantitas rei excreta, adest dolor lumborum & pubis, inflatio & rugitus, lassitudo partium infernarum, quādoq; etiam tumor œdematosus, & hæc difficilius concipiunt, quam aliz ex fluxione laborantes.

Quod si fluxio fiat ex cerebro, caput est graue, sunt somnolentæ, consueueruntq; antea copiosas habere narium, aut oris purgationes, quæ quādoque superueniente fluxu muliebri desinunt, quādoque persistunt.

D Cognoscetis fieri ex toto corpore, si ad sit lassitudo, corpus sit plenum, vita otiosa.

Si ex ventriculo, aderunt signa imbecillitatis ventriculi, quæ alias retulimus.

Si ex iccore intemperato, habuistis signa harum intemperaturarum.

Si ex renibus oclusis, desunt vrinæ.

Si ex cutis densitate, desunt sudores, cutisque sit densa & arida.

Malus hic est fluor, non ob id tantum, quod conceptum impediat, verum etiam, quod, ubi fluxio sit acris, vlcera & vteri caneros infert: Si non sit acris, progressu temporis potest inferre cachexias & hydropes. Aliquando tanto impetu excerpuntur humores, ut etiam syncope succedat, id quod

Causa prædiata.

Signa distinguuntur menses albos a gonorrhœa.

quod refert Gal. aliquando factum esse *l. de præcog. ad Posthum. cap. 8.* in vxore Boetij, in quem senium scripsit Hipp. *sect. 5. apb. 56.* a fluore muliebri conuulsionem, & animæ defectum superuenientem malum esse.

Curatio.

Cum muliebris fluore aliquando ex vteri intemperie, nonnunquam autem ex errore externo proficiatur, ut dici solet; Ideo duplex est etiam curandi ratio. Aliquando enim satis fuerit vtero abunde euacuato, frigidam & humidam illius intemperiem corrigere, quod satis hæcenus, ni fallor, factum est in tractatu de Sterilitate ex intemperie frigida & humida.

Nunc itaque versabimur in curando fluxu muliebri, qui sit ex purgante se, aut vniuerso corpore, aut partibus quibusdam determinatis. Perficitur itaque hæc curatio reuulsione, deriuatione euacuatione, & totius, & partium, alteratione intemperaturæ partis generantis, & denique adstrictione vasorum vteri.

Reuulsoria.

Quod ad reuulsionem, facienda est in rubro fluore per venæ sectionem in cubito, si vires sustineant, vel, si infirmiores fuerint, appositis dorso & scapulis, ex Ætj sententia, cucurbitulis: in alijs fluoribus pallidis, flauis & albicantibus, considerandum, an cacochymia sit exquisita, an notha: nam in exquisita abstinendum a quacunque sanguinis missione, Galeno auctore *lib. 4. de san. tuend. cap. 4.* In spuria poterit mitti sanguis parce tamen, & ut voluit Ætius, repetenda potius erit venæ sectio, aut paulatim detrahendus sanguis.

In antiquo casu spernendi non sunt fonticuli, supernis partibus affixi, brachijs scil. & illud tunc maxime, cum fluxio ex cerebro ortum duxerit: Non præmittantur frictiones, ligaturæ, & dropaces, vel sinapismi.

Et quod ad vomitoria pertinet ijs, quæ vomitioni fuerint assuetæ, vel saltem quibus facile vomitus excitetur, omnino est imperandus, vel ab assumpto cibo, vel ab assumpto oxymelite & iure, fiatque saltem semel in hebdomada.

Euacuatio.

Euacuatio per medicamenta fiat deiectionaria, & si fluxio sit ichorosa, statim ab initio purgans conuenit medicamentum. Dicebat Gale. *lib. quos & quando purgare oporteat*, serosus humores ab initio esse statim purgandos, etenim nullam subeunt coctionem.

Si itaque corpus sit robustum ac multo abundet sero, præcipue vero densata cute, & oclusis renibus, conueniunt ea ipsa medicamēta deiectionaria, quæ hydropicis administrantur, de quibus omnibus, quanquam publice sim locutus, hoc tamen tempore, illud tantum dixisse sufficiat, elaterium in his casibus, ad gr. iij. cum scr. j. pill. alephang. egregiam posse operam præstare. Quod si declinatores fuerint mulieres, satis erit serosum humorem, manna ipsa expurgare, sed ante mannæ, quam dabitur ad dr. iij. præbere debetis dr. ij. specierum hieræ.

Interim, quia, ut dixi, aqueus humor non præparatur, non est opus syrupis incidentibus, nisi forte cum seroso humore crassus etiam abundet. Deficiente autem crasso humore satis erit in diebus,

A in quibus purgans non acceperint medicamentum, loco syrupi decoctionem exhibere exsiccantem, aut calidam, aut frigidam, prout est intemperies; Ideo in frigida intemperie conuenit decoctio ex absinthio, ex spica, calamo aromatico, squinā ho, mentha sicca, & ante decoctum præbeat bolum ex olibano, thure ac styrace confectum. Iuuabit etiam mirandum in modum dr. j. specierum hieræ, aut scr. ij. pilularum alephanginarum, quæ, ut dixi, singulis diebus ante decoctum exhiberi possunt.

Quod si ichor fuerit calidus, exsiccati debet exhibitio succo limonum, vino granatorum, reb de ribes. Pulueres autem conuenientes, erunt bolus Armena, terra Lemnia, margaritæ præparatæ, corallium &c. frigida & sicca.

B Alternatim vero post tres, aut quatuor dies repetenda sunt euacuantia, usque quo & venter minus appareat tumidus, & fluxio minuat: tunc enim locus est medicamenti, quæ etiam vrinas, & sudores moueant, quæ consequenter renes oclusos, & cutis densitatem aperiant.

Mouentia autem vrinas in causa frigida, debent esse vere diuretica, ut apium, asarum, & cetera id genus, quæ tamen possint etiam menses mouere, nihil tamen afferunt incommodi, quando quidem serosam ac tenuiorem sanguinis partem ducunt ad vrinas; Sanguinem vero iam a sero depuratum, ducunt ad vterum, quod nobis non est fugiendum, qui illud tantum optamus, ut serosam sanguinis humiditatem alio diuertamus.

Diuretica calida.

C Quod si intemperies sit calida, mouentia vrinas, sint temperata aut frigida, ut est capillus Veneris, adiantus, polytrichon, agrimonia, cuscuta, pentaphyllon, cichoracea omnia, & omnia etiam semina frigida, maiora, & minora. Hæc etiam possunt ad cutem diuertere. Adiuvanda tamen est materiæ per cutem purgatio frictionibus, aut panno aspero, aut manu oleo aliquo illita: vel, quod fecit Galenus in Boetij vxore, *lib. de præcogn. ad Posthum. cap. 8.* melle peractis.

Diuretica frigida.

In agrestionibus corpore existente sub tumido piritosa cachexia tentato, conuenit insolatus, longa sub Sole æstiuo mora, subauratio, illutatio totius corporis, facta per luta medicamentosa, balneum aquæ sulphuræ.

Iuuat quin etiam sudor excitatus, aut vi laponici, aut cucurbitarum, aut velicatum, quæ sint repletæ decoctionibus sudorificis; deriuant hæc omnia, sicuti etiam clysteres, & potissimum acriores.

Si fluxio ex cerebro fuerit facta, purgandum quoque erit cerebrum, & per os, & per nares.

Quod si contingat materiam esse crassiorem, incidenda est, & attenuanda illis syrupis, de quibus supra.

Curatio fluxus facti ex cerebro.

Interim incumbendum est alterandis partium intemperaturis: Et si sit frigida & humida, iam docui, quibus aquis thermalibus, decoctis salisfras & ligni, iure galli, magnis antidotis, rotulis, ac pulueribus, vinisque medicatis, vtendum sit, ad superandam huiusmodi intemperiem.

Quod si ad calidius vergat, corrigi poterit potu aquarum,

aquarum, quæ, vel æneam, vel ferream habeant mineram, & ut ingenue dicam, quod ipse sum expertus, plures curavi hoc flubre calido laborantes potu aquæ Virginis ad quindecim, vel viginti dies exhibito. Qui carent istis aquis medicatis, utantur sero chalybeato. In defectu feri accipiant aquam portulacæ, nymphææ, plantaginis, virgæ pastoris. Utantur etiam illis pulueribus frigidis & siccis, de quibus paulo ante verba feci.

Adstrictoria.

His peractis deueniendum est ad adstrictoria, quæ, mea sententia, nunquam locum habent, nisi corpore iam sic diligentissime euacuato, & ad adstrictoria preparato; vel quando ob nimiam fluxionem patientes animo deficiant; in quo casu tam diu utendum est adstrictorijs, quam diu vires resciantur. Si enim importune & ante tempus ad adstrictoria quis confugiat, mulierem necessario, vel ad hydropem, vel ad vlcera vteri, vel hystericas affectiones deducet.

Itaq; non possum satis mirari rotam fere Medicorum syluam, qui ad fluores muliebres proferant secreta, & ea quidem omnia adstrictoria, quibus humoris fluentis impetus compescatur. Mihi sane, ut dixi, adstrictoria non probantur, nisi ut venæ vteri, iam ex longa fluxione imbecilles, constringantur, & tunc tantum, cum iam præmissis reuulsionibus, euacuationibus ac corroborantibus propositis fluxus fere ex toto desierit: Tunc igitur ad corroborandum vterum quadam extrinsecus, alia intrinsecus connumerantur. Extrinsecus potissimum omnium auxilium est balneum ex aceto, in quo sedeat mulier vsque ad umbilicum. Est adhuc fortius, si in aceto incoquantur cortices granatorum, acacia, myrtus, balaustium, hypocystis, gallæ immaturæ, & cetera adstrictoria. Qui voluerit medicamentum hoc mitiore quodam modo administrare, poterit uti tantum pedum lotionem, ex eodem aceto facta, dummodo tamen mulier operto diligenter vase vaporem illum in vterum excipiat.

Balnea.

Pulueres.

Valent quoque in hoc casu pulueres in vterum iniecti, & inter ceteros video probari apud Ætium puluerem factum ex spongia, pice liquida imbuta, vsta, & in puluerem redacta.

Pessarij.

Possunt etiam fieri pessaria ex adstrictorijs confecta, de quibus dicemus in tractatu de Mensibus nimium abundantibus.

Extrinsecus, si balneum illud non placeat, non desunt linimenta, emplastra, & inunctiones.

Ceterum, quia Ætius videtur tantum medicamenta frigida adstringendi facultate prædita proposuisse, vos monitos esse volo in fluxu muliebri frequentiora debere esse auxilia adstringentia cum caliditate, quam cum frigiditate. Ratio est clara, quia fluor muliebris frequentius est albus cum frigida intemperie, cum totius corporis cachexia, quam sit calidus, & cum vteri intemperie calida. Itaque in hoc casu iniectiones fieri debent in aquis aluminosis, falsis & nitrosis, aut in vino acerbo, in quo bullierint spica, absinthium, squinanthus, calamus aromaticus, vel fiant emplastra ex albumine oui, recipiente puluerem thuris, olibani, styracis, spicæ &c.

A His omnibus accedat victus ratio, & quia, ut dixi, plerumque laborantes fluxu muliebri, sunt pituitosa & frigida, ideo conuenit victus tenuis & attenuans; quod etiam fecit Galenus in curanda illa nobili Romana, lib. de præcogn. ad Posthum. cap. 8. qui ipsam auiculis montanis alebat, ac denique omni victu exsiccante. Vinum sit in paucâ quantitate, atramen generosum, potius rubrum. Corpus exerceant; fugiantque Venerem. Et hæc est curatio fluxus muliebris.

DE GONORRHOEA.

Cap. XVII.

P Ræter albos menses sunt quoque alia duo symptomata, quæ ab immoderata fluxione, seminis virilis retentionem impedire possunt: Toroppeia scilicet & rubri menses immodice fluentes.

De Gonorrhœa autem, quæ nihil aliud est, quàm fluxus seminis inuoluntarius continuus, & absque delectatione in mulieribus, hoc tempore plura non dicam, quandoquidem symptomatis causæ & curatio prorsus conueniunt cum causis & curatione gonorrhœæ viri contingentes, de qua alias dictum est.

Quid go:
norrbæa.

Illud tantum hac in parte vos mouere volo, minime audiendum esse Aristotelem, aut Peripateticos, qui mulieribus semen non inesse, pluribus argumentis persuadere conati sunt: potissimum vero quod dicunt, mulieribus loco seminis datos esse rubros menses. Et quod si haberent semen, in seipsas absque viri concubitu concipere. Præterquam quod, ut alias docui, etiam sine delectatione concipiunt. Dico istos non esse audiendos, quandoquidem & gonorrhœa, qua tentantur mulieres & nocturna pollutio, & delectatio in coitu, & furor vterinus, & vteri præfocatio ex semine retento, & denique vasa seminaria, & testes aperte demonstrant mulieribus semen inesse, illudque fecundum, quicquid sentiat Albertus, atque cum eo Auerrhoes, libro secundo collectaneorum, capite decimo.

Lib. de gē.
animal c.
20. An
mulieres
habeant se-
men.

Neque vero Aristotelis ratio quicquam habet momenti. Nam si eo, quod menses habeant mulieres, arguit Aristoteles semen deficere, licebit quoque a pari sic arguere viris plerumque sunt sanguinis, vel ex naribus, vel ex hæmorrhoidibus eruptiones, atque istæ quidem singulis mensibus: igitur talibus semen deficiet: at consequens est falsum, & falsum quoque antecedens. ¶ Præterea quanquam esset vera illa ratio, non tamen in omnibus esset vera. Neque enim in illis, quæ parcissime purgantur, vel nunquam: talibus enim saltem concedendum esset prolificum semen.

Ad aliud autem argumentum, quod in seipsas conciperent, facilis est responsio, facultatem illius seminis formatricem non esse vsque adeo perfectam, ut sola possit opus complere, sicuti tamen gallinæ absque mare aliquid pariunt, oua scilicet subuentanea vocata; ita & mulieres ratione proprii seminis aliquid possent parere, sed non absolutum.

De Immodico Menstruorum Fluxu.

Cap. XXIII.

*Immodica
fluxio ra-
tione tem-
poris.*

Sed his prætermiſſis, veniamus ad aliud ſym-
ptoma, immodicam ſcil. ſanguinis menſtrui
fluxionem. Hæc non eſt præter naturam ratione
ſubſtantiæ, vt docuit Gal. lib. de differ. febr. cap. xli.
ſed duntaxat ratione vel temporis, vel quætitatis,
vel ordinis, vel modi exeundi.

Ratione temporis multipliciter, vt quando vel
ſuperueniant menſes ante annum duodecimū,
vel diu perdurent poſt quinquageſimū ſecun-
dum. Noui ego puellam, cui menſes quinto ætatis
anno apparuerunt, & ordinatim ſingulis mēſibus
prodibant, modice tamen.

Hiſtoria.

Plures ſcio & noui, quæ decimo anno liberaliter
purgabantur, ſicuti & adulti, innoxia tamen
iſtis fuit purgatio, ſicuti etiam innoxia fuit alteri
cuidam moniali, annum iam centeſimū agentis,
cui poſt longum ſex menſium pruritum ſuperue-
nientes menſes pruritum ſuſtulerūt, vixitque vſq;
ad 103. annum cum menſtrua purgatione, obiit
ante tres annos. Sed hæc ſunt monſtroſa.

*Ratione
quantita-
tis.*

Eſt quoque importuna purgatio, quæ ſit in præ-
gnantibus; propterea ſcribit Hippocrates ſect. 5.
aphor. 60. purgationes prægnantibus apparentes,
fœtum non ſanum ſignificare.

Eſt etiam vitioſa purgatio ratione temporis,
quæ plures dies durat, quam vires ſuſtinere poſ-
ſint. Eſt vitioſa ratione quantitatis, quando tanta
excernitur ſanguinis copia, vt vires illam amplius
ſine noxa ſuſtinere non poſſint.

Eſt quoque inordinata purgatio, quæ vnico mē-
ſe, aliquando bis, quandoque vero ter repetit, cum
ſemel tantum fieri debeat quinimo non ſingulis
menſibus æque abundanter, ſed alternis tantum,
quod voluit Ariſtoteles lib. 7 de hiſt. anim. cap. 2.
cum ſcribit, mulieres alternis menſibus coacerua-
tim purgari. De vitioſa purgatione ratione modi
dicam ſuo loco.

*Ariſt. lib.
2. de gen.
anim. c. 4.*

Ex dictis puto iam vnumquemque veſtrum
colligere poſſe vitioſam purgationem proprie
neque libris ſanguinis exeuntis, neque certo dierū
numero eſſe præſiniendam, ſed tantum iſtarum
mulierum facili tolerantia.

Hoc dico, qui tametiſi moderata mulierū pur-
gatio ſit ſingulis menſibus facta, in iunioribus cir-
ca nouilunium, in adultis vero circa plenilunium,
iuxta illud; Luna vetus vetulas, iuuenes noua luna
repurgat. Sitque ſpatium trium vel quatuor die-
rum, in quo excernuntur ſanguinis libræ tres plus
minus, nihilominus habita ratione temperaturæ,
ætatis, habitus corporis rationis vitæ, quædam &
largius, & per plures dies; aliæ vero parcius, &
per pauciores abſque noxa purgantur.

Itaque tunc arbitrandum eſt, fluxum mēſium
eſſe vitioſum, cum factus fuerit abſque tolerantia
cum pallore faciei, cum laſſitudine, cum deiectione
appetitus, cum principio cachexiæ, denique vi-
tium deiectione.

*Cauſæ flu-
xus ex par-
te vteri.*

Cauſæ igitur huius fluxus immodici aliæ ſunt
ex parte vteri, aliæ ex parte iſtus ſanguinis. Ex

A parte vteri, aut eroſio, vel ruptura, vel fractura,
aut nimia anastoſiſ venarum vteri. Dixi, ni-
miam, anastoſin, quia per moderatam ſit natu-
ralis purgatio; per immoderatam vero, aut pro-
pter eroſionem vel rupturam ſit ſymptomatica.

Fiunt autem eroſiones, vel rupturæ, aut anasto-
ſiſ ex difficili partu, et abortu, extractione ſe-
cundinæ violenta, ex caſu & percuffione ſuper-
terum, ex nimio Veneris uſu, præcipue cum valde
mentulatis, ex frequenti adminiſtratione acrium
& calidorum medicamentorum, tam extrinſecus,
quam intrinſecus: præcipue autem per peſſaria:
Et quanquam peſſaria facilius mouere poſſint ſā-
guinem ex venis, quæ tendunt ad os vuluæ, quam
ex iſis, quæ tendunt ad vteri cavitatem, nihilomi-
nus vitæque purgatio aliqua ratione poteſt dici
menſtrua; quandoquidem natura, per vaſa com-
munia, eundem ſanguinem, modo per vham, mo-
do per aliam expurgat partē; frequentior tamen,
& magis conſueſta purgatio ſit per venas, quæ ad
vteri cavitatē tendunt: hæc via impedita, vel pro-
pter conceptum, vel propter alias cauſas; expur-
gatio ſit per venas ceruicis vteri, quæ hæmorrhoi-
dales vocantur, quod etiam notauit Gal. in comm.
aphor. 60. ſect. 5. & obſeruauit Realdus Co-
lumb. l. 6.

Sed iſtæ cauſas immodici fluxus perſequamur.
Inter ceteras, quæ pertinent ad vterum, eſt nimia
quoque vteri caliditas, atque iſta conceptio. Ali-
quando enim ex conceptu tanta attrahitur ſan-
guinis ad vterum portio; vt & conceptum ſuffo-
cet, & aliquando matrem extinguat; vt ego bis
obſeruauim.

Fit quoque immodica fluxio ex parte ſanguinis, *Cauſa ex*
vel nimium abundantis, vel acris, & calidi, vel *parte ſan-*
tenuis & aquoſi. *guinis.*

Abundat autem ſanguis dupliciter, aliquando,
quia plus generatur, quam conueniat; aliquando,
quia tametiſi plus non generetur, non tranſeat in
alimentum partium.

Abundat autem plus iuſto & ratione materia,
& ratione cauſæ efficientis. Ratione materiæ, id
eſt, ratione alimenti cibi & potus; multi ac maxi-
mi alimenti, quibus ſi adiungatur otium, longus
ſomnus, balnea, animi affectus hilares, ſanguis in
magnam excreſcit molem.

Cauſa efficiens eſt temperatura calida & hu- *Cauſa ef-*
mida iecoris: propterea eorum ſententia abſolute *ficiens.*
probat, qui putant, mulieres quo frigidioreſ, eo
liberius purgari, falſiſſima eſt: nam ſanguineas
mulieres, quæ ſunt calidæ & humidæ, ſupra om-
nes alias purgantur, niſi ſanguinis materia in pin-
guedinem tranſeat. Etenim adipis, ſeminis, &
ſanguinis menſtrui materiæ, ſunt eiſdem fatinæ,
pertinent ad excrementum tertiæ concoctionis v-
tile. Contra vero frigida & pituitosa parcius ex-
purgantur.

Illud tamen negari non poteſt, aliquando, vt
paulo ante dicebam, abundare ſanguinem ip-
ſum, non quod multus generetur, ſed quod
non tranſeat in alimentum partium. Id autem
fieri conſueuit, quando carniū temperatura
frigidiore fuerit & humidior, vt quali principium
R cache-

cachexia appareat, in quo casu, ut recte animadvertit Galenus in *com. apb. 57. sect. 5.* sanguis iam ipsis membris gravis, excernitur importune ad vterum. Ad hanc causam respiciens quoque Arist. *lib. 2. de gener. animal. cap. 4.* dicebat, menses fieri potissimum in fine mensis, eo quod tunc, & dies, & mulierum corpora sint frigidiora, ob frigiditatem vero non, ut antea, alimentum conficiunt: Natura itaque irritata ad vterum mittit.

*Causæ cur
sanguis fiat
acris.*

Fit quoque copiosa purgatio, ubi sanguis simul copiosus, & acris euaserit, aut si non sit copiosus ex acrimonia erosionem in vasis vteri effecerit.

Hoc dico, quia sanguis quamquam acris, dummodo non abundet, aut erosionem non faciat, potius guttatim excernitur, & cum doloribus, quam ut immodicam faciat fluxionem.

Fit vero acris hic sanguis, vel ex mixture vtriusque bilis tam flauæ, quam atræ, vel ex usu salitorum, acrium, aromatum medicamentorum calefacientium, præcipue eorum, quæ sunt venefica, ut est colocynthis, antimonium, præcipitatum, diagridium &c.

Fit quoque acris ex diuturna in corpore, & in vtero mora, propter quam causam purgationes puerperij sunt ceteris deteriores.

Ex quo, domini, potestis Medicorum controuersiam, quæ tamen apud me est legis, conciliare. Digladiantur Medici, utrum sanguis excernatur, qui menstruus dicitur, sit benignus, aut malignus?

Hinc inde sunt rationes & auctoritates. Rei veritas est, sanguinem, neque putridum, neque diu retentum, neque acrem redditum ob causas dictas, benignum esse alimentalem, excrementum utile, tertiæ concoctionis, sicuti semen, & lac, & adeps.

*Sanguis mens-
struus, v-
trum pec-
cet quali-
tate, an qu-
antitate.*

Sed ex causis iam dictis, quemadmodum etiam semen euadit venenum, ut omnia illa inferat matrem, de quibus Plinius, Columella, Femelius, & alij abunde dixerunt.

Denique abundant menses ex nimia tenuitate & aquositate. Fiunt vero aquæ, vel ex imbecillitate facultatis sanguificatricis, iecoris, & venarum, ut in cachexia, leucophlegmatia & cæcite. Aut ex errore in victu, videlicet propter assumpta frigida & humida, siue sint olera, vel fructus, vel alia id genus.

Menses.

Menses immodici, cum nec sola sanguinis mensura, nec dierum numero circumscribantur, sed magis vitium imbecillitate, idcirco facile cognoscuntur, cum primum mulieres præ nimia copia, pallorem, inappetentiam, corporis grauitatem, pulsus denique imbecillitatem subierint.

Distinguendi autem sunt morbi, & causæ, a quibus proficiscitur. Idcirco si fiat fluxio ob erosionem, præterquam quod aliquando confertim multus excernitur sanguis, fere semper etiam aliquid guttatim emittitur, & cum dolore.

Quod si fiat per rupturam, præterquam quod præcessit vel casus, vel vulnus, aut percussio, sanguis non modo coaceruatim euacuatur, verum etiam partim grumofus, partim liquidus.

Quod si fiat ex imbecillitate vasis, in hoc etiam

A casu sanguis, toto mensis tempore guttatim emittitur, sed sine dolore.

Si fiat propter anastomosin ex sanguinis nimia plenitudine, quoad vasa, corpus est carnosum, rubicundum, venæ sunt amplæ, præcessitque, ito tunc etiam adest victus plenus multi alimenti, otium & retentio excrementorum; sanguis etiam, qui excernitur, rubicundus est, & quamquam plurimus, sine insigni noxa euacuatur.

Quod si plenitudo sit ad vires, quia scilicet carnes corporis sufficienti alimento non videntes deponunt sanguinem, tanquam onus; in hoc casu corpus extenuatur, est cacheticum, frigidum, & subalbidum, & copiosa excretio, vires quam primum deiicit.

B Quod si fiat euacuatio propter acrimoniam sanguinis, primum quidem cognoscetis hunc sanguinem ex habitu corporis gracili, ex colore citrino, vel fusco, ex propensione mulieris ad iram, vel melancholiam, ex vigilijs & siti, ex doloribus sub tempore purgationis apparentibus.

Quod si linteam iam seruatum inspexeritis, eo superficialiter diluto, & in umbra exsiccatum, colorem humoris abundantis cognoscetis, siue flauus, siue viridis, vel alterius fuerit coloris.

Denique cognoscetis fluxum immodicum ex sanguinis nimia tenuitate, eo, quod corpus laborat vel cachexia, vel hydrope, & sanguis exiens, aqueus & pallidus est.

Omnis fluxio immoderata, magni est facienda, quandoquidem ad multos & vteri, & totius corporis morbos deducit. Nam actior sanguis vlcerat vteri; immoderatus vero vniuersum refrigerat corpus, cui non modo sterilitas, verum etiam inconcoctio, cachexia & hidrops subsequitur. Ut propterea iure Hip. *sect. 5. apb. 56* scripserit, abundantibus mensibus morbos fieri.

Curatio huius affectus, aliquando dirigitur ad symptoma, quando vires iam deiiciat: quandoque vero respicit morbum & causas.

Quod pertinet ad symptoma, ubi iam vires deiiciat, tractandum est reuellentibus, adstrictorijs, & tandem etiam opiatjs. Reuellentia sint frictiones partium supernarum, cucurbitulæ magnæ sub mammis affixæ, ligaturæ vel supernarum tantum partium, vel quandoque etiam supernarum & infernarum, ut iure censuit Auicennas: nam hac ratione tollitur fluxionis occasio, & ex supernis, & ex infernis partibus in vterum. Præcedant tamen ligaturæ supernarum, & cum soluantur, soluantur primum infernæ.

Adstrictoria sint & externa, & interna, vel iniecta, vel assumpta. Exteriora multa a scriptoribus proponuntur, inter quæ duo mihi probantur, quibus, præteritis vtor; alterum est balneum, quod isti vocant infessionem in decocto adstringente, quod decoctum debet esse varium, pro varietate intemperaturæ. Si sanguis frigidus cum intemperie frigida, balneum fiat ex vino austero, in quo bulliant alumen, sal chalcantum, spica, ablynthium, squinanthus, thus, & olibanum.

Si intemperies sit calida, accipiatjs pro materia balnei acetum: Adstringentia sint frigida, ut gal-
la, myrtus, rosa, acacia, hypocythys.

Et

*Prognosti-
ca.*

*Curatio.
Sympto-
matis.*

Reuellentia.

*Adstricto-
ria.*

Et quia in copiosa fluxione quanquam intemperies fuerit calida, refrigeratur tamen calor, expedit his frigidis aliqua calida immiscere, ut spicam & absynthium.

**Empla-
strum.**

Aliud remedium, quo ego fluxus admodum inueteratos constrinxi, est hoc emplastrum;

℞. fuligin.

farin. volat. volend. an. onc. ij.

bol. Arm.

sang. drac.

stuv. an. dr. β.

albus. ouov. m. ij.

succ. portul. vel

plantag.

aceti an. q. s. M. f. linim. quod applicetur partim dorso; partim etiam ipsi vtero.

Inijciuntur etiam in vterum decoctiones similes ipsi balneo.

Intrinfecus autem ego uti soleo succo hypocyssidis condensato, & est hac in re præstantissimus, danturque eas scr. ij.

Probantur etiam trochisci illi ex carabe, ex terra sigillata, ex spodio, ex camphora.

Vtiliter parantur pilulæ hunc in modum;

℞. thar.

masticb. an. dr. j.

troc. de carab. dr. ij.

succ. polygon. q. s. M. & f. pil. xij.

Exhibeantur duæ ex istis singulo mane cum onc. iij. aq. aut myrti, aut polygoni, aut portulacæ.

Vbi calidior fuerit temperatura, non improbat pulueres quidam frigidi & sicci, quales sunt illi, qui parantur ex corticibus chamarum, & illarum præcipue, quarum meminit Auicennas, quando inquit, convenire pulverem corticis ostrearum, quæ asportantur ex S. Iacobo.

Opiata.

Sed quando hæc non proficiant, ad opiata est confugiendum, vel theriacam recentem, vel philonium Romanum, vel pilulas ex cynoglossa. Hæc sunt agenda vbi symptoma virgeat. Nam si non virgeat, adstrictoria prætermittantur, nisi fluxus fiat ex imbecillitate vasorum vteri; tunc enim conveniunt adstrictoria, non minus, ac si fluxu esset immoderatus. Vbi autem importune & immodice quispiam sanguinem adstrinxerit, vlcera & caneros, inflammationesque varias non vteri modo, sed aliarum quoque partium infert.

**Curatio
fluxus ex
ruptura.**

Itaque potius morbis & causis occurrendum, quam symptomati. Et si morbus sit ruptura, agendum est agglutinantibus, hæc sunt amyllum, tragacantha, gummi Arabicum, rasura cartæ pergamæ, aloes, pili leporini combusti, qui pulveres oui candido excepti, ac succo amoglossæ, siue injecti, siue per pessarium immissi, vas ruptum agglutinant. Id ipsum præstant decoctiones epotæ ex eodem amylo, tragac. & gummi Arabico. Interim tamen revellendus est sanguis & cucurbitulis, & si vires consent, secta vena in cubito, ligaturisque, ut iam dictum est.

Quod si adsit erosio, in tractatu de Vlceribus audiuissis, qualia nam in erosione conveniant. Il-

A lud tantum dicam in præsentia, præter sectionem venæ, quæ etiam in hoc casu convenit, quanti calidi humores a iecore in vterum mittantur, opus est etiam medicamentis vtramque bilem educentibus, adstrictorijs tamen: propterea conveniunt myrobolani citrini & indi, fumaria, tamarindi, rhubar. immaturum: syrups similiter sint frigidi & adstrictorij, ut myrtinus, ros. de ros. siccis, rob. de ribes; syrupus de portulaca, de plantagine. Post purgationem vero conveniunt & renutrientia, & refrigerantia. Ex renutrientibus primum locum obtinet lac chalybeatum. Neque enim in fluxu sanguinis per erosionem lacte potissimum chalybeato aliquid præstantius excogitari potest.

**Curatio
fluxus ex
erosione.**

Conveniunt quidem & aquæ ferratæ, tam in potu, quam in sessione, & serum chalybeatum, & alia id genus frigida, sed non renutrient, sicuti lac.

In hoc casu fluente sanguine bilioso conveniunt quoque cibi, & potus incrassantes, ut oryza, alica, pedes vitellini, &c.

Quod si fluxio fiat propter vasorum imbecillitatem, adstringenda sunt vasa, ut dixi, si propter nimiam sanguinis copiam, detrahendus est sanguis ex partibus superioribus, non semel tantum, sed bis & ter, & victus ratio tenuis est imperanda.

**Curatio
fluxus ex
vasorum
imbecilli-
tate.**

Quod si plenitudo fuerit quoad vires, quia carnes non attrahunt alimentum, utendum est frictio- nibus & inunctionibus calidis, balneis calidis, insolatu, & denique etiam picatione.

Curationem autem fluxus immodici, ob sanguinis agnoscatem, partim habuissis in tractatu de Fluxu muliebri, partim habebitis in sequentibus.

C

**DE VITIIS, QUÆ AD DEPRAVATA-
tam alteratricem pertinent: Et primum
quidem De Furore Vterno.
Cap. XXIV.**

Infecundæ, ut ab initio dictum est, evadunt mulieres, siue semen virile in vteri cervicem, non admittant, siue admissum in vterum non attrahant, vel attractum non retineant, aut denique retentum non alterent, vel alterent alteratione corruptiva. De prioribus vitijs ad ingressum, attractionem & retentionem spectantibus abunde, ni fallor, dictum est. Sequitur in præsentia tractatio de vitijs ad alteratricem facultatem spectantibus, & quando hæc vitia partim, ut dixi, pertinent ad alteratricem imminutam, vel sublatam, partim vero ad depravatam, de prioribus nihil amplius dicam, quam quod hæcenus dictum est. Etenim tollitur, vel imminuitur alteratrix ex frigida, siue humida, siue sicca intemperie, de quibus hæcenus satis diximus.

D

Nunc itaque de vitijs, quæ ad depravatam alteratricem pertinent, erit sermo.

Depravatur alteratrix facultas, aut ex morbis, vel ex errore externo.

Et morbi sunt vel intemperies calida & sicca, vel morbi instrumentales, ut erysipelas, & inflammatio. De inflammatione capite 16. huius libri

egimus, ubi aliqua etiam de erysipelate fuisse cō-
texta: nunc tamen huius intemperaturæ calidæ &
siccæ occasione, plura dicemus de attinentibus ad
curationem erysipelatis, & quia furor vterinus, &
satyriasis hanc ipsam habent intemperiem cali-
dam, & siccam annexam, suntq; affectus quodā-
modo erysipelacei, idcirco mihi explicandos assu-
mam hos duos affectus, quibus cognitis & cura-
tis, simul etiam cognitz erunt causæ intempera-
turæ calidæ & siccæ, & erysipelatis vteri.

Quid fu-
tor vteri-
nus.

Incipiam autem a furore vterino, cuius memi-
nit Aëtius 4. *sestrib.* 4. cap. 74. & nihil aliud est, quā
ingens in mulieribus cœundi desiderium, cum delirio
amatorio. Dixi, cum delirio amatorio, quandoqui-
dem huiusmodi mulieres, quæ in tantam cœundi
rabiem desinunt, amentes fiunt, sed earum deliriū
totum est positum in cognitionibus & sermonibus
amatorijs; & ego novi virginem in quodam cœ-
nobio huius vrbis, quæ omnibus vicibus interiecto
spatio plurimum annorum inter has tres exacerba-
tiones laboravit hoc morbo; cui cum prima vice
virgines illius loci, alioquin huius morbi, & con-
sequenter symptomatum insciæ, cum carcere non
prospexissent, sicuti postea prospexerunt, factum
est, ut ipsa per cœnobium huc atque illuc vagata
obscœna multa protulit, & tanta religione indi-
gna, quæ tamen ad seipsam rediens castissima fuit
& honestissima, & nunc temporis cum iam annū
agar 72. iā octo dies incidit in apoplexiā, cui sub-
secuta est paralytis linguæ, & totius partis dextræ.

Causa.

Fit hic affectus ex multo atque acri semine, ac
menstruo sanguine ad vterum confluente, qui, ut
aliquando docuit Hipp. *lib. de morb. virg.* cum nō
possit satis superq; expurgari, rediens ad cor &
superiores partes, fatuitatem seu delirium infert.

Quia vero deliria sequuntur naturam humoris
abundantis, ut propterea quædam fiant cum rixa,
alia cum studio, nonnulla cum risu, prout conse-
quuntur vel bilem, vel melancholiam, vel sangui-
nem; hæc quæ proprie fit ex semine spirituofo re-
rento, infert quoque delirium, & res venereas spe-
ctans.

Augetur autem & sanguis, & semen ex cibo, &
multo & multi alimenti, ex otio, cogitationibus,
lectionibus, & sermonibus amatorijs. Propellitur
vero in vasa seminaria, ex usu tubetum, cardui, at-
que aliorum id genus, quæ flatum augēt crassum.

Cognoscitur facile hic affectus ex his duobus iā
propositis signis, delirio, inquam, rei amatoriz
absque febre, cum Veneris insigni tentigine.

Estque affectus diuturnus, qui durat, menses &
annos, sicuti observavi in illa virgine. Est etiam
periculosus, quandoquidem solent aliquādo hu-
iuscemodi mulieres manus sibi ipsis inferre, aut
seipsas suspendendo, aut in puteos precipitando
interimere, ut non absque causa arbitretur Mer-
curialis, Milesias illas mulieres, quærum meminit
Plutar. in libello de *virtutibus mulierum*, quæ acer-
uatim seipsas suspendebant, ob tale morbi genus,
ita in seipsas sœvisse.

Curatio.

Curatio huius affectus posita est in medicamē-
tis euacuantibus, reuellentibus ab vtero, reprimē-
tibus a capite, refrigerantibus vniuersum corpus,

A ac siccantibus seminis abundantiam.

Quod ad euacuationem, mittendus est sanguis
in hoc casu non semel aut bis, verum etiam plu-
ries, bis saltem ex venis supernis, &, si vires susti-
neant, mittatur sanguis non ad uncias, sed ad li-
bras: deinde vero secentur quoque venæ inferior-
es poplitis, vel malleoli.

Neq; improbatur apertio venarum sedalium: Purgatio,
nam istæ quoque deriuant ab vtero.

Purgatio quoque per medicamenta debet fieri
in hoc casu; leniatur aluus cassia cum tamarindis,
vel syrupo rosato solutio.

Præparentur humores syrupo violato, de nym-
phea, de portulaca cum aquis vel decoctis accom-
modatis.

Expurgētur ita præparati infusione rhabarba-
ri in sero caprino, addito syrupo rosato solutio:
aut si bolum voluerint:

℞. el. de succo rosar. dr. iij.

℥. cass. nou. extr. onc. j. M. f. boli.

Bolus.

Si feri copia ad sit, exhibeatur ad lib. iij. vel iij;
singulo die cum onc. iij. vel iij. emulsion. sem. me-
lon. Aut in magno furore cum onc. ij. emuls. sem.
pauperis albi.

Interim adhibeatur oxyrrhodonon capiti ex a-
ceto, oleo rosato, & succo lactucæ inuicem mixtis.

In defectu feri exhibeantur aquæ ferratæ. His
deficientibus accipiantur destillatæ, ut aq. nim-
pheæ, violarum, plantaginis, quarum dosis sit sin-
gulo mane pnc. viij.

Interim refrigeretur etiam vterus in flectionibus
& iniectionibus aquarum frigidarum, qualia sūt
balnea ferrata & ænea, vel saltem alterata planta-
gine, portulaca, solano, capitibus papaueris a'bi,
hyoscyamo, nymphaea, ac ceteris id genus.

Refrige-
rantia.

Probantur quoque exsiccantia, tam exteriora,
quam interiora. Inter externa probantur lini men-
ta vtero & renibus, facta ex ruta, ex castorio sub
actis aliquo succo frigido.

Exsiccantia exteriora.

Intrinfecus Aëtius probauit medicamentum ex
smyrnio & croco, quod vtrumque mihi suspectū
est, quandoquidem, præterquam quod mouent
sanguinem ad vterum, feriunt etiam caput, ut de
croco scribit Gal. *lib. 2. de compos. med. per loc. cap. 1.*
& de smyrnio in capite de puero epileptico. Ita-
que minuatur semen potius visu tenui, & nullius
fere alimenti, vtantur oleribus frigidis, fructibus
frigidis, cucumeribus, cucurbitis, ptisana vel pul-
te ex hordeo, ex milio fracto, ex chondro, dimi-
tente carnes & ova, vinumque omne, bibant atq; uā
ferratam, chalybeatam, piscesque petrosos, car-
neantque consuetudinem eorum omnium, quæ
possunt illas ad Venerem prouocare. Idcirco vter
etiam Veneris quanquam videatur tunc temporis
aliqua ex parte furorem mitigare, plerumque ta-
men illum augere solet.

Interna.



DE SATYRIASI SEU PRURITU VTERI.

Cap. XXV.

Quid satyriasis.

AB hoc affectu hæcenus declarato parum differt hic, quem Græci *satyrismos*, Latini pruritus vteri, & Arabes priapismum vocant. Est hic quoque affectus *tenigo Veneris, sed pruritiosa, & dolorosa, absque delirio*, quandoquidem in huiusmodi affectu cogitur mulieres ex insigni pruritu locos muliebres continuo scalpere, ex quo de in ingens dolor consequitur. Fit hic affectus ex fluxione materiæ salis & introfa ad muliebres locos.

Causa.

Aqua.

Augetur hæc materia vel ex putredine, vel ex assumtis cibis ac potionibus, & medicamentis calidis, acerbis, & salis. Idcirco non magis fit in iunioribus, quam in senioribus. Quinimo hoc anno ego nobilem curavi mulierem hoc pruritu laborantem, quæ annum agebat septuagesimum tertium, & postquam fuit curata, dum iam esset ruri, & promiscua vteretur viuendi ratione, incidit in apoplexiam & extincta est.

Aduuano huiusmodi fluxionem frequentes partus, ut præterea & hæc, & alia mulieres, quas noui hoc pruritu laborantes fuerint valde fecunda.

Signa.

Prognostica.

Est affectus, qui sicuti facile cognoscitur, ita non facile curatur: estque non modo molestus, sed etiam periculosus. Nam præterquam quod somnum tollit, accedit etiam, quod post scalptum mulieres plerunque animo deficiant, & quædam præ molestia seipsas extinguant.

Curatio.

Curatio huius affectus requirit primo totius corporis providentiam, deinde vero localia quædam auxilia.

Circa corporis providentiam secunda est vena vel unica in senioribus, vel duplex, ut voluit Auicennas, in robustioribus, media scilicet & cephalica, vel basilica.

Purgandum est corpus ijs medicamentis, quæ salsum educunt humorem. Idcirco electuarium lenitiuum, vel rosatum cum syrupo de polypodio usurpari possunt pro leniente medicamento.

Præparabuntur humores syrupo de fumaris, de lupulis, violato simplici, ac melle rosato, vel syrupo acorosi cum decoctione hordei, fumaris, lupulorum, scabiosæ, hepaticæ, sonchi, &c.

Bolus.

Purgatio fiat per pilulas cochias præparatas, aut per huiusmodi bolum;

Re. confect. hamech dr. ij.

diaphan. dr. j.

el. lenis communis onc. j. M. f. bol.

Si potionem voluerint, fiat sic;

Re. cortic. elieb. nigri dr. j.

agar. trochisc. fer. ij. infundantur f. a. in

decocto cordiali, & facta expressione, adde

mel ros. sol.

syr. de polypod. an. onc. ij. M. f. potio.

Localia.

Alteretur etiam intemperies calida, ut paulo ante dictum est, vel sero, vel aquis, aut succis varijs.

Denique quod pertinet ad localia, tamen ad

Arem pertinere possit, inungere renes, & vteri regionem vnguentis & linimentis frigidis, nihilo minus localia in hoc affectu necessaria sunt, vel linimenta, vel pessaria, vel clysteres vulvæ, & vterò impositi.

Et quia hæc omnia possunt esse aut reprimentia, ut propter ea Cleopatra, a quo accepit Auicennas, probat decoctiones ex rosis, ex corticibus granatorum, atque alijs id genus, possunt quoque esse remedia anodyna, atque ultimo possunt esse siccantia, & quantum ego potui propria experientia comprobare, neque reprimentia, neque anodyna, neque moderate siccantia quicquam præstant in hoc affectu. Ego sum expertus balnea & frigida, & adstringentia in infusione, fotu, & clystere, nihil profecerunt. Vfus sum linimeto ex succo solani, semperuiui, portulacæ, additis vitellis ouorum, ol. rosæ, ac mucilaginis frigidis, incanum tamen omnia: his addidi pulueres siccantes, de cerussa, lythargyro, rutia, videbatur morbus moderari, sed tamen redibat. Itaque tandem coactus sum Ambrosij Paræi hæc in re sententiam sequi, qui cap. 64. imitatus ipse quoque Cleopatram cap. 27. vitur medicamentis siccantibus validis nempe lixiuio, aut aqua salsa, in qua dissoluit vnguentum Ægyptiacum, quem liquorem deinde inijcit in vterum.

Conuenit etiam pessarium ex nitro & sulphure excepto cera confecta in formam pessarij.

His non conferentibus, efficacissimum est præcipitatum mixtum, cum butyro, vel cum adipe anserino.

C Non improbatnr etiam inunctio, facta ex sulphure, sale Armoniaco, & nitro puluerisatis, & cum eodem butyro commixtis.

Scio eundem Paræum proposuisse inunctionem cum hydrargyro, sed hæc tanquam minus tutam mihi non vndiquaque probantur.

De Defectu Mensum, & eorundem Stillicidio, Cap. XXVI.

Alteratrix facultas vteri sterilitatem facit, non ex morbis tantum, sed ex externo etiam errore. De morbis iam diximus, dicemus nunc quoque de errore externo.

Est error externus vitium, aut sanguinis menstrui, aut seminis. Est autem hoc vitium, & in quantitate, & in qualitate.

DIn quantitate quidem, si vel protus menses deficient, aut valde minuantur, aut inminuantur, & tardius effluant: vel denique per modum stillicidij effluant.

Quocunque modo res habeat, certum est, conceptionem ipsam, vel difficilem, vel impossibilem aliquando fieri.

Quod si apud Medicinæ scriptores aliquando inueniatis mulieres, etiam non purgatas peperisse, ut apud Petrum Toletum lib. de morb. pueror. cap. 1. apud Brasauolam comm. apbor. 36. fecit. 5. atque apud alios, ratio ea est, quam protulit Aristot. lib. 7. de hist. animal. cap. 2. & lib. 1. de gen. anim. c. 19. quia scilicet in istis mulieribus tantum sanguinis confluit ad vterum; quantum in illis relinquitur, quæ ex

consuetudine purgantur. Itaque non est defectus fluxionis sanguinis ad vterum, sed est defectus purgationis exterioris. Vt cumque res habeat, certum est, quæ non purgantur, ceteris esse infœcundiores.

Causæ cur Causæ igitur, quamobrem post decimū quartum ætatis annum, & ante quadragesimo octavo, neque vtero gerentes, neque lactentes careant menstris purgationibus, vel secius ac parcius habeant, post 14. & 18. ætatis anni sunt ex parte ipsiusmet sanguinis, aliæ vero ex parte vteri.

ante 48. non purgantur. Ex parte sanguinis, qui aut non generatur in tanta quantitate, quæ superabundet nutritioni membrorum, vel si generetur, crassior sit viscidior, quam ut vteri venas possit transire. Vel denique, si probus sit sanguis & multus, ad alias cōfluat partes.

Non generatur autem ob insignem corporis caliditatem & siccitatem, siue sit ex temperamento naturali, siue ex aere, aut nimia exercitatione, ut propterea scribat Aëtius 4. *tetrab. 4. cap. 51. saltatrices & exercitatas mulieres mensibus carere.* Id ipsum facit inedia, victus ratio attenuans, vigiliæ, curæ, timor, & mœror, ac nimix totius corporis purgationes, siue per aluum, & vomitum, vrinæ, vel sudores, sanie, aut tubercula in corporis cutem irrupentia.

Generatur sanguis siue melancholicus, siue pituitosus ex cibis & potionibus, & ex intemperie tam ventriculi, quam iecoris.

Denique alio confluit sanguis, siue expurgetur per hæmorrhoides, siue per nares, aut per os. Scribit Amatus Lusitanus *centur. 2. curat. vigesima prima*, cuidam mulieri aliquando menses per mamas effluxisse.

Diueritur quoque sanguis in mulieribus, quæ cum antea essent graciles, fiunt carnosæ & pingues.

Ars ipsa quoque sanguinem diuertit, dum sæpius sanguis potissimum ex supernis mittitur partibus. Deficiunt quoque menses ob vitia vteri, inter quæ est mala situatio oris, vteri procidentia, sunt compressiones vasorum ex varijs tumoribus, & ex pinguedine; sunt obstructions ex crassis & viscidis humoribus, sunt constipationes a medicamentis excitatæ adstringentibus, ut in illis, quæ, etiamsi conceperint, iterum virginitatem venditare volunt. Id ipsum faciunt aer, & aqua frigida.

Supprimuntur etiam nonnunquam ex coalescentia post vlcera, & subsidientia propter nimiam vasorum exsiccationem, ut in atrophia totius corporis.

Omitto in præsentia causas ex parte oris & cervicis vteri. *quædam* scilicet adstrictionem, oburationem a carne, a membrana, de quibus diximus alias.

Istæ igitur causæ aliquando faciunt integrum mensium defectum, nonnunquam imminutum & tardantem, quandoquidem consummata obstructio, aut constipatio, vel coalescentia, vel compressio, vel subsidientia, atque insignis defectus sanguinis, facit etiā menses omnino suppressos: Semiadultio vero, & semidefectus faciunt imminutos. Etsi

A sanguis fuerit frigidior, facit etiam tardantes.

Et hæ sunt omnes causæ deficientium purgationum a Galeno propositæ, partim *comm. aphor. vis. 28. & 57. sect. 5.* partim *libr. 3. de caus. sympt. cap. 4.*

Quamquam autem videatur Galenus citatis addidisse robur vteri expellentis a se sanguinem, non puto tamen hæc causam vlla ex parte distinguere iam propositis. Vterus enim, qui sua natura appetit sanguinem menstruum, si non sit impeditus, nunquam vteretur suo robore ad expellendum hunc sanguinem. Itaque robur vteri pendet ex aliquo impedimento.

Ex dictis possunt etiam colligi causæ stillicidij *Quid stillicidium* mensium, quod nihil aliud est, quam *fluor sanguinis paulatim factus, & cum dolore, saltem mensium.* magna ex parte.

Causa vero, cur hic sanguis guttatim effluat, aut est imbecillitas facultatis retentricis venarum vteri, & tunc dolor non adest, aut est semiangustia horum vasorum cum præsentia sanguinis: qui aut irritat multitudinem, aut acrimoniam, propter crassitiem tamen vel vasorum densitatem, non potest excerni, nisi guttatim, hinc dolor excitatur.

Huiusmodi affectus, ut cognoscantur, signis non indigent, ipsæ enim patientes referunt, an menses deficiant, vel ex toto, vel ex parte, an senius accedant, anque stillatim, vel non.

Distinguenda tamen sunt causæ, & primum distinguenda est suppressio viciosa ab ea, quæ sit propter conceptum.

C Distinguitur autem magna ex parte morbis & symptomatis: Nam suppressio ex morbo magna ex parte habet febrem connexam, dolores circa ileum ac dorsum, ac imum ventrem, gravitatem ac stuporem crurum, dolorem capitis, melancholiam, quandoque furorem, inappetentiam, atque alia id genus plurima. Concipientibus quidem aliqua ad ventriculum spectantia superueniunt, sed in ceteris non male habent.

Cognoscetis autem defectum fieri, quia sanguis non generetur, eo quod mulier erit gracilis, fusci coloris, hirsuta, iracunda, virili voce donata, exercitata: aut erit consumpta ex aliquo morbo longo, aut febre hectica, aut tentabitur alia purgatione corporis iam dicta. Quod si sanguis fuerit nimis crassus vel pituitosus, vel melancholicus, ad ea signa est confugiendum, quæ vel pituitam, vel melancholiam abundare demonstrant.

Quod si alio defleat sanguis, hoc quoque unicuique erit in comperto. Sicuti & corporis pinguedo ac carnositas præter naturam accedens.

Malam vteri situationem, quomodo cognoscere possitis, docui in proprio capite. Sicuti docui etiam signa omnium tumorum & coalescentiarum partium ad vterum spectantium.

Subsidentiam vero cognoscetis ex totius corporis atrophia. Et quod spectat ad stillicidium, si fiat ex sanguinis acrimonia, corpus est biliosum, vel attrabile, iracundum, gracile, & dolores sub excretionis tempus vehementissimi excitantur, sanguis-

sanguisque exiens admodum ruber esse solet.

Quod si fiat ex crassitie, oportet confugere ad signa demonstrantia abundantiam vel pituitæ, vel melancholiæ.

Si fiat ex multitudine, totum corpus rubet, venæ sunt turgidæ, lassitudo, phlegmonodes, & tensio vniuersum occupat corpus. Si fiat ob venarum labefactatam retentricem, sanguis excretus est tenuis, aqueus, & excernitur sine dolore, & menses tempore consueto aliquanto largius effluunt.

Prognostica.

Est huiusmodi suppressio non tantum verenda propter sterilitatem, quantum etiam propter mulierum varios morbos, quibus ex tali suppressione subiiciuntur. Dicebat enim Hippocrates *sect. 5. aph. 57. mensibus pluribus prodeuntibus morbi fiunt, & non prodeuntibus, ex vtero morbi contingunt*, quibus addit Galen. *in com. ex recentis mensibus excitari caneros, atque alios tumores vteri, præterea vlcera quæ suas communicant toti corpori affectiones, quarum meminit Galen. lib. 6. de loc. aff. cap. 5. & ante ipsum Hippoc. lib. 1. de morb. mulieb. scribens: mulier usque ad sextum iam mensem purgationes suppressas habens, non potest amplius ab hoc affectu liberari. Quæ sententia absolute prolata est falsissima: nam, ut alias præteream plurimas, ego ipse vnā curauī Venetiis, cui menses fuerant suppressi per annos duodecim integros.*

Doctissimus Mercurialis hanc sententiam inquit intelligendam esse de mala tantum vteri situatione: nam transacto sexto mense non potest amplius reuocari. Quod tamen etiam est falsum: Nam ego quoque curauī superiori anno virginem in quodam cœnobio, quæ septem iam menses ex distorsione vteri suppressionem passa fuerat, & tamen auxilio Dei & meo curabatur.

Intelligendus itaque Hipp. de illis tantum, quibus supprimuntur menses cum prauis illis symptomatis, de quibus meminit eo loci: Quando enim symptomata sunt vsque adeo magna, ratio persuadet causam quoque affectus esse maximā, ut transacto sexto mense non possit amplius exsuperari.

Curatio de sectis mēstrum ex de sectu sanguinis.

Suppressorum mensium curatio variis pro causarum varietate, perficitur intentionibus & auxiliis.

Nam quæ sit ob sanguinis defectum siue consequatur calidam & siccam temperiem, siue inedia, & corporis exercitationem, duplici modo curatur, pro duplici mulierum hac passione laborantium statu. Nam si fuerint virgines ad conceptionem ineptæ, augenda potius, quam mutanda est viuendi ratio attenuans & exsiccans, ut hac ratione tantum sanguinis generent, quantum satis est pro corporis nutritione, ut purgationibus non indigeant. Possunt enim mulieres temperanter viuentes exercitæ potissimum etiam sine mēstruis toto vitæ suæ tempore sanæ degere.

Quod si conceptionis sint idoneæ, in istis sanguinem vsque adeo augere oportet, ut non nutritioni tantum, sed & purgationi sufficiat. Ideo renuntiantur cibo copiosiore optimi succi, diu dormiant, quiescant, vtantur balneis, inunctionibus humectantibus, denique viuendi ratione renutri-

toria & humectante. Neque hætenus opus est vlla sanguinis missione.

Quod si resecto iam corpore purgatio nõ succedat, trahendus tunc erit sanguis ad vterum illis ingenijs, quæ paulo post proponam. Si deficient menses eo, quod trahantur ad alias partes, vel nares, vel mammas, aut os, aut sedem, non statim secandæ sunt venę inferiores, quod tamen video totam fere Medicorum Scholam fecisse, & facere, qui ad vnicam Galeni sententiam respiciens *lib. de curand. rat. per sangu. miss. cap. 11. & 19.* prolata, in suppressis mensibus inferiores venas semper esse aperiendas indiscriminatim, & in quocumque casu id putant esse agendum, nullo quandoque patientis commodo, imo vero maxime earum perniciem; nam si alio deflectat sanguis propter v-

Curatio de sectis mēstrum ex de sectu sanguinis alio trahatur.

Num sint secunda venę inferiores.

terii callositatem, scirrhum, inueteratam distorsionem, carnem adnatam, obstructionem consummatam, quid quæso præstare potest sectio venę inferioris? trahit quidem sanguinem ad vterum, non autem expurgat per vterum, quia talia habet impedimenta, quæ non permittant sanguinis excretionem. Auget itaque sanguis cõuulsiones facit, ac fauiores omnes vteri præfocationes. Satius igitur in his casibus est tam diu ab omnibus auxilijs sanguinem ad vterum ducentibus abstinere, quamdiu impedimenta sint sublata. Quod si tolli nõ possint, permittamus naturæ excretionem alias, dummodo sint per loca cõuenientia. Hæc est sententia Hippocratis, atque etiam Galeni, *sect. 5. aph. 33.* scribit Hipp. in suppressis mensibus sanguinẽ ex naribus excerni bonum esse, subdit Gal. *in com.* in suppressis mensibus non modo nares, verum etiam alia loca accommodata posse vtiliter satisfacere huic necessitati euacuationis, inter quæ ponit venas sedales. Et propterea *lib. 3. de caus. sympt. c. 2.* ubi loquitur de dysenteria hepatica, inquit, hæc vtiliter fieri per singulos menses illis mulieribus, quæ per vterum non purgantur.

Idcirco cognita impossibilitatis purgationis causa, nunquam accedatis ad secandas venas inferiores, gratia attractionis sanguinis ad vterum: quanquam ratione deriuationis id fieri possit. Potest autem euacuatio deriuatiua ab vtero fieri absque attractione in vterum duobus modis: primo, per appositionem hirudinum venis hæmorrhoidalibus vteri, quandoquidem habent tantum consensum cum venis, quæ pertingunt ad corpus vteri, & quia sanguis non potest purgari per corpus vteri, purgabitur per venas ceruicis vteri. Secundus modus est, ut aperiuntur quidem venę inferiores, sed mittatur sanguis ad duas, vel tres ad summum vncias, quousque euacuetur sanguis ille, qui in venis vteri turgentibus continebatur.

Si quispiam acceperit Auicennæ consilium, ut scilicet in hoc casu crura sint elatiora reliquo corpore, securius id obtinebitis, ut euacuetur vterus, neque tamen nouus attrahatur sanguis.

Ceterum si vterus non sit impeditus, quāquam sanguis euacuetur per regiones conuenientes, vel nares, vel sedem, expedit illum ad vterum trahere sectis ambabus venis infernis, in illis quæ sint graciliores, aut sacrificatis eturibus, in his quæ sunt

*Curatio
impedita
purgatio-
nis ppter
sanguinis
crassitiem
& visciditatem.
Vomitus.*

*Medica-
menta.*

pinguiore. Præterea frictionibus, ligaturis, cucurbitulis non sacrificatis, atque alijs ingenijs, de quibus infra. ¶ Quando autem impedita sit purgatio propter sanguinis crassitiem & visciditatem, legitima curandi ratio in expiando sanguine ab impuritate humoris, vel pituitosi, vel melancholici est posita.

Expiabitur autem purgatione, & per vomitum, & per medicamenta. Vomitum, si tentandus sit, ter tetur statim ab initio; progressu enim temporis habet rationem auxilij reuellentibus ab vtero: ideo purgationem impediens.

Medicamenta in humore melancholico sunt aut syrupus de polypodio cum mell. ros. solut. aut mel ipsum rosatum solutiuum.

In præparatione vero est abstinendum ab omnibus decoctis, quæ habeant vim ducendi humores in vterum, augerent enim obstructions. Satis fuerit uti syrupis incidentibus, ut est oxymel compositum, scylliticum, syrupus byzantinus cum aceto.

Post præparationem vero corpus valido medicamento est purgandum. Dixi, *valido*, Ætium imitatus, qui scribit, se euphorbio semel tantum exhibito in pituita, vel epithymo in melancholia purgationes statim reuocasse. Et sane ratio persuadet, ut sublata impedimenti causa tollatur quoque effectus. Causa est humoris crassities, purgato humore subsequetur purgatio: mihi igitur placet vsus hieræ, aut Pachi, aut Logodionis, vel Archigenis ad dr. ij. aut electuarium indum, vel maius, vel minus ad dr. iij. vel diaphænicon ad onc. sem. cū dr. ij. spec. hiero, vel dr. j. pilularum scitidarum cum dr. sem. alephanginarum.

Si voluerint potionem, infundantur scr. iij. agarici trochiscati in decocto cordiali, cum dr. ij. fol. senæ. & onc. iij. mell. ros. solutini, pro pituitoso scil. humore. Pro melancholico infundatur dr. j. corticum ellebori nigri, in decocto pariter cordiali cum dr. ij. senæ, & dr. iij. syr. de polypod.

Tunc tempus est administrandi medicamenta, quæ sanguinem fortius administrare possint. Et ideo prædictis syrupis addatur decoctum ex pulegio, calamentha, phu, meu, saturia, senecione, dielamno. Et ideo ipso tempore fiant fomenta vtero ex hoc ipso decocto, atque munctio post fomentum ex ol. lil. alborum cum aromatibus. Et post quintum syrupum repetatur eadem purgatio: quid repetita tunc locus est, & sectioni venæ infernæ, & medicamentis omnibus attrahentibus & impellentibus sanguinem ad vterum, qui ante hoc tempus hæc tentauerit, in patientis discrimen tentabit.

*Sanguinis
missio.
Frictiones*

Mittatur itaque sanguis ex venis infernis, aut sacrificatis crunibus: fiant frictiones & ligaturæ, lotiones pedum ex decocto matricariæ, origani, sabina, rutæ, pulegij, calamenthi, meu, & asari.

Gerant quoque mulieres sub pedibus aut flores croci, aut senecionem virentem, aut sabinam. Vtatur suffitu aromatum ex trochiscis de gallia moschata, de myrrha, vel ex cinnamomo, costo, cassia lignea: nam, ut nostis ex Hipp. sect. 5. aph. 28. suffitus aromatum muliebria educit.

Ineffiones

Fiant quoque ineffiones in aquis thermalibus,

A aut decoctis propositis. Adhibeantur pessi ex lana imbuta succo Mercurialis, succo cyclaminis: & in maxima pituitæ præsentia ego feliciter vsus sum, pessario, quod vno & eodem tempore menses, & adstrictam aluum mouit: composui autem in hæc formam;

℞. pulp. colocynth. interioris dr. j.

elaterij gr. iij.

diagrid. gr. iij.

trochisc. de myrrha dr. β.

oxymel. scyllit. q. s. M. fiant pessaria, quæ inuoluantur linteolo rato, imbuto ol. amygdalino, in quo dissoluatur granum vnum moschi, & hoc in nobilioribus. In agrestioribus potest etiam imponi absque linteo linceo.

Pessariū.

B Impellendus etiam est sanguis ad vterum decoctis, bolis, seu pilulis, vel pulueribus; Idcirco in hoc casu primum locum mihi obtinere videntur trochisci ex myrrha, quorum dosis est a scr. ij. ad dr. j. Vt etiam castorio admixto cum puluere vel pulegij, vel calamenthi, vel sabina:

Sit exempli gratia.

castorij onc. ij.

pulueris sabina

calamenth an. dr. j. M. cum syr.

capillo. Vener. fomentur pil. xij. ex quibus exhibeantur iij. singulo mane, quatuor horis ante cibum, post quas superbibant onc. viij. vel x. iuris alterati cum pulegio, sabina, capillo Veneris, asaro, atque alijs id genus aperientibus. Et si ius fuerit cicerum rubeorum, erit adhuc fortius.

Pilula.

C Quod si impedimentū sanguinis fuerit ex multitudinem, in huiusmodi casu secunda primum est vena superior, deinde vero inferior, vel vna, vel ambæ, & quamquam hæc sententia vnicum habeat ex antiquis auctorem, Ætium scil. cap. 57. & ex recentioribus, quos ego viderim (cum tamen plerimos, ne dicam omnes, viderim) duos tantū, Gordonium, nempe & Syluium, nihilominus est vsq; adeo rationabilis, ut quia aliter faciunt, tantum abest, ut moueant menses, ut potius inferant mulieribus hystericas passiones. Nam ubi suppressio oritur ex insigni sanguinis abundantia, id ipsum contingit vas vteri, quod contingit vas ore angusto donatis, & aqua repletis, quæ vasa, etiam si vertantur in partem perforatam, non euacuantur. Sed si in parte superiore aliquod fiat foramen, statim euacuatio fit etiam per inferiora. Hoc quotidie cernimus in dolijs plenis, hocque contingit etiam in mulieribus, quæ non purgantur ob nimiam sanguinis abundantiam, in quibus si secantur primo venæ superiores, deinde inferiores, purgatio felicissime succedit: imo vero, ut dicam, quod probavi experientia in istis, sola sectio venæ supernæ statim menses reuocauit eo ipso die, aut ad summum sequenti, quod ego secui venam in cubito mulieribus repletis sanguine, menses abundanter apparuerunt.

*Curatio
impedita
ti sangui-
nis ex mul-
titudine.*

D Tamen multi sunt vteri morbi, propter quos menses supprimuntur, cum tamen horum omnium curatio, obstructione excepta, in superioribus fuerit proposita, idcirco versabimur in præsentia de obstructione.

In ob-

Curatio de In obstructione autem vteri primum vniuersa- A
fectus mē- lis purgatio est necessaria, de qua fuit sermo in
suū ex ob- precedentibus, quia iam absoluta, ad ea statim
structione confugiendum est, quæ crassos & viscidos humo-
vini. res vteri attenuare & incidere possint. Et quia ho-
rum auxiliorum materię multiplices sunt, valenti-
ssimæ in hoc casu sunt eligendæ. Et quia aliæ in-
trinsæ, aliæ extrinsæ sunt administrandæ, o-
portet in hoc casu prius vti extrinsæ: ratio est,
quia si prius interiora adhibeantur, non præceden-
tibus externis, crassam & viscidam materiam at-
tenuantibus, ducuntur humores ad vterum, nec
transire possunt: hinc augetur obstructio.

Præmissis ego vniuersalibus, vterus hoc fomē-
to est irritandus;

Fomentū.

℞. *pulegij*
calamentib.
origani
sabina
valeriana
dictamni Cretici an. M. j.
sem. lini onc. iij.
costi

castia lignea an. onc. j. incidantur inci-
denda, & contendantur contundenda, bulliantq:
in s. q. aquæ: facta expressione f. fom.

Vbi per tres aut quatuor dies adhibita sunt alia
fomenta, tunc conueniunt etiam intrinsæ adhi-
bita, quæ crassum humorem ex venis deturbare
possunt. Sunt hæc quidem varia. Ego tamen &
familiariter vti soleo his pilulis;

Pilulæ.

℞. *troch. de myrrha dr. ij.*
sagapeni
opopanacis an. dr. j. cum syr. de capill.
Vener. aut de artemis f. pilula xij. &
deurentur.

Aliquando etiam vsus sum his pilulis;

Pilula a-
lia.

℞. *castor.*
pulegij
sabina puluerisatorum an. dr. j. M. &
cum eodem syrupo formentur pilula x. quæ de-
urentur: capiantur duæ ex istis singulo mane 4.
horis ante cibum. Post pilulas vero accipiant, aut
decoctum ex sabina, pulegio, senecione, nepita,
matricaria, valeriana, asato. Vel si diuturnus fue-
rit affectus, paratur decoctum ex infusione rad.
salsæ parillæ, ligni sassafras, chinatum, cui super-
addantur herbæ supradictæ, & post pilulas ℞. *hu-*
ius decocti onc. vij. vel viij.

Qui apud se thermalium aquarum copiā ha-
bent, felicissimo successu ad aperiendas vteri ob-
structiones illi vti poterunt, in potu, balneo & stil-
licidio adhibito ipsi vtero.

Non obtinet vltimum locum triphera magna
sine opio, aut theriaca, vel mithridatium.

Dum autem hæc administrantur, externa non
sunt prætermittenda, fomenta dicta, inunctiones
ex ol. cheirino, liliorum alborum, aut dropaces in
hunc modum facti;

Coratum.

℞. *galbani*
serapini
opopan. an. onc. β.
costi

cast. lignea an. dr. j.
piperis
pyretbri
zedoaria an. dr. β.
cer.

resina an. q. s. M. f. ceratum.

In hunc vsam probarunt veteres etiam sinapif-
mos & cucurbitulas, vel scarificatas, vel non scarifi-
catas, pubi vel inguinibus adhibitas, vt attrahāt
sanguinem ad vterum.

Idcirco vtiliter etiam dantur, & iniectiones &
pelli: Iniectiones quidem eorū, quæ possunt cras-
sum humorem attenuare, & eundem expurgare.
Fiant ergo clysteres ex decoctis dictis pulegij, ca-
lamen sabina, dictamni: quibus ad purgationem
humoris addatur colocynthis, aut cucumer sylue-
stris: dissoluatur quoque dr. j. hieræ diacoloc.

B

Pelli similiter fiant ex valentiori materia, qua-
les essent isti;

℞. *opopan.*

serapini an. dr. j. dissoluantur in vino o-
dorato, vt maluatico vel hippocratico, deinde
adde

Pelli.

pulpæ colocynth.
elaterij
scammonij an. dr. β.
mell. scyllit. q. s. M. f. pessarium longi-
tudine vnus digiti minimi.

Vbi iam magna ex parte sublata sint obstru-
ctiones, conueniunt quoque fræctiones partium in-
fernarum, balnea aquæ calidæ, sectio venæ popli-
tis aut malleoli, sacrificatio crurum, denique om-
nia, quæ sanguinem trahant ad interiora.

C

Et hæc curatio dirigitur non tantum ad sup-
pressionem mensium, verum etiam ad stillicidiū
ex copia & crassitie sanguinis.

Si vero fiat stillicidium ex sanguinis acrimonia, Curatio
alia est curatio; sanguinem primo purgare oportet ab humore acrimoniam inferente, deinde ve- ex acrimo-
ro illum quoque, & in toto, & in vtero tempera- nia sangui-
re. Vt expurgeretur, conueniunt vomitoria ex aqua-
nis,
hordei & ol. amygd. conuenit purgatio præmissa
leniente ex castia, syrup. ros. sol. succedentib. syr-
pis viol. simpl. demum subsequente purgatione,
vel per infusionem rhabarb. cum syr. ros. solutiuo,
vel per electuarium rosatum Mesuæ, quod potest
dari ad dr. iij. cum dr. vj. *cast. nou. extr.*

D

Extrinsæ, quo tempore conuenit etiam venę
sectio in cubito, ad refrigerandum iecur, ad tetra-
hendos acres humores ab vtero, dummodo tamē
hec sectio fiat octo vel decem diebus ante tempus
purgationis consuetæ.

Extrinse-
ca.

His peractis contemperandus est sanguis, &
in toto & in vtero: In toto, sero caprino in sicciori-
bus mulieribus, & lacte caprino, aquis ferratis, vt
aqua virginis, Lucensi & Calderiana, aqua hior-
dei, nymphæ, portulacæ, capillorū Veneris, & c.

Vtero autem administranda sunt medicamen-
ta acrimoniam quidem obtundentia, sed purga-
tionem non prohibentia, talia sunt ol. amygd. pin-
guedines anatis & anseris, mucilagines varia sem.
maluæ, psyllij & cydoniorum, radix altheæ et mal-
uæ confusa, & in lacte, aut in iure pingui cocta.

Omenta

Omenta animalium calefacta in iisdem oleis & pinguedinibus, spongiæ vel vesicæ imbutæ decoctis maluz, altheæ, violarum, sem. lini & fœnugræci.

In quem vsumparatur etiam injectiones ex iisdem decoctis aut lacte, aut aliquo iure, vel infusiones, pessi pariter ex mitioribus, vt radice altheæ contusa, & mixta cum succo mercurialis.

Vena se-
lio. Secunda est etiam vena inferior biduo aut tri-
duo ante purgationem. In quem vsu veniunt
frictiones, cucurbitulæ coxis & cruribus adhibite.

Et præ ceteris omnibus victus ratio tota sit humectans, & moderato refrigerans, quibus, vt dictum est, curari potest, & mensium mora & stillidium.

DE PRÆFOCATIONE VTERI.

(cap. XXVII.)

EX retentis mensibus ac semine, nec nō ex horum omnium corruptela non modo læditur conceptio, sed affectus etiam mulieribus admodū frequens & molestus excitatur, quam Gale. lib. 6. de loc. aff. cap. 5. hysterium vocauit, Latini dicunt vteri suffocationem, vel præfocationem.

Quid præ-
focatio v-
teri. Definitur a superioribus vario modo hic affectus, placet tamen mihi, & forte etiam iure optimo, illum sic desinere, quod sit *symptoma omnium affectionum ex vteri affectione*. Est symptoma omnium affectionum, naturalium scil. vitalium, & animalium, vario tamen modo ac forma.

Differen-
tia.

Dico, *vario modo ac forma*: neque enim vnica est præfocationis vterinæ differentia, sed ea quidem multiplex; vna quidem est, in qua symptomata apparent facultatis tantum naturalis: Idcirco hanc patientes præfocationis differentiam, inflationes ventris subeunt, rugitus, murmurationes, frequentes eructationes, dolores ventriculi, anxietatem, quandoque etiam vomitiones.

Vitalis.

Aliquando læditur vitalis, vt propterea hanc patientes præfocationem, non modo palpitatione tententur, verum etiam leipothymia, ac pulsibus parvis frequentibus, inæqualibus.

Animalis

Quandoque læditur animalis, & ea quidem multipliciter; nam tolluntur nonnunquam motus & sensus externi, seruata tamen spiratione & pulsu ac functionibus principibus.

Datur alia species, in qua motus deprauatur, vt fiant cōuulsiones variz crurum & brachiorum, dentium & labiorum, oculorum, atque adeo vniuersi corporis.

Omnium.

Denique datur præfocatio vteri, in qua facultates omnes ad sensum saltem sunt abolitæ, vt propterea sic patientes in nulla re a mortuis distinguantur, factumque est frequenter, vt tales iam sepultæ reuixerint, & ex tumulo ad proprias ædes redierint.

Quomodo
sine respi-
ratione &
pulsu uiue-
re possint.

Quod si quispiam quærat, quamam ratione istæ sublato iam pulsu ac respiratione viuere possint? His satisfacit Gal. ex sententia Heraclydis lib. 6. de loc. aff. ca. 5. videlicet tantam esse & partium præcipuarum, & totius corporis refrigerationem, vt istis non minus, quam animalibus, quæ in latebris

A degunt, vt sunt cochleæ, & alia id genus ad tuendam vitam satis esse possit transpiratio, quæ sit per vniuersum corporis ambitum (hanc eandem questionem tractarunt etiam Nic. Rocheus lib. de morb. mulieb. cap. 4. Tac. Syluius fol. Gynæciarum 159. Mercurialis lib. 4. de morb. mulieb. cap. ult. Albertin. Bottonus lib. de morb. mulieb. cap. 43. & Paræus lib. 2. cap. 46.) Cum igitur hæc & tot sint præfocationis vterinæ differentia, singulæ quoque singulas ac proprias habent causas, quæ tamen omnes etiam si ex vtero initium sumant, atramentum ad huiusmodi mulieris perniciem non descendunt, quin etiam duæ aliæ concurrant causæ, vna ex parte membri læsionem suscipientis, alia ex parte viarum, per quas vteri affectio ceteris partibus communicatur. ¶ Versetur itaque in his causis.

B Quæ tres sunt numero, sanguis menstruus retentus, semen, atque alij quoque humores seu ichores putridi & corrupti in aliqua vteri parte contenti.

Et quod pertinet ad sanguinem, vt dixi, non satis est sanguinem menstruum retineri ad hoc, vt fiat vteri præfocatio: pluribus enim retinetur mens, paucis tamen sit hæc præfocatio. Oportet igitur & viarum latitudinem concurrere, per quas sanguis retentus præcipuis partibus communicetur, & earundem partium præcipuarum imbecillitatem, propter quam sanguinis influentis iniuriā sentiant. His tribus simul conspirantibus, sit præfocatio. Et si sanguis per venas & arterias confluat in cor, sit præfocatio illa valentissima, quæ nihil aliud est, quam syncope ex vtero.

C Si ascenderit in cerebrum, pro sanguinis varietate, varie infert symptomata. Nam vbi sit pituitosus, facit præfocationem cum somno, emulaturque carui, si sit biliosus, facit præfocationem furiosam, in qua mulieres seipias aliquando dilaniant, vestes lacerant, crines enellunt: si sit sanguis dulcis, cogitant amatoria: Si sit melancholicus, est præfocatio cum mœstitia.

Semen pariter retentum, & hæc, & grauiora infert symptomata: nam vbi corrumpitur, & ex insigni putredine iam frigidus euaserit (euadit autem frigidius, vbi iam cessauerit illa putredo) tale semen sic refrigeratum est pessimum venenum, vt recte docuit Gal. lib. 6. loc. aff. cap. 5.

Propterea vbi inuenerit partes præcipuas debiles, illam infert præfocationis speciem, in qua mulieres sunt mortuis similes. Totum enim corpus ex hoc frigido veneno insigniter refrigeratur.

Contingit autem hoc in illis, in quibus semen multū colligitur in vteri cavitare, & hæc est causa, quamobrem neque viris fiat præfocatio, neque virginibus frequenter, sed magis viduis. Non viris, quia semen, si in pollutionibus nocturnis effusus datur, mittitur extra penē: in mulieribus per pollutiones nocturnas potest retineri in vtero, vbi propter diurnam moram transit in venenum: quod frequentius in viduis, quia iam assuenerat natura ad huiusmodi transmissionem: id quod non facile contingit virginibus.

Quod si hoc semen abundet quidem, sed potius in vasis seminarijs, tunc temporis facit quidē

Causa ma-
terialis.

Præfoca-
tionis a-
ffectiones vi-
tales lædē-
tis causæ.
Animalis

Causæ præ-
focationis
quæ red-
dūt mulie-
res mortu-
is similes.
Quare
hæc præfo-
catio non
contingat
viris, sed
frequentius
viduis.

præfocationem, sed minus periculofam.

Signa præfocationis in vasis seminarijs. Si tamen fit semen acrius, fit plerunque conuulſio. Si non fit ita acre, videntur tantum animo leuiter linquere, & blando quodam ſapore tentari: pulſus ſunt quidem parui, ſed non admodum inæquales, manent oculis clauſis, nec tamen mutatur color faciei ad pallorem, & ſæpe ſæpius excitantur. Cum autem redeunt ad ſeipſas, emittunt ſuſpiria, & paulo poſt iterum incurrunt ſymptoma. Si contredentur loci muliebres, effuſo ſemine ſtatim ſanantur, vt docuit Gal. *loc. cit. in hiſtor. viduæ*, quæ multo ſemine effuſo à ſymptomate eſt liberata.

Cur etiam contingat ijs, quæ viro ad ſatiatē vtantur. Ceterum, quia hic affectus fit etiam in illis, quæ & largiter purgantur, & vito ad ſatiatē vtuntur, & fit quoque in vetulis: alia etiam eſt huius affectus cauſa, nempe vel ſtatus, vel vapor, vel humor quidam putris, & corruptus: in vtero contērus, ſed per varias vias cordi & cerebro imbecillioribus communicatus: ſic vbi ſtatus abundent, atque vterum ipſum diſtendant, inflatur vterus: & ſi communicetur ſtatus ligamenti vteri, aliquando trahitur ſuſum, ſit aſcenſus vteri, vt recte docuit hac in re, & Plato in *Timæo*, & ante illum Hippoc. in *lib. de ſteril. & lib. 2. de morb. muliebr.* quanquam Gal. hoc negauerit *lib. 6. de loc. aff. capit. 5.* Aſcendit, inquam, aliquando vterus tota ſua mole, & ſubſtantia, uſque ad diaphragma: ſicoti ego ipſe aliquando ſic iubentibus mulieribus tāgens inueni, neque illud eſt mirum: nam cum ligamenta vteri uſque adeo laxentur, vt in procidētia delabatur, quandoque uſque ad genua, cuius rei hiſtorias protuli alias ſuo loco, mirum nemini eſſe debet, ſi in ea ipſa ligamentorum laxitate vterus aliquando ad ſuperiora propellatur, vel a ſtatibus, vel attrahatur ab odoribus iucundis, & gratis naribus adhibitis, vel a repletionē ligamentorum, quæ repletio fit ex multo & craſſo ſanguine, vel etiam propellatur ab ingratis odoribus vtero appropinquātibus. ¶ Quandoque igitur vterus aſcenderit, præfocationes variæ oriuntur. Et ſi communicetur ſtatus cordi, fit præfocatio cum palpitatione, ſi communicetur cerebro, fit præfocatio cum vertigine, cum tinnitu aurium, cum ſuſfuſione ex phantaſmatibus oculorum; ſiūt autem hæc, vbi vel ſtatus, vel vapor potiſſimum aſcenderit per ſpatia inania, aut per venas & arterias: aliquando enim huiusmodi ſtatus & vapores, vel prauī humores aſcendunt etiam in caput per neruos ipſos, in quo caſu ſunt conuulſiones variæ, & eo maiores, ſi cerebrum quoque multis ac frigidis fuerit reſertum humoribus.

Et cum hic affectus virginibus non ſit admodū frequens, vt ego experientia obſeruauī, illis potiſſimum contingit, quæ vterum & cerebrum atque vniuerſum corpus habent reſertum pituita. Ego tres iam curauī, virgines caſſiſſimas, quarum duæ ſingulis menſibus in debita quantitate purgabantur, tertia vero erat ſine purgatione propter malā vteri ſituationem: erat enim diſtortus & diſtractus in latus ſiniſtrum. Iſtæ tres cum eſſent deditæ ieiunijs, vigilijs & orationibus, atque vterentur pro cibo ſere tantum oleribus ac fructibus, &

A aqua pro potu, inciderunt in hæc præfocationes vteri cum maximis & frequentiffimis conuulſionibus, ita vt duæ ex iſtis, quæ purgabantur, haberent perpetuum die ac nocte dentium ſtridorem: præterquam quod manus & crura in perpetua erant conuulſione, & aliquando aderat opithotonos & emproſthotonos, id eſt, conuulſione ad poſteriora & anteriora, quæ tamen omnes ſunt curata uſu medicamentorum pituitam purgantium, calefacientium & ſiccantium. Vltima autem ex iſtis fuit hoc Menſe Februarij curata in Monasterio S. Blaſij. Hæ igitur ſunt cauſæ proximæ & immediata præfocationis vteri.

B Immediatę itaque cauſæ, vt iam dicebam, ſtes ſunt præcipuæ, ſanguis menſtruus retentus, ſemē, humoresque ſaniſſi, purulēti, alique omnes corrupti in vtero retenti, qui partibus præcipuis ſunt inſenſi, & propter viarum latitudinem, & propter partium ſuſcipientium imbecillitatem. Propter hæc autem cauſas magnus Hippoc. *lib. 1. de morb. muliebr.* cui videntur adhærere Ariſtoteles, *lib. 1. de geuer. animal. capit. 11.* Paulus *lib. 3. capit. 7.* Mauritius Cordax *in comm. quos edidit in libros illos Hippocratis de morb. muliebr.* Et Fernel *lib. 6. pathol. cap. 16.* vt alios prætermittam, fuerunt in hac ſententia, vterum ſecundum totam ſuam ſubſtantiam ad partes ſuperiores aſcendere; vt propterea comprimens iecur aut diaphragma conſequenter pulmones, & cor, aut ipſum ventriculū varias inferat præfocationes, cui ſententiæ, vt dicebam & ratio & experientia adſtipulantur. Neque Gal. rationes *lib. 6. de loc. aff. cap. 5.* in appoſitum prolata quicquam roboris habent: cum enim inquit vterum dorſo firmiter eſſe alligatum, reſpōdemus, hæc vincula & ligamenta non minus in re curſu ad ſuperiora, quam in prolapſu ad inferiora laxari & extendi poſſe. Quod etiam ſecundo dicit, ventriculū impedimento fore, ne vterus aſcendat, itidem nihil concludit: cedunt enim partes partibus, præcipue vero viuētes & molliores: ſecui ego aliquando hydropicum, cuius venter continebat plusquam trecentas libras aquæ, ſectō corpore, neque cordis, neque pulmonum vlla appaiebant veſtigia: nam aquæ copia ipſum diaphragma cum pulmonibus compreſſerat ad iugulum. Ventriculū ipſe quoque mirandum in modum compreſſus & anguſtatus reperiebatur. Itaq; ſi id facit aqua, poterit etiam facere vterus.

D Aſcendit itaque ſuper diaphragma & ſub aſcenſu comprimit prædictas partes, & ſuffocationem inferit.

Aſcendit autem vel attrahitur, vel impuſus. Attrahitur quandoque a venis & arterijs ligamenti repletis, vt in retentione menſium.

Quandoque vero ſuſum attrahitur a bonis odoribus, non quod vterus habeat odoratum, ſed odores viri quod boni odores trahant ad ſe ſpiritus & calorē, cum ſuſum trahant. Cur grati

Vterum ſecundum totam ſuam ſubſtantiam aſcendere.

non possit, quæritans alimentum superiora petit.

Propellitur autem a prauis odoribus ipsimet vtero administratis, propter quos vasa constringuntur, excretiones retinentur, ligamenta replentur, ut propterea fiat recursus ad superiora.

Et hæc de immediatis causis dicta sufficiant: mediatas enim facile poterit unusque ex iam dictis in capite de suppressione mensium colligere, partim vero ex his, quæ habentur in tractatu de Gonorrhœa.

Causa mediata.

Signa.

Nam quod pertinet ad mediatas causas, istæ sunt varix, abundantia prauorum humorum, tumores vteri varij, vlcera, & abscessus, ætas senilis, victus ratio praua, &c. Venio ad signa. Vteri præfocatio simul cum omnibus suis differentiis facile a vobis deprehendi poterit, si denuo legeritis, quæ a nobis antea dicta sunt. Sed quia illæ omnes differentiæ aliquam habent similitudinem cum symptomatis, etiam ex vtero non prodeuntibus, idcirco proponam vobis quædam signa distinctiua, primo in genere, deinde in specie.

Generalia.

Generatim cognoscetis symptoma ex vtero, si suppressi sint menses, si retentum semen, ut in viduis & virginibus, si inceperit morbus tempore conceptus in vtero, aut in abortu, aut in puerperio: si vterus aliquo morbo laboret, si per singulos menses symptomata exacerbentur, si denique ex auxilijs vtero adhibitis, symptomata mitigentur & tollantur.

Signa distinctiua hunc affectum ab alijs.

Distinguitur autem in specie vteri præfocatio insignis, in qua videntur mulieres mortuæ, a syncope eo, quod syncope sit brevis affectus, præfocatio perdurat aliquando horas & dies, ita, ut aliquando mortuæ existimentur. Neque experimenta ab auctoribus proposita satis esse possunt ad confirmandum, illas esse omnino extinctas, quæ desumuntur ex speculo nitido, aut lana carminata ori & natis adhibita, vel ex cyatho vini vel aquæ thoraci imposito: Dicunt enim isti, quod si speculum non inficiatur, & lana vel aqua non moueatur, mulierem iam esse extinctam. Hæc, ut dixi, non sunt certa, quandoquidem ex Gale. *loc. cit. lib. 6. de loc. aff. cap. 5.* Si possunt istæ mulieres absque respiratione viuere per solam corporis transpirationem, ergo nec inficiunt speculum, nec mouent lanam, vel aquam. Tutius itaque fuerit illas non sepelire ante 72. horas a principio symptomatis: nam si post hunc terminum, qui est terminus circuitus omnium humorum, non reuiuiscant, actum est de ijs.

Cæterum præfocatio differt ab epilepsia, quia in epilepsia adest spuma, tolluntur functiones principes, præcipue memoria: in conuulsione propter vterum neque adest spuma, nec tolluntur sensus interni.

Differt etiam a caro, qui in caro pulsus validus seruatur, seruantur actiones principes: in præfocatione vteri pulsus semper sunt imbecilliores, & magna ex parte principes actiones seruantur.

Cognoscetis autem præfocationem fieri ex sanguine menstruo, si fuerit hic retentus.

Differetias autem sanguinis vel biliosi, vel melancholici, vel pituitosi cognoscetis ex symptoma-

tis. Si fiat ex femine istæ viro non vtuntur, sunt calidæ & sanguineæ, & optimis vtuntur ahimæis, & emisso sanguine subleuantur.

Si autem fiat ex corruptis humoribus, istæ purgantur, viro vtuntur, patiuntur tamen, vel passæ sunt graues vteri morbos, vel pruritus, satyrismus, vel vlcera, vel abscessus, vel purgationes venteris, quæ iam sunt suppressæ. Quod si ascendat vterus, vos aliquando manibus proprijs poteritis inuenire vterum iam ascensum in modum rotundæ pile, quem etiam manu paulatim poteritis deponere, præterquam quod aderit aliqua ex causis prædictis. Est sane omnis præfocatio magni momenti, utpote, quæ vel statim iugulet, vel saltem aliquando deducat ad paralyin, ad stuporem, ad melancholiam. Noui enim ego mulierem 22. annos continuos vterinis præfocationibus subiectam, quæ tandem in insignem desijt melancholiam.

Dicebat tamen Hipp. *sect. 5. aph. 35.* mulieri præfocationem patienti sternutamentum quod superueniat, bonum esse. Itaque concepta salutis spe descendamus ad auxilia, & auxiliorum materiam. Curatio præfocationis alia est in accessione, alia extra accessionem, & in accessione quidem opus est remedijs renouatorijs, reprimentibus, ac corroborantibus calorem cordis, ventriculi, atque adeo ipsius vteri.

Quod igitur pertinet ad reuellentia, hæc sunt multiplicia pro varietate causæ, a qua fit præfocatio: nam si fiat ex multitudine sanguinis propter suppressos menses, conuenit venæ sectio ex partibus infernis, facta etiam tempore accessionis, neque obstat syncope. Nam & syncope est ex suffocatione. Dicebat vero Hipp. *com. 4. acut. tex. 23. 24. & 25.* in venarum interceptionibus, ut inquit Galen. in *com.* in suffocationibus illis, siue sint apoplexia, siue syncope, quæ fiunt ex copia sanguinis, venam quam primum esse secandam. Idipsum repetit idem Hipp. *cod. com. tex. 82.* ubi inquit, tetanum & venarum interceptionem solui venæ sectione, inquit Gal. Sine per venarum interceptionem intelligamus arteriarum totius corporis motum absolutum, qui dicitur *σπένδρα*, siue sublatum, quæ dicitur *σπένδρα*, in utroque casu conuenit venæ sectio.

Quod si refrigeratio ex refrigerato semine, aut prauis humoribus, tempore accessionis, minime secanda est vena. Loco autem sectionis venæ, instituuntur functiones, ligaturæ cucurbitulæ, satem non sacrificatæ, partibus infernis administratæ, adhibeantur vesicantia, præcipue intra coxas, siâ pessaria ex medicamentis valentissimis, ut colocynthide, elaterio, myrrha & sagapeno addita, semper aliqua portione moschi, zibethi, nux ambre: Fiant quoque linimenta ex oleo sambucino & iunio, liliorum alborum cum aromatibus, in quibus dissoluatur crocus, myrrha, & porrio moschi, vel zibethi. Possunt hæc odorata dissolui in vino aromatico, quale est matuaticum, & imponi in vterum, aut per turundas, aut digito obstrictis.

Suffumigia in his casibus mihi non probantur admodum, primo, quia mulieres præfocata non facile

Prognosis.

Curatio præfocatio.

Vena se-

Suffumigia impro-

facile accommodantur ad suscipiendum suffumigium: Deinde vero cum suffumigia debeant ex odoratis parari, imminet periculum, ne odor ille gratus ascendat ad caput, ad nares, & præfocationem augeat. Fiant quoque clysteres & suppositoria statim discutientia, feces & humores euacuantia, atque utrum calefacientia, in quem usum Gal. lib. 9. de comp. med. sec. loc. cap. 10. probauit succurritur impositum in anum: vos poteritis parare, clysteres ex vino odorato, ol. rutaceo cum hiera pro clystere, & melle rosato: aut parabitis suppositorium ex cymino, aniso, castorio, speciebus hieræ, melle exceptis.

Clysteres
& suppo-
sitoria.

Ceratum.

Vt uterque quinetiam apponenda sunt cucurbitula cum multa flamma non sacrificata: & ceratum huius conditionis; *℞. galbani onc. ss. sem. pæonæ gr. viij. zedoar. galangæ an. dr. j. costi, cassia lignea an. dr. ss. dissoluantur gummi in vino odorato, additis ceteris in puluerem redactis cum cera & resina, fiat ceratum, quod comprehendat totum vterum, factum foramine in medio cerati, ne cõtegat umbilicum.*

Quod pertinet ad ea, quæ superius administrari debent, considerandum est, qualisnam sit præfocationis curandæ differentia. Nam si fuerit ex illis grauissimis, in quibus patientes videntur mortui, tentandum primum illas excitare suffumigijs ex assa fetida, ex galbano, ex sulphure accenso, aut antiquis corijs accensis, aut lichenibus equorum, aut asinorum, vel vngulis, vel cornibus, vel lucerna extincta, vel plumis perdicis, vel (quod celebratur maxime) pilis ex capite patientis euulsis, vltis, & natis suppositis.

Nares quoque sæpe sunt agitandæ digitis, accito acerrimo madefactis.

Quinimo excitandum est sternutamentum, aut puluere ellebori nigri, aut nigellæ, aut piperis, & pyrethri, vel euphorbii, & sinapi, vel tandem colocynthide, & elleboro albo.

Aperiendum istis erit os, ad detinendum apertum cochleari intra os posito, aut ligno, vel alio consimili.

Interim illinendus est palatus theriaca, confectio anacardina, diasinapi, mithridatio dissoluta cum vino odorato.

Conuenit etiam in hoc casu aliquam vini odorati portionem in os, & in ventriculum infundere.

Et in hoc tantum casu mihi etiam probatur excellentissimi Horatii Augenij consilium Epistolæ medicinali: epistola vltima, ut exhibeatur vinum generosum, cum nucis moschata, cinnamomo, & caryophyllis, additis granis quinq; moschi, in istis, inquam, quibus & respiratio, & pulsus sunt sublatis, moschus & ambra non improbantur. In alijs autem, qui sensum & motum non prorsus non amiserunt, nihil periculosius existimo usu odoratorum assumptorum. Nam præter probatissimorum auctorum testimonia obseruari, pleraque mulieres incaute moscho & ambra vtentes, in aliqua confectioe statim præfocatas esse. Sed ubi iam videntur extinctæ, si odores isti possunt vterum excitare, poterunt etiam arterias mouere, ut spes salutis iam elucescat.

Lib. 12. fo
m. 1.

A In his casibus probantur etiam cerata calidissima, cordi & vtero imposita; cordi, inquam, theriaca dissoluta, cum aqua vitæ, cum vino maluatico, vinum maluaticum, mixtum cum croco, & cum aliqua portione moschi. Inunctio facta ex oleo magni Ducis Hetruricæ, aut oleo scorpionum Matthioli, vel etiam oleo charebythæ.

Quod si præfocatio sensum & motum non prorsus sustulerit, videndum, an fiat ex humoribus frigidis: an calidis; nam si ex frigidis, conuenit præbere dr. j. zedoariæ puluerisatæ, cum vino generoso, aut duas rotulas diagalangæ.

In hunc usum parantur etiam rotulæ ex speciebus contusis hoc modo;

℞. cinnamomi subtiliter contusi

galangæ

zeduariæ

nuc. moschat.

caryophyll. an. dr. j.

sacch. dissol. in aqua melissæ q. s. Misc. f. confectio in rotulis.

Rotula.

Præstantissimi auxilij materia, qua ego vtor feliciter, est tryphera magna sine opio, quam præbeo ad dr. j.

His non cõferentibus, si caput videatur humoribus frigidis repletum, præter iam dicta conueniunt etiam vesicantia, post aures adhibita, aut cauterium in occipite.

Sed si materia fuerit calidior, mihi in hoc casu placet, quod probatum est a Galeno lib. 9. de comp. med. sec. loc. cap. 10. nempe onyx purpureæ, seu cuius operculum Arabes vocant blattam byzantinam: datur huiusmodi operculum puluerisatum aut ex aqua melissæ, matricariæ, pulegij: vel si magnus non sit calor, ex vino.

Fouendus etiam est ventriculus vino odorato, in quo bullierit mentha & absinthium. Et hæc de agendis in accessione.

Extra accessionem incumbendum est causis, propter quas fit præfocatio.

Itaque si fiat ex retentis mensibus, docui iam, quomodo iam sit progrediendum.

Si fiat ex semine retento, videndum est, an semen retentum sit adhuc in vasis cum corpore pleorico, an potius sit collectum in vtero, & conuersum in frigidum venenum, ut etiam vasa & totum corpus sit refrigeratum. Nam in primo casu quicquid alij sentiant, mittendus est sanguis ex vena inferna, & semen euacuandum contrectatione partium muliebrium, Sed ubi iam semen & vniuersum corpus factum fuerit frigidius, abstinendum est a venæ sectione.

Quod si prauis fuerint humores, docui in tractatu de Fluxu muliebri, quam ratione omnes prauis humores expurgari possint, corpusque præseruari a tota congerie, ergo ad illud caput confugiatis.

Quod si vterus ascendat ad superiora, præter ligaturas, frictions, cucurbitulas, & cetera reuulsoria dicta, expedit etiam manu inuncta oleo odorato, ut cardino, vel de spica, vterum paulatim in proprium locum restituere; Et ne facile iterum ascendat, iubet Hippocr. lib. de morb. muliebr. ut fascijs

Curatio
præfocatio
nis extra
accessionē.

fascijs partes supra vterum cōstringantur, interim supernis locis ingrati odores præbeantur. Intrinsicus vero aliquod ex enumeratis medicamentis.

De Superfætatione, & Prole Numerosa.
Cap. XXVII.

Egimus satis superque hætenus, ni fallor, de causis omnibus conceptionem prohibentibus. Aggrediamur in præsentia tractationem deprauatæ conceptionis.

Hæc cum fiat multis modis, primum aliquæ breuiter dicam de conceptu deprauato ratione, numeri; secundo agam de conceptione deprauata ratione formæ, ad quam pertinent mola & monstrosi partus.

*Quid sit
superfætatio*

Quod pertinet ad conceptum numerosum, hic fieri solet dupliciter, aut scilicet cum superfætatione, aut sine ea. Et superfætatio nihil aliud est, quam *secunda conceptio post primam facta*. Huiusmodi conceptionem super conceptionem, aut non cognouit Galenus, aut si cognouit, illam non concessisse visus est, ut qui *lib. 2. de caus. sympt. cap. 3. & lib. 17. de vs. part. cap. 7.* profiteatur os vteri adeo cōstringi post conceptum, ut ne specillum acus admittat, usque ad statutum partus tempus, neque ingressui, nec egressui dandi locum. Hippoc. tamen de superfæt. cui subscribit Aristot. *lib. 7. de histor. animal. cap. 14. & lib. 4. de gener. animal. cap. 5.* cū quibus est etiam Auic. *sen. 12. lib. 3. tr. 1. cap. 17.* ut Rhases & alios præteream, isti omnes proprijs etiam ducti experimentis, superfætationem confirmant. Et quanquam plures referantur historie, quas omnes collectas legere potestis apud Marcellum Donatum *lib. 4. historiar. mirabil. cap. 16.* ego tamē vnā vobis dicam præ ceteris omnibus singularem a me obseruatā ante annos quatuordecim. Vocabar ad vxorem naturæ, qua filiū pariebat bono mense viduum & perfectum: Octauo die a primo partu alium rudem, & non omnino absolutum; post quindecim dies iterū alios duos. Cum iam reualuisset, anno sequenti, cum iterum vtero gereret, habuit eisdem omnino partus, & singuli eorum in propria tunica erant inuoluti. Cū tertio cōcepisset, filium edidisset primo, & adhuc vterus esset filijs plenus, parere amplius non potuit. Et cum ipsa refecit, se vterum habere filijs adhuc refertum, nec posse parere, tandem obiit: secuissem libenter, sed quo tempore obiit, ego erā Venetijs, ita ut obitum eius ignorarem. Ergo certissimum est, superfætationes fieri, & aliquando fieri post tertium, aut quartum diem; aliquando etiam post primum, secundum, & tertium mensem, ut potestis legere apud Aristotelem *loc. cit.*

Causa.

Causa superfætationis nulla est alia, quam oris vteri apertio, quo tempore virile semē denuo effunditur.

De causa, propter quam aperitur, est dubitatio. Quidam aiunt in omnibus vtero gerentibus statutis quibusdam diebus os vteri aperiri ad excernenda vteri excrementa; id confirmant, quia pleræque ex istis habent albas purgationes, & cum coitu vtuntur, semen effundunt, multæ etiā

A menstruas habent purgationes, falsa tamen hæc est sententia; quandoquidem tametsi albæ purgationes, & semen excernatur, possunt tamen excerni per vasa, quæ ad ceruicem vteri tendunt. Itaque accipienda est hac in parte Auicennæ sententia, scilicet in illis tantum mulieribus superfætationem fieri, & consequenter vteri apertionem, in quibus multus abundat sanguis, vterus est calidus, & semen virile appetit, & quibus tempore conceptus apparent menses.

Quod si dixit Aristoteles *li. 7. de histor. animal. cap. 2.* quæ tempore conceptus, habent menses, fœtus gerere imbecillem, & qui facile intereat, loquitur de illis, quæ purgationes habent a primo mense ad vltimum; Auicennas loquitur de illis, quæ purgantur a primo ad tertium tantum mensem, quæ tanto abundant sanguine & semine, ut non modo possint nouum semen attrahere, & nouum fœtum alere, verum etiam propter insignem sanguinis copiam fœtum suffocant, ut ac inhibendum hoc periculum opus sit sectione venæ in cubito: id quod factum fuisse legi, sed bis feliciter sum expertus, qui præseruauit mulierem ab abortu missu sanguine in cubito.

In istis ergo fit superfætatio, quæ quidem, dum fœtus adhuc est in vtero, deprehendi non potest, sed cum iam fuerit ortus, ut cognoscatis, an alij super sint, inquit Auicenn. inspicendum esse infantis umbilicum: Si enim fuerit sine plicis, vnus est fœtus, sin ad sint plicæ, tot super sunt fœtus, quot sunt plicæ in umbilico.

C Quod si vel simul oriantur, vel vnus statim post alium, cognoscetis fuisse superfætationem, si singuli singulas habuerint secundinas, præterquam quod vnus soleat altero esse imperfectior, ac minus vitalis. Sunt autem minus vitales, quando nō dies tantum, sed menses inter primam & alteram conceptionem intercidunt. Nam in hoc casu necessarium est, aut primum, aut secundum exstingui. Quod si pauci intercidant dies, vterque seruari potest, ut de Hercule & Iphide scriptum est a Plauto & Aristot. *lib. 7. de hist. animal. cap. 4.*

Numerosus autem conceptus absque superfætatione deprauatus dicitur, quando binarium excreuit numerum. Vterus enim etsi vna sit cavitās, duos tamen habet sinus ad duos concipiēdos partus, & propterea duo etiā vbera natura dedit mulieribus. Quæ vero concipiunt tetnos aut quater-nos, iam monstruose concipiunt. Idcirco Aristoteles tanquam rarum quoddam *lib. 7. de histor. animal.* refert, mulierem quinq; partibus viginti peperisse. Capus in Mundinum scribit, se reperisse in eadem cysti quindecim fœtus.

Habetis historiam apud Albertum Magnum ex Hollandina Comitissā 160. vna vice peperisse, cuius monumentum & inscriptio adhuc exstat apud illas regiones.

Habetis item historiam Comitissæ Hollandiæ, nomine Margaretæ, Comitissæ Hermannī ab Henneberg coniugis, quæ ætatis suæ anno 42. Christi autem 1276. in ipso die parasceues 365. infantes, pueros ex parte vna, ex altera puellas, vno partu edidit, quorum illi Ioannes, hæc vero Elisabethæ

*In quibus
mulierib.
maxime
fiat super-
fætatio.*

*Signa, quæ
bui sciri
potest, an
post primū
editum fœ-
tū plures
adhuc sint
in vtero.*

*Numero-
sus conce-
ptus.*

nominata, & baptizata fuisse. *Guicciard. & Patrus in sua chirurg.*

*Causa
multipli-
cis fetus.*

Causa autem multiplicationis non sunt cellulae variae, ut Mundinus vult, sed ut recte Avicennas, est diuisio seminis in multas partes, quod fit, vel ex parte vteri, vel ex parte viri semen eijciētis.

Ex parte vteri, cum omnes vteri partes dextrae & sinistrae, superiores & inferiores auide admodum attraxerint: tunc enim si singulatim varijs vteri venis adhaerint, varij quoque conceptus fieri possunt, ut, si vera sit illa historia comitulae, probabile sit, ne dicam necessarium, tot fieri posse conceptus in vtero, quot sunt ora venarum, ad vterum pertingentium, & vnaquaque vena proprium semen attrahere, & conceptum efficere, ad maturitatem tamen perducere non possit.

Ex parte vero viti, est eiectio seminis per vias facta. Potest enim ita vicissim attrahi, sicut vicissim emittitur, ut plures fiant conceptus. At isti ad differentiam superfœtationis, siue duo, siue tres siue plures, sunt in eodem inuolucro. Et si fuerint vnus tantum sexus, sunt ambo vitales; Si vnus mas, alter femella, illa ut plurimum exstinguitur.

Prognostica.

Vtraque hæc conceptio inter deprauatas reponitur: quia siue fiat superfœtatio, seu numerosus conceptus, rarissimum est, quin exstinguatur vnus saltem ex foetibus, præterquam, quod frequenter accidit, ut etiam mater simul cum conceptibus intereat.

Curatio.

Modus occurrendi superfœtationi facilis esset, sed mulieribus minime gratus, si cum concepissent, ab ulteriori coitu abstinere. Si id facere nōlint, & potius quidvis pati, cum superfœtationis causa sit sanguinis & seminis copia, mittatur sanguis ex cubito, vtantur tenui victu: ut etiam in illis, quæ plura pariunt ob insignem vteri calorem, expedit ante conceptum vterum refrigerare illis ingenijs, de quibus est in calida intemperie.

DE MONSTRIS. Cap. XXIX.

Monstrosus dicitur conceptus, non tantum ratione numeri, quantum etiam ratione formatricis, & consequentium formationem. Dicam in primis de monstris ad formam pertinentibus, deinde vero de illis, quæ referuntur ad sequentia formam.

In prima igitur classe quædam reponitur, mea sententia, prorsus fabulosa, alia vero realia, & quotidiana experientia comprobata.

*Monstra
fabulosa.*

Fabulosa sunt monstra hippocentauri, onocentauri, minotauri &c. siue in terris, siue in mari producantur, ut Tritones, Nereides, Syrenæ &c. fabulosa hæc, inquam, omnia sunt existimanda, ut recte docuit Gal. contra Pindarum lib. 3. de vs. part. cap. 1. & ante illum Arist. lib. 4. de gener. animal. cap. 4. in princ.

Neque enim conueniunt partus tempora, neque alimēta, neque actionum perfectio, ut alia multa præteream incommoda, quæ ad hanc positionem sequuntur.

Non conueniunt partus tempora, quandoquidem homo nono ut plurimum oritur mēse, equus

A duodecimo. Præterquam quod, ut recte docuit Gal. credibile est, vel semen humanum in vtero equæ, vel equinum in vtero muliebri, aut non admitti, aut admissum corrumpi.

Sed præterea non conueniunt in alimento, nam pars humana, pane & carnibus debet nutriri, equina feno & zea. Præterquam quod equus tertio anno adolefcit, humana pars tertio anno vix pedibus stare potest, vbera adhuc sugit.

Addo ego huic monstro, neque locum esse excretionis: humana pars non habet vnde excernat, equina non haberet vnde spiraret.

Sunt itaque, ut arbitror, nugæ omnes, quæ de hippocentauris ac similibus animalibus passim proferuntur. Neque enim me mouet hac in parte Plutarchi auctoritas in conuiuio septem sapientum, qui scribit, visum esse animal simile paruulum tamen inuolutum, & a quodam adolescente gestatum: forte enim allegorice hæc dicta sunt.

Et quod etiam scriptum est in vita beati Antonij Abbatis, puto illusionem fuisse dæmonicam: nam, ut doctè scribit beatus Hieronymus Homel. 7. super caput 3. Epistolar. Pauli, non minus absurdum est, animal construere ex equo & homine, quam vitem oliuæ insertam, quæ simul vinum & oleum proferat.

His igitur fabulosis prætermis: alia sunt monstra in forma, rara quidem & admirabilia, quæ tamen pluribus experimētis, & grauissimorum scriptorum testimonijs, tanquam realia accepta sunt. In hac classe sunt Satyri, seu Fauni & Syluani infantesque orti cum capite vitulino, hædino, quandoque elephantis, cum pedibus caprinis, rostro, cornubus & alijs, de quibus omnibus abude scriptum est apud Iacobum Ruffium, Peucerum, Cornelium Gammam &c. qui horum omnium icones & tempora, in quibus prodierunt, abunde nobis descripserunt: talia igitur monstra, tametsi non visque adeo infrequentia sint, raro tamen in publicum prodeunt conspectum, eo quod vix orta magnæ ex parte ab obstetricibus aut mulieribus parui assistentibus, statim exstinguantur. Hoc habui ab obstetrice huius ciuitatis, & a nobilissima etiā muliere factum pluries, ut tempore partus in lucem prodierit animal cum rostro & alis, quod statim per conclaue euolabat, quodque statim mulieres illud venantes culcitris, vel alijs id genus tegumentis suffocabant.

D Est monstrum Cracouiæ natum, de quo Iacobus Ruffius meminit, quod adoleuit, quod puto istis fuisse similem, quorum nuper memini.

De Satyris etiam præterquam quod scriptum est in vita beati Antonij vnum ab hoc sancto in syluis visum esse, qui professus se mortalem hominem, sicuti & ceteros. Habemus quoque S. Hieronymi testimonium loc. cit. qui scribit, Alexandriæ vnum coram Constantino Imperatore viuētem productum esse, quem totus vidit populus.

Itaque cum de ipsa non sit dubitatio, quaeritur, *Causa.* quæ sit causa huius monstri conceptus. Fuerunt plerique, qui dixere, referendam esse causam in coitum humanum cum bestijs, in mixtionem seminis humani cum semine bruti, sic scriptum est a quo-

quodam anno post natum Christum 1543. visum esse infantem capite canino, ex coitu canis, cū muliere ipsa sic conficente, quæ flammis etiam simul cum cane amasio viuens, data est.

Idipsum scribit Volaterranus in commentarijs Urbanis sub Pio tertio Pontifice contigisse; quæ tamen nihilo magis mihi probantur, quam quæ de centauris proximo dicta sunt; rationes iam adduxi, quas non repetam.

Quid igitur dicendum? Aristoteles *lib. 4. de gen. animal. cap. 4.* inquit, hæc monstra, quæ oriri dicuntur capite vitulino aut hœdino, vere caput bruti non obtinere, sed tantum similitudinem cum illis habere.

Ceterum cum experientia, ut dictum est, docuerit, oriri infantes cum cornubus, cum rostris auium, cum alis & pedibus, vel auium, similiter vel capræ, non est dicendum, hæc tantum habere similitudinem. Causa igitur est indaganda.

Ut monstri vnus cuiusque pateat causa, videndum est, quamnam concurrant ad fetus productionem, & qualia esse debeant. Concurrunt autem, primo & maxime facultas formatrix, deinde instrumenta, quibus facultas illa operatur: Et hæc instrumenta partim sunt mouentia spiritualia, partim mouentia realia. Intentionalia sunt imaginatio; realia vero calor, & spiritus in semine contentus.

Concurrit præterea materia, utrumque; semen, & sanguis menstruus, quæ debent esse pura, temperata, optime elaborata.

Concurrit etiam uterus tanquam locus, qui debet esse bene conformatus, non histriatus, non tuberosus.

Cum igitur hæc & tot causæ ad formationem fetus concurrant, si fiant monstra, necesse est, aut vnâ, aut plures ex istis, aut omnes a suo naturali cursu deriuari.

Quomodo fiat monstrum. Quod pertinet ad facultatem formatricem, quicquid senserit Aristoteles, qui dixit, monstrum esse naturæ errata, certum est, facultatem formatricem nunquam errare, semper, quantum sit ex se, proprium finem consequi posse, nisi impediatur a causis instrumentarijs, materia aut loco. Et propterea monstra sunt opera naturæ, sed naturæ degenerantis a proprio fine, ut tamen fiat id, quod est melius ut fiat tale, vel tale monstrum, quam quod materia illa indigesta, & inalterata in utero maneat, quæ alioquin transit, vel in molam, vel in saxum, ut aliquando contigit.

Quod si aliquid producatur monstrum, concurrunt ad perfectionem vniuersi, præterquæ quod aliquando potest etiam proficisci ex voluntate Dei: hæc enim siue monstra dixeris, siue portenta aut prodigia, sic nominantur, eo, quod aliquid monstrant, vel portendant, vel significant. Itaque omnis error est ex parte, vel instrumentorum, vel materiarum, vel loci.

Et quod pertinet ad instrumenta, quæ, ut dixi, duo sunt, imaginatio scilicet & spiritus, vel calor; imaginatio maximam habet hac in re potestatem, ut non defuerint, qui omnem huius monstri conceptus causam in solâ eam retulerint. Sic enim re-

A fert Volaterranus in *comm. Urbanis* in loco quodam de Petra Sancta, ortum aliquando infantem pilosum, & asserere matrem nullam aliam ob causam id esse factum, quam quod tempore conceptus imaginem Diui Iohannis Baptistæ pelle lanuginoso obductam mente firmiter conceperit, & retinuerit.

Et sane si experientia demonstrat quotidiana, mulieres ex forti hac imaginatione scetus iam factum varijs notis signare, pyris, cerasis, ficibus, lacte, vino &c. quid quæso mirum est, si tempore conceptus mulier ex forti aliqua imaginatione, aut canis, aut vituli scetus capite hœdino, vel vitulino proferat?

B Quod si aliquando etiâ animo concipiant mulieres, id quod frequenter fieri potest, dæmonem turpissimum alis & rostro, pedibus bifidis, quid prohibet quo minus hæc mulier infantulum proferat cum cornubus rostro & alis? potissimum vero si materiarum dispositio accedat? accedit autem, quando semen & sanguis fuerint impura.

Nam sicuti ex hac impuritate oriuntur, pueris adhuc in utero existentibus, oblongi capilli & ungues, ita accedente huic impuritati hac imaginatione poterit scetus oriri cum alis, rostro & similibus.

Sed quod pertinet ad huiusmodi varias capitisfigurationes, quæ emulantur, vel vitulum, vel elephantem, vel quid tale, non est præter rationem arbitrari, id posse fieri ex spiritu in semine contento.

C Cupio vos videre aliquando, si non vidistis modum, quo vitra conficiuntur: nam poteritis etiam obseruare, qua ratione in utero monstri conceptus fiant: dum conficiuntur vitra, si quis spiritum nimis impellat, ita materiam illam extendet, ut & longam & latam ultra debitam formam producat. Idipsum potest fieri in utero, ubi spiritus multus reperitur, quod contingit potissimum mulieribus, quæ concipientes sunt multo vino repletæ: tunc enim ex multo illo spiritu semen usque adeo præter naturam extenditur, ut nasum producat monstrosum, qui amulabitur promuscidem elephantis.

Denique uterus etiam, qui male est conformatus, non minus potest monstrosum producere, conceptum, quam faciunt etiam exteriores formæ, ex cera aut gypso conflata, quando turpes & monstrosæ fuerint.

DE MOLA. Cap. XXX.

A Dconceptus deprauatos ratione formæ is etiam pertinet, qui a grauitate & pondere, quod infert, mola nuncupatur. Hic autem affectus a scriptoribus vario modo accipitur. Quandoquidem *Ætius lib. 16. capit. 18.* & *Paulus lib. 3. cap. 69. in princ.* arbitrantur, nihil aliud esse molam, quam inflammationem induratum, aut carnem uteri excrecentem. Alij etiam, inter quos est Alexander Benedictus, uteri hydropem molam vocant. Nos in præsentia molæ nomine carnem intelligimus, informem in utero genitam instar conceptus. Et per carnem informem, intelligimus

Quid mola.

rotundam, quandoq; tamen sphericam, aliquando oualem pisci rotundo simile, vt propterea eas omnes conceptiones, quæ sub mola nomine a scriptoribus comprehenduntur, & tamen figuratæ sunt, nos potius reponamus sub monstris iam declaratis in præcedenti capite, quam sub verò nomine mola.

Hac ratione molam illam, quam refert Lemnius lib. 1. de occult. cap. 8. instar rapacis auis, quæ infantem in vtero exsidentem exegerat, & aliam, cuius meminit Gattinaria in sua praxi, & Matthias de Gradibus lib. 2. præf. inc. de mola, quæ æmulabatur ranæ: has, inquam, omnes nos reponimus sub monstris.

Quid mola proprie Mola autem proprie accepta, caro est informis, quæ tantum vixit planta: nutritur enim & augetur: quandoq; etiam habet sensum tactus, vt dilatetur & adstringatur. Consimile descripsit Lemnius lib. 1. de occult. cap. 8. vtricæ marinæ prorsus æquiparandam: Aliæ autem omnes carnes sunt informes, quæ neq; dilatantur; neq; constriunguntur; Et, vt dixi, aliquando oblongæ, quandoq; rotundæ sūt.

Causæ. Causæ huius mola vario modo a scriptoribus sunt propositæ; Auerthoes 3. collect. cap. 29. retulit, mola causam in vitium facultatis formatricis, & quia forte intellexit, quod a nobis antea fuit explicatum, facultatem sc. formatricem non errare, inquit errorem facultatis esse, aut ex parte vteri intemperati, aut ex parte seminis & sanguinis. Quæ cū vera sint, videndum modo, vitium veteris, an sanguis & semen sint causæ mola: Auicennas sen. 2. r. lib. 3. tract. 2. capit. 19. cuius sententiæ subscribunt Gordonius parte 7. cap. 8. & auctor lib. 10. de hist. animal. (quem puto non fuisse Aristotelem, sicut etiam ante me recte arbitratus Theodorus Gaza, propter multa dogmata, quæ in eo continentur contraria legitimis dogmatib. Aristotelis) Valescus de Taranta lib. 6. Nicolaus Rochæus lib. de morb. mulieb. cap. 7. isti, inquam, omnes arbitrantur, mola causam esse mixtionem seminis muliebris, cū sanguine menstruo, non accedente semine virili.

Ceterū hæc sententia vnicā & fortissima expoditur ratione, quæ elicitur ex Aristotele lib. 4. de gen. animal. c. 7. videlicet, in viuiparismihil omnino produci posse absque maris congressu; in ouiparis res est certissima. De viuiparis cōset Aristoteles, & Gal. lib. 14. de vs. part. c. 17. ea nihil parere posse absq; maris congressu. Confirmatur experientia: neque enim vlla vnquam virgo, aut vitum non vrens, inuenta est in vtero molam continere.

Propter hanc causam minus mihi probatur Mercurialis opinio, qui putat, molam ex solo menstruo sanguine absq; vilo semine generari; eo, quod eum sit caro, possit & gigni, & eo modo augeti, quo ceteræ omnes carnes.

An mola fiat ex solo sanguine absque viri congressu. Quod enim pertinet ad hanc rem, si mola nomine intelligere velimus, omnem carneam excrementam, quocumque tandem modo fiat, profecto non inficit, aliquando ex solo sanguine hanc posse produci; Excreuit aliquando hæc caro mirandum in modum in vlceribus, qua ratione, vt dixi, Aëtius & Paulus molam dixerint excrementam carnis in vlceribus.

Aliquando etiam sunt abscessus quidam glandulosi & carnei, qui augentur & nutriuntur, ha-

berentque venas & arterias: Vidistis talem hoc mense Octobri sublatum a Monacho ad S. Iustinam librarum viginti quinque, qui in vtero etiam posset ex crescere. Sed hæc proprie non est mola: nō enim fit instar conceptus: Dictum est enim in definitione, molam esse carnem informem instar conceptus genitam.

Nam post congressum viri cum muliere supprimuntur menses, venterq; & mammae intumescunt eodem modo, quo prægnantibus.

Excrementum autem carneum, siue in vlceribus, siue per abscessus, absq; vilo viri congressu sunt.

Idcirco veram mola causam expressit Hippocr. 1. & 2. de morb. mulieb. quæ etiam repetit in lib. de sterilitate, dum inquit, tunc fieri molam, cum multus sanguis menstruus paucum aut morbosum semen virile exceperit; vt duæ tantum in immediata mola causæ, copia materiæ & infirmitas facultatis formatricis in semine virili.

Ex imbecillitate facultatis sunt quædam rudimenta ipsius fetus, formantur quædam vasa: quædam venæ & arteriæ, per quas indigesta illa moles nutritur & augetur.

Sed spiritus vitalis propter materiæ copiam & crassitiem non vndiq; diffunditur, non discurnit huc atq; illuc, vt possit & membra præcipua, singulas venas & arterias, & membranas effingere, facit tamen quod potest: Et ideo ratio Mercurialis contra hanc Hipp. sententiam nulla est, quando vt hanc rejiciat opinionem, inquit, ex morbo aut infirmo semine saltem morbosum vel infirmum aliquid debere fingi. Ego enim dico, sane morbosum effingi; nam quandoque sunt, vt dixi, rudimenta venarum & artiarum, ex quibus nutritur caro informis, aliquando illa caro recipit formam piscis, ranæ, si vis formatrix sit validior, recipit formam serpentis, aut; vno verbo facultas formatrix, dum non est prorsus extincta, nunquam otatur, & producit semper id, quod melius est.

Itaq; vera causa immediata est ista, ex qua vnus Cur solum quisque etiam statim potest intelligere, cur solæ mulieres, lieres, non autem bruta animantia molam patiant: & non causa est ex parte viri, & ex parte mulieris. Ex parte viri, quia plerunque effundunt semen infecunda molam dum propter frequentes coitus, id quod bestia non pariant, faciunt, quæ nisi habeant vasa turgida, non cōgrediuntur. Alia est ratio, quia viri cōgrediuntur interdum cum mulieribus vtero gerentibus, quo tempore propter oris vteri angustiam semen in modica quantitate recipitur; & ideo a sanguine confluente suffocatur. Et hinc fit, vt nō raro sint mulieres prægnantes, quæ molas simul cum fetu pariant. Alia causa est ex parte mulieris, quam tetigit Arist. 1. 4. de gen. animal. c. 7. & est menstruum copia: huiusmodi sanguinis menstrui copia facile semen potest suffocare, idque potissimum contingit, quando quispiam vtatur coitu, vel cum muliere menstruatâ, vel tempore mensium imminuentium: nam aut sunt mola, aut filij tardi & stupidi, ad omnia inepti, qui vt Lem. 1. de ocul. cap. 8. inquit, vocantur quarta luna nati, quia scil. concipiuntur tempore menstruum purgationis.

Huiusmodi mola non facile cognoscitur: Dicitur signa. bat Hipp. lib. 1. de morb. mul. cognosci molam, si 4.

S mense

Veracausa immediata.

menſe nullus ſentiat motus: Eſt tamen fallax ſignum: nam in mola ſtatus multi in vtero generantur, qui mouent vterum, ſalſiq; conceptus formam referunt. Addebat Hip. mammæ intumeſcere, ſed hæc non producere, poteſtis vos alia adijcere, nempe ventris frigiditatem, facta comparatione cum ſœtu viuo.

Adhæc vbi mulieres in latus vertuntur, cadit mola in illam partem quaſi lapis, & ſi ambulant, maximum ſentiunt pondus, os vteri non ita clauditur, ſicut in vtero conceptu, & quarto aut quinto menſe, quo prægnantes melius habere ſolent, molam habentes in deterius labuntur, extenuantur, ſiunt decoloratæ, crura gracileſcunt, ſtatus & humiditates ex vtero erumpunt, vt propterea hic affectus tagdem in hydropem ſoleat deſinere.

Prognoflica. Eſt affectus valde periculofus: nam vbi ſecundum annum attigerit, ſi tunc excernatur, cum vitæ periculo excernitur, propter inſignem ſanguinis eſuſionem, aliquando tamen retinetur in vtero vltra quartum, quintum, decimum, aut duodecimum annum, ita vt tandem indureſcat & lapideſcat.

Quare interdum tam diu retineatur mola in vtero. Si quis quaerat, quare tam diu in vtero retineatur? Scribit Ariſt. *l. 4. de gen. anim. c. 47.* id fieri, quia natura tentat elaborare & perficere id, quod imperfe-ctum eſt. Sed reuera hæc ſententia non probatur: nam vbi ſœtum non elaborauit facultas formatrix, vſq; ad tertium meſem, neq; elaborat, vſq; ad ſextum vel vltra.

Itaq; dixerim ego, non eiſci hæc molam, quia eſt fortiter acerbulis vteri alligata, ſicut ſi firmiter etiã abſceſſus carnei partibus alligantur, quibus adhærent. Et ideo ab initio huiusmodi mola ſiunt ex infirmitate caloris, vt recte docuit *l. 6. Ariſt. progreſſu a tēporis*, quando indurantur & exſiccantur, cedit calor, ſimul tamen, vt ego puto, cum facultate formatricæ offiſica. Nam in ſemine illo virili, adeſt omnis facultas apta ad producendas partes ſimilares: Inter ceteras eſt offiſica, in principio ſœtus offa ſunt mollia, & ideo ſi mola excernatur ante annū, erit caro mollis, vbi iam diu moratur in vtero, etiã ſi offa non figurentur, nihilominus exiſtente facultates offiſica induratur illa materia, & eo magis induratur, quia a calore partes etiam tenuiores digeruntur. Hinc fit, vt mola difficile, & cum vitæ periculo excerni poſſit.

Deprauatio ſexus. Inter deprauatos conceptus illi etiam ſunt, qui pertinent ad ſexum & effigiem; Ad ſexum quidem dupliciter; primo, quando oriuntur infantes vtroq; ſexu donati, quos Androgynos appellant; ſecundo, quando mulieres, aut, vt melius dicam, ſœmellæ in nubili græte ſexū mutant, & in viros mutantur, prodi-gioſū hoc quoq; & portentofum hoc exiſtimatur.

Quod ad primum, non poteſt cauſſa intelligi, niſi primum cauſſam habeamus ſimplicis ſexus, tam masculini, quam ſœmini. Et cauſſa vario etiã modo a varijs eſt propoſita.

Non accipio Empedoclis ſententiam, qui putauit. Mare ex calidiori, ſeminas ex frigidiori fieri temperamento, eo quod viri ſint vere calidiores mulieribus.

Nec admitto Anaxagoris placitum a pluribus receptum, mares in dextro vteri ſinu, ſeminas vero in ſiniſtro ſemper gigni. Huius ſententiæ falſitatē varijs brutorum ſectionibus redarguit Ariſt. *lib. 4. de hiſt. animal. cap. 1.*

A Nec tamen placet etiã Ariſt. *loc. cit.* quæ videtur quoq; fuiſſe *Gal. lib. 4. de vſ. part. cap. 17.* mares ſc. primo, & per ſe a facultate formatricæ productos eſſe, ſeminas autem extra inſtitutum & propoſitū, quaſi appendicem, opus minime ordinatum, ſed caſu creatum. Falſa ſane ſententia. Quæ enim caſu ſiunt, rara ſunt, indecenſque eſt affirmare hominem ex caſuali re produci.

Andreas Laurentius Hippoc. ſententiam accipit *l. 1. de dieta* deſcriptam, ſc. tam in ſemineo, quã maſculo ſemine inſitam eſſe facultatem formatricem, & maris, & ſœminæ: vt propterea ſi vtrumq; ſemen habeat facultatem maſculam præualetem, ſiunt heroes. Si tantum virile ſemen habeat maſculinam præualetem, ſiunt quidem omnes fortes, ſed illis inferiores. Si præualeat maſcula in ſemine tantum ſœmineo, ſiunt viri effœminati. Contra ſi ſœmineū præualeat in vtroq; ſiunt mulieres heroicæ. Si præualeat in virili, ſiunt viragines, quæ velint prædominari maritis. Si tantum in muliebri, tunc ſiunt mulieres imbecilles, timidæ.

Hæc ſententia, quamvis docte expreſſa, non tamen explicat, quid ſit maſculum & ſœmineum reconditum, nec ex qua fiat cauſſa.

Idcirco ego tandem nullam inuenio ſententiã, quæ mihi magis placeat, quam Democriti reſutata, quidē ab Ariſt. *li. 4. de hiſt. animal. cap. 1.* ſc. in ſemine virili ineſſe facultatem generandi mares, in ſœmineo vero generandi ſeminas, hanc facultatē, ait ipſe, obtinent illa ſemina, eo quod aliqua parte decidunt ex huiusmodi membris genitalibus.

C Illa igitur ſeminis pars, quæ ſecedit ab vtero, habet inſitam facultatem formandi ſibi ſimile, & conſequenter ſingendi ſœminam, vt ſemen virile procreandi ſimile. Ergo vbi præualeat facultas maſculi, ſit mas, ſecus, vbi ſœminæ.

Placet mihi hæc ſententia, quia cauſſam habet rationabilem, & quia poteſt etiam cauſſam reddere, propter quam ſimiles in ſexu ſunt diſſimiles in facie aut moribus.

Nā poteſt fieri, vt ſemen ad faciendū ſexum præualeat quidē, ſed in ceteris partibus præualebit ſemen alterius. Ergo poterit infans in ſexu ſimilis patri, in carnis mollitie & moribus matri ſimilis eſſe.

Negandum tamen non eſt ad maſculeitatem ad ſœmineitatem concurrere etiam locum, materiam, calorem, mulieris imaginationem: quāto enim calor erit maior, eo facilior mas formabitur, vt præcipue in ſinu dextro, qui calidior eſt ſiniſtro, tunc etiam facilius, cum ſuppetat materia ad formandam penis magnitudinem: & ſi mulier maſculi imaginem fortiter imprimat.

D Ex dictis patent cauſſæ Hermaphroditarū, tunc enim generantur tales; primo, quando ſuppetit materia ad generanda membra virilia & ſœminea, quæ tamen ſunt in triplici differentia: nam aliquando ſexus maſculus præualeat ſœmineo, ita vt eo cōmode vtantur, ſœmineo nequaquam: alia quæ vtuntur ſœmineo, maſculo inepti: quadam quæ cōmode neutro, quod ſcribit ſe vidiffe *Columbus lib. 1. 5.* Quidam ponunt quartum modum, eorum ſcil. qui vtraq; parte æque valent. Sed hoc rarū ac inuentu difficile eſt. Fiunt ergo, vt dixi, ſi materia ſuppetat; Item ſi facultas vtraq; in vtroq; ſemine cōtēta tā-

cum

Cur quidā diſſimiles in ſexu ſiunt ſimiles in facie aut moribus.

Cauſſa Hermaphroditarū.

rum possit, ut utraque proprium constituat sexum.

Sexus mutatio. Sed quod pertinet ad sexus mutationem, hanc sane rem ego fabulosam existimasse, nisi viderē, illam tot egregijs scriptoribus comprobata: Primo Plinio l. 6. c. 4. Pontano l. 10. de reb. celest. Volaterrano in com. Urban. Julio Alexandrino de salubrib. c. 14. Amato Lusitano cēt. 3. sur. 39. qui omnes atq; alij plurimi cum ijs testantur, puellas nuptui iā datas inter tripudia pudendum emisisse, & ex feminis in viros transisse. Quæ si vera sunt, nulla alia est causa, quā facultas formatrix sopita, quæ tamē aliquando insurgit. Nam sicut dētes in vtero matris incoantur, extra vero perficiuntur, ut docuit Bartholomæus Eustachius, ut etiam anno 39. & vltius dentes sapientiæ dicti generantur, quorū duo mihi orti anno 34. fieri potest, ut factō genitalium viriliū in vtero exordio, facultas hæc paulatim perficiatur & tempore sponsalium, quo sanguis & calor vehementer mouetur, mentēla prodeat. ¶ Quārum ad effigiem, monstra in effigie dicuntur, quæ nō modo æmulantur faciem canis, leporis, vituli &c. sed sūt et omnino parentibus dissimilia, nec dissimilia tantum in effigie, sed etiam in affectibus & moribus.

Causa etiam istorum cognosci nō potest, nisi duo primum cognoscantur, quæ attinent ad causā similitudinis in apparētib; primo in quo cōsistat effigies, secundo quæ sit causa mutationis effigiei.

Quod ad primum, effigies nō modo cōsistit in ijs, quæ necessario accidunt corporibus, verum etiā in consequentibus temperamenta. Accidunt autem corporibus magnitudo, positio, numerus, & figura seu conformatio.

Necessario accidunt colores, mollities, durities, &c. Ergo causa similitudinis, aut dissimilitudinis tota pēdet ex mutatione figuræ, situs partium, magnitudinis, numeri, coloris, duritiei & mollitiei.

Cum effigies in magnitudine, numero, figura, & alijs accidentibus enumeratis sit posita, consequenter monstrorū effigiei causæ sunt illæ, quæ ad huiusmodi magnitudinem, situm, figuram, numerū atque accidentia permutanda conferunt. Sunt autem hæc materia, locus, facultas formatrix, calor & spiritus, tum imaginatio.

Omitto in præsentia astrologorum opinionem, quæ monstrorum causam, vel aspectibus, vel signis celestibus tribuerint, tanquam omnium leuissimam, & satis a doctis refutatam.

Ergo quod attinet ad materiam, monstra faciet, siue superabundet, siue deficiat, mollior, duriorq; fuerit, quam expediat.

Ob materiam. Nam ex multitudine, vel sunt monstra in magnitudine aucta, seu secundum totum corpus, ut gigantes; vel secundum caput, ut hydrocephali: seu secundum vnam capitis partem, nasum scilicet oculos, aures, aut alia denique corporis partes.

II. Fiunt etiam monstra in numero, quando quispiā habet 6. digitos duplicem manum aut pedē, quatuor crura aut brachia, duplex caput. Albertus Magnus scribit, ortum esse monstrum, cum undecim linguis & oculis.

III. Ex defectum materiæ pariter fiunt monstra in magnitudine imminuta, vel in numero deficiente. Magnitudo imminuta secundū totum in pygmæis, quorum vnus iam annos 10. per totam fertur Ita;

liam in parua capsula, cuius nulla alia pars videretur nisi magnum caput, vocemque emittit admodum sonoram, vel secundum partem, ut quibus, vel inanus, vel pedes iusto sunt breuiore. In numero autem, quando deficit manus, aut digitus, aut oculus, aut pes, &c.

Fiunt vero monstra ex mollitie, aut duritie materiæ, quia materia nimium mollis, laxa aut fluida est in causa, ut meatus omnes iusto ampliores reddantur, ut præterea quæ recta esse debent, incuruantur & flectantur, id, quod in varijs cōtingit. Vbi vero durior, membra & meatus constrictos & angustos reddit, ut hinc nascantur filij, aliquando auribus, ore, ano, vulua aut orificio penis imperuij seu imperforati. Ex parte itaque materiæ tot fiūt mōstra.

Quod pertinet ad locum, monstrorū fiunt effigies, si contingat, vterum vel a natura, vel ex tumore aut causa extranea illum fortiter comprimente perperam figurari, esse nimis rumosum, stryatum, conchylatum, aliaq; simili figura donatū: ut enim in æneis, aut lapideis formis, talis est effigies, qualis est forma, in quam funduntur; ita etiam in vtero, talis plerunq; sit effigies, qualis erit vteri forma.

Inter externas causas repono morbos, qui pueris contingunt adhuc in vtero degentibus: laborant enim infantes non minus in vtero atque nos, ut febribus, affectibus capitis, thoracis &c. ex quibus fiunt fatui, surdi, cæci, muti, gibbi, claudi &c.

Prodeunt quoque monstra ex facultate formatrice; nam si quidam morbi hereditarij, ut reuera sunt, non possunt ex alia fieri causa, quam ex ea seminis formatrice facultate, quæ morbosam suscipit qualitatem a parentibus. Hinc plerunq; fatui a fatuis, surdi a surdis, cæci a cæcis, phthistici a phthisticis &c. excitantur.

Quinimo nati quo & stigmata patrum & avorum in filios inferuntur, manique ex matris ut plurimum generantur.

Hæc omnia pertinent ad seminalem substantiā, in qua residet formatrix.

Sed dicet quispiam, si morboſi ex morboſis fiūt, si nati ex natis, ergo ex omnibus partibus decidit semen, quæ tamen sententia nec accipitur ab Hippocrate nec rationi consona est? Hippocrates hac in re varius esse videtur: aliquando in libro de aere, aquis & locis, & de genitura videtur velle semen ex omnibus partibus corporis decidere, partim ob dictā causam, partim ex delectatione, quæ circa vniuersum corpus est, partim ex dissolutione: aliquando in libro de genitura, & in lib. de off. natura videtur voluisse ex capite tantum de fluere: inquit enim defluere semen per venas iugulares: confirmatur ex caluitie, quod illis potissimum superuenit, qui immoderata vtuntur Venere, exsiccatō scilicet cerebro & recedente a cranio. Confirmatur etiam liuore & cauitate oculorum, quæ succedunt coitum, præterquam quod scribit lib. de aere &c. macrocephalos ex macrocephalis ortos nō ob aliam causam, quā ob seminis ex capite recedentis facultatem.

Omissa hæc in parte Auic. sententia, qui putat ex tribus præcipue locis semen decidere, puto rei veritatem esse, semen immediate ex vasis seminarijs & testibus tantum effluere.

I. Causas autem semē generantes, partim ex mēbris

IV.

Ob locum.

Ob formatricem.

An & quomodo semen ex omnibus partibus decidat.

bris præcipuis, partim etiam ex alijs, quæ non sunt præcipue, originem sumere. Ex membris præcipuis fuit in testes & vasa seminaria spiritus animalis, vitalis, naturalis. Si datur ex alijs, non quidem omnibus numero, sed omnibus in specie, decidit materia tanquam excrementum inutile ratione quantitatis, quæ est materia seminis. Dico hanc materiam decidere ex omnibus partibus nõ numero, sed specie, quia cum necessariũ sit ex determinato fieri determinatum: nec enim statuarius facit statuum lapideam ex cera; Ita etiam ad formationem singularium partium simularium, ossium, venarum, necessarium est, determinatã in semine materiã reperiri, in quam decenter agat facultas formatrix, quæ materia alio modo non redditur determinata, nisi quãdo ad has partes similes accesserit, & aliã ab his qualitatibus susceperit, & tandem tanquam superabundans expellatur ad vasa seminaria.

Hoc stante patet causa, cur manci ex mancis, claudi ex claudis, &c. generentur, aliquando etiam non: nec enim est perpetuum, sed ut plurimum.

Contingit autem quando materia seminis decidat ab ea parte, quæ m̃ca est, & quia ubi pars corporis deficit, ibi alimentum magis abundat, hinc fit ut facilius pars mutilata mittat materiam ad vasa seminalia, quam pars non mutilata, hinc etiam frequentissime morborum ex morborum oriuntur.

Quod si contingat ut in mutilatis materia decidat ex alia parte simili in specie, quæ tamen sit sana, infans ille poterit esse sanus, quanquam parens fuerit morbosus. Hæc obiter de loco.

Ob calorem, & spiritum. Rediens ad propositum, ex facultate, ut dicebã, formatrice fiunt monstra hoc modo.

Quod vero pertinet ad calorem & spiritum, hic quoque varia producit monstra in magnitudine, figura, situ: ubi enim calor & spiritus vehementer agunt in materiam feminalem, dilatant illam, extendunt, fundunt, loco etiam movent, ut variz oriator figuræ etiam monstruæ, apũssimum habetis exemplum in arte vitriaria desumptum. Materia a vitri est valde similis materiæ seminali: ut ergo spiritus impulsus per fistulam ferream, in materiam vitri extensam, super lapidem varias efficit figuras, & si fortiter impellat, facit monstruosas; ita calor & spiritus in semine inclusus, ubi præter modũ agit, varias facit monstruosas figuras, quæ non minus contingunt, quãdo hic etiam nimium extinctus, sopitus, aut suffocatus fuerit.

Ob imaginationem. Denique fiunt monstra ex imaginatione, quod potest probari, & ratione, & experientia: Ratione quidem; nam si mulier vtero gerens ex imaginatione potest alicuius expeditæ rei formam & imaginem ad vnguem seculi imprimere, ut hæc ratione videantur infantes cum maculis ficus, lactis, cum prunis, carne suilla &c. nascentes; poterit etiã tempore conceptionis talem reddere infantis effigiem, qualis erit imaginatio vel mulieris concipientis, vel viri excrementis Venerem.

Nec quis obijciat, diuersam esse rationem, quãdo quidem ideo imprimantur imagines in seculo, quod summo opere illa desiderantur; nulla autẽ est mulier, quæ, etiam si monstruosam imaginetur effi-

giem, illam expetat, imo abhorrebit. Nullius momenti est hæc obiectio. Tamen si enim verum sit ad imprimendam imaginem in seculo formato opus esse ingenti desiderio; nihilominus ad faciendam effigiem tempore conceptionis non est necessario, quia ad faciendam conceptionem, vel potius ad faciendam effigiem in seculo non concurrunt multum temporis: ubi enim rem habet cum viro, si imago illa monstruosa versetur in mente, & tum fiat conceptio, concipietur etiam illa imago.

Ad imprimendam imaginem seculi iam facti, necessarium est primum imprimi in spiritum, secundo in sanguinem, qui accedit ad nutritionem fœtus: ita, ut si desistat desiderium, quanquam aderit imaginatio, non signabitur fœtus.

Si quispiam querat, quare potius una pars signetur quam alia? Nõ hoc fit ex simplici tactu, ut plerique putant, sunt nugæ: Quædam enim mulieres, dum vehementer rem expeteret, voluerunt Medicos decipere, tamen oriebatur imago in altera parte. Itaq; causa, cur potius in una, quam altera parte signetur, est imago partis, ubi fortiter desiderat rem aliquam: veretur enim ne in una vel altera parte signetur fœtus. Ergo aliquando volunt unã, aliquando alteram partem: illa vero signatur, quæ fortius in mente imprimitur, & hoc est experientia observatum: Propter hanc causam scribit Cornelius Gamma lib. de admirandis spectacul. mulierem prægnantem, quæ fugiebat virum, qui gladio illam in capite tentaret, enixam esse puerum cum maximo vulnere capitis, cuius causa nulla alia fuit, quã fortis imaginatio periculi.

C Sed redeamus ad rem. Ex imaginatione fiunt huiusmodi stigmata in corpore. Ergo etiam inenstruosæ imaginationes. Confirmat Levinus Lemnius lib. 1. de occult. ca. 4. ubi scribit mulierem prægnantem, quæ summa cum admiratione quendam est intuita magnum habentem caput, puerum peperisse cum magno capite.

Habetis etiam historiam apud Aristotelem lib. 7. de hist. animal. cap. 6. qui scribit, mulierem albã ex Æthyope concepisse Æthyopem filium.

In eundẽ sensum scribit D. Hieronymus in quaestione super Hippocratem, mulierem a calumnia vindicasse, quæ ex albo parente filium Æthyopem susceperat ex pictura in thalamo existente; quod etiam Quintilianum & Alcibiadẽ fecisse legimus. Dicit etiam Augustinus lib. de civitate Dei, cap. 30. rationi dicit consentaneam esse historiam in Genesi de ouibus albis & variegatis, quæ oriebantur ex industria Iacobi.

Et denique propter hanc causam in niuosis montibus reperiuntur coruines alba, & pavones, & vulpes, & alia animalia alba, non propter aliam causam, quam imaginationem. Ex hac ergo causis possunt fieri monstra, ut diximus.

Restaret quidem iam altera pars huius tractatus, de partu scil. (huc usque enim de conceptione imminuta, abolita & deprauata dictum est) Verũ quia mulieres ad huius curationem raro Medici operam vtuntur, hic peristimus, & ita huic tractatui finem imponimus.

Quare potius una pars in seculo signetur quã alia.

HERCVLIS SAXONIAE

Patauini Professoris Medici Primarij.

DE FEBRIBVS.



P R O O E M I V M.

Exordium



Inter dona, quæ Deus, & Natura mortalibus elargita sunt, nihil calore præstantius reperiuntur. non meo duntaxati ipsius testimonio, sed recentiorum, & antiquorum placitis sic testificatum est,

vt non egeat probatione.

Est enim Calor omnium rerum natura, anima substantia, & potentia vitalis essentia, omnia recipit, fouet, perficit, tuetur.

Vegetali autem calore Mixta habent suum esse, plantæ vitam recipiunt, animalia motus; per calorem principes facultates exacuuntur, artes seruantur, mortalia cælestibus coniunguntur: sine calore omnia marcescunt. Huius moderantia Sanitas, immoderantia Morbus dicitur, in corde, & in vniuerso corpore Febris, de qua præsentis anni dicturus sum.

Est sanè speculatio omnium nobilissima, utpote de affectibus partis nobilissimæ verba faciens, omnes difficultates, & quæstiones declarabo circa genus, causas, differentias, signa, curationem.

Est omnino necessaria. Fuit enim doctissimorum sententia, nullum esse grauem morbum, qui febre careat, vel cum ea non copuletur.

De hac igitur tam necessaria materia ego disputaturus, meas partes esse scio omne studium, laborem, diligentiam præstare. ad vos pertinebit frequentia, assiduitas, exercitatio.

Vt meum impleam munus, præter publica in priuatis locupletissimum etiam tractatum vobis communicauimus de Signis & Symptomatibus putridarum: pro viribus etiam enitar, vt quæ publicè & priuatum docuero, in vsum vestrum transferam.

Ordo tractationis

Ordo tractationis erit ab vniuersalibus ad particularia. Circa vniuersalia quidem Nomen, Differentias febris. Circa particularia, primò de Ephemeræ, secundo de Putridæ, tertio, de pestilenti, quarto de hæctica, quinto de compositis agam.

Ordo & ratio ordinis ex Auicenna desumpta sunt. Voluit simpliciores primò ceteris

anteponere, quæ sūt Ephemeræ, propterea de his primo agit: succedunt Hæctica, vt Gal. lib. 10. Meth. med. de his ante putridas egerit. Verum Galenus non ad facilitatem modò, sed etiam simplicitatem perspexit.

His pestilentes superueniunt, quæ quadam ratione inter compositas numerari possunt.

Vltimo loco succedunt compositæ. Vtar opera Auicennæ nostri, ita vt neque Hippoc. neque Gal. nec reliquorum Arabum recentiorumque placita prætermittam. Propterea quod ad Gal. legatis illum lib. j. ad Glauc. lib. 2. de diff. feb. & lib. 2. de cris. quinque libros gant.

Meth. ab 8. vsque ad 12. Ex his etenim locis & Epidemicis accidētibus, prognosticis, morborum temporibus, vniuersam doctrinam de febribus inuenietis.

Non improbo quoque vt legatis Auicennæ interpretes, vt pote Gentilem, Arculanum, Nicolum Florent. Consulo tamen, vt ab illis Quæstionibus abstineatis; neque existimo recentiores propria laude fraudandos: Trincauellij in 2. lib. de diff. febr. doctas existimo annotationes Iulij Alexad. in 1. ad Glauc. obseruat. Foresti. Quod ad Holler. Vidium Vidium, Pisonem, &c. omnes per otium legantur. His prælibatis venio ad rem ipsam.

De Febribus in Genere.

Cap. I.



St sermo de febribus. Febres ab Auic. inter Morbos non Appropriatos collocantur. Vocantur affectus appropriatos illos, qui ita vnam partem afficiunt, vt læsio in illa tantum parte contingat. Morbi ergo in aliquibus non sunt appropriati, sed ita vocantur, quod a propriata partu contingant. Quod id sit verum, annis elapsis in plerisque affectibus didicistis. Itaque, vt dixi, omnis morbus non ex sua natura appropriatus dicitur, sed si determinatam obsidet partem, sic nominatur, vt Epilepsia, Conuulsio, &c. ex Parte læsa, non Causa lædente; Propterea

Quid morbi appropriati.

A rca

rea Auic. in lib. 4. de morb. non appropriatis verba facit, & dicitur in septē Fen. In 1. Sermo est de febre tam in genere, quam in specie, tāquam morbo communi in uerso corpore; in 2. de Signis; in 7. de Apostematibus; in 4. de ulceribus, & vulneribus; in 5. de Dislocationibus, & Fracturis; in 6. de Venenis; in 7. (que non est inter medicinae partes connumeranda) de Decoratione.

Derivatio nominis. Venio ad primam Fen. & primum caput, in quo proponit primum Definitionem Febris, quę Latinis à feruore denominatur, Grecis πυρετός à πῦρ, quod ignem significat.

Definitio Definitur à varijs, nihilominus nulla est magis integra, quā Auicenna, cum inquit;

Definitio nis explicatio. Febris est calor extraneus accēsus in corde, & procedens ab eo, &c. In hac Definitione duo præcipuē Causarum genera cōprehenduntur; Formalis siue Genus Febris. formalis Subiectum.

Loco generis omnia extant, genus hoc totum est. Febris est calor extraneus inflammatus, qui lædit actiones. Hæc omnia sunt loco Generis, reliqua loco Subiecti.

Dicitur Calor, ad differentiam morborum in compositione mala, & soluta unitate. Distinguitur etiam ab alijs morbis in Intemperie. Itaque est calor; sed quia Calor alius est Natiuus, alius extraneus; subdit non esse calorem natium, sed extraneum.

Quid nomine extranei caloris intelligendum. Dubium est apud Medicos, quid nomine extranei intelligendum; quia possumus nomine extranei intelligere extraneitatem caloris, hoc est proprietatem caloris aduersam proprietati caloris natui, scilicet calorem, qui habet proprietatem occultam aduersam calido innato; aut possumus intelligere augmentum caloris in gradu. Nicolaus & illius sequaces utrumque esse intelligendum affirmant: minimè autem conceditur. primò quia si sic, sequeretur omnem febrem esse pestilentem; accedit quod huiusmodi calor extraneus sufficit ad lædēdas actiones nostri corporis. Est itaque calor extraneus calor immodicus aut supra naturalem statum. Sed quia datur huiusmodi calor immodicus etiā in temperamento naturali. Quia alij sunt alijs calidiores corde, quidam etiam patiuntur intemperiem natuiam calidam, ut iuuenes; Ideo ut Auic. contra distingueret à morbo, addit extraneū mutare Actiones Naturales. Nominē naturalium intelligit nō solum illos quatuor, Attractionē, Retentionem, Alterationem, & Expulsionem; sed omnes actiones homini consuetas siue procedunt ex intemperatura naturali, siue ab alio statum ac mutatur, sic dicuntur.

Quid calor extraneus.

###

Sed quia huiusmodi calor auctus aliquando mutatur ex causa non naturali, aliquando ex causa præter naturam. Ex non naturali; ut sunt ira, motus nimius, balneum vini potio, nimius cibus, &c. Auic. vidit hanc mutationem, & ideo rectè inquit febrem esse calo-

rem extraneum.

Hinc colligitur, non refert, siue dicatis esse hunc calorem immodicum, vel præter naturam, vel contrarium naturali, vel intemperiem calidam.

Ex quo constat, huiusmodi calorem esse quidem, non tamen in fieri, sed in tacto esse.

Volo etiam vos colligere, nomine caliditatis nos nō intelligere Substantiam calidam, ut nonnulli existimant, sed potius Qualitatē, quia est sermo de morbo; substantia autem non est morbus; qualitas verò est morbus.

Est dubium hac in parte, numquid febris sit Intemperies simplex, an composita; Alij dicunt esse simplicem, & calidam tantum, eiusque testem citant Gal. lib. de diff. morb. cap. 5. alij simplicem siccam tantum, non calidam. Quod Hipp. sec. 1. aph. 16. victum humidum febricitantibus conuenire scribat, nulla ætatis ratione habita. Paucis. Febris si consideretur, est intemperies calida & sicca; propterea composita. Sed si consideretur ratione subiecti, sunt aliquando calida, frigida, humida, ut Epiala.

Ad Hipp. auctoritatem quod attinet, existimo illum loqui ibi de victu, & præscribere victum liquidum, potulentum, qui facile dissoluantur; non dicere de medicamento, quod febris, ut febris est, opponatur.

Quod ad reliquas quaestiones, habebitis solutionem ab excellentissimis Theoricis.

Haecenus ergo intellexistis febrem esse calorem præter naturam, & propterea lædere actiones; actiones autem, quæ læduntur sunt primo & per se Vitales, Subinde etiam Naturales, & Animales.

Et si querat quispiam, qualis sit læsio, Deprauata ne, an Ablata? Dico primò & per se actiones deprauari; ex accidente aliquando minui, aliquando tolli. Declaro, febris est calor; à calore actiones deprauantur, ideo necessarium, ut omnes actiones ab hac tanquam immediata causa deprauentur. Pulsus fiunt frequentiores, &c. incidunt vigilæ, deliria, vires fiunt moraces, coloratiores. Ex accidenti possunt imminui, aliquando tolli.

Primum imminuantur, quia hic calor præter naturam calori natui est aduersarius; depascitur pabulum caloris natui: si sic, necessario calor natui deficit; hinc infirmæ fiunt omnes actiones.

Alio etiam modo debilitantur: quando scilicet hic calor præter naturam mouet, & fundit varios humores in corpore existentes; si pituitosi in caput ruant, solent fieri comata, stupores, &c.

Sed aliquando, ut dixi, ex accidente nonnulla vitia corriguntur. propterea Hip. aph. 40. dolorem hypochondriorum absque inflammatione incidentem à febre superueniente solui inquit. cuius rationem adducit Gal. in com. sic igitur læduntur actiones à calore febrili.

Haecenus

Haecenus de Genere febris. Transeo ad **A**rum uocarunt aereum, insitum, influentem; calestem, aqueum, &c.

subiectū febris. Duo causarum genera in Definitione Febris proposita continentur, formalis seu genus & Materialis seu subiectum. De genere dictum, succedit subiectum. Febris Subiectū ex Auic. sententia & reliquorum duplex est, primum Principale; alterum Adæquatum.

Principale est cor. Adæquatum est totum corpus. Nomine autem vniuersi corporis intelligere oportet vniuersum corpus, simul cum corde, teste Gal. lib. de mor. caus. cap. 2. Et propterea quantumuis ager ex nimia exercitatione, aut insolatu caluerit, nisi ad cor penenerit, febris non dicitur.

Febris non necessario totius corporis affectus. Hæc communis sententia videtur corrigenda, ut scilicet dicamus, febrem primò & per se esse cordis passionem: ex Accidente non necessario totius corporis. Ratio: quia ideo febris est passio totius corporis, quia cor est fons spiritus & caloris, & hic per venas & arterias in vniuersū corpus distribuitur. si non posset distribui, esset febris, neque tamen peringeret ad vniuersum corpus. hinc fit ut aliquando febres reperiātur absque vniuersi corporis caliditate, ut in febribus Epialis manifestum est. in 6. Epid. 29. ibi docet febrem quidem passionem cordis primario, per accidens tamen & in reliquis partibus nonnunquam accendi.

Ideo si eōtingat circa arterias & venas humores frigidos obstruentes reperi, nō necessario totum corpus incalescit, itaque ex accidenti contingit.

Hæc igitur videntur satis ad explicandam subiecti naturam, cum tamen nō sufficiant: non est cor & totum corpus subiectum febris immediatum, est illud idem, quod est subiectum calidi innati, Gal. sect. 4. aph. com. 14. febris nihil aliud est quam conuersio naturæ caliditatis in igneam.

Proximum Subiectum naturæ caliditatis est Spiritus, Humor, Solida substantia. Nomine solidæ substantiæ intelligo carneam & feminalem. Hoc dico proter Gal. qui libro 11. meth. c. 13. carneam uidetur à solida substantia secernere.

Hæc igitur tria sunt subiectum immediatum caloris natiui, & consequenter febris.

Subiectū calidi innati. Hæc tria pro eorū diuersitate constituunt etiam variam caliditatem innatā, ut influēs. Insita itaque duplex, insita producta ex materia seminali sanguinea constituen e partem ipsam solidam; alter calor qui positus est in spiritu & sanguine, influens dicitur.

Datur tertius mixtus ex primò & secūdo, ut patet ex Gal. lib. 3. de simpl. med. fac. c. 9.

Huiusmodi calor influens semper in partibus determinatis aliqua ratione cōtinetur, in hunc usum, ut augeat calorem istum insitum, qui postea est autor omnium actionū; propterea Medici uaria excogitarūt natiui caloris nomina, propter uarietate subiecto-

Hæc omnia ad pauca rediguntur. Vocant elementarem, quia cōstat ex elementis, ex semine, sanguine; semen & sanguis componitur ex elementis: dicitur genuinus in pueris, sect. 1. aph. 14; ascititius in adultis, &c. calestis quatenus est autor omnium operum, quæ in humano corpore sunt.

Hæc habita distinctione, conciliabitur varias quæstiones apud illos quæstionarios. Disputat, quinam istorum sit calor febrilis, qualis calor in febribus immutetur. Rei ueritas est omnem hunc calorem aliquando murari posse in calorem præter naturam. **B** Ratio: tria sunt tantum prima subiecta quæ aliquando mutantur in calefacto esse, & tunc potestis dicere mutatum esse calorem natiuum in igneum, &c.

Quod si aliquis tantum ex caloribus mutatur ratione sui subiecti, ut in Ephemeris, potestis dicere, unum tantum calorem esse mutatum, scilicet influentem. Præterea, cum etiam quærent Medici, nūquid in febre reperiatur vnus, an plures calores, & qui isti? Dico in heclicis unicum esse calorem eumque præter naturam, igneum. naturalis enim in igneum est mutatus.

Si sermo sit de Ephemeris, dico duos esse calores: vnum igneū positum in spiritu ipso: alterum naturalem, qui adhuc seruetur in partibus solidis. In putridis tres sunt calores: primus in ipsis cordis humoribus mutatus in igneum. Secundus partium solidarū adhuc immutatus. Tertius in loco putredinis.

Hæc est doctrina Gal. lib. de inaq. intemp. cap. 1. & 5. clarius sect. 4. aphor. 37. ibi manifestissime scribit Gal. In febribus putridis, & malignis, ubi sudores frigidi, signum potissimum esse, clarius est com. 2. in 1. epid. text. 46.

Sed hic duæ maximæ insurgunt dubitationes. Prima, contra primam resolutionem, ad febrem heclicam. Secunda ad putridas, **Dubia.**

Diximus in febre heclica esse unicum calorem, illumque præter naturam, qui fieri possit in hac seruetur uita? Respondetur dupliciter, primo ex Gal. lib. 1. de diff. feb. c. 9. ex distinctione febrium heclicarum. nam scribit ibidem, febres heclicas alias esse primi gradus, alias secundæ & tertiæ speciei, quæ postrema Marasmus dicitur.

Dico igitur in febribus heclicis primæ speciei torridam humiditatem habere quidem calorem hunc mutatum, sed non mutatum adhuc in summo. Itaque cum actiones prodeant à parte solida seminali, sit ut actiones naturales seruari possint.

Dicet quis, quid dices de marasmo? Respondet Galen. libro 1. de temp. capit. 3. in temperiem aut esse paruam, aut mediocrem, aut magnam. Parua potest referri ad sanitatem.

Hac proposita distinctione dico in miasmaticis esse mediocrem; si est maxima, primum mors succedit.

Secunda instantia contra secundam decisionem, quæ grauior; si enim verum sit, in febribus putridis, & Ephemericis calorem naturalem integrum seruari, sequitur huiusmodi febres non esse morbos. Morbus enim est partium viuientium: at humores & spiritus non viuunt. Ergo &c.

Vt hanc objectionem recentiores plures diluerent, dixerunt in febre putrida & Ephemera spiritus & humores poni in calefacto esse, solida esse in calefieri. Definunt ex Gal. lib. de diff. febr. qui ibi vtitur hac distinctione: sed responsio hæc non tollit difficultatem.

Morbusest quid in factoeffe, non in fieri, propterea aut dixerunt in omni febre, etiam solida poni in calefacto esse: in Ephemericis in habitudine; in alijs in habitu, &c.

Hæc responsio nihil habet veritatis. Peto enim ego quid per habitum & habitudinem intelligant. Existimo enim primum cum Gal. & ratione constituendum, Ephemeras & Putridas aliquando esse absque totius corporis caliditate, neque in calefieri, neque in calefacto esse. locus Gal. est lib. 3. de præf. ex pul. c. 6. maxime notatu dignus, ideoque diligenter legendus. Nam ex eo constat dari febres putridas, humorem esse calidum, vbi tamen solida substantia cordis sit nec in calefieri, nec in calefacto esse. Non igitur necessarium est febribus Ephemericis, & putridis solida esse calida. Non inficior, plerumque (nam hoc est rarum admodum) & magna ex parte poni in calefacto esse & calefieri.

Cum igitur hoc non sis necessarium, superest soluiam dubium. Ergo febris putrida non est morbus, quia non pertinet ad partem viuentem.

Primo concedo consequentiam, secundo nego. Dicunt primo, ergo febris putrida non est morbus. concedo. Dicunt vterius. Si non, ergo non laeduntur actiones, nego consequentiam. Probant, quia actiones læsæ sequuntur morbum. Falsum, omnis actio læsa sequitur morbum. Verum est morbum lædere actionem, sed solum morbum, &c. falsum. Ratio, quod non solus morbus lædat actionem, est quia concurrunt non solum pars viuens, sed alia plura.

Si sermo sit de partibus naturalibus, docuit Gal. lib. 1. de loc. aff. c. 7. nihilominus partes egent facultate, materia, alimento, &c. clarius idem Gal. lib. 1. de loc. aff. cap. 6. dicit alias etiam lædi actiones ex defectu materiae & facultatis; ita vox læditur deficiente aere, qui est materia vocis; pariter lib. 3. de sympt. causis, inquit coctionem vetriculi aliquando vitari ex cibo improporcionado; & lib. 1. de caus. puls. docuit mutari pulsum etiam ex viti, qui est tantum augmentum caloris propter quantitatem.

Ad propositum itaque cum facultas cordis virtus animosa non tantum ex naturalibus fiat, quemadmodum etiam ex spiritibus vitalibus, hinc fit, quod actiones possunt lædi læsis spiritibus. Ergo non valet consequentia.

Alius modus negandi consequentiam, quod vitium humorum aliqua ratione non possit dici morbus, dico, quod aliqua ratione humorum vitium possit dici morbus saltem generaliter, quemadmodum ex lib. 1. colligitur, de diff. morb. ca. dicit inquit, morbum esse immoderantiam eorum, quorum sanitas est moderantia, &c. In finitionibus medicis humorum moderantia est sanitas. Ergo humorum immoderantia est morbus. Secundo dicebamus solidas partes in calefieri posse aliquo modo morbum vocari. Et hæc est doctr. Gal. lib. 1. de loc. aff. c. 2. Ibidem inquit dari morbos in calefieri. possumus dicere, quamquam partes solide sint in calefieri, tamen semper aliquam portionem esse in calefacto esse.

Ideo ea ratione Ephemera putrida possunt dici morbus.

Vtrum autem in Ephemericis & Putridis possint lædi solida, suo loco dicemus. Hactenus de subiecto.

Febris ex omnium sententia cum ex genere morborum sit, ideo accidens est. Accidentium essentia non tantum in genere & subiecto, quantum in causa effectiua consistit. Cum igitur hactenus de genere & subiecto satis dictum sit, succedit sermo de causis. Immediata vniuscuiusque rei causa vniua est, & febris quidam calor ipse. Idcirco tamē genus & causa efficiens in genere continentur.

Mediata autem huius caloris causa est mult. plex, quidam proxima, quidam magis remota.

Proxima proponitur lib. 1. de diff. feb. c. 4. quæ accepit a se ipso lib. de caus. morb. c. 5. reducitur ad quinque præcipua capita. Sunt hæc motus, vicinia corporis calidi, prohibita transpiratio, putredo, & assumpta calida.

Quod motus calorem augeat in corpora quocunque experientia docet.

Huiusmodi humani corporis motiones alia pertinent ad animum, alia ad corpus.

Ad animum, ira, timor, & molestia: quamquam enim & alia reperiantur, ista tamen reuocant semper sanguinem ad centrum; in ira concentratur calor ad ipsum cor.

De motione corporis res est cōtantissima ex lib. 1. de diff. feb. c. 4. & lib. 5. de tu. val. c. 2.

Quantum ad viciniam pertinet, nomine viciniae intelligo vicinitatem qualitatis, vel corporis externi & interni.

Interna vicinia duplex est ratione situs, & intelligentiæ.

Ratione situs, communicant cordi feruorem, quæ cordi sunt vicina. Ratione autem colligentia id ipsum efficiunt reliquæ omnes partes maxime præstantiores, ut scribit Gal. com. 3. lib. c. de fract. ex ossis calidis corruptione propter consensum cordis cum illa febrem.

Causa febrim.

Mediata

Motus 1.

2. ad viciniam corporis calidi

brem continuam excitari posse. Vbi autem communicatur hic calor ratione colligentia, solet communicari vel per vapores, qui communicant suam caliditatem cordi, aliquando habet caliditatem absque, aliquando cum materia.

Auget occasionem huius caloris ex locis determinatis communicantibus suam caliditatem cordi: Calor etiam ipse natiuus confluent ad focum putredinis, & agens in putredinem. quod dico propter virum quendam excellentissimum, qui vt centies scripsit in suis Ep. reperiri febrem, quæ à calore nativo proficiscatur, existimo calorem nativum profluere in locum vbi materia est putre facta, & agere in putredinē. Sed quod calor innatus sit causa præcipua febris, non concedo. puto posse esse concausam, præcipuam vero causam non.

3. Prohibita transpiratio. Ad tertiā causam, quæ est prohibita transpiratio, sentio cum Gal. lib. de diff. feb. ca. 4. Quandoquidem natura poros insensibiles in corpore constituit, per quos potest vaporosum excrementum excernere, simul etiam aerem frigidum ad euentationē caloris suscipere. Si hi meatus claudantur, impeditur transitus huius vaporis. Si impediatur transitus vaporis ex sanguine benigno, datur plenitudo totius corporis; vbi hæc coaceruatur, datur occasio febrium gignendarum.

Quod si vapor iste sit admodum fumosus, acris, mordax, qualis generatur ex impuro sanguine, datur occasio generationis febrium putridarum.

Si quis petat causam, cur generetur hic vapor acris; Galeam docet lib. 1. de diff. feb. c. 4. dicens gigni ex cibis acris, &c.

Generatur præterea ex ciborum corruptione, quæquam natura non sint acres.

Similiter si retineantur consueta excretionēs, sunt in causa, quod generentur hæc acra excrementa.

Causæ obstruccionis pororum cutis. Causa autem propter quam vel huiusmodi meatus externi, pori in quâ totius corporis, aut venæ minores occludantur, solet esse multiplex. proponuntur à Gal. lib. de caus. morb. cap. 7. In ambitu totius corporis duæ: vna obstructio, secunda subsistentia.

Obstructio ab humoribus, viscidis, crassis. Subsistentia autem fit ex triplici causa, siccitate, astrictione, densitate.

Siccitas fit in omnibus atrophijs, febribus hecticis, marasms.

Astrictio à quocunque medicamento astringente, siue extrinsecus siue intrinsecus administrato.

Densitas fit ex causa frigida, siue cutis ex aqua refrigeretur frigida, aere, niue, &c. hæc in corporibus puris: plenitudinis in impuris febris causa.

De quarta causa, quæ est putredo, diligentius agam in tractatione de febribus putridis.

Quinta paucis etiam omnino expediri po-

A test. nam certum est assumpta calida posse corpus multo calidius reddere, vt vinum, castoreum, confectio alKermes, &c. His coniungantur quædam causæ naturales vocatæ, quæ disponunt corpus ad febrem, vt propterea Auic. habeat proprium caput de preparatis ad febrem.

Venio ad Differentias, quas antequam proponam, puto vos intelligere potuisse modum, quo febris excitatur, qui duplex est; aliquando praua febris origo est ex corde; quandoq; autem opposito modo se habet; incipit calor in toto corporis ambitu, vel determinata parte, & transmittitur ad cor.

B Differentiæ aliæ sunt Essentiales, aliæ Accidentales. Essentiales capiuntur ab his, quæ propriam febris naturam constituunt, quæ sunt tria; Genus, Subiectum, Causa Effectiua.

Quantum ad Genus, quia genus & causa effectiua coincidunt in vnam naturam, idcirco hauriuntur differentiæ ab intensione caliditatis. propterea quædam magnæ, quædam parvæ &c. testib. Hipp. com. 1. in 6. epid. text. 29. & Gal. lib. 1. de diff. feb. 4.

Differentiæ à Subiecto desumptæ tres sunt, prout triplex est etiam febris subiectum, Spiritus, Humores, Solida.

Vbi calor primò, & per se obsidet Spiritus, quæquam nec Humores, nec solida substantia calefierent, attamen febris Ephemera nuncuparetur. Non nego quidem, reliqua etiam non accipere calorem, sed hoc dico non esse de essentia febris huius, quod Galen. exemplo aeris calidi follem ingredientis declarat.

Quod dico de spiritibus, nunc de humoribus.

Febbris putrida est. quando humores ponuntur in calefacto esse cum putredine. Si fieri posset, vt neque spiritus, neque solida caliditatem acquireret, attamen febris nuncuparetur, teste Gal. lib. 3. de præf. ex puls. cap. 5. Fingamus leberem calidam in qua aqua imponatur frigida, res erit manifesta. putant quidam difficillimum esse, quia spiritus, & humores non sunt calidi. Non autem est de essentia vt humores sint calidi, &c.

D Quod si primò & per se huiusmodi calor obsideat solidam substantiam, & non spiritus, est tamen febris hectica, vt colligitur ex exemplis, lib. 1. de diff. feb. c. 1.

Dimittamus exempla, videatis eum lib. 3. de præf. ex puls. cap. 5. est pulcherrima autoritas.

Dicet autem quispiam: duo possunt obijci; primo si statuamus febris hecticæ essentiam in solidis, non in humoribus, febris Hectica non est æqualis intemperies? facilis est responsio. Ego etiam concedo magna ex parte æqualem esse intemperiem. hoc tamen volui probare consequi interdum, non ex necessitate.

Secundum, si in omni febre hectica humores & spiritus sunt in calefacto esse. Igitur

Modus quo febris excitatur duplex.

Differentiæ essentiales.

A generis, et causæ effectiue.

A subiecti.

Dubium 1.

in omni hectica aderit febris putrida, & Ephemera. De Ephemera non est dubium, verum de putridis. Sed quando accensi sunt humores, non statim sequitur esse febrem putridam. Dixi enim paulo ante ad constituendam febrem putridam oportere, ut humores acquirant putredinem.

Essentiales, ut dicebam, febrium differentiae à subiecto de genere, & causa proxima sumuntur: Cum tamen genus & causa in vnum coincidunt. Etenim sub caloris genere comprehenduntur. Calor autem varias habet differentias, propterea. essentielles febrium Differentiae primum erunt sumendae à subiecto.

Itaque cum hactenus tres praecipue sint desumptae differentiae febrium à subiecto proximo, Ephemeræ, putridæ, hecticae.

Hinc etiā tres oriuntur Differentiae ad calorem spectantes, Spirituum caloris mitis, Humorū acris, mordax, Solidorum siccus, aridus.

Hinc scribit Hippoc. febrium alias esse mites, mordaces, paruas, & aridas.

Prima differentia respondet Ephemeris, secunda putridis, tertia hecticis.

Rursum putridæ cum in humoribus resideant, in varias distribuuntur differentias pro humorum varietate, quia aut sanguineus, aut biliosus humor est, &c.

Si biliosus, habet calorem perurentem.

Vbi putrescit sanguis, calor etiam si primò magnus sit, tamen manui tangenti cedit.

Contra si putredo sit in humore pituitoso, vel melancholico, post primum tactum apparere solet: Hinc Hipp. alias esse statim perurentes, aliae vero habent calorem cedentem, aliae sunt post insurgentes.

Rursum quia est Pituita, aut est insipida, aut falsa, duplex etiam oritur calor.

Ex falsa calor ita est acris & mordax, ut videatur manus tangere, quod Muriam Hipp. vocat febres saluginosas.

Aut pituita Dulcis, quæ semper in vniuersa cute infert humorem, quas Hip. humectas vocat.

Differentia
accidentales.

Aliae differentiae, quæ Accidētales vocantur sumi solent à causis Remotis, subiectis, & accidentibus, quæ febribus connectuntur. A causis remotis, principales secundariae, seu secundum Arabes morbi & accidentia. Antiquiores, ut Galen. sect. 7. aph. com. 42. sympt. febres nunquam vocabant, sed ab affecta parte morbum. Morbi autem dicuntur, qui ex putredine oriuntur: accidentia verò ex alio affectu in corpore, ut inflammatione, ulcere, tumore, &c.

Rursū distinguuntur febres ratione Causæ Remotæ, quæ aut est cōmunis omnib. regionib., aut propria alicui regioni, aut vaga, propter quæ aliae sunt epidemicae ex causa communi regioni; Endemicae, & Sporadicae propriae urbis ex causa propria febricitantis.

Rursum alię autumnales, vernaes, æstiuę,

A nocturnæ, diurnæ.

Pariter accidentales à subiecto remoto, viriles, muliebres, pueriles.

Praeter quas sunt differentiae à Symptomatis. Si sit cū maximis symptomatis, praecipue cum pustulis, petehijs apud Gal. 1. in 6. e pid. tex. 29. uocantur ab Hipp. febres *ασυμπτωτικές* id est, pestilenciales.

Accidētales deniq; differentie à symptomatis desumptae sunt singultuosae, sudorificae, quæ oēs sub duob. generib. comprehenduntur lib. 8. meth. c. 1. aliae hecticae, aliae scheticae.

Hecticas intelligit eo loci, quæ diuturno temporis spatio non tantum in solidis, sed alijs partibus perdurare solēt, etiam ad differentiam scheticarum, quæ breui perdurant.

Hactenus de differentiis omnium febrium, quando postea sermo erit de Putridis, alias habebitis differentias. Et hæc uolo pro generali febrium tractatione sufficere. De Signis enim, & curatione agendum singillatim.

De febre Ephemera siue Diaria exquisitè legitima.
Cap. 11.

Accedā ergo ad Ephemeræ. Ephemera igitur Græcis hoc nomine dicitur, quod vnicum soleat diem perdurare, horas sc. 24. est determinatio desumpta, uel ab animali, cuius meminit Ari. lib. 3. de hist. anim. c. 29. in fine, aut denominatur ab herba colchico, quam nonnulli Ephemeron vocant, cuius facultas est, ut si assumatur horis 24. interficiat: Ideo latini etiam diariam uocant, eo quod unum tantum diem perduret. Antequam definitio instituat, distinguenda est huiusmodi febris.

Colchicō
lethale.

Ephemera febris duplex est una legitima, altera spuria.

Epheme-
ra du-
plex.

Legitima subdividitur in duas: in exquisitè legitimam, & nō exquisitè, seu nō exactè.

Legitima & exquisita est intemperies spirituum, quæ non perdurat ultra horas 24. ex causa catartica recedente.

Non exquisita est feb. quæ solet perdurare ultra secundum & tertium diem ex causa adhuc persistente.

Spuria ephemera solet perdurare ad 5. 6. diem ex inflammatione spirituum & humorum ex causa permanente, praecipue ex obstructione.

Singula examinabo. Legitima exactè est febris quæ non perdurat ultra 24. horas, est accensio spirituum propter causam procatacticam iam recedentem.

Quid E-
phemera
legitima

Dixi esse accensionem spirituum, per spiritus intelligēs Vitales, quidquid Nicolaus, & alij hac in re disputent, quia animales intelligunt.

Concedo equidem aliquando Animales incendi posse ex mœstitia, uigiliisque, &c. hæc tamen incensio, nisi ad vitales pertingat, nisi accedantur vitales, nunquam erit febris.

Nomine

Nomine spirituum Vitaliū intelligo influentes non insitos. est igitur intemperies spirituum vitalium influentium.

Causa. Addidi causam esse aliquā iam recedentem. est talis, quæ pertinet ad motū ad vicinitatem, ad adsumpta, & propterea siue ex ira, labore, uigilijsque, inuēctione calida, &c. recedentibus, tamen solet hæc febris induci & durat tantum 24. horis; quia calor factus est in corpore spirituofo. De his uera est Gal. sententia lib. 11. meth. med. cap. 2. quando scribit Diarias & Hecticas habere simplicem curationem, quæ dirigitur ad intemperiem: hic propriè intelligit uarias & exquisitas exacte; nam aliæ habent causam fouentem, & curatio duplex requiritur.

Signa. Sunt facilis cognitionis, & curationis. *Pulsus.* Cognoscuntur primum quidem ex pulsu. Pulsus lib. 3. de præf. ex puls. 5. c. & 7. in principio sunt magni, celeres, frequentes: non tamen intelligatis omnes habere hos pulsus: uerificatur de legitimis, & exactè exquisitis. Gal. li. 1. ad Glauc. c. 5. addit pulsus ephemerarū esse pulsus carentes omni inæqualitate, omnes sunt eiusdem tenoris: hoc uerificatur de istis. nam in spurijis etiam adest inæqualitas.

Addit loc. cit. Ephemerarum pulsus habere eilem inæqualitatem. sed rectè corrigit postea lib. 1. de diff. feb. 7. In putridis systole maior est Diastole: in ephemeris opposito modo se habet.

Aliud signum pertinet ad calorē febrilē.

Calor. Est calor admodum suauis, mitis, ad differentiam putridarum, in quibus est mordax. *Tēporia.* Præterea ut docet lib. 1. de diff. feb. c. 7. status & incrementum putridarum, differt ab his febr. quod in putridis est diuersitas inter principium & incrementum. at in ephemerale est principium, quale est incrementum, & status est rectissimus, cito declinat.

Urina. Cognoscitur etiam ex urinis, prima die urina habent signa perfectæ concoctionis.

Cognoscitur ex symptomatis, nullum habent graue symptoma: & in fine adest sudor mitis, paucus, quo omnia symptomata cessant, ut dicit Gal. lib. 1. ad Glauc. 2.

Si quis uoluerit singulas causas legitimæ ephemeræ distinguere, legat lib. 1. de diff. feb. lib. 1. ad Glauc. lib. 2. de cris. 12.

Signa causarum. Primum signum delumitur ab oculis, à siccitate cutis, à pulsu.

Quantum ad oculos, si ex uigilijs, & inēdia, semper oculi sunt concaui.

Si ex mæstitia, & inēdia sicci, in uigilijs humidi, ex calore solis cutis sicca: ex labore pulsus magni.

Non proponam hoc loco signa permutationis, vel in putridas, vel in hecticas. quia non facilis est transitus, sed ubi agam de spurijis, hoc tractabo.

Prognostica. Si rectè tractantur & non accedat aliqua constipatio, seu densitas, lib. 10. meth. med. c. 2. unica die curantur: nā si acquirunt Medi-

cum ignarum, incidunt in Putridas, & Hecticas.

Curatio autem facillima est: abstineant à quacunque sanguinis missione, quocunque etiam medicamento, alius quidem lubrica tenenda, sed in ceteris nulla sanguinis missio nec medicamentum conuenit: tantum ut patientes reficiantur conuenit cibus frigidus & humidus, non tamen excrementitius, ut docuit Gal. lib. 8. meth. med. c. 2.

Inter hæc est prisana hordeacea, panatellam in omnibus casibus propositis Gal. lib. ad Glauc. 3. concedit, ut & lib. 8. meth. cap. 2. præterquam ab ira.

B Refrigerantia sunt interna, saccharum rosaceum, conserua ex floribus cichorii, iuscula alterata ex soncho, hordeo, serum caprinum.

Externa sunt balnea & inuēctio, balneum sit aqua dulcis, alterata malua, folijs viticis, &c. Inuēctio ex oleo dulci, quale est amygdal. Et hæc de febre Ephemera Exquisita volo sufficere.

De febre Ephemera non exquisita legitima: & Periodica. Cap. III.

C Ephemeram exacte exquisitā paucis perstrixi, quod illius curatio, nisi error committatur, sponte cedit. Longior ero in hac secunda differentia, adhuc longior in tertia.

Secunda Diaria differentia est intemperies calida, quæ perdurat ultra primum diem, accensa in spiritibus ex causa adhuc perseverante.

Hanc speciem colligo partim ex Gal. magis ex ratione, ut intelligetis ex Gal. lib. 10. meth. cap. 2. facit triplicem Ephemerarum distinctionem.

Primum distinguit Ephemeram, in qua Causa procat artifica recessit ab ea in qua persistit.

Et rursus in qua permanet causa, duplex illi est. In una nulla est obstructio: alia in qua adest obstructio in meātū penitionum corporis, & venularum, quæ ad ambitum totius corporis permaneāt; Quæ potius media quædam febris est, seu Synochus Imputrida, ubi datur eiusmodi febris, cuius causa non sit obstructio. Constituo ego hanc esse secundam diariam.

Dixi hanc esse intemperiem plurium dierum, ad differentiam prioris.

Per plures dies intelligo non solum, in qua calor perdurat per duos, tres continuos, vel in qua calor exacerbatur singulis diebus. In solis Spiritibus accensa non durat ultra tertium aut quartum diem. Veritas est ex Gal. lib. 1. de diff. febr. c. 7. qui loquens de legitimis inquit produci ex bubonibus.

Si uerò sit sermo de Differentijs Periodicarum, potest dari Legitima, quæ durat 4. 6. 8. accessiones, ut doctus sum experientia.

Dixi autem huiusmodi accensionem esse tantum

De Ephemera legitima non exacta.

tantum in spiritibus ad differentiam Ephemerae spuriae.

Addidi ex causa perseverante. Ideo febris persistit ultra secundum, & tertium diem, quia causa fouet hanc spirituum accensionem.

Causa p-
manens
caloris.

Quod si quis quærat, quæ sit causa, propter quam huiusmodi calor perduret ultra secundum & tertium diem? Duplex ea est prima, error; secunda, ex natura ipsius causæ.

Gal. lib. 3. meth. cap. 1. meminit solius erroris. inquit Ephemeræ progredi: hæc est vna causa verissima.

Ex parte ægri committitur error, quando febris ex ira, & cogitatione oritur, & patiens eligit persistere in eo affectu.

Ex parte Medici committitur error, si ægrotus, qui ex inedia, vigilijs, &c. febrem incurrit, teneatur tenuissimo victu.

Qui ipsi etiam possunt committi ex parte ministrorum, si dent quæ dare non debent.

Sed ex parte Causæ naturæ, & hoc est difficilius, duplex est causa, propter quam diu potest consistere causa febrilis; prima putredo; secunda, prohibita transpiratio.

2. Causa.
Ephemeram
fieri
ex putre-
dine.

Quantum ad Putredinem, videtur difficile existimare, Ephemeram posse fieri ex putredine, unde fiunt febres tantum putridæ.

Quomodo ergo dicimus nos Ephemeram fieri ex putredine? Febris Ephemera ex putredine prouenit, quando substantia putrida non potest ad cor usque peruenire. Itaque Gal. etiā lib. 1. de diff. feb. c. 7. inquit, febres Ephemeræ fieri ex bubonibus, eo quod non materia putrida, sed solum vapores adsint.

Igitur causa immediata, propter quam non fit putrida, est, quia extraneus calor peruenit ad cor.

Questio.
Cur Ephe-
mera non
fiant pu-
trida.

Quæritur, quæ causa, quamobrem corpus putrescens non permittat humores putridos ad cor, ut inde fiat putredo? Sunt 4. causæ. Prima ex parte loci. Secunda ex parte affectus, in quo est putredo. Tertia ex parte materie. Quarta ex parte ipsius putredinis.

Locus triplex. Primus, ut sit distans à corde Secundus, ut sit admodum ignobilis. Tertius, ut non habeat venas, & arterias propinquas.

Hac ratione propter distantiam etiam si in articulis materia, fit quidem febris, sed non putrida.

Quantum ad Locum ignobilitatem; in summa cute fiunt affectiones, ex quibus febres Ephemeræ, furunculi, scabies, &c. & tamen febris non est putrida.

Tertia conditio loci, ut non habeat venas, & arterias proprias. hac ratione glandulosæ partes non facile possunt communicare putredinem per venas, & arterias.

2. Secunda ex parte affectus, non communicatur cordi materia putrescens, si sit exilis.

3. Tertia est causa ex parte materie; non quæuis materia est subiecta putredini admodum

excellenti, sed tantum lentè potest admodum putrescere; propterea ubi abundant in corpore humores frigidi, humidi, siue sicci, non facile putrescunt. Ex hac causa fiunt febres ex distillatione, catharro, & magna ex parte sunt Ephemeræ.

Quod dico de Catharro, dico etiam de Melancholia.

Denique ex putredine propter humorem tantum semiputridum; hac ratione fiunt aliquando febres Ephemeræ ex lacte putrescente in mammillis.

Habetis quattuor causas propositas Ephemerarum.

B. Causa ex parte putredinis, puto etiam rationabiles, & à me proxima experientia comprobata, sunt tamen etiam autoritates. Ex bubonibus, lib. 1. de diff. feb. cap. 7. ex corruptione ciborum in ventriculo habetis testimonium Auic. cap. 2. Gal. lib. 8. method. 5. Hipp. 5. in 6. Epid. 4. tex. 3. 1. lib. 8. meth. 6.

De Ephemera ex affectionibus extrinsecis, ut ex Phymate, furunculo, pustulis, scabie, est testimonium apud Auic. Fen. 1. lib. 2. c. 34 de alteris ex distillatione apud Nicol. Florent. summa 5. tex. 2. c. 29. Syluium proprio tract. de febrib. cap. 2. Et apud Forestum, obser. 6. ex urina & excrementorum alui corruptione, ap. Vallesium proprio tract. de febr. qui dubitat, num talis febris sit diuersa ab Ephemeris & putridis, annon necessarium erit aut Ephemera, quando calor eleuatur ex putredine illius excrementi, aut Putrida, quando ex illis vaporibus humores inficiuntur.

Sunt nugæ. Ex eiusmodi causis non constituitur noua aliqua species, sed tantum fit Ephemera.

Sed cum dictum sit, magna ex parte Ephemeram fieri ex bubone, ex nauseatiua satietate, quid intelligendum per hæc? nomine bubonis inflammationem intelligo non tantum, quæ sub inguine, verum etiam, quæ sub axillis ad aurem, &c. ex. Gal. lib. 2. ad Glau. c. 1. & lib. 13. meth. c. 5 intelligo item nomine bubonis legitimam inflammationem ex sanguine prodeuntem & φύμα, & φύθλον.

Bubo est inflammatio ex sanguine, quæ non citò; φύμα, quæ citò ad suppurationem tendit: φύθλον est spuria inflammatio.

Bubo.
φύμα.
φύθλον.

Huiusmodi itaque inflammatio, vel legitima, vel spuria sit ex sanguine sincero fluente, vel mixto cum bile.

Huiusmodi fluxio fit propter causam internam, & externam.

Interna, propter quam confluit hic sanguis ad inguina, est praua viscerum, vel totius corporis dispositio, aut robur facultatis expultricis irritata à copia vel humoris qualitate.

Si propter prauam qualitatem, est inflammatio viscerum.

Si propter abscessum, tantum abest, ut sit Ephemera

Ephemerā, ut sint maligna, teste Hipp. sect. A 4. aph. 55.

Si expellatur propter robur, tunc possunt fieri Ephemeræ, multo autem magis fiunt, si humor in proxima parte consistens trahatur ad inguina. potest esse in cūre, vel coxa vlcus, inflammatio. solet attrahi humor ad aures, & fieri bubo.

Ex quo colligitur errorem Petri Foresti in suis observationibus, qui deceptus ex loco Gal. lib. 1. ad Glauc. c. 2. dicit bubones ex vlcere externo magis esse periculosos. Gal. inquit esse salutare. Forestus vero bubones sine vlcere esse magis salutare.

Nausea-
tina sa-
metas.

Quantum ad nauseatiua satietatem Arabibus sic vocatā, Gal. lib. 8. meth. c. 3. dicitur cruditas vetriculi, quomodo ex cruditate Ephemerā fieri? an propter cōuersionem cibi in saporem acidum, vel in nidorosum, aut in substantiam putredinosam? Dubium an ad saporem acidum causa febris. Auic. dubius est, ut acidā est qualitas, nunquam fit. quia non est qualitas acris, quia necessario debet influere extraneus calor ad cor; sed aciditas videtur ex causa frigida produci. Acidā qualitas, ut est acidā, non est qualitas calidā. Dubitatur tamen, utrum acidā ex causa calidā an frigida? Videtur aliquando acidum fieri ex causa calidā. Certum est ex acidā qualitate non eleuari vapores calidos. non eleuatur calor extraneus ad cor; non facit ergo Ephemerā, &c.

Fit autem ex hac corruptione, si huiusmodi vapores, vel cibi inconcocti propter nimiam exercitationem attrahantur ad cutem, cutis densetur inde, &c.

Quomo-
do nause-
atina sa-
tietas sa-
ciat Ephe-
merā.

Due p̄ci-
pue cā-
Epheme-
ra sunt,
putredo,
& prohibi-
ta tran-
spiratio.

Itaque fit febris Ephemerā ex conuersione cibi, aut ad nidorem, aut ad putredinem. Itaque nauseatiua satietas potest primo, & per se Ephemerā efficere: si acidā non fit primo, sed ex accidenti.

Inter causas, quæ Ephemerā excitare solent, sunt duæ præcipuæ, Putredo scilicet, & prohibita Transpiratio, quæ etiam putredas constituit. Docui autem in præcedentibus qua ratione ex putredine possit Ephemerā produci. In præsentia, quomodo ex prohibita transpiratione fieri possit docebo.

Prohibita transpirationis nomine intelligo impeditā halitus fumosi excretionem; & impeditam aeris frigidi intra corpus receptionem.

Huiusmodi prohibita transpiratio varias producit affectiones, prout ea varia, & habitus retentus varius est.

Quantum ad retentionem, est multa, mediocris, parua, halitus blandus, suauis, mitis, acris, & mordax. Hinc variæ affectiones.

Vbi acris & mordax halitus in magna copia retinetur, putridā; si in mediocri, Ephemerā spuriam, Synochum non putridam; si in parua, Ephemerā legitimā constituit: Blandus, si in maxima copia, facit febrem

Ephemerā spuriam: si in mediocri, legitimā. Et si in parua, facit tantum plenitudinem, non febrem.

Interrogabit quispiam, quæ sit causa huius variæ retentionis? & quomodo hic halitus fumosus & acris possit excitari, &c.?

Quantum ad primum; halitus fumosus & acrem dico excitari teste Gal. lib. 5. meth. med. c. 10. in temperamentis biliosis, siccis, assumptis, vigilijs, laboribus & illis, qui in ediam sustinuerunt; & ideo idem Gal. lib. 8. meth. cap. 7. ubi proponit temperamenta disposita ad febrem suscipiendam, proponit primo loco temperamentum calidum & siccum. Disponunt etiam corpus cibaria omnia calida, potissimum acra.

Quantum ad secundum quæsitum. Quæ causa huius variæ retentionis? Dico, id potest contingere ex causa interna, & externa.

Externa quando eiusmodi impedimentum fit ex causa frigida, balneo adstrictorio, aut ex sordibus. quam causam habet Auic. & præponitur inter causas mediocres; inter quas est etiam horror, vel rigor, ut scribit Gal. in illo lib. 10. meth. c. 4.

Est etiam inter mediocres obstructio. Ex causa interna potius multa quam crassa, viscida, & lenta, fit obstructio ex sanguinis multitudine, & tunc est leuis, si ex crassis, viscidisque humoribus, est permanens, & constituit febrem diuersam ab Ephemerā.

Itaque nomine prohibita transpirationis intelligimus halitus acutum in parua copia; aut dulcē in magna copia, sed à balneo, multitudine, causa refrigerante impeditum.

Præter has causas proponit Auic. Ephemerā ex dolore. hanc causam puto pertinere & ad putredinem, & ad prohibita transpirationem, quia in omni dolore continetur materia multa & calidā, aut multa. Calidā vel ex propria natura, vel ex putredine. Si est calidā ex propria natura, vel accidente, &c. hinc fit omne febrem, quam producit dolor, vel ex putredine esse, vel ex prohibita transpiratione.

Epheme-
ra ex do-
lore.

Ex materia, si sit materia putris; si non, secus.

Fit Ephemerā ex dolore vel capitis vel dentium, digiti, &c. omnes isti dolores partium distantium à corde possunt facere Ephemerā propter putredinem, cuius substantia cordi non communicatur, sed solum calor extraneus; quam veritatem exempla proposita ab Auic. ostendunt.

Hactenus de causis febris legitimæ non exacte: nunc quia diximus, huiusmodi febres aliquando habere periodos, de hac re etiam agendum.

Causa fe-
brium e-
phemerā
rum per-
iodicarū.

Apud Gal. non ita facile inuenietis mentionem fieri febris Ephemeræ periodicæ. Apud Auic. in duobus capitibus, in Capite de Ephemeris ex oppilatione, & in Capite de nauseatiua satietate.

Ergo

Omnes febres Ephemeræ posse habere periodos.

Ergo, ut dicam meam sententiam, existimo A omnes febres Ephemeræ ex putredine, & prohibita transpiratione posse etiam periodos obrinere. Et quia Auic. nō fecit mentionē de forma periodi, dico posse habere circuitus quotidie, binis, quaternis diebus, &c.

Omnes febrem Ephemerā posse habere periodos patet cōsideranti causas periodi.

Proxima causa reditus febris est collectio excrementi illius, quod priorem fecit febrem.

Causa huius collectionis est, vel noua excrementi retentio, vel expulsio, vel attractio, vel generatio.

Causa horum imbecillitas retinentis, expellentis, &c. ut Gal. lib. 2. de diff. febr. c. 12. testatur. pro exemplo statuamus febrem Ephemeram ex dolore articuli, fuit materia ad articulum imbecillum, & ibi incipit fluxio, incipit febris, quæ post 24. horas resoluitur, materia dissipatur, persistit tamē imbecillitas articuli; secundo die redit alia materia, fit iterum fluxio, articulus imbecillis materiam suscipit, fit denuō consequenter febris cum omnibus signis. Idem potest fieri in oculis, inflammatione ex dolore eodem modo, atq; itidem ex affectu aliarum partium, si remoueatur etiam febris.

Quærat aliquis, cur non fiat putrida hæc collectio materia? Dices enim febrem hanc posse transire in putridam. Ratio quia si febris sp. esset eiusdem tenoris, fieri non posset, quin trāsiret in putridā? Dico qd prior materia, quæ collecta erat, prorsus dissipata est & delitescit, quando superuenitalia.

Vidi ego exempla, ubi febris Ephemeræ prior planē euanuerat, antequam accederet Ephemeræ alia, & non transijt in putridas. Et iam ante tres annos, cum explicarem doctrinam de febribus, habui patricium Patavinū laborantem eiusmodi febre: durabat vsque ad viginti dies, ita ut possint constitui viginti Ephemeræ.

Quia dictum est, eiusmodi periodos esse varios, quantum ad quotidianam: non dubiū est Cathartales exacerbari quotidie, præcipuē sub noctē horis vespertinis; pariter fluxiones humoris pituitosi habēt suas exacerbationes quotidie, de tertio in tertium difficiliore videntur, ut possint cōstitui. Sed inueni præclarissimū exemplum, fieri de tertiā Diaria mentionem apud Gal. lib. 10. meth. med. c. 16. scribit ibi, ex halitu acri & fumoso retēto sub cute, excitari febrem halitu discurrete per vniuersum corpus in magna copia: hunc motum ita validum inquit Gal. potissimum fieri propter inediā, in illis qui habent corpus biliosum, si inediā sustineant, si a cibo abstineāt. Tertio dicit, quod in horrorem incidunt. Si duabus horis post horrorem nutriantur, non possint seruari a febre. Eandē febrem mitem, blandam, placidam esse dicit, quæ cum sudore soluitur.

Quenam est febris blanda, quæ soluitur cū sudore? Est Ephemeræ teste Gal. lib. 1. de diff. febr. c. 7. Obscurius hoc potestis colligere lib. 8. meth. med. c. 4. Ibidē cap. 3. Gal. proponit Exemplum iuuenis, quem seruauit solo cibo ante, & in accessione, sese opponens omnibus Diatritarijs. Febris autē quæ Iuuenis laborauit Tertiā, nō putrida erat, quia dabat Gal. cibum ante & in accessione; at in tertiā putrida ex eodem Gal. cibibus dandus non est: Ergo fuit tertiā Ephemeræ.

Quantum ad periodum Quartanæ, habetis exemplum in illis, qui tentati sunt, quæ cum liberi sunt, sentiunt postea semper in eodem die, quo vexabantur quartana, calorem præter naturam, quæ nihil aliud est, quam febris Ephemeræ quartana.

Dantur denique febre Ephemeræ sopradicæ, de his non est difficultas, qui habent bubones in axillis & vlcera in pedibus, incidunt in has febres.

In tractandis Ephemerarum, quæ ultra diem durant, signis, diligentia opus est. quia omnia Ephemerarum signa à Gal. & Auic. generatim proposita vidētur; in his nos decipere possēt: hęc, pulsus magni, celeres, frequentes, æquales tamen, nec duri: Calor minimē mordax, vrinæ, quæ prima die coctionē pre se ferunt, declinatio post. 20. horas, intermissio feb. post. 24. horas carētia symptomatum, sine rigore & frigore incipiunt. Denique signum etiam est, quod non incipiat absque causā Procatartica.

Et tamen in febribus, quæ extenduntur ultra diem primum, omnia difficultatē continēt. Quia etiam si hæc febres primum quidem incipiant absque causis procatarticis, illud tamen non solæ habent proprium. etenim & illa febris, quæ ex putredine aut obstructione est, incipiat absque causā procatartica.

Preterea, habent pulsus dueros, paruos, inæquales, calorem mordacem, horrorem, refrigerationem, nauseas, inappetētias, fluxus alui, dolores capitis, vigilias, quæ putridis etiā conueniunt, & vrinas crudas, vel ruffas, quales in putridis. vultis hoc videre? Sumamus Ephemeræ ex vigilijs, lib. 1. de diff. febr. c. 7. scribit in his pulsus fieri dueros: in febre producta ex cruditate ventriculi ad acidum, scribit, eodem loco pulsus fieri dueros.

Si sermo sit de pulsibus paruis, in omni Ephemeræ, in qua exoluantur vires, pulsus sunt parui.

Si de inæqualibus, dicit loco cit. pulsus semper inæquales Fieri, quamquam non adsint, dum causā aliqua noxia os ventriculi infestat; sic igitur in Ephemeræ ex cruditate ventriculi pulsus sunt inæquales.

Si sermo sit de rigore, horrore, refrigeratione, in febribus ex bubone, horrores, rigoresq; fiunt.

Item in Ephemeris ex corruptione ad nudorem

Ephemeræ sporadica, erratica.

Signa Ephemerarum ultra diem durantiū.

nidorem, quando huiusmodi nidores acres vellicantos ventriculi. Hipp. 3. in 6. Epid. 31.

Pariter Ephemeræ ex retentione halitus fumosi, & acris, sunt cum rigore, horrore; lib. 10. meth. cap. 4.

Quæ ortum ducunt ex destillatione, habent refrigerationem, & horrorem adnexum.

In febribus quæ fiunt ex retento halitu acris, ex corruptione cibi post nidorem, ex cibis acidis, ex bubone, calor est mordax.

Quo ad alia symptomata in Ephemeræ ex corruptione cibi ad nidorem, adest Cardialgia, fluxus alui habet annexum dolorem capitis, Catarrhum. Ergo his signis absolute fidentium non est, sed opus limitatione, & distinctione.

Pulsus. Quantum ad distinctionem, si de Pulsibus fiat sermo: Differt pulsus Ephemerarum à Pulsu Putridarum. Quia si Ephemerarum pulsus sint dugi, sunt etiam æquales; Putridarum inæquales. Si pulsus Ephemerarum sint parui, sunt æquales; in Putridis parui, inæquales. Inæqualitas potest etiam coniungi in febribus, quando humor petit os ventriculi: distinguuntur tamen, quod magis adest æqualitas collectiua.

Calor. Quod ad calorem, in quibusdam Ephemeris est mordax, sed non exurens, ut in Putridis.

Urina. Quantum ad urinas, in Bubonibus solent esse crudæ, imo in magna copia egerunt sæpe teste Gal. lib. 3. loc. aff. 14. quam solent omittere, quia serosa humiditas in illa agitatione fertur ad renes. Sed facile distinguetis huiusmodi cruditatem Ephemerarum à Putridis: nam post 24. horas apparent prorsus sanæ, quod non faciunt in putridis. Similiter si in febribus quibusdam sunt ruffæ, habent quidem colorem mutatum, sed neque substantiam, neque contenta mutata. Rigor, horror, refrigeratio, multo mitior, breuiorque, quam in putridis, ubi & alia symptomata; & si quæ grauius, potius causa febris Ephemeræ, quam effectus sunt: Et si ad sunt, ad unicam pertinet speciem. In febre ex nauseatiua satietate ad ventriculum in putridis, vno eodemque modo, & caput, & iecur, & ventriculus possunt laborare.

Signa Ephemerarum ex Procacitate. Quod si quis voluerit singulas differentias inter se distinguere quod ad illas, quæ ortum ducunt ex causis Procacitatis: ex sola fere patientis relatione habentur. Præterquam quod si ortum ducat febris, exempli gratia, ex vicinia corporis calidi, ex mora sub sole, quod primo læditur caput: si propter assumptam calidam maxime omnium læditur iecur, si constet sitis, inappetentia, oris biliositas.

Ex cutis densitate. Si facta sit ex aliqua cutis densitate & astringente, habetis indicium ex cute aspera.

Quantum vero ad Differentias Ephemerarum ex putredine, patebunt partim sensibus, partim signis.

Signa Ephemerarum. Sensibus, si exempli gratia Ephemeræ excitatur ex hæmorrhoidibus, ex inflammatione

ne dentis gingivæ, dolore articulorum. ex putredine.

Quod dixi de huiusmodi tuberculis, dico etiam de bubone, apparebit vel sub auribus, axillis, inguinibus. Et aderit etiam inflammatio Erysipelacea.

Distinguetis autem huiusmodi Bubonem benignum à pestilenti. quia benigni statim incipiunt, cum febre prima die; pestilenti symptomata vehementissima accedunt. & ideo si ad sit vlcus in gingivis, sit bubo ad aures. lentis.

Ephemeram etiam ex eruditate cognoscetis ex ipsa eruditione. adest etiam in hoc casu nausea, inappetentia, & aliquando fluxus ventris. Signa Ephemerarum ex eruditione.

Cognoscetis Ephemeram ex transpiratione prohibita, ex rigoribus, horroribus, lassitudine, quæ vniuersum corpus infestant: præterquam quod si cutis astringatur præ se fert duritiem, siccitatemque. Ex transpiratione prohibita.

Si propter causam internam habetis corpus plenum sanguine & lentis humoribus.

Omnes huiusmodi febres sunt salutares: si tamen aliquis error fiat, transeunt in hecticas, aut putridas. Prognostica.

Errores autem qui committuntur, sunt commemorati ex parte, exempli gratia in temperamento gracili, calido & sicco, Medicus imperat in ediam, purgantia, &c.

Ex altera parte in Temperamento calido, humido, si hoc prætermittat, scilicet purgationem & venæ sectionem, exponat patientes aeri frigido, repleat cibis acris, præbet occasionem putridæ.

Signa perennationis in alias febres, vel Hecticas, vel Putridas, non sunt usque adeo obscura. Si siccus sit corporis habitus & gracilis, & patiens continua febre laboret sine exacerbatione, plethorico, arteria sit calidior cæteris partibus circumstantibus, de hectica metus erit. Si in carnosio habitu, febris, quæ cum leui horrore vel rigore incepit, sequenti die sit maior rigor, & calor sit mordax, si post 24. horas nullus appareat sudor, de Putridis suspicandum erit.

De putridis agam suo loco, nunc de Ephemeris protensis.

Et primum quidem breuibis expeditio curationem illarum, quæ ortum ducunt ex causis extrinsecis siue enim ex ira, vigiliis, timore, &c. quis incidit in febrem Ephemeram, curabitur victu humectante optimi succi, Cauendum a fructibus, & oleis. Videndum panatella, priuana hordeacea, ouis sorbilibus, vino. Curatio Ephemerarum ex causis extrinsecis.

Duo distinguenda in his, videlicet febres, quæ ortum duxit ex insolatione; & ex causis iecur calefacientibus: in his vinum non conuenit, quia semper dolor adest. Requiritur etiam aliam curationem, quia in his casibus præter balneum conuenit etiam balneum, & multum refrigerans ipsi capiti.

Qui igitur sub sole diu fuerint, debent lauari aqua, Galen. balneum administrandum lib. 8.

lib. 8. meth. c. 3. ait nisi adsit destillatio: tamē post subiūgit, in febre ex vitione, quaquam hāc destillatio adsit, possumus vti balneo, & in hoc cōueniunt etiam capiti refrigerantia. quam sententiā acceperunt etiā Auic. Nicolus, & alij, quā tamē sano modo est intelligenda. videndum ne materia in capite preceps labatur ad alium locum, iecur, vel thoracem, vt lib. 12. meth. c. 3. Gal. docet.

Propterea ego non consulo, vt adhibeatur balneū, vbi destillatio cruda & copiosa.

Nec refrigerantia mihi probantur.

Itaq; sum huius opinionis, sententiā Gal. esse veram tantū de leui destillatione, existente iam corpore ab excrementis mundo. Propterea lib. 6. de tūend. val. c. 3. in huiusmodi temperie calida vtiur similiter balneo refrigerante. sed oportet supponere materiam non esse multam.

Curatio febris Ephemera ex iecoris causa. Si febris ortū ducat ex Iecore, vt curetur, necessarium est extrinsecus & intrinsecus iecur refrigerare Epithematibus ex succo Endiuiae, lactucae, cum speciebus Diatrion-
santalorum; Item aqua refrigerante, & vitus ratione similiter refrigerante.

Ex bubone. Si ex Bubone fiant febres, quanquā Arabes sint prolixi in his curandis, Gal. tamē secus facit, ita vt atqui irriserint Medicos, qui hāc curabant. Auic. in principio refrigerantia, & reprimētia adhibet. 3. 1. cap. 19. Quod consiliū apud me est suspectum, nam si hūnt propter plenitudinē bubones expellente viscere, materia ex mēbris principalibus, debet vacuari, nō autē retineri. Cur igitur vult bubones repelli, cum a parte interna ad externam pellantur? neque probandum consiliū, quod vult refrigerantia, & reprimētia esse ponenda in illud spatium, quod est inter cor, & inguina: operatio nullius momenti: potius pelletur calor intrō.

Si dolor intrinsecus, sedabitur aliquo medicamēto anodyno. Si E. G. ex fonticulis aliquando imponere potestis globulū, aliquādo imitigantia dolorē, vt pro mitigādo dolore oleum de vitellis ouorum, chamam. ad digerendum supra insulā vrina pueri.

Si ad suppurationem tendat, adiunanda: prospiciendum cordi, & vniuerso corpori.

*Curatio eius quae ex nau-
seatiua
satietate
facta ad
saporem
nidrosū.* Si sit bubo iam factus laudo, si plenum sit corpus, vt si in inguinibus, ex pede mittatur sanguis.

Inter Ephemerarum causas, quā diligentem exposcūt curationem, est nauseatiua satietas, siue cruditas, vt inquit Galenus ad saporem nidrosū, de qua agendum.

Dixi autem tractādā esse nidrosā cruditatis curationem: quia cum lib. 8. meth. med. c. 5. cruditas sit duplex ad acidum, & ad nidorem. De ea quā sit ad acidum, non fiet recordatio.

Loquar itaq; de corruptione tantū ad nidorem, quā aut est coniuncta cū fluxu alui; aut sine eo: Ita. n. Gal. l. c. & Auic. distinguūt.

A Si habeat fluxum alui, tripliciter contingit, aut fluxus est moderatus talium qualium oportet, & in ea quantitate, quā expedit: aut in minori copia, quam oportet: aut maiori copia, quam vires ferunt.

Supponatur esse cum fluxu moderato, ni- Cum fluxu alui
hil aliud agendum, quam conueniens insti- tuenda diata; & intus, & extra ventriculus
tuenda diata; & intus, & extra ventriculus moderato.
confirmandus.

In diata tria sunt obseruanda: primum est, ne vlla ratione frigido aeri se exponāt: quia si cutis constringatur, fluxus augetur.

2. Vt si huiusmodi deiectio sit admodum frequens, patientes non surgant ex cubili.

B 3. Vt illis cibis non praebeatur nisi cruditate magna ex parte superata. Si enim praebeatur, certissimum est corrumpi, & consequenter nouam putredinem fieri.

Interim exterius fouendus ventriculus oleo Mastich. ol. de absynth. de mentha.

Intrinsecus praebeantur rotulae ex Diarrhod. Abbat. Et sic prima species cruditatis curatur.

Sed si fluxus sit imperfectus, & minus quam oporteat aducatur, necessarium huiusmodi motum adiuuare per inferius exhibita, & superius explicata, deinde ventriculum roborare.

Quantum ad inferiora, vtendum suppositorijs, & clysterijs.

C Sed ego, vbi Clysteres administrari possunt, eos magis laudo. quia in hac cruditate cum corrupti sint cibi, ex vna parte habent acrimoniam, & dolorem inferunt: Ex altera parte etiam multi flatus generantur. Itaq; clysteres vtrumque praestabunt.

Eritque clyster talis;

Recip. flor. chamomil.

anethi an. p. j.

sem. fenic. vnc. j.

bord. p. ÷ bulliant in s. q. iuris optimi

& facta expressione

Recip. huius decocti. lib. j.

ol. chamom:

butyr. recent. an. vnc. j. ÷

sacchar. rubr. vnc. ij. M. f. clyster, quā

li opus fuerit, quousque cruditas sit euacuata.

D

Quantū ad Suppositoria lib. 8. meth. c. 5. commendauit vium diatrionpipercon simplicis. Est compositio, vt potestis colligere apud Gal. lib. 4. de tu. val. c. 5. calida, &c. vt propterea nō videam, cur in hac corruptione ad nidorem commodet. Certum est in hac esse acrimoniam humorum, & a calidis fieri, quomodo ergo huc calidissima confectio potest commodare?

Neque potestis dicere, loqui Gal. de corruptione ad acidum, quia humores hic acrimoniam habent, & sunt calidi.

Possumus dicere, inquit Auic. conuenire, quia habet vim precipitandi humores, qui sunt in ventriculo, ad partes inferiores.

Sed

Cum fluxu alui moderato.

Diata.

Imperf.

Clyster.

Suppositoria.

Sed si in hunc finem, mihi magis probatur materia remedij efficacior, & magis probata. potius exhiberem aliquam pilulam ex aloelota cum aliquo succo refrigerante ad scrup. ij. magis placeret usus Diatrionpip, ubi iam suppurata est huiusmodi cruditas.

Interim aliqua exterius adhibendo pro corrigendis symptomatis. nam si dolor adsit, inungenda uetris interioris regio oleo. Mastichino, rosaceo &c. vi & uentriculus rebus prabendus non nisi uacuat excrementis.

Immodicus fluxus. Si fluxus immodicus, ut superet uires. Ita, tum medicamenta astringentia externa, & interna admittenda. Intrinsicus uis cōfidiacyronites, & si adsit multa caliditas, simplex; Si non, cū speciebus poteritis aliquando addere Mastich. piper. cōfectionem uenij ex herbis; neque inprobāus usus ipsius metcitoni, pyri, pomi adstringentis ante reliqua cibaria. Externa fomenta, Emplastra, olea, cerota, astrictoria.

Et si insignis euacuatio, & vires deiciantur, quanquam causa calida præcesserit, nihilominus calidum innatum dissoluitur. Igitur consulo, ut in hoc casu omnia uettra Emplastra habeant aliquid aromatis.

Igitur adhibeatur uentriculo crusta panis madefacta in succo Cydon. aceto, alio uino astringente, imposito piperi, spica, puluere Mastich.

Fortius medicamentum est pulpa citonij imbuta in decocto rosarum, balaustrorum, myrtillorum, acacia, & huic pulpe inspergite pulueres propositos. Pariter oleum ex astringentibus & refrigerantibus, cui adde & calida: ut,

℞. ol. melini.
rosac. an. vnc. j.
de absinth.
spic. an. vnc. β.
mastich. vnc. j.
nuc. moscat. drach. β. M.

Ceratum. Si Cerotū malueris, ℞. ol. mastich.
melini an. vnc. j.
mastich.

aloes an. drach. j.
cer. q. s. M. f. Cerot.

Fomentū. Si fomentū fortius, ℞. balaustrorum.
cortic. granat.
hypocistid.
acacia.
ros. an. M. j.
absinth.
spica an. M. β.
coriandr. prepar. vnc. ij.
myrtill. vnc. j. bull. in uino a-
cerbis. q. s.

Et facta expressione adhibeatur illud uinum calidum, vel per spongiam, vel per pannum purpura tinctum, aut lanam ipsam purpura tinctam.

Ante cibum semper detur aliquod astringens. Ego uxor expresso carnis assæ cum coriandris ex primo torculari, & inspergo car-

A nem puluere granatorū, & cochlear uinum singulis diebus tribus exhibeo. Hoc admodum potest nutrire.

De ceteris remedijs non agitur. non mittitur sanguis, quia incurreret æger in fluxum hepaticum. Ratio est duplex; prima, quia natura est concitata, ad hanc mota ad intestina, in illis necessario trahitur portio cibi corrupti in iecur.

Secunda: duplici afficiuntur euacuatiōne. & inde debilitantur vires.

Succedit alia cruditas, quæ est absque alui fluxione, in hac considerandum, an fluxio adhuc sit in ventriculo, vel intestinis.

Si sit in ventriculo, humor expurgandus vomitorijs, ut est aqua hordeaceas simplex, aut cum ol. amygd. dulc. Si flatus adsint, incoquatis anethum: Si humores etiam crassif, addatis mell. rosac.

Si in intestinis, clysterijs est utendum propositis, & medicamentis, ut sunt pil. ex aloel, quæ mihi maximè probantur. Postea corroborandus ventriculus, ut propositus & cibandi patientes cessante cruditate.

Venio ad Ephemeram ex Obstructione, sed non vera; de qua in syn. cho. Aliquādo incumbendum ipsi obstructioni ex multitudine sanguinis, aliquādo tantum obstructioni cutis, &c. hoc loco breuibus. Quæ sit ex aere frigido, balneo astrictorio, curatur omnibus, quæ possunt cutē calefacere, & mundare ab his excrementis, ut si ponantur in sudatorio, vel excitetur sudor sub stragulis, aut extretur aqua calida; omni ratione curabitur: Sordines abstergenda strigili; aut saltem debent uti ministri panno aspero, & hac ratione potest curari febris ex densitate, & sorditie.

Animaduertendum utrum in hoc casu uinum cōueniat? Ex vna parte habet quidem uim penetrandi & consequenter aperiendi densitatem, & eo magis, quando densitas est ex aere frigido: nihilominus Gal. lib. i. ad Glauc. c. 13. prohibet. Ratio; Considerauit aliquādo fieri posse, ut ex aere frigido externo tanta cutis sit densitas, ut eo quidē uinum perueniat, sed non possit aperire cutim.

Consulo itaque & ego, ut antequam prohibeatis uinum, studeatis aptione cutis: quemadmodum etiam non sunt prohibenda cibaria aperiencia, nisi cutis adstrictione, & densitate sit liberata.

Idem dico de cibis omnibus acris & esculentis: abstinendum ab his, quæ sunt crassifucci. Propterea nutriendi sunt ægri cibo optimi nutrimenti. Hactenus de Legitimis.

De Febris Ephemeris, seu Diarijs Spurijs.
Cap. IV.

S Purias febres Diarias Galen. lib. 9. meth. med. c. 2. uocat medias inter Diarias Veras & Putridas. numquā enim sit transitus ab
B vno

vno extremo in aliud absque intermedio. A hoc intermedium est spuria. vocat Galenus hanc Diariam Synochum absque putredine. Dicamus ergo quid sit media ex Galeni, ex recentiorum, & mea sententia. Est febris synocha non putrida effervescentia spiritus & sanguinis absque putredine ob retentum calidum effluxum.

*Quid diar-
ria spu-
ria.* Dixi effervescentiam, quia recentiores Medici inquirunt fieri ex humoribus ebullientibus, alias ex humoribus vitis.

Sanguinis nomine intelligo vel massam sanguineam, vel vnum ex 4 humoribus in vasis magnis, vel omnibus, vel cordi proximis.

Intelligenda haec plenitudo non ad vires, sed ad vasa. Sanguinis incalescit in venis maioribus, videlicet cordi vicinis.

Causa est retentus calidus effluxus.

Hic calidus effluxus est fluxus vaporosus. Halitus hic peccat potius multitudine, quam Qualitate.

Quando autem dicimus huiusmodi halitum retineri, non intelligetis omnem retineri: non omnimoda & vniuersalis est retentio, sed maiori ex parte. Tripliciter enim retinetur, teste Gal. lib. 9. met. c. 4. & lib. 2. de diff. feb. cap. 2. Vbi primo portio est aequalis illi, quae retinetur, fit *diapneusis* seu *diapneusis*. Secundo, si portio sit copiosior, quam quae excernitur, semper imminuitur & vocatur *diapneusis*, 3. Quando plus gignitur, quam dissipatur, fit *diapneusis*.

*Causae in-
terna.* Causae sunt internae & externae.

Ex Internis maxima causa est sanguinis multitudo, cui potest coniungi humor etiam crassus, aliqua pituitae portio, quae simul cum sanguine facit obstructionem in toto corpore. sed in corpore adeo repleto fit potius obstructio à multitudine sanguinis. ex solis enim humoribus pituitosis obstruct. non potest fieri.

Externa. Externa, Si reperiat corpus in quo constipetur cutis ex balneo adstringente cutem. sed necesse est ut corpus sit plethoricum. Recentiores, inter quos Nicolaus Florentinus & Valef. lib. 5. cōtrou. 19. cōstituunt alias ex humoribus ebullientibus, alias ex humoribus deustis: addunt bilem deustam esse in causa febris humorosae mediae inter Ephemeram & Putridam. quam sententiam acceperunt ex Auerroee lib. 3. Colliget. cap. 13.

Hanc Iulius Alexander contra Nicol. Flor. impugnavit, & usus est hoc argumento. Febres ex Bile deusta sunt periodicae; Sed sic est nullam febrem periodicam periodum obtinere, quam ex sola putredine; Igitur omnis febris periodica est ex putredine. Antecedens falsum, probata autoritate Gal. lib. 10. meth. 34. quibus in locis manifeste profert exemplum iuuenis, qui febre tertiana laboravit, quem solo victu curavit.

Vidit hanc difficultatem Galen. & subiungit huiusmodi patientes curandos esse solo victu. Facit hinc syllogismum ex capite 4. ut probet dari Ephemeram ex sola inedia, qui

talis est. Rigor excitatur ex materia biliosa, acris & mordaci, diffusa uelociter per ambitum corporis. In corporibus biliosis sustinentibus inedia huiusmodi humor biliosus mouetur ad ambitum, & fit rigor; Ergo fit rigor absque putredine in istis. Superueniente rigore si statim non cibentur, succedit febris. Sed si cibantur, succedit quidem febris, attamen innoxia cum madore. Gal. lib. 8. meth. c. 2. loquens de febre quae debent habere alimentum, in febribus biliosis, vult per sanam praebere in principio accessionis, nisi febris sit coniuncta uel cum phlegmone, uel cum putredine. Ergo datur febris Ephemera Periodica ex humoribus biliosis minimè putrescentibus; & quia animaduertit aliquibus uideri paradoxon, subiungit, existimasse illos medicos hanc febrem non posse cognosci, irritet eos: Igitur datur febris ex humoribus nondum putrescentibus, quae est Ephemera.

Hoc dixi propter Iulium Alexandrinum, qui nullam febrem periodicam concedit, quae non sit putrida. Consequentia etiam est falsa. Potest esse putredo in Causa Antecedente, non tamen in Coniuncta libro primo de diff. feb. cap. 5.

Concludo igitur, Nicolum, Auerroem & Valle sium rectè sensisse, dari febres Ephemeram etiam ex bile exusta.

Sed quia haec conclusio potest dupliciter intelligi, humorales febres habere uisionem in causa antecedente & coniuncta: Nicolaus diligentissimus cōcedit utrumque. & rectè.

Datur etiam alio modo febris humorosa, quando humores potius exusti sunt, quam putridi. *Signa.*

Sed quando instat quis, in Gal. hac ratione esse praetermissam febrem mediam, cuius non meminit. Ego ut tuear Galenum, existimo huiusmodi febrem biliosam ex bile adusta potius appellandam febrem Ephemeram legitimam non exactè. Ratio: quia huiusmodi febres ex humore ebulliente fiunt temperamentis biliosis, calidis, & siccis, in quibus vapor non potest exhalare, & producit febrem accendendo spiritus.

Audiuistis igitur dari febres medias ex sanguine ebulliente, & humore adusto. Huiusmodi febres, si sermo sit de Synocha, habent pulsus maximos, uehementissimos, celeres, frequentes: urinas rubras, in substantia mediocres; calorem minimè mordacem; est corpus rubicundum, & turgidas continet uenas, lassitudo totius corporis tenet ex lib. 9. meth. c. 3. & 4. Est febris, quae si statim uena secetur, facilis est curationis: si praetermittatur, transit in putridam. Aliquando est etiam periculum disrptionis, & syncopes.

Duo sunt remedia, ex sententia Gal. lib. 9. meth. cap. 4. & 5. quibus curatur Synochus non putrida: uenae sectio usque ad animi deliquium, & potio frigida. De quibus disserendum.

Primum

Vena se-
ctio. Primum quidem dicam, quid agendum sit, ubi sit administranda venæ sectio, an vsq; ad animi deliquium, necne.

Si sit administranda vique ad animi deliquium, duæ requiruntur conditiones: prima est ex parte ipsius Plenitudinis; secunda ex parte Virium.

Quantum ad primam, necessarium est, vos supponere Plethoram Legitimam quo ad Vasa, non quo ad Vires, & prævalere sanguinem cæteris humoribus.

Ex parte virium oportet non tantum vires Vitales, sed etiam Animales & Naturales cuiuscumque partis constare. quod notate non sufficit virtus vitalis. Colligitur hoc ex ipso Gal. lib. 9. meth. c. 10. loco cit. inquit Galen. missionem sanguinis vsque ad animi deliquium maxima inferre pericula. Hæc sunt pericula, si virtus Vitalis non constet, sub vel statim post venæ sectionem moriuntur.

Aliud periculum, quando virtus Animalis non constet, sequuntur Apoplexiæ, Deliria, &c. quæ est ratio? propter imbecillitatem animalis facultatis: aliquando inquit cachexiæ, hydropes, imbecillitates ventriculi, &c. quia facultas naturalis, vel ventriculi, vel iecoris non constabant: propterea his prospiciendū.

Quæro vtrum in tali plenitudine febre non putrida, liceat mittere vsque ad animi deliquium.

Dum quæro causam, cur Gal. hoc fecit, non fuit imminutio plenitudinis; potuisset enim hoc facere duabus vicibus. quid igitur voluit Galen., ut scilicet propter huiusmodi immodicam evacuationem syncope superueniens refrigeret corpus, & superueniat excretio sudoris, vel alai, ut habetur ex lib. 9. meth. ined. cap. 3. sed in syncho non putrida non est necessaria.

Quantum ad aliam causam, ut refrigeretur uniuersum corpus, si euacuari una, uel altera libra sanguinis non potest, quid prohibet, cur non possit aqua hordei refrigerare. propterea non consulo ut deueniatis ad animi deliquium: magis laudo, ut multis & reiteratis vicibus sanguinis educatur; postea refrigeretis corpus alijs medicamentis.

Continentium febrium absque putredine duo præcipua remedia à Gal. sunt proposita lib. 9. meth. c. 4. & 5. venæ sectio scilicet usque ad animi deliquium; & potio frigida.

De venæ sectione quid sentiam explicauimus, & iterum uestri gratia repetam. nam maxime ad agrotantes, & nos pertinet.

Huiusmodi nunquam à uobis administranda. Prima ratio, quia raro uel nunquam reperiuntur illæ duæ conditiones, sine quibus nunquam debet ad animi deliquium administrari, plenitudo scilicet legitima absque aliqua corporis cacochymia, & Humorum copia; & in hoc tempore est uictus ratio, ut excrementa crassa & pituitosa possint augeri, si fieret ad animi deliquium phlebothomia.

A Difficillimum est etiam reperiri vires omnes huiusmodi corporis uique adeo ualidas, ut nulla sit noxa: nomine uirium, animales, vitales, & naturales intelligo. lib. 9. meth. med. c. 10. ubi aliqua istarum sit inuulnata, non conuenit: sed dato, non tamen concessio, reperiri hæc duo, nulla necessitas coget nos ad hoc faciendum.

Si quis dicat ad imminuendam insignem hanc plenitudinem? Huic respondeo, posse id ipsum fieri larga euacuatione, & posse repeti secundo & tertio.

Si quis dicat Gal. lib. 9. meth. c. 4. ideo mittere ad animi deliquium, ut subsequatur totius corporis refrigeratio, sudoris excretio, alui deiectio, &c. Dico in Syncho non putrida hæc non reperiri. satis est ut calor imminuat.

Quantum ad refrigerationem, si libera una sanguinis erit, aut duæ non satis sunt. poteritis deinde exhibere potum frigidum: de quo in præsentia; proposuit hunc potum Gal. loco citato. Et existimat hoc remedium præstantissimum.

Per frigidam intelligit aquam reuera frigidam fontanalem ex fonte frigidissimo aut arte frigidam redditam.

Per potionem huiusmodi intelligit potum largissimum ad saturitatem; unico tamē haustu & inspiratione, ut colligitur ex hacut cō. 43. Colligit Gal. ex eo textu posse etiam concedi aquam frigidam. an recte colligat, uolo uos esse iudices: mihi certè non uidetur eius consequentiam ualere. Quidquid sit, certum est, Galenum ibi proponere potum aquæ frigida ad saturitatem, unica tantum inspiratione. Conditiones obseruanda lib. 9. meth. c. 5. proponuntur, primò, ut febris non sit putrida, & si putrida, ut humores sint concocti. Ex quo potestis colligere, potionem frigida in Synochis non putridis posse etiam administrari in principio: in putridis oportet differre usque ad concoctionem.

Secunda conditio est, ut patientes non laborent aliqua imbecillitate uiscerum, uel alterius partis præcipua.

D Tertia conditio est, ut patientes sint assueti ad frigidam, & ex assuetudine facile hunc potum uultineant.

Altera coniectio est, ut patientes non habeant corpus gracile, neque à natiuitate, neq; ex morbo. his enim qui graciles, noxia. statim enim penetrat usque ad neruolas partes.

Neque tamen existimetis Galenum sibi ipsi contradicere, qui proponit potum aquæ frigida etiam in febre Hæctica lib. 10. meth. capite 5. Dico, nulla est contradictio. nam ibi nomine eorum, qui quamuis sit Hæctici, sunt tamen benè habituat, loquitur de prima specie. colligatis hoc ex libro, de marcore, c. 10. ubi inquit, exhibeatur, ubi vires sunt constantes & corpus abundat multo sanguine. non debet decerni natura febris hæctica, uel ex macie, uel ex diuinitate.

Potus frigidus ut concedatur, quas requirat conditiones

Cur sanguinis missio ad animi deliquium non sit administranda.

Hoc non sentit Galenus locis citatis. Vult dari frigidam, ubi vires sunt robustæ. in hoc casu non adest macies. addit postea in hecticis, in quibus macies succedit, non est præbenda.

Si hæ conditiones non adsint, & tamen corpus refrigerandum, loco aquæ frigide fontanalis præbenda aqua simplex cocta alterata Coriandro, Mastich. absinthio, agrim. quæ respiciant partem illam imbecilem. Et si uos etiam uelitis annectere utilitatem refrigerationis, & attenuationis humorum, oxym. syrup. ex acetosa, & hoc faciendum 2. 3. & 4. diebus. Et sic his duobus remedijs curari potest Synochus non putrida.

Cibus.

Quantum ad cibum, sit tenuissimus, nam in febribus corpus est refertum multo sanguine, & conuenit sola prisana hordeacea, panatella cum emulsione seminū melonū.

*Curatio
Ephemeræ
ex ob-
structione.*

Venio modo ad Curationem Febris Ephemeræ ex obstructione ex crassis, lentis, ac uiscidis humoribus. Hæc Febris curatur Euacuantibus, & Attenuantibus, Incidentibus, & Abitergentibus.

*Euacuan-
tia.
Vena se-
cto.*

Quantum ad Euacuationem, cum possit fieri per Sanguinis missionē, & Medicamenta, est insignis dubitatio; num in his febribus expediat sanguinē euacuare, necne? loquor de Ephemeris non putridis. Ex una parte habet Gal. 8. Met. c. 4. hæc uerba; in his febrib. etiam plenitudinis Signa nō adsint, mittendum tamen sanguinem: & addit rationem. Hæc sententia uidetur non libenter admitti ab Alex. Trall. & cæteris, qui uolunt mittendum tantum sanguinem, quando adsunt signa plenitudinis, nō cacochymia. quod habent ex Gal. lib. 4. de tu. ual. c. 4. Et ideo Aetius serm. 5. c. 64. legit, si plenitudinis signa adsint, putauit esse mendum in Gal. sed, Domini, reuera sequentia uerba ostendunt sic esse legendum. nam si sic dixisset, ut uoluit Aetius, non opus habuisset reddere rōnem.

Ego itaque existimo Galeni sententiam esse ita accipiendam, id est, si plenitudinis legitimæ & exquisitæ signa non adsunt, & ideo Gal. uoluit, si legitimæ & exquisitæ plenitudinis signa non adsunt, mittendum tamen sanguinem. Debet autem mitti ex Basilica, vel communi in maiori, aut minori quantitate, prout vires ferunt. Ad Medicamenta quod attinet, conuenient quæ crassos & uiscidos humores educunt; quale esset:

Recip. Mell. ros. sol. vnc. v.

Potio.

Aq. beton. q. s. M. f. potio.

Deinde præparentur humores Syrupo hoc;

Recip. Oxymel. simpl. vnc. j. ÷

Syr. de beton. vnc. ÷

Decoct. beton.

Agrimon.

Capil. uener.

pentaphyl. vnc. iiij. M. pro syrup.

*Syrupus
p. par.*

Multa proponuntur calida à Galen. lib. 8. Meth. med. cap. 4. ut calamethum, organū,

A ruta, &c. Sed ista euitanda usquequo persistit calor febrilis alicuius momenti.

Quantum ad oxymel, Alex. Tral. lib. 12. c. 1. videtur limitationē habere, ut carpat Gal. Putat se accusare Galenum, sed non accusat eum, inquit oxymelle utendum esse in obstructionib. frigidis, pituitosis, & crassis, &c. Vbi autem humores obstruentes sunt frididi & sicci, debent attenuari remedijs calidis, & humidis potius quam oxymelite. Sed quantum ad hanc partem, Galen. probat oxymel, non meminit humoris melancholici. Sed quamuis adesset, nō propterea credatis, quod non conueniret etiam oxymel: habetis experimentum succi limonum, in quo lapis dissoluitur quamquam durissimus, propterea oxymel minime prodest in affectibus lienis. Et propterea Alexandri Tral. sententia reprobanda est.

Attenuati humores expurgantur hoc modo: ut A. Tral. probat.

Recip. Agar. troch. drac. j. aut drac. j. ÷ f. infus. f. a. in aqua beton. Et facta expressione adde mell. ros. vnc. iiij.

*Potio
purgans.*

diaphan. drac. ij. M. f. potio.

Aut si uoluerit holum, Recip. El. leni. vnc. j.

Bolus.

Diaphan. drach. iiij. vel vnc. ÷ M. & cum saccharo f. bol.

Facta euacuatione, si supersint reliquæ humorum obstruentium, superari debent.

Interior sunt decocta a perientia validiora, præter oxymel; decoctum, Calam. orig. ruta, foenic. petros. apij.

Exterius aliqua corporis frictione pulueribus abitergentibus farina fabacea; placentula post conf. amygd. amar. sunt venales. Sapo quineuam lib. 8. meth. med. cap. 4. idiplum præstare potest.

Quantum ad victum, debet esse & tenuis & attenuans, sola prisana hordeacea incoquatur radices petrosel. foenic. apij.

Potus, aqua cocta est forniculo, apio, agrimon. usquequo superata sint obstructiones.

Hæc est facilis explicatio febrium Ephemerarum: transeo nunc ad Putridas.

In hoc tractatu ordior primum à communibus & uniuersalibus, deinde ad particularia in uniuersum, ut primum ad definitionem putridarum, secundo, ad differentias, tertio, versabor circa omnes causas differentiarum: proponam deinceps signa communia, & curationem communem, Deinde agam de his in specie.

De Febribus Putridis in genere.

Cap. V.

Generalem febrium Putridarum doctrinam à Definitione ipsius putridæ febris exordiar. Cuius etiam occasione singula, quæ ad huius naturam pertinet, explicabuntur.

Est

Quid febris putrida. Est igitur febris putrida calor extraneus putredinalis accensus primò & per se in humoribus cordis.

Dixi esse calorem extraneum; quia species vnius generis necessario participat naturam illius generis. Omnis enim febris est calor extraneus. Itaque etiam febris putrida.

Cæterum ad differentiam febrium Ephemeraum Spuriarum & Hæcticarum diximus hanc putridam habere calorem putredinosum.

Et quia huiusmodi calor putredinosus potest aliquando contineri in materia Antecedente, non Coniuncta; exempli gratia, in aliqua corporis parte determinata, non tamen pertingit ad humores cordis, in quo casu est Ephemera ex putredine, non febris putrida: propterea diximus hunc calorem esse primò & per se in humoribus cordis. si. n. absque hoc, nunquam & nusquam erit putrida, ppter ea Gal. lib. 1. de diff. feb. c. 5. distinguit Ephemeram à Putridis; quia in illa neque substantia, neque vapor pertingit ad cordis substantiam.

Neque valet obiectio eorum, qui aliter sentiunt & existimant. Hoc concessio, in omni putrida humores putredinem continentes esse statim pestilentes, est obiectio nullius momenti. nam distinguitur Pestilens à Putridis, non ex hoc tantum, sed ex excellentia putredinis, com. in 6. epid. tex. 29. & ideo pestilentes ortum ducunt ex putridis humoribus cordis, ut testatur lib. 1. de diff. feb. c. 4. sed si contingat, ut humores cordis fulgines tantum putridas accipiant, tum est febris putrida.

Dicet quis, quidnam sit hæc putredo: quæ situm maxime opportunum, neq. enim possumus intelligere quid sit putrida, nisi intelligamus quid sit putredo.

Putredo duplex. Putredo omnis in duas præcipuas distribuitur differentias: alia est naturalis, alia præternaturalis.

Sed quia Putredo præternaturalis percipi non potest, nisi cognita naturali putredinis essentia; de hac prius dicendum. Et quia putredo naturalis lib. 4. met. c. 2. est opposita generationi simplici, & oppositorum una eademque sit natura. Idcirco fieri non potest, ut intelligatis naturam putredinis naturalis, nisi sciatis, quid sit generatio simplex. Itaque de hac disputandum: neq. putetis aliquid dici à me per ostentationem. sunt necessaria.

Quid generatio simplex. Generatio Simplex est productio formæ mixti similis, ex mutua actione primarum qualitatum Elementorum inter se, prævalentibus tamen actibus, præcipue calido super passivas.

Quid putredo naturalis. Contra putredo opposita generationi simplici erit corruptio eiusdem formæ similis à mutua actione qualitatum Elementorum inter se, prævalentibus passivis supra activas.

Hæc est brevis dilucidatio. sed breviter singula accuratius expendenda.

Et primò quantum ad generationem simplicem, quæ sit productio formæ mixti, patet

A tum ratione, tum autoritate. nam est generatio; generatio est mutatio ad formam substantialem. Itaq. productio formæ substantialis non accidentalis, autoritate Arist. sc. lib. 2. de gen. & inter summa 3. cap. 1. circa finem, ubi loquitur de simplici mixtione, inquit mixta carnis ovis fieri ex mixtione Elementorum inter se.

Itaque productio formæ mixti generatio simplex, & consequenter producitur.

Idcirco Arist. lib. 4. met. in principio inquit, generationem simplicem esse opus harum virtutum: si opus est, illæ virtutes sunt causæ operis. Ergo non genus ortus simplicis, sed causæ. Itaque ortus simplex est productio causæ substantialis.

Dicitur simplex, quia hæc generatio producitur ex mixtione Elementorum, quæ sunt simplicia, ad differentiam plantarum; & animalium, quæ generantur ex mixtis, sanguine; partibus simplicibus. Huiusmodi autem ex Elementis simplicibus propterea simplex, & quanquam Elementorum generatio sit simplicior, quam Mixti; tamen distat à generatione Mixti. Nam Elementa ubi generantur, semper fit corruptio altero; sed multorum Elementa simplicia, ex quibus generantur, non corrumpuntur, sed manet integra, quamquam diuidantur in minimas partes, ut quælibet pars non possit suas vires exercere. Exemplum in illis, quæ non sunt mixta. Ignis minima pars est ignis, & est forma integra, refracta tamen quoad vires, nec valet scintilla ut in maiore; refracta vires, sed non forma. Sed hæc obiter.

Per productionem duo possumus intelligere: vel productionem formæ substantialis in instante; vel præuiam dispositionem ad generationem formæ substantialis, Auerh. 6. Phys. Per productionem debemus intelligere utrumq.; per formam autem intelligimus formam mixti communem & determinatam. In vnoquoque mixto est quoque forma communis, postea variæ differentie multorum; singulæque habent varias formas determinatas; quando dicimus ortum simplicem esse productionem formæ, genericam, & specificam intelligimus.

Ipse formæ quanquam aliquando videantur multiplices in mixto, tamen omnes resident sub vnica, quæ est vltima cæterarum; exempli gratia, in carne hominis adest forma mixti ut mixtum est, forma carnis, forma carnis humanæ: hæc specifica, quæ constituit formam carnis, exempli gratia cordis, corrupta cordis remanebit carnis, corrupta carnis forma solidi & hæc mixti.

Per mixtum intelligo commune, & determinatum.

Per commune intelligo omne id, quod potest vel per se subsistere; vel si sit pars alterius, est tamē pars similis. Subiectum particulare cuiusque formæ mixti sunt variæ

humiditates, quæ in mistis continentur. Nomine variarum humiditatum intelligo vnam & eandem humiditatem, sed vario modo gubernatam à qualitatibus actiuis. Exemplum; calor ubi regit humidum, constituit formam mixti, ut mistum est. Sed ubi dominatur peculiari modo, variae emergunt species, alia magis determinata, &c. Itaque hæc est subiectum cuiusquam forma misti.

Causa Effectiua est actio primarum qualitatum Elementorum inter se, prævalentibus actiuis. Hoc etiam scriptum est ab Aristotel. lib. 4. Meteor. c. 2. qui inquit, generationem simplicem esse opus primarum qualitatum, ut actiua dominantur. *sed nomine actiuarum ego non intelligo frigiditatem, sed tantum caliditatem.* Ratio: quia (vti intelligetis, ubi erit sermo de Putredine) tunc fit putredo, & est ultimus status putredinis, quando dissoluuntur mixta, ut remaneat tantum ultimum; quod ultimum remanens, est terra, quæ retinet in se frigiditatem.

Huiusmodi caliditas est, quæ terminat Passiuam qualitatem, præcipue Humidam, & (quemadmodum diximus) potest variare Mixti formam ad varij caloris gradus. Communis, innatus; & alius, qui potest proprius appellari.

Ad Innatum pertinet productio formæ ut mixtum: ad Proprium, huius, vel illius formæ.

Putredo naturalis.

His sic se habentibus, patet definitio *Putredinis naturalis, quæ est corruptio formæ mixti similis, ex victoria Passiuarum Qualitatum supra Actiuas.*

Quod sit corruptio formæ, patet primo, quod est opposita ortui simplici. patet etiã ex Genere. nam si putredo est corruptio, corruptio est motus ad substantiam, &c. lib. 4. Meteor. cap. 2. tam ortus simplex quam putredo, dicuntur etiam opera harum primarum qualitatum. Ergo istæ qualitates sunt causæ operis. Ideo inquit Aristotel. fieri corruptionem, quando id, quod terminatur, superat terminans.

Hoc dico, non tantum propter Argentarium, sed etiam alios qui volunt, quando dicimus, putredinẽ esse corrupti calidi Definitionem per se: Errant isti, quia tradita est propter Causam Efficientem. Ideo nõ est corruptio caliditatis, est tamen causa efficiens, quæ est posita loco generis: ut Eclipsis est interpositio terræ, &c. est corruptio Formæ specificæ, nõ corruptio calidi. per corruptionem verò nõ intelligo putrefactionem, sed omnia ad Formam substantialem pertinentia. nõ hæc est violenta: loquimur de naturali.

Quia verò dictum est in generatione simplici plures esse formas sibi inuicẽ subordinatas; nomine corruptionis formæ misti intelligo corruptionẽ cuiuscunque Formæ Misti in putredine naturali: cuius conditio, est, ut nulla forma mixti permaneat, sed omnes

A resoluantur in sua Elementa. Itaque oportet quidem intelligere præuiam dispositionem ad putredinem, quæ postea definit in corruptionem omnium formarum.

Hinc volo vos habere interpretationẽ lib. 4. Met. ubi inquit Arist. putrefactionem fieri in his, quæ secundum partem tantum à propria natura recesserunt, &c. optimè per verba dicta, interpretat, quare dicit putrefactionem; quia scilicet putredo nõ significat propriè id, quod iam corruptum est, ultimum terminum corruptionis, sed motum ad aliam corruptionem. igitur semper continet mixti aliquid, ubi mixtum putrescit, & continet aliquid mixti; corruptitur mixtum secundum partem tantum. ubi omnia sunt corrupta, mistum non amplius mistum, sed putrefactio est, quæ non potest fieri, nisi separentur à varia natura. Vinum ubi uertitur in acetum, est putrefactio secundum partem, quia non corrupta est tota forma, ut mixtum est, sed tantum ut uinum est, seruat adhuc formam mixti humidi.

Igitur uerum est, quod scribit Aristot. Et ideo scribit etiam omnia, quæ putrescunt tandem transire in finem & terram.

Putrefactio igitur est corruptio omnium formarum.

Si loquamur de putredine naturali, nomine mixti intelligo & mixtum commune, & determinatum.

Per commune intelligo mixtum per se subsistens, uel quod sit pars alterius.

Subiectum putredinis naturalis semper est vel mixtum, quod per se natum est subsistere; aut est pars alterius, sed quæ sit separata, per naturalem interitum, uel marcorẽ illius, cuius est pars: ut quando homo moritur, est senectus; si mors sit uiolenta, tunc mixta illius corporis putrescunt potius putredine præter naturam. Ita si excindaris ramum, & moriatur; est præter naturam, &c.

Propterea nomine misti intelligo mixtum ex propria natura subsistens, vel ut est pars alterius. Hanc ueritatem expressit Arist. lib. 4. met. cap. 2. inquit *senectam in animalibus & marcorem in plantis esse viam ad putredinem naturalem.* Quia ubi animal moritur ex senio, partes similes postea possunt putrescere putredine naturali.

Nomine mixti particularis intelligo humiditates misti, quæ vario modo regulantur à calore naturali. Et ideo Aristot. inquit in Definitione Putredinis esse *corruptionem calidi in vnoquoque humido.* Per Humidum interpretes uaria intelligunt. Veritas est intelligendas illas determinatas condiciones misti, per quas fit vel durum, flexibile, &c.

Explicauimus hætenus naturalis putredinis genus, & subiectum; nunc autem verfabor circa causam proximam, & immediatam.

Proxima & immediata Putredinis Causa Proxima est mistionis dissolutio. Sicut enim forma et immixti

Subiectum putredinis naturalis.

diata putredinis naturalis causa. mixti introducitur ex missione; ita corrumpitur ex dissolutione; quod dissoluitur quādo passivæ qualitates dominantur actius. Sicut enim constituitur, quando activæ qualitates dominantur passivis, ita tunc dissolvitur quando fit contrarium.

Hinc scribit Arist. lib. 4. met. cap. 2. fieri corruptionem, quando id quod terminatur superat terminans.

Nomine autem Passivarum Qualitatum intelligo vtramque humiditatem & siccitatem, quia in putredine, quæ vocatur secundum partem, tunc temporis permanet humiditas & siccitas; in misto remanet communis siccitas & humiditas, propter quam causam scribit Arist. loco cit. *quæ putrescentia fieri humidiora*, hoc est verum de mixti putrescentibus secundum partem.

Vbi autem corrumuntur secundum totum; tunc prævalet tantum siccitas reliquis qualitatibus. propterea idem Aristoteles scribit, omnia putrescentia tandem fieri sicciora.

Per Activas qualitates, quæ superantur à putredine, oportet intelligere caliditatem, non frigiditatem. Ratio; quia in putredine remanet & terreum & aqueum Elementum: sed sic est quod Elementa terreum & aqueum sunt frigida, quæ non corrumuntur: Corrumptur itaque Activa Qualitas ratione caloris, non ratione frigiditatis.

Neque credatis ijs, qui arbitrati sunt, huiusmodi Frigiditatem esse tantum frigiditatem Privativam, non Positivam, non tamen remanet reuera hæc qualitas positiva eo modo in mixto putrido, quo in non putrido, verumetiam frigiditas patitur in putredine; sed non patitur, quia corrumptur, sed ideo quia non terminat humidum in sicco: propter ea ex parte permanet, ex parte non; relinquatur igitur frigiditas positiva.

Quæritur, quid hæc agat? adiuuat expressionem, ex mixto, qua ratione dixit Aristot. putredinem esse passionē & frigiditatis propriæ, & caliditatis alienæ. Si passio frigiditas, effectus est frigiditatis: nam passio est accidens, accidens debet produci ab aliqua causa. Quomodo fit à frigiditate? in hunc modum, quem dixi.

Itaque ut redeam ad id, quod dixi; dissolvitur mixtum, & si petatis ulterius, quæ sit causa, quod passivæ qualitates dominantur, respondeo; Corruptio calidi innati mixti. Quæ est causa huius corruptionis? Causa, propter quam recidit ex mixto, est duplex: Interna & externa.

Interna duplex, prima propria natura caloris, quæ est ut recedat à partibus profundis & petat partes superiores, teste Galen. lib. de trem. & rig. cap. 6. Hinc fit, ut quò mita sunt solidiora, eò minus putrescant: propterea apud Aristotelē loco cit. pariter videtur ferrum, aurum, quia sunt dēiora, etiam minus

A putredini esse obnoxia. Secunda causa interna est separatio misti à suo toto. Vbi hæc separatur, infirmas obtinet vires.

Do exemplum, si intereat animal, reuera similia, quæ componunt animal, obtinent validum innatum, nō tantum à proprio temperamento, quam etiam ex influente calore. Sed lib. 5. de simpl. med. fac. c. 9. est pulcherrimus locus ex hoc duplici spiritu confici calidum innatum. Itaque vbi pars similis separatur a toto, destituitur suo calore; hinc sequitur putredo, & propterea Aristot. loco cit. docet, multa minus putrescere parva: dat exemplum de mari, & c. portuncula destituitur à calore totius. Hæ igitur sunt duæ causæ internæ.

Externa est calor extraneus ambientis. Sed animadvertite hunc calorem ambientis nō esse calorem, qui agat violenter; in præter naturali agit quidem violenter. Quid agit igitur hic? nil aliud facit, quam quod suscipit caliditatem mixti, quæ iam sponte sua evaporat in beneficium naturæ communis. Non igitur agit violenter, sed vbi calor invenit mistum, &c. libenter attrahit.

Hinc patet error Argenterij, qui contra Arist. contendit, Putredinē Naturalem esse violentam. Putavit Argenterius calorem externum esse causam proximā putredinis, nec debere fieri à causā intrinseca. Quia ut ortus simplex fit à causā interna, ita etiam corruptio. & dicit Argenterius, dixi Arist. fieri à calore ambientis dico genus putredinis, si corruptionis simplicis est corruptio forma, causa proxima dissolutio mixti, prædominū est, vbi calor resoluit; calor ambientis est causa causæ, nō etiam est causa proxima. Hinc fit, omnia putrescentia naturali putredine posse dici simul & semel frigidiōra & calidiora. Sunt frigidiōra intrinsecus, calidiora extrinsecus: quia calor exolat ad circumferentiam.

Propterea cum quaritur, num hæc corruptio calidi sit verè extinctio, an incrementum caloris? dico respectu mixti, quod Putrescit, sic; sed respectu proximi mixto, videtur potius incrementum caloris.

Et si ulterius quaratur, vtrum recedat omnis calor proprius & innatus? dico vtrūque, ut propterea Arist. dixerit; putredo est corruptio propriæ, & innatæ caliditatis. Per proprium intelligitur ille calor, a quo fit forma specifica mixti. Exempli gratia, in carne talis calor, qui constituit formam carnis. Itaque corrumptur vterque, sed primo proprius, quia semper primo corrumptur forma mixti, postea forma generica.

Hactenus de causis putredinis naturalis. Superest, quid nomine caloris ambiētis intelligere oporteat. Multæ sunt sententiæ. Ego huius tum opinionis, intelligi solā aeris caliditatem, non aquæ, nō alterius corporis. Ratio

Quid nomine caloris ambiētis intelligendum.

Ratio est, quia (vt dixi paulò ante) nunc est sermo de putredine naturali; in hoc oportet causam esse, quæ agat naturali modo: si causa præter naturam, constituit potius putredinem præter naturam.

Differen- Ex quibus colligitur differentia inter putredinem naturalem, & præter naturam, ad veritatis differentias. Differunt enim primò Genere. nam naturalis est corruptio formæ usque ad Elementa. Corruptitur Forma Specifica, & communis; nisi tamen accedat aliqua causa extrinseca. Propterea Arist. lib. 4. Meteor. c. 2. inquit: *Omne mixtum desinere in putredinem, qua est finis omnium Elementorum, nisi accedat causa extrinseca, ut comburans.* In putredine præter naturam, de qua est sermo, non est necessarium. potest corrumpi vna causa specifica, vnum mixtum, relictis reliquis formis: potest exempli gratia corrumpi sanguis, & verti in pus: Corruptitur sanguis, sed conuertitur in alium humorem; potest igitur corrumpi vnica.

1. **Differunt etiam subiecto.** Naturalis subiectum est, vel mistum per se subsistens, vel pars alterius, est separatū à suo toto per naturalem interitum, vel animalis, vel plantæ. Si putrescat in toto viuente: hac ratione putrescunt humores, quia putrescunt in toto suo viuente ad differentiam, quæ non fit in mistis viuentibus.

2. **Differunt præterea, quia mistum putredine naturali corrumpitur, etiam si sit optimè temperatum: in præternaturali corrumpitur magna ex parte mixta perperam temperata.**

3. **Differunt quartò, quia in naturali corruptione omne humidum necessarium est, vt tandem desinat infimum, quod non est in præternaturali.**

4. **Differunt etiam causis. naturalis fit ab intrinseca, præternaturalis ab extrinseca. propterea putredo præter naturam precipuè fit ab aliqua caliditate externa per vim quandam. Quod si ab intrinseca, fit etiam violenter.**

5. **Differunt vltimò, quia causa extrinseca in putredine naturali est tantum aer; in præternaturali, potest esse aer, aqua, & quoduis corpus circumfusum misto putrescenti. His differunt, quæ omnia diligentius existimabuntur.**

Breuis hætenus fui in proponenda differentia putredinis naturalis à præter naturam, eò quod occasione eorum, quæ de humorum putredine nunc dicetur, pluribus etiam de reliquis agetur.

Quid humorum putredo. Humorum putredo potest comprehendì sub Galeni Definitione, quam proposuit his verbis lib. 8. meth. med. c. 8.

Corruptio formæ mixti. Est corruptio formæ mixti, & mutatio ad substantiam corporis corruptelam putrescentis à calore externa, misti tranco.

Hæc Definitio & integra & perfecta est; &

A quamuis possit communis existimari, & putredini naturali & præter naturam, nihilominus præternaturali magis conuenit. Ostendo prius illius perfectionem; deinde quod magis conueniat putredini præternaturali.

Constat hæc ex tribus partibus, vt omnes accidentales de sitiones; ex Genere, scilicet, proprio Subiecto, causa Effectiua. Genus est mutatio ad corruptelam substantiæ; subiectum proximum corpus putrescens; causa effectiua est calor extraneus.

B Nomine mutationis ad corruptelam oportet intelligere non solum accidentium permutationem, vt Archangelus putat, sed etiam mutationem in substantia, vt paulò infra manifestabo.

Constat ex hoc esse falsissimum, quod alij asserunt Gal. definitionem comprehendere tantum rem mutatam; quinimo, vt obiter hoc dicam, si putredinis definitio ab Aristotele talis esset, qualem plerique existimauerunt, melior esset Galeni, quam Aristotelis. Aristoteles calidum innatum primo in genere describit: si hoc verum esset, non effugeret Arist. obiectionem Archangelii. Itaque Galen. ipse quoque voluit accipere pro Genere non corruptionem calidi, sed corruptionem formæ mixti.

C Subiectum corporis putrescens Zabarella increpat. Subiectum inquit nimis remotum; sed si rem diligenter consideras, non intellexit corpus remotum; sed quod primò & per se potest putredinem suscipere, quale est mixtum, idq; simile vel dissimilare.

Dissimilare non potest accipere putredinem primò & per se, sed quia partes similes putrescunt, vt nervi, caro, &c. Ideo etiam ipsum dissimilare deinde corrumpitur.

Iam dictum est Causam immediatam corruptionis formæ mixti esse intemperatiam. Intemperantia autem equius partis est morbus, instrumentariæ, an similis? Profectò primò & per se similis: Secundariò potest etiam tribui ipsi organo. Propterea Gal. non increpandus, intelligit mixtum simile, vt mixtum est: addit à calore externo: proposuitque hanc causam, vt ostenderet, hanc Definitionem potius conuenire putredini præternaturali.

Sed causa huius Causæ est varia. in putredine naturali huiusmodi dissolutio venit à principio intrinseco. Igitur cum hic dicat à calore externo, voluit significare, quod definit putredinem præter naturam.

Venio ad putredinem humorum; cum sit putredo præter naturam, consequenter dici potest mutatio ad corruptelam, substantiæ humoris putrescentis ex dissolutione Elementorū ex causa extrinseca: sed tamò à causa externa debet fieri hæc dissolutio. Nomine dissolutionis ad corruptelam non tantum intelligenda præuia formæ corruptio, sed corruptio infieri substantiæ. Si enim seruetur forma

forma mixti, quamquam fiet alteratio magna, & non fiat mutatio substantia, non potest dici putredo. Vultis hoc videre in Gal. lib. 9. met. med. c. 1. 2. 3. 4. & loquitur de syncho nō putrida; quæ fit ex sanguinis effervescentia: nemo profecto negabit in tanta sanguinis ebullitione fieri alterationem, non tamen est putrida. vocat Gal. hanc febrem mediam inter Ephemeram, & Putridam.

Sed clarius legatis com. aph. 17. sect. 2. in fine, ubi inquit, mutationem sanguinis comparari posse mutatione vini, inquit, quod aliquando aciditatem contrahat, nunquam prorsus in acetum conuertatur, &c. Sic inquit contingit etiam sanguini, ut aliquando videatur accedere ad naturam putredinis. in tali casu, inquit, non est dicendum sanguinem esse corruptum, sed dicendum, esse in multitudine auctum.

Itaque recedant isti, qui existimant putredinem Medicorum esse Qualitatem tantum extraneam, decipiuntur. Itaque putredo humorum vera est corruptio formæ substantialis ipsius humoris, quæ fit multis modis, & pro varietate formarum humoris, & causæ efficientis.

Pro varietate formarum humoris. unusquisque enim humor habet varias formas sibi inuicem subordinatas. Exempli gratia, sanguis habet formam sanguinis, deinde humoris, tertio mixti, ita ut possit corrupti forma sanguinis, & maneat humor: si humor, manet nullum.

Alia causa est ex parte causæ efficientis. Causam Efficientem intelligo calidum innatum, facultatem concoctricem, quæ consistit in parte seminali, præcipue in venis & arterijs, quæ continet humores. Dicebat Gal. com. 2. in 1. epid. text. 47. & propterea, quādo virtus ualida non permittat corrupti, & si corrumpatur, statim natura vel ad meliorem statum reducere, vel statim suppressere corruptionem conatur, ne ulterius transeat illa corruptio ad benigna.

Contra ubi hæc facultas uenarum est corrupta, fit putredo insignis. hinc fit ut Galen. lib. 1. de diff. febr. c. 6. constituerit tres putredinis differentias. Prima putredo est, quæ fit superante natura. Secunda quæ fit superata natura. Tertia est media inter primam & secundam. Explico singula diligenter.

Putredo, quæ fit prorsus superante natura, in qua humor amittit unicam formam specificam. Sed quid contingit? Hæc statim ac est inducta, calor naturalis cōuertit hunc humorem in eum, qui non possit corpori esse noxius. Galenus ipse explicauit hanc rem exemplo abscessuum priuatorum.

Sed antequam progrediar, agam de obiectione Iouerti, qui in lib. 2. parad. cap. 2. minime admittit huiusmodi cōuersionem sanguinis in pus fieri ex putredine, &c. addit rationes, quæ videntur apparentes, sed tamen

A sunt nullius momenti. quod pus fiat à calore nativo, quod species concoctionis, uerissimum; quod non fiat ex putredine, falsissimum. Si uelit dicere pus iam conuersum in substantiā albam, non esse amplius putredine concaderem. Ergo non sequit ad putredinem sanguinis: nego eam cōsequentiam; propterea Gal. 2. progn. com. 42. quāquam apertissimis uerbis affirmet huiusmodi cōuersionem sanguinis in pus propter concoctionem, non tamen negat aliqua ex parte esse putredinem, quæ tantū in pus conuertitur, propterea quod dicitur, concoctio est impropria locutio. Si uultis hoc uidere, legatis Gal. lib. 5. de simpl. med. fac. cap. 6. & 2. acut. 44. vera ibi concoctio duas habet conditiones. Prima, ut fiat à calido naturali. Secunda, ut materia sit apta ad uertendum in substantiam nutriti: prior potest dici cōcoctio, quæ fit à calido innato. Sed quia non potest nutri. e, ideo non dicitur uera concoctio. Cadit ergo primum fundamentum.

Quod secundo affert, omnē putredinem esse cum foetore, confiteor omnem putredinem, dum persistit, esse cum foetore.

Dicit pus non continet foetorem: Non continet, quia iam mutata est substantia corporis putrescentis. stat itaque prima differentia putredinis.

Hanc putredinem lib. 1. Meth. med. cap. 9. uocat semiputredinem. loquitur de hac putredine, in qua calor nativus superat naturam putrescentem. Vide capit. 8. artis medicinae.

Secunda Differentia putredinis erat, in qua calor nativus prorsus superatur. Causa, 2. Superata natura. propter quam cōuincatur hic calor, ait Gal. lib. 1. de diff. febr. c. 6. est duplex, insignis scilicet malignitas humoris putridi, & insignis imbecillitas venarum & arteriarum. Quocumque modo se habeat, necessariò mutatur hic humor in omnes prauas formas, & hæc antequam corrumpatur, habent omnes prauas qualitates. Materia fit viridis, nigricans, habet foetorem. sect. 4. aphor. 1. in 6. Epid. tex. 29.

Tertia, in qua natura partim vincit, partim vincitur. Exempli gratia, humor putrescens poterit habere prauum calorem, sed 3. Inter has media. non foetorem, aut contra: vno uerbo, vult in hac media non ad esse omnes prauas conditiones, aliqua semper naturalis seruatur substantia, calor, odor.

Ostendi hæc ex Galen. sententia tres esse in humoribus Putredinis differentias; quarum prima est vnius tantum formæ specificæ humoris putrescentis superante natura ex toto. Secunda plurium humorum putrescentium superata natura. Tertia quæ media est partim superante, partim superata natura. Sed circa primam Differentiam volo vnum vos notare, propter quædam dubia, quæ inferius inferuntur: primam differentiam, quam-

Duplex
pusredo.
1. Superante natura.

quamquam habeat unicam formæ humoris corruptionem, nihilominus magna ex parte desinere usque ad Elementa. hanc rem docet Gal. lib. 2. de diff. febr. cap. ult. In humoribus putrescentibus partem dissolui in halitum, partem in cineres, imo inquit, partes ichorosas substantiæ putrescentis digeri, & in fumos conuertri.

Hinc colligitur substantiam putrescentem dissolui prorsus, & tandem in propria Elementa distribui.

Sed aduertite hanc dissolutionem misti non fieri à calore nativo per humoris putredinis: aliud est humoris putrescere, & dissolui usque in Elementa ratione putredinis: aliud humorem putrescere, ratione calidi innati. Quando in cineres, non est putredo, sed potius vel vstio vel ebullitio.

Itaque in hoc differt Transmutatio humoris à putredine, quia ubi putrescunt usque ad Elementa, corrumpuntur ob caliditatem extraneam. Et idcirco corrumpuntur vera putredine, secus hic tantum per vstionem, vel ebullitionem.

Subiectum putredinis in corpore humano. His explicatis venio ad subiectum putredinis in humano corpore.

Est hoc duplex: Commune, Proprium, & adæquatum. Remotum est mixtum. Omne mistum simile in humano corpore est subiectum putredinis. Itaque in humano corpore mixta similia sunt Subiectum putredinis, & ex his omnibus possunt febres excitari.

Proximum est humiditas propria vniuscuiusque mixti.

Quantum ad subiectum remotum sunt mixta. Per mixta intelligo partes solidas continentes, & contenta, humores, & spiritus amplector: quæ etiã est Vallesij sententia.

Nomine humorum intelligo alimentales, & non alimentales.

Per Alimentales intelligo chylum, quatuor primos humores, nec non quatuor secundas humiditates, vt sunt, ros, gluten, cambium, &c.

Non alimentales sunt adhuc alij vtilis, alij inutiles. Vtilis sunt Pituita Dulcis seruata in vetriculo pro nutritione corporis tempore defectus alimenti: huiusmodi pituita est quidem minimè alimentalis, habita ratione alimenti, sed tempore euadit alimentalis.

Non alimentalis, sed utilis, est Bilis, & illa quæ seruatur à natura ad intestinorum irrationem, & vt illa Melancholia Acida ad ventriculi appetitum faciendum huiat.

Sunt quoque inter humores minimè alimentales, sed vtilis, Pituita Acida, semen pro generatione, lac, sanguis menstruus pro nutritione fœtus.

Inutiles & Excrementitij sunt Bilis, cuius varia species, prassina, æruginosa, vitellina, pallida: pituita acida, mucilaginosæ, salis, vitrea.

Istæ oēs species excrementitij, sunt inutiles.

A Similiter melancholia alia Naturalis est, alia præternaturalis.

Per humores igitur hos omnes intelligo.

Ex quo colligitur, non absque ratione antiquiores (vt Athenæum, Attalum) maximè nominis apud Galen. Medicos, existimasse omnes febres esse Putridas, quæ sententiam non ausus est impugnare. Excipit tantum Ephemeræ. Ratio est in promptu, quia nomine humorum putrescentium intelliguntur etiam secundæ humiditates, vt ros, gluten, cambium, quæ vbi putrescunt, pertinent ad partem solidam. Et hac ratione febres Hæctica possunt dici putridæ.

B Sed quia excipit Ephemeræ, hoc diligenter cõsiderandum. Sententia Gal. potest dupliciter intelligi, vel quod Ephemera nunquam possit esse putrida, vel quod magna ex parte absque putredine. Hoc secundo modo sententia est vera: prior verò falsa.

Ratio falsitatis constat experimẽto, quia datur febres Pestilentes Ephemere, quæ vnicæ die interficiunt, quales fuerunt febres illæ Britannicæ sudorificæ, quæ spatio 24. horarum interficiebant. Sunt ex spiritibus putrescentibus, & putredinem habent insignem. Ratio spiritus sunt mixta. Omnia mixta sunt putredini subiecta. Ideo Arist. lib. 4. Meteor. c. 2. dicebat, omnia Elementa præter ignem putrescere, non quatenus sunt corpora simplicia, sed quia suscipiant missionem alterius Elementi. Si igitur aqua & terra putrescunt, multò magis putrescit spiritus.

Alia ratio; omnia, quæ possunt admittere missionem corporis putridi, possunt etiam putrescere, sed spiritus hoc potest. Ergo potest putrescere. Maior manifesta; Minor probatur ex Arist. lib. 4. Meteor. cap. 2. omnia putrescere, præter ignem, qui non admittit missionem.

Neque est cõtradiçtio, quod 25. problem. inquit etiam aerem nõ putrescere. loquitur enim ibi de aere ppinquo sphaeræ ignis, de aere scilicet purissimo: Inferior hic omnino potest putrescere. Igitur cum spiritus sint mixta, consequenter poterunt putrescere, & dari aliquando Ephemeræ putridæ.

Subiectum itaque commune putredinis est omne Mistum.

Proprium Subiectum est humiditas cuiuscumque mixti, vt Gal. docuit lib. 1. simpl. c. de sale, 3. in 3. epid. 1. Si debet fieri putredo, humiditas debet superare actiuam qualitatem. quò igitur corpus humidius, eò facilius putrescit. Hinc fit, vt melancholia, pili, & ossa &c. difficilius putrescant.

Dubium est, num hæc humiditas, vt facile putrescat, debeat coniungi frigiditati, an caliditati? nam ex vna parte videtur, quod frigiditati, quia putridum redditur frigidius. Nihilominus videbitis Gal. ubique, vt lib. 8. Met. med. c. 7. lib. 1. de diff. feb. 3. lib. de cur. per sang. mult. &c. statuere corpora calida & humida

Quod spiritus possit putrescere.

Subiectum proprium.

Questio.

humida putredini esse obnoxia. Hæc res habet difficultatem. Quia Arist. contrarius lib. 4. met. c. 2. aperte scribit, corpora calidiora minus putredini obnoxia. Experientia etiam videtur opposita.

Non obstantibus istis, censendum est corpora calida & humida citius putrescere, seruatis conditionibus propositis, loco citato. quā prima est, ut huiusmodi corpora contineantur in aliquo loco calido, & angusto; in loco frigido & aperto non facile putrescunt, propterea recte sentit. Arist. loco citato.

Secunda conditio est, ut hæc corpora non dissilientur, aut ventilentur. Si hoc prohibeatur, calida & humida putrescunt. Putrescunt calida & humida, quia ista caliditas innata, quando non potest dissilari, sit sibi ipsi præter naturam, hæc ipsa caliditas agit in seipsam, consumitque propriam humiditatem.

Ad objectionem, de sanguine dico, citius putrescere quam alios humores, seruatis his conditionibus.

Propterea si sermo fiat de locis determinatis, videbitis citissime putrescere, si in venis communibus, ut ibi putrescit, de qua re suo loco.

Objectiones.

Hactenus de Subiecto communi, & proprio putredinis ex sententiæ Galeni. Sed non defuerunt nouorum dogmatum inuectores, qui artem monstris replere voluerunt. Et quia eorum autoritates alicuius sunt momenti, breuibus de his agere, & eorum rationes explodere conabor.

1. Nullum humorem posse putrescere.

Aliquorum est sententia nullum prorsus humorem posse putrescere, illisque duobus argumentis vtuntur. Primum est, omnes febres sunt passionis calidæ, & siccæ. Ergo non possunt fieri ex putredine. Probatur consequentia. quæ enim sunt putrida, sunt seipsis frigidiora, si putredo habet frigiditatem. Ergo febres non fiunt ex putredine.

Aliud: putrida ideo euadunt putrida, quia calor extraneus corrumpit propriam caliditatem; Ergo sequitur febres fieri non posse ex putredine. Probatur consequentia, quia multæ febres fiunt ex causa frigida, ut ex obstructionibus cutis.

Responsio.

Istæ sunt rationes leuiiores, quas breuibus dissoluo. Quo ad primum; nego consequentiam, dum dicunt putrida esse frigidiora. Respondedo dupliciter; aut sunt frigidiora post putredinem, vel sunt frigida caliditate innata. Secundum argumentum magis ridiculum. Putrida quidem ideo euadere putrida, quia calor extraneus corrumpit proprium, concedimus; consequentiam vero negamus.

Opinio igitur hæc satis est leuis, quāquam à viris satis doctis probata.

Opin. Iuberti, san- guinem non in omni- bus febri-

Secunda opinio est Iuberti lib. 2. Parad. cap. 2. qui putauit in febribus tantum perniciosæ & pestilentibus putrescere sanguinem tantum, in leuioribus humores nunquam putrescere, sed tantum vri. Habet rationes, 1.

A humores ideo putrescunt, quia pauci, vel extra proprium locum sunt, vel quia non modis putrescunt, vel quia sunt in loco angusto: sed sic scire.

est, quod humores intra venas nullum obtinent ex conditionibus propositis. Ergo intra venas non possunt putrescere. Minor probatur, Ergo ratione copiarum non potest putrescere. Præterea sunt in proprio loco, 3. ibi etiam mouentur; sunt enim in loco amplo, venis scilicet communibus, ideo non est tanta copia, ut motus eorum impediatur. Similiter non potest impedi eorum ventilatio.

Non potest etiam putrescere extra venas. Nam si sermo fiat de synceris humoribus, in his nunquam videmus humores putrescere; Si aliquod adest signum putredinis, contingit potius ratione sanguinis permixti, quā alterius humoris. Verum Erysipelas nunquam putrescit; si non extra venas; ergo minus in venis.

Alia ratio. Huiusmodi humores extra venas non congelascunt, præterea, cum putredinis comes sit foetor, &c. & tamen in febribus benignis foetor non adest; præterea, putredo in benignis febribus est conuersio in pus, quæ conuersio in pus est concoctio; ergo non putredo lib. 5. simpl. cap. 6.

Denique inquit, in hac benigna putredine humores conuertuntur in cineres; quod est argumentum ebullitionis, non putredinis. Itaque propter has causas asserit humores non posse putrescere præterquam in febribus malignis. Quæ opinio non est accipienda. Quamquam enim videatur probabilis, in sequentibus tamen refutabimus, quando erit sermo de loco ubi putrescunt.

Erat dubitatio de humoribus putrescentibus, numquid scilicet vel omnes, vel aliqui eorum siue intra, siue extra venas putrescere possint, ut febres excitent. Cum enim decretum sit, non tantum humores, sed solidam substantiam, & spiritus etiam putrescere posse, nihilominus fuere, qui omnia confuderint. Alii nullum humorem putrescere posse; alij omnes, excepto Sanguine; alij omnes excepta Melancholia, &c. Ego singillatim horum sententias nolui examinare, sed proposui Iuberti rationes; addam nunc alias, quæ ab ipso prætermisæ sunt, & postea omnibus satisfaciam.

Præter rationes Iuberti comprobant non-Obiectio, nulli Bilem & Melancholiam non putrescere, quod sint humores sicci. Ex sententia autem Galeni ad inducendam putredinem necessaria sit humiditas. Et ideo sunt, qui dicunt excepto melancholico humore omnes putrescere, eo quod sit siccus.

Alij sanguinem negarunt posse putrescere, quia sanguis seruatur pro uitæ thesauro à natura. Nituntur etiam autoritatibus Gal. lib. 2. de diff. feb. cap. 9. & lib. 2. de Crif. c. 12. re. sanguis, ubi corrumpitur, ratione tenuioris partis in Bilem, crassioris uero in Melancholiam

Obiectio, bilem & melancholiam non posse putrescere.

Sanguinem non putrescere.

Iam conuertitur, non autem putrescit. Itaque inquit, sanguis sub propria forma nunquam putrescit.

Quantum verò ad locum, audiistis, quibus argumentis probauerit Iubertus non putrescere in venis. Addo aliam rationem verum, Trall. lib. 12. c. 2. argumentum tale est; nusquam & nunquam in venis vermes generantur. Ergo, nusquam humores putrescunt.

Hæ sunt potiores rationes, quibus antiqui & recentiores probauerunt putredinem non fieri in venis, & humores potius ebullire, quàm putrescere. Primò cum dicebamus humores in venis non posse putrescere, quod sint in loco proprio, maxima copia, diffidentur propter loci amplitudinē. Respondeo, his seruatis conditionibus nunquam putredinem in corpore fieri. Sed quia multæ accedunt causæ præter naturam, contingit, ut possit etiam putredo excitari. Causæ hæc paulò post patebunt, quando erit sermo de causis putredinis.

Ad rationem de vermibus; non fiunt vermes; Ergo non putredo. Nego Consequentiam. Primò necessarium non est, ut ex omni putredine fiat vermis. Vinum si fiat acetum putrescit, tamen non fit vermis. Lac, pars pomi, & pyri, si corrumpatur, &c. Ergo falsa positio.

Sed præterea dico: in putredine inter venas vel naturam superare humorem putrescentem vel superari; si superat, conuertit substantiam illam putrescentem in materiam puri similem. Cuiusmodi transmutatio est proinde ac si natura generasset vermen. Nam sicut in alijs rebus putrescentibus fit vermis: ita hæc materia puri similis, quæ est quasi vermis.

Quod si contingat ut humor putrescens superet, generatur putredo ita noxia ut corrumpat animal. Itaque hoc argumentum nihil concludit.

*Iuberti
opin. re-
iutatur.*

Quod dicit Iubertus, Putredinem esse conuersionem in pus; & conuersionem in pus esse coctionem, respondi superius. Et dixi esse quidem opus caloris naturalis; sed non sequitur. Ergo materia, ex qua genitum fuit pus, non fuit puredo. Non valet Consequentia; pus fit à calido innato; Ergo non fuit puredo.

*Fætuem
nō nunq̃
esse in ve-
nis.*

Pariter, quod dicit de foetore: foetor est comes omnis putredinis; in venis non, quia non est foetor. Dico, Domini, aliquando in venis esse maximum foetorem, ut etiam foetor è venis exeat; præsertim in febribus pestilentibus, vrinæ sunt foetidissimæ: falsum itaque.

Sed dico præterea, non semper in putredine venarum esse foetorem, quia quando natura conuertit in materiam puri similem, cessat foetor: fuit foetor, sed recessit, ubi natura superauit.

*Resp. ad
3. argu-
mentum.*

Ad tertium Argumentum, ubi ex Gal. lib. 2. de diff. feb. cap. ultimo. pus conuertitur in cinerem; Ergo est vstro in humoribus: respondit etiam, & solutio est: putrescere in primis

humorem, deinde à calido innato posse vritenuiorem, & mutari in halitum, crassiorem in cinerem conuerti. Itaque huiusmodi vitio fit in materia ubi non est amplius putredo. Itaque non valet: fit vitio in tali materia; Ergo non est putredo: potuit fuisse.

Probat deinceps humores non putrescere extra uenas. Inquit, non gelascunt; Ergo non putrescunt. Consequentia leuissima. Congelascere & concrelescere est passio; quæ non conuenit omni misto sicut putredo: sed passio, ut lib. 4. Meteor. scribitur. Itaque corpora ex humido & sicco facile concrelescunt, quia habent admixtam substantiam crassam, cum parte terrestri; & quia sanguis in se habet fibras consequenter concreleat; reliqui, qui non habent fibras, non possunt. Propterea nulla est Consequentia, quando addit sinceris humores non putrescere in priuatis tumoribus. Prius enim est falsissimum. Id quidem verum est, in sinceris humoribus fieri difficulter putredinem. Videatis. Galenum. lib. 2. ad Glauc. cap. 7. in abscessibus, qui difficilem suppurationem, sed non impossibilem, inquit, &c. propterea in canetis uldebitis tandem transire in ulcus.

De Bile etiam dicebat Hip. sect. 7. aph. 20. *Quod Bile
lis putre-
scat.* Erysipelas transiisse in suppurationem: quam existimemus esse Erysipelas spurium, nihilominus Erysipelas ab humore prædominante. Sed demus, non putrescere, nisi obstitutionem sanguinis: in venis semper sunt humores admixti sanguini. Satis est, illas posse putrescere intra, & extra uenas.

Ad rationem de Melancholia, & Bile. Sunt humores sicci potentia, alii corpora humida, & ea tenus putrescunt.

Hactenus de substantia humoris putrescentis & quanquam difficultas de sanguine, maxima omnium, dabitur commodior locus de synocho putrida. Intelligetis, & probabo sanguinem posse putrescere sub propria forma.

Ex his omnes puto explosas hæreses ab antiquis & recentioribus propositas.

Dico omnes. Nam Gal. lib. 2. de diff. febr. c. 1. dicit fuisse sententiam admodum erroneam, omnes febres esse ex Bile non putrida. quam sententiam habet autor Libri de Natura humana pluribus uerbis (sive sit Hipp. sive Polybius, non tamen uidetur esse uel Hipp. uel Polybi, quia ibi fit mentio Synochi: appellatio autem Synochi tunc temporis, quando illi uixerunt, nondum fuit nota) sensu omnes seu magnam partem febrium ex Bile ortum duxisse, quod defendit etiam Iubertus omnium paradoxorum autor. Legatis istud paradoxon Paradox. 3. lib. 2.

Non desuerunt qui existimauerunt Putredinem non fieri in corde. Potest fieri, dico, in uasis communibus, determinatis extra uenas, in uentriculo &c. Intelligo omnes causas in humano corpore: intelligo omnia spatia inania, denique omnem locum extra uenas & arterias.

*Iubertus
omnium
parado-
xorum au-
tor.*

Sed fit aliquando putredo etiam in ipsis cordis ventriculis primario, & secundario.

In inter- Primario fit tantum in febribus perniosis, *mittenti-* quando vel ex contagio aeris putridi conin- *bis su-* quantur humores; vel si comprimuntur *pu-* spiritus intra cor, ex insigni obstructione vel *treantur* inflammatione pulmonum, ut non possint *euentulari*. Itaque siue ex aere externo, si- *ratione* ue interna causa spiritus inficiatur, potest *frigoris* fieri primario; secundario in quacumque alia *in ceteris* febre: quia nunquam potest appellari febris pu- *tratione* trida, nisi humores cordis putredinem suscipiant. *substan-* Sed, Domini, est dubium: si humores cordis *ta pro-* putrescunt; Ergo omnis febris erit pestilens *pu bu-* perniosa, ut colligitur lib. 3. de prae. ex pul- *moris cor* cap. 4. Sed facilis solutio, Loquitur ibi Gal. *dis.*

de putredine solida cordis substantia, non de putredine in corde contentorum: nomine solidae substantiae intelligo secundas humiditates per totum corpus distributas.

Explicavi haecenas varias humorum putredinis differentias: Exposui etiam proprium & commune huius subiectum: docui praeterea locum, in quo hi possunt putrescere: Succedit in praesentia, ut de causis sermo fiat.

Cause hu- Difficilis est haec tractatio, propter eorum *moru pu-* ferè omnium sententiam, qui existimant *eredimus.* apud Gal. nullam aliam reperiri humorum putredinis causam, praeter unicam prohibitam transpirationem. Ita inualuit haec opinio, ut Excellētissimi etiam viri in priuatis & publicis lectionibus, soleant omnem putridam febrem in prohibitam transpirationem, & obstructionem referendam esse contendere. Difficile igitur propter hanc tractionem difficilem, quia apud me longe distat à veritate.

Refuta- Qui igitur putredinis causam existimant *tur coru-* esse transpirationem prohibitam propter ob- *opinio q* structionem, mouentur autoritate Galeni *solā tran-* lib. 9. Methodi med. c. 3. & lib. 11. Methodi *speration-* med. c. 4. & alijs sequentibus pluribus, in his *em pro* locis solum huius prohibitae transpirationis *hibitam* mentio fit. Et ratione. nam si quae debent *causā ef-* putrescere, sunt calida & humida, ut ex Gal. *se docent* ostendimus, necessario talia putrescunt ob *putredi-* prohibitam transpirationem. Nam corpus *nus.* calidum non potest putrescere, nisi amittat propriam caliditatem, quod non fit, nisi ab alieno calore fortiore. Hic calor non aliam ob causam augetur, quam propter prohibitam transpirationem.

Haec sententia est contra rationem, & contra auctoritatem.

Quid pu- Quod contra rationem, facile est probare *redo?* ex Definitione Putredinis, quae siue naturalis sit, siue praeter naturam, semper est corruptio formae nisi similis ab extranea caliditate.

Calor igitur extraneus est ille, qui surripit calorem misti, & consequenter inducit putredinem. Si hic calor extraneus augetur ob solam prohibitam transpirationem; vera est illorum sententia: verum si etiā propter alias causas, quae est ratio, ut dicamus, putredinē

A fieri ex sola prohibita transpiratione?

Quod sic, adest ratio in illo libro de causis morb. c. 5. lib. 1. de diff. feb. c. 3. non tantum augetur ex prohibita transpiratione, sed et ex morbo, vicina corporis calidi, assumptis calidis, & putredine. Ergo causae variae & ex quinque: Igitur & quinque modis fit febris putrida. Legatis explicatissimis verbis apud Gal. lib. 2. de diff. feb. c. 9. cum supponisset sanguinem putrescere, eius etiam addit causam: His itaque mentio fit non vnius tantum causae, sed inquit sanguinem putrescere, quando separat ab extrema caliditate, ut est motus, vicina, &c. Auctoritas Gal. lib. de inaeq. intemp. cap. 7. inquit non tantum ex obstructione putredinē fieri, sed causis multis, quas inquit se alijs locis retulisse, quorum sunt duo; alter est citatus iam; alter est lib. de causis morb. c. 8. ubi inquit putredinem fieri ex obstructione, medicamentis putrescentibus, excrementis putridis retentis.

Vidit hunc locum Alimarus 1. parte, de feb. 33. inquit verum est Gal. asserere loco cit. putredinem fieri, ut diximus; sed inquit aliud est loqui de putredine, de qua lib. 11. Methodi med. aliud est loqui de corruptione: de qua lib. de causis morb. c. 8. quae non vera est putredo, sed corruptio tantum: propterea nomine putredinis intelligit generalem corruptionem. Sed eum hoc dixisse, mihi or; locus potest ab omnibus videri Gal. proponit; membrum posse corrumpi propter quatuor causas, per combustionem, refrigerationem, sectionem, & quartò, ubi putrescit. Quid est igitur, quod dicat generalem corruptionem intelligere, si speciatim vniuscuiusque meminit. est voluntaria interpretatio.

Aliqui aliter Galenum tuentur Cardanus 1. controu. tract. 2. controu. 6. examinat hanc difficultatem. Et quia vidit loca Gal. inquit, aduertite aliud est loqui de humoribus generatis, aliud loqui de generandis. Si sermo de genitis, non potest corrumpi, nisi propter prohibitam transpirationem.

Haec opinio est falsa. si n. vera esset haec sententia, sequeretur nunquam humorem posse putrescere à principio intrinseco. Cōsequens est falsum, ergo etiam antecedens. Veritas lib. 1. de diff. feb. c. 3. circa finem primo loquitur de multitudine quo ad vasa, & loquens de hac inquit, huiusmodi constitutere febrem putridā propter obstructionem & prohibitam transpirationem, postea de plenitudine, quo ad vires, inquit humores tunc putrescere, quando non amplius possunt vinci ab ipsarum venarum facultate: Igitur non fit hoc loco putredo à prohibita transpiratione.

Hinc lib. de curat. per sanguinis miss. c. 5. plenitudinem quo ad vires, facillimè putredinem inducere ait, & faciliore esse conuersionem humorum in putredinē in plenitudine quo ad vires, quam in altera. Ratio est quia calores non reguntur à calore innato. Ergo falsum est quod dicitur à Cardano.

Refuta-
tur Ale-
marus.

Refuta-
tur Car-
danus.

Nec dicat quis, quod Caprilius, qui do-
cissimè scripsit de febribus, inquit verum
quidem est, posse humores putridos gigni
absque obstructione, & prohibita transpira-
tione, sed isti febrem non inducunt.

Videtur accepisse ex Gal. lib. 1. de diff. feb.
cap. 3. Cum loquitur de humoribus, qui pu-
tridi, generantur propter cibaria assumpta;
inquit, quamquam illum locum non propo-
suerit. Sed hæc responsio nil nisi fuga est. Ve-
rum quidem est humores, qui sunt in primis
vijs, quamquam corrupti, nō facile febrem
inducere, nisi totius fiat corporis obstructio.
Verum si putredo fiet propter causam pro-
positam, poterunt excitare etiam febrem,
etiamsi non sequatur obstructio, & prohibi-
ta transpiratio; nec solum febris excitatur,
sed & febris maligna. Ratio: quia humores
isti, ubi putrescunt ex defectu facultatis ve-
narum, est putredo ex illa specie, quæ sit su-
perata natura, sit inquam quæ omnium de-
terrima constituit febres pestilentes.

Itaque falsum, fieri febrem, vel humores
putridos ex sola obstructione, & prohibita
transpiratione.

Cum igitur hoc falsum; veritas erit, hu-
mores putrescere immediatè ex causa exter-
na, vel causa intrinseca.

*Causa pu-
tredinis
externa
triplex.
1. Aer.*

Externa causa triplex: aer, cibus assum-
ptus, medicamenta putrescentia.

Quantum ad aerem, scribit Gal. lib. 1. de
diff. feb. c. 3. & 4. Ex aere putrido & pestilen-
ti, tales febres generari. fiat hæc receptio
quo modo velit, siue sit ex corporibus, legu-
minibus putridis, siue per transpirationem,
siue per respirationem: & ait, sit siue ex an-
tro, siue ex palustribus locis, siue ex corpo-
re putrido. Et hæc prima causa, quæ sit abs-
que prohibita transpiratione.

*2. Cibus,
& potus
putridus.* Secunda, cibus, & potus putridus. Si quis
in annonæ defectu aliorum ciborum assumat
olera, aut fructus; nam ex putrido putridum
fit, teste Gal. lib. de succorum bon. & vit. lib.
1. de diff. feb. cap. 3.

*3. Putre-
scētia me-
dicamen-
ta.* Tertia causa sunt putrescentia medicame-
ta, quæ docuit Gal. lib. 3. & 5. simpl. cap. 15.
Nomine putrescentium medicamentorum
intelligit septicum calidum & siccum in
quarto gradu, non putridum aliquod. Pro-
pterea ex hoc genere conficiuntur nostra
caustica communia.

Et propterea Galenus etiam secundo
acut. com. 12. prohibet frequentem usum
purgantium.

Ab antiquis usurpata erant admodum de-
leteria, & caustica: habetis externas causas.

*Causa in-
terna.*

Internæ, contactus à putrido, aut in-
temperis humoris putrescentis, aut calidi-
tas externa.

*1. Conta-
ctus pu-
tridus.*

Quantum ad contactum putridi, res est
clarissima, & propterea huiusmodi conta-
ctus potest fieri, vel à parte solida putrida,
uel ab humore.

A Parte solida quando iecur, lian, &c. tenta-
tur eiusmodi putredine. Puto vos obserua-
se in phthisicis, excitantur febres humora-
les putridæ.

Quod dico de parte solida, dico etiam de
humoribus. Omnes humores possunt co-
inquinari, ut signis putredo sequatur.

Secunda causa est Intemperies humoris
putrescentis, ubi humor quis redditur in-
temperatus vel humidior, vel frigidior, vel
facilior est ut in putredinem transeat.

*2. Intem-
peries hu-
moris pu-
trescentis.*

Contrahit caliditatem & frigiditatem,
dum generatur.

Ex obiecto, vel concoquente facultate.

B Ex obiecto, ubi generatur ex prauis ali-
mentis, oleribus, fructibus, &c.

Ex facultate autem, quando facultas ve-
narum uniuersi corporis non potest domina-
ri ipsis humoribus. lib. de cur. ratione per san-
guinis miss. cap. 5. inquit, sicuti in vetriculo;
ubi cibi corumpuntur, varie sunt corruptio-
nes, ad aridum, ad nidorem, &c. ita fit in ieco-
re, & venis, si cessat verbi gratia facultas san-
guificatrix hepatis, humidiores & frigidio-
res sunt humores. & alimentum conuertit in
eosdem prauos humores, qui etiā in ventri-
culo generantur. Legite hoc caput, quia est
pulcherrimum. Ita accidit etiā in iecore, &
venis, ut propterea generentur aliquando hu-
mores frigidiores, calidiores, humidiores.

C Corruptuntur autem geniti, quando nō
possunt regulari à calido innato partium,
lib. 1. de diff. feb. cap. 3.

Tertia causa est ex calore externo, quan-
do hic vincit calidum internum humoris.
Nomine calidi externi non intelligo solam
prohibitam transpirationem, sed omne cau-
sam, quæ habet rationem extrahendi cali-
dum innatum ab humore putrescente, siue
sit calor solis, motus, medicamenti accepti,
iræ immodicæ, &c. omnes poterunt putre-
dinem inducere per prohibitam transpira-
tionem. lib. secundo, de diff. feb. cap. nono.
Itaque hæc est vltima causa, propter quam
humores putrescant, calor scilicet extrane-
us quicunque.

*3. Calor
externus.*

Sed si sermo fiat de prohibita transpira-
tione, huius causæ non aliæ sunt, quam vel
obstructio ab humoribus multis, crassis, fri-
gidis & lentis Gal. lib. 9. & 11. Methodi med.
Multitudo augetur ex nimio cibo, otio, sup-
pressionē menstruorum, hæmorrhoidum,
intermissa alia consuetu euacuatione, vel
membro mutilato.

*Causa pro-
hibita
transpi-
rationis.*

Quantum ad crassitatem, & lentorem; cau-
sæ harum generantes sunt cibi frigidi, &
crassi, sicci, legumina, edulia ex pasta, caseus,
caro bubula, pisces crustati, quæ impellun-
tur in venas minores corporis, aut attrahunt.

Impelluntur propter vinum generosum,
aut cibos acres, aut diuretica.

Attrahuntur, vel ob nimiam exercita-
tionem, frictionem, balneum, insolationem
quam.

quancumque corporis motionem. Hæ sunt causæ, quæ putantur necessario efficere prohibitam transpirationem.

Præter has est etiam alia causa pulcherrima à paucis posita; non est tantum obstructio, quandoque causa referenda est in Facultatem, & Instrumentum.

Ratio Ratio propter quam fit transpiratio totius corporis est triplex: via aperta, facultas expultrix venarum, & arteriarum totius corporis, & obedientia instrumenti. Si non concurrunt hæc tria, numquam fit transpiratio. Si concurrunt tres causæ, quamobrem vnicæ tantum ad prohibitam transpirationem meminerunt, scilicet tantum viæ nempe obstructionis? Veritas est apud Galenum, qui lib. 11. meth. med. cap. 4. apertissimis verbis inquit, prohiberi inflationem, & transpirationem, si deficiat arteriarum obedientia, quam pauci viderunt, 3, in 3. epid. tex. 1.

Propterea non tantum prohibetur transpiratio ex obstructione, quantum etiam ex arterijs inobedientibus, & in his omnibus causis libera humorum transpiratio potest impediri.

Dicebam causas putredinis humorum alias immediatas esse, alias mediatas. Immediatas hæcenus explicavi, quandoquidem alias redegi ad externas, quædam ad internas. Inter externas est aer putridus, assumpta putrida, & medicamenta putrescentia. Internas contactus rei putridæ, intemperies, quæ declinet ad humidum & frigidum. Est denique externus calor, Superest in præsentia, ut solvamus quædam Dubia supra prolata, & Mediatas proponamus Causas.

I Dubium. Primum dubium est contra totam determinationem, qua diximus putredinis humorum esse plures causas. Galen. authorit. lib. 9 meth. med. c. 3. lib. 11 meth. med. c. 4. & seq. in quibus solus prohibita transpirationis meminit, à qua putredo producatur.

Responsio. Non est difficile his locis satisfacere: non loquitur de causa putredinis, cuiusq; febris, sed de synochis, seu continentibus. Vultis hoc videre? Legatis lib. 9. meth. med. cap. 3. inquit, esse in fieri in corporibus, &c. iungit corpora frigida & humida longè abesse ab hac febre, &c. Ego puto. verumne sit, solum calida & humida corpora febrem incurrere, an verò etiam alia?

Hoc est certissimum, & inquit, talia corpora non incidere in febres, de quibus ibi meminit, scilicet synochas.

Pariter lib. 11. meth. med. c. 5. non proponit causas vniuscuiusque putredinis; inquit, quærendam esse causam cur humores putrescant in vasis communibus, hoc non est querere causam cuiusque humoris.

Propterea isti existimant putredinem particularem esse causam cuiusque febris, & decepti sunt.

2 Dubium. Aliud dubium; Quia dictum, humores

A posse febrē excitare, dum sint putridi, quavis non adsit obstructio. Cōtra est Gal. lib. 1. de diff. febr. cap. 3. ubi scribit, corpora posse humores corruptos contrahere ex paucis cibis, & tamen inquit, &c. vide locum.

Sed, domini, etiam hoc dubium facile soluitur. Ibi facit verba de humoribus corruptis adhuc existentibus in primis vijs, quæ siue euacuentur per alium, siue etiam paulatim in illis vijs quiescant, siue patientes quiescant, ut nō attrahant humorem in totum corpus, non potest febrem efficere. Causa est, tollitur corruptio, & non consequitur febris, sed si exerceant inmoderate corpus, subsequitur.

Hoc quidem verum est, sed aliud est loqui de corruptione facta in primis vijs, aliud de putredine facta in venis, de qua sermo.

Itaque respondendum sermonem fieri de corruptione in primis vijs.

Tertium & ultimum dubium: Quia dictum est humores, qui defleunt ad frigidum, & humidum, esse aptos ad suscipiendam putredinem. Rationem attuli. Hæc determinatio cōtra Aristotelem, & Gal. 3. in 3. epid. tex. 1. c. scribit ea, quæ sunt frigidiora, difficilius putrescere ceteris; Idq; accepit ab Aristot. lib. 4. meth. med. cap. 2. congelata minus putrescere, quàm cetera.

Solvitur ita: aliud est loqui de refrigeratione naturali, & propria: aliud de vitiosa, & extranea.

C Si supponamus dari corpus à natura frigidum & siccum, aut frigidum & humidum, difficilius putrescit, quàm calida & humida. superficies enim est magis densa.

Sed si sermo sit de refrigeratione præter naturam, aliter se res habet. Quando res redditur frigidior, amittit propriam qualitatem, mistumq; redditur facile ad putredinem. Vbi igitur mistum amittit vires, disponitur ad putredinem.

Venio ad Causas mediatas, quæ sunt, propter quas humores contrahunt intemperiem, de qua dictum est, frigidam & humidam: sunt illæ etiam propter quas calor extraneus in corporibus augetur.

Quantum ad primum genus, quædam naturales, aliæq; præter naturam.

Ex Naturalibus est Temperamentum calidum & humidum: frigidum & humidum: A Etas naturalis, senilis; Sexus muliebris.

Ex causis non naturalibus est præcipue cibus & potus; qui multoties disponit humores ad putredinem, primò ratione quantitatis, quando plus assumunt, quàm ut possint concoquere.

Idipsum fit etià ex qualitate, quando cibi sunt admodum frigidi, vel humidi, ut olera, cerasa, melones, pepones, cucurbitæ, cucumeres, citrulli: Cuiusmodi est etiam ipsum lac, &c. generant paruos humores.

Idipsum contingit, ubi obtineat qualitatem necessariò corpori inimicam. ut naturatum & omnia acrida.

C 2

Idipsum

Idipsum dico de illis, quæ difficilius possunt conuertere in substantiam nutriti, propter suam crassitiem, ut fungit, tubera, &c.

Reponitur quoque inter causas istas ordo assumendorum ciborum, ut primo esse astringentia, deinde quæ facilis corruptionis; ut prius mespila, deinde lac, cerefa, &c.

Idipsum sit ratione præparationis, & quando cibus assumitur antequam prior sit concoctus, & exierit.

Alias plures non naturales Lib. 13. Fen. 3. Tract. 2. c. 2. proponit Auicennas.

Præter cibum & potum est etiam Aer, qui maximam habet vim ad excitandam putredinem. Talis est australis, pluuiosus, qualem 3. aphor. 16. Hippoc. facile putredinem inferre scribit.

Est etiam aer conclusus ferè immobilis, in carceribus, aut in locis, quæ occluduntur à montibus. Propterea scribit Aristoteles 13. Problem. 17. & 14. Problem. 17. eos, qui habitant in his locis conclusis, citius cæteris senescere & mori.

Sed aduertatis per aerem immotum, non oportere intelligere penitus immotum, sed qui difficile potest moueri, & distillari. Sic in aliquo loco, ubi aer non perflatur, non putrescunt corpora. 22. Prob. 4. 23. problem. 17. Ratio est in promptu. Nam ubi prorsus immotus, nullam facit illius corporis contenti distillationem. Et ibi non opus ventilatione.

Itaque in ruribus plenis aere mundo fructus liberè conseruatur.

Propterea etiam antiqui inuenerunt usum lucernarum duorum, aut trium millium annorum; sicut fuit una inuenta in agro nostro Patauino, factum per summum artificium, ut aer neque ingredi, neque egredi potuerit.

Contingit idipsum in fructibus conseruatis in ruribus.

Aer qui lente mouetur, potest putredinem inferre.

Cause præter naturam. Cæteræ causæ non naturales sunt, intermissio exercitiorum, retentorum excrementorum portio, Vigiliæ nimia, somnus, curæ, anxietas.

Causæ præter naturam sunt omnia vitia partium principalium, quæ debent humores concoquere, siue ventriculus, siue iecur, siue lien, in quibus fiunt concoctiones.

De vitijs harum partium superiore anno egimus.

Quantum ad causas, propter quas prohibetur transpiratio, has esse partium defectum facultatis mouentis arterias, partim ipsius arteriæ vitium, siccitatem, crassitiem, duritiem, densitatem, à duritie, crassitie humorum.

Est densitas cutis ab aere, astrictio ab usu astringentis medicamenti.

Qui igitur sæpius vtuntur cibis astringentibus, facile possunt incurrere febres ex astrictione cutis propter prohibitam trans-

pirationem, &c.

Hactenus de omnibus causis putredinis; superest, ut repetam vobis Definitionem febris putridæ, ut accedamus, à quibus recessimus.

Diximus igitur, febre putridam nihil aliud esse, quam calorem extraneum putredinosum in humoribus cordis primario accensum ex putredine.

Dixi esse calorem putredinis, quia, ut superius exposui, necessarium est in quacumque febre putrida humores cordis recipere in se aliquam saltem fuliginem putridam: quæ fuligo aliquando eleuatur ex materia putrescente in ventriculis cordis, aliquando ex alio loco.

B Si ex materia putrescente; vel putrescit ibi primario, vel secundario.

Primario ex accepto aere putrido, aut propter prohibitam transpirationem sanguinis huius loci.

Secundario corrumpitur, ubi putredo est in venis communibus, & magnis.

Putrescit autem humor cordis tantum ratione fuliginis; quando humor fuerit distans à parte cordis.

Si petatis, qui sint isti humores? possunt esse, vel alimentales, vel excrementitij.

De Differentijs Simplicibus Februm Putridarum in Genere. Cap. VI.

C Absoluta Putridæ febris Definitione, ad Differentias, & earum Causas descendam.

Putridarum Februm Differentiæ plures quidem sunt; & quædam vniuersales, aliæ vero minus vniuersales, imo singulares; & priuatae. Nunc temporis, quia sermo est de Putridis in genere, versabimur circa Differentias & Causas differentiarum in genere.

Vniuersales putridarum differentiæ, aliæ simplices sunt, aliæ compositæ.

De Compositis habebimus particularem tractationem, propterea eas hoc loco intermitteremus.

D Quantum ad Simples: simplices, quæ aliquam exposcunt speculationem, sunt istæ.

Februm putridarum aliæ Continuae sunt, aliæ Intermittentes.

Rursum ex Continuis quædam sunt continuæ Continentes, Synochi vocatæ; quædam Proportionatæ, quæ exacerbationes; & periodos continent.

Rursus continuæ, quæ habent circuitus, & exacerbationes (Notate, quia hæc distinctio non ex alijs colligitur) sunt in duplici adhuc differentiâ; aliæ habent exacerbationem, quâquam nullam sensibilem declinationem; altera differentia illarum, quæ etiâ si exacerbant, habent tamen alias exacerbationes per intensiones, siue declinationem aliquam, habent et remissiones. Colligunt ex Gal. & maximè sunt ad artem.

Quæ habent declinationes, aliquæ habent declinationes admodum sensibiles, ut depo-

Quid febris putrida.

deponant magnitudinem, duritiem, frequentiam, & celeritatem pulsus: Aliquæ habent declinationes, sed non deponunt celeritatem, quamquam deponant magnitudinem, duritiem, frequentiam.

Prima differentia Continuarum Proportionatarum; quæ exacerbantur, sed non declinant, colligitur ex se 4. aphor. 43. ubi inquit Hippoc. febres quacumque non intermittentes per ventam fortiores sunt, magis periculosa sunt. Quocumque vero modo intermiserint, quod sine periculo sunt, significant. Hic est sermo de febribus continuis proportionatis. Sed huiusmodi sunt febres, quæ exacerbantur, absque declinatione, ut scribit Gal in eom. & nos obliuiscimur in praxi, dari continuas exacerbatas.

Hæc est una differentia.

Alterâ est eo, tum, quæ non deponunt celeritatem pulsus, quamquam deponant magnitudinem, duritiem, frequentiam.

Aliæ vero quæ deponunt magnitudinem, duritiem, frequentiam, & celeritatem, quandoque à Medicis vocantur continuæ, quandoque intermittentes. Communiter Febres Subintrantes, quæ ex sui natura sunt intermittentes, sed propter materię visciditatem, non possunt ad integritatem desinere. Ex eom. 1. in 3. Epid. text. 2.

Quantum ad Intermittentes, ipsæ quoque sunt aut Typicæ, aut Erraticæ.

Typicæ sunt, quæ habent certum & ordinatum circulum; suntque in triplici differentia.

Aliæ enim vocantur Tertianæ, aliæ Quotidianæ, aliæque Quartanæ.

Quæ quidem ipsæ quoque adhuc subdividuntur: nam aliæ simplices, duplices, triplices, quadruplices.

Rursus diuiduntur; quia aliæ Exquisitæ, aliæ Nothæ.

Si de Typicis sit sermo, cum Galeno libro secundo de differ. febr. capite octauo, sunt tantum sex, tres continuæ & tres intermittentes. Quæ sententia fuit causa deceptionis plurimorum, qui existimant, vniuersaliter hoc esse intelligendum, nec plures nec pauciores reperiri. propterea sanguineam dixerunt nullam dari. Sed decipiuntur. Galenus ibi proponit numerum tantum Februm typicarum: non loquitur de illis, quæ carent circitu, vel habent circuitus inordinatos Vultis hoc videre? Legatis locum de typis cap. 2. excipit febres Synochos & erraticas.

Præter istas differentias aliæ sunt magnæ, paræ, acutæ, chronicæ, benignæ, malignæ, duas proposuit Galenus 1. in 6. Epid. 29.

A De causis Differentiarum Simplicium Februm Putridarum in genere: & primum de Continuant tam Conclufarum, quam Periodicarum. Cap. VII.

H Actenus proposui Putridarum februm præcipuas Differentias; succedit ut omnium causæ diligentissime inquirantur: sumpto initio à Continuis tam conclusis quam Periodicis, & Intermittentibus. Hæc diligens inquisitio magni momenti. Docet enim nos locum affectum, & causam febris Estote itaque attenti.

B Communis est opinio, omnem Februm Materiam contineri in venis communibus: distingui a febribus Continentes à Periodicis, & Conclufis hac ratione; quod in Continuis continentibus materia putrescat, in vasis omnibus vel saltim magnis cordi proximis. Accipiunt hanc sententiam ex Galeno, lib. 11. meth. med. c. 4. & 9.

Quantum ad febres continuas periodicas; eas inquirunt fieri, quia putrescit materia in venis communibus, sed à maioribus ad minores venas transmitti.

Quantum ad intermittentes, dicunt fieri, quod quamquam materia in venis continetur, trahuntur tamen à venis ad ambitum corporis, putrescit propterea in eo ambitu; hinc fit Febris Intermittens.

C Hanc sententiam putant se accipere ex Galeno, lib. 2. de diff. febr. c. 2. & lib. 2. de cris. c. 3. & 6. & sect. 4. aph. com. 63. in quibus locis inquit Galenus, Materiam febris Intermittentis differre à materia continuarum. Hæc est, ut dixi, communis opinio circa causam februm omnium, quæ tamen in multis & à Galeno & à veritate dissentit.

Incipiam à febre Continente.

Primo si sermo fiat de febre Synocha continente, accipio sententiam fieri ex putredine vasorum omnium, vel maximorum. Sed si dicant ita fieri, ut non in vasis determinatis, falsum. Probabo n. autoritate Galeni, & rationibus, quod etiam in vasis determinatis.

D Galenus docuit hoc 1. in 6. Epid. text. 2. circa finem. (locus pulcherrimus) fieri posse Febrem Synochum ex putredine sanguinis contenti in utero, &c. Quocumque modo fiat, inquit, sit febris continens; si sit febris ex utero. Ergo non ex vasis communibus.

Præterea 2. de fract. com. 23 Hippocrat. inquit fieri ex fracturis, &c. docet rationem Galenus, quia ex huiusmodi fractura venę disrumpuntur, & affectus nervis communicatur.

Præterea, Febris Ardens est febris Synochus, continens, continua conclusa, ut lib. 2. de differ. febr. c. 2. & lib. 2. de cris. capit. 6. Galenus inquit febrem ardentem, si quis synochum vocauerit, non aberrauerit, &c. Certissimum est Febrem Ardentem reponi inter Continentes;

tes; tunc dico febrem ardētem fieri magna ex parte ex vasis determinatis: Ergo & cōtinens. quod testatur Galenus 4. acut. com. 1. & 12. c. 1. in 1. Epid. text. 9. 1. in 2. Epid. text. 27. & 37. febres ardentes inquit fieri ex materia putrescente in vasis, & propterea lib. 2. etiam de crisib. 7. dicebat febres ardētes malignissimas fieri; & lib. 3. loc. affic. 7. inquit ardentes febres fieri ex materia putrescente in pulmonibus, & esse perinde continuas continentes.

Itaque certissimū est ardentem febrem, quae synochus dicitur, non tam ex cōmuni-bus vasis, quā determinatis fieri posse.

Habet eandem veritatem Auicē. 1. lib. 4. tract. 2. c. 41. dum inquit febrem ardentem fieri ex putredine pulmonis, &c. secutus Galenum locis tit.

Et ne quis existimaret febrem non esse continentē, capite sequenti inquit hanc habere temporum occultationem. Et ideo Galenus etiam 4. acut. com. 12. loquens de hoc casu, quem ego puto continentem, cōtradistinguit ab omnibus tertianis, necessarium ergo, esse continentem continuam.

Prima itaque haec opinio corrui. nam sit etiam ex vasis determinatis.

Secunda opinio, continuas periodicas fieri transmissa materia à venis magnis ad parvas, peccat in duobus. Primum est in iusticiens; secundò est falsa.

Quod insufficiens, probo argumentis; primo quidem non assignat causam earum Febrium Periodicarum, quas diximus habere exacerbationes, sed non declinationes. Itaque in his febribus eorum opinio locum nō habet.

Deficit secundò, quia non assignat causam circuitus febrium in febribus continuis ex inflammatione; in his materia non continetur in venis magnis nec parvis. Gal. lib. de inaeq. intemp. cap. 4. inquit, quotidianam posse esse continuam, quia materia non potest transmitti, si non est in eis.

Tertiò non est sufficiens lib. 2. de diff. feb. cap. 4. inquit, quotidianam posse esse continuam propter humoris copiam & crassitiam.

Præterea falsum; quia haec opinio non proponit causam exacerbationis, sed declinationis.

Ego ipsis concedo materiam magnā esse causam periodicarum, id est, est causa periodi. Haec oportet docere cur postea reuertantur. Si dicant inquinamentum humoris; falsum in biliosis, lib. 2. de diff. feb. c. ult. cineres non relinquuntur.

Si dicant, est humoris putrescentis portio, quae relinquitur. Videamus an hoc verum. Si sic. petam quamobrem haec materia, quae habet totam substantiam propinquam, non corrumpat eam semper; Hoc Domini, non est meum quaesitum, sed Galeni lib. 2. de diff. feb. cap. ult. ubi inquit: si esset in vasis cōmuni-

bus, corrumpere humorē vicinū. falsa itaque haec sententia.

Quantum ad intermittentes, falsa etiam est communis opinio, Intermittentes ideo fieri, quod transmittatur materia à venis ad extra venas. Primò quia hoc Gal. rarò aut numquam dicat. Inueni illum dicentem, materiam febrium intermittendum contineri extra venas pluries, sed quod à venis ad extra venas, non inueni. Hoc non dico, quod non possit fieri, sed quod loca, ex quibus hoc demonstrant non concludant. Loca in quibus Galenus huius meminit sunt; lib. 2. de diff. feb. cap. 2. lib. 2. de cris. cap. 3. & 6. & 1. in 2. Epid. text. 28. & 30.

Sed præterea haec sententia est contra Galenum, & contra rationem. Galenus in illo lib. 2. de diff. feb. cap. 5. non dicit Febrium Intermittentium focum esse intra venas, sed inquit magna ex parte. Idem lib. ad Glanc. c. 4. & 5. rarò inquit incipere absque ventriculi affectione. Itaque non semper materia continetur in ambitu totius corporis.

Fernel. lib. 4. cap. 16. etiam multas habet rationes contra hanc sententiam. 1. est efficax à varijs symptomatis: Videbitis Intermittentes, in quibus est oscitatio, fluxus biliosus; in his materia non transmittitur ad corporis ambitum. Haec fiunt, quia materia peccat in visceribus.

Secunda ratio, in pluri bus Intermittentibus vrinæ sunt omnes sanæ: sed si vrinæ sunt indicium affectuum venosi generis, debent hanc ostendere putredinem.

Tertia ratio. Præterea si in venis, unica venae sectione deberet euacuari, & nulla amplius febris residere.

Accedit, quod nulla esset ratio, quamobrem fierent 2. vel 3. vel 4. tertianæ.

Accedit, quod, ut ipse inquit febres quartanæ deberent esse breuissimæ, & datur tamen, quae perdurat duos, tres, & quatuor annos, quia humor aliunde pendet.

Itaque propter has causas, & hanc quam addo, aliquando has febres Intermittentes biliosas curari vnico vomitu.

Venio in hanc sententiam, falsam esse etiam opinionem. Sed quia Fernelius non fuit contentus hanc sententiam explodere, sed voluit probare numquam & nusquam posse in ambitu corporis reperiri, non accipio, & rationes illius sunt nullius momenti, nihilque concludunt.

Nam quando dicit materiam non posse momento temporis ad extra mitti: Dicam iam fuisse dispositam ad huiusmodi transmissionem.

Quod dicit nō momento temporis vsque ad extremas partes. Sunt nugæ; volunt tantum transmitti ratione inordinationis, de quo egi in proprio tractatu de Rigore.

Quod etiam dicit ex Pituita Vitrea & Bile discurrēte fieri posse rigores, verum est. Er-

go nō transmittitur materia ad extra uenas. A
Nego Cōsequentiam. Cū igitur sententia
haec falsa, expendamus iam alias meliores.

Docui hactenus, Febres Continuas conti-
nētes posse fieri etiam in determinatis par-
tibus. Deinceps ostendi Continuas Periodi-
cas non fieri ex sola putrescente materia ē
venis maioribus ad minores.

Quantum ad Intermitteutes prouli Fer-
nelij sententiam cōtra opinionem commu-
nem: nūc uidendum, vtrum alia melior opi-
nio circa has causas inueniri possit.

Quantum ad Continuas Continentes,
omnes in hanc sententiam deueniunt, non
aliter posse fieri, quā putrescente materia
inuenis communibus cordi proximis.

Quantum ad Continuas Periodicas, trans-
missa materia ē uenis maioribus ad paruas.

Iul. Alexand. in Annot. c. 4. lib. 11. Meth.
& lib. 1. ad Glauc. aliam protulit sententiam,
Febres Continuas Periodicas fieri etiam ex
putredine humorum in uasis determinatis,
uel iecoris, uel pulmonis, ut docuit Galen. in
libris proximē citatis.

Quantum ad Intermitteutes, quia res dif-
ficilis, uariae existunt sententiae.

Fernel. lib. 4. pathol. c. 19. uoluit, omnem
februm intermittentiū focum esse circa
uiscera & prae cordia: numquam sentit fieri
posse ex putredine humorum in ambitu to-
tius corporis.

Rationes audiuitis in praecedentibus, quae
in hoc tantum ualent; posse aliquando in-
termittentes febres ex uisceribus ortum
ducere; quod uerō propterea sequatur, Er-
go non ex putredine in uasis communibus,
nihil concludunt.

Purgant ergo haec sententia cum Galeno
& ratione.

Cum Galeno quia libro secundo de cris.
cap. 6. & 4. aph. 63. &c. testatur febres inter-
mittentes ortum ducere ex materia discur-
rente per ambitum totius corporis.

Cum ratione; quia aliquando materia pu-
trescens potest attrahi in corpus propter in-
signem caliditatem, siccitatem, uel dolo-
rem. Quid enim prohibet exsiccatō corpore,
aut calefacto, quō minū attrahantur ex-
crementa ad corporis ambitum.

Hanc ueritatem docuit Gal. lib. 4. de cris.
capit. 1.

Potest & in eodem ambitu generari, quia
dantur temperamenta calidissima, & siccis-
sima, quae circa omnes partes biliosum suc-
cum habent.

Quod dico de bilioso, dico etiam de pi-
tuitoso, teste Gal. co. 1. in 2. Epid. tex. 20.

Propter has itaque causas reprobāda Fer-
nelij sententia hac in parte; & ita potest in
ambitu putrescere, ut Altimarus parte 2. de
feb. c. 3. & 2. hunc unicum existimauerit ge-
nerationis februm intermittentiū modum;
non accipit Fernelij sententiā, nec p̄dorem,

sed tantum transmissa materia à uenis ad ex-
tra uenas. Vide locum.

Sed haec quoque opinio falsa, numquam
generari febres intermittētes ex uisceribus:
corruit ex rationibus, quas audiuitis. Au-
thor lib. 1. ad Glauc. 5. ubi aperte scribit fieri,
uel iecore, uel uentriculo, uel liene laboran-
te: pariter lib. 2. de diff. feb. cap. 3. inquit, ple-
rumq; iecur & lien affici, 5. in 6. Epid. 31. fie-
ri ex putredine humorum in cauitate uentri-
culi, quanquam Hippocr. dicat, explicat Ga-
lenus hunc locum.

Hinc factum est, ut Caprilij, & Iul. Alex.
loc. cit. uoluerint febres Intermitteutes ali-
quando fieri ex uisceribus, aliquando mate-
ria peccante in ambitu totius corporis. sed
semper dicunt hanc materiam esse extra
uenas, ut Iul. Alexand. si in liene, in substan-
tia carnea lienis, non in uenis.

Quantum uerō ad ambitum totius corpo-
ris, inquit materia est extra uenas.

Hac sententia est ceteris probabilior. Nō
probat in hac parte, quod uelit febres in-
termittentes fieri in ābitu nulla ratione con-
sentiente putredine cum uasis totius corpo-
ris. Et ratio, cur, nō probetur, desumpta par-
tim est ex Gal. lib. 5. l. a. c. ult. scribit quem-
dam inuenem liberatū à febre ardēte trans-
missa materia ad ambitum totius corporis,
ut subsequuta sit Icteria. Si febris Ardens
soluitur transmissa materia ad ambitum; quae
igitur ratio, si existente materia intra uenas?
At Hipp. 4. aph. 62 & 64. scribit Icteriā an-
te 7. malam; post, bonam: pariter 64. Ratio-
nem considerat Galenus, quia ante diem 7.
biliosa materia nō potest criticē transmitti:
transmittitur autē ad ambitum corporis: &
tamen soluitur febris. Quid clarius? trans-
mittitur à uenis ad extra uenas, & soluitur
febris. non fit febris intermittens.

Accedit ratio. Nam Galenus lib. 2. de diff.
feb. c. 12. lib. 3. de praef. ex puls. c. 7. ubi expli-
cat causam principij febris, quam obrem in
principijs accessionū fiat refrigeratio totius
corporis, pulsus parui, inquit causā esse, quia
materia mouetur ad interiora. Si hoc uerū,
materiam semper cōfugere ad uiscera. Ergo
non peccat tantum in ambitu totius corpo-
ris, ita suffocat, ut etiam in principio acces-
sionis homines aliquando moriantur.

Ostendo nunc ueram causam. Et quānum *Veracem*
ad continuas conclusas attinet, nolo ut acci-
piatis primum tria fundamenta, super quae *con-*
fundatur causa februm propositarum. *cluse.*

1. *Omniem Continuarum Synochorum conclusarum*
causam esse Putredinem humoris alimentalis.

Omnis febris Intermitteutis causa est Humor ex- *Tria sū-*
crementitius. *crementitius.* *damēta.*

Februm Continuarum periodicarum causa ali-
quando est solus humor excrementitius; aliquando
alimentalis, & excrementitius.

Probo haec: Quod humor alimentalis
sit causa februm synochorum, probatur
auth.

authoritate, & ratione.

Authoritate: nam humor alimentalis est sanguis acceptus pro massa omnium humorum in venis.

Itaque Auic. Fen. 1. Lib. 1. tract. 3. c. 1. inquit, & putredo quidem sanguinis facit febrem Continuum continentem.

Sed probatur etiam ratione; volunt febrem Synochum ex putredine intra venas magnas ideo fieri; quia obtinet tres conditiones; quarum prima est, ut materia putrescens nunquam deficiat. 2. quia huiusmodi putredo facile communicatur ipsi cordi. 3. tertia, quia in venis ipsis non facile potest transpirare fuligo putrida. Sed istae conditiones habent locum in sanguine tantum.

Hoc igitur stante fundamento; quando quaerimus, num febres continentes fiant ex vasis communibus: Dico non tantum ex vasis communibus, quantum determinatis. Si quis quaerat causam; non tantum est intemperies partis, quam morbus instrumentalis, vel morbus communis, nempe vlcus: ita ut possit dari febris continens ex intemperie partis principalis ex inflammatione, scirrho, putredine partis. Singula probabo.

Quod febris continens possit fieri ex vasis determinatis.

Primum quod ex vasis determinatis possit fieri febris continens, probabo ratione.

Dictum est Causam continens febris esse sanguinem putrescentem, potest itaque fieri febris continens etiam ex vasis determinatis.

Est causa triplex, prohibita transpiratio, &c. omnia haec sunt in vasis determinatis partium principalium. Hoc est clarissimum. Propterea Galenus 1. in 6. Epid. 2. inquit fieri febrem continenter ex sanguine in vtero consistente, & 2. de fract. cap. 21.

De Continentibus seu Synochis febribus duo mihi praecipua probanda proponam. Primum, continuas febres non tantum ex vasis communibus, sed etiam determinatis prodire. Secundum, febres continentes aliquando etiam cum inflammatione, vel Erysipellate, vel abscessu, vel scirrho, vel putredine partis determinatae nasci. Primam conclusionem probabo 1. Febris continens oritur ex putredine humoris alimentalis; igitur potest fieri in vasis determinatae partis aliquid praecipue.

Probo consequentiam: siquidem in his partibus abundat humor alimentalis. Ergo eo putrescente potest excitari Synochus.

Secundo, febris continens fit ex putredine vasorum communium, vel saltem maximorum cordi vicinorum: venae pulmonis, oris ventriculi, & iecoris sunt proximae cordi. Ergo in istis potest excitari febris continens.

Si quis dicat non posse ex locis determinatis, quamquam venae magnae cordi; proximae, quia iste humor non possit ita pridem putrescere, ut in vasis communibus: Probo, quod magis in determinatis, quam communibus possit putrescere, hoc argumento.

In vasis communibus sanguis non putre-

A scit, nisi, quia est prohibita transpiratio, uel quia venae obtinent intemperiem talem, cuius ratione sanguis corrumpatur. Igitur argumentor sic: in venis determinatis potest corrumpi ex intemperie, obstructione, Erysipellate, putredine partis. Igitur plures causae concurrunt ad corruptionem in venis determinatis, quam in venis communibus.

Quod in vasis determinatis ex illis causis, ex quibus etiam in communibus, testatur Galenus lib. 3. loc. affect. cap. 7. inquit ex intemperie frigida iecoris sanguinem in eo contentum corrumpi, ex quo febris lenta, & continua, &c. Vide locum. Itaque ex parte determinata certissimum est corrumpi sanguinem.

B Quantum ad obstructionem, dubium est num ea febrem inferat necne? Ratio dubitandi est: quia 1. acut. 12. ex obstructione iecoris febrem non fieri propterea lib. 2. loc. affect. cap. 8. inquit, ubi sensus gravitatis in hypochondrio dextro percipitur, si sit absque febre, ostendit uel obstructionem, uel abscessum ibi contineri: si cum febre, inflammationem ibi adesse. Ideo obstructio absque febre: Et tamen dixi ante, &c. Quae est ratio? Obstructio consideratur ratione materiae, ex qua fit, & quae est in causa, ut sanguis in eo uiscere contentus putrescat.

C Si ratione materiae ex qua fit, non est necessarium, ut obstructio febrem exciteret; sed fieri potest, ut frigidi, leni, & crassi succi, obstruant venas totius corporis, & consequenter putrescat sanguis propter prohibita transpirationem. Gal. lib. 2. de diff. feb. c. ult.

Quantum ad inflammationem, quod haec corrumpat sanguinem in parte determinata: minime est dubium. Quia in omni inflammatione est conversio sanguinis in pus; in inflammatione continetur sanguis intra; & extra venas: Quae extra venas, est materia, quae faciat putredinem, & facit febrem, quae per circuitus exacerbatur lib. 2. de diff. feb. cap. ult. ubi scribit ex sanguinis corruptione in parte determinata duo mala sequi alterum, &c. Non tantum corrumpitur sanguis, qui stuit extra venas, sed etiam qui intra lib. de inaeq. intemp. c. 3. inflammationem duplicem esse ut lib. de totius morb. intemp. c. 6. inquit totum membrum corrumpi, ut fiat deinde gangraena, sphacelos, superante inflammatione facultatem membri.

Itaque certissimum est, etiam corrumpi sanguinem intra venas, ubi potest fieri febris continens.

Hanc veritatem colligo ex Galeno 1. in 6. epid. com. 2. inquit febrem continentem fieri ubi sanguis multus in utero continetur, cum, uel citra inflammationem. Quid clarius? Concedit, & cum inflammatione hanc febrem fieri posse, & sane in istis locis, ubi fit sermo de praecipuis inflammationibus internis, nulla fit mentio ullius exacerbationis, 2. pgn.

Num obstructio febris inferat.

text. 4. vbi inquit Hippoc. si caput, manus, & pedes frigidi sunt ventre costisq; calentib⁹ malum. Et Gal. in com. inquit continuus est febris, nō facit mentionem circuitus, Similiter 4. aph. 48. vbi scribit Hippoc. in febris non intermittentib⁹ si partes exteriores frigida; interiores vntur, & sitim habeant, lethale: inquit Galenus in com. sermonem fieri de febris ex inflammatione viscerum. Idipsum docet 1. aph. com. 7.

Et propterea apud Galenum plurima sunt exempla febrium ex inflammatione. Ita scribit 1. in 6. epid. tex. 29. Phrenitidem habere mordacem caliditatem aequaliter per omne tempus, & totum corpus diffusum. Quid sibi vult, & per omne tempus, nisi febrem esse continentem.

Pariter lib. 5. de loc. aff. c. 3. de icore; multa exempla 3. in 3. epid. in casu Hermocratis inquit, primò tentatum fuisse igne. Inquit Galenus nomine ignis eum intelligere febrem in com. probat ex inflammatione icoris productam fuisse, &c. & 3. in 3. epid. per totum librum. Certum igitur est, continentes fieri etiam aliquando ex inflammatione, quæ potest corrumpere sanguinem alimentalem in venis determinatis.

Idipsum fieri potest etiam ex Erysipellate. Ideo libro secundo de cris. cap. 7. inquit ardentissimas febres malignas fieri ex Erysipellate pulmonis, oris ventriculi, icoris, exquisitè ardentes. quorum signa 3. in 3. epid. 34. duo sunt, sitis inextinguibilis, & calor exferens. Sed sic est, quod lib. 2. de cris. sit sermo de his febris, & dicit eas ortum ducere ex Erysipellate pulmonis, aut icoris.

Quod dico de his, etiam de abscessu, & scirrho intelligendum. Nomine Abscessus intelligo non atheroma, steatoma, Meliceriden, quia hæc febrem nullam inferunt lib. 2. loco aff. cap. 8: sed illos, qui inflammationes consequuntur. Si inflammatio in pus conuertatur, ex his febres continuæ fiunt.

Constantissimum igitur, febres continuas ex vasis determinatis fieri, & huiusmodi affectiones producere.

Obiectio. Sed video vos dicturus; primum quidem dubium est, ex vasis determinatis, quomodo possit fieri febris continens, quia Gal. lib. 2. de diff. feb. cap. vi. in fine, hæc uerba pferit. *Febres omnes, quæ circuitus habent, ortum ducunt ex locis determinatis: quæ autem Synochi ex putredine in vasis communibus, vel maximis, & cordi proximis; unde uidetur colligi febrem ex locis determinatis habere circuitus.* Pro responsione possemus dicere, aliud esse febres, quæ per circuitum repetit, ortum ducere ex locis determinatis; aliud febrem, quæ ex locis determinatis ortu ducit, habere circuitus. Verum quidem est febrem, quæ per circuitum repetit, ortum ducere ex locis determinatis; Non autem uerum, omnes, quæ ortu ducunt ex locis determinatis, habere circuitus.

A Contra hanc negationem est iterum Galenus lib. 9. meth. cap. 5. quæ igitur solutio stantia. huius loci?

Dico pro consideratione, Galen. nomine loci determinati intelligere illum, qui necessario habet aliquam affectionem magni momenti, vel Erysipelas, vel Scirrhum, Obstructionem, vlcus. In istis verum est febres fieri, quæ certo ambitu redeant. quia putrescit non tantum succus excrementitius, sed etiam alimentalis.

Si excrem. putrescit, habent omnes periodum: si non; possunt fieri in parte determinata.

B Alia solutio; febres continuæ sunt in duplici differentia. Exquisita seu legitima, & spuria.

Legitimæ Continentes duas habent conditiones; fiunt ex sanguine alimentali putrescente. De his lib. 9. meth. med. cap. 3. vbi inquit febrem synochum fieri tantum in temperamento calido, & humido.

Spuriæ Continentes sunt in triplici differentia; aliæ ratione loci; aliæ ratione humoris; aliæ ratione loci, & humoris.

Hanc distinctionem febris Legitimæ, & Spuriæ colligo ex Hipp. & Gal. 3. in 3. Epid. 34. ibi Hippoc. proponit febres ardentes absque siti & magno calore. Galenus miratur, qui fieri possit; proprium signum est, sitire. Et tamen inquit Hipp. &c. Itaque concludit Hip. dari febres ardentes legitimas, & spurias.

Idipsum dico quoque de continentibus. Dantur Legitimæ, & Spuriæ ratione loci, & humoris.

Spuriæ ex humore, quando s. sanguis in venis non est admodum probus, sed cacochymus, vel biliosus, vel pituitosus, vel melancholicus. In hoc casu fit Febris Melancholica conclusa, sed non determinat, vbi sanguis cacochymus. Talis est materia synochi, qualis est natura sanguinis: si prædominatur pituita, fit synochus pituitosa; si melancholia, continens melancholica, sed tanta melancholiæ copia non datur.

D Dantur aliæ Continentes præter naturam, quæ ex nimio calore icoris, & ventriculi generantur. sect. 4. aph. 25. loco bilis naturalis generatur æruginosa prassina. In his casibus ille sanguis est alimentalis, & tamen ita prauus, ut si ex hoc febris excitaretur, esset quidem continens, sed continens maligna, quæ excitatur ex sanguine maligno.

Idipsum fit ex prauis succis, ut colligitis ex Galen. lib. de bon. & malis succis, per totum librum.

Verfabor in diluendis Dubijs, cum dictum sit dari febrem ex communibus, & determinatis vasis, cum intemperie, inflammatione, scirrho, abscessu, & vlcere. Contra has difficultates primò Gal. autoritas, qui lib. 9. & 11. meth. scribit febres continentes, synochos ortum ducere ex putredine in vasis & communibus

munibus, & sanguine. Et propterea lib. 9. A meth. med. cap. 3. inquit Synochum fieri ex vasis communibus. & 1. in 6. Epid. secundo, Synochum fieri ex sanguine putrescente: & tamen nos determinauimus ex venis determinatis.

Accedit, quod lib. 2. de diff. febr. cap. vlt. & lib. 9. meth. c. 3. scribit, febres habere periodos, quæ ex locis determinatis oriantur, quia Galenus & Hippoc. febres Ardentes volunt habere circuitus. 1. in 2. Epid. 75. 3. in 3. Epid. 36. vbi pariter sermo est de Legitima ardēte. inquit eam habere accessiones, & Galenus in com. inquit mirabile est, quod habeant accessiones: Ergo falsum febres ardentes esse continentes; nam habent exacerbationes.

Falsum quoque febres ex inflammatione esse continentes. quia vbi Hipp. 4. aph. 43. scribit febres quæcunque non intermittentes tertia die Fortiores fiunt, magis periculosa. Gal. in com. inquit, febres ex inflammatione viscerum tertia quaque die fiunt fortiores; Ergo habent accessiones. Idem dicit Galen. sect. 1. aphor. com. 12. de Phrenitide, & Pleuritide.

Quid Galenus peruenias magnas intelligat.

Hæc sunt dubia. Primum quidem quod ad Galeni auctoritatem lib. 11. meth. cap. 4. Continentes fieri ex putredine vasorum in vasis communibus. Dicimus Galenum vasorum maximorum nomine intelligere etiam vasa pulmonis, iecoris, ventriculi, vteri; quæ non sunt vsque adeo parua, vt inter maxima reponi non possint.

Et ideo Hippoc. 1. in 6. Epid. 2. loquens de vtero, inquit, quibuscunque ex deperditione circa vterum & tumoribus in capitis gravitatem permutatur, in principio dolores, & quicunque alij ab vteris, istis octo aut decem mensibus in coxendicem finiunt, &c.

Accedit quod idem Galenus scribit synochum fieri, vel ex vasis communibus, vel ex vasis inter alas & inguina, inter quæ pulmones, ventriculus, iecur, & vterus.

Itaque has omnes partes possumus amplecti; atque hæc auctoritas non obest.

Quoad ex altera parte, non fieri synochum nisi ex sanguine. Respondeo Synochus est duplex Legitima, & Spuria.

Legitima, quæ fit ex sanguine putrescente in vasis communibus.

Spuria est triplex: ratione loci, ratione materiae, & ratione vtriusque.

Ratione loci; quando fiat in vasis determinatis. Dicimus cum Galeno hanc non esse legitimam Synochum; satis est, posse fieri synochum.

Est Spuria ratione materiae, quando distat à natura sanguinis materia putrescens; quando fit ut feruetur sanguis naturalis, vel ut fiat sanguis præter naturam.

Servatur naturalis, quando fit sanguis biliosus, prædominante bile naturali, vel pituitosus; uel sanguis melancholicus, si tamē sic

ri potest. Sed datur sanguis pituitosus, & biliosus; in quibus casibus potest fieri Synochus biliosa, pituitosa.

Biliosa uocatur propriè Ardens, de qua Gal. lib. 2. de diff. febr. c. 2. quando dicit, febrem ex Bile aliam esse Continentem, aliam exacerbationes habentem.

Pariter lib. 2. de diff. febr. cap. 6. constituit febrem Ardentem continuam.

Et paulo post subiungit, siue hanc appellaueris Synochum, nihil interesse prævalente pituita. Hanc Arabes uocant Laticam à latendo Gal. sect. 1. aph. 12. Succensam, seu Typhoden.

Sed si humores distent ab humore sanguinis, sintque præter naturam, faciunt febres continentes, sed alterius conditionis. Si exempli gratia, pituita falsa, sit febris synochus, quam uocant febrem ardentem ex pituita falsa, teste Hipp. 2. acut. à tex. fen. 13.

Potest etiam humor distare à natura sanguinis, quia ad modum malignus. Aliquando enim ex cibis, nimia iecoris caliditate, generantur succi ita prauis, ut omnino maligni appellentur. partes uniuersi corporis abhorret ab hoc sanguine; fugiunt carnes hoc alimentum. Gal. in lib. aduersus Iulianum c. 7. inquit, in febribus pestilentibus huiusmodi humores putrescere. Dabitur itaque spuria febris ex omnibus istis humoribus.

Est Spuria utroque modo, quando in vasis determinatis continentur isti humores multum distantes à natura sanguinis. Et si putrescant illi humores æruginosi, constituent malignam pestilentem; si pituita falsa, sit ardens ex pituita falsa. 4. acut. 16.

De his sermo est apud Gal. com. 21. in 1. prorrh. vbi Hipp. scribit febres ex hypochondrijs, malignæ. Inquit Gal. non omnes, sed quæ, fiunt ex affectione iecoris, ventriculi, & ex inflammatione, & appellantur acutæ; neque omnes, sed quæ fiunt ex magna inflammatione.

Cum dicebatur, febres, quæ ex locis determinatis ortum ducunt, habere circuitus lib. 2. de diff. feb. cap. 2. & lib. 9. meth. cap. 3. huic auctoritati satisfacio; Galenum scilicet per locum determinatum patientem intellexisse, non illum, qui continet humorem putrescentem cum partis intemperie, sed qui habet uel inflammationem, uel Erysipelas, uel alium morbum communem.

Veritas loci citubi ostendit causam huius circuitus, qui in febribus apparet, semper utitur inflammationes exemplo; ubi autem inflammatio, ibi necessariò etiam circuitus.

Quantum ad aliam rationem, febres ardentes ex sententia Hipp. & Galeni habere circuitus; dico ardentem febrem dupliciter accipi Lib. de palp. & rig. cap. 7. communiter scilicet, & propriè.

Propriè pro uero & legitimo causo.

Com-

Ardens febris duplex significatio.

Communiter, pro omni febre biliosa.

In primo sensu amplectitur omnes febres biliosas tam Synochum, quam Periodicas.

In secundo tantum Synochum, seu Causum uerum.

Itaque quando scribunt causum habere accessionem, intelligunt de non uero.

Alia solutio. Febres ardentes ex locis determinatis, siue cum, siue sine inflammatione possunt habere circuitus, & ita periodi quandoque apparebunt, quandoque non.

Aduerte. Volo accipere illud fundamentum, causam febris Continentis esse humorem putridum: ubi igitur affectio in parte determinata, in hac præter humorem alimentalem colligitur tertia etiam coctionis excrementum. Igitur ubi partem determinatam occupat, fieri potest ut non tantum alimentalis, sed & excrementitius humor putrescat. Vbi hoc, præter continentem aderit febris, quæ per circuitus exacerbatur, & hic circuitus quandoque apparet, quandoque non apparet.

Apparet, quando putrescens materia superat quantitatem humoris alimentalis, & circuitus erit conspicuus: ubi humor alimentalis superat excrementum, circuitus aderit, sed non apparebit.

Quæ ratio cur humor alimentalis superetur ab excremento? contingit, quia pars, quæ affecta est, non tantum potest continere excrementum, quod in se ipsa generat, sed etiam propter imbecillitatem potest recipere ab illis partibus lib. 2. de diff. feb. cap. ult. Itaque fieri potest, ne laesa pars non solum generet excrementa, sed recipiat modò ab hac, modò ab altera parte.

Vbi vi colligitur excrementum tantum illius partis, quod est paucum, in hoc casu obsecratur periodus. quia feruor tantus, ut calor, qui exacerbatur, non potest ostendi; humor alimentalis maior. Et propterea cohibet ne appareat periodus.

Et hæc solutio etiam satisfacit auctoritatibus Galeni, in febribus ex inflammatione fieri circuitus, non semper hoc contingit, sed quando excrementum superat humorem alimentalem.

Causa continens continua.

Verlabor in re admodum difficili, uidelicet, in proponenda causa continuæ febrium continentium, nec non periodicarum continuarum & intermittens. Et hæcenus causam exposui Synochorum siue continentium.

Quæ causa est ista? Ideò fit febris continens, seu Conclusa seu Synochus, quod putrescit humor alimentalis, ut alimentalis est, & idcirco putrescit ille humor in uenis communibus & determinatis, seu cordi proximis antequam exeat excrementum illius partis: ubi adhuc est in loco illo, nec euasit adhuc excrementum, uocatur adhuc humor alimentalis, qui facit continuam continentem: quia egreditur humor, semper abundat, & suppeditat spem nouam materiam, quæ putrescit & corrumpit.

A Nonne Humor Alimentalis intelligitur omne illud alimentum, quod generatur vel in corpore sano, vel aegro, siue sit corpus sanum temperatum, vel intemperatum; dum modo humor sit paratus, ut debeat corpus nutrire, semper dicitur alimentum. Si igitur generetur prauus sanguis, generat febre continentem.

Quid nunc humorem alimentalem intelligatur.

Addo hunc humorem alimentalem, quicumque fuerit, aliquando primario putrescere in uenis, aliquando secundario.

Primario, ubi in uenis non continetur alius humor excrementitius: secundario, quando alius humor excrementitius, a quo incipit putredo, de quo humore nunc loquor.

B Quantum ad periodicas, difficilius est multo tractatio, quam superior: in hac parte proponam primo Causas Periodi in genere; intelligetis postea, quamobrem fiant Periodice Intermitteutes, & causam, cur quædam febres periodice sint continue abique declinatione: Et cur quædam hæc habeant exacerbationes, cum horrore, refrigeratione; alie non: deinde causam, cur alie ex periodice continuas habeant declinationes non admodum sensibiles, & cur alie admodum sensibiles: loquar deinceps de Intermitteutibus; postmodum causam harum protensarum & breuium, & causam febrium duplicium, quæ duplitem, compositarum postea transibo ad declarandam causam periodice typicæ, seu ordinatæ.

Causa periodica in genere.

Quantum ad primarias, Græcis, Latine, sonat circuitum. Huiusmodi Periodus, seu circuitus est tempus quoddam accessus, & recessus rerum. Sic enim tempora anni videntur habere periodos, quod per statuta tempora recedant & redeant in humano corpore.

Huiusmodi reditus, & recessus dupliciter fit, naturaliter, & præternaturaliter.

Causa periodice in genere.

Naturaliter in Alimentis, & Excrementis. In Alimentis, quia sicut post faciliem chylicationem chylus excernitur, & rapitur in secur, & quando statuto tempore secernitur bilis, & mittitur ad vesicam felleam.

In Excrementis, quia quotidiè in sanis eguntur hora statuta: idem modus seruatur in exercenda urina, & sanguine menstruo.

Præter naturam fit periodus, vel ratione Symptomatum, vel Morborum.

Symptomatum, tam in excrementis, quam in Actionibus mutatis.

In Excrementis, quia quibusdam statutis temporibus fiunt vel vomitus, vel Diarrhæe, sanguinis fluxiones, sudores symptomatiæ, &c.

Ratione Actionum, quibusdam fiunt periodi Dolorum articularium, nephriticorum; alijs periodicè leduntur alie actiones, nempe aliquis motus.

Quod dico de Symptomatis, dico etiam de Morbis, qui habent etiam suas periodos, præcipue Febres. Periodus hæc, auctore Galeni, non est,

Quid periodus febris.

no est, *intensionis, & remissionis febris*. Quid est hoc tempus Intensionis? nil aliud, quam quod constat ex triplici tempore, Principio, Augmento, & Statu. Tempus Remissionis, quandoque vnicum, quandoque duplex. Vnum in febribus Continuis declinantibus. Declinatio scilicet duplex, in Intermittentibus, tempus reditus motus, in quo reditus, fit quidam motus.

Quæritur, quis sit hic motus? duplex; primus localis, alter alterationis: ita vt hæc periodus sit tempus motus localis, vel alterationis humorum.

Est motus localis, præcipue in Symptomatis, quæ pertinet ad excrementa mutata. Nā vbi debet fieri symptoma in genere Excrementorum immodicè fluentium, necessarium est naturam mouere localiter humorē, & detrudere ad locum expulsionis.

Sed nō tantum huiusmodi excrementa immodicè fluentia supponūt hunc motum, sed & alij Morbi, Dolores articulares, nephritici, Febres ipsæ. Exempli gratia: si humor quiescat in capite, & fiat dolor, hic humor necessariò mouetur ad renes: Pariter in febrili ab ignobili, ad præstantē, & sic facit febrē.

Quandoque ex motu fiunt tantum alterationes, quando materia iam collecta excrementitia ibi retinetur propter inflammationem, aut abscessum; retenta putrescit, corrumpitur, & ex hoc nouo motu fit noua periodus, & tamen non adest motus localis. Descendo ad causam.

Cum fiat ree fluxus, & recessus? Quare redit symptoma, vel febris, postea desinit? Non potest esse materia alimentalis, quia hic motus fit ab aliqua materia, quæ facultati expultrici est grauis & noxia quocumque modo, scilicet propter pondus, molem, morbum, teste Gal. lib. 3. de nat. fac. cap. 12. Ideo materia non alimentalis, quæ corpori non est infesa; Est igitur excrementitia.

Sed quia materia excrementitia alia est prima, alia secunda, alia tertiæ cōcoctionis, non credatis, Domini, materiam, quæ excipit periodos febrium, esse excrementum, aut primæ, aut secundæ, sed tertiæ. Hoc accipiat tamquam primum suppositum.

Quodnam est excrementum primæ cōcoctionis? Feces. Improbitas alimenti transit in feces; ex fecibus, vt docui aliquando, fiunt febres, sed febres Ephemeræ. Nunc loquimur de Putridis.

In ventriculo generantur primum feces, alia excrementa, pituita, aliquando bilis viridis, prassina.

Humores bilioli & salsi transmissi; sed non excrementa Primæ cōcoctionis, sed tertiæ.

Ventriculus consideratur duobus modis: primo, vt promptuarium totius corporis, vt organum, in quo conficitur Chylus; deinde

vt est pars nostri corporis, quæ vt alia, cupit nutrir.

Quādo organum commune generat propriè excrementum primæ cōcoctionis, feces vt pars, quæ nutritur, possunt generari excrementa varia, quæ tertiæ cōcoctionis excubis, pituita, bilis, &c. nihilominus si ventriculus eo humore vteretur pro suo alimento, non persisteret ibi.

Quamobrem verò persistit? Quia ventriculus, vt debet nutrir, non nutritur ab eo, sed cum fugit. hinc fit humor excrementum tertiæ cōcoctionis, idē & sanguis naturalis dicitur excrementum tertiæ cōcoctionis; quando nimis abundat & partes tanquam onus illum expellunt.

Excrementa Secundæ cōcoctionis sunt, vtraque bilis, flaua, & nigra, serum, succus etiam crudus.

Huiusmodi humores quatenus excrementum secundæ cōcoctionis, sunt alimentales: Nam ex melancholia naturali alitur licet ex bile vesica fellis. Itaque ex his humoribus, aut non fiunt febres, aut non sunt periodice, sunt Continentes.

Excrementum tertiæ cōcoctionis est illud, quod semper facit febres periodicas; Quodnam est hoc? Est illud, quod fit & augetur a quacumque parte corporis determinata.

Per partem determinatam intetligo non organum, sed similem.

Et idē excrementum Tertiæ cōcoctionis est illud, quod generatur, quando pars hæc determinata suscipit alimentum.

Hoc excrementum duplex est, tenue, & crassum. Docet hoc Gal. lib. 3. met. c. 3. & lib. 1. de tu. val. c. 12.

Tenue, est portio illius serosæ humiditatis, quæ distribuitur cum sanguine ad omnes partes corporis, vt sit quasi vehiculū alteri.

Crassum, portio impurior, quæ relinquitur post nutritionem.

Huiusmodi Excrementa euadunt præter naturam, ratione obiecti alimenti, & ratione partis nutriendæ.

Ratione Alimenti, quando illud aut nimis superabundat, quam partibus necessarium sit; vel quando impurum, vel quando adert vtraque conditio.

Est multum & peccat in Quātitate, quando sanguis nimis abundat: quod fit in intermissione exercitij, &c. uni parti excrementum, alteri alimentum.

Deinde quandoque colligitur in tanta copia, ut pro uasis seminalibus sufficiat, & pro gignendo semine.

Peccat excrementum ratione Qualitatis, quando impurum generatur, quando ex prauis cibis generatur sanguis prauus: partes determinatæ hunc augebunt; si sanguis sit pituitosus, augebunt pituitam; si biliolus, bilem.

Augetur

Angetur autem excrementum præternaturam non ex obiecto, sed ex partis determinata latione lib. 3. de sympt. caus. c. 2.

Partes determinatae laborant aliquando morbo. Alimentum, quod confluit ad hanc partem, etiam si sit probum, tamen propter hanc partem mutabitur excrementum tertiae concoctionis.

Certum est omnes morborum motus periodicos præternaturam prodire ex motu huius excrementi Tertiae concoctionis, ut Gal. docet lib. de causis morborum cap. 6. & lib. de cibis bon. & mal. lib. c. & lib. 1. de diff. feb. c. ult. ita ut omnis ratio periodi consistat in motione excrementi tertiae concoctionis.

Cause periodice febrilis. Febris periodica tria habet causarum genera 1. est formale, de quo dictum hætenus. est autem tempus intensiōis, & remissionis febris.

2. Materiale illa scilicet materia, quæ mouetur in hac periodo: quam dicebam esse excrementum tertiae concoctionis. quod excrementum tertiae concoctionis probo ratione, & testimonio Galeni.

Ratione quidem; etenim hæc materia, quæ debet periodam febrilem constituere, debet esse partibus determinatis infensa, vel propter copiam, pondus, mordacitatem. Sed sic est, quod nulla materia excrementitia vel prima, vel secunda concoctionis est inteta, &c. Ergo sequitur, quod illud excrementum, quod debet efficere periodum, debet colligi in parte determinata, teste Galeno libro secundo, de diff. feb. cap. ult. & lib. 9. meth. c. 3. ubi dicit, omnem periodi causam referri debere in partes singulas determinatas, quæ generent excrementa, vel retineant.

Itaque quodcumque excrementum colligitur in fine tertiae concoctionis, est causa omnium morborum periodicorum.

Sed dicit quis: nonne etiam colliguntur excrementa morborum in ventriculo, & iecore, & primæ & secundæ concoctionis? verissimum hoc, quæ sunt apta ad excitandas febres periodicas; sed illa excrementa sunt quoque excrementa tertiae concoctionis. Do exemplum, ventriculus ubi chylum generavit, necessarium est, ut probus transeat ad iecur, de quo nullus periodicus est affectus.

Si corruptus, aut statim excernitur per intestinum, & tunc nullum facit morbum: aut retinetur in ventriculo, & euadit excrementum tertiae concoctionis. Ratio, ubi retinetur, si esset bonum, deberet transire in nutritionem ventriculi, ut scribit Galenus lib. 3. de nat. fac. c. 13. Itaque totum, quod retinetur, potest esse materia alimenti ventriculi; & propterea ubi non alteratur, statim transit in excrementum tertiae concoctionis. Quia ventriculi membranæ abhorrent ab hoc alimento.

Idipsum dico de iecore, si augeat excrementa naturalia utilia, vel mittit ad propria loca, in quo casu nullus fit morbus.

A Si retinentur in iecore, pars vel totum, contingit iecori; quod diximus contingere ventriculo. quia retinet simul sanguinem, bilem, pituitam, quæ deberent mitti ad alia loca, quia iecur tantum debet retinere quod ad sui nutritionem est necessarium.

Habuitis, quæ sit materia, quæ facit motum periodicum, excrementum scilicet tertiae concoctionis. Hoc quandoque colligitur in partibus determinatis, quia non potest euacuari per sua loca consueta. Præterea Galen. lib. de morborum causis, cap. 6. circa finem, tunc fieri inquit morborum originem, ubi retinetur excrementum, ubi loca fuerint conspiciata, aut non possint excerni. Et singillatim pluribus lib. 9. de usu part. c. 1. exemplo mucigeniti in cerebro id comprobatur. Itaque hæc est prima causa, retentio. scilicet excrementi.

2. Collectio excrementi propter copiam, vel prauitatem alimenti, si fluat plus alimenti, vel sit corruptum, partes abhorrent. Et colligitur excrementum tertiae concoctionis pro varietate partis, & humoris.

3. Causa est partis ipsius vitium. Etiam si igitur alimentum fuerit laudabile, ex partis tamen vitio coaceruantur excrementa.

Hætenus exposuimus Causam Formalem, & Materialem periodi.

Efficiens est illa, quæ mouet excrementum tertiae concoctionis.

C Nomine motus intelligo localem, & alterationem, non statim ac collectum est, facit febrem, & alium morbum, aliquando hoc contingit, aliquando verò colligitur in corpore, & quiescit diu, & augetur.

Quando collectum statim febrem facit, necessarium est ut facile putrescant, & ut pars, in qua colligitur, sit valde sensibilis.

Vbi autem colligitur in corpore in maxima copia, excrementum non est mordax, vel pars, in qua colligitur, non admodum sensibilis. Et propterea in cavitatibus corporis, ventriculo, intestinis, spatio inter intestina, & ventriculum, cavitatem vteri, spatiis inanibus, in omento, mesenterio, pancreate in capacitatem thoracis, substantia cerberi, ambitu totius corporis, & ut dixi, in maxima copia; quia non est mordax. Siue igitur in locis iam dictis, siue alijs collectum moueatur ad putredinem, certum est, esse causam febris periodicæ. Causa, quia hic humor, si de nouo generetur, est in loco illo, in quo generatur, aut in alium transmittitur. Vbi generatur de accessione in accessionem, fit, quia illa pars, quæ generat, & retineat excrementum, & statim putrescat, ex quo excitatur humor, & dolor, quod fit, ubi hoc excrementum facit calorem febrilem. Ex his quid fit trahitur etiam excrementum ab alijs partibus, & adhuc magis repletur.

Et ideo in hoc casu fit principium accessionis, quod vocatur tempus intensiōis, Græci *παροξυσμὸν*, Latini exacerbationem in qua continetur & Principium, & Augmentum, & Status.

Huiusmodi congeries ex tribus temporibus vocatur paroxysmus, exacerbatio, quando materia putrescit, & lædit partem, & calorem inducit.

Idipsum fit, quando materia transmittitur ad aliam, ubi infert calorem, humorem, & consequenter habebit eundem statum.

Succedit huic temporis declinatio, & quandoque interuallum, quandoque digeritur, & consumitur, vel euacuatur, quando euacuari potest, quod est secundum tempus remissionis, siue cessionis à motu.

Si contingat affectionē partis, quæ excrementum generauit, perseverare, tam diu perseverabit accessio, quam diu materia.

Quod si materia iam sit collecta, & in corpore resideat in maxima copia in dictis partibus, tunc huiusmodi materia, aut tota simul putrescit, aut pars. si tota, aut in maxima copia, facit potius Continentem, quam Periodicam.

Si pars putrescit, periodicam duobus modis; quia pars transmittitur à loco, in quo est, ad alium.

Dabo exemplum.

In pancreate, vel omento collecta multa materia excrementitia fieri potest, ut tunc contrahat aliquam intemperiem, in quo casu excalescentia iecoris fieri potest, ut portio huius materiæ, quamquam non putrescat, trahatur in iecur, & febrem excitet.

Idipsum dico si pars collecta in cavitate ventriculi, vel venis communibus. Dū enim consistit contractione valida calorem indueit.

Succedit, ut audieris, causa periodi tam in Continuis, quam in Intermittentibus.

Hæc causa non est usque adeo difficilis. lib. 2. de diff. feb. cap. ult. Erit febris continua, sed periodica, quando excrementum tertiarum coctionis collectum sit multum crassum, vel facultas sit debilis, & languida.

Contra verò ubi materia sit pauca, tenuis in loco aperto, & habeat huiusmodi naturam facultatem corporis validam, necessariò fit febris intermittens; ut pauca enim facile euacuatur; ut tenuis facile item.

Sed difficilior, & a nemine explicata est causa varietatis continuarum. Dixi enim dari continuas, quæ nullas habent declinationes; habent quidem exacerbationes, sed non declinant: habent exacerbationes, sed semper ita validas, ut non habeant declinationes; 4. aph. 43. aliquæ habent declinationes, aliæ pulsi non deponunt celeritatem; aliæ, in quibus deponunt. Itaque oportet inuenire horum causam.

Quantum ad primas, cum quærimus causam, propter quam dantur febres continuæ periodicæ non declinantes; dico duobus modis fieri posse hanc febrem.

Primus est, quando materia generatur de accessione in accessionem.

Secundus, quando periodica fit ex ea materia, quæ multa collecta est in corpore.

Venio ad primum modum: primus fit, quā pars aliqua determinata tentatur inflammatione, aut alio morbo instrumentario, præcipue magno: ut non tantum corumpatur excrementum tertiarum coctionis, sed etiam alimentum partis. Do exemplum: In inflammatione in iecore, in qua materia est extra venas; propterea excrementum tertiarum coctionis quandoque contingit, ut inflammatio sit parua, ut non corumpat alimentum: aliquā magna, & totum membrum fit gægrina. Vbi igitur talis fuerit, ut corripat excrementum & alimentum, fit continua periodica, sed quæ nullas habet declinationes.

Alio modo potest fieri, quando materia multa sit collecta in venis communibus, ita ut venæ repleantur hoc excremento, quamquam non corrupto.

Si corumpatur, corrumpit etiam sanguinem alimentalem; fieri potest, ut huius portio transmittatur ad partem determinatam, ad cerebrum, pulmones, &c. Et ibi faciat inflammationem, tunc duplex oritur febris, continens in vasis communibus, proportionata ex inflammatione illius partis ad quam transmissa est materia. Hæc est causa febrium continentium periodicarum non declinantium.

Materia periodi febrilis ut dicebam, est quod colligitur in tertia coctione.

Causa Efficiens huius periodi est una, vel plures, ex facultatibus naturalibus partium determinatarum, quando generant, & corrumpunt excrementum, vel genitum transferunt ad alium locum, quando inducit calorem, ruborem, tumorem & si ostendi possit, ubi humor dissipatur, pars relinquitur sine calore, tumore, & rubore: succedit secundum tempus remissionis, quoties humor de nouo colligitur, & in parte retinetur.

Causa autem periodi tam in continuis, quam intermittentibus, pendet ex multitudine, crassitie, loci densitate, facultate, partis imbecillitate, aut ex oppositis.

Sed quia ex continuis periodicis quedam sunt, quæ exacerbantur quidem, sed non declinant: aliæ exacerbantur & declinant, quærebamus harum febrium causas.

Dicebam & repeto, causam esse, quia in febribus periodicis, quæ non declinant, putrescunt simul & semel alimentum, & excrementum. ubi hoc, est febris periodica non declinans; ubi putrescit tantum excrementum tertiarum coctionis, est continua, quæ habebit declinationem, & ut melius intelligeretis rem. proposuimus quatuor causas continuitatis periodicarum, copiam, crassitiem, loci densitatem & facultatis imbecillitatem. Vbi omnes simul concurrunt ad faciendam continuam periodicam semper illa est continua sine declinatione; si deficiunt aliquæ ex istis habent declinationem; sit exempli

gratia

Causa periodi tam in continuis, quam in intermittentibus.

Cur quædam continuæ habeant exacerbationes, sed non declinationes.

Materia periodi febrilis. Causa efficiens.

gratia febris, in qua materia sit multa, crassa, locus obstructus, & facultas debilis. Vbi locus obstructus, siue venę communes, siue loci determinati, semper materia ibi collecta corrumpitur, ubi retinetur excrementum, putrescit: si putrescit, etiam corrumpit humores propinquos alimentales, teste Gal. lib. 2. de diff. febr. c. ult. quod est caput aurei, consulo, ut illud diligenter legatis, in quo tota hæc materia continetur.

Idipsum contingit, si facultas sit debilis, siue intelligatis expultricem, siue alteratricem.

Si Alteratrix, aut non potest sanguinem conuincere propter frigiditatem, aut corrumpit propter caliditatem, cum, vel sine materia. Vbi igitur ista continuitatis causæ adiunt, semper necessitatio corrumpitur alimentum, unde febres periodice sed non declinantes; in quo genere primò febris, inflammationes ad sunt partium principalium. Si inflammationes magnæ sunt, febres continuæ periodice, sed quæ nunquam declinant.

In hoc genere sunt etiam febres ardentes ex putredine humorum in vasis cordi proximis, uel communibus, de quibus in superioribus egimus. Et Gal. in 1. Epid. com. 10. idem testatur.

Dantur inquam febres continuæ periodice non declinantes, non tantum ex inflammatione, quantum ex putredine contenta in venis partium propositarum.

Istæ etiam habent aliquando suas periodos, & ut dicebat Galen. 3. in 3. Epid. 6. in diebus paribus.

In hoc genere sunt quedam continuæ periodice: ex vasis communibus, quales sunt illę, in quibus aut aliqua portio tenuior magis toruola propter copiam excernitur à venis ad extrâ uenas, quando ob insignem venarum plenitudinem non potest humor retineri, quæ excitat horrorem, uel rigorem leuem, & facit tales febres.

De his loquitur Galen. in com. 43. 4. particaphor. Quando scribit Hippoc. febres quæcumque non intermittentes de tertio fortiores sunt, magis periculosa sunt, &c. inquit, in com. hæc esse duorum generum, ex inflammatione, & magna putredine. Et de his uera sententia Hippocrat. quod aphor. 46. ubi inquit, si rigor incidat, febre non deficiente agroti iam debili, lethale est. Galenus in com. inquit, aliud est dicere, si rigor inciderit, aliud si incidat. Vide locum. Habetis itaque tres differentias febrium continuarum periodicarum non declinantium.

Transeo modo ad Declinantes. Continuæ declinantes erunt illæ, in quibus deficit aliqua ex conditionibus propositis, & debent ita carere hac cōditione, ut non corrumpatur humor alimentalis, uel in modica quantitate, uel in loco admodum distante à corde. Sed quia dictum est has periodicas declinantes adhuc esse in duplici differentia; alie

A quæ deponunt pulsus duritiem & celeritatem, alie quæ non; causa, propter quam non deponant; pēdet ex loco affecto, & affectione, ubi pars aliqua determinata afficitur inflammatione, abscessu, vel tumore alio, ita ut materia sit extra uenas, pulsus non deponit duritiem, & celeritatem. Ratio est in promptu, ubi materia est extra uenas cum inflammatione, ut dictum est, non deponit duritiem, quia materia extēdit partes membranas, nervosas, ex quibus fit durities.

Non celeritatem, quia dum continetur extra uenas cum tumore, non potest euacuari.

B Dissoluitur, quia totus non potest digeri humor, hinc istæ febres declinant quidem, sed non deponunt pulsus duritiem & celeritatem. Hoc non est in imaginarium: uideatis Gal. lib. 2. de diff. febr. cap. ult.

Potestis dicere, ubi pars habet inflammationem, semper corrumpit alimentum. Hoc est falsum, quia propterea dixerat in inflammationibus consimilibus quandoque fieri unicam accessionem, quandoque tunc, ut explicauit ibidem, quando materia noua non transmittitur ad partem.

Itaque potest contingere, ut pars inflammata non corrumpat alimentum, & contineatur excrementum extra uenas, hæc quæ febris est continua.

C Quod si materia continetur in uenis communibus, uel determinatis, cum robore ipsius partis, in tali casu febris erit continua periodica, & maxime declinans, in qua non relinquitur celeritas in pulsu, nec durities.

Ratio: quia in hoc casu materia cum non contineatur in loco arcto, illa sub finem accessionis transmittitur ad uenas minimas, ut aliquando possit extra uenas uacillare.

Et quantum ego potui intelligere ex scriptoribus, putō hæc unicam harum febrium causam eos cognouisse scriptores. Est uera, sed non semper, sunt etiam aliis modis propositis, immo ratio hoc accedit, quia materia febrium periodicarum est excrementum tertie cōditionis. Efficiens loci determinatum lib. 1. de cur. rat. per uen. sect. c. 4. Ideo cum multe sint corporis partes, facilius est ut febres periodice fiant ex parte determinata, quam ex uenis communibus.

Ex his patet ratio, propter quam ex cōtinuis propositis alie capiunt cum rigore & refrigeratione, alie exacerbant sine his symptomatibus, sed tantum habent incrementum caloris.

Exacerbantur cum rigore, quæ fiunt ex locis determinatis, uel locis uenarum cōiunctis.

Ex locis determinatis, quando materia, quæ facit febrem, sit admodum actis, & mordax, & excitat inflammationem in parte admodum sentiēte, qualis est membrana phreniticothi, incipiunt cum rigore maximo.

Fiunt etiam rigores, ut dixi, ex locis cōi-

bus, comodo, quem paulo ante explicavi, quando materia ita est copiosa, ut non possit tota in venis contineri. Hinc Galenus lib. 1. ad Glauc. cap. 5. inquit, continuas febres habere rigores, sed paruos; habent rigores paruos, quando materia est mordax, & locus minus sensibilis.

Fit refrigeratio duplex: quædam est admodum prolixa, & vehemens; alia parua, quæ tantum fit in principio accessionis.

Vbi vehemens, & perseverans per totum tempus accessionis, fit ex magna inflammatione viscerum. in quo casu inflammatio magis pertingit ad carneam substantiam visceris. Exempli gratia, caro jecoris, aut pulmonis repletur multo sanguine, &c. Hæc est doctrina Gal. 4. prog. com. 5. se. 3. aph. 1.

Quod si refrigeratio sit parua, in tali casu fit confluentibus humoribus ab uno loco ad alium, ita tamen ut hic humor sit sine inflammatione, & non vellicet partem sentientem.

Denique nulla fit refrigeratio in cõnuiis propositis, sed tantum calor; quando putredo est vel in venis determinatis, vel communibus; in tali casu potest fieri exacerbatio; quæ potest consuevere nova materia ad venas determinatas, vel communes, quæ augeat calorem loci; sed non fit horror, quia materia est intra venas; nec refrigeratio, quia calor non ita concentratur, sicut, quando extra venas.

De causis febrium intermittentium in genere.

Cap. VIII.

Explicavi hætenus Causas Continentium omnium Periodicarum, succedit explicatio causarum febrium omnium Intermittentium, quæ perfectio non minorem quam superior continet difficultatem. Dicebam autem cum Galeno lib. 2. de diff. feb. c. ult. causas intermissionis cuiusque febris esse 4. paucitatem excrementi, tenuitatem eiusdem, locum amplum, & minimè coarctatum, & facultatem robustam; singula singulatim explico.

Pauci- Nomine pauci excrementi intelligo illud, **tas excre-** cum quo tamè possit servari, causa vniuscuiusque febris intermittens, quia ut potestis colligere ex Galen. 3. in 1. Epid. 5. Intermittentium febrium quædam sunt brevissimæ, quædam protensæ, ut accedant ad continuas; quædam medio modo se habent. Itaque nomine pauci excrementi intelligo, & protensæ & mediocris. Exempli gratia ad inducendam tertianam brevissimam est necessaria materia ichorosa ex bile, & non durat ultra 5. horas; quod ego his observavi, quod fit ex bile putrescente in pauca quantitate. Si putrescat bilis sincera absque reliquis excrementis, facit Exquisitam Tertianam, quæ non excedit horas 12. Si in maiori copia, febres excitat, quæ transeunt ad

A nothas, circiter 15. durant horas. Si ex bile pallida, hæc est frigidior, durabit ad 18. uel 20. horas.

Et si adhuc magis misceatur pituitosus humor cum bilioso ad 24. & 30. horam & si etiam melancholia misceatur ad 40. & 44. horam, ita ut accedat ad continuas periodicas pro varietate, copia varia.

De quotidiana est dubium, num detur intermittens, quæ desinat ad infestationem. Galen. libro secundo, de differ. feb. capite 4. dubius est, & sibi contrarius. Nam primo inquit non desinere ad perfectam infestationem; postea addit, multos alios sensisse desinere, quorum sententiæ videntur subseribere; nihilominus paulo post iterum subiungit, non relinquere huiusmodi corpus immune a febre. Et ratio quia Galenus utitur, potius concludit oppositum, inquit, erit intermittens, quando sit exquisita. Scitis autem, quod sit exquisita quotidiana, quæ fit in temperamento frigido & humido, vita otiosa, post usum ciborum frigidorum & humidorum; ergo spuria magis ad infestationem desinit.

Sed quicquid sit, certum est, ex mutatione excrementi fieri febres, uel breuiores, uel longiores.

Quod dixi de reliquis, dico etiam de Quartana, quæ humor tenuior, cõ breuior.

Sed transeo ad difficiliora: dixi, intermittentes fieri, ubi materia non est in loco arcto conclusa, & ubi virtus valida. Videamus, an materia non sit conclusa in loco arcto, in quo loco duo veniunt explicanda.

Quantum ad locum pertinet, locus febrium intermittentium duplex constituitur: unus, in quo continetur materia Antecedens, quæ est excrementum Terræ coctionis, antequam corrumpatur, in quo materia conclusa, quæ actu facit febrem Putridam intermittentem.

Si sermo sit de priori loco; dico hunc locum esse posse quamcumque nostri corporis partem, internam, externam, comunem, determinatam, & propterea carnes totius corporis, spatia inania, &c. omnes partes uno uerbo. Probanur ratione; quia omnis pars proposita generat excrementa. Ergo potest & ea colligere, quia ubi generantur excrementa, possunt etiam retineri. Causa propter quam retinentur describitur lib. 10. de tuend. nat. cap. 4. Adest alia etiam ratio. Omnis pars nostri corporis potest esse imbecilla; Ergo potest colligere excrementa; nam ad partes imbecilliores semper fluunt excrementa, lib. de causis morb. cap. 6.

Quod omnis pars possit esse imbecillis, loco citato.

Pars naturalis in duplici differentia: naturalis cutis, adenes, loca expulsionis; omnes aliæ sunt imbecilles propter morbum, & in duplici differentia; morbo naturali, & acquisiti-

Nū quotidiana desinat ad infestationem.

Locus febrium intermittentium.

quisitio. Exempli gratia. Si quis naturaliter oritur claudus, gibbus, cæcus, & aliqui semisani, asthmatici, est morbus naturalis: alij incidunt in hos.

Itaque partes imbecillæ semper aliarum partium excrementa suscipiunt, auctoritate Galen. libro quarto de tuend. val. per totum librum, videbitis Galenum agentem de hac materia.

Itaque omnes istæ partes colligunt excrementum, quod est causa antecedens febris, propterea libro primo de differ. febr. capite quarto, eandem proponit sententiam. Quandoque in primis vijs & in ambitu colligi excrementa; & tamen patiens non febricitat. Causa propter quam possint colligi hæc excrementa absque febre, est proposita loco citato, quæ est ratio: inquit Galenus plenitudo est duplex, alia quo ad vasa, & alia quo ad vires: si colligantur humores quo ad vasa, non necessario putrescunt, quæ est ratio? ubi vires constant, potest subsistere materia aliquo tempore in corpore. Vbi vero est quo ad vires, statim putrescit.

Locus cõ iuncta materia. Si sermo sit de loco, in quo continetur materia coniuncta, audimtis, quid alij dixerunt. Altimarus semper ambitum totius corporis pro tali loco habet. Inlius Alexandrinus ambitum totius corporis, parenchyma, carnem viscerum. Fernel viscera omnia, præcipue pancreas, mesenterium. Ego præferam meam sententiam, quam cupio diligenter audiri.

Primò quidem existimo ego materiam febris intermittens nunquam esse in carnibus viscerum seu parenchymate.

Secundò materiam febris intermittens nunquam peccare in ambitu tantum totius corporis.

Tertiò locum febris intermittens vel venas communes vel venas determinatas partium internarum, vel cavitates amplas ventriculi vel alterius loci. Singula confirmabo.

Non esse carnẽ viscerum. Primò quidem, quod intermittentes non possunt fieri ex materia peccante in carne viscerum, probatur hoc argumento. Quia deficiunt conditiones, quæ faciunt febrem intermittentem, propter quam febris intermitit; Ergo non potest fieri talis febris. Consequenter est clarissima: nam ad faciendam febrem intermittentem oportet concurrere 4. conditiones: deficiunt duæ præcipuæ, quod probabo. Deficit primò cõditio, quod materia continetur in loco aperto, nam si in carne iecoris, lienis, est extra venas. Coarctata non possunt excerni, oportet ut iterum ingrediatur venas. Et ideo Galenus libro secundo de diff. feb. cap. ultimo, quia materia est contracta in unico loco, quod sit ubi febris intermitteat continetur in propria substantia. Vellẽ, ut mihi explicaret Alexandrinus quid intersit inter materiam inflammationis, & huius febris. Inflammatio sit, &c. teste Gal. bil.

A de inæq. in temp. c. 3. quando, dum calida fluxio in musculum procubuit, prius maiores arteriæ venæque opplentur, ac distenduntur, ab istis minores, &c. Vide locum, est paulo prolixior, quæ ut hic totus annotari possit. Idipsum fit in materia febris intermittens.

Præterea, deest secunda cõditio, quæ est, ut facultas sit robusta: quando materia continetur extra venas & non possit euacuari, necessario reddit membrum debile: eadem ratio, quæ inflammationis, quæ semper reddit locum debilem, sed est alia ratio, si materia intermittens continetur in hoc loco angusto, quomodo in principio accessions fieret uomitus, in fine sudor, necesse esset ut materia moveret de loco in locum. Itaque materia non est in parenchymate viscerum.

Tertia ratio, Si materia intermittens esset in huiusmodi loco extra venas: Ergo urinae non demonstrarent neque cruditatem neque coctionem huius febris. Ratio ex Galeno habetur. nam lib. 1. de cril. cap. septimo, aperte scribit, urinas esse iudicium affectionum venosi generis.

Concedamus materiam intermittentium esse extra venas, urinae nihil ostendunt.

Nec est, quod quis dicat cum Rõdeletio, quæquam urina ostendunt affectionem venosi generis, tamen ostendunt etiam partium determinatarum affectiones. Est contra Galenum 1. in 1. Prothet. 6. ubi proponit Hippoc. quædam signa phrenitidis, & inquit Galenus, urinae nihil ostendunt ad affectionem phrenitis: pariter lib. primo de cril. cap. septimo dicebat; pleuritidis cognoscitur tantum ex sputaminibus 3. in 2. Epid. text. 6. loquitur de uolulo, inquit in com. in uolulo ex inflammatione urinae sunt inspiciente tantum ob hanc causam, quia si bonæ fuerint, habent nullum momentum ad sanitatem patientis; si sint pravae, aliam adesse affectionem significant.

Itaque si materia extra venas continetur, est eadem ratio, quæ inflammationis, quæ non cognoscitur ex urinis. Ergo nec in febris intermittens.

His argumentis mihi persuadeo, parenchyma viscerum non esse locum, ut nec ambitum corporis. Primò enim si materia putrescens in ambitu corporis febrem intermittenter efficiat, peto quamobrem in scabie, & lepra non fiat febris putrida continua? Docet Gal. scabiem & lepram fieri ex materia putrescente salia & multa in ambitu totius corporis. Si igitur in toto corporis ambitu. Ergo sequetur, quod materia putrescens ex se non possit febrem intermittentem efficere. Præterea si esset, solo balneo, frictionibus, & cucurbitulis curaretur, cuius consequentia ex Galen. lib. quarto de tuend. val. cap. 6. patet. Alia fortior, si in solo corporis ambitu, uenæ sectio, uomitus, alui deiectio essent perniciosissima.

Ratio est ipsius Galeni, qui loco citato inquit, ubi abundant humores in primis vijs, cauendum, ne qui sint in primis vijs, trahantur in corporis ambitum, nec qui in ambitu, ad intro: quæ sunt illa, quæ ducunt humores ad intra? Sunt timor, purgans medicamentum, itaque sic ducerentur humores ab ambitu corporis in venas.

Præterea argumentor. Transmissa materia à venis ad extra venas in corporis ambitum, febris tollitur. Ergo sequitur, ex materia putrescente in corporis ambitu non posse febrem fieri. Consequentia clara, nam si hic locus curat febrem continuam, transmissa materia à venis ad extra venas. Sequitur id quod dixi. Maior est Hip. & Galeni 4. aph. 58. inquit Galenus fit solutio, quia transmittitur materia à venis ad extra venas.

Neque est quod quis dicat, transmitti quidem materiam, sed & euacuari. Dicam hanc fugam esse nullius momenti. nam Galenus ipse, lib. quinto loc. aff. c. ult. scribit febrem ardentem esse, ubi febris continua succedit Interitum. est argumentum materiam non esse euacuatam. Domini, plura essent dicenda, quod fiet in sequentibus lectionibus, ubi contendam non solum falsam esse hanc sententiam, sed & ex Gal. sententia semper necessarium esse ingressum materiam ab ambitu corporis ad venas ipsas: hoc & authoritate, & ratione probabo.

Ostendi hæc materiam coniunctam febris intermittens, numquam peccare tantum extra venas, siue nomine loci extra venas intelligamus ambitum totius corporis. siue parenchyma, siue carnes viscerum. Superest ut in præsentia meam proponam sententiam, facilitatis gratia complectar totam hanc meam sententiam quibusdam conclusionibus, quas singulas pro viribus confirmabo.

Prima est, in omni febre intermittente necessario materiam coniunctam in Principio, Augmento, & Statu putrescere intra venas. Confirmatur hæc prima conclusio triplici potissimum argumento. Primum desumitur ex vrinis: Omnes febres intermittentes necessario habent eam coctionem, vel cruditatem in humoribus, quam alia febres continuæ. Ergo ex vrinis talis coctio vel cruditas apprehendi debet. Antecedens est manifestum. Consequentia est probata in præcedenti lectione ex Galen. lib. 1. de Cris. 2. vrinas esse indicia eorum humorum, qui in venis tantum continentur.

2. Id ipsum probo ex natura Temporum accessionis febrium intermittentium. Quæ est natura horum temporum? natura horum temporum ut ex Gal. lib. 3. de diff. febr. c. ult. 1. acut. com. 46. lib. 3. de præf. ex puls. c. 7. patet, est, ut in principio accessionis inqueatur humores à circumferentia ad centrum, in augmento à centro ad circumferentiam; in statu

moventur profusa à centro ad circumferentiam in declinatione digerentur, vel euacuantur per insensibilem halitum, vel sudores.

Hoc stante igitur necessarium est huiusmodi temporum naturas mutari ex mutatione humorum, ut in principio à circumferentia ad centrum, in augmento, statu, & declinatione, contra.

Sed hic motus non fit, nisi per venas, neque possunt moueri à visceribus ad ambitum corporis, nisi per venas. Igitur toto augmento tempore continetur materia in venis.

Tertio probatur ex euacuationibus, quæ contingunt vno, & eodem die in febribus intermittens, quod testatur Galen. lib. 2. de sympt. causis, cap. 5. & reperit 4. aph. com. 34. huiusmodi euacuatio vno eodemque die facta non potest fieri, si materia contineatur in solo corporis ambitu, vel in carne viscerum. Itaque constantissimum est ex his, materiam peccare in venis.

Secunda conclusio est, hanc materiam, quæ dixi, peccare in venis, in principio nam mitti etiam aliqua ex parte ad extra venas, & per loci extra venas, intelligo membranas viscerum, vel carnem totius corporis. Exempli gratia, si è carne iecoris portio tenuior transmittatur ad membranam iecoris, confirmatur, quia omnes intermittentes necessario incipiunt cum rigore, horrore, & refrigeratione: quia rigor & horror non potest fieri, nisi materia stimulante carnes viscerum, & totius corporis.

Tertia conclusio est, materiam febris intermittens numquam totam simul collectam esse in venis ipsis, ubi febris ipsa intermittens excitatur. Ratio huius conclusionis pendet ex his, quæ dicta sunt. Diximus febrem continuam fieri, vel ex multa materia, vel crassa, vel quod in loco arcto, vel facultate imbecilli. Si multa materia in venis, omnes conditiones concurrunt, quæ faciunt continuam. nulla est ratio ut dicebat libro 2. de diff. feb. cap. ult. ubi materia continetur in uno loco, est alligata uni loco, sed ubi materia simul colligitur iuncta in venis communibus, & una pars putrescet, putrescit etiam altera, & ideo est febris continua.

Neque etiam fit febris intermittens ex materia genita & retenta in eo loco, ubi generatur.

Supponamus exempli gratia, si generetur bilis in iecore, & ibi retineatur, non erit febris intermittens, quia ubi materia generatur & retinetur & corrumpitur, in illo loco concurrunt multe causæ continuitatis. Propterea vera conclusio intermittens est, non fieri ex materia genita, retenta, & corrupta in vno eodemque loco.

4. Conclusio, fieri febrem intermittentem ex materia attracta vel transmissa à loco ad locum. Hic locus à quo fit hic motus, potest esse multiplex, aliquando potest moueri à venis

venis vnius à partis determinate ad venas alterius partis determinate. Exempli gratia, generabitur excrementum in venis iecoris, potest transmitti ad alienis, vteri, &c. aut potest mitti à determinatis ad communes; vel gigni in venis communibus, & mitti ad determinatas. Hanc transmissionem per venas de loco ad locum, docuit Gal. in lib. de cur. rat. per sang. miss. cap. 8. vbi multa dicit de huiusmodi transmissione.

Et rursus aliquando partes transmittunt materiam ad aliam partem: Iecur exempli gratia ad lienem, & lien iterum ad iecur. Hæc transmissio semper fit per venas vnius partis, per venas alterius partis. Vicumque sit, potest seruari ratio febris intermittens: quia excrementum, quod transmittitur, si sit in pauca quantitate, ea pars potest hoc extra corpus pellere siue per sudores, vrinas, &c. Et hoc sufficit ad collinuendam febrem intermittentem.

Et propterea est necessarium, vt patet, extra venas sit, & intra venas, nec multa, & transmittatur de loco ad locum, & locus non sit imbecillis.

Itaque iam intellexistis, quomodo possit fieri hic motus à loco ad locum intra venas. & hanc sententiam confirmare possum quibusdā Galeni autoritatibus. Galenus in illo lib. 2. de diff. febr. cap. 2. & lib. 3. de cris. cap. 6. & sect. 4. aphor. 59. scribit, in nullo alio differre febres continuas ab intermittentibus nisi quod in continuis materia mouetur intra venas, in intermittens extra venas. Tunc si per motum intra venas, vel Galenus intelligit motum intra venas tantum in principio accessionis, vel in augmento, & ita; nulla est ratio, quam obrem cōtinuæ distinguantur ab intermittens.

Si dicant Galenistæ sententiam Galeni de febre continua intelligi, quod contineatur materia intra venas in principio, augmento, & statu: Dicam ego in declinatione potest huiusmodi materia euacuari, quæ soluat solam febrem, igitur etiam totam accessionem. Distinctio igitur est, materia toto accessionis tempore mouetur in venis, & est continua; in intermittens mouetur extra venas.

Ceterum transmittitur etiam materia à locis ab extra venis ad intra venas, qui locus quādoque potest esse ambitus corporis, cavitates amplæ partium internarum, spacia inania.

Dixi materiam mitti à carnibus totius corporis ad intra venas in principio accessionis. Sed vbi mittitur hæc materia ad intra venas, & faciat intermittentem, necessarium est collectam esse in corporis ambitu in modica quantitate, & propter errorem externum. Exemplum scribit Galenus 1. in 3. Epid. tex. 29. Itaque vbi adsit insignis aliqua inempies, propter quam augetur excrementum: febris erit continua. Videatis locum 4. acut.

A com. 1. vult nobis significare, fieri febrem ardentem, non tantum vbi venæ arefactæ ad se traxerunt materiam, verum ubi totum corpus arefactum attraxerit materiam ad sese. Clarius lib. 4. de tuend. val. cap. 10. inquit: in lassitudine phlegmonosa fieri febrem synochum, quia materia copiosissima colligitur in carnibus totius corporis. Itaque in hoc casu fit febris continua maxima, denegamus ergo ad rem.

Oportet vt febris intermittens, quæ debet fieri à corporis ambitu ad venas, sit materia pauca, & collecta, propter aliquam causam extraneam constipantem cutem. In hoc casu, necessarium est in principio accessionis, vt semper maior portio transmittatur per ambitum totius corporis. Tota hæc probatio pendet ex natura horrois, & rigoris. Inde argumentor sic.

In principio accessionis intermittens materia discurrente per carnes totius corporis, fit rigor & horror. Ergo materia confluit ad intra venas, imo usque ad viscera. Consequens probatur lib. 4. de tuend. val. c. 6. & lib. de sympt. caus. c. 5. & lib. 10. meth. c. 4. In his locis scribit, naturam rigoris & horrois esse, ut moueat humores à circumferentia ad centrū, & propterea lib. 4. de tuend. val. cap. 6. dum quærit causas propter quas existunt humores in ambitu corporis, possint confugere intro: inquit causas esse rigorem & horrorem. Ergo humores mouentur ad intræ venas.

Clarius patet ex natura principij febrium intermittentium, lib. 2. de diff. feb. c. ult. & 1. acut. 46. inquit, naturam huius febris esse, ut in principio sanguis moueatur ad viscera, & hac ratione fieri pulsus contractos, &c. nulla alia est ratio, inquit, quia confugiunt humores in principio à circumferentia ad centrū.

Si igitur ita se res habet, quis negabit, materiam, quæ facit rigorem, & horrorem, in principio febrium intermittentium non confugere vsque ad viscera.

Neque uolo mihi obijci huiusmodi febres intermittens aliquando fieri sine his symptomatibus, quod Gal. lib. 2. de caus. pul. c. 3. dixerit, dar. biliōs adeo benignas: est Obiectio nullius momenti, oportet intelligere illas biliōs Ephemerās, quas supra audiuitis non habere pulsus inæquales, nec cetera signa contractionis, &c. Omnes aliæ causæ, quæ sequuntur, sunt causæ febrium Ephemerarum, nam inquit fieri ex lassitudinibus: Itaque non ualet hoc argumentum.

Transmittatur itaque materia à corporis ambitu in venas in principio accessionis, sed non tota, quando aliqua portio discurrit per totum corporis ambitum. Hoc nō nego primum quidem antecedit motus, qui facit rigorem, postea succedit calor febrilis.

Ostendi hæc enas materiam febris intermittens in principio, augmento, & statu accessionis.

cessionis esse intra venas, ut patet ex motu A
facto circa tempora accessionum, ut patet
etiam ex euacuatione, quae fit in febribus in-
termittentibus, vno die per aluum, intestina,
vomitus, &c.

Ostendi quinetiam hanc materiam in
principio accessionis pro parte moueri ad
extra venas, cuius motus ratione fiunt hor-
rores, & rigores.

Addidi hanc materiam non esse collectam
in loco, ubi putrescat, nec ibi putrescere ubi
colligitur, sed transmitti à loco ad locum,
vel attracta, vel transmissa à parte ad partem
materia.

Addidi locum transmissionis esse varium,
& in proximè precedentibus explicabam, B
quod materia in corporis ambitu debeat &
possit transmitti ad intra.

Nunc probatur fieri hanc transmissionem
ab aliquo loco interiore existente materia
extra venas; ita tamen, ut in principio, au-
gmento & statu mittatur ad intra venas. Hoc
fit, ut vult. Fern. lib. 4. cap. 10. quando mate-
ria excrementitia colligitur in aliquo loco
ignobili, non admodum sensibili, qui potest
diu multa excrementa sustinere. Exemplum
huius potest esse lib. 1. ad Glauc. cap. 3. ubi
est sermo de febribus intermittentibus, hu-
iusmodi fieri magna ex parte iecore labo-
rante, si sermo sit de tertianis.

Itaque nunc accipiam pro exemplo uen-
triculum, qui est in causa febris quotidiana
intermittentis. Quomodo? oportet ut por-
tio moueatur à ventriculo ad iecur, ad ue-
nas cauas communes, & transmittatur extra
corpus.

Confirmatur: quia in hac febre sudor ap-
paret per totum corpus accessionis; si locus
putredinis sit tantum ventriculus, nec etiam
in uenis, hic sudor non apparebit.

Sed hodie mane casum habui, certissi-
mum argumentum huius transmissionis ma-
teriae a ventriculo ad venas. Quidam in mo-
nasterio Sanctae Iustinae laborat triplici quar-
tana, sed cum maxima ventriculi imbecilli-
tate, hanc materiam circa tempus inaequalita-
tis incipit distribuere ad partes distantes à ven-
triculo, in quibus oritur dolor, & cessat ven-
triculi imbecillitas.

Itaque hic motus à cavitatibus ventriculi
ad venas partis iecoris gibbae, postea ad uni-
uersum corpus.

Hinc credendum Hippoc. 4. acut. tex. 69.
loquentem de febribus singultuosas, quae or-
iuntur ex plenitudine ventriculi, uoluisse
solui sudore, per urinas crassas, abscessu.

Sed si perstet in ventriculo; neque solua-
tur sudore, urinis crassis, neque abscessu ali-
quo. Quod uero de huiusmodi febre mentio
fiat, patet ex curatione. & Gal. in com. inq.,
uocat singultuosas febres illas, in quibus ex-
citatur singultus circa principium accessio-
nis, curat tale facientibus, & siccantibus.

Hactenus ostendimus materiam hanc con-
tineri in uenis in principio, augmento, & sta-
tu. De declinatione autem semper est neces-
sarium, ut materia digeratur in halitum, uel
ex toto transmittatur extra venas, uel per su-
dorem, urinam, &c. Et haec est uera causa in-
termittionis, nihil refert materiam retineri
in principio, augmento, & statu in uenis, nam
facultas uenarum robusta est & ualida.

Succedit ut soluamus quasdam autori-
tates, quae uidentur contra nos.

Multae quidem sunt auctoritates, ex qui-
bus colligitur febrium intermittentium ma-
teriam peccare extra venas, 3. in 6. epid. 31
Hippoc. habet haec uerba. *Rigor à superiore
venit. Ignis autem ab inferiore magis est.* Inquit
Galen. com. sententiam Hipp. sic esse intel-
ligendam, ex ore uentriculi irritato fieri ri-
gorem, ex materia in fundo febrem. Igitur
constat febrem dari intermittentem mate-
ria existente in fundo. Sed praeterea superius
multa attuli loca, quod fiant febres intermit-
tentes motu per ambitum materiae, & carnes
totius corporis. Loca sunt lib. 2. de differ.
feb. cap. 2. sect. 4. aph. 60. & 2. in 1. epid. 20.

Sed praeterea, si concedamus, ut nos sup-
posuimus, habere febrem intermittentem ma-
teriam intra venas. Ergo non videtur seruari
ratio rigoris: nam uenae non habent sensum
talem, in quibus potest fieri rigor. Accedit,
quod debeat esse febris continua, *non inter-*

Diffoluta. Quando dictum est febres exci-
tari ex materia contenta in fundo uentriculi;
solutio habet apud eundem Gal. Lc. inquit,
ventriculus vel generat vel sentit, uel incipit
febrem ipsam. Hoc stante, dico ex fundo
ventriculi fieri febrem, quia ibi generetur,
sentitur, incipiat: generatur in ventriculo
non transmissa materia, quando excremen-
tum, quod putrescit, est putrescens propter
errorem in cibo & potu magis, quam propter
errorem uentriculi lib. 8. meth. c. 3.

Sed si febris debeat esse putrida, habebit
materiam iam diu ibi collectam, erit putri-
da, sed continua, & quidem lenta.

Ego habeo nunc virginem in cenobio
D. Marci, quae tentatur febre quotidiana
consimili.

Sed si excrementum hoc ex parte putre-
scat, & transmittatur ad venas, facit intermit-
tentem, & dicit Hipp. inchoare febrem.

Quantum ad ambitum corporis; dico
primo sententiam Galeni duobus modis
verificari.

Primus est, moueri hanc materiam per
carnes totius corporis in principio accessio-
nis. Hoc etiam euenit, ubi colligitur materia
excrementitia in ambitu corporis, necessa-
rium, ut antequam fiat febris, materia putre-
scat; musculos corporis sentientes moueri,
ex motu fit rigor & horror; statim excitatur
horror, necessario statim materia ingreditur
venas: quia proprium est horrores, & rigoris
duce-

ducere humores ad intro: hinc suffocatur quasi viscera, & fit difficultas anhelitus.

In hoc vera est sententia Galeni, ut & secundo modo.

Mouetur etiam materia ad extra in fine accessionis, & propterea illae febres, quae incipiunt cum rigore, & non desinunt cum sudore, non sunt intermittentes, ut obseruabitur in praxi, & hoc ego experientia comprobauit: materia enim retinetur, & retrocedit, &c.

Obiectio. Sed ingeniosus aliquis obijciat duas auctoritates contra nos, & probabit ex ambitu corporis non communicata materia venis, fieri tamen posse febrem.

Prima auctoritas est ex 4. acut. com. 1. ubi Hipp. dixerat, fieri febrem ardentem, quando venae aefactae attraxerint. Gal. inquit huic sententiae aliquid esse addendum: nam quæri potest, inquit Gal. an etiam musculi attrahant. Itaque si admittamus hanc suppositionem Galeni, videtur constituere febrem intermittentem, quando prauis humores ad carnes mittuntur.

Secundus locus est lib. 4. de tu. val. c. 10. ex lassitudine phlegmonode fit feb. synochus.

Quantum ad primum locum: primo dico, Gal. non decauisse hanc veritatem, ponit rem sub dubio, inquit hoc posse quæri, & interrogat, utrum sic fiat.

Sed praeterea supposito, quod fieri possit, dicam Gal. hunc voluisse huiusmodi non fieri ex attractione materiae in carnes, nisi aliqua ex parte communicetur etiam ipsis venis.

Ad alium locum lib. 4. de tu. val. dico similiter: non posse fieri synochum ex sola materia: sunt iugae istae, credetisne vos, venas ita repleri carne, ut videantur disrumpi.

Quantum ad alias rationes, facilis est solutio. Materia est in venis. Ergo non fit rigor. Materia febris intermittens non tantum continetur in venis, sed etiam transmittitur ad extra venas.

Quantum ad illud, quod deberet esse continua. Dico, esset continua, si tota accessionis tempore materia constitueretur intra venas: Nil itaque hae ratio concludit.

De differentiis febrium putridarum periodicarum ratione ordinis quem in reditu & intermissione seruant, aut non seruant. Cap. IX.

Febres periodicae, quas hactenus in continuas & intermittentes distinximus, & quarum causas hucusque exposuimus, in alias adhuc Differentias distinguuntur, vel ut melius dicam, aliae plures sunt differentiae a nobis considerandae.

Primo enim distinguuntur Periodicae in Typicas, & Erraticas.

Febris Typica. Typicas febres illas voco, quae reuertuntur certo quodam temporis ambitu cum certa quadam forma, & ideo cum quadam febris.

A Erraticae febres sunt, quae reuertuntur quidem, sed non seruat ordine temporis, & formae.

Typus quid.

Explico utrumque, Typus ex Galeni lib. de typis cap. 2. significat ordinem intensificationis & remissionis febris, ita ut illa febris dicatur typica in hac prima significatione, quae ordinatè reuertitur singulo, vel tertio die, vel per intervalla. Typus etiam significat formam cuiusque febris ex proprijs signis & symptomatibus. Hac ratione typus tertiana est congeries uariorum signorum, quae concomitantur tertianam. Exempli gratia, iugilis, oris amaritudo.

Contra sudor quidam inacidus, uentriculi imbecillitas, sopor, ignauia, urina cruda, conficiunt typum quotidianum.

Itaque ubi huiusmodi febres reuertuntur ordinata ratione temporis, & iidem symptomatibus dicuntur typicae. Si mutatur, dicitur Erratica, seu Inordinata, & Inconstans, quae febres habent varias Differentias.

Quidam mutant ordinem temporis ratione diei. Exempli gratia, quae interficit quatuor, quinque diebus, postea intermittunt spatio totidem dierum, & rident reuertuntur, iterumque intermittunt.

Sunt uero erraticae ratione temporis, non ratione plurimum dierum, sed in iisdem temporibus, in quibus sunt etiam aliae febres, quando scilicet mutatur hora accessionis: & ea est inordinata.

C De exemplum, superueniat febris quotidiana, vel alternis diebus, potest seruire, & mutare ordinem horarum, si seruat ordinem horarum, est typica; Si mutat, est ordinata mutata, vel inordinata.

Est ordinata, quando singulis diebus, vel de uicinis intervallis habent quoddam anticipationem.

Sed danatur alia, quae ita mutant horas, ut Meliet non possit praevidere. Hodie venit hora decima nona, sequenti diei hora nona, altero sub media noctem.

D Tertia differentia erraticarum est ratione formae febris. Exempli gratia, hodie in hac febris cum signis Quotidianae, urina cruda, &c. in sequenti die reuertitur eadem hora, sed cum signis Tertianae. In sequenti in ipsa hora, sed cum signis Quartanae. Ita dicitur Erratica ratione formae febris. Habetis igitur tres differentias erraticarum febrium.

Typicae febres ipsae quoque seruant ordinem, aut hebdomadarum, aut dierum, aut horarum.

Seruat ordinem hebdomadarum, quando sunt quaedam recidivae in diebus decretorijs. Exempli gratia, quae intermittit in quarta absque signis iudicatorijs, reuertitur in septima, quae intermittit in septima, reuertitur in 14.

Alter typus fit ratione dierum, & hic proponitur uno modo a Gal. alio ab Hip. Apud Gal.

tide; sed potest fieri, ut ex imbecillitate partium, abundantibus excrementis biliosis, vel melancholicis in corpore, moueatur humor ab una parte in aliam, & sic biliosa fit, si melancholica, febris erratica quartana, & hunc modum tetigit lib. 2. de diff. feb. cap. ult. Sed aduertatis, quod monet Gal. partim loc. cit. lib. 2. de cris. cap. 9. ne decipiāmini febrem inordinatam esse erraticam, quia maxima est similitudo inter febres duplices, & triplices cum erraticis. Exempli gratia. Sint duæ tertianæ, una inuadit hora 15, altera 13; videatis mutationem fieri duabus horis, non propterea fit erratica, habent suos typos de tertio in tertium.

Et idem quoque dico de complicatione febrium diuersi generis, etsi inuadat febris diuersis horis, ut tamen possitis inuenire proprium typum.

Ratione horarum. Denique erratica ratione horarum tota pendet ex erroribus commissis ab ægro, uel Medicis. Si delinquat in diætâ, irascatur surgat ex cubili exerceat corpus, retineat excrementa, humores, uel citius, uel tardius mouentur de loco.

Interdum causa est in Medicis, qui aliquando ualidissimis utuntur, non concocta materia.

Quinimo aliquando ex medicamentis opportunè adhibitis, & venæ sectione solent fieri huiusmodi anticipationes. Ratio: humor mouetur, & ex huiusmodi motu facit febrem anticipare.

Haftenus de causis erraticarum, quarum Differentias proposuimus tres, 1. dierum aliquot, quæ fiunt ex dispositione partis relicta, aut erroribus, aut ex cinerib⁹ relictis humorum. Secunda erat erraticarum ratione formæ, quarum causæ, uel mutatione formæ humoris, uel eiusdem uarietas. Tertia erat earum, quæ mutat horas absque ordine, cuius causa error in cibo, potu, somno, uigilijs, &c.

Ratione motus in Typicis. Typicæ ut dicebamus alix seruant circuitus hebdomadarum, uel quaternionum ordinem, alix dierum, alix horarum. Semper igitur in typicis seruiatur forma febris, sed tempus mutatur.

Quæ seruant hebdomadas, sunt quæ exempli gratia intermittunt quarto, & reuertuntur septimo: aut intermittunt 7. & reuertuntur 14. Tales febres docet Hip. in Epidemijs & experientia esse.

Typica ergo per hebdomadas, aut quaterniones nil aliud est, quam recidua ordinata, uel sunt febres acutæ desinētes absque indicatione, & reuertentes in diebus iudicatorijs.

Per febrem ego intelligo unam tantum accessionem febris, sed eam quæ saltem perdurat 4. 6. uel 7. diebus.

Per acutam non tantum intelligo uelocitatem in ea motus, sed etiam febris morem,

A quo est mala, & maligna.

Nam leues febres & parue etsi desinant absque indicatione, possunt tamen solui sine reditu, si æger conuenienti utatur uictu, Gal. lib. 1. de cris. Cito desinētes dixit ad differentiam magnarum, quæ desinunt absque crisi, & non faciunt recidiam, lib. 1. de dieb. decr. cap. 5. Non omnes, inquit, febres iudicari debent per crisin neque recidiam faciunt, sed paulatim soluiuntur.

Ad harum autem differentias diximus cito desinētes.

Sed quia usus sum exemplo quartæ, uel sextæ, uel undecimæ, uel 14. iure quaeremus, quā dies recidiam afferat. nam ex Hipp. constat tantum eas habere recidiam, quæ desinunt in die par. 4. aph. 61. Si diebus imparibus febris non intermittat, reuertitur: quasi dicat: si diebus parib⁹ reuertitur, reuertitur: Si imparibus non item. Item lect. 4. aph. 36. dicit iudores bonos esse tertio, septimo, nono, & ita enumerat impares dies, in quibus sentit recidias eas facere, quæ desinunt die par.

Sed non credatis, eas tantum recidias facere; quæ relinquunt die par: pono enim tres conclusiones, quas etiam probabo.

I. Febrem quæ desinit in imparibus habere recidiam.

II. Quæ desinit in paribus, non necessario recidiam habere, sed esse salutarem.

C III. Facilius esse facere recidiam, quæ demittit paribus, quam imparibus.

Prima conclusio probatur experientia, & *Febres quæ desinunt in imparibus habere etiam recidias.* autoritate. Quæ enim desinunt septima reuertuntur 14. uidistis hæc in ægro apud Zabarellam. & 1. in 3. epid. in casu Herinocratis.

Idem ratione probatur; Causa recidiae est, quia absque perfecta excretionē humorum peccantium desinit. unde Hipp. 2. aph. 12. inquit: quæ relinquuntur, faciunt recidiam. Si autem reuertitur febris post indicationem, multo magis id fit, ubi nulla excretio. Unde 3. aph. ait febres, quæ desinunt sine excretionē necessario recidiam facere. Sed quales sunt istæ febres? Sunt illæ, quæ demittunt in diebus iudicatorijs, absque tamen signis coctionis siue admodum obscuris. Et Hipp. 2. in 1. epid. 46. Cruda autem & in prauos abscessus conuersa, uel mortem, uel recidias significare. Ideo certissimū propterea fieri recidias, quia quamquam febris desinat in diebus iudicatorijs, desinit tamen abque signis coctionis. Hoc posito fundamento, dico non tantū in die par. sed etiam impari posse desinere febrem, & habere tamen recidias. Ratio; quia coctio non adfit. In confirmationem ueritatis sunt multe historiae apud Hipp.

Quantum ad secundam, dicebam non necessario fieri recidias etiam si febris inter- *Non necessario* mutat die par. Ratio conclusionis est; Om- *fieri re-* nes

*recidivam, quomodo febris intermit-
tat in die pari.*

nes dies decretorij ponuntur in duplici dif-
ferentia. Sunt Principales, aut Intercident
lib. 2. de dieb. decret. cap. 6. Principales sunt
illi, qui distinguuntur vel secundum quater-
niones, vel hebdomadas: sunt indicatorij se-
cundum quaterniones.

Intercidentes distinguuntur adhuc in 2.
Differentias: intercidentes pares, & Impa-
res. De utrisque Hipp. 3. in 1. Epid. 14. ubi
proponit Hipp. dies indicatorios interciden-
tes pares hoc est 4. 6. &c. & impares 3. 9. &c.

Hoc stante fundamēto: dico omnes mor-
bos, qui habent accessiones diebus paribus
feliciter, & melius indicari diebus paribus,
quam imparibus: Qui imparibus, imparib⁹.
Hæc est doctrina Gal. com. 14. 3. in 1. epid.

Cū itaq. res ita se habeat, accipio hoc fun-
damentum, & dico. Dantur morbi multi, qui
habent accessiones diebus paribus. & ijs iu-
dicantur melius, quam imparibus. Si ergo in
diebus paribus isti non habebunt recidivas,
propterea probata est secunda conclusio.

Et si quis putat, quæ sint istæ febres, quæ
habent accessiones dieb⁹ paribus? Resp. illæ
sunt, in quibus accessio secundi diei est ma-
ior, quam primæ, & sic vicissim 4. accessio
semper maiore tertia, & sexta quinta. Do
exemplum; Incipiat hodie febris, cras re-
uertatur. si accessio cras sit grauior, & quar-
ta sit grauior, quam tertia, in hoc casu febris
dicitur habere accessionem diebus paribus.

Propterea Gal. 4. aph. 61. non accepit li-
benter hanc sententiam. nam dicit; dantur
multæ febres, quæ iudicantur in decimo
quarto, idest, die pari, tamen non necessariò
faciunt recidivam.

*Frequen-
tius sa-
ciunt re-
cidivam
febres, q̃
mouentur
dieb. pari-
bus, quā
quæ im-
paribus.*

Venio ad tertiam conclusionem, quæ erat
frequentius facere recidivas febres, quæ
mouentur diebus paribus, quam quæ impa-
ribus. Ratio est, quia huiusmodi febres, quæ
mouentur paribus, semper sunt ex sui natu-
ra longiores, & periculosiores cæteris; lon-
giores teste Gal. com. aph. 36. sect. 4. pericu-
losiores teste eod. com. 36. 3. in 3. epid. ubi
Hippoc. inquit, loquens de febribus, illius
contumitionis; *Accessiones in malignis febribus
erant diebus paribus:* inquit in com. Gal. acces-
siones esse signum malignarum febrium,
quod repetit 2. in 1. epid. com. 75.

Sed quæret ulterius ingeniosus quispiam.

*Cur fe-
bris, quæ
habet ac-
cessiones
in dieb⁹
paribus,
sint longi-
ores, & pe-
riculosio-
res.*

Quæ est causa, cur febres, quæ habent ac-
cessiones diebus paribus, sint longiores, &
periculosiores? nemo hoc soluit. Ego puto
causam pendere totam ex transmutatione
materiæ, vel copia eiusdem.

Ex transmutatione, quando accessio pri-
mæ diei transit in accessionem diei secundæ.
Dantur, qui hodiè incipiunt febrere, reuertit-
ur cras, sequenti tertia non, sed quarta. Et
sic vicissim redeunt accessiones, quæ respon-
deant non amplius primæ, sed secundæ. In
hoc casu fiat permutatio ab vno loco in aliū,
primi diei permutatio transtulit in alium lo-

A cum; quæ excitatur secunda die est longior
& periculosior, quia pars quæ protulit hu-
morem protulit ad nobiliorem partē, vel igno-
biliorem: sed ad nobiliorem fit periculosior;
si ad ignobiliorem, magis protentā, diutur-
nior: propterea ex permutatione febres so-
lent esse periculosiores, vel longiores.

Alio etiam modo sunt periculosiores, &
longiores ex copia materiæ, quando ea tan-
ta sit in corpore, ut sufficiat pro constituen-
da prima, & secunda accessione.

Et propterea si huiusmodi febres inter-
mittant absque coctione, &c. necessarium
est illas recidivam facere.

B Conclusio itaque sit, febres acutas, & per-
nitiosas, quæ citò desinunt paribus, vel im-
paribus, atque crisi, necessariò recidivas fa-
cere.

Causa modò propter quam huiusmodi
febris intermittat, & redeat, est inquirenda.
nam videtur valde dubia; propterea inqui-
rendum, quare intermittat resitente humo-
re in corpore, & quare redeat.

Quantum ad causam intermissionis; fe-
bres istæ intermittentes, aut sunt prorsus le-
thales, omninò incurabiles; aut perniciosæ
quidem, sed quæ curari possunt.

Febres, quæ omnium lethaliissimæ, inter-
mittunt quidem, sunt, quæ habent locum de-
terminatum laborantem maxima inflam-
matione cum malignitate, qui locus neces-
sariò extinguitur, & corrumpitur. Vidi Ve-
netiis agros fuisse sine febre, cū decubue-
runt lethaliter, & post 3. 4. dies mortui sunt.
quia malignitas illa obsidet partem deter-
minatam, ex qua febris excitatur.

Sed si humor adeò malignus, ut partem in
gangranam conuertat, febris desinit.

Itaque toto eo tempore, quo putredo nō
peruenit ad alias partes, videtur corpus sine
febre: sed quia non potest ibi perflittere, sed
ulterius progreditur, ut videtis in gangrana-
tis, ita contingit etiam in partibus internis,
ubi incipiunt corrumpi, noua excitatur fe-
bris, quæ exacerbatur & crescit, & si pars di-
stat a corde, potest etiam secundò febris de-
finire: postea communicata corruptione
partibus cordi propinquis, statim aeger mori-
tur, etiam Medicis nil tale verentibus. Ita-
que hæc est causa, quamobrem fiat recidiva
in morbis lethalibus. quam sententiam ha-
betis 3. in 1. epid. com. 8. & 10.

In morbis autem, qui non sunt ita perni-
tiosi, intermittit febris, quia portio euacua-
tur, vel detruditur ad partem ignobilem,
quod sicut natura, si non potest extra corpus
pellere, pellit ad partem non admodum sen-
sibilem: dum est in hac parte non affert ma-
lum; si autem rursus petat partem princi-
pem, fit recidiva.

Causa etiam patet, quamobrem reuertat-
ur persistente humore in corpore: necessa-
rium, ut vel digeratur, vel moueatur ad par-
tem

*Quare fe-
bris inter-
mittat re-
sistere ad
huc hu-
more in
corpore.
1. Ratio.*

2. Ratio.

tem nobilem, vel ignobilem. Si digeritur cessat: si mouetur redit.

*Cur re-
deat 4.
vel 7.* Si quaratis, cur moueatur per quaternarios, & septenarios, &c. dies nō semper perpetuo necessarium: potest recte non modo septenariis, sed etiam diebus intercidentibus, frequentius quidem per circuitus quaternarios, & septenarios. Causa referri debet in naturam humoris peccatis, & putrescentis, & facultatem expultricem, non in sidera, & proprietates occultas.

*Ut vult
Fernel.* Dicebam causas recidiuarum, quæ statutis quibusdam temporibus fiunt nullas esse alias, quam humoris putrescentis copiam, & qualitatem, quæ irritat expultricem ad nouam humoris motionem: non confirmari propter temporis angustiam, quod hoc tempore vnico argumēto faciam. Eadem est ratio recidiuæ per quaternarios, vel hebdomadas, quæ crisis factæ per huiusmodi quaternarios vel hebdomadas: tūc facio tale argumētū. Sit sic, quod nulla est causā præter copiam humoris, vel qualitatem irritatam expultricem, quæ facit crises per quaternarios, vel hebdomadas. Ergo hæc etiam causā erit recidiuarum. Quod non alia causā, patet ex varietate temporum crisis. Scio esse varias opiniones; quidam attribuunt sideribus, proprietatibus humorum, humori melancholico, vt dixi. Hoc vnico argumēto conuincō, pendere non ex sideribus, non ex proprietatibus humorum, quia crises non perpetuo in diebus decretoriis in vno eodem die fiunt. Quando verò aliquid propriū habent, necessarium est, vt semper hoc die fiat. Exēplū: quarta dies est decretoria, sed nō in illis, qui mouentur de 3. in 3. de quibus Hip. 4. aphor. 36. Itaque crisis quartanæ bona, vt & 14. non est vsque adeo perpetua. nā in omni febre, quæ habet accessiones diebus imparibus, iudicatio semper cadit in 13. nō 14. in alijs diebus etiam fiunt crises 3. Itaque nulla certa dies. Fit citius, serius, prout humor magis abundat, vel minus: est magis calidus, aut minus. quæ omnia mutant. nam causā, quæ facit crises ad mortem, vel solutionem, facit etiā recidiuas. Propterea si sublata sit febris per iudicium imperfectum, tam diu homo erit sine febre, quousque tanta coarctetur copia excrementi, quæ possit iterum irritare expultricem ad motū. Similiter quamdiu copia persistit in loco, quo pars non possit retineri, tunc fit recidiua.

*Quare
alia fe-
bres mo-
ueantur
quotidie
alia de
tertio in
tertium,
&c.* Succedit vt explicem causam motus febrium per dies, quamobrem alia mouentur singulis, alia de tertio in tertium, 4. in 4. 6. in 6. in 7. &c.

Quantum ad Gal. vt intellexistis, non admittit circuitum vltra quartum diem, com. 7. 9. 13. in 1. tertij epid. Sed tamen in lib. de typis c. 4. non reculat hoc typos, sed qdquid sit de Galeno, confirmant Hip. Auic. fen. 4. lib. 3. cap. 69. Vallesius, & mea experientia.

Quaramus igitur causam huius periodi post quartum diem; est materia melancholica in pauca quantitate peccans, sed cū multa crassitie; propterea subiungit, est humor melancholicus ex pituita exulta. inquit hanc materiam debere esse crassissimam, propterea longos habet circuitus.

Hæc sententia videtur confirmari posse testimonio Hip. & mea experientia: nam 3. in 1. epid. tex. 9. vbi loquitur de quintana, inquit hanc antecedere vel consequi tabem: quasi dicat, ad generandam huiusmodi febrem duo esse necessaria, calorem excellentem continuum, præter naturam, præsentiam frigidi humoris pituitosi, qui exurat in hūc humorem. Hæc duo concurrunt in febricitantibus febre hectica, quæ tēdit ad tabem, quia habet calorem naturalem admodum debilem, calorem præter naturam continuum: hinc fit, vt pauci laborent febre hectica, qui non etiam destillatione propter defectum calidi innati: generatur succus pituitosus, ex altera parte exuruntur humores, quæ etiam causā quintanæ.

Et propterea Gal. scribit 3. in 1. epid. com. 9. se vidisse tertianos typos, sed non quintanos. Itaque ex hoc loco videtur confirmari opinio Auic.

Mea experientia. quia dicebam me vidisse duos febricitantes octaua: vir erat & mulier: vterque laborabat continuis longis, & desierat in cachexiam: post febrem trium mensium incidebat in octauam huiusmodi.

Monachus mensē Decembri incepit corripī, desijt in Februario.

Itaque hic post tres menses incidit in febrem octauam cum cachexia, qui post annum obiit.

Et nobilis mulier laborauit etiam febre *Febres,* admodum polixa, & in octauam desijt: qui *qua trā-* casus etiam videtur confirmare sententiam *seunt 4.* prædictam. Statutum igitur sit, febres, quæ *diem ex* transeant quartum diem, esse ex humore *quo hu-* melancholico genito ex pituita exulta, teste *more sit.* Hippoc. 3. in 1. epid. com. 7.

Hæc propono, quia sunt fundamenta eorum, quæ dicturus sum, de typis Quartanæ.

In inueniēda causa huius motus multum laborarunt interpretes. Ego nolo opiniones singulorum recensere: Tantum Arabum, Fernelij, & meam in medium proferam.

Arabes videntur huiusmodi motus tertianæ, quartanæ, &c. tribuisse proprietati humoris, qui in talibus diebus mouetur: est enim proprietas humoris biliosi, ut moueatur tertio, melancholici vt quarto die.

Confirmant hanc sententiam argumēto: hic motus cōuenit omni humori soli, & semper: ergo prouenit ex proprietate occulta.

Domini, vt dixi, si antecedens esset verū, vera esset consequentia: sed antecedens falsum. quod probo antecedente huic prorsus contrariō. Hic motus non conuenit omni

E humori,

humori, nec soli, nec semper; ergo non provenit ex proprietate occulta. Probo Antecedens, primo, quod non omnibus humoribus, &c. quia datur corpus, quod abundat multa pituita, ut corpus leucophlegmaticum, & tamen in hoc nullus fit motus typicus in oedemate.

Idem dico de icteria tam flava, quam nigra: & tamen, in flava neque erit motus, de tertio in tertium, neque in nigra de quarto in quartum: Ergo h. c. motus non convenit omni humori.

Non soli, quia multa alia praeter hos humores habent certos circuitus, ut excrementa alui, urinae excretio, menses muliebres, sanguis haemorrhoidalis, &c.

Sed omisso hoc circuitu prolixo, certissimum est sanguinem ipsum habere proprios circuitus, ubi sunt inflammationes ex sanguine, quae sunt magna ex parte ex fluxione sanguinis a loco ad locum. Itaque augentur & singulis diebus fit nova affluxio, lib. 1. de diff. feb. cap. ult. ubi docet causas circuitum febrium: Itaque certum est huiusmodi motum non convenire omni humori, nec soli.

Non semper, quod patet ex his, quae in proximis lectionibus dicta sunt. Nam consulto volo prius querere causas motus febrium, &c. quoniam fuerint illae. Diximus Erraticas ex sententia Hipp. 3. progn. 29. fieri ex humore melancholico: Ergo humor melancholicus non semper movetur, de 4. in 4. Consequentia clara, quae sunt istae, quae per quaternarios, & hebdomadas biliosae legitimae, vel spurcae, quae exacerbantur, paribus, vel imparibus reuertuntur, 6. dies intermittunt, iterum reuertuntur: Et haec sunt febres ex bile. Pariter quae ex 5. in 5. ex sententia Auic. Dixi esse copiam humoris melancholici: Ergo non semper convenit motus de 4. in 4. humori melancholico. Itaque non convenit omni, nec soli, nec semper. Itaque non ex proprietate occulta.

*Fernelij
opinio re-
futata.*

Fernelius ut evitaret tantum primam propositionem imaginatus est, se posse fugere, si diceret posse moveri omnes humores, si essent putridi. Est imaginatio nullius momenti. Nam dato, quod esset ratione humoris putridi non fugit tamen vim 1. & 3. & 4. rationis; praeterquam quod reuera falsum est, quod ratio huius motus pendeat ex putredine humoris, quia etiam non putrescentes habent aliquem motum typicum, teste Gal. lib. de typis cap. 2. pauci sunt morbi, qui non habent typos, excepta atrophia.

Propterea dolores oculorum, dentium, &c. omnes habent typum, neque tamen in omnibus humor putrescit.

Deinceps quaeram ex Fernelio, dato, sed non concessio, quae sit ratio, cur humor putridus contrahat hanc proprietatem? si dicat ex putredine, falsissimum. non est unica, oportet, ut dicat oriri hanc proprietatem ex humore putrescente, quod coincidit cum opinio-

ne Arabum. Ut omittamus alios, mea sententia est, concors cum Gal. lib. 2. de diff. feb. ult. nulla alia, quam humoris copia putrescentis, propter quam hic motus fit, vel quotidie, vel de tertio ad tertium, ubi multus est humor, movetur quotidie: Si minor de 3. in 3. Si adhuc minor de 4. in 4. Ego addo, si non de 4. in 4. faciat de 5. in 5. de 6. in 6. Itaque vno verbo causa est copia humoris putrescentis.

Cum dictum sit, quod ex copia humoris pituita, quae movetur quotidie, facilius possit putrescere. Duo igitur ne cessario concurrunt. Copia humoris, & facilitas eiusdem ad putredinem comparadam. Probo in pituita haec melius concurrere, quam in bile, & melancholica. pituita abundat magis in sanis, quam aegris. In sanis ex quatuor, ex alimentis, loco, instrumento coctionis, & ex fine.

Ex alimentis, quia quamquam alimentum habet seminaria omnium humorum, tamen propter sui impuritatem, & crassitiam semper habet plus excrementi crudi, quam ceterorum humorum.

Ex loci natura huiusmodi excrementum generatur in omnibus corporis partibus, ventriculo, intestinis, iecore, venis, &c. in maxima copia tamen in ventriculo, & cerebro.

Ex parte facultatis: nam calor deficit ex multiplici causa: naturaliter, quia semper evanescit praeter naturam, quia suffocatur copia, vel extinguitur a contrario, vel resolvitur a calore magis potente, vel contabescit ex defectu.

Denique augebit in maxima copia pituita, ex fine, quia tempore necessitatis convertitur in sanguinem, lib. 1. de nat. fac. c. ult. in fine, inquit Gal. natura non constituit vllum receptaculum pituitae, sed permittit manere in venis: ut tempore necessitatis convertatur in sanguinem.

Ex sua natura est pituita ita abundans, propter alias causas; primo, quia propter sui crassitiam, visciditatem, & lentorem non potest expurgari; secundo quia cum sit in ventriculo in maxima copia, est in causa conversionis alii menti in pituitam, quod cum ex pituita generatur, semper relinquit maximum inquinamentum. Illi humores maxime augent humorem similem, qui semper relinquit maximum inquinamentum, quod est causa facillimae putredinis alterius humoris.

De Causis Circuituum Febrium intermittentium: Cur scilicet quotidiana quotidie, tertiana de tertio in tertium, quartana de quarto in quartum, &c. reuertatur, & accessionem suam repetat, & simul etiam de causis febrium compositarum. Cap. X.

Ver labor in indaganda causa certa febrium, quae quotidie innadentes, propterea quotidianae vocantur, & earum similiter, quae eo, quod de tertio in tertium affligunt, tertianae nuncupantur: pariter earum, quae ob motum de 4. in 4. quartanae.

Propo-

*Pituita
magis ef-
se aptam
ad putre-
dinem quam
bilis, vel
melanchol-
ica.*

*Pituita
magis ab-
undare
in sanis,
quam in
aegris.*

Proposui eorum qui Arabum sectantur sententias, ut Hugonis Senensis, Thomæ de Garbo sententias, qui existimant huiusmodi causam referendam esse in occultam proprietatem horum humorum: nempe pituitam occultam habere proprietatem, cur quotidie moueatur, melancholiam, aliquam, ob quam de 4. in 4. bilem flauam, ob quam de 3. in 3.

Proposui etiam Fernelij sententiam, qui in hoc ab his differt, quod existimat proprietates huiusmodi competere humoribus iam putredinem habentibus. ut exploderem hanc sententiam, dicebam falsum esse, quod motus periodicus neque conueniat omnibus humoribus iam propositis, neque solis, neque semper.

Est argumentum oppositum. Illi dicunt: ille motus sequitur occultam proprietatem, quia omnibus istis humoribus conuenit solis & semper. ego oppositum statuo, & repeto. quod non conueniat omnibus, patet conspiciue in febribus biliosis, pituitosis, continuis.

Datur casus ex putredine bilis in venis communibus lib. 2. de cris. c. 6. quem inquit nil referre si vocemus febrem continentem, nullos habet circuitus, & tamen fit ex bile. Itaque si hic motus fieret ex occulta proprietate, haberet hanc periodum, & in venis & extra.

Quod dixi de bile, dico etiam de pituita. Febris latica Arabibus pituitosa febris est, & tamen non mouetur quotidie hic humor.

Accedit etiam, ut dicebam, in icteritia, ubi abundat bilis, non fieri motum de tertio in tertium; in Elephantiasi de 4. in 4. Ergo non omnibus humoribus.

Non solis, quia sudor aliquando erumpit modo typico, neque mutat dies, horas. Dicebam etiam pluribus statuto tempore alui excrementum excerni, uel quotidie, uel alternis diebus: patet itaque habere certos circuitus.

Quid plura? Sanguis habet certos circuitus, prætermisissimis mensuris, prætermisissimam inflammationem, certum est ex Galeno lib. 2. de diff. febr. capit. vltim. Omnes febres, quæ per circuitus exacerbantur sunt febres inflammationis. Vide locum, si sanguis confluat ad partes determinatas, facit accessiones habentque suas periodos, & si non accipiat hanc sententiam, aliter saltem accipiat in inflammationibus. Exempli gratia, membrana cerebri si nullos alios circuitus facit, saltem inflammationem facit. Certum igitur est ex his duobus esse falsam, quæ isti accipiunt pro verissimis, omnes & solas habere has periodos.

Tertio non semper eiusmodi motum competere his humoribus, patet primo ex febribus erraticis, quæ sunt ex pituita, vel melancholia. Ergo huiusmodi motus non ita necessarius, ut non possit variari.

A Denique patet in febribus quintanis, sextanis, septanis, nonanis, &c. Habent periodos ex humore bilioso, melancholico, vel inuicem mixto. Ergo falsa illorum sententia.

Præter has rationes alia sumitur ex febribus duplicibus tertianis, quas vocamus duas & tres: & tres, febres. Explico: Dantur febres duæ & tres duplices & triplices, vocantur duæ & tres, quæ cum deberent inuadere de tertio in tertium, inuadunt singulis de quarto in quartum, uel singulis uel duobus diebus affligunt, vno intermittunt.

Vocantur duplices illæ, quæ inuadunt vno die, uel pluries. Exempli gratia, quotidiana si semel affligat, dicitur simplex. Si bis, ter, duplex, triplex: Pariter tertiana si vnica die habebit duas accessiones, dicitur duplex; Idipsum dico de quartana, lib. de typ. c. vlt.

His explicatis, dico ex his febribus colligi hunc motum, quem ipsi existimant incertum.

Veniamus primo ad quotidianas, quæ ex eorum sententia, qui putant periodos esse certas, affligunt 18. horas continuas, sex intermittunt, post 6. reuertuntur. Tunc dico febres quotidianæ quæ duas, tres habent accessiones singulo die, quas habebant periodos? scio dictum, ut singulæ singulis respondeant; Exempli gratia, inuadat vna hora, duodecima, 13. 24. Si altera die reuertuntur, possunt dici tres quotidianæ, hoc est certissimum: sed hic circuitus non adeo certus, ut non possit variari. Dantur Febres catarrhales ubi sunt

C duæ, tres, quatuor, quinque accessiones singulo die & inordinatæ, quia sunt ex materia pituitosa multa in cerebro. Pro varietate fiunt post duas, tres horas.

Ego vidi multas ex his febribus. Prima accessio corrumpit propinquam, & sic vicissim fit motus vno die quinque, sexies: nullus est certus ordo in istis. Venio ad alias.

Quantum ad biliosas; hæc possunt esse duplices, & duæ. Duplices, si vno die habent duplices accessiones: Duæ, si singulo die inuadunt.

Accipiamus quæ singulo die inuadunt. Quæ est causa harum? Pendet ex loco affecto qui aut vnus aut plures: ex vnico loco & pluribus possunt fieri duæ accessiones; Ex vnico loco fit duplex accessio. Primo ut

D pars generet excrementum, quod corruptum facit accessionem; ubi corruptam & pars ex putredine redditur calidior, sequitur imbecillitas in parte, ut tunc altero die materia generetur eadem quantitate & faciat secundam accessionem. Hanc rem significauit libro secundo de Differentiis febrium capite duodecimo, ubi docet febres, quæ certo ambitu redeunt, &c. Itaq. si sit febris biliosa quotidie, & altera die iterum inuadat, hæc febris poterit appellari tertiana, si non respiciamus ad antiquum morem; sed ex meo placito vocabitur biliosa quotidiana; quia inuadit ex eodem loco, istdem causis, neque est imaginariū. Gal. ipse lib. 2. de cris. c. 9. audit has e-

bres cum iisdem signis cum iisdem sympto-
matis eadem hora inuadentes, & vocat duas
tertianas, quia mouetur quotidie humor.

Aliquando fiunt huiusmodi febres duæ ex
diuersis locis patientibus: vna die putrescit
humor in iecore, altera in cerebro: in his ca-
sibus inuadunt cum diuersis symptomatibus,
diuersisque horis.

Quod dixi de biliosa, dico etiam de me-
lancholica. Dantur melancholicæ, quæ ali-
quando habent suas proportionales de quarto
in quartum, quanquam singulis diebus in-
uadant.

Causa Sed dantur aliæ quæ inuadunt quotidie
quarta- vna hora, aut saltem quotidie habent suas
narū dua anticipationes. Exemplum vidistis in ancilla
rum aut D. Caltoris. Sed ista habeat accessiones, sin-
trium. gulis diebus anticipabant duabus horis; Sa-
nata Dei beneficio à tribus quartanis media
hyeme. Idipsum etiam paret in duplicibus,
& ceter.

Causa dupli- Causa duplicis & triplicis pendet, vel ex
eis & tri- unico loco, vbi pluribus.
pluris.

Ex unico loco potest fieri, vt fiant duæ 3.
febres vno & eodem die.

Do exemplum. Si iecur, in quo accédatur
vna accessio febris tertianæ, aut generet ex-
crementum biliosum, ex quo fiet vna accessio,
vbi humor putrescit, & reddit partem ca-
lidam, excrementa biliosa propinqua quæ re-
periantur, attrahuntur, quæ erit occasio secun-
dæ accessionis. Si contingit hanc attractionem
fieri pluries, fiunt etiam plures accessiones:
potest fieri ubi iecur attraxerit excrementum,
corrumpit alimentum, dabitur occasio ter-
tiæ accessionis lib. 2. de diff. febr. cap. ult. tunc
dico fiunt duæ, tres accessiones. Per has casus
petam, quæ sit periodus inter primam & ter-
tiam accessionem, non certa; nam secunda est
accidentalis. Supponatis prima est certa, se-
cunda, & tertia, quæ sit ex attractione excremen-
ti à locis propinquis, ex qua causa prouenit, non
potestis dicere, quod ex occulta proprietate
humorum. qui uult seruare naturam proprie-
tatis humorum, oportet ut dicat fieri ex earum
natura: Quando autem dicimus fieri ex attra-
ctione, non erit motus ex proprietate humo-
ris, erit ex uolentia. Et illa secunda, & tertia
erit biliosa, quæ fiet à natura partis calefactæ
attrahentis excrementum. Dico ergo, quod
cum sit accessio ex generatione, ex attractione,
alteratione, non posse dici causam esse
occultam.

Quod si febres istæ duplices triplices fiant
ex pluribus locis, aliquando potest fieri, vt
habeant certam periodum.

Sed dico: quando huiusmodi duæ tres ac-
cessionis fiant eo modo, quem explicavi,
non habent periodos. Fiunt ex necessitate,
quia iecur calidum reddatur & corrumpat
excrementum.

Etiamsi febrium periodi non sint usque a deo
certe, ut non possint mutationem subire, vt

A expoluimus, nihilominus, quia experientia
docet, magna ex parte pituitosas quotidie
axacerbari: Biliosas uero de tertio in tertium,
& melancholicas de quarto in quartum, oportet
assignare causam huius frequentie, etiamsi
non sit perpetui ordinis.

Vt accessio fiat quotidie, duæ requiruntur
conditiones, quæ uel si ambe deficient, aut
vna saltem, necessario accessio in longius
tempus protrahitur.

Conditiones inquam duæ sunt, ut fiat quo-
tidie, prima, ut materia multa simul sit col-
lecta, quæ sufficiat ad efficiendas multas ac-
cessionis.

II. Vt huiusmodi materia multa collecta
habeat causam effectiuam, quæ quotidie mo-
ueat putredinem illam.

Si deficiat prima conditio aut secunda, ac-
cessio non fit quotidie.

Hoc stante fundamento, dico magnam ex
parte pituitam moueri quotidie, quia obti-
net has duas condiciones.

Quod pituita multa colligatur & reperia-
tur in humano corpore probavi in superio-
ribus: Probabo etiam in presentia.

Causa est multiplex: pendet primò ab ali-
mento peccante in copia, qualitate, & ordi-
ne assumptionis: in tempore antequam pri-
mus sit coëctus, & preparatione, ex somno
interrupto, ex curis animi, nimis laboribus.

C Altera causa est imbecillitas caloris uen-
triculi atque uniuersi corporis, qui facillime
propter errores, qui committuntur, corrumpi-
tur.

III. Causa est finalis: nam ut docuit Gal.
lib. 3. de nat. fac. cap. ult. huiusmodi succus à
natura generatur, & in uenis continetur, ut
deficiente alimento conuertatur in alimen-
tum & sanguinem. Itaque natura hoc excre-
mentum sustinet gratia huius usus, eiusque
multum in corpore & in omnibus partibus,
præcipue uentriculo & cerebro, quæ sunt
fontes pituitæ.

Prima itaque conditio locum habet in pi-
uita.

Secunda conditio quod scilicet adsit ca-
lor, propter quam quotidie moueatur ad putre-
dinem, pendet partim ex inquinamento, ex
loco, in quo continetur, atque ex alimentis
quotidie assumptis.

Quantum ad inquinamentum, sunt reli-
quæ humoris propriis putrescentis adhuc non
expurgatæ & in huiusmodi digestæ.

Ex humore melancholico paruum etiam
relinquitur inquinamentum, sed conuertitur
in cinerem lib. 2. de diff. febr. cap. de quartana.

Pituita relinquit inquinamentum calidum
& humidum, & propterea conuertitur in pu-
tredinem. Itaque ex hac prima causa inqui-
namento scilicet facillime, & quotidie po-
test fieri noua accessio.

Secunda est ex parte loci, quæ committit
cum tertia.

Locus

Vt humo-
res quoti-
die mo-
ueantur,
quid re-
quiratur

Cur in hu-
mano cor-
pore plus
abundat
pituita,
quam re-
liqui hu-
mores.

Quæ quo-
tidie pu-
tuita mo-
ueat ad
putredinem
magis quæ
humores

ali.

Locus in quo fiunt est ventriculus & cerebrum, in quibus quotidie corrumpitur, quæ est causa vel cibi, vel id, quod habet locum cibi; quando quis abhorret à cibo propter nauseam, vel ob præscriptum Medicorum, in hoc casu adest aliquid loco cibi, quod moueat putredinem; quid hoc? Ichores, qui attrahuntur à ventriculo. Est doctrina Gal. lib. 3. de nat. fac. cap. 13. vbi ventriculus cibum non habet, & eget nutrimento, si non attrahit ab ore, attrahit à partibus circumstantibus: Et si non potest attrahere bonum succum, attrahit malum, Itaque quod accedit ad ventriculum, habet rationem mouendi putredinem. Causa facillima, vbi pituita in ventriculo illum moueat ad putredinem, si accedit alimentum, statim illud alimentum suffocat illum calorem præter naturam, ille suffocatus fit magis acris, & excitat maiorem putredinem. Vbi factus acrior, & magis putridus, datur occasio principij secundæ accessionis. Hoc potestis aduertere in stercoribus animalium.

In ventriculo vbi pituita iam semitam habet ad putredinem, si supponatur cibus, auget putredinem, consequenter fumus maximus erumpit, quoties materia perseverauerit in ventriculo, & cerebro.

Dicetis hanc causam habere locum in ventriculo, non in cerebro. Sed aduertatis, quamquam in cerebro non tantum cibus apponatur, qui efficiat hanc suffocationem, nihilominus accedunt cerebro fumi, qui ascendant à ventriculo in cerebrum, qui vapores habent locum causæ mouentis putredinem. Itaque si multoties fiat hic ascensus in cerebrum, sunt quandoque duæ tertianæ, aliquando tres, quod obseruavi, qui propter ingluuiem uolunt cibum capere bis, & ter, & tunc sunt duæ, & tres accessiones si unica vice, unica & melior.

Cur tertiana non moueatur quotidie.
Tertiana modò, seu biliosa non quotidie exacerbatur, quia deficit una conditio; aut enim materia non est tota simul collecta, aut non est in eo loco, in quo possit quotidie moueri ad accessionem. Declaro utrumque.

I. Dico biliosam tertianam non habere totam materiam simul collectam, si sermo fiat de proportionatis, & intermittentibus. Loquimurigitur de proportionatis, & intermittentibus. Istas dico magna ex parte fieri ex materia, quæ colligitur de accessione in accessionem. Tunc fit si debet hæc materia colligi de accessione in accessionem. Dico, quod numquam est in tanta copia, ut possit quotidie excitari. Quæ est ratio? Quia hæc materia est ita acris, mordax, & calida, ut non possit sustineri à partibus præcipuis. Itaque ut dixi in hoc casu primum non potest multa colligi, quia propter acrimoniam non sustinetur. Secundò, quia non relinquit inquinamentum, vt pituita, quia est tenuis. Itaque necessarium est dari tempus huius regenerationis.

Si materia simul collecta reperitur, defi-

A cit altera conditio, quia hæc materia, quæ multa colligitur in corpore, colligitur in locis ignobilibus, & propterea non accedit ijs locis ita facile noua materia, sicuti in pituita, quæ est in uentriculo non concurrit ibi causa, quæ tam cito possit suffocare calorem. nam excrementum hoc biliosum in locis ignobilibus transmittitur à nobilioribus. Exempli gratia, generabitur in carne corporis, iecore, natura non sustinet, transmittit ad imbecillas. Huiusmodi transmissio non potest fieri, nisi absoluta iam tertia coctione. Singula coctio exigit 8. uel 9. horas, ita ut tertia post horas 27. circiter absoluat, hac absoluta generatur excrementum tertiæ coctionis: Si non sustinetur à parte, sed transmittitur, tunc temporis excrementum potest mouere illum humorem ad putredinem: Sed quia non statim fit motus, requiruntur saltem sex, uel septem horæ, ut corrumpat humorem propinquum, & etiam 3. horæ antequam excrementum putrescat; Itaque tertiana exquisita affligit duodecim horis, & triginta sex intermittit: videtis quomodo ordine rectè procedat.

B Quod dixi de bilioso, dico etiam de melancholico. Exquisita Quartana (neque enim loquor de spurijs) propter causas dictas longiores habet accessiones; paucissima colligitur in corpore melancholia, & propterea antequam colligatur humoris copia, requiritur duplum horarum quam in tertiana. Non nego posse colligi melancholiam viginti septem horis, sed ita paucam & tardam ad suscipiendam putredinem, ut nisi alius accedat, non possit moueri ad putredinem, requiritur duplex circuitus, quinquaginta quatuor horarum ad inducendam putredinem, & sex, aut septem ultro, ut sint 61. horæ.

Itaque hæc est causa propter quam magna ex parte sic procedit. Ego excogitavi hanc sententiam. si uobis ardeat, potestis eam accipere: Sin minus, excogitare aliam meliorem.

Expedio breuibus causas febrium Compositarum. Febres Compositæ, aut componuntur ex febribus eiusdem speciei, aut diuersæ (loquimur de putridis.)

D Componuntur ex febribus speciei eiusdè, quando componitur simul quotidiana cum quotidiana, tertiana cum tertiana, quartana cum quartana.

Componuntur febres diuersæ speciei, quæ tertiana cum quotidiana, tertiana cum quartana, uel quotidiana cum quartana, uel quotidiana cum tertiana.

Componuntur febres diuersi generis, quæ intermittentes cum continente, siue sit biliosa, uel pituitosa, siue melancholica.

Componuntur febres eiusdem generis continuæ cum continuis, intermittentes cum intermittētibus: quæ Complicatio est adhuc duplex, per modum Complexionis, uel Confusionis.

Cur omnium earum dissimile moueantur quartanæ.

De causis compositionis.

Complexionis, quando accessiones inuadunt horis diuerfis.

Confusionis, quando duæ accessiones inuadunt vna eademq; hora. causas explicaui in præcedentibus.

Componuntur ex vnico loco affecto, vel pluribus.

Ex vnico, quando scilicet vnicus generat excrementum, retinet, & corrumpit: aut quādo vnus locus suspicita pluribus partibus. à iecore, liene, ventriculo, & tot sunt accessiones quot sint tempora attractionis.

Ex multis, quando duo, aut tres sunt foci putredinis.

Breuis repetitio eorum omnium: Quæ de causis Februm Putridarum huc usque dicta sunt.

Cap. XI.

*Quatuor
notanda.*

Hactenus de febris⁹ propriæ ideæ. Oportet primò nouisse ideam: secundo magnitudinem, vel proprietatem: Tertiò motum febris; Quarto morem. Veriati hætenus sumus in explicanda idea, in sequenti agam de reliquis tribus. Oportet, vt dicebam, cum, qui rectè febres sit curaturus, quatuor ante omnia intelligere, quorum modò mentionem feci. In his itaque versari oportet, antequam ad curationem descendamus, & ad specificas differentias.

*Idea fe-
bris.*

Dico antequam descendamus ad specificas differentias, etenim idea, seu natura, seu forma, seu species febris, alia est generica, alia specifica.

Specifica est illa, de qua erit sermo absoluto vniuersali tractatu, in qua parte loquimur de singula specie febris biliosa, pituitosa, & melancholica. Denique etiam de sanguinea.

Idea vniuersalis est illa iam explicata, quæ sub se continet putridas, continuas, conclusas, periodicas, intermittentes omnes tam erraticas, quam typicas. Harum causas explicaui.

*Causa pu-
tridarum.*

Sed quia tractatio prolixa, & difficilis est, decreui anteq̃ progrediar breuiter hoc tempore vobis repetere, quæ dicta sunt, & breuioribus conclusionibus prestringere putridarum causam.

Dixi esse putredinem in humoribus cordis; non sufficit humores vniuersi corporis putrescere, nisi etiam cordis.

Hæc Putredo est vel primaria, vel secundaria.

Si Primaria, inducitur vel ab aere externo putrido, vel à prohibita transpiratione humorum cordis. quæ prohibita transpiratio fit existente aliquo morbo, vel in arterijs pulmonum lauibis, vel arcta arteria.

Fit secundariò hæc putredo ex contactu alicuius humoris, vaporis, fuliginis, putridæ transmissæ, vel a venis communibus, aut venis determinatis ad cordis ventriculos. Et

A hæc causa putridæ vt putrida.

Conunarum Synochorum, seu Conclusarum Continentium est, vt dixi, putredo humoris vtilis, & alimentalis in venis communibus, vel saltem maximis, & cordi proximis: & si huiusmodi humor contineatur in uasis omnibus, siue uteri, iecoris, &c. quæ uasa maxima, facit hæc putredo continuam continuentem, quia hæc materia tamquam vtile alimentum cordi proxima est; semper abundat, semper potest corrumpi.

*Causa cō-
tinuarum.*

Quantū ad Proportionatas, quia sunt continuæ intermittentes, explicaui primò causam periodi in genere, siue continuas conueniat, siue intermittentes.

*Causæ p-
portiona-
tarum.*

BCausa igitur, vt sint periodica, est unica in continuis & intermittentes, Putredo scilicet excrementi tertiæ coctionis, non humoris vtilis, sed excrementum quod relinquitur celebrata tertiæ coctione.

Itaque vno uerbo semper febres proportionate excitantur ex putredine excrementi tertiæ coctionis in parte determinata.

Nunc modò descendendo ad continuas proportionatas.

Continuæ proportionate, quæ habent circuitus, aut nullas habent declinationes, aut habent, sed non multum sensibiles. propterea ut Gal. dicit, non deponunt duritiem, inæqualitatem, nec frequentiam pulsus, lib. de morb. temp. c. 7.

*Causa cō-
tinuarum
proportion-
atarum*

CAliæ etiam sunt, quæ quia habent manifestas declinationes, deponunt hæc omnia. Quæ nihil declinant, puto esse illas, quæ excitantur tam ex humoribus alimentalibus, quam excrementis tertiæ coctionis, quæ locum habent in magnis inflammationibus partium principalium, & putredine uenarum communium.

Quandoque sunt magnæ inflammationes uteri, pulmonis, &c. In his materia, quæ est extra uenas, est excrementum tertiæ coctionis, sed propter magnitudinem inflammationis corrumpitur etiam sanguis in venis communibus. ubi non declinant, mittunt aliquando excrementum ad uenas, quæ ibi putrescit, habent proportionem, & tamen non declinant.

DCausa declinantis quidem, sed non deponentis duritiem, inæqualitatem, nec frequentiam pulsus, est inflammatio partis putridi humores excrementi in uenis communibus in maxima copia, aut insigni crassitie.

*Causa cō-
tinuæ de-
clinatio-
nis.*

Non dico in huiusmodi casu peccare humorem alimentalem. nam tunc febris non declinaret. Dico saltem in partibus adesse inflammationem alicuius momenti, & ideo non deponunt pulsus duritiem.

Similiter febres ex humore crasso tertiæ coctionis habent declinationes; sed quia humor multus, & crassus, natura non potest eum consumere, tunc facit frequentiam.

Causa

Causa proportionata Causa proportionatarum & continuarum declinantium, est affectus partis determinatæ, sed ignobilis distantis à corde.

Idiomatica Id ipsum contingit, si humores in venis, vel non sint multi, vel non admodum crassi. Habetis causas continuarum intermittentiū.

Intermittens Intermittit febris, quia humor excrementum tertie coctionis, qui peccat, totus euacuat, aut totus digeritur. hæc causa intermissionis.

Explicavi quinto etiam causas periodi Erraticæ, & Typicæ.

Erratica Erraticæ periodi variant pro varietate motus erratici; dantur enim ratione hebdomadarum, dierum, horarum.

Hebdomadarum sunt ex leui affectione calida post morbum magnum, longum, cui accedant errores. augentur enim excrementa, quæ progressu temporis putrescunt.

Secunda causa est varia natura partis continentis in se cinerulentos humores relictos post alias febres, ubi quis, exempli gratia tenatur quartana, & consequenter partes variae contineant cineres. Calidior mouebit humores citius, frigidior serius; & hic motus est innatus.

Quando sunt erraticæ ratione dierum, sit duplex similiter transmutatio; vnius humoris in altum; varietas humorum simul & semel in corpore abundantium; nam exempli gratia si mutetur humor pituitosus in melancholicum, quodiana mutatur in quartanam.

Fiunt erraticæ ratione horarum ob errores ægri, Medici, astantium. Si deliquerint in 6. rebus non naturalibus, statim anticipationes mutant horas.

Causæ typicæ Quantum ad causas typicarum, seu ordinatarum: Typicæ alie sunt febres recidivari quintanæ, sextanæ, &c. 7. 8. 9. alie quotidianæ, tertianæ, quartanæ.

Recidivæ producuntur, aut ex errore, aut humore nō integrè purgato in priori febre, sed transmissō dolore ad locum.

Causæ quintanæ, sextanæ, &c. Causa autem febris typicæ, quintanæ, sextanæ, &c. 7. 8. 9. est putredo humoris melancholici geniti ex pituita exulta: quia hic humor difficillime vitur, propterea longas habet accessiones.

Causæ quotidianæ Causam verò febris quotidianæ, tertianæ, quartanæ explicavi in proprijs locis, & puto vos meminisse horum, Quotidianā fieri ex pituita contenta in ventriculo, quæ quia relinquit maximum inquinamentum, & quia eibus quotidie assumitur, adest semper nova materia ad putredinem.

Tertianarum Tertianæ sunt plerumque ex humore, qui de accessione in accessionem relinquitur. Quod si totus collectus sit in corpore, est collectus in partibus ignobilibus, propter ea requiruntur horæ viginti septem, & sex, vel septem ad motionem.

Quartanarum Accessionem fieri dixi ex humore melancholico frequenter. quia hic humor requirit duos circuitus coctionum, antequam generetur, & putrescat.

Duo circuitus sunt 45. horæ: his accedunt septem, vel octo, propter quas humor disponatur ad putredinem, eruit sexaginta duæ horæ.

Exposui etiam causas compositarum omnium. Venio modò ad id, quod sum pollicitus.

De Magnitudine, & Paritate febrium; quod erat secundum observandum. Cap. XII.

B Magnæ febres, vel Parvæ duobus modis intelligi debent. Magna ratione vehementiæ caloris, ut explicavit Gal. com. 3. aph. sect. 6. ubi Hipp. inquit distinguendas esse differentias dolorum alio modo, ratione symptomatum, lib. 3. de cris. c. 4.

Ratione Vehementiæ ingentis caliditatis provenit ex sanguine, bile, vel his inuicem mixtis.

Ex sanguine putrescente; & quo calor fuerit maior, non tantum suspicandum de bile putrescente, quantum de quibusdam bilis speciebus. nam pallida facit calorem ingentem, sed non maximum: æruginosa magis facit intensum: intensissimum porracea.

Ratione Symptomatum, quæ habet symptomata pathognomonica, quæ ostendunt magnitudinem, sed magis pernitiem febris, quæ magnitudinem: Exempli gratia, biliose teoris pathognomonica signa, ut sitis, &c. quod maiora eò ostendunt febrem maiorem, cū non tantum materia putrescens, non tantum bilis, quantum etiam locus eo conspirant.

Excitantur ex locis determinatis, & quò locus præstantior, eò grauiora inferi symptomata. Ex cerebro nempe, vicerum omnium maximo.

Ex quibus etiam patent causæ Paritatis, quæ sunt ex humoribus oppositis, non in locis præcipuis.

In sequentibus habebitis tractationem de Causis acutarum febrium, & longarum, & breuium.

D *De Motu Februm Putridarum, cuius ratione dicuntur Acuta, Breues, aut Longa, siue chonica, Cap. XIII.*

*F*ebres putridæ, ut dicebam, non tantum ideam, & magnitudinem obtinent, quantum & motum & morem. De idea generica, & magnitudine hæcenus dictum est, nunc dicam de Motu, & in sequentibus etiam de More.

Habent ergo ut dicebam febres putridæ Motum, cuius ratione aliquando dicuntur Veloces, aliquando Tardæ. Nonnullæ enim sunt velocis motus; aliæ tardæ: & quæ sunt uelocis,

locis, rursum distinguuntur in illas, quæ aut sunt cum periculo, aut absque eo.

Febres velocis motus quæ habent vitæ periculum adnexum, proprio nomine Acutæ vocantur.

Quæ nullum habent vitæ periculum adnexum proprie vocantur Breues.

Rursum febres tardi motus sub diuidentur in eas, quæ cito sua tempora pertranseunt; & quæ longo temporis spatio finiuntur.

Primæ similiter Breues dicuntur; secundæ autem Longæ, seu chronicæ: ita vt tota distinctio febrium ex parte motus tres sub se comprehendat præcipuas differentias; quarum prima est acutarum, secunda breuium, tertia chronicarum, seu longarum.

Acuta febris.

Acutæ diuiduntur in duas differentias. nã acutarum cum character sit vitæ periculum, nihilominus contingit vt aliquando citò finiatur, aliquando admodum serò. Hinc duæ Acutarum Differentiæ nam quæ finiuntur in vigesimo. Simpliciter acutæ dicuntur; Quæ progrediuntur vterius, Acutè ex delapsu vocantur, Libro 2. de diebus decret. cap. secundo.

Breues.

Pariter breues febres sunt in duplici differentia: aliæ breues velocis motus; aliæ breues tardi motus. Fieri potest vt febris sit brevis, & tamen modò velox, modò tarda. Velox quâvis spatiū non admodū breue, admodū tamen velociter transire solet; & propterea febris, quæ definit in vigesima die, si habeat accessiones vehementissimas, cum maximo calore, dicitur velocissima, & tamen non est ita brevis. Contra illa febris, quæ mitissima & tardissima, quamquā definat in quarto, vel sexto, dicitur non brevis, sed tardi motus.

Chronica.

Chronicæ autem febres vnicam habent differentiam tardi motus, & longi. Versabimur itaque circa has febres; & primò circa breues & longas, deinde circa acutas. Breues sunt, quæ cito sua tempora pertranseunt; sicut longæ quæ tardius eadem pertranseunt.

Vt intelligatis quid sibi velint hæc verba, duo veniunt explicanda, Primò quæ sint hæc tempora febrium. Secundo quid intelligamus per Citò.

Nomine Temporum intelligere oportet quasdam morbi mutationes, secundū quas videntur febris ita mutare statum, sicut mutant homines proprium statum ratione ætatis: Ita vt Medici tempora febris ætates vocant. alia enim est natura pueri, alia iuuenis, alia ætatis consistentiæ, alia senectutis. Sic Medici febris quattuor habet tempora, Principium, Augmentum, Statum, & Declinationem, quæ sunt tempora vniuersalia; de particularibus autem agemus infra.

Tempora igitur vniuersalia constituuntur quattuor & quamquam multi antiquitus & nostris temporibus de numero dubitarunt, & conati sunt explodere, alij exploserunt

A principium; alij augmentum, &c. Ego non volo in his diutius versari. Videte Gal. in lib. de tot. mor. temp.

Supponamus dari quattuor tempora, principium, augmentum, statum, & declinationem. versari oportet in hoc potissimum, vt inueniamus rationem distinguendi hæc tempora. Gal. qui diligenter de hac re scripsit in lib. de tot. mor. temp. cap. 4. & Auic. fen. 1. lib. 4. 7. 1. c. 3. putant totam rationem distinctionis horum temporum pendere ex sola coctione & cruditate excrementorum; ita vt tempus exquisitæ cruditatis; sit tempus principij; tempus in quo incipit concoctio, augmentum; tempus, in quo perficitur status; facta absoluta coctione tempus declinationis. Propterea Gal. non tantum in genere, uerum & in specie huiusmodi coctionem, & cruditatem explicauit: nouit nō omnes morbos esse vnius, & eiusdem speciei. Dantur, qui ortum ducunt ex humoribus contentis in venis. Secundo, qui oriuntur ex fluxione de parte in partem. Tertiò dantur solutæ vnitatis. Galen. omnia lib. 1. de crif. capit. 17. describit.

Distinctio temporū vniuersalia.

Quisnam est modus cognoscendi? Tota ratio cognoscitur ex vrinis. Vrinæ constituunt principium febris, ubi incipit coctio, color ex albo mutatur in flauum: substantia magis crassa est augmentum; si factum ad bonum colorem, status: si superuenit excretio humorum noxiorum, sequitur declinatio.

In inflammationibus principium morbi est totum tempus fluxionis humorum, ubi sanguis iam fluxus incipit putrescere. nam in inflammationibus sanguis, qui confluit ad partem, est extra uenas, ubi, necessario putrescit: ubi incipit putrescere, est principij augmenti; si conueritur in pus, aderit status, factò pure, si digeritur materia, succedit declinatio.

In ulcere principij tempus, in quo fluunt ichores multi & tenues ex ulcere, & in maxima copia; augmenti, in quo fluit ichor minori copia, sed in formam puris conuersus; declinatio est manifesta. Sed qui sectantur Arabes, (intelligo autem per sectatores Nicolū, Thomam de Garbo, Gēulem, Iacobum Foroluiensem) isti præter hos modos alios inuenerunt. Primus capit ab essentia morbi, seu febris: alter à symptomatis febrium. Dicunt præter coctiones & cruditatem nos posse distinguere ab essentia, & symptomatis febrium.

Porro erit ex essentia principium febris, quando calor naturalis incipit conuertere in igneum: ubi augetur, erit augmentum: ubi auctus persistit in uigore, erit status: ubi declinat, & reuertitur ad statum naturalem, erit declinatio.

Pariter ex symptomatis: ubi incipiunt symptomata parua, & pauca, est principium: ubi augentur numero, & ui, est augmentum: ubi sunt

sunt in summo, est status: ubi remitti incipiunt, declinatio. Valle sius qui his hsec Arabū sectatoribus est infelix lib. 10. cōt. 16. impugnat hac sententiam, & deridet, & inquit huiusmodi modos distinguendi febriū tempora semper esse coniunctos, & cruditis tempora; vno verbo inquit, hæc tria vnū esse pendereq; a cruditate. sed pace illius, neque essentia morbi, neque symptomata conueniunt cum cruditate. vt aliter se res habere nou possit, probo ratione, & autoritate.

Febris aut ortum ducit ex putredine humorum in vasis communibus, aut determinatis.

Vbi putrescunt humores in vasis communibus, si sint calidi, ut synochus, statim in principio ratione essentis febris est in statu, lib. 3. de cris. cap. 4. quia huiusmodi humores putrescunt in omnibus vasis, & statim in principio excitant calorem vehementissimum: propterea 3. in 1. epid. tex. 10. febris quibusdam statim incipiens florescit & viget, statim est in statu, habetur ratio cruditis, non essentis.

Ex aduerso in parte determinata, exempli gratia, in ore vetriculi huiusmodi febris habet statim in principio omnia symptomata horrendissima, & tamen si respiciatis vrinas, erit principium; si symptomata, erit augmentum.

Pariter supponatis febres malignas, quæ lib. 3. de cris. c. 4. non sunt vehementes & tamen habent symptomata grauissima. Itaque quantum ad essentiam morbi, est in principio; quantum ad cruditatem erit in principio: Quantum ad symptomata, erit in augmento. Autoritate, vt scēt. 2. aph. 29. com. vbi scribit Hipp. incipientibus morbis si quid mouendum videtur, moue. videntibus verò, quietem agere melius est. Inquit Gal. quandoque contingere, vt in statu symptomata sint grauissima, & tamen morbus est mitior, sed symptomata augentur.

Distinguuntur igitur secundo conditione ex Essentia, & Symptomatibus. Pariter acut. com. vlt. inquit aliquando febrem reddi mitiorem, symptomata augeri. Sed quamquam distinguantur, si petatis, num huiusmodi sint sufficientes ad describenda tempora febriū, mihi non probatur. sunt valde dubia; aliquando in principio tempore cruditis symptomata sunt in augmento: fallit hæc regula. Similiter, malignæ semper erunt in principio, etiam quando patientes moriuntur.

Itaque nulla alia regula, quæ nunquam fallit, quam quæ desumitur ex costione, & cruditate. Itaque ad hanc rem etiam perspi-

A tempora particularia, quæ in intermittentibus sunt sex. 1. principium. 2. inæqualitas. 3. augmentum. 4. status. 5. declinatio. 6. interuallum.

Principium in quo calor natus viscerum suffocatur a materia, quæ excitatura est febrem; & propterea illud tempus est istud, in quo comprehensa sit annotatio, seu comprehensio pulsus, seu contractio, aut paruitas, quæ omnia vnum & idem significant.

Tempus inæqualitatis, in quo natura incipit aggredi pugnam inter calorem intentū, & frigus externum. nam in principio calor omnis retrahitur ad interiora: ubi calor erupit ad exteriora, est tempus inæqualitatis.

B Augmentum illius, in quo calor naturalis superauit ex toto refrigerationem externam, sed intenditur, & augetur.

Status, in quo calor febrilis est in summo.

Declinatio, ubi calor incipit euanescere.

Interuallum tempus dimissionis.

Hæc sunt tempora febrium intermittentiū.

Continuæ enim proportionatæ quædam habent quinque tempora, quædam tantum tria. Nam dixi in superioribus febrium Proportionatarum duas esse differentias: quædam habent declinationem, quædam non.

Declinantes habent quinque tempora; principium, inæqualitatem, augmentum, statum, declinationem; carent tantum interuallum.

E Sed quæ exacerbantur non declinant tantum, quia deficit declinatio, & inæqualitas.

Ratio est; quia huiusmodi febres non exacerbantur cum refrigeratione, horrore, rigore; augetur calor, sed raro cum refrigeratione.

Breues præter tempora vniuersalia non transeunt viginti diem. ubi transeunt hunc diem, incipiunt fieri longæ febres, longumq; habent statum. Intra viginti dies sunt etiam varij termini, quædam 3. 4.

Quantum ad particularia tempora, quæ abfoluuntur spatio duodecim horarum, sunt breues, quæ plurimum, sunt protentæ.

Ostendi hæcenus sub motu tardō, aut veloci tres febrium differentias præcipuas contineri.

D Continetur enim breues, longæ, seu chronicæ, & acutæ. Et Breues sunt tam velocis, quam tardi motus.

Acutæ simul sunt tam longæ, quam breues. Sed in hoc differunt a Breuibus, quod Acutæ semper velociter mouentur, tardæ febres a-breues, Acutæ semper periculosa, breues non item.

Alia differentia est febrium chronicarū. docui quæ sint breues, quæ longæ. Breues, quæ cito sua tempora pertranseunt: sicuti longæ, quæ eadem tardius.

Explicui vobis quam sint hæc tempora vniuersalia, & particularia. Vniuersalia quat-

*Tempora
continua
rum pro-
portiona-
tarum.*

*Differen-
tia inter
febres a-
cutas, &
breues.*

*Tempora
particu-
laria.*

Particularia tempora sunt tempora febriū proportionatarum, quæ habent accessiones, vt propterea lib. 3. cris. c. 4. Galenus dixerit, Synochi vnum esse tempus, sed febres, quæ exacerbantur per circuitus, habent etiam

quattuor, principium, augmentum, status declinatio; & hæc distingui, & cognosci ex cognitione, & cruditate.

Particularia in intermittētibz sex, in proportionatis declinantibus esse quinque: in alijs non declinantibus tria.

Num oēs febres habeant hæc quattuor tempora vniuersalia, an quædam tantum: & quia curiosa est questio, paucis eam explicabo.
Resolutè dicendum, febres alias esse perniciosas, alias salutes.

Si sermo sit de pernitiōsis, qñque habent tria tempora, quādoque tantum duo, quādoque vnicum, numquam omnia quattuor.

Nam febres pernitiōsæ sunt illæ, quæ omnino patientes interficiunt, ad minimum earent Declinatione: sed quædam interficiunt in augmento, propterea habent duo: quædā in principio, & ideo vnicum: est doctrina Galeni lib. 7. de crisi. cap. 9.

Febres salutes quamquam videntur aliquando carere principio, tamen semper habent quattuor tempora, propterea quāquam reperiuntur, quæ videntur his carere, vt synochi illæ tertianæ, quædam admodum salutes, in quibus apparet coctio in principio nihilominus dicendum horum morborum principia esse incognita, lib. de tot. mor. tēp. cap. 4. Venio modo ad causas februm, quæ breues, vel longæ sunt.

De causis breuium ratione motus, cur scilicet quædam sint acutæ, quædam breues, quædam longæ siue chronica, &c.

Cap. XIII.

Breues febres, ut docet Gal. lib. 2. de crisi. c. 11. ex quatuor prodeunt causis: ex materia scilicet, ex loco, affectione, & facultate.

Vbi materia, quæ febrem facit, sit calida, tenuis, pauca, mobilis, semper facit febrem breuem; & propterea febres ex biliosis ichoribus sunt omnium breuissimæ; vt aliquando non transeant secundam, aut tertiam accessionem, & accessiones etiam sunt breues, non transeunt quinque, aut sex horas.

Causæ breuium febrium.
Pariter breuissimæ, quæ excitantur ex ichoribus sinceris, non adustus pituita, aut melancholia, absoluntur quinque, aut ad summū septem circuitibus.

Pariter si locus, in quo excitantur febres, sit locus præcipuus, calidus, nobilis, ratione huius loci sunt febres breuiiores. nam hæc loca non diu sustinent excrementa.

Affectio etiam conuenit ad faciendam febrem breuem, vbi excitetur in vasis communibus, cæteris paribus semper breuior, quàm quæ in vasis determinatis.

Denique breues sunt febres ex facultate. Si facultas robusta, breues sunt: Si imbecilla, longiores. propterea Gal. 3. progn. com. 24. hanc rem pulcherrimis uerbis exponebat,

Adum inquit: morbus ex humoribus calidis cum virtute valida, numquam facit abscessum, cito desinit, quia humores calidi cito euacuantur.

Humores frigidi, cum uirtute debili faciunt morbum periculolum, longum.

Vbi materia frigida, sed uirtus ualida, morbus iudicatur per abscessum: similiter vbi materia calida, uirtus imbecillis, morbus iudicatur per abscessum. Itaque patet, quæ sint causæ breuitatis febris: quibus causis si coniungatur ætas iuuenilis, tempus calidum, & siccum, constitutio, calida, vita antea cta, & exercitatio, cibi calidi, fiet morbus omnium breuissimus.

Causæ longitudinis erunt prorsus oppositæ, vt patet ex lib. 4. de crisi. cap. 11. quini mo 3. progn. 32. Proponit causas lōgitudinis febris, quæ sunt humores crassi, frigidi, lenti, aut tumores scirrhusi. Et profecto hæc etiam est causa præcipua, si quis committat errorem in iudicio ratione. His si accedant etiam ætas senilis, maximè facit ad longum morbum. 6. aph. 6. Si tempus frigidum 3. aph. 3. denique constitutio temporis auget longitudinem.

His explicatis trāleo ad Acutas febres, quæ, vt dicebam, tria continent, tempus motum, & periculum.

Quantum ad tempus, & breues & longæ.

Quantū ad motum, sunt semper veloces.

Quantū ad periculum, semper periculosa.

Propterea Galen. lib. 2. de diebus decret. cap. 1. laudat hac in parte Archigenem, qui non totis, & nudis temporibus acuta febris naturam describit, sed magis ex motu, & periculo. Si enim ad totum, & nudum tempus describitur febris acuta, non rectè describitur. Nam, vt dixi, est longa & breuis: motu sunt semper veloces natura, quia semper periculosa.

Quantum ad tempus, cum longæ & breues. hinc acutarum due præcipue sunt Differentiæ. Breues acutas vocat simpliciter; longas acutas, quæ iudicantur in 40. diebus; acutas ex delapsu, 1. progn. tex. 25. ubi scribit spirandi facilitatem, semper magnam habere spem: Gal. com. 2. 1. progn. vocat autem ex delapsu, quia ut scribit lib. 2. de dieb. decret. cap. 12. huiusmodi febres declinant aliquantulum ab illa acutæ acutarum simplicitate.

DEt si queratis causam, cur hæc declinent? duplex est ratio: prima; quia huiusmodi febres, vel in decimoquarto, uel in vigesimo habent aliquod iudicium, scilicet crisin imperfectam, cuius ratione tollitur velocitas motus. Sed quia non ex toto tollitur causa, progreditur usque ad quadagesimum.

Alia ratio: quia huiusmodi morbi non habent materiam ita calidam, mobilem, vt in paribus nobilibus, sicuti alij morbi simpliciter.

Acutorum igitur simpliciter terminus ex Hip. sect. 2. aph. 23. est quatuordecim dierum.

hic

sic enim scribit Hipp. acuti morbi in 14. diebus iudicantur. Sed Domini, huiusmodi sententia habet aliquas difficultates. nam ut docuit Gal. lib. 2. de dieb⁹ decret. c. vlt. huiusmodi morbi ex Hipp. sententia aliquando desinunt usque ad vigesimum, teste Hipp. 2. in 3. epid. 20. ubi acutæ febris terminum ponit diem vigesimum, sed facilis solutio, & ponit hanc Gal. loc. cit. partim 2. aph. com. 23.

Cur nonnullæ acutæ perueniant usque ad vigesimum Morbi acuti simpliciter vocati semper habent suum terminum maiorem quattuordecim dierum tantum, sed qui perueniunt vel ad 17. vel 20. diem. Ideo perueniunt, quia acuties morbi non incipit primo die, sed vel in 4. vel in septimo, ita ut si acuties incipiat in quarto, terminus sit 17. si in 7. in 20. ita ut stet veritas ab Hipp. proposita.

Sed notandum acutos morbos, siue incipiant prima die, siue 4. 7. aut procedere per quattuordecim dies, semper vno & eodem modo cum insigni velocitate & pernitie: aut aliquando remitti velocitatem, & pernitie. Si procedant semper vno eodemque modo, seruant velocitatem, numquam trāseunt 14. diem. hoc est certissimum.

Sed si remittatur velocitas vel in quarto, 7. 10. trāseunt 14. 17. & 20. ut euadant propterea acuti ex decedentia, ut Galen. lib. 2. de dieb⁹ decret. cap. vlt. testatur.

Itaque acutæ febres iudicantur in 14. diebus. Quando per 14. dies semper procedunt cum eadem velocitate, vel pernitie, desinunt in acutas ex delapsu.

Sed quamquam terminus acutorum morborum simpliciter sit quattuordecim dierum, nihilominus aliquando desinunt citius in 4. 7. & isti sunt adhuc acutiores.

Acutorum morborum simpliciter quattuor differentia. Propterea Galenus lib. 2. de dieb⁹ decret. facit acuti morbi simpliciter quattuor differentias, quarum prima est febris, seu morbi, quem vocat exacte peracutum, hic desinit in quarto.

II. Est peracuti, qui desinit in 7.

III. Est exacte acuti, qui desinit in 14.

IV. Est acuti simpliciter vocati, & desinit in 20.

Horum exempla ex parte possunt colligi ex Hipp. 3. progn. 2. ubi inquit, simplicissimæ febres ex signis securissimis confirmantur, 4. 10. die, aut citius desinunt, &c. Pariter ex 1. acut. & 1. aph. colligatis peracutas exacte esse, quæ desinunt in 7. Propterea 1. acut. continet agrum usque ad septimum sine cibo; de illis 2. aph. 23.

Acutæ ex delapsu habent varios terminos; alia in vigesimoquarto, 27. 31. 34. 40. 48. 60. 80. 100. 120. die; isti omnes sunt dies decretorii febrium, & morborum acutorum ex delapsu teste Galen. lib. 2. de diebus decret. cap. 24. & Hipp. 4. aph. 26.

Quæ veloces. Quantum ad uelocitatem: ueloces sunt illæ febres, quæ cito sua tempora pertranseunt, quando principium, aut augmentum sit

breuius, quam sit status: nam omnino febris uelox habet statum longiorem, quam principium & augmentum.

Quantum modo ad causas harum febrium pertinet, agam in sequentibus.

Acutæ febres, ut dicebam, sunt & breues & longæ: Breues dicuntur acutæ simpliciter; Longæ uocantur acutæ ex delapsu, decedentia, uel acutæ, quæ iudicantur in 40. diebus.

Terminus acutarum simpliciter ex sententia Hipp. 2. aph. 23. sunt 14. dies; quamquam, ut dicebam aliquando 20. diem huiusmodi terminum constituerit, ut colligitur ex 3. progn. 25. ubi inquit, ubi febris 20. diem pertranseat, abscessum expectare oportet: cuius causam reddit Galen. in com. Ratio diuersitatis, ut dicebam, est. quia aliquando acuti morbi incipiunt prima die, & perseverant cum uelocitate, & pernitie usque ad 14. isti numquam 14. pertranseunt: Si in 4. desinunt in 14. Si in 7. in 20.

Et si, ut inceperint acuti, remiserint acutiem in 4. 7. 10. ex acutis simpliciter trāseunt ad acutas ex delapsu.

Ostendi quinetiam acutos distingui simpliciter in quattuor differentias, in exacte peracutos, in peracutos, in exacte acutos, & acutos simpliciter, qui desinunt in vigesimo.

Modo querenda Causa huius Pernitiei in acutis febribus, & Breuitatis coniunctæ cum pernitie, ac longitudinis.

Que causas Quantum ad causam peracutæ: ideo omnes periculosa, quia sunt continuæ: nā apud Hippoc. 4. aph. 43. Febres quæcumque tertio peracutæ quoque die fortiores fiunt, magis periculosa sunt. & cur sit &c. Idcirco cum huiusmodi semper sint periculosa, propterea etiam semper periculosa.

Quod semper continuæ testatur Gal. lib. 2. de dieb⁹ decret. cap. 12. ubi inquit febres, quæ pertranseunt 20. diem, & perueniunt ad 40. aliquando esse intermittentes, aliquando continuas: Intermittentes non reponi inter acutas, sed tantum inter continuas. & hinc pendet ratio periculi.

Nec obstat authoritas Hipp. 1. progn. 25. qui scribit sperandi facilitatem semper magnam habere spem salutis in omnibus morbis acutis, qui sunt cum febre: quasi dentur morbi acuti, non tamen cum febre acuta, sed & sine febre.

Propterea in hunc etiam sensum uidetur scripsisse Gal. 2. aph. 29. magna ex parte, quasi non semper sint comites acutorum morborum. nō obstat aliud: nē est loqui de morbis acutis in genere, aliud de febribus acutis. sunt enim morbi acuti, qui nullam habent adnexam febrem, 1. progn. com. 25.

Itaque ratio periculi est cōtinuitas febris. *Quare cō* Querendum modo, quæ sit causa, propter cuiusmodi cōtinuam sint periculosa in acutis simpliciter, & in acutis ex delapsu? Quod acutæ pernitiei, simplici-

simpliciter sint periculosa, non est usque adeo nouum: sed quod dantur febres acutae vique ad trigesimum. 40. 100. 150. diem, obsecrum. proponemus itaque causam.

Quantum ad Acutas simpliciter, causa, propter quam sint perniciose & perniciose ante vigesimum, est duplex, prout duplex est exitus harum febrium. nam quaedam tendunt ad salutem, quaedam ad necem.

Causa acutarum simpliciter, quae desinunt ad salutem, est febris continua ex humoribus calidis, vel biliosis, vel sanguineis, sed non copiosis; siue putrescant in vasis communibus, siue in terminatis: ita tamen, ut inflammatio non tendat ad suppurationem, & virtus sit robusta.

Vbi haec conditiones concurrant, necessario febris acuta simpliciter tendit ad bonum exitum. Nam quantum pendet ex calidis humoribus, neque multis breui temporis spatio mouetur, & potest moneri. Propterea 3. prog. 24. inquit calidos humores cum virtute robusta semper iudicari per excretionem.

Itaque quamquam febres acutae simpliciter sint ex inflammationibus, nihilominus si inflammationes sint legitima, si non tendant ad suppurationem, iudicantur in quattuordecim diebus. & vera est sententia 2. aph. 24.

Loci, per quos expurgantur, propositi sunt lib. 3. de crisc. 3. per excretionem sanguinis narium, sudores, excretionem alui.

Quod si febres acutae simpliciter tendunt ad necem, sit ex humoribus mistis, ex calidis, & frigidis, cum & sine inflammatione, & cum viribus imbecilibus, atque admodum exsolutis. in quo casu cum morbus non sit facilis solutionis, extinguitur aeger, 3. progn. com. 24.

Cur acuti ex decidentia retineant acutiem per tot dies. Sed haec leuiora. Querere oportet causam cur Acuti ex decidentia retineant hanc acutiem per tot dies. vulgus miratur, cum moriantur in vigesimo, 40. Vt inueniamus causam harum febrium, primum inquirere oportet, quamnam sit causa prorogationis febrium. nam hac inuenta, postea videbimus curationem.

Prorogationis febrium tres causae. Dicebat Gal. 3. progn. 23. prorogari febres ex tribus causis. Ex dispositione partis confirmata; copia humorum crassorum, frigidorum; erroribus commissis ab aegrotante, sub quibus etiam Medici complecti possunt.

Certum est febres acutae simpliciter, non esse ex illis simpliciter, quae prorogantur propter errores, sunt febres accidentales. id contingit ex accidente, quod febres prorogentur, sed ex delapsu sunt essentiales.

Neque etiam locum habet causa ex parte humorum crassorum, viscidorum, lentorum. quia haec copia est apta ad faciendos morbos chronicos, longos quidem, sed non acutos.

Oportet igitur ut huiusmodi febres acutae etiam longae proueniant ex affectu aliquo contumaci alicuius partis; qui affectus potest

esse in temperies, morbus instrumentarius, morbus in soluta unitate. Si in temperies, potest esse quaecumque. nam omnis apta est coaceruare excrementa tanto tempore, quo durat febris.

Propterea omnes in temperies potissimum inaequales, possunt facere febres acutas ex delapsu, consequenter periculosas, inter quas sunt hemitritae, quae proueniunt ex missione tertianae cum quotidiana, ex putredine bilis cum pituita: Exempli gratia, iecur habet confirmatam intemperiem calidam, per quam generentur excrementa biliosa. Ventriculus habet confirmatam intemperiem frigidam, propter quam generentur excrementa pituitosa.

Si sunt haec causae, fiunt Hemitritae.

Fiunt etiam ex morbis instrumentariis, qui sunt vel obstructions, vel tumores varii.

Quantum ad tumores frigidos; certum est, huiusmodi non facere febres acutas, imò nec febres.

Itaque si quis morbus instrumentarius facit febrem ex delapsu, est obstructio in parte praecipua, aut inflammatio spuria ad suppurationem tendens.

Quantum ad Obstructions, quod faciant febres, testatur Gal. lib. 5. de loc. aff. capite 7. *Obstr. in ipa te paupt* ubi scribit imbecillitatem iecoris, retenta excrementa in ipso viscere in principio inferre febres ita paruas, ut negligantur: sed progressu temporis augmentur, & deducunt ad necem.

Sed quamquam haec certissima sint, nihilominus magna pars febrium acutarum ex delapsu proficiscitur ex inflammatione partium principalium, quae vel spuriae sunt, vel quamquam legitima; in suppurationem vertuntur. *Inflam. matio.*

Hanc sententiam potestis legere apud Hippocrat. 1. & 2. prognost. in 1. sermo est de inflammatione partium, quae pertinent ad hypochondria praecipue iecoris: scribit text. 31. illius libri.

Quod si in inflammatione iecoris transcendat febris 20. diem, necessarium est verti in suppurationem: ante si soluat inflammationem ita soluta.

Quod si inflammatio sit spuria, ista quoque necessario infert febrem longam, sed periculosam.

Quia ubi spuria, & ad suppurationem tendit, haec suppuratio propter materiae frigiditatem non potest fieri cito. propterea progreditur ad vigesimum, trigesimum, & ultra. 1. prog. 31. ubi inquit Hipp. inflammationes illas, quae non sunt sincere, aliquando desinere, & tantum finem habere in sexagesimo die. Addit Galenus, aliquando etiam habere suppurationem in 40.

Idipsum 5. progn. 43. potestis legere; inquit vniuersaliter suppurationes inflammationum fieri in 40. 60. Itaque causa prorogationis

gationis ex decedentia, est inflammatio legitima, vel spuria.

Quod autem huiusmodi febres sint continuæ, & periculosa, me tacente cognosci potest. Sunt enim continuæ, quia materia, quæ conuertitur in pus, est putrida. Vbi in pus conuersa adhuc putrida, ex putrido expirat putridum.

Et quia terminus varius in quadragesimo, quinquagesimo, 60. 70. 100. 120. die, querenda ratio huius rei. pedit partim ex vario tempore confectionis puris, partim ex vario tempore expurgationis puris, partim ex affectione relicta in parte, quæ habuit inflammationem.

Quantum ad tempus confectionis puris, dictum est, hoc esse variū pro varietate materię confectionis puris. 2. progn. com. 27. Si materia calida, virtus valida, locus calidus; breuius: vbi deficiat aliqua conditio, conuersio in pus requirit plus temporis, & sit quidamque in 40. aliquando in 60. Confectio putris, aliud tempus requiritur pro expurgatione puris.

Causa quamobrem facili expurgetur pus, pendet ex materia, & loco.

Ex materia, si tenuis, acris.

Ex loco, si is habet operculum tenue, & facilis disruptionis, materia facili dissoluitur, & expurgatur.

Si crassa, operculum densum, expurgatio secus Hipp. 6. aph. 41, inquit; quibus suppuratio in corpore existens non inuasecit, his propter puris, aut loci crassitudinem sui significationem non exhibent.

Aliud magni momenti, aliquando difficultas huius curationis pendet ex loco, ad quem tendit pus. nam potest tendere ab bonum, prauum, locum, lib. de inq. intemp. cap. 3.

Do exemplum, si facta sit inflammatio in membranis cerebri, & tendat ad suppurationem, disrupto abscessu sanies effluet ad ventriculos anteriores cerebri, est optima via: vbi sanies colligitur inter membranas cerebri, & cranium, lethaliter laborant per multos dies. Et aliqui moriuntur, aliqui euadunt fatui.

Similiter si adsit abscessus in ventriculo, qui disruptatur in anteriorem tunicam ventriculi, est optimum, vt memini focum meum habuisse talem suppurationem ad tunicas anteriores ventriculi.

Itaque vno verbo, vbi materia purulenta colligitur in locis, vbi possit euacuari, est illud optimum.

Denique, vbi facta puris collectio, vel solida substantia est corrupta, vel non: Si non, expurgato pure sanatur. vbi sanies pertingit vsque ad solidam substantiam partis, superstites esse possunt vsque ad 120. diem, sed moriuntur, quando sanies corrumpit carneam substantiam partis. Exemplum, fiat inflammatio in iecore, pus inter membra-

nam iecoris, & carneam substantiam, possunt esse superstites.

Ego habui exemplum cuiusdam, qui circa 60. diem fuit superstites, est nauta, & adhuc viuit. Perforaui locum, exiit sanies duodecim, aut quindecim librarum. Alij vero in quibus pus pertingit vsque ad carneam substantiam, viuunt quidem diu, sed tandem moriuntur. Propterea dicebat Hipp. 6. aph. 44. 45. qui vruntur, & exeat pus album, & æquale, isti seruantur: vbi vero exit, simile amurcæ olei, illi moriuntur, &c. Ratio, quia vbi pus amurcæ olei simile est, exit pars iecoris. Vidi patientem, qui 120. die obiit.

Est de febribus malignis, seu pestilentibus. *Differentia febri* diligentem sum instituturus Tractationem, *um mali* nihilominus hoc tempore duo verba de differentijs, & causis faciam: deinde ad Signa *gnarum.* omnium Patridarum me transferam.

De differentijs Febrium Malignarum.

Cap. XV.

Malignæ igitur febres in duplici sunt differentia. Aliæ Propriæ, & vere sunt malignæ; aliæ vero Impropiæ significatione, tales nuncupantur.

Propriæ malignas febres appello illas, quæ ex occultâ, & venefica qualitate, seu proprietate proueniunt: & absque hoc nunquam consistere possunt, siue hæc grauitas habeant annexa symptomata, siue sint sine his.

Secunda significatio impropria est, quæ malignæ vocantur ratione symptomatum.

De prima differentia propriæ vocata sermonem facit Gal. lib. 3. de cris. c. 4. in febribus quibuidam proponit ideam, magnitudinem, motum, & morem.

De more sermonem faciens inquit, reperti febres, quæ minime uehementes sunt, tamen ad necem agrum deducunt, &c. Itaque tales non cognoscuntur ex symptomatibus, quia nulla fere habent, sed ptauam qualitatem.

De his etiam lib. 3. de præs. ex puls. c. 4. ubi proponit constitutionem in sui temporis pestilentem, in qua medici prorsus decipiebantur in cognoscendis his febribus, & neque ex pulsu, uel calore, uel urinis potuerunt scire.

De his et lib. 9. simpl. med. fac. cap. de terra Samia, ubi pariter scribit, has esse occultas, non calore uehementes, propterea à Medicis ignorari. hæc significatio malignæ febris, seu febris mali moris, propterea lib. 3. de cris. c. 3. dum querit, vtrum febris sit boni, uel mali moris, statim subiungit, an maligna, an benigna. Pariter 3. progn. com. 4. dum scribit Hipp. febres malignissimas esse illas, quæ quarto, & ante quartum interficiunt, intelligit pestilentias. Propterea Gal. 1. in 1. epid. cō 1. has quoque vocat malignissimas, perniciosissimas, ita, ut confundantur uoces febris mali moris, cum pestilentia; omnia unum significant.

F In

In alia vero significatione dicitur febris maligna ratione Symptomatum, & hoc animadvertite propter Consultationes medicas. Nam in istis consultationibus, ubi de malignis febribus sermo est, ubi aliqui Medici volunt malignas, quæ coniunguntur cum his symptomatis, quæ sunt adhuc in triplici differentia.

Sunt primo Symptomata Pathognomonica vocata, seu Concomitantia, quæ incipiunt & desinunt cum febre.

Dantur etiam symptomata Superuenientia, quæ sunt in duplici differentia; quædam vocantur Critica, alia Prognostica.

Stante hac symptomatum distinctione, aliquando vocantur malignæ ratione symptomatum pathognomicorum: quando sunt maxima, vehementissima, propterea illa Pleuritis, quæ habet tussim, & febrem maximam, potest dici febris maligna.

Idem dico de Peripneumonia. In hunc sensum sumpsit hanc vocem Hippocrates. in 1. pro. he. 21. febres ex hypochondrijs malignæ sunt, inquit Galienus com. Vniuersaliter prolata verba sunt falsa: non enim omnes ex hypochondrijs, sed quæ ex iecore ventriculo: neque omnes, quæ ex iecore, sed quæ pendunt ex inflammatione, neque proprie malignæ, sed potius acutæ. Itaque abutitur hac voce maligni Hipp.

Pariter Galenus abutitur hac voce 3. in 3. epid. com. 1. qui scribit febres ex cerebro; meningibus, pulmonibus, corde, septo transverso, ventriculo, malignas vocari: sunt malignæ ratione symptomatum Pathognomicorum concomitantium.

II. Significatio malignarum ratione symptomatum est earum, quæ habent signa Critica tempore cruditis.

Signa critica quedam sunt signa tantum: quædam & signa & causæ. libr. 3. de cris. cap. quarto.

Signa tantum erunt, Exempli gratia, vertigo tenebricosa, dolor capitis, inquietudo, vigilia.

Signa & causæ simul, rigor, sudor, fluxus sanguinis narium. Itaque ubi appareant signa, quæ sunt signa & causæ ante morbi coctionem, constituunt febrem, quæ potest dici maligna ratione symptomatum.

Hanc veritatem ex varijs Gal. locis, 2. in 1. epid. 75. scribit. Hip. & proponit quædam signa febrium ardentium, & inquit, rigor in principio accedebat, insomnes erant, grauiter agebantur, erant sitibundi, fastidiosi, &c.

Gal. in com. scribit esse signum malignitatis, &c. pariter 3. in 3. epid. 36. scribit Hippocrates, ante coctionem apparuisse stillam sanguinis narium. inquit in com. est signum malignitatis.

Denique omnes aliæ euacuationes ante coctionem morborum, solent esse indicia febrium malignarum.

Tertio modo etiam dicuntur febres malignæ ratione symptomatum illorum, quæ prognostica proprie appellantur. libro 3. de cris. cap. 4.

Dantur quædam signa, quæ semper absolute mala, vel bona, ad differentiam criticorum, quæ quodam tempore sunt bona, quodam mala: ut si sudor appareat, tempore coctionis, est bonum.

Ita mala semper difficilis spiratio, delirium, non facile delirium ferrè: sicuti contraria absolute semper bona.

Si igitur febres habeant absolute praua, sunt malignæ in hac tertia significatione: sed hæc differentia etiam improprie.

Si tamen coniungantur malignitas, & occulta qualitas, & prauitas symptomatum, erit febris omnium malignissima.

Patent differentia malignarum, & causæ, quas diximus improprie.

Concurrunt cum differentijs febrium malignarum, & acutarum, de quibus in superioribus lectionibus; quæ omnino ducunt ex humoribus calidis peccantibus in parte præterputa cum inflammatione, habent omnia symptomata concomitantia, superuenientia critica.

De signis febrium putridarum in genere.

Cap. XV. I.

Venio ad Signa febrium putridarum, quæ explicabuntur eo ordine quo Differentia & Causa. Primò Signa Putridarum ut putridæ sunt: deinde Continuarum in genere: Tertio Continuarum conclusarum: Quarto Continuarum Proportionatarum: Quinto Intermittentium: Sexto Acutarum febrium. De Malignis enim suo loco.

Putridarum febrium signa proponuntur libr. 1. de diff. feb. cap. 7. & ab Auic. sen. 1. libr. 3. cap. 2. sed reuera oportet nos esse cautos in distinguendis his signis. Ego distinguam Putridarum, ut putridæ sunt, ab alijs: quamquam etiam omnia hæc signa pertineant ad putridas, quædam tamen ad has in genere, quædam in specie.

Quantum ad signa putridarum in genere. Primò quod huiusmodi febres non incipiunt a causa procata externa. Est hoc signum fallax: quia aliquando febres Ephemeræ incipiunt absque causa externa, & putridæ a causa externa.

Quod putridæ a causa externa: manifestum est experientia. si quis moram ducat in aqua frigida, aere frigido, incidit in febrem putridam, libr. 1. de diff. feb. c. 7. nouit Gal. hæc veritatem. Sed oportet mentem assequi: fiat absque putredine humorum in corpore existentium, potest quidem a causa externa fieri prohibita transpiratione. sed etiam febres Ephemeræ non ex causa externa, ut quæ fiunt ex obstructione, libr. 8. meth. c. 4.

Aliud

Signa pcedentia putridarum. Aliud signum somit ab his, quæ præcedunt febres putridas. Aut. in princ. capit. vocat hanc congeriem, quæ præcedant Almesum, significat concursum quendam multorum signorum, symptomatum, quæ præcedunt illos, quæ breui in febres putridas sunt incipiri. Exempli gratia, si quis prius sentiat dolorem, gravitatem capitis, dormiat interdum præter consuetudinem, lassitudinē spontaneam, si abundet sputum, vomitus, vrina, excrementum alui, si amittat patiens appetentiam. Alia signa pertinent ad ea, quæ necessario concomitantur febrem Putridam: quæ sunt tria, Pulsus, Calor, & Vrina.

Signa concomitantia tria. **Pulsus.** Quantum ad pulsum: pulsus sunt quidem celeres, frequentes, quæ conditio non ostendit putridas. nam Ephemerarum, & Hæctica sunt celeres. conditio ex pulsu est inæqualitas, quæ consideratur facta compositione systoles cum diastole.

Quæ est hæc inæqualitas? Explicat à Gal. lib. 3. præfex puls. 7. v. scil. in principio, & incremento Accessionum Systole sit celerior Diastole; in Statu systole æqualis diastole; in Declinatione diastole celerior systole.

Ratio huius diversitatis est satis conspicua: Systole sit celerior, quando magis abundant in humido corpore fuligines putridæ, quam calor febrilis. Contra diastole, quando magis calor febrilis minus fuligines putridæ.

Hoc tantæ fundamentum, in Principio, & Augmento accessionis semper abundat magis fuligo quam calor: in Statu ex æquo, & calore, & fuligo; in Declinatione plus calor, quam fuligo. Hinc pendet diversitas pulsus: quia systole expurgat fuligines. Hæc vera sunt.

Videat tamen dicturum quempiam, quomodo deprehendam hanc Systolen? Etiam ex sententia Gale, ni, nisi in pulsibus maximis hoc fieri non potest: in tanis autem pulsus sunt maximi, non in agris.

Quomodo deprehendenda sit Systole. Ego quantum ex me, non potui hanc systolen deprehendere. respicio in huiusmodi casu ad respirationem. exspiratio, & inspiratio respondet systoli & diastoli; Exspiratio systoli, inspiratio diastoli.

Sed est quædam contradictio in Gal. lib. 7. de diff. febr. 1. pulsus inquit in principiis accessionum esse celeres lib. 12. meth. capit. 3. inquit esse tardos.

Contradictio soluitur ex dictis. in principio accessionis habere celeres quo ad systolen, tardos quo ad diastolen. in lib. 1. de differ. feb. respexit ad systolē, lib. 12. met. ad diastolē.

3. Calor. Calor februm Putridarum est calor mordax, qui non apparet primo tactu, sed paulatim inturgit, ad differentiam Ephemeræ, & Hæctica; in quibus non apparet mordacitas, quæ ferat manum quasi muria.

Vrina similiter lib. 1. de diff. feb. c. 7. ostendunt febres putridas, quando nullam habent coctionem, vel exilam. ostendunt cruditates apparere in febribus Ephemeræ ex nausæati

ua satietate, & ex bubone: quandoque in principio tertiana vrina apparent cōcocta, cum sit febris putrida. Ergo non unam, uel alteram, vel plures vrinas ad tertium etiam diem inspicere oportet. Exempli gratia, non tantum si alba, tenues, careant sedimento, sed præter hæc etiam, si crassa, virides, luida, aut turbulenta, cruditatem significabunt.

Præterea, oportet nomine cruditatis intelligi, quod omne illud quod sit oppositum coctioni, siue sit vera cruditas, siue aliquod signum coctioni oppositum, ubi tamen deteriores, quæ simpliciter crudæ.

In sequentibus versabimur in proponendis Signis Putridarum Continuarum, tam in genere, quam in specie; & si dabitur tempus, aggrediemur etiam signa Acutarum.

Putridam febrem in genere quam ratione, & dignoscere, & distinguere poteritis, explicari; nunc versabimur in proponendis signis Continuarum omnium in genere, & in specie. quæ tractatio est maximi momenti.

Continuæ febres in genere tria præcipue habent signa à Scriptoribus proposita.

1. Vnum proponitur à Gal. lib. 1. ad Glau. c. 7. dum inquit febres continuæ cognoscuntur, quando carent illis signis, quæ obnuntiant intermittentes. Signa propria intermittentium sunt, quod incipiunt cum rigore, horrore, refrigeratione. Propterea febres quæ incipiunt abique his, dicuntur continuæ. Sed hoc signum est fallax, quandoquidem ut de cetero lib. 1. ad Glau. c. 6. dantur febres continuæ, quæ incipiunt cum rigore, vel tamen cum horrore, & pluries, quam cum refrigeratione.

Hanc rem huius explicatur in propriis lectionibus. propterea signum fallax est.

Aliud signum, quod non desinit ad infestationem, est propositum lib. 2. de crit. c. 6. imò ubi etiam proponitur primum signum, cognoscunt, quia incipiunt sine rigore, & non desinunt ad infestationem, & hac ratione distinguuntur tertiana continuæ ab intermittentibus, quod dicitur abique rigore, & infestatione, sunt; hæc tamen rigore, incipiunt, & desinunt cum infestatione. sed incertum. dantur enim continuæ improprie, quæ vocantur lubitrantes, quæ propter accessionum longitudinem non possunt ex toto ad infestationem desinere, id est, tantum ex propria natura sunt intermittentes, non desinunt ad infestationem; habent signum, quod erit certissimum, & huiusmodi memoriæ mandare. Est Pulsus inæqualitas systematica, collectiva. Explicabo.

Vbi pulsus comparati inter se sunt admodum varij, diuersi, alia pulsatio magna, parua, celeris, minus celeris, vehemens, minus vehemens, dicuntur inæquales in qualitate systematica.

Vbi hanc febris obtineat, semper est continua; animaduertite hoc signum, numquam errabitis.

Signa putridarum continuarum in genere tria sunt.

1. Continuæ febres in genere tria præcipue habent signa à Scriptoribus proposita.

3. Certissimum.

Observanda tamen duæ conditiones. Primò ut non consideretur huiusmodi pulsus tantum in Principio Accessionis. ratio est, quia in principijs accessionum pulsus sunt inæquales inæqualitate systematica etiam in intermittentibus. eotempore concentrantur humores, suffocatur calor, confluunt humores ad viscera, quæ efficiunt pulsus inæqualitatem, imò non est signum febris, ut testatur Gal. lib. 3. de prat. ex puls. c. 7. lib. 1. de diff. febr. c. 7. Nam potest fieri hic pulsus in anxietate, cardialgia.

II. Conditió: ut non fiat comparatio pulsus unius temporis febrium cum tempore alterius. Exempli gratia, Principij cum Augmentis, aut status. Sic enim sunt temper inæquales, inæqualitate systematica, lib. 2. de caus. puls. cap. 3.

Quid igitur tunc pulsus inæquales ostendunt? febrem continuam, quando servant huiusmodi inæqualitatem Collectivam per omnia febris tempora. Propterea dicebat Gal. lib. 1. ad Glauc. c. 7. ubi pulsibus accedat inconcinnitas & inordinatio, est argumentum febris continuæ, & lib. 3. de cris. c. 9. inquit febres in declinatione habere pulsus, qui redeunt ad statum naturalem, quando sunt febres salutares: Si perniciose, inæquales, perniciose etiam sunt continuæ. Ideo idem Gal. lib. 2. de causis inquit pulsus inæquales excedere limites morbi mutis.

Excedunt autem febres limites morbi mutis, quæ sunt continuæ.

Signa continuarum Ostendunt etiam continuam, si retineant in declinatione duritiem, celeritatem insignem, & frequentiam lib. de temp. morb. c. 7. itaque memoriæ mandetur hoc signum.

Venio modò ad Differentias Continuarum, & primò Continentium.

Facilimè dignoscuntur, quando huiusmodi Continuarum Continentes nullas habent exacerbationes, sed semper uno, & eodem modo procedunt: ut si sunt synochi ex sanguine, habent pulsus vehementes, magnos, celeres, lib. 1. de diff. febr. c. 9. ad differentiam hecticarum, quæ habent pulsus parvos, languidos.

Signa proportionatarum Quantum ad Proportionatas. Proportionata Continuarum habent aliquam similitudinem cum Intermittentibus, quæ vocantur Subintrantes, & licet distinguantur ex Pulsu proposito, attamen sunt & aliæ distinctiones, quæ capiuntur ex temporibus febrium proportionatarum.

Dantur primum, quæ carent in qualitate, quia primum exacerbantur absque frigore, horrore, & rigore.

Præterea distinguuntur etiam ex Longitudine, Breuitate Principij, & Augmenti.

Periodicæ, quæ principium, & augmentum habent magis longum, quam statum, & declinationem.

Omnes istæ sunt Continuarum, & verissimè contra ubi Principium & Augmentum sit bre-

Auius, quàm Status & Declinatio ex natura Intermittentium, ut Galenus lib. 4. de cris. c. 3. & lib. 3. de cris. c. 4.

Aliud signum desumitur ex Inæqualitate Incrementi: ubi febres habent quasi varias Accessiones, ita ut quâdo transit à Principio ad Incrementum, si absque multis exacerbationibus potest esse ex natura intermittentium. Quando autem habeant quasi varias exacerbationes, ita ut nunc videantur esse in incremento, pulsus deinde contrahi, febres continuæ. & hoc est id, quod voluit Galenus lib. 1. de diff. febr. c. 7. febres continuas habere quasi varias superexacerbationes, hoc nihil aliud, quàm febrem difficilime posse venire ad suum incrementum, Cuius historiam vidi nuper in nobili illa muliere Passanti, cuius historiam post lectionem referam lib. 1. de diff. febr. cap. 7.

BUtimo separantur, & dignoscuntur ex symptomatis. Quæ habent symptomata superuenientia multa & maxima (huc nominè symptomatum intelligatis Critica, siue prava) sunt continuæ, si tantum symptomata Pathognomica, quamquam gravia, sunt ex natura intermittentium.

Sed hæc quamquam cognitio necessaria, sunt tamen magis ea, quæ sequuntur. Necesse est distinguere febres Continuas Periodicas, quæ sunt ex locis patientibus deterioratis, ab illis, quæ sunt ex vasis communibus, quæ distinctio maximi est momenti, & reuera febris rectè curari non potest absque hac distinctione, & Dominus ego libentius in his versabor, quia video Galenum esse relictum in his proponendis. nam lib. 2. de cris. c. 7. proponit quidem necessitatem huius cognitionis, postea vero eam omittit.

Primum quidè dantur quedam febres ex locis patientibus, quæ habent signa, ex quibus non difficulter conoscunt, sed ita non facile est distinguere, an sit ex locis communibus an determinatis. Proponam primum, quæ ostendunt locum affectum. Ponam de communibus.

Febres ex locis affectis conoscuntur ex Actionibus læsis, ex Excrementis, Qualitatibus mutatis, & Accessionibus propriis, Temporibus universaliibus febrium.

DQuantum ad Actiones, hæc sunt Communes, aut Propriæ. Inter Communes sunt tres, Pulsus, Dolor, & Lassitudo.

Quantum ad pulsus. Pulsus partium determinatarum affectarum præcipue inflammationum duas obtinet conditiones: duritiem, & inæqualitatem æqualiter. Omnis pulsus inflammationis continet duritiem per se, & usque ad tempus declinationis, ut intelligetis ex proprio tractatu de Pulsib. Oportet & alia signa inspicere: & præcipue si per se tenet declinationem.

Alia conditió, ut pulsus habeat inæqualitatem æqualem. Datur inæqualitas æqualis, & inæqualis.

Exempli

Signa locorum
coram affectuum.

Pulsus.

Exempli gratia : Si post singulas pulsationes una semper remittat, vel parua magis sit, quam celeris, dicitur inaequalitas inaequalis.

Si vero habent pulsationes inaequales, modo post tres, aut quattuor unam pulsationem intermittit (inaequalitas inaequalis) Pulsus inflammationum sunt inaequales in qualitate ordinata. ratio est, quia huiusmodi inaequalitas fit a loco inflammato, tumor est permanens, ita & in pulsu.

Quantum ad Dolorem ; est comes inflammationis, quae contingit partibus sensitiuis, ut Galenus lib. de tumor. præ. nat. c. 8. sed huiusmodi dolor quandoque demonstrat, & locum cum inflammatione tentatum. 2. nam si dolor sit pulsatiuus, locus ipsemet est arteria, aut arterijs propinquus. lib. de loc. aff. c. 6. Vbi vero dolor est grauius, affectus locus potius est membranae lib. 2. de loc. aff. c. 4.

2. Dolor. 3. Tertiò cognoscimus loci affectum ex lassitudine, si conqueratur de parte lassitudinem sentiente, oportet ibi constituere sedem loci affecti. lib. 5. de san. tuen. c. 10.

Ex determinatis facile est locum distinguere. Oportet primò cognoscere Actiones cuiusque partis: si videatis læd. Actiones harum, & læd. permanentes. Constant, ut non cesset eiusmodi læsio actionis, est ibi sedes, præterea lib. de puls. ad. yr. cap. 11. ubi proponit signa ex actionibus læsis, &c. singula partes habent symptomata sua.

Excrementa mutata. Tertiò ex excrementis partium communibus parum determinatis. Per communia intelligo Urinam, sudores, & alia id genus.

Prima. Quantum ad Urinas, si in febre continua parum sint mutata a naturali statu, argumentum certissimum est febrem ortum ducere ex affectu partis determinatae.

Ratio lib. 1. de cris. c. 7. urina ostendit tantum affectiones humorum contentorum in vasis; si boni coloris urina, signum non esse vitium in venis communibus.

Sudores. Sudores pariter, si fiant potius in una parte, quam in alia, sunt indicia partis affectae. Propterea dicebat Hipp. 4. aph. 38. in Phrenide potius sudores in capite, quam in alia parte. quod idem affirmat Gal. lib. 3. de cris. c. 3.

Qualitates mutatae. Quantum ad Qualitates mutatas: similiter si vel calor, vel frigus obideat magis unam partem, quam alteram, ibi est origo morbi. Hoc etiam docet Hip. 4. aph. 39. ubi pars modo frigebat, modo, &c. Quod dico de calore, & frigore, dico etiam de colore: ubi colore fiat magis rubra, liuida, ibi morbus. Si facies perpetuo rubra, dicendum morbum habere originem ex ipso cerebro.

Exacerbationes. Quantum modo ad exacerbationes februm, quae habent exacerbationes, vel quotidie, vel alternis diebus, vna hora accedentes, sunt febres ex locis determinatis patientibus, ut colligitur ex lib. 2. de diff. febr. cap. ult. clarius 4. aph. com. 3. Nam ubi scribit Hippocr. febres si accedant hora eadem, accesserunt

A qua pridie; esse difficilis indicationis, &c. Galenus inquit in com. huiusmodi febres esse necessariò febres, quae pendet ex affectione confirmata in parte determinata.

Præterea, quae non habent varias illas accessiones, ipsae quoque sunt febres partium determinatarum.

Vbi febris ex inflammatione, loco determinato, materia non mouetur.

Tertiò huiusmodi febres inflammationi cognoscuntur ex symptomatis. nam habent rigores aliquando, ubi materia confluit in partem membranosa sentientem. Præterea habent refrigerationes maximas, longissimas, ut quandoque perdurent sex, vel septem horas, aut etiam octo. ubi hæc uidebitis, affirmate ex loco determinato ortum ducere: nam retrahitur calor ad illud viscus 4. aph. 48. 7. aph. 1. 2. progn.

Cognoscetis denique ex Locis determinatis, ex Temporibus uniuersalibus. quia huiusmodi febres habent Principium, & Incrementum uniuersale longius, quam quae ex putredine humorum in uasis communibus. nam ubi inflammatus patitur, humores non facile mouentur; quia materia est impacta magis in locis determinatis: si in uasis communibus, facillimè. Insequentibus uersabor in hoc, ut ostendam Signa, quibus possitis certò cognoscere febres in uasis communibus.

Febres, quae ex putredine humorum in uasis communibus contentorum ortum ducunt. per se habent quandam cum febribus ex inflammatione similitudinem. Etenim aliqua humoris portio, aut uapor saltem calidus in partes præcipuas mittitur; cuius ratione partes læduntur; ita ut de aliquo affectu in illa parte consistente suspicio oritur.

Itaque oportuim duxi non tantum Signa ex inflammatione referre, quod proxime tactum, uerum etiam signa usque adeo conspicua indicare, quibus cognoscatis febrem in uasis communibus, quae hauriuntur ex Actionibus læsis, Excrementis, & Qualitatibus mutatis, ex Forma Temporum accessio num, & ex Temporibus uniuersalibus febris.

Quantum ad Actiones, si sermo sit de actionibus communibus, de quibus nuper meminimus pulsus dolor, & lassitudo.

Quantum ad pulsus; pulsus februm, quae ex humoribus in uasis communibus putrescentibus fiunt; numquam obtinent illam duriciem per omnia febris tempora, sicut obtinent febres ex inflammatione. Loquimur nunc de Putridis Continuis Proportionatis. quia dantur etiam pulsus duri in hecticis, & quartanis, quae tamen sepe semper sunt Intermitteutes. Vbi igitur Continuae habent pulsus duos, de inflammatione cogitandum.

Præterea pulsus harum februm, sunt inaequales inaequalitate ordinata, ad differen-

Signa februm ex putredine humorum in uasis communibus.

Signa februm ex inflammatione.

Pulsus.

tiam febrium ex inflammatione. Rationem affert Gal. lib. 2. de caus. pull. quandoquidem in huiusmodi casu inæqualitas provenit ex humoribus, qui continentur in venis: qui sūt in vasis communibus, qui non sūt stabiles, mouentur ad cor, modò ad partes remotiores à corde, vnde quandoque est magnus, paruius, uehemens, minus uehemens. Itaque signum hoc est certissimum.

Dolor. Quantum ad aliud signum, dolorem scilicet: in istis numquam adest dolor partis determinatæ continuus, & per omnia perseuerans. Sed sic est: quod uapor transmittitur tantum in Principio, Augmento, & Statu; in Declinatione digeritur. propterea febres non ita sūt perseuerantes.

Lassitudo Quantum ad lassitudinem, numquam magis ea oblidet hanc, uel illam partem, non magis caput, quam thoracem.

Actiões propria. Quantum ad Actiones Proprias, in his non contingit, quod in febribus ex inflammatione, quæ semper ostendunt locum affectum ex læsione permanente illius partis: in febribus istis, uel nulla apparet læsio partis determinatæ, uel si quæ est, non permanet per omnia febris tempora.

Præterea huiusmodi læsiones Actionum in febribus ex venis cõmunibus non sūt quotidie sibi ipsis similes, sed uno die ledentes actiones. Exempli gratia, cerebri, altero oris ventriculi, altero musculorum totius corporis, &c. Ratio: quia materia, quæ peccat in uenis communibus, potest impetum facere ad omnes partes. Ideò aliquando magis repit ad cerebrum, aliquando ad os ventriculi, aliquando ad musculos totius corporis: ut propterea in his febribus magna sit varietas symptomatum.

Excrementa. Quantum ad Excrementa: in huiusmodi febribus, quæ ostendunt febrem ex vasis cõmunibus, sūt duo, Urina. s. & Sudor.

Urina. Sicut in inflammationibus urinae nihil valent ad ostendendas inflammationes, ita hic habent primas partes. quia sūt signa affectionum venosi generis.

Sudores. Pariter, ubi sudores erumpunt à toto corpore, certum indicium est febris ex uasis cõmunibus.

Tempora accessionum. Quantum ad Tempora accessionum, citius periodos cognoscimus, quæ citius ducunt ex venis communibus, si exacerbantur absque ulla refrigeratione, uel horrore, uel rigore. Si quotidie augeantur symptomata, nec adsit refrigeratio, horror, rigor; certum est esse ex febribus, quæ ortum ducunt ex uasis communibus.

Sed quia aliquando etiam istæ febres habent aliquam refrigerationem, uel paruum horrorem, teste Gal. lib. 1. ad Glauc. c. 5. cognoscetis, & distinguetis à febribus ex inflammatione partim ex signis propositis, partim ex breui, quam habent, refrigeratione, quæ ibi sūt maxima, in istis est minor, refrigeran-

ture enim dumtaxat partes extremæ, rarò alia: quia in Principis accessionum transmittitur aliqua portio huius materiæ ad exteriora.

Præterea incrementa harum febrium ex venis communibus sūt plerumque inæqualia, habent quasi plures Superexacerbationes, modò pulsum paruū, modò maiorem, modò calor ad exteriora, modò ad interiora. hoc etiam signum est.

Tempora vniuersalia. Quantum ad Tempora vniuersalia, in vasis communibus habent Principia, & augmenta vehementiora, quam inflammationum: rarò contingit, ut febres inflammationum in prima die sint admodum graues, quandoque contingit, quando sūt ex decubitu, aliquando sūt per paulatinam cõgestionem, aliquando per defluxum.

Per decubium materiæ de loco ad locū, ita ut materia ab uno loco transmittatur ad alium: in principio nunquam habet maximas febres inflammatio. Vbi igitur videatis in principio calorem maximum, credatis esse ex febribus, quæ ortum ducunt ex venis cõmunibus: præter cetera habent plures euacuationes, & facilius euacuantur. In loco. n. inflammato materia est impacta, & nō facile euacuatur. Et hætenus puto vos posse distinguere febres ex inflammatione ortum ducentes, ab illis, quæ ex vasis communibus.

Distinctio febrium in inflammationum, quæ tendunt ad Resolutionem, ab illis, quæ ad Suppurationem. Ceterum oportet distinguere febres inflammationum, quæ tendunt ad Resolutionem, ab illis, quæ ad Suppurationem.

Febres enim, quæ ad resolutionem tendunt, vel decimo quarto, vel 20. ad summum iudicantur, ut Gal. exemplo pleuritidis 1. aph. 12. testatur. Et propterea ubi adsint signa huius inflammationis, morbus semper tutior est, quam ubi ad suppurationem. Cuius signa ad suppurationem tendentis iam proponam.

Cognoscitur inflammatio, quæ ad suppurationem tendit, si eo tempore, quo febres, & Symptomata debebant desinere, febres, & Symptomata augeantur. Propterea dicebat Hipp. 1. progn. T. 31. n inflammationibus iecoris si febres ad vigesimum diem prouenit, suppurationem expectandam esse: pariter 3. progn. 25. considerandum de abcessu est, si febris vigesimum diem transeat.

II. Signum desumitur à Dolorē; si dolor in febribus ex inflammatione perseneret ultra vigesimum diem sitq; continuus, expectanda est suppuratio, ut Hippoc. 7. aphor. 13. testatur.

III. Sumitur à Rigore; si in vigesimo, vel post in febribus ex inflammatione iterum rigor repetat, argumentum est suppurationis, inquit Galen. lib. 4. de loc. aff. cap. 8. Hipp. 2. progn. 58.

Aliud signum est pulsatio aucta in loco inflammationis, ubi hæc pulsatio augeatur in vigesimo, vel post argumentum est suppurationis, teste Gal. lib. 2. de loc. aff. cap. 3.

Aliud

Aliud etiam sumitur ex spiratione facili, vel difficili. Vbi in inflammationibus post vigesimum diem spiratio facilis euadat, suspicandum de suppuratione inflammationis: Si facilis, abigendus timor suppurationis, inflammationis. Hanc veritatem colligo ex 1. progn. 25. vbi scribit Hip. & Gal. in com. reddit rationem huius dicti. Sunt autem vlla inflammatione partium spiritalium: ita ex aduerso vbi habent spirandi difficultatem post 20. diem, suspicandum.

Signa. Neque erit difficile distinguere spurias, inflammationes à legitimis.

Distinctio Desinunt semper in decimaquarta, spuriae perueniunt ad vigesimum; legitimae, quae debent suppurari, suppurantur semper in 20. spuriae, quae debent suppurari, quandoque in 40. 60. 80. prout materia sit mixta humori magis, vel minus frigido, loco, calori magis, vel minus debili.

Signa di Quantum ad Intermittentes, facilius est nosse proportionatam intermittentem. Nam vbi desinit ad interturbationem, statim est cognita: sed habent aliquam cognationem cum Ephemeris. Itaque non oportet nos decipi, sicut Methegi tempore Galeni.

Ephemeræ sanantur tantum cibo, hæc non: oportet igitur Tertianas Putridas distinguere à Tertianis Ephemeris, Quartanas à quartanis.

Distinguuntur à precedentibus, à concomitantibus tempore accessionum, & sequentibus.

Quantum ad Præcedentia: præcedunt nausea, inequalitas, abundantia sputi, somni longi, excrementa foetida, oscitatio, præcedunt ista febrem putridam.

Quantum ad Concomitantia; in Ephemeris tertianis tempore accessionis, etiam si incipiat cum rigore, est tamen sine sensu refrigerationis, & rigor in putridis est cum sensu refrigerationis. Præterea sit transitus à qualis à principio ad incrementum: in putridis sit incrementum inaequale, intercedit inter principium, & incrementum aliquod tempus, quod vocatur Inaequalitas. in Ephemeris illud non datur.

Distinguuntur ex Statu: nam putridæ habent aliqua maxima symptomata, vigilas, inquietudinem, sitim, deiectionem alui: Contra Ephemeræ non.

Declinatio quoque differt: sunt putridæ cum sudore alui excrementis copiosis. Ephemeræ item absque his.

Ex consequentibus denique cognoscuntur Ephemerarum Pulsus. redeunt ferè ad naturalem statum, secus putidarum, hoc docuit Gal. lib. 1. ad Glauc. c. 5. Sic igitur distinguetis hæc febres ab Ephemeris.

Signa err Erraticæ cognoscuntur, si videatis, quod octo dies intermittant, & postea redeant, & sunt erraticæ septimanarum, & quæru. Oportet inspicere horas, & formas accessionum, si vna die inuadat febris cum signis febris bi-

liosa, hora 14. sequenti cum signis pituitæ, tertio hora 16. cum signis pituitæ, quarto hora 21. cum signis bilis, est erratica dierum.

Quantum ad febres Recidivas, cognoscitur ex duobus potissimum signis. Primum si febris deficiat absque signis solutorijs Secundo, si desinat in die non iudicatorio.

Quæ sunt signa Solutoria? sunt signa coctionis, & excretionis.

Vbi aliquis morbus habet signa coctionis, soluitur, ut amplius non reuertatur: vbi contra, desinit absque excretionis, & coctione, sit recidiva, teste Galen. lib. 1. de dieb. de cr. capit. 5.

B Pariter si desinant absque signis coctionis. Hipp. 2. in 1. epid. 46. cruda inquit, & in prauos abiceffus conuersa, aut acresias, aut dolores, aut diuturnitatem, aut mortem, aut recidivas portendant, &c. Et propterea vno verbo test. Hipp. 3. prog. 42: Si febris desinat absque signis solutionis, necessario recidivam facit.

Idipsum dico si desinat in die non iudicatorio: Ideo scribit 4. aph. 61. febrientem, si non in diebus imparibus febris dimiserit recidivare solet. Loquitur Hipp. de illis febribus, quæ reuertuntur, de 3. an. 3. quæ habent accessiones quotidie: ita ut vera indicatio potius debeat cadere diebus paribus, quam imparibus.

C Est etiam aliud signum ex Hipp. 3. aph. 8. vbi inquit eos, qui à morbo cibum capientes non reficiuntur, si cibo plurimo, vtiuntur necessario indigere euacuatione. Gal. in com. aph. 12. test. eund. Vbi scribit Hip. quæ relinquuntur in morbis post indicationem, recidivas facere solent annexit hunc aphorismum cum precedente, & inquit cur indiget euacuatione? quia si euacuatio non fiat, recidiva sequitur.

Habetis itaque etiam Signa recidivarum; **Signa du** succedunt duplicium, quæ inuadunt singulis diebus bis, & ter tres, Quartanæ similiter singulis diebus. **composita**

D Compositæ vna die vnam habent accessionem, altero duas.

In sequentibus aggrediemur pulcherri- mum tractatum Acutarum.

Quæ de prognosticis supersunt tractanda, hodierno die Deo volente absolui. Sunt autem ista.

Primò quidem breuibus declarabo signa magnitudinis & paruitatis febrium: deinde signa longitudinis, & breuitatis. Tertiò signa malignitatis, & securitatis. Quarto versabor in proponendis signis, quib. cognoscatis vniuersalia febrium Tempora: deinceps in signis, quib. particularia. Denique erit sermo de signis, quibus præcognoscitur futurus status morbi, in quem finem omnia dirigantur.

Quantum ad Magnitudinem, & Paruitatem: hæc paucis verbis complectemur. Cognoscitur magnitudo; ubi calor febrilis sit admo- **Signa fe**
bris ma
gna.

admo-

admodum intensus, & symptomata Pathognomonica, seu necessario febrem sequentia, quæ maxima sint, & propterea, Exempli gratia, si febris tertiana habeat calorem exurentem, sit immixtam, vigilas, inquietudinem, &c. hæc dicitur magna.

Parua. Contra parua est, quæ habet calorem blandum, symptomata pathognomonica admodum leuia.

Longitudinis, & breuitatis signa quattuor Quantum ad longitudinem, & breuitatem modum cognoscendi febres longas, & breues proposuit Hipp. 1. aph. 12. paucissimis verbis, & desumitur ex quattuor signorum fontibus ibi apud Hipp. propositis. 1. fons sumitur à natura febris. 2. à circuituum incrementis. 3. à tempore anni. 4. ab accidentibus, seu symptomatibus superuenientibus.

Natura febris. Quantum ad naturam febris. Illa febris est brevis, quæ vel ex sanguine, vel ex bile finceris ortum ducit: Propterea omnis tertiana, siue intermittens, siue continua, omnis ardens biliosa, omnis synochus, omnis ex Erysipelate non suppurante, est brevis.

Contra, quæ ortum ducunt ex humoribus pituitosis, & melancholicis, vel bile, & sanguine mixtis cum pituita, vel melancholia, aut sanguine faciente inflammationem, quæ debent suppurari, sunt longiores.

3. Incrementa circuituum. Quantum ad circuituum incrementa, in tribus rebus considerantur. Prima conditio respicit Anticipationem accessionis. Secunda ad Gravitatem, & Longitudinem. Tertia ad Magnitudinem symptomatum. Itaque illa febris futura est Brevis, quæ habet accessiones multum anticipantes, & propterea omnes illæ febres, quæ inuadunt, vel statutis horis, neque anticipant, vel postponunt, aut anticipant proportionabiliter, aut parum, sunt longiores, non faciunt longitudinem, ut febris non anticipet, quemadmodum vult Hippocr. 4. aph. 30. ubi scribit quibuscumque accessiones fiunt, quacumque hora febris dimiserit, si eadem cras occupauerit, iudicium habent difficile, &c. non sufficit inquam ad cognoscendam longitudinem, ut inuadat ea ipsa hora, sed quando anticipationes alternis diebus, & paulatim anticipent, sunt longiores.

Itaque cognoscetis febrem futuram breuem, si anticipatio sit maxima, & in proportionata, si altera anticipat hora sexta, altera septima, aut octaua.

Secundum est ex Breuitate, vel Longitudine accessionum: accessiones particulares, si breues, totus morbus est brevis & contra: Et propterea tertianæ exquisita, ut 4. ap. 39. scribitur, septenis ad summum circuitibus absoluntur, potest etiam in tertio, aut quarto morbo absolui.

Sunt enim exquisita, quæ non transeunt horas 12. ubi transeunt, durant diutius, ut Avicenna sent. lib. 4. tit. 4. testatur, præterquam, quod elicitur ex lib. 3. de crit. c. 4. Quando

A quidem ubi dicit Principia, & Incrementa febrium sunt breuiora, & quæ sequuntur. Itaque ex breuitate, & longitudine de morbo coniciendum.

Quantum ad symptomata, quo maiora (loquimur de Pathognomonicis) eo febris est velocioris motus: quo minora, tardioris motus, & propterea tertianæ, quæ inuadunt cum Pathognomonicis vehementissimis, sunt breuiores, quam quæ omnia habent remissiora.

Ex symptomatibus etiam superuenientibus, de Longitudine, & Breuitate licet coniecturam facere. nam in quibus symptomata superuenientia citò accedunt, sunt breuiores, quam ubi tardè. Per Superuenientia intelligo signa Critica & Cruditatis. nam ubi cruditas in principio, & critica adsint, sunt breues, sed tamen lethales. & contra.

Ex his habetis tres fontes signorum, ex quibus cognoscitur febris longa & brevis: nam de quibus nuper dixi, sunt illa, quæ comprehenduntur a Hippocr. in quarto fonte, & sunt Superuenientia.

Superest quartus fons, Anni tempus, quo nominè Regio, Constitutio, Temperatura, Aetas, Habitus corporis, Sexus, & vitæ ratio comprehenditur.

Si febris accidat tempore anni calido, temperamento calido, ætate iuuenili: sexu virili, ætate adolescentiæ exercitatis, habitu corporis raro, erit omnium breuissima: si res opposito modo se habeat, longissima. Hæcenus igitur habetis signa longitudinis, ac breuitatis.

Quantum ad Malignitatem, & Benignitatem, cognoscitur ex duobus fontibus signorum, qui pertinent ad superuenientia. Dixi Superuenientia, quæ sunt tria Critica; absolute praua vel bona, coctionis, vel cruditatis. Malignæ, vel benignæ cognoscuntur ex duobus fontibus, ex ijs, quæ absolute mala, vel bona dicuntur, & quæ critica.

Absolute bona sunt, facilis spiratio, facile decubitus, terrene mente consistere, &c. quorum in 1. progn. alia plura proponuntur, oculos non esse concavos, &c.

Opposita sunt, absolute praua: in sputo, si appareat humidum, turbidum, valde flavum, praua signa in urinis, si sedimentum liuidum, nigrum, turbulentum, prauum. Si excrementa alui colliquantia, admodum foetentia, praua. Si hæc appareant, omnino iudicant malignum morbum. Et contra.

Similiter Critica ubi in Principijs apparent cum virtute debili, semper malignitatem morbi demonstrant. & propterea ut heri dicebamus in priuatis, Rigor in principijs febris Ardentium est signum malignitatis. 2. in 1. Epid. 75. & 2. epid. 1. scribit Hippocr. decretoria in principijs non apparent, & quæ sequuntur. Ex his itaque cognoscetis breuitatem, & longitudinem, malignitatem, & benignitatem.

Quan-

Signa et tempora Quantum modò ad Tempora vniuersalia; hæc cognoscuntur partim ex coctione, & cruditate. Tempus Cruditatis est tempus Principij coctio rudis Augmentij, perfecta Status, euacuatio excrementorum Declinationis.

Sed præter huiusmodi motum est alius desumptus ex Symptomatis febrium tam Pathognomonicis, quàm Superuenientibus. Desumptum etiam Signa ex circuituum incrementis, lib. 1. de crisi, cap. 3. desumpsit ex 3. ep. 1. Oportet inquit Hipp. inspicere, utrum accessiones anticipent, vel non: utrum longiores, vel breuiores fiant; ex quibus cognoscuntur varia febris tempora.

De exemplum. Si febris habeat accessiones anticipantes, si sit etiam longior, si habeat symptomata grauiora, certum est signum augmenti.

Quando sunt duæ, vel tres accessiones similes, sunt accessiones Status. Vbi oia incipiunt imminui, tempus declinationis, lib. 1. de crisi, cap. 3.

Sed hæc regula desumpta ex circuitibus, & symptomatibus quandoque fallit; quia dantur, quæ habent uniuersam accessione Principij, Augmentum, & Status, lib. 1. de crisi, cap. 3. Dantur etiam quadam, in quibus non adest abcessio Status.

Quantum ad Particularia Tempora, hæc determinantur ab Auic. feni. lib. 4. tr. 1. c. 4 & Gal. lib. 2. de diff. feb. c. 16. lib. 3. de prat. ex pull. & principij accessions cognoscitur primum quidem ex refrigeratione extremorum, & colore luido, ex horrore, & rigore, ex lassitudine, inæqualitate, pandiculatione, olcitatione, frequenti ex pultione, colore faciei, & labiorum pallido, & plumbeo, palpebris submissis, sopore, anxietate ventriculi, urinis crudis, pulibus paruis inæqualibus quandoque frequentibus, si materia sit calida, & biliosa: quandoque raris, si frigida. Hæc omnia constituit principium accessions, quod vocant conflictationem.

Inæqualitas cognoscitur ex pugna inter calorem externum, & frigus internum. Et ego vnum experientia animaduerti tempus scilicet inæqualitatis in febribus biliosis absolui cum vomitione superuenienti. non videbitis vomitiones fieri circa principium accessions: fit quidem nausea. Et ratio est: quia toto eo tempore calor naturalis pugnat cum materia noxia, ut antequam liberari possit calore Externo, non potest expellere.

Incrementum cognoscitur calore circa exteriora.

Status ubi permanet, nec auget.

Declinatio, ubi incipit desinere. Hæc omnia, quæ diximus dicta sunt, ut tandem futurus morbi status cognoscatur, à quo præcognito prædici possunt tuto curare, & victum instituere.

Quod cum verum sit, præcognoscere in febribus oportet, utrum futura breues, longæ, salutares, perniciose, utrum debeant solui

per crisin, vel paulatim digestionem, & tempore salutis, vel morbi, non possunt præcognosci absque statu: nam quantum ad longitudinem, & breuitatem, numquam habent finem, nisi status accedat.

Quantum ad salutem & mortem, cognitio, Quæ sit pendet ex comparatione cum uiribus, & longinquitate, & breuitate morbi. Nam & dicebat Galenus 3. de crisi, 5. hæc tria in febribus necessaria sunt cognoscenda, nunc comparantur, &c.

In morbis hæc tria comparantur, ut morbo uires languida statui. Itaque non potest scire, an aliquis superstes, nisi quæ longitudo, vel breuitas status.

Certò non potest scire, num debeat iudicari per crisin, num per paulatinam digestionem solui. nam ubi status, citò per crisin, & contra.

Pariter non potest scire tempus mortis, vel salutis: quia salus non aduenit ante Statum; nec mors, quia magna pars eorum, qui moriuntur, moriuntur in Statu.

Ex Statu pendet curatio. nam ut Hipp. 2. aph. 19. incipientibus morbis. si quid mouendum uideatur moue: in statu aut quiescedum. Itaque nisi præcognoscatis Statum, ignorabitis quando medicamenta administranda.

Oportet denique cognoscere Statum pro instituendo victu. Si propinquus, tenuissimo victu utendum. Et propterea Hipp. 1. aph. in morbis acutis statim tenuissimo victu utendum. Res est difficilis & pulcherrima: propterea in seq. uersabimur in modo cognoscendi hanc futurum statum, & simul sermo etiam erit de Prognosticis.

Nihil est in tota medicina, quod æquè gloriosum efficiat Medicum, ac futurorum prælagium: nam curatio dubia, & incerta plerumque, & ex uarij causis pendet, & natura maximè curat. prælagium uero tolerius medici opus. nunc igitur in ea parte veriamur, primum de statu præcognoscendo, postea de morte, & salute.

Futurus morbi status necessariò, aut longus aut brevis est. longum intelligo, qui excedit diem vigesimum: Breuem, qui ad summum definit vigesimo, sed sæpe etiam desinere potest 17. 4. 5. & 3. &c.

Statum longum certum est non posse præcognosci nec in prima, nec secunda hebdomada.

Itaque prim. acut. secundo, aut tertio septenario nosse non futurum statum ante vigesimum.

Hæc satis prudenti Medico, & ad Curationem, & ad victum. Quaritur unde hoc noscam, quando habiturus morbus Statum ante 20. Resp. ex idea morbi, & magnitudine, motu, anni tempore, & ex superuenientibus.

Ex his patet, an morbus non sit habiturus statum ante 20. Ex Idea. nam si Quartana, aut Quotidianæ, aut Semitertianæ, aut febris ex inflammatione spuria, aut suppurante, certum est

Signa particularia temporum. Principij accessions.

Inæqualitas.

Incrementum. Status. Declinationis.

Quæ sit necessaria cognitio.

Quomodo futurus Status cognoscatur longus.

Idea.

est finem non habere hos morbos ante 20.

Magni- Ex Magnitudine; si Pathogn. symptoma-
tudo. ta praua.

Motus. Ex Motu; si accessiones una eademque hora permanentes, aut tardantes, aut progredientes aequaliter, aut principaliter, & incrementum longum habentes.

Tempus. Ex Anni tempore: si hiemale tempus fuerit, duras, corpus, habitus dēus, victus crassus.

Ex superuenientibus; si praua ea non sint, sed potius quasi bona quadam (praua sunt 1. progn. facies mutata statim à statu naturali, nares acute, oculi collapsi: hæc Statum ostendunt futurum) nam hæc ostendunt morbum producendum.

Vnde Hippocrates Rigoris in sexta indicium difficile, & Sudor frigidus longitudinem morbi notat, & 2. progn. hoc ultimum etiam dicit quidem 2. aph. 28. Corpus nihil, aut multum contabescere, utrumque malum. Pariter 4. aphor. si abscessus, qui ad primas accessiones non iudicant, longitudinem significat.

Loquitur de huiusmodi abscessibus factis tempore cruditatis, quæ propterea non soluiunt febrem: & propterea etiam 6. aph. dicit: sudor non deficiente febre malus, pro rogatur enim.

Denique omnes Excretiones, quæ sunt cum virtute valida tempore cruditatis, & morbi, febre non admodum acuta, semper significant morbi longitudinem, & Statum remotum.

Ex cruditate; propterea ubi color albus in urinis, substantia tenuis, nullum sedimentum, vel id crassum ut farina, necessario significat longitudinem status 4. progn. tex. 28. & c. 7. aph. 31. scribit utrobique in eandem sententiam, urinas in febribus sedimenti crassioris farinam referentes longum fore morbum significare.

Itaque satis vobis erit in huiusmodi morbis longis obseruare Statum, ut deinceps in Declinatione urinam. nam si coctio in hac appareat, prædicetis statum futurum septenario die.

Ergo si coctio appareat vigesimo quarto die, prædicetis statum in 31. si appareat in 27 in 34.

Si in 33. in 40. transacta 40. die, non amplius septenario prædicendus status, sed per vigesimum; unde qui non iudicantur quadragesimo, solent iudicari sexagesimo, & qui non sexagesimo, octuagesimo, & c.

Signa fu- Quod si Status futurus sit brevis (nomine
turi sta- brevis status intelligo eum, qui non transit
tus bre- diem 20.) oportet primum intelligere, quibus
us in ge- signis cognoscatur status futurus brevis
nere. absolute in genere: Deinde quomodo futurum scias statum in quarto, septimo, nono, vndecimo, decimo quarto, decimo septimo, vigesimo.

Vniuersaliter cognoscetis non posse Statum transire 20. relictos ad ideam, ma-

gnitudinem, & mortum.

Nam si febris sit synochus, vel biliosa, continua, ardens, vel proportionata, vel fiet ex legitima inflammatione, vel ex Erysipelate, omnes istæ nunquam transeunt in 20. Certiores eritis, si huiusmodi morbi habeant Signa pathognomonica magna, ut sint velocis motus, anticipantes.

Sed quia non satis est, nouisse statum sic vniuersaliter, sed etiam num futurus in 4. 7. 11. audiat modum.

Desumitur primo modus ex speciali natura, & idea ipsius morbi.

B Dantur quidam morbi, qui de sua natura vocantur exacte peracuti, si desinunt in quarto, vel ante in secundo die, ut sunt Angina, Apoplexia, Spasmus, ex inanitione; & etiam Epilepsia in his Status non transit quartum diem, sed citius saepe incidit.

Sed quia rari sunt isti morbi, qui ex propria natura non transeunt quartum, multi qui iudicantur varijs temporibus, quidam in 4. 7. 9. 14. 17. & c. ut Pleuritis, Pempneumonia, inflammation pectoris, iecoris, oris ventriculi, febres omnes Ardenres, Synochi, & c. quæ iudicantur intra vigesimum, sed varijs modis. Quæ cognoscuntur ex idea, magnitudine, uelocitate motus cum temporibus, & superuenientibus. Itaque cum ubi morbi ex propria natura non desinunt in quarta, sed citius, uel tardius, ut cognoscatis, oportet attendere alios fontes magnitudinis, uelocitatis, & superuenientium.

C Si habent Signa Pathognomonica maxima primo die, uelocissime moueantur & anticipent, Principio, & Augmento brevissimo, unus tantum sit status, regio, tempusque calidum. Profecto necessarium est hunc morbum habere Statum in quarta.

Verum quoniam in quarta desinit ad salutem, uel ad mortem, ut cognoscatis, oportet, ut semper respiciatis ad superuenientia: quæ sunt tria, absolute praua, uel bona; critica, & coctionis, uel cruditatis.

Nam si huiusmodi morbus habeat statim signa praua, & critica in tempore cruditatis, erit lethalis.

D Si non, imo habeat coctionem & cū hac appareat signum coctionis, desinit in quarta ad salutem, ut Hipp. 3. progn. T. 2. febres inquit, simplicissimæ, ac signis confirmate securissimis, desinunt in quarta, uel ante quartum. Quid putatis eum intelligere per signa securissima non febres paruas, sed uehementes, quoad symptomata, sed cum signis securissimis, coctionis scilicet & defectu signorum paruum, & excretionis signis. contra, ubi signa praua, deficit coctio, & adsit cruditas, desinet in 4. uel ante, ad mortem.

Quod dico de quarta, dico etiam de 7. 11. & 14. Si incipiat morbus, qui uideatur non usque adeo uehementis, sed in quarta habeat summam uehementiam, & in hac ostendat signum

signum aliquod coctionis, necessarium est statum fieri in septima. nam proportio quartæ ad septimam est quasi prima ad 4. & 17. ad 20.

Sicuti igitur febres ille desinunt in quarta, quæ velocem habent motum cumq; primo die: quæ in 4. mouentur cum his lignis desinunt in 7: quæ in 7. habebunt hæc signa vehementissima, desinunt in 11.

Quæ in 11. 14. eadē semper est proportio.

Sed contrario modo ubi huiusmodi signa omnia non conspirant, alia est ratio. iudicium nō sit per quaternarios, sed per septenarios, Exempli gratia, in principio febris non sit cū maximis symptomatis vt pleuritis primo die habeat, quidem tussim, febrem, dolorem lateris, difficultatem spirandi, sed non ita vehementia vt in prima hypothese, sint in secunda pypothese remissiora.

Pariter motus non tam velox, tempus non feruidum, nec regio, nec constitutio, ætas nō ita iuuenilis, corpus deditum crapula, otio; necessarium est vt status ultra quartum progrediatur: & si non coctio in excrementis ad 11. 14. si coctio appareat saltem, desinere in 7. 11. 14.

Quod melius cognoscetis si consideretis tempus, in quo coctio incipiat apparere: Nā si sputum incipiat in quarto, & omnia moderata, desinit in 14: si in 7. & omnia mitia, peruenit ad 20.

Si continua gratia, terminus erit breuior.

Itaque proposui modum cognoscendi statum per 4. septenarios in illis, qui sunt euasuri.

Vnicum notandum, desumi hunc statum potissimum ex coctione.

Quærat quis, quæ sint ista signa coctionis? huiusmodi coctio debet inspicere in triplici excrementorum genere pro varietate morborum, quibus vexantur humana corpora. nam vnicum excrementum non sufficit.

Affectus thoracis, siue sit Pleuritis, siue peripneumonia, non cognoscuntur ex vrinis aut alui excrementis. Coctio igitur in his quidnam est?

In sputaminibus sunt primum: Si sputum quamprimum appareat, toto enim eotempore quo non apparet, morbus est crudus: aliud, vt sputum habeat aliquam admitionē humoris, qui efficit necessario pleuritim, uel peripneumoniā. Et propterea si Pleuritis sit Sanguinea, oportet, vt habeat admitionē sanguinis: Si biliosa, bilis: Si absque miltione, cruda. Hippoc. 2. progn. 45. expulsiōnem candidam, & rotundam nullius dicit esse fructus: ratio est, quia vt dicit Gal. in com. non excernitur ex loco inflammato.

Quantum ad vrinas, vrinæ ipsæ quoque ostendunt aliqua rudimenta coctionis: Si sint bene coloratæ; si habeant aliquod contentum: si adsint omnia, quæ iudicant morbum, morbus iam instat lib. 3. de cris. capit. 4.

sed vbi debet fieri præfagium futuri status conditio est, vt ex cruda fiat melius colorata, & vt bonum sed mentum sit: bonum autem sedimentum est album, leue, & æquale, sed quandoque etiam rubrum, vt Hipp. 4. aphor. 71. scribit; quibus iudicatum in septima futurum est, bis 4. die rubram nubeculam apparere oportet. Vult rubram nubeculam esse signū sufficiens, quando appareat in 4.

Est locus difficilis.

Nam idem 2. progn. T. 27. loquens de huiusmodi vrina, quæ habet sedimentum subrubrum, inquit significare longitudinem morbi.

Gal. vidit hanc contradictionem, & vt soluat, inquit in Aphorismis voluisse notare id, quod ratio coniungit.

Sed ego aliter existimo conciliandum Hippocratem. nam 2. progn. T. 27. loquitur de subrubro sedimento in 4. aphor. 71. non de subrubro, sed de rubro; quæ differunt apud me.

Subrubrum sedimentum com. 27. 2. prog. est indicium sanguinis incoacti, imperfecti, ichorosi: ruber autem color perfecti sanguinis, beneq; coacti. Si igitur subrubrum, consequenter indicat debilitatem caloris, & longos morbos: Si rubrum sedimentum, indicat signum perfectum.

Propterea rectè Hipp. inquit, in morituris aliter se habet res, & prædici potest status in his signis.

Si in morbo ex sua natura, veloci, maximo, velocis motus, anno calido, primo ipso die superueniant praua symptomata, & signa sint cruditatis, ipse certò est moriturus in quarta: vbi vtrò aliqua adsint, aliqua nō, aduertatis, non conferatis multa signa cum multis, & credatis illum esse moriturum, qui habeat plura signa: non ille moriturus est, qui habet vnum signum, sed ceteris pernitiosus ille seruabitur, qui habet signum fortius bonum.

Exemplum: Peripneumonicus habeat tussim, oculos concauos, deliret, sputum prauum, & si vires constant, plus possunt, quam omnia signa proposita praua: propterea Galenus lib. 10. meth. cap. 9. in Peripneumonia, & Pleuritide unica salus est virium robur, licet signa Pathognomonica sint omnia mala, quia potest suppurari: & conuerso sint omnia bona, & virtus vitalis prostrata, & languida, status est ad mortem, si vires mediocres, oportet conferre signa cruditatis, & praua inter se.

Propterea Hippocrat. 2. progn. 38. loquens de inflammationibus thoracis, inquit, si omnia signa sint praua, moriuntur in 11. in 14: vbi secus, moriuntur quidem, sed post hoc tempus.

De Prognosticis in genere. Et primum de prasagio futura Mortis, & Salutis. Cap. XVII.

Cum futuri status præcognitio non per se, sed per futurorum cognitionem, & curationem sit expetenda.

Idcirco in presentia de huiusmodi futurorum prasagio verba sunt facienda. In posterum autem de curatione.

Futura, quæ à Medico in febribus queruntur, tria sunt: eventus patientis bonus, vel malus, vel ad salutem, vel ad interitum.

Modus, vel salutis, vel mortis: denique eiusdem, vel salutis, vel mortis.

Verborum primò in signis futuri eventus uel boni uel mali: tum de modo, mox de tempore.

Signa ex sententia Gal. lib. 3. de crisi. cap. 4. desumuntur potissimum ex idea morbi, magnitudine, & ex more. Sed domini, ne frustra tempus teramus, Idea, & Magnitudo minimam habet partem, illamque usque adeò incertam, ut non sit fidendum. Ratio: quia quantum ad ideam, & si Ardens Synochus, Pleuritis, Peripneumonia videntur ex propria natura periculosi, non sunt tamen ex sua natura perniciosi. Propterea non valet consequentia; Idea huius morbi est morbi periculosa; Ergo morbus tendit ad mortem sicut nec hæc; febris est ex propria natura salutaria; Ergo tendet necessario ad salutem, quia aliquando in intermittentibus circa principium moriuntur ægrotantes, quod docuit Gal. lib. 3. de pñ. ex pñ. c. 7. Et ego semel observavi: Itaque idea nil concludit, nulla certitudo.

Alique tamen pariter incertæ ex magnitudine: neque hoc negavit Galenus, qui lib. 3. de crisi. c. 4. inquit, plerumque dari morbos magnos primo aspectu placidos, qui tamen interficiunt, & dari primo aspectu absque ullo periculo: contra mires, qui tamē interficiunt: Itaque non dicendum, est magna, ergo interficiet: est parva: Ergo servabit; falsa est consequentia. Ergo signa certa, ex quibus certo prædicatur salus, uel mors, desumuntur ex supervenientibus, quæ sunt in triplici differentia: absolute prava, uel bona; critica; coctionis, & cruditatis. Adhæc tria signorum genera respicientes poteritis certo prædicere, an servandus, an interiturus sit æger. Si enim huiusmodi morbus nulla habeat supervenientia prava, appareat coctio critica tempore coctionis, erit salutaria.

Signa coctionis 2. progn. longo sermone docentur, ut quæ sunt sputamina concocta, &c. Itaque morbus talis ad salutem necessario tendit.

Erit lethalis, qui habuerit hæc supervenientia opposita, sit maximus, periculosus; habeatque supervenientia prava, critica importune apparentia, morbusque crudus, necessarius.

Prava si salio interibit.

Sed quia pollicitus sum, me explicaturum,

A quæ sint prava signa, de his brevitèr. Explicantur ab Hipp. præcipue 1. & 2. progn. 2. aph. & etiam nonnulla in 4. plura in 4. præcogn. prænot. & coacis.

Rediguntur omnia ad tres præcipuos fontes; Primus complectitur læsas Actiones. Secundus Excrementa mutata. Tertius Qualitates corporis mutatas.

Quod pertinet ad Actiones, quia distribuitur in Animales, Vitales, & Naturales. Idcirco symptomata prava, alia pertinent ad actionem animalem, alia ad vitalem, alia ad naturalem.

Et quia rursus actiones animales subdividuntur in principes, Motivas, uel Sensitivas, pari ratione etiam symptomata ad has referenda.

B Quantum ad Principes, pravam signum; obliuio, delirium. Si quis non tantum obliuiscatur præteritorum, sed aliquando etiam eorum, quæ præsentia sunt, offeseit. in ore, matula ut mungat, est obliuio magni momenti de qua Hipp. in 1. prorrh. 30. Ignorantia cum rigore malum: malum & obliuio: Delirium quoque periculosum, sed illud magis, quod est cum rixa, quam quod cum risu.

Vnum notandum, quod cum Hipp. in 3. prorrh. 26. scribit in phreniticis frequentes permutaciones malæ sunt; inquit Gal. in com. per permutationem non Hipp. intelligere permutationes symptomatum vnius loci, ad symptomata alterius loci, ut scilicet fiat primo phrenitis, deinde convulsio, postea difficultas spirandi; sed intelligere permutationem specierum delirij, quando scilicet phreniticus, & delirans primò delirat cum risu, deinde cum rixa, cum studio, quæ permutatio est multo deterior.

Quantum ad motivas, perniciose sunt signa, si in febribus acutis superveniat tremor manuum; convulsio totius corporis; & partium determinatarum, palpebræ oculi, mandibula, dentis, pessima, & lethalis est ægritudo, & eò deteriores sunt, quando febribus supervenerint. nam contrarium ex 2. aphor. 1. melius est.

In huiusmodi parte, quæ ad motum pertinet, continetur etiam decubitus patientis, si decumbat supinus, pronus in latus oppositum, habeat crura dissenta, nimium reducta inquietusque modo decumbat ad pedes, modo in aliam partem, &c. omnia perniciose.

Quantum ad sensitivas actiones. Si sermo sit de Sensu Communi, malum est, patientem non percipere suos dolores, & suum morbum. Pariter, ad sensum communem pertinet Somnus, & Vigilia, si interdum dormiat, noctu non, malum: Si nihil quis, aut semper dormiat, deterimum.

Ex doloribus, si dolores sint perseverantes cum febribus acutis, malum, ex 4. aphor. 66.

Quantum ad sensus particulares; si non videat, audiat, gustum amittat deterimum.

Quantum ad Actiones Vitales, sunt respiratio

Abiice læsa.

Læsa a-4
tio fun-
ctionum
animalium
principis

Motiva
non.

Sensitivum

Læsa a-4
tionum
vitalium

ratio Pulsus; deterrimum, si Respiratio adsit frequens, celeris, inaequalis, aut insuetam cōtineat in acutus febribus inaequalitatem. Est enim indicium Delirii, & Conuulsionis. Pariter si Respiratio sit frigida, foetida, est omnium deterrima.

Pulsus parui, celeres, frequentes, inaequales, minuti, deficientes, decurtati, &c. omnes isti sunt pessimi.

Naturalium. Quod ad Naturales Actiones, obseruanda potissimum actio Oris ventriculi. Propterea si siti inexplibili tententur, amiserint prorsus appetentiam; si Nausea perpetua, & Vomitione uexentur, & Singultu, omnia mala sunt. Et haecenus de actionibus.

2 Excrementa. Quantum ad Excrementa, legatis Hipp. 2. Progn. ubi de his uerba facit. Siue enim sint sputamina, siue urinae, siue alui excrementa, si prauos obtineant colores, si habeant colliquationes, si nimium liquida, cum maximo fœtore: urinae admodum turbidae, & crassae; omnia mala, & exitialia.

3 Qualitates mutatae. Quod ad Qualitates mutatas: si Oculi multum mutentur à naturali statu, sint concaui, unus maior altero, sine splendore, ubi nimium rubet, praecipue album oculorum repletum nimio sanguine; ubi lacrymantur, sordeque apparent, sunt signa pessima.

Similiter Nares acutae fieri; Aures admodum exsiccatae, tempora collapsa, facies mutata, Hippocraetica, omnia exitialia. Pessimū quinetiam est uentre, costisq; calentibus, 2. Progn. 5 extrema esse frigida. Itaque haec sunt praecipua capita Signorum, quae praua nuncupantur. & si apparent, malum aegri statum significant.

Critica. Quantum ad Critica; ea sunt in duplici differentia. Quaedam Signa tantum; quaedam Signa, & Causae.

Signum tantum, Difficilis spiratio, Delirium, Lacrymae inuoluntariae, Vertigo tenebrosa, Morfus oris uentriculi, Inquietudo, Vigiliae, &c. teste Gal. lib. 3. de cris. cap. 2.

Signa & causae sunt, sudores, vomitiones, fluxus narium, alui excretiones, sputamina, fluxus mensium, &c.

Ubi itaque apparuerint Critica, quae tantum sint Signa, & appareant extra tempus coctionis, connumerantur inter praua. Si appareant tempore coctionis, non oportet arbitrari, hunc morbum lethalem: quibus indicatio futura est, illis nox, quae praecedit, grauis est. Hipp. 2. Aph. Si sunt signa, quae uidentur esse praua, inquit, Galen. in com. & lib. 3. de cris. cap. 4.

Quantum ad Critica, quae sunt Signa, & Causae, aduertite. Est dubium, utrum signa illa critica, signa & causae, si appareant in tempore morbi adhuc non concocti, sint necessariae perniciose; an salutem polliceantur? Quod mortem semper significant, Gal. tot locis & apertis uerbis asserit, ut nemo fortassis alteram sententiam ausit tueri. Dixi Hip.

A 2. in 1. epid. tex. 45. concoctiones celeritatem portendunt iudicij, securitatemque salubrem. & tex. 46. cruda uero, & inconcocta, atque in malos abscessus conuersa, aut acrisias, aut dolores, aut diurnitatem, aut mortem, aut recidivas. Ex quo loco sumpsit Gal. hanc generalem propositionem; omnes excretiones, quae fiunt tempore cruditis, vel mortem, uel acrisiam significare.

Præterea 4. aph. com. 23. inquit Galenus, quae in principiis excernuntur, nunquam ex naturae ratione excernuntur; & lib. 1. de cris. c. 7. dicebat, omnes has excretiones apparentes in tempore cruditis prauum signum esse.

B His non obstantibus, legite tertium meum librum de Phoenigmis, (qui est ultimus horum operum) in quo fusè habebitis hanc disputationem. Nunc breuibus dico: non in omnibus morbis, nec semper, huiusmodi excretiones esse improbandas, sed aliquando esse utiles: prout unicam adducam rationem, & duo, uel tria loca.

Ratio talis est: Materia turgens est à principio, nulla expectata coctione, purganda: Ergo natura etiam aliquam excretionem potest moliri tempore cruditis. Antecedens est ex 4. aph. 10. ubi scribit Hip. Purgare oportet in valde acutis, si humor turgat eadem die. Morari enim in talibus, est malum. Consequentia est manifestissima. Si materia turgens arte potest utiliter euacuari in principio, cur non etiam natura? Veritatem hanc vidit Gal. lib. 3. de cris. c. 6. dum inquit, fieri crises in statu, non ante, quando morbus non admodum magnus, nec admodum uelox; sed inquit, si contingat morbum esse valde acutum, fiunt crises non tantum in statu, sed etiam Augmento, & Principio.

Fateor crises, quae fiunt in statu, esse omnium absolutissimas; sed dico cum Gal. illas tamen, quae fiunt in Principio, non esse omnes malas. Propterea idem 1. in 1. Prothet. 12 ubi scribit Hipp. in phreniticis à principio clementer habere, sed credò permutari malum, id est, mala quoque, & frequens sputatio inquit in com. Dixit Hipp. in principio clementer habere, sed permutari, quia aliter forsitan Fieri non potest in huiusmodi morbis perniciosiss. non dicit in omnibus, sed in his, qui ex praua, & multa humorum copia oriuntur, quando humores in aliam alias partem, interdum quidem in principem, interdum uero in non principem transmigrant, quā ut habeant eiusmodi permutationes in principiis. Sed aliter fieri non potest in ipsis morbis ex prauis humoribus. Ergo huiusmodi permutationes in principio sunt utiles, praecipue quando fiunt à loco nobili ad ignobilem; tunc enim docet nos, quid sit agendum: Oportet adiungere naturam. nam quo natura urget, eo ducendum, scribit Hippoc. test. 1. aph. 21. Itaque etiam in Principiis morborum fiunt excretiones huiusmodi utiles.

Quod quaedam excretiones extra tempus coctionis sunt bonae.

Secundus locus est 1. aph. 12. vbi Hippoc. inquit: *in pleuritide est signum breuitatis, si sputum statim appareat.* Ego quærerem causam. Gal. vidit hoc dubium in si. eom. & inquit, rationem esse, quia in huiusmodi sputaminib⁹ apparet concoctio: Videtur aliquid dicere, sed nihil. Hipp. enim non inquit, cum sputum apparet, debere esse concoctum. sed inquit, si statim apparet, esse signum breuitatis. Itaque à Pari dicam: Igitur etiam alia excrementa ex locis patientibus expurgari, dum patiens ferat, erunt signa bona, vt testatur Hippoc. 4. aph. 1. in hoc casu excretio sæper utilis. Propterea nõ est, vt dicam, sputum esse bonum in principio, quia concoctum, sed quia ducitur ex loco inflammato. vide in com. Omnes inflammationes, quæ non reguntur operculo duriore, emittunt materiam. Hic ego peto, vtrum melius sit humorem hunc excerni, quam retineri? Gal. dicit melius esse excerni. Itaque si in principiis apparent excretiones, si retinerentur, obessent.

Quod dico de criticis, dico etiam de Signis Coctionis.

De Signis Modi futurae Mortis, & salutis: Quomodo scilicet ager sit moriturus, aut euasurus.
Cap. XVIII.

TRia, vt dicebam, in singulis febribus veniunt prædicanda; salus, aut mors; modus salutis, aut mortis; tempus eiusdem salutis, aut mortis. De futura salutis, aut mortis præfatio dictum est, succedit tractatus de Signis Modi, & Temporis.

Signa modi mortis, & salutis in genere. Quantum ad modum pertinet; consideratur in genere, & specie. In genere hoc tantum considerare, & præcognoscere oportet, cum sint varij modi salutis, & mortis, quis modus locum sit habiturus.

Quod igitur ad primum, cognoscetis, num febris debeat desinere Per, an Absque crisi, ad quattuor respicientes. Ideam scilicet magnitudinem, Modum, & Tẽpus anni. Vbi febris sit producta ab humoribus calidis, siue ardens, synochus. & erysipelas, inflammatio legitima, adsit magnitudo symptomatum, moveatur velocissimẽ, sit anni tempus calidum, constitutio, & regio, ætas iuuenilis, semper desinet cum crisi. Contra, quæ ortum ducit ex frigidis humoribus, sit parua, tardẽ moveatur, anni tempore frigido, constitutione frigida, ætate senili, temperamento frigido. virib⁹ imbecillis, numquam habebit crism, sed paulatim soluetur. Trãseo modò ad modos particulares.

Signa modi salutis in specie. Modi particulares salutis ex sententia Gal. lib. 3. de cris. c. 7. sunt tres: aut enim patiens subito ad sanitatem tendit cum crisi perfecta: aut habet quidem crism, sed imperfectam, postquam morbus sit minor, non tamen ex toto tollitur: tertius est in illis, qui seruantur absque vlla crisi, sed soluitur mor-

bus marcescẽtibus, & deficientib⁹ illius virib⁹

Modi mortis loc. cit. sunt quattuor. Primus eorum, qui intereunt cum crisi: quæ statim, ac subito patientem necat. Reperiuntur febres, quæ ita sunt grauẽs, vt licet crisis ingrediatur, statim interficiant.

Secundus, qui habent crises imperfectas, in quibus patiens non statim interficitur, sed post crism ita fit debilis, vt post aliquot dies moriatur. est mutatio ad peius.

Tertius modus est per paulatinam resolutionem virium, respondet tertio modo salutis. paulatim deficiunt.

Quartus est eorum, qui moriuntur statim subito, sed absque crisi nec perfecta, nec imperfecta. Differt à priori, quia in illo moriuntur cum aliqua crisi, hic non. Præter hos quattuor modos ego aliũ inueni apud Gal. & Hip: est permutatio morbi in alium morbum deteriore. In quo casu nõ moriuntur statim, non fit crisis imperfecta; ex qua morbus tendat ad deterius, nõ soluitur paulatim, sed morbus grauĩs deferẽt ad locum nobiliore. Hip. 7. aph. 1. & 12. à Pleuritide peripneumonia, & à peripneumonia phrenitis, malũ.

De his permutationibus 1. in 1. prorrh. 12. quando scribit Hip. in phreniticis in principio clementer habere, sed permutari, malum. Inquit Gal. malũ, fieri permutationem a loco ignobili ad nobiliorem. Est quintus modus mortis.

His stantibus modis, quaruntur signa modi salutis, & mortis. Cognoscetis salutem futurã cum Crisi Perfecta, si respicietis ad ideã, magnitudinem, motum, tempus anni, & superuenientia omnia. Febris ex sua natura cãda, non tamen vsque adeo magna, nec velocis motus sine prauis signis sit. absque his, cũ concoctio habeat aliquam diem. quæ præindicat diem ipsius crisis prænuncietur crisis, ab alio die indicatorio; in die verò indicatorio cum signis coctionis, & proportionata ipsi morbo. Exempli gratia, in affectib⁹ pulmonis, si fiat euacuatio per sudores, sanguinẽ ex naribus, crisis est proportionata morbo. Plura lib. 3. de cris. c. 3. nã ibi habet omnes modos, itaque vbi adsunt hæc signa, desinit febris per crism subitam statim ad salutem: si aliqua ex his deficiant, crisis erit imperfecta.

Quando dico aliqua deficere, non putetis me tantum intelligere febrem, exempli gratia, esse spuriam, minimẽ velociter moueri: imo res opposito modo se habet, lib. 3. de cris. c. 6. quia huiusmodi crises imperfectæ irritantur a causa aliqua vehemente, fier crisis imperfecta; si accedat magnitudo, & velocitas, ad salutem; si vires constant, nec adsunt praua symptomata, morbus soluetur absque crisi. Si febris sit ab humoribus frigidis parua, vires sint robustæ absque grauib⁹ symptomatis.

Quantum ad signa Modi mortis, cognoscetis futuram mortem cum crisi respiciendo

Modi mortis.

1

2

3

4

Signa modi futurae salutis.

Signa modi mortis.

do, ad ideam, magnitudinem, motum febris, Symptomata superuenientiaque omnia.

*Signa mor-
di mortis*

Si febris sit calidissima cum maximis symptomatis pathognomonicis, velocis motus, pravis superuenientibus, fiet quidem aliqua crisis, sed moriuntur in crisi. quia ratione ideae magnitudinis, & velocitatis, necessarium est fieri crisin: sed quia prava sunt symptomata, desinet cum crisi lethali.

Si febris talis sit calida, & velociter moueatur, vires non admodum infirmæ, symptomata prava non adsint omnia, aut quæ adsunt, sint moderata; in tali casu fiet crisis imperfecta, quæ tamen tendet ad interitum, potissimum si cruditas adsit.

Cognoscetis autem febrem, quæ debet absque crisi desinere ad mortem. Exempli gratia, incipiat Febris Ardēs, & desinat absque crisi in febrem hecticam, magna ex parte tendunt ad interitum, marcentibus viribus.

De signis permutationum nihil certi adferri potest. Signa enim habentur tantum, quando presens est permutatio, non quando futura. Propterea si videatis symptomata permutationis ita ut ex dolore lateris cum tussi deficiat dolor lateris, & incipiat lædi respiratio, magis certi eritis ex pleuritide in peripneumoniæ dolorem factum: pariter si ex peripneumonia superueniat delirium, in phrenitum.

Hic locus postulat, ut etiam docerem vos particulares crisis modos, qui fiunt per effluxum, aut decubitum.

*Signa
crisis per
effluxum.*

Quæ fiunt per Effluxum, sunt; variæ per effusionem sanguinis narium, menses, vomitum, urinas, alui defectiones, sudores. Breuibus dicam aliqua de hac re.

Crisis per effluxum cognoscitur potissimum ex idea, magnitudine, & motu febris. ubi febres fiunt ex humoribus calidissimis, sit cum pathognomonicis symptomatibus, velocis motus, sint vires vitales constantes, crisis magna ex parte fit per effluxum. Dico magna ex parte. Quia aliquando etiam fiunt per Abscessum, sed non quoscunque, sed per abscessum, quem vocant proprie Parotidem.

Hanc veritatem excipio ex Gal. 2. progn. 34. 4. aph. 74. & Hipp. 3. progn. 70. & 72. & ratio, quia parotides fiunt, vel post inflammationes cerebri, vel in febribus continuis continentibus, ardentissimis. In inflammationibus cerebri natura attrahit materiam post aures: in febribus humores tamquam calidi petunt superiores partes: propterea aliquando fit crisis per fluxum sanguinis narium: aliquando ascendit post aures, & facit parotida.

In morbis frigidis velocis motus, viribus non constantibus fiunt crises, ut Gal. 2. progn. 23. dicit, ad faciendos abscessus, vel humores sunt frigidi, & virtus invalida, vel humores sunt calidi, & virtus imbecillis. Sed advertatis, quod in febribus velocis motus casus sit, apud Hip. 3. in 1. epid. tex. 29. ubi inquit, quidam calefactes coenauit, & potauit largius, uomuit

A cuncta, &c. & est casus Clematidis, qui iudicatus est 80 per sudores: itaque etiam per effluxum. sed raro hoc fit; sæpius per Abscessum.

Postea, si sermo sit de crisis per effluxum, cognoscetis partim ex natura morbi, symptomatis, pulsibus, Explico. Ex natura morbi, quæ Gal. lib. 3. de cris. c. 3. proponit omnes morbos, quibus propriè conuenit crisis. Exempli gratia, pleuritis iudicatur, vel sudore, vel fluxu narium; omnes febres per sudores. loc. cit.

Quantum ad Symptomata, similiter cognoscetis. Exempli gratia: fluxum sanguinem ex naribus, si oculi lacrymentur absque causa: si splendores ante oculos appareant ex capitis grauitate, & pruritu narium.

B Vomitus cognoscitur motu oris ventriculi, tremore labij, anxietate, &c.

Quantum ad Pulsus; ex Pulsibus cognoscetis futuram crisin. Nam magnus semper significat excretionem sanguinis; undosus excretionem per sudores; parui, sed inæquales excretionem per partes internas; in quo casu postea oportet, ut attendatis signa illarum partium.

De Signis Temporis Salutis, & Mortis; quando scilicet ager sit euasurus, aut moriturus.

Cap. XIX.

Quantum modò ad tempus salutis, & mortis, hoc est, uniuersale, & particulare. Vniuersale, uel Principium, uel augmentum, uel Status, uel Declinatio. Particulare, dies, horæ, &c.

Quantum ad uniuersale; si sermo sit de saluandis per crisin perfectam, dico tempus aduenientis salutis per crisin perfectam esse semper tempus Status. ut Gal. lib. 3. de cris. c. 6. docet. Omnis crisis perfecta aduenit tempore status. Igitur tempus solutionis, etiam huius morbi est Status. lib. 3. de cris. cap. 9. In morbis autem, qui habent crises imperfectas, tempus iudicationis est aliquando Status, aliquando Declinatio.

Ego addo, & uidetur Paradoxon, esse aliquando tempus Augmenti. Et hoc probabo. Est Status in illis febribus, quæ habent quidam inclinationem ad melius, sed non possunt iudicari nisi superueniat alia crisis. Exempla 3. in 1. epid. & 1. m. 3. habetis, ibi duo agrotantes habuere multas crises, & tamen iudicati sunt.

In alijs tempus huius salutis est Declinatio; quando scilicet febres, quæ habent crisin imperfectam, leues reddantur, ut non egeant alia crisi. Ego addo Paradoxum; aliquando Status in Augmento habere suum iudiciū ad salutem. Veritas patet ex precedenti lectione. Nā qui admittit fieri excretiones utiles, et in tpe non perfectæ coctionis, et hoc admittet. Sed inueni locum pulcherrimum, scilicet de cris. c. 5. ubi loquitur Gal. de humorum crisisibus. Primò inquit, has sæpe per munari malum. Sed subiungit, si febres non ad

*Signa
temporis
salutis in
genere.*

modum periculosæ; inquit, tria sequuntur, Primò, quod recidiuam faciant: Secundò, quod iudicantur imperfecto: Tertiò, quod iudicantur cum grauissimis symptomatibus. Proponit tres modos inter se distinctos, secundum quas febres huiusmodi solent iudicari per crisin imperfectam: tertius ad rem nostram facit. Dantur enim morbi, qui ducunt patientem ad crisin in Augmento.

Signa temporis mortis. Quantum modò ad Tempus mortis; potest esse Principium, Augmentum, & Status, Declinatio verò numquam.

Potest esse principium in illis morbis, qui statim ad interitum tendunt absque crisi. ut docuit Gal. in morbis, qui desinunt ad mortem subitam, sed cum crisi.

In Augmento, & Statu mors rarissimè succedit; si loquimur de vero Statu, sed si pugna assumitur pro statu, potest.

Quantum ad declinationem, inquit neminem interire. Ratio; nam hoc tempus est tempus expulsionis humorum post perfectam coctionem. Sed aduertatis, dari Declinationes fictas decipientes, ut posuit Gal. exemplum 1. in 3. epid. 1. in casu Hermocratis. Istæ declinationes sunt fictitiæ: in veris nemo moritur, si loquamur de vniuersalibus.

Signa temporis particularis moris. Quantum ad Tempora Particularia; moriuntur patientes in illo die, in quo deterius habent, in quo crisis solet superuenire. Exempli gratia; si morbus habeat Accessiones, moriuntur illo die, in quo accessio grauior inuadit. Si non, in alio die indicatorio, dummodo vires sustinere possint, nam alias moriuntur in Principio.

Quantum verò ad Horas: si morbi interficiant ex suffocatione, moriuntur in Principio, vel augmento accessionis (interficit per resolutionem, aut suffocationem virium; per suffocationem, inflammationem; per resolutionem, venenati.) Si ex suffocatione, hora moris erit in principio accessionis; si ex resolutione, moriuntur potius in declinatione.

Breuis Repetitio eorum omnium, quæ de Signis, & Prognosis dicta sunt.
Cap. XX.

QUæcumque hætenus de Putridarum Signis a nobis dicta sunt, in præsentia breuissimè repetemus, & quasi in compendium redigemus.

Putridæ igitur febres, quatenus putridæ sunt, cognoscuntur, ut dixi, ex signis febres antecedentibus, ex Pathognomonicis, & ex Superuenientibus.

Præcedentia sunt Actiones, Excrementa, & Qualitates mutata à naturali statu. Et ideo ubi quis, antequam in febrem incidat, sentiat spontaneam lassitudinem, dolores, grauitatem, uigilias, & somnos insuetos; excrementa plura, uel pauciora, uel magis foetida; magis, minusue colorata, crassiora, liquidiora, ubi

A corpus fiat calidius, faciei color mutetur ad ruborem, citrinum colorem, sunt certa indicia febris putridæ.

Ex pathognomonicis vnum, & præcipuū signum est Pulsus. Huius contractio, seu Systole in Principio, & Augmento fit celerior Diastole: in Statu & Declinatione cōtra alia quoque signa tam pathogn. quā superuenientia, de quib⁹ in speciali, conueniunt ē putridis; sed hoc ut putrida est: si febris nō habeat Accessiones, Systole est celerior Diastole.

Deniq; Superuenientibus. nam putrida habet superuenientia plurima, & maxima.

B Continuè cognoscuntur ex Pulsu inæquali inæqualitate systematica, seu collectiua. hoc est præcipuum signum.

Continentes continuè cognoscuntur ex inæqualitate proposita; cui accedit febris, quæ nullas habet exacerbationes, nullos circuitus, nullas periodos.

Proportionatæ continuæ, ad differentiam, quæ per sub ingressum, cognoscitur partim ex Principijs accessionum, partim etiam ex Statu, & Declinatione.

Ex Principijs, quia multæ ex periodicis, neque incipiunt cum horrore, rigore, neque refrigeratione: illæ verò, quæ sunt sua natura Intermitteutes, & sua crassitie euadunt Continuæ, incipiunt cum horrore, rigore, & refrigeratione. Dantur tamen etiam continuæ, quæ verè sunt continuæ, quæ incipiunt cum horrore, rigore, & refrigeratione; habent Principium, & Augmentum valde longum, & quoque multas superexacerbationes. Propterea istæ in illo tempore habent Pulsus inæquales inæqualitate systematica i Declinatione.

Præterea continuæ carent tempore Inæqualitatis ad differentiam earum, quæ per sub ingressum.

D Cognoscetis Continuas Proportionatas, quæ sunt ex inflammatione, ab his, quæ in vasis communibus: primò, ex mutatione horarum accessionum: in vasis cōmunib⁹ sunt horæ inconstantes, quæ ex inflammatione, vel una, & eadem hora, uel exiles faciunt mutationes. Præterea ex venis communib⁹ habent symptomata uaria, & incōstantia; ex inflammatione similia, cōstantia, uno & eodē modo semper se habent. Inflammationes ad suppurationem tendentes cognoscuntur, quod post diem 20. febris augeatur. & rigor, & pulsus in parte inflammata, & dolor perseveret in principio usque ad tempus sine intermissione. Cognoscetis Intermitteutes distinctas ab Ephemeris, ex horrore, rigore, refrigeratione, uehementia, multitudine; simplex simplicem habet accessionem, duplex duplicem. De Spurijs, & Legitims in particulari tractatu dictum est.

Recidiuæ Febres cognoscuntur; si prior dimiserit, cum sit acuta, & magna absque ulla crisi; aut si facta sit, sit imperfecta, in die nō indicatorio, absque signis coctionis; si præ-

terea

terea patiens per cibum non reficiatur.

Signa Magnitudinis Febris duo sunt: vehementia caloris febrilis; & vehemens symptomatum Pathognomonicorum.

Breuitas, & longitudo cognoscuntur ex idea, magnitudine, motu, anni tempore, superuenientibus.

Ex Idea. Nam Febris ex humoribus calidis Syncretis, qualis Ardens Synochus, Tertia ne ex sui natura sunt breues: breues si magnae fuerint, si motum habeant vehementem; si praeterea regio, constitutio anni calida, & aetas correspondeant, & coctio statim appareat. Si adsint opposita; necessario longae.

Acuta febris, id est, periculosa, cognoscitur semper ex continuitate: & si ortum ducat ex insigni putredine, eo periculosior: Si ex erysipelate, adhuc acutior.

Tempora febrim vniuersalia cognoscuntur partim ex coctione, & cruditate, partim ex Symptomatis.

Ex coctione, & cruditate. Nam Principium morbi est tempus cruditatis: Augmentum, tempus coctionis imperfectae: Status, coctionis perfectae; & Declinatio, tempus expulsiōnis humoris noxii.

Ex Symptomatis: Principium, quod habet praua symptomata: Augmentum, quod multa; Status, in quo illa permanētia absque augmento: Declinatio, in qua imminuuntur.

Cognoscuntur Particularia Tempora ex Pulsus tarditate, pandiculatione, ut dixi. Pandiculatio fit ex lucta, quae fit inter calorem internum, & frigus externum. Augmentum ex calore iam vniuersum corpus inuadente: Status ex calore non amplius aucto: Declinatio ex calore declinante.

Futurus Status cognoscitur Signis, quibus Breuitas, & Longitudo Febris. Nam idea febris calida, & magna, & velociter mota, cum superuenientibus prauis, indicat Statum proximum: frigida idea, parua, cum cruditate sine superuenientibus, remotum.

Salus & Mors cognoscitur futura ex superuenientibus prauis, vel bonis, ex coctione & cruditate.

Modus salutis cognoscitur potissimum ex idea magnitudine, & motu morbi. Nam febris calida exquisita, magna, velociter mota, semper desinit per crīsim: frigida, parua, & tardi motus, per paulatinam solutionem.

Salutis, & Mortis Tempus cognoscitur eo modo, quo status. Hae volo repetisse. Vno modo ad Indicationes.

De Indicationibus, seu inuentione Auxiliorum.

Cap. XXI.

C Vratio duobus modis accipitur. Primo, pro inuentione auxiliorum. Secundo, pro recta auxilij, & materiae auxilij administratione. Galen. lib. 7. meth. cap. 3. inuentione auxilij potest haberi experientia, analogismo, & indicatione. Nos tamquam dogmatici

A sermonem facimus de inuentione auxilij per indicationem, quae est inuentione agendorum, perceptio agendorum, insinuatio agendorum, facta ex cognitione naturae eorum, quae iuuant, & quae nocent. Hae potestis colligere ex lib. 2. meth. d. 7. lib. 3. meth. in princ.

Est inuentione auxilij. Per auxilium oportet intelligere vnum ex illis tribus instrumentis Medicis, vel Pharmaceuticum, vel Chirurgicum, vel Dieteticum, cuiusmodi nos docet inuentionem huius, quae proficiscitur tamquam a causa, a cognitione eorum, quae nocent & iuuant corpus. Nam si cognoscetis, oportet facere semper has duas Propositiones: Contraria contrariis pelluntur. Similia similibus iduantur. Haec est natura Indicationis. Itaque, ut alia, sic febres Putridae habent etiam suas Indicationes, lib. 10. meth. cap. 1. a tribus praecipue fontibus; ex morbo, seu febre, causa febris, & virtute.

Quantum ad febrem: quia est passio calida, & sicca, oritur intentio refrigerandi, & humectandi. nam nocet, ergo debet pelli per sua contraria. Sed quia habet causam, a qua conseruatur, haec est amouenda.

Causa immediata est Putredo, quae partim est facta, partim in fieri.

Quatenus est facta, indicat medicamentum eradicans, quod educat hanc materiam putrescentem, lib. 1. meth. cap. 8. Quia non potest concoqui.

Quae vero est in fieri, potestque putrescere, debet tolli sublatiis causis propter quas conseruatur haec putredo. ad quem locum vos reuoco, quia multi errant.

Repero, dictum est putredinem fieri debere corrigi. Quae sunt istae causae? Secunduū omnes Medicos, non aliae, quam quae a Galeno lib. decimo meth. med. sunt propositae: cuius tamen verba, sano modo sunt intelligenda. Sunt prohibita transpiratione quae fit ex obstructione: obstructio ex crassis, lentis, & viscidis humoribus, aut multis; ut indicationes ex istorum sententia sint quoad febrem, refrigerare, & humectare putredinem, & quae est facta eradicare: eius, quae potest fieri, transpiratum facilem reddere; humores vnde obstructio, abstergere; incipere, attenuare. Hae Indicationes omnium.

Sed si ad has tantum respiciatis, numquam recte poteritis febres Putridas curare; non sunt vniuersales; sunt proprie continentis, quae ortum ducunt ex plenitudine in vasis communibus, quae ibi tantum locum habent.

Sed danturne tantum istae? Rarissime apparent istae: frequentius, in quibus Indicationes haec loco non habent, quae nunc proponam.

De Plenitudine quo ad Vasa, sanguis potest peccare in venis communibus; vel partibus determinatis.

Si in communibus, facit continentem, de qua dictum est. cuius indicationes iam propositæ lib. 11. meth. cap. 10. & 13. Habentur in his locis etiam aliæ Indicationes, quæ tamen omnes sunt inutiles. Exempli gratiâ: obstructioni contrarium est reclusio; non utilis, quia reclusio non fit, nisi ablata causa: propterea prætermittatis has.

Prætermissa hac plenitudine, venio ad illâ quæ est in venis determinatis, quæ sit confluente sanguine ad hunc locum, siue quia attrahatur, siue transmittatur. De istis Indicationibus Gal. lib. 13. meth. cap. 6. & 11. Non credatis Gal. lib. 11. meth. c. 7. prætermisisse has indicationes.

Agemus primò de indicationibus in venis communibus, postea de alijs.

Vbi loquitur de alijs? Non in lib. 11. meth. sed in 13. per totum librum, sed præcipue indicationes cap. 7. & 11. quæ sunt, si sanguis in parte fluit, quia attrahitur, aut transmittitur: attrahitur à calore, & dolore, lib. 13. meth. c. 6. transmittitur propter plenitudinem, & robur corporis.

Itaque quatenus humor fluxit, est euacuandus, & dirigendus: quatenus fluit, est reperiendus, retrahendus, & reuellendus: quatenus abundat in toto, euacuandus: quatenus attrahitur à parte, tollenda causa attractionis; quæ si sit calor, oportet partem refrigerare; Si dolor, mitigare.

Superfunt Indicationes Februm ex plenitudine quo ad Vires, quæ omnium frequentissima, quæ indicationes diuersæ sunt à prioribus, de quibus in sequenti lectione.

Vt reprobarem communem illam de Putridam indicationibus sententiam auctor fuit Gal. lib. 11. meth. c. 4. & 7. Locis enim cit. Gal. qui cognouit nō unicam putridæ febris esse Differentiam, sed plures, in quibus etiam distinctæ sunt indicationes, inquit distinguendas esse inter se has differentias, & primò dignoscendum, vtrum febris sit ex venis communibus, vel locis determinatis. Si loci determinati; distinguendum, an cum, an citra inflammationem. Postea subiungit in singulis istis differentijs nos exerceri debere. Propterea lib. 11. meth. proponit differentiam putridarum a venis communibus. In si. eiusd. lib. quæ ortum ducunt ex putredine in locis determinatis, absque inflammatione. In 13. meth. quæ est ex inflammatione partium determinatarum, Gal. has varias indicationes proponit, quas & nos probamus.

Si igitur, ut dicebam, febris ortum ducat ex putredine humorum in venis communibus cum plenitudine, quo ad vasa, indicationes sunt propositæ, c. 12. & 13. lib. 11. meth. Fit semper ex prohibita transpiratione, quæ fit ex obstructione, densitate: obstructio, verò ex humoribus viscidis, lentis, medicamentis adstringentibus, &c. Istæ sunt indicationes, quæ desumuntur ex his causis.

Quod si plenitudo quò ad Vasa sit in Parte Determinata cum inflammatione, consideratur materia vt fluxa, vel ut fluens.

Si vt fluxa, uel est digerenda, quando est pauca, uel suppuranda, quando multa. Si fluat; quatenus fuit, est reprimenda, & retrahenda, vel reuulsione, uel deriuatione, vel euacuatione totius corporis.

Et si fluit, quia attrahatur, tollenda causa attractionis.

Si fluxio fiat per plenitudinem totius corporis, ea imminuenda.

Sed si sermo sit de Plenitudine, quo ad Vires, aliæ sunt Indicationes, & vt dixi, multò plures febres fiunt ex plenitudine quoad vires, quàm ex plenitudine quoad vasa. Hoc docuit Gal. quia humores citius putrescunt, si plenitudo quoad vires. Lib. de cur. rat. p. sag. miss. c. 9. de ea agitur. Itaque in huiusmodi casu, quando putrescunt humores in plenitudine quo ad vires, uidendæ hæ causæ: putrescunt tam in uasis communibus, quàm in determinatis.

In communibus, si vires, seu facultas, cui demandatum munus ad conseruandum sanguinem, & elaborandum, sit ita imbecillis, vt non possit illum conficere, nec conseruare, necessarium est, vt humores putrescant.

Idem etiam dico de Partibus Determinatis, & præcipue quibus demandata est Coctio in usum totius corporis, qualis ventriculi, & iecoris. Si hæ partes sunt imbecilliores, plenitudo est quo ad vires.

In tali casu Indicatio quæ sumitur, debet tota respicere ad corroborationem illius partis, vt conseruetur, & augeatur calor. quâ indicatione Gal. non intermisit, lib. 11. meth. c. 9. & 13. dum inquit, indicationes in febrib. putridis desumuntur à materia putrida, & semiputrida, & quæ sequuntur, ad corroborandum calorem innatum.

Itaque non semper nec tantum prohibetur putredo faciendo transpirationem liberam, sed etiam corroborando partes affectas, præsertim si sit ventriculus, iecur &c. & propterea lib. 1. de differ. febr. cap. 3. inquit, in putredine humorum cum plenitudine quoad vires facilius humores putrescere. quia vires, quæ humores debebant conseruare, sunt languidæ.

Præterea in hac plenitudine quoad vires, etiam si non deficiat calor innatus partis, nihilominus humores sunt ita rebelles, & distantes à natura sanguinis, ut nō possint regi. Exempli gratia. Sint venæ refertæ multis humoribus excrementitijs, intentio est hos statim expurgare, non corroborare, nec transpirationem liberam reddere.

Non nego, in hac etiam plenitudine aliquando causam esse prohibitam transpirationem: sed aduertatis, quod etiâ docui Tractatu proprio de Putredine, sicuti in Putredine quoad vasa est multitudo, crassities, & lentor,

Indicationes plenitudinis quo ad vires.

Signa morbi ita & hac quo ad vires, non est tantum occlusio venarum, quantum defectus Calidi innati, & Arteriarum. Prohibita transpiratio fit ex tribus causis, quæ alibi etiam proponuntur. & sunt Angustia, Densitas, & Obstructio viarum.

Quo ad vires, ex defectu calidi innati, instrumenti duritie, siccitate, repletionem.

Denique sunt variae indicationes in febribus ex putredine humorum in venis determinatis, absque inflammatione. Nam Humores, uel ibi generantur, uel confluunt: Si generantur, necessarium est inuenire causam, propter quam generentur. Nam si intemperies, alteranda, obstructio, aperienda; Si ulcus, aut abscessus, expurgandum.

Si materia fluat, locum habent Indicationes, quas proposui in febribus cum inflammatione; oportet videre, utrum per attractionem fluat, an per transmissionem, & utrum a parte nobiliori ad ignobiliorem, an contra, vel ad partem. In primo casu materia non est repellenda, uel reprimenda, non oportet corroborare partem recipientem: contra uero in altero; si pares sunt partes, diuertenda fluxio ad loca vicina, & expurganda, teste Galeno lib. 7. meth. cap. 11. Et ideo sui memor. lib. xj. meth. cap. 10. dum loquitur de balneo administrando in febribus putridis, inquit esse administrandum potissimum in illis, qui ante febrem tentabantur doloribus podagricis, quod ex huiusmodi balneo relaxentur viæ, fluxio deriuetur ad partes ignobiles. Habetis igitur Indicationes putredinis è vasis communibus.

Quantum ad vires, hæ ipsæ quoque indicant, sed diuerso modo indicant sui custodiam. Nomine virium volo etiam intelligere vires determinatas partium principalium, ut ventriculi, & iecoris.

Oportet itaque conseruare Vires Vitales, & Animales: quibus oportet satisfacere, Chirurgia, Pharmacia, & Dieta.

De curatione Chirurgica: Et primum de Vena sectione, quæq. cam indicare, & prohibere possint. Cap. XXII.

Chirurgia.

Quantum ad Chirurgiam, in hac parte multa sunt instrumenta, quæ locum habent in Putridis: Venæ sectio, Cucurbitula scarificata, Hirundines, & Vesicantia. De singulis dicam.

Vena sectio Quantum ad Venæ sectionem, considerandum, in quibus Putridis conueniat, quando, quomodo, & ubi administranda.

Etio in quibus febribus putridis conueniat. Quo ad primam partem, dubium est, num in omnibus putridis conueniat, necne? Ex vna parte est Gal. auctoritas lib. 11. meth. c. 13. ubi scribit, saluberrimum esse venam aperire. Itaque si ad hæc unicam respiceremus, liceret in quacumque sanguinem mittere.

Sed aliter res se habet, & vtendum est ali-

A qua Distinctione. Febres putridæ aliæ sunt cum Plenitudine, aliæ cum Cacochymia. In febribus cum plenitudine semper est secunda: in quibus adest cacochymia numquam.

Dicatis quid est plenitudo? quid cacochymia? Explico. Plenitudo duplex est; prima genericè accepta: vna dicitur plenitudo simplex & legitima, secunda composita, seu mixta, & spuria: vtraque est quoad uasa, & quoad vires.

Plenitudinis differentia.

Quæ ad uasa, simplex est sanguinis abundantia, accepto nomine sanguinis non pro quarto humore, sed tota massa sanguinea, in quo calu nullam suppono mixtionem humoris excrementitij. Talis dicitur plenitudo simplex. Dicitur plenitudo quoad uasa ita referta, ut propter nimiam tensionem videantur disrumpi.

Huiusmodi plenitudo Simplex, & quoad Vasa est æqualis, & inæqualis.

Dicitur AEqualis, quando augentur humores in hæc molem seruata ueteri proportionem. Explico. Sit, exempli gratia, quispiam, in quo abundat sanguis præ ceteris humoribus, deinde bilis, post pituita, post melancholia.

Si augeantur isti humores seruata proportionem, dicitur plenitudo quoad uasa æqualis.

Inæqualis, quando, exempli gratia, si prius abundat plus bilis quam pituita; postea abundet plus pituita, quam bilis, quia non seruat veterem proportionem.

C Quæ communis, & determinata? communis, quando est in omnibus vasis: determinata, quando obsidet unam tantum determinatam partem. Hæc igitur est plenitudo legitima, simplex, æqualis, inæqualis.

Notha uero, in qua abundat quidem sanguis, sed humores non sunt utiles tantum, sed & inutiles, & excrementitij. Vbi ex istis speciebus plenitudinis aliqua adsit in corpore, semper licet uenam secare: si cacochymia, abstinendum.

Sed quid Cacochymia? Nomine cacochymia duo sunt intelligenda: copia humoris excrementitij in uenis communibus, uel uenis partium contenti, qui superet sanguinem in ea parte, uel in toto consistentem.

Cacochymia.

Alia species est, quando humores putrescentes superant naturales, & consequenter sanguinem. De qua cacochymia Gal. 2. aph. com. 17. ubi adsit una, uel altera cacochymia, uene sectio non est aggredienda.

Quis hoc dicit? Galenus. Primo enim si sermo sit de Humoribus excrementitij constituentibus cacochymiam, multa sunt loca, in quibus improbat uenæ sectionem, ut Lib. de cur. rat. per sang. miss. c. 6. ubi loquitur de corporibus pituitosis, ibi apertissimis uerbis prohibet, siue æstate, siue hyeme. Potestis legere illud cap. lib. 4. meth. c. 6. loquens de ulceribus cum fluxione, inquit abundante sanguine mittendum eum esse pro reuulsione, quod ipsum loquitur lib. 13. meth. c. 15. ubi loqui-

loquitur de inflammationibus glandularum, & idem de humoribus excrementitijs, lib. 4. de tuend. ual. c. 4. Sed præterea sect. 2 aph. 7. in ea putredine, quæ nõ potest ad naturalem statum redire, & constituit in hac specie non licet re, uti uenæ sectione. Videatis locum. est enim pulcherrimus, & propterea etiã in lib. 2. aduersus Iulianum cap. 7. cum loquitur de putredine humorum conuersorum ad virtutem. Etiam, inquit uenæ sectionem esse perniciosissimam: Et hoc uoluit etiam lib. 11. meth. c. 14. inquit sectionem uenæ, neque obstructionem, neque putredinem curare. Quæso, quæ hæc uerba? In capite sequenti proponit sententiam conspicuam, quod sit secanda. Si non sanant, ad quid igitur secatur? Si adsit plenitudo, ut ulterior plenitudo prohibeat.

Itaque conclusio sit, in omni Plenitudine proposita conuenire sectionem uenæ: in omni cacochymia non.

Dubium ortum ducit ex Gal. lib. de cur. rat. per sang. miss. cap. 8. & seq. 11. 12. partim ex lib. 3. de art. cap. 62. in quibus uidetur irridere antiquiores, qui secabant uenam existentibus signis plenitudinis. 3. de artic. probat Hipp. uenæ sectionem in fractura costarum, & propterea Gal. in com. inquit non ratione plenitudinis, sed ratione morbi magni.

Auctoritates non offiunt nobis. nã quando dicit in inflammationibus secandam esse uenam, etiam si non adsit plenitudo, intelligit Plenitudinem legitimam, simplicem, exquisitam, quo ad uasa communia. Sed nos intelligimus quamcumque, tam communem, quam determinatam, quæ determinatio in fractura adest, ob fluxionem. Itaque sanguinem licet ibi mittere, si præualeat supra ceteros humores: alioquin in cacochymia non licet.

Indicationes uenæ sectionis. 1. Plenitudo.

Venæ sectio in putridis à duobus est petenda, a plenitudine scilicet, & à virium robore. De Plenitudine hæcenus: scil. in omni plenitudine, siue legitima, siue spuria, siue communi, siue ex loco determinato, posse uenam secari: in Cacochymia uero, & humorum excrementitiorum abundantia non neque in insigni putredine.

Quantum igitur ad Vires, per has intelligo potissimum Vitales: Nam etiam si Gal. & Animales & Naturales vires requirat lib. 11. meth. c. 15. tamen ubi vitales constant, naturales etiam semper constare debent.

Virtus uitalis est in spiritu, sanguine, & solidis. Spiritus, & sanguis fit ex sanguine genito in iecore: qui si probus, etiam proba uirtus uitalis, &c. Vbi igitur vires constant uitales, necesse est etiam constare naturales.

Animales autem etiam si non constant, non prohibent tamen uenæ sectionem. Nam in Apoplexia ubi vires uitales constant, secatur ueliter uena: in lassitudine phlegmonosa secatur item; item in Lethargo, & Phrenitide. Itaque Vitales potissimum intelligo. Si igitur

vitales sunt validæ, coincident uenæ sectionem: si imbecillæ, prohibent: si mediæ, permittunt.

Vires autem, & ut præsentēs, & ut futuræ considerantur, ut præsentēs, ex tribus subiectis considerantur, primum solidis, & solidæ substantia: secundo humorosa substantia; tertio spiritiosa.

Requiruntur autem vires, ut optimæ sint, ut constant in his tribus.

Sed tamen etiam si solida deficiat, & spiritiosa, aliquo modo licet secare; modo non deficiat humorosa substantia. Itaque etiam si emaciatus sit patiens, & modicum habeat sanguinem, tamen sint humores in uenis, licet secare: in 6. Epid. 29. scribit Galenus se mulieri Romanæ admodum emaciatæ cum suppressione mensium, uenam secuisse, & ex Hipp. & Galeno 4. in 6. Epid. 25. colligitur sanguinem esse posse in uenis multum, corpore tamen emaciato. Nam scribit Galenus sanguinem copiosum, & acrem gigni aliquando, ut tamen corpus ab eo abhorreat. Vide locum.

Si spiritiosa autem substantia deficiat per exsolutionem, & dissipationem, non licet euacuare.

Sed si suffocatio sit ob copiam sanguinis, uenæ sectio conuenit. 4. acut. tex. 23. & 80. mittitur sanguis in suffocationibus ob nimiam sanguinis plenitudinem intercipientem vias spiritus.

Si humores omnimodè deficient, aut ob inedia, aut ob tabem, aut euacuationes magnas, non licet secare: neque etiam si uenæ plenæ humore distante à sanguine, quæ cacochymia, ut dixi. Hec de Variis præsentibus.

Futuræ vires etiam expendendæ, & an in posterum æque sit habiturus vires, ut nulla uirium exsolutione sequatur.

Ut hoc noscas, est respiciendum ad Signa, quorum classes sunt duæ. Signa tantum, & Signa & Causæ simul.

Illæ sunt ætas, temperatura, & habitus corporis, hæc, tempus anni, regio, constitutio, uigilia, dolor, coitus, inedia, exercitatio, & omnia symptomata, quæ pertinent ad excrementa immoderate fluentia.

Priora sunt Signa tantum, quia non habent vim dissipandi: at aliæ habent & rationem Causæ conseruantis, & dissipantis vires.

Igitur si sermo sit de Signis tantum, ubi ætas florens, temperamentum calidum & humidum, habitus corporis densus, item vires constant, non modò in præsentem, sed etiam in futuro constare poterunt: & contra, ubi ætas iuuenilis, habitus corporis gracilis, uel nimis obesus, pinguis, & crassus, temperamentum frigidum, & humidum, tum non permittitur uenæ sectio. lib. 1. ad Glauco. cap. 14.

Sed tamen nonnumquam licet sanguinem mittere in hoc casu, puta ætate puerili, senili ætate,

Indicationes uenæ sectionis. 2. Virium futurarum.

etate, & temperamento humido.

Distinguit igitur, ubi hæc tria sunt cū temperamento humido, sicco, aut admodum humido, & corpore gracili, non est secanda vena, & si senex, &c. At si senex sanguine plenus & carnosus, quamvis septuagenarius, licet secare, teste Gal. eod. lib.

Ego secui & viris & mulieribus, nuper mortali 77. annorum secui in pleuritide, & conuuluit.

Item, si puerorum habitus densus, multa caro & sanguis, & ante 14. annum morbo magno hoc requirente, licebit secare venam, etsi Galenus videatur ante 14. annum prohibere: sed puto ego intelligendum si adiunctus habitus admodum rarus.

Auenzoar misit puero trium annorum, filio suo. sed ne veniat vos ad huiusmodi monstra.

Si sit sermo de Signis, & Causis; signa & causæ sunt duplicia: quædam recessere, quædam adhuc persistunt. Exempli gratia: Sit quipiam, qui ægrotet post nimium usum Veneris, quaeritur an secanda vena, si hæc recesserit? Apud Venetos est magni momenti quaestio: Putant maximum esse piaculum secare venam, si quis Venere sit usus. Ego secui, si præsentēs vires consent, & hæc causæ recesserit: nihil enim prohibet venæ sectionem: nisi suspicio sit, ne tales causæ reuertantur, & in tertiana in accessione inuadat syncope, & deserit. Cautè agendū. nam tertio die potest ea reuerti. Itaque roborandum os vetriculi, si redierit syncope, aut alia causæ resolutionis virium.

Præsentēs autem causæ, aut sunt debiles, aut validæ.

Debiles sunt tempus anni, regio, constitutio, vigilia, aut dolor: hæc debilitant vires, sed non ita validæ, & narium fluxus, &c. Hæc autem nō indicant futurum lapsum virium, nisi omnes concurrant, ut tempus, regio, & anni constitutio: tunc enim est metus extinctionis.

Sed ubi tempus quidem febrile, sed constitutio, & regio non sit talis, certè mittere licet morbo requirente, etsi parum. Nam teste Gal. ad Glau. non tantum in feruido, sed etiam in frigido tempore non conuenit, sed non in quocumque casu in frigido tempore vacuandum, sed tum, ubi febris cum accessione inuadit, quæ habeat summum frigus: nam periculum est, ne intereant tales l. 1. ad Glau. c. 14. ubi autem ardentes febres, etiam tempus potius fauet venæ sectioni. Et hoc etiam facit pro ijs, qui degunt in loco frigidiore, ut in Germania:

Tertia indicatio venæ sectionis est dolor. Quantum ad dolorem; prouenit is a causa nonnumquam, quæ potest euacuari venæ sectione, nonnumquam ab alia. Exempli gratia, si dolor ex fluxu sanguinis, ut inflammatione; in tali casu etiam ad animi deliquum mittendus. 1. aph. 23.

A At ubi causæ doloris non potest euacuari, ut si ea sit impacta. lib. 12. meth. cap. 8 aut flatu, sint aut humor acris; in tali casu consideranda vires patientis. nam tum venæ sectione multum poteritis obesse. & cautè agendum, & parum mittendum ex loco commodior.

Vigiliæ non prohibent, nisi simul sit corpus caco-chymum, biliosum totum, ut prænaleat bilis sanguini. nam tunc non corrigetis iurium sanguinis.

At quando cum uigilijs est sanguis multus, & spirituosus, tum venæ sectio curat uigilias. nam tolluntur uapores, & refrigeratur iecur, & somnus succedit utilis sæpè.

B Causæ, quæ possunt corpus reddere debile, ut euacuationes, considerandum, an euacuatio sit consueta, an non; ut menses, aut hæmorrhoides.

Vbi igitur ex consuetis euacuationibus aliqua est imminuta, aut moderata, aut nimia; Si imminuta, adiduanda; etiam si lib. 1. ad Glau. cap. 4. Galenus uideatur prohibere; sed loquitur de euacuationibus insuetis; nam lib. 9. meth. c. 5. de assuetis loquitur contrarium. Nam dicit: Si menses succedant imperfectè, est satisfaciendum etiam arte: Si moderatè, est permittendum: si nimis copiose, licet uenâ secare pro Reuulsione, lib. de cur. rat. per sang. miss. cap. 19. & 20. Ideo ubi menses abundant, aut hæmorrhoides, si secetis in cubito, aut manu, potestis compescere.

C Si inassuetæ, ut narium per sanguinem uentris, tum considerandum, an nimis copiosa, an moderata.

Si illud; cum uenæ sectio possit compescere, licet secare, Gal. lib. de sang. miss. & lib. 2. ad Glau. in fluxu sanguinis narium secat in cubito.

Si euacuatio non possit comprimi uenæ sectione, non oportet patientem duabus euacuationibus nexare.

Itaque si euacuatio artis possit sistere eam que sit spontè; licet ea uti.

Et si fluat alius magna copia, non est secanda uena: nam uenæ sectio non potest compescere.

Si dysenteria hepatica licet ea uti.

D An liceat secare prægnantibus, in sequentibus tractabo.

Plerumque contingit utero gerentes uenæ hemetissimis tentari febribus, quo casu perplexos oportet esse Medicos circa uenæ sectionem. Ambiguitatis causæ prodit ex uarijs Hipp. Gal. auctoritatibus.

Ex una parte saluberrimum est, ut intellexistis, in omnibus febribus, quas putrescens humor excitat, uenam secare, consentientibus ætate, & uirtute. Sed sic est, quod magna ex parte mulieribus prægnantibus febres putridæ sunt, cum uirium constantia, & ætate florent: Igitur secanda uena.

Ex alia tamen parte Hip. 5. aph. 31. inquit, mulie-

An liceat venâ secare prægnantibus febri cor reptis.

mulieri vtero gerenti si vena secetur, abortus sequitur: præcipue vero si foetus sit grandior.

In hac quaestione varij varia dixere. Ego veritatem tantum proponam. Primum id resolutè dico: non accipiendam esse sententiam eorum, qui existimant secandam, etiam si abortus periculum imminet. nam præterquàm quod impia est hæc opinio, non etiam est tuta: nemo potest sibi polliceri ex secta vena, cui succedat abortus, mulierem debere seruari. Alij alia dixere. Ego tantum resolutionem huius rei propono. Resolutio est: in febribus acutis, quamquam vtero gerant, in principio, dummodo vires consent, secandam esse venam. Neque tamen abortus periculum imminet. Ratio: Febres Acute, quæ prægnantibus contingunt, ortum ducunt ex affectione vteri, vel alijs locis patientibus. Quod ex affectione vteri, docuit Hipp. 5. aph. 43. quando inquit mulieri vtero gerenti Erysipelas superueniens malum. Gal. in com. non tantum Erysipelas, sed etiam Inflammationem vtero contingere posse, ait: quod ego etiam obseruavi.

In hoc casu, cum sanguis confluat præter illum, qui est necessarius pro alendo foetu, propterea tantum abest, ut venæ sectio abortum faciat, ut potius ab hoc præseruet. Si enim secetur vena superior, diuertitur fluxio sanguinis, & intercipit materia erysipelatis, vel Inflammationis. Itaque in principio ubi suppono inflammationem in fieri, venæ sectio conuenit. Si febris ex alio loco ortum ducit, talis enim sectio constantibus viribus nullam infert puero noxam. Nam si alius locus præter vterum laboret, ratio non vult, ut tum in principio foetus sit debilis, est debilis quando in vtero. Itaque si in hoc principio mittaris sanguinem ex superioribus uenis, nullum imminet foetus periculum, imò tollitur periculum inflammationis.

Habenda tamen ratio etiam temporis foetus. nam si is adhuc paruulus, tuto secabitis constantibus viribus, nullum imminet periculum: quia ex defectu tantum alimentum imminet periculum abortus. Et hoc voluit Hippoc. loc. cit. ubi inquit, præcipue vero si fuerit grandior.

Sed hoc tempore exponenda plenitudo corporis muliebris, sunt enim aliæ pauci, aliæ multi sanguinis.

Utrum gracilitas mammarum sit signum defectus sanguinis. Quæ pauci, quod deprehenditur ex venarum angustia, & subsidentia abstinentis a venæ sectione: si plus sanguinis, & vires robustæ, etiam in ultimis mensibus existimo consilium, si secetur vena superior. Hoc loco, volo ut unum consideremus, cui occasionem dedit Gal. 5. aph. 37. 53. utrum gracilitas mammarum in prægnantibus possit esse signum defectus sanguinis? Hoc dico, quia in comm. aperte scribit Galen. gracilitatem mammarum ostendere defectum sanguinis tam in mam-

mis, quam in utero. Ideo ubi mammae gracilescent, etiam uterus, & foetus interficitur. Ego aliter sentio: gracilitatem potius argumentum esse abundantiae sanguinis circa vterum, quam defectus. Ratio: quandoquidè huiusmodi motus sanguinis ab vtero ad mamas, & à mammis ad vterum, est ualdè reciprocus, ita ut deficientibus mensibus etiam in uirginibus mammae repleantur lacte; contra uero ex huiusmodi defectu sanguinis superueniunt menses. Præter hæc rem aperte scribit Hipp. aph. cit. si mammae gracilescent, &c. Quæ est ratio? si gracilitas fuisset in causa, propterea si facta hac fluxione uterus aliud expellat hanc materiam, abortus non fit.

B Venio modo ad considerationem Temporis, Quantitatis, Modi, & Loci mittendi sanguinem.

Quo ad Tempus, est uel uniuersale, uel particulare. De Vniuersali paucis dico; non debere connumerari per dies, nec hebdomadas, sed considerandam esse præsentiam indicantis, & uirtutis constantiam. Si adsit iudicans uenæ sectionem, de quo in præcedenti lectione, si vires permittant, semper secanda, teste Gal. lib. 9. meth. c. 5. & lib. de cur. rat. per sang. miss. c. 20.

Quo ad tempus particulare, dubium de die, iurum uel cibi in uentriculo contentus, uel cruditas cibi possit prohibere, quo minus una die sanguinem euacuemus, uel differamus. *Quando mittendus sanguis in febribus.*

C Quantum ad cibum; certè Gal. ipse lib. de cur. rat. per sang. miss. cap. 12. & lib. 9. meth. c. 5. aperte docet, tam diu differendam esse uenæ sectionem, quam diu uentriculus à cibo nuper assumpto possit liberari. Sed dantur casus, in quibus non differenda. Prætermitto nunc casus, contusiones: sed in febribus, qui ortum ducunt ex maximis inflammationibus incipientibus, & præcipuis, ut in pleuritico, qui in principio statim habeat symptomata grauissima, non est expectanda hæc concoctio: expedit igitur statim euacuare, teste Auenic. fen. 4. lib. 1. c. 20.

D Quo ad cruditatem; aliquando prohibet, aliquando non, ubi occurrat febris uehementissima cum inflammatione proposita, quamquam cruditas in uentriculo, præmissio clystere, secanda: si morbus det inducias, melius est euacuare, cruditatem concoquere, & postea mittere. Propterea lib. cur. cap. 12. in huiusmodi cruditate primo paulatim concoquit, & postea mittit, & iterum concoquit, iterumque uenam secat. Idem uobis agendum, si morbus det inducias, si morbus medio se habeat modo.

Dantur aliquando simul Cacochymia, & plenitudo, ut ex equo postulet purgationem & sectionem. sunt Medici in hoc casu ancipites. Si res ex equo pugnet, præmissio clystere semper secabitis est doctrina Gal. & Hipp. 4. acuta 1. Debeat antecedere sectio purgationem.

nem, lib. 10. de comp. med. sec. loc. c. 2. 1. in 6. epid. 6. In hoc loco consultit, ut aggrediamur primo uenæ sectionem; postea medicamentum.

Quantum ad horas particulares, si febris fuerit synochus, poterit eligi hora diei frigidior, quia declinationem non habet. Si febris habeat declinationes, ex lib. cur. cap. 21. eligenda est declinatio febris.

Quod si febris habeat exacerbationes, nec declinet, eligenda qua minus uexentur.

*Qua quā-
titate sã
guis mit-
tendus.* Quantum ad Quantitatem: quantitas alia continua est, alia Discreat. Per continuam intelligo mensuram sanguinis euacuandi: per discretam, vitum debeat repeti venæ sectio.

Quod ad primum, si sermo sit de euacuatione facienda ad nimi deliquium, talis euacuatio, quamquam à Gal. proponatur, mihi tamen his temporibus nostris est suspecta. quia non inuenio corpora ita plethorica, robusta, ut sustineant.

Sed dico, quod hæc conueniat, non credatis conuenire in quibuscumque febribus, sed tantum in synochis absque putredine, aut in febribus ex inflammatione, quæ adhuc principiant cum viribus robustis.

Quod in febribus synochis absque putredine, lib. 9. meth. c. 3. 4. & 5. probatur. In his locis consuluit venæ sectionem hanc faciendam ad animi deliquium, antequam putredo incipiat. Lib. 2. meth. cap. 14. ubi loquitur de febribus synochis, inquit subsistendum esse, & aliquid remittendum naturæ, alioquin erimus coacti cibum intempestiue præbere. Itaque in putridis numquam mittendus ad animi deliquium, si sermo sit de synochis putridis.

Quantum ad febres inflammationum cū virtute valida, tractantur ab Hipp. & Gal. in hac vacuatione ad animi deliquium. Hipp. 4. acut. t. 74. loquitur de Pleuritide: ubi consultit, per animi deliquium intelligi non veram Syncopen, sed Lipothymiam. Quæ ratio, cur tam larga sanguinis euacuatione utatur? Hipp. in inflammationibus hac utitur, ut non tantum euacuetur in uenis communibus, sed per paulatinam egestionem attrahatur à loco inflammato. 2. acut. t. 10. Ibi scribit mittendum in pleuriticis, usquequo fiat mutatio coloris, ut ex pituitoso euadat rubicundior. Ratio, inquit, est; quia sanguis in inflammatione requirit colorem magis intensum, quam qui extra inflammationem. Ex quo loco colligitur, multo diuersam hodie esse sanguinis euacuationem, quam illis temporibus. Nostrates, cum secant uenam, inspicunt sanguinem, & si ex nigricante rubicundus sit, tum primum subsistunt; quia, inquit, est sanguis bonus: hæc regula ualet in febre continente, siue quæ ortum ducit in uenis communibus. Itaque in his duobus ca-

Asibus conuenit usque ad animi deliquium.

Sed quia vires raro constant, ut possit fieri consulo, ut non sitis audaces. quia lib. 9. meth. c. 10. scribit, se uidisse sub tali sectione duos extinctos, alios qui paulo post, alios, qui per totam uitam ualeudinarij fuere. Potius Auic. consilium accipiendum fen. 1. lib. 4. tr. 2. c. 6. melius reueratio numeri, quam quantitatis.

Sed vnum pulcherrimum volo vos obseruare: repetenda igitur, quando necessitas urget, venæ sectio: sed debet libentius repeti, & 2. & 3. in febribus, quæ ortum ducunt ex locis partibus, quam synochis. Ratio est: quia prima euacuatio sanguinis, non educit sanguinem à loco inflammato: facit potius operationem, quæ est agrotanti noxia.

Prima venæ sectio, si moderata sit, demit aliquid à loco inflammato, sed trahit à loco inflammato in venas, ubi postea contenta, & attracta materia vi vacui corrumpit reliquum humorem in uenis. & sic si non repetatis sectionem, ille corruptus, corrumpit alium, & est occasio peioris febris. Lib. 4. de tuen. val. in lassitudine phlegmonode inquit repetendam esse venæ sect. Et quod dixit de ambitu corporis: id ipsum c. 5. lib. eiusd. docuit de visceribus.

Itaque si prauus est, nisi succedat secunda euacuatio, corrumpit alium: reiteranda igitur secund. & tert.

C In seq. agemus de Loco mittendi, quæ tract. omnium difficillima, & controuersa. Legatis disputatione Matth. Curt. de secanda vena in Pleuritide: Item Petr. Brisoti Gali, & Sufium in libel. de uenis e directo secandis.

Ex alia parte sunt Trincan. Turinus, Alex. Bened. qui tuentur oppositam sententiam cum Arabib. Ego nolo singulorum oppositiones recensere, sed dumtaxat proponam veritatem, & facilem.

In his, quæ ad modum sectionis venæ in febribus putridis pertinent, tria tantum considerabo, & ea quidem breuissimè. nam cetera ipsismet ministris relinquam.

D Vnum est, de quo mentionem facit Gal. lib. 4. de tu val. cap. 11. ne scilicet statim à secta vena cibus patientibus exhibeatur: futurum enim inquit ex hac intempestiua nutritione, ut crudus cibus ratione vacui in venas attrahatur.

Alterum documentum sumitur ex Auic. fen. 4. lib. 1. tr. 10. c. 10. ne scilicet illi patientes, quibus secatur propter aliquam repletionem circa viscera, ab ipsa secta vena somno se ipsos dedant. Prohibet. Auic. loc. cit. in istis, in quibus secatur uena propter viscerum internorum affectionem, non esse somnum à uena secta concedendum. Sententia intelligenda de illis in quibus secatur uena, sed non mittitur usque ad mutationem caloris, & consequenter euacuationem eius, qui in loco inflammato continebatur. Si enim mittitur in tan-

Quare in
dicatur
somnia.

Quibus
prohiben-
aus.

Qua ve-
na secan-
da.

Opin. co-
rum, qui
primo ve-
na in par-
te remo-
ta secan-
dam sta-
tuunt.

tāta copia, potestis permittere somnum, sed ubi est parca sanguinis euacuatio, & propterea necessarium est hanc venę sectionem re-
petere, ut ex secunda missione sanguinis à vi-
sceribus eliciatur: prohibuit somnum. & au-
re: Ne ille sanguis in viscera retrocedat: Nō
tamē in omnibus post sect. venam somnum
prohibeatis, ut faciūt vulgares, sed tācū in his
Tertiō, Obseruandum, ut si sanguis sit ad-
modum crassus, temperamentum calidum,
& siccum, ut foramen sectionis sit satis am-
plum; si tenuior, & tēperatura corporis dis-
flabilis, angustum. Venio ad locum conside-
randum. Primō, Vtrum febris ortum ducat
ex putredine venarum communium, vel lo-
co patiente; si ex putredine venarum com-
munium expedit vel basilicam, vel commu-
nem aperire; nisi aliqua euacuatio huic pa-
tientī fuerit suppressa, ut mulieribus mentes,
viris hamorrhoides. In his casibus potius in-
feriores secanda. teste Gal. lib. de cur. rat. per
sang. miss. cap. 18 & 19. Si ex loco aliquo pa-
tiente, hoc opus hic labor est, maxime ortum
tur difficultates inter maximos viros, & duę
pręcipuę sunt opiniones.

Quidam ut Arabes existimant, quib' ex re-
centioribus adheret Trincav. prop. de venę
sect. in pleur. Andr. Turin. & Bened. Fauent.
&c. Illi omnes existimant in huiusmodi fe-
bribus primo secandas venas remotiores dis-
tantes a loco affecto: deinde proximas. Pro-
bat rationibus, & auctoritatibus. I. est Reuul-
sio semper præcedat derivationem. Ergo an-
te venę sect. proximę oportet a perire remo-
tam. Probatur Consequentia. Nam Antece-
dens est Gal. in pluribus locis, præcipue Lib.
de reuul. cucurb. & scarif. & cur. per sang.
miss. cap. 19. Probatur inquam consequentia.
Nam inquirant: Reuulsio attrahit humores à parte,
distantes: Derivatio educit humores a loco affecto. sed
antequam euacuetur locus affectus, oportet prius re-
uelli, & ad distantiorum locum deducere humores;
ergo reuulsio debet præcedere. Confirmant va-
rijs Gal. loc. lib. 10. de comp. med. sec. loc. 3.
Nam in curanda itchiade, primō secat supe-
riorem venam in cubito ad reuulsionem: po-
stea poplitis ad derivationem: similiter lib.
per sang. miss. cap. 18. in renibus affectis pri-
mo superiorem pro reuulsione deinde infe-
riores pro derivatione. Itaque Gal. ipse, pluri-
bus in locis vult, reuulsionem præcedere.

Probant etiam alio argumento: Ante eua-
cuationem partis necessaria est euacuatio totius. Er-
go ante sect. venę proximę secanda aliqua remota.
Anteced. est clariss. Conseq. probatur: quia
euacuatio proximę euacuat locum affectū.
Et ideo Gal. lib. 4. meth. cap. 6. in fluxio-
nibus laudat semper reuulsiones ad partes
distantes: Et Hippo. lib. 2. de nat. hum. text. 9.
inquit, in huiusmodi fluxionibus reuulsionem, &
reuulsionem faciendam ad partes admodum distan-
tes. Itaque istis argumentis Trincavellius sic
statuit, quod vos animaduertetis, si legatis

scripta Auic. & aliorum Arab.

Ex alia parte Matth. Curt. cui etiā assentitur
Petr. Bril. de secanda vena in pleur. & Sul. de
ven. in direct. secand. censent, in huiusmodi
casib' statim secandam proximam. Habent
& ipsi proprias rationes, & auctoritates. I. Est.
Frustra sit per plura, quod fieri potest per pauciora.
*Sed sect. vena proxima euacuat totum corpus, & par-
tem.* Ergo frustra tentatur sect. alterius venę. Con-
sequentia est clarissima. Si ita bene reuellit,
multo melius est vna sect. efficere. Quod
autem huiusmodi sect. proximę hæc omnia
præstet, confirmant Galen. test. plurib' loc. I.
Certum est, Gal. sect. venę proximę partis
esse non tantum euacuatoriam, sed et reuul-
sionem: unde in inflammationibus lib. 12.
meth. cap. 11. secat venam in cubito dextro.
Similiter lib. de cur. rat. per sang. miss. cap. 16.
alibi proponit varias affectiones, in quibus
probat semper sect. venę proximę partis pa-
tientis; in iecore, dextre: in liene sinistra: in
capite humeralis: quod etiam facit lib. 4. de
tu. val. cap. 10. Hipp. similiter 2. acut. 20. & 4.
acut. 74. in plenitudine statim secat venam
eiusdem lateris affecti, nec aliam tentat re-
uulsionem, Secanda cubiti interna lateris af-
fecti. Addunt etiam isti, curandi huiusmodi mor-
di esse multo tutiorem, breuiorem, faciliorem.
Tutior, quia vnica venę sect. possumus eua-
cuare, derivare, & reuelli. Quod eua-
cuetur plenitudo, patet: quia vnica sect. euacuat
totum corpus, teste Gal. multis in loc. Gal.
lib. 4. de tu. val. c. 10. lib. de cur. rat. per sang.
miss. c. 19. lib. 3. de admin. anat. c. 16. Accedit,
quod est tutior, quia non est periculum ut
ducatur sanguis in alium locum, in quo pos-
sit inflammationem excitare; si exempli gra-
tia, exsistente inflammatione in parte dextra,
secetis in sinistra, periculum, ne etiā hæc in-
flammetur. Est etiā cum minori virium di-
spendio huiusmodi vena pxima loco affecto,
teste Gal. lib. de cur. rat. per sang. miss. cap. 18.

In hac difficultate ego puto neutrum recte
sensisse, & hæc duo extrema conciliari qui-
dem posse. adhuc bis distinctionibus quibu-
sdam, potest veritas determinari.

Primum oportet ut intelligatis, quid per
venas proximas, & remotas intelligere ueli-
mus, quid per communes, & e directo. Nam
Curtius eligit proximam, & e directo. Opor-
tet ergo intelligere hos terminos. Vbi autem
intelligeris quid vena proxima? Lib. de cur.
rat per ven. sect. cap. 14. Vniuersum corpus
distribuitur in duas præcipuas partes, quarum
vna dicitur superior, altera inferior: medijs
constituuntur renes. Itaque, ubi laboret una
ex partibus supra renes, si secetur aliqua ex
superioribus, semper secatur vena proxima.
Contra laborantibus supra renes, si secantur
inferiores, dicuntur venę remotę.

Quantum verò ad communes, existima-
runt, intelligi uenas nulli parti appropriatas.
Sed non est ita. Oporteret intelligere venas con-

Tertia et
vera opi-
nio.

conjugatas, quæ habent communionem ad inuicem. Exempli gratia, venæ cubiti dextri habent coniugium cum venis thoracis, & iecoris: nam venæ iugulares, quæ interuntur in thoracem, radificantur in brachio; itæ dicuntur coniuges: sub lingua sunt coniuges cum partibus faucium, &c.

Quantum ad directionem, directe dicuntur, quæ sunt in parte, in qua reperitur locus affectus, dextræ cum dextris, sinistra cum sinistris; siue sint superiores, siue inferiores. Ad faciendam directionem sufficit rectitudo partis.

Itaque Curtius & ceteri volunt, in secandis his venis eligendam venam proximam directionem, quæ habet coniugium cum loco affecto.

Contra Trincaveilius, non opus inquit esse.

Duo ob-
servanda. His explicatis venio ad conclusiones quas vobis sum pollicitus. Vbi duo sunt obervanda: Locus affectus, & Affectio.

Locus af-
fectus. Quantum ad locum, numquid sit supra, an infra renes.

2. Affe-
ctio. In affectione considerandum, an sit tota iam facta.

In huiusmodi causa considerandum, num hæc affectio sit in loco, ex quo non possit amplius euacuari: an potius sit in loco, ex quo possit educi. Exempli gratia: si iecoris inflammatio iam facta, materia est extra venas, & vel transiit in pus, vel potest etiam esse indurata, quæ non potest educi ex illo loco, etiam si mitteretis totum sanguinem; nulla igitur convenit venæ sectio. Si possitis applicare scarificationes, congruum quidem esset, sed non propter Reuulsionem. Propterea Gal. lib. 2. ad Glau. c. 2 & lib. de rat. cur. per sang. mis. c. 19 in inflammationibus nihil tale agit; sed si materia sit in venis fluxa quædam, sed adhuc in venis, oportet considerare, an hæc sit dura, vitæda, aut læta, an mobilis, ut possit euacuari. Si admodum dura & vitæda, sectio non convenit.

Hæc est illud, quod voluit Galen. lib. 1. meth. med. c. 14. quando dicebat, venæ sectionem nec curare putredinem, nec obstructionem. Per obstructionem intelligit obstructionem factam ab humoribus lentis, crassis, vitædis: nam quæ a multitudine facta, tunc vivat venæ sectio. Sed si humor sit mobilis in venis fluxus, iam convenit sola Derivatio, nulla Reuulsio. In hunc sensum scripsit Gal. lib. 2. ad Glau. c. 2. quoniam inquit humorum, qui iam partem obiderunt, derivatio medela est. Et propterea ipseniet Gal. lib. cur. & lib. 1. meth. med. c. 11. laudat in his casibus, ut in Angina secetur vena sub lingua: in inflammationibus oculorum, angulorum oculi: affectionibus capitis, frontis: dicitur Derivatio euacuatio.

Sed si affectio sit partim facta, partim fies, in huiusmodi casu convenit reuulsio; sed non semper, ut existimavit Trincaveilius, & Arabes, ex partibus longinquis sunt nugæ. Oportet animadvertere, an fluxio fiat per Attractionem, an per transmissionem.

A Fit per Attractionem, quando locus est nimis calidus, vel dolens, ut docuit Gal. lib. 13. meth. med. c. 6. In tali casu non facienda Reuulsio ad partes distantes, secunda vena proxima. Et hoc voluit idem Gal. lib. 13. meth. med. c. 11. in inflammatione iecoris lecta vena. Hip. 2. & 4. acut. & Gal. lib. de cur. cap. 76.

Idipsum dico, si fiat per Transmissionem à partibus propinquis; in inflammationibus iecoris secunda proxima, quia pars suscipiens & mittens sunt in eadem classe. Sed si fluxio fiat à partibus distantibus, aliter res habet. Vt exempli gratia, sit locus affectus superior, & fiat fluxio ab inferiori, quod facile fieri potest; in tali casu necessaria est Reuulsio ante Derivationem. In hoc rectè Trincaveilius sentit, & alij cum eo: Et propterea si inflammetur pars superior, secunda inferiores: si inferior, & transmissionem à supernis, primo secunda superiores, deinde inferiores, ut testatur in locis pluribus.

Denique, si fluxio sit tantum fiens, reuulsio semper convenit Reuulsio.

Sed, Domini, non facit ad rem nostram. Nos querimus rationem secandi in febris ipsi: ubi affectio tantum est fiens, febris non adest. Veritas est, com. 3. in lib. de nat. hum. ubi loquuntur de reuulsione ad partes distantes, & postea subiungit propriam sententiam, quem locum videatis.

C DE ADMINISTRATIONE SCARIFICATIONIS, & Cucurbitularum in Febris.

Cap. XXIII.

Multas ob causas plerumque contingit, ut etiam si venæ sectio in putridis sit saluberrima, nihilominus aliquando administrari non possit. Etenim vel vires præfentes, vel futura: hoc non sustinent. In quo casu antiquiores & recentiores Medici alios invenierunt mittendi sanguinis modos. Sunt autem præcipue Scarificatio, Cucurbitula scarificata, atque Hirudines.

Scarificatio inventum est potius antiquorum, quam Arabum, & qui eos sunt sectati Gal. enim, imo & Antyllus, & Apollonius, referent. Oribasius lib. 7. Collect. hanc miris laudibus extulerunt, sectionemque venæ æqualem fecerunt, cum minori virium dispendio administrari soleat. Has omnes dotes, quas scarificationi tribuunt, Aulic. & alij Arabes tribuerunt Cucurbit. scarificatis. Quid autem inter sit inter scarificationes & cucurbitulas scarificatas, satis superque docuere Ioann. illi Mannus Medicus apud Aegyptios celebris, quod de hac rescripsit, & Prosper Alpinus Professor huius Academiæ celeberr. de Medicis Aegypt. lib. 3. c. 5. & 6. Nā Scarificatio est cutis per scapellum incisio longa & recta, secundum quam sanguis educitur, nullo alio adhibito instrumento concavo.

Cucurbitula scarificata est euacuatio sanguinis, facta per incisionem, vel percussionem, adhibito tamen instrumento concavo supra locum incisionis.

Scarificatio.

Differentia inter scarificationes & cucurbitulas scarificatas.

H

Has

Has duas operationes dixi tantundem valere, quantum venæ sectio, quamquam non recipiant id Alpin, nec man: qui ut tucantur Gal. doctrinam, prorsus explodunt. sed ego ostendam tantum scarificatas cucurbit. quantum scarificationes posse, & illas potius eligendas.

Ut hanc veritatem assequamur, primum distinguenda sunt scarificatio & cucurb. scarificata. Scarificatio 2. collect. Oribal. & Gal. de deri. reuul. cuc. & scari. accipitur tripliciter. Primo pro incisione facta super parte affecta, & instituitur in euacuationem humoris ibi contenti. Sic scribit Gal. lib. de cur. rat. per sang. mil. c. 19. in inflammationibus interatis, ubi cessauit fluxio, adhiberi scarificationes: cuius etiam meminit l. 2. ad Glau. c. 7. Scarificantur itaque ubi vel dolor adest. Euacuantur pariter inflammationes, induratae. Instituitur quoque in extractionem veneficæ qualitatis, in collect. cap. 18.

Secundo usurpatur scarificatio pro deriuatione. Loc. cit. scribitur, aliquando scarificari cutem frontis, & capitis, ut fiat deriuatio humorum.

Tertio adhibetur scarificatio partibus infernis, nempe suris crurum, quæ instituta est ad euacuandum vniuersum corpus, & reuelandum humores à partibus principalibus. De hac operatione. Gal. lib. 4. de tu. val. c. 4. ait, quod tantundem possit, quantum venæ sectio. De hac ipsa legitur l. 13. meth. med. c. 5. euacuari plenitudinem totius corporis incisa vena, vel scarificatis cruribus. & lect. 2 aph. 17. plenitudinem corporis euacuari, ut antea.

Itaq; in hac parte rectè lensit Mann. & Alpinus. Sed quod subiungit postea, cucurbit. intermittendas, non accipio. Cucurbitulæ usurpantur tam cum, quam sine scarificatione, siue, ad educendum spiritum flatuosum, & ad reuulsiones humoris, qui impetum facit ad aliquam partem.

Scarificata antiquitus duplici modo usurpata fuerunt. Primo ad euacuandam materiam parti infixam in eundem casum, in quem est scarificatio, ut sanguis ille impactus extrahatur. Aliquando usurpantur ad deriuationem, & sic adhibentur Cucurbitulæ cervici, scapulis, ad deriuandam materiam à capite, dorso, thorace. lib. 11. meth. med. cap. 17. Alium modum administrandi cucurbitulas scarificatas non inueni antiquioribus fuisse acceptum. Arabes vero, quorum principes est Auiic. Fen. 4. lib. 1. c. 21 de cucurb. præter vsum euacuationis à parte affecta, & deriuationis, excogitarunt, & pro euacuatione totius corporis & reuulsione, ut ex Gal. scarificationem; ut ita non tñ Arabes hanc suam libenter acceperint, sed et Cellius lib. 2. c. 11. ferè circa fin. Itaq; qñ accipimus cucurbit. scarificatas esse æquales scarificationi, loquimur de scarificatione circa suras crurum, quæ pro cucurbitulis scarificatis in iisdem partibus adhibetur.

A His statim ostendo, cucurbitulas scarificatas potius esse eligendas quàm scarificationem.

Scarificatio adhibetur crurum suris, ut euacuet sanguinem satis copiosum, sed minori virium dispendio, quàm venæ sectio.

Cucurbitulæ scarificatæ his ipsis partibus adhiberi possunt, & eadem sanguinis copiam educere. Ego sanguinis viginti vncias cucurbitulis extraxi: igitur tñ præstat, quantum scarificatio. Vtrum huic rōni aliquis aliquid respondere possit, sanè nescio. Deinde quod paulò ante dixi, id repetito, non tñ idipsum posse, sed esse administrandas; quia melius, citius, tutius, & cum minor virium dispendio hanc euacuationem sanguinis moluntur.

B Quod citius: nam euacuantur per scarificationem multa necessaria: primo percussio fit satis longa post balneum aquæ calidæ: post incisio, quæ debet sanguinem euacuare, præterquam quod attrahatur a cucurbitulis: propterea non ita subito mittitur ut in cucurbitulis.

Itaq; citius operantur, & melius, quandoquidem cucurbitulæ extrahunt sanguinem à profundis partibus, duplicem ob causam. Scarificatio ob vnicam tantum. Scarificatio enim attrahit à remotis & profundis ob totam sectionem. Cucurbitulæ verò scarificate ob sectionem & attractionem a cucurbitula factam.

C Operantur et cucurbitulæ tutius, nam scarificatio, si debeat aliquam sanguinis quantitatem effatu dignam emittere, debet esse longa, profunda, quæ admodum periculosa, quia sunt admodum dolorosa, unde multi spiritus euacuantur. Deinde quia ex sententia Gal. lib. de cur. per sang. mil. c. 11. adhibentur scarificationes potissimum in mulieribus pinguioribus, obesis, quæ habent venas angustas, quæ frigidiore; vulnera impacta difficilime consolidantur, durant aliquando 20. dies, unde periculum ne succedat gangrena, teste Gal. l. 2. ad Glau. c. 7. itaq; non vsq; adeo tutæ. Si n. fiant superficiales, sanguinem non educunt, itaq; tutiores cucurbitulæ sunt.

D Cum minori etiam sunt virium dispendio: nam in scarificatione est dolor. Antiquitus fuisse scarificationem præstantiorem cucurbitulis non nego: Concedo etiam ignotum fuisse Gal. cucurbitulas tantum præstare, quantum venæ sectio: sed non concedo cucurbitulas esse postponendas scarificationi. Accedit, quod ægri pro molienda hac operatione coguntur surgere ex lecto, coguntur adherere ipsi cubili, pedibus stare in vase aqua calida pleno, & omnia sustinere, quæ fieri non possunt absq; virium dispendio. Quinimo scarificatio, cum nullam habeat cucurbitulam superpositam, necessariò permittit spiritus exhalare, ut Fen. 4. lib. 1. cap. 21. Aulic. scribit. Est pulcherrima cōsideratio, in cucurbitula retinetur spiritus; addit, scarificationes illas, quæ non possunt seruari, nisi longo

Quantum præstent cucurbitulæ scarificationem.

Cucurbitula non scarificata.

Scarificata.

longo tempore, posse vigilas, & virum iacturam facere, secus scarificatas cucurbitulas.

Itaq; ego præpono cucurbitulas scarificatas ipsi scarificationi. Quod dicunt isti, fuisse istos deceptos, & per scarificationem intellexisse cucurbitulas scarificatas, existimo fuisse ingenium huius viri. Itaq; & ego accipio potius cucurbitulas scarificatas, quam scarificationem.

Modus
adhiben-
di cucur-
bitulas.
In prin-
cipio.

De modo adhibendi cucurbitulas, in Primis est sciendum, cucurbitulas has scarificatas convenire tam in Principio morbi, quam etiam aliquando in Augmento & Statu.

In principio ad euacuandum vniuersum corpus, in quibus venæ sectio administrari non possit. In progressu vbi facta vniuersalis euacuatio, vel per venam sectam, vel medicamentum, vel vtrumque.

Si sermo sit de cucurbitulis adhibendis in principio, pro euacuatione totius corporis; est dubium, an semper adhibenda partibus in fernis, quemadmodum scarificatio: an in principio, & superioribus. Rônes sunt variae.

Qui putant adhibendas partibus superioribus, nituntur ratione, & auctoritate. Ratione: nam cucurbitule appositæ superioribus (intelligo dorsum, lumbos, & nates) inquit, in his venæ sunt proximiores venæ causæ, quam circa crura. Ergo & auctoritate Auic. qui Fen. 4. lib. 1. c. 21 inquit, has esse vicarias venæ basilicæ, communis & cephalicæ. Si vicariæ, igitur deficiente occasione, oportet eligere cucurbitulas scarificatas.

Ex altera parte rationes, propter quas sunt suspectæ, & loca Galen. sunt non magni momenti. quia quamuis loquens de huiusmodi vñ cucurbitularum, semper dicat, nūquam esse adhibendas, nisi euacuato corpore toto: Cognouit tantum pro euacuatione partis affectæ: non cognouit, ut administrarentur pro euacuatione totius.

Quantū ad rationes, inquit, si adhibentur cucurbitule dorso, necessario obstructio nes cutis augent, attrahunt humores à uenis magnis in capillares, uel à uisceribus in uenas magnas, & deinde in capillares. Sed sic est, sanguis in uenis, humores in uisceribus, humores crassi, sanguis crassus augebunt obstructionem cutis, & per consequens febrē.

Accedit, quod affixæ cordi, & partibus proximis possunt ducere humores ad loci affectum; propterea lib. 11. meth. med. c. 17. in affectibus thoracis non laudat cucurbitulas, nisi facta totius euacuatione.

Domini, hac in parte existimo opus esse distinctione. Considerandum primò numquid febris, cuius ratione sanguis mittitur, ortum ducat ex uenis communibus, an determinatis?

Si communibus, considerandum, an adsit cacoehymia insignis in uenis uel prius uis, an non adsit.

A Vbi igitur febris ortum ducat ex uenis communibus, neq; insignis adsit cacoehymia, nec in uenis, nec primis uis, existimo posse tūc mitti ex uenis infimis, cruribus scilicet; tamen nō existimo esse adeo magnum peccatum, si etiam adhiberentur lumbis & natibus: nam nullum imminet periculum huius obstructionis. Sed consulo, ut antequā ad hanc operationem deneniatis, præbeat medicamenta ad euacuandas cruditates. Postea adhibeatis etiam lumbis & natibus, quando nulla adsit necessitas.

B Contra, ubi suppressæ hæmorrhoides, aut fluxio fiat ab utero in partes superiores, ibi secetis inferiores, cruribus apponatis: quæ operatio non tantum facienda in mulieribus obestis, sed etiam in illis, quæ habent uenas latis, quando non sustinent uenæ sectionē. quia lib. cur. c. 11. secunda crura in mulieribus in pinguib⁹. Quæ uero secunda sit uena, uide ibidem. Hæc sententia intelligenda de illis mulieribus, quæ possunt sustinere uenæ sectionem. Nos loquimur de illis, quæ non possunt.

Sed si ex aduerso fluxio fiat ad uterū, uterū ipse laborat erysipellate, inflammatione, aut laborat uesica, aut pudenda: cucurbitulæ scarificatæ partibus infimis proderunt. Oportet tempus distinguere: si sit principii morbi, si ex parte fiat, ex parte sit factus, si non sustineant uenæ sectionem patientes, oportet partibus superioribus apponere.

C Per partes superas non intelligo thoracem, neque dorsum, sed cucurbitulas adhibitas ipsis brachijs.

In his casibus ubi sit fluxio ad uterū oportet adhibere cucurbitulas brachijs; minuitur enim plenitudo, & fit reuulsio a loco patiente: postea etiam poteritis scarificare crura.

Sed si locus superior sit affectus, ut cerebrum, fauces, pleura, & tamē huiusmodi affectus non fiant ex fluxione à partibus infernis; sed proximis; in tali casu difficillimum est decernere, num liceat adhibere cucurbitulas; non præmissa alia euacuatione partibus supra renes: periculum enim, nec materia trahatur ad cor. Propterea Auic. cap. 21. loc. citat. cucurbitulas in dorso inferre cordis tremorem, inquit.

Oportet, ut consideretis, num ex partibus præcipuis quædam sit imbecillis, necne? Interrogetis, an naturaliter, an ex morbo imbecillis. Exempli gratia, si qui laborant circa caput, tentantur asthmate, habeant pulmones imbecilles, imbecillem ventriculū, non auderem imponere cucurbitulas partibus propositis, nec dorso, nec lumbis, nec materia fluere ad illam partem. Itaque ipsis brachijs supra cubitum, ubi nulla noxa.

Si sermo sit de cucurbitulis adhibendis post alios morbos, ut post morbillos, petchias, &c. in his casibus facta uniuersali purgatione per uenæ sectionem & medicamen-

ta, tunc possunt apponi, non tantum infernis, quantum etiam natibus, lumbis, & dorso. Propterea Gal. lib. de reuulsi. deriu. cucurb. & scarif. prop. cap. de cucurbitulis, inquit conuenire. Quod etiam sentit Auic. & omnes.

De apertione venarum sedalium, seu Hemorrhoidum, & appositione hirundinum, lib. 1. cap. XXIV.

Inter ceteros modos, quibus sanguis in febribus mitti solet, duo supersunt examinanda: primum est venarum sedalium, seu hemorrhoidum apertio; alterum uero hirundinum appositio.

Nec miremini, me hos duos modos distingere proponere. nam possunt aperiri venae sedales, absque hirundinibus, possunt apponi hirundines varijs partibus, non solum hemorrhoidibus. Itaque de utroque modo sigillatim.

Quantum ad apertionem venarum sedalium video inter omnes conuenire, huiusmodi aliquando esse utilem; non conuenit uero inter omnes, quando talis sit utilis, nec quibus conueniat.

Quibus liceat aperire hemorrhoides.

Fuere inter recentiores viri clarissimi, qui existimarunt huiusmodi apertionem nusquam & nunquam esse tentandam, nisi in illis, qui sunt assueti ad excretionem, non cuiuscumque sanguinis, sed tantum melancholici, nec cuiuscumque melancholici, sed dumtaxat melancholici naturalis, qui est saxis sanguinis, ut propterea uno uerbo existiment, non esse aperiendas, nisi in illis morbis, qui proueniunt ex melancholia naturali. Itaque in febribus quartanis, & melancholia conueniunt; in alijs autem febribus, uel phrenitide, non: quia alijs febres ex alijs humoribus ortum ducunt.

Confirmant hanc suam sententiam Gal. testimonio sect. 6. aph. com. 1. 1. 2, & 3, ubi scribit, huiusmodi venas expurgare sanguinem feculentum, & melancholicum. Et propterea in illo com. 21. inquit, per insanientes, quibus scribit Hipp. hemorrhoides prodesse, intellexisse non quamcumque insaniam, sed tantum melancholiam ipsam.

Quod autem in alijs non liceat has venas aperire, probant varijs rationibus. Primo, quia, si in alijs aperiantur, excernunt tantum sanguinem magis ichorosum, & tenuem, crassiores uero in corpore relinquunt. Secundo, quia huiusmodi operatio non expurgat viscera praecipua, praecipue iecur, quod magna ex parte est focus, & sedes putridarum. Tertio, quia eiusmodi sanguinis euacuatio non potest curare obstructionem in uniuerso corporis ambitu repertam.

An ex apertione hemorrhoidum anineant pericula.

Praterea inquiunt, ex tali euacuatione maxima imminet pericula. nam interdum tantum educitur, ut exanimis relinquunt, praterquam quod dolores, ulcera, fistulae ex hemorrhoidum apertione in his locis innascentur. Domini, est questio magni

A momenti, agitur de remedio in febribus praestantissimo: non est Logica. quod si non usurpatur, potest obesse: itaque oportet esse diligentes.

Quod agitur ad hanc rem pertinet, hanc sententiam existimo esse prorsus a Galen. & Hipp. & ratione alienam.

Quod a Gal. patet manifestissime ex 3. in 6. epid. com. 13. ubi inquit Galen. in com. 25. *venas hemorrhoidales non tantum excernere sanguinem melancholicum, sed etiam plerumque immuere plenitudinem totius corporis*; ita ut ex eo loco colligatur, quandoque excerni hunc sanguinem, quia est operi naturae: quandoquidem excernitur propter nimiam copiam, quamquam bonus sit: quandoque propter imbecillitatem vasorum sanguinem continentium. Itaque patet non tantum melancholicum, sed etiam probum propter imbecillitatem excerni. Vadit locum, sed responderi euacuari quidem alium sanguinem diuersum a melancholico, sed tamen tum naturam improbe agere, quae excretio patientibus noxia, & concludit auctor, non imitandum esse naturam improbe agentis motum: sed si ita esset, abstinendum.

Sed sunt alia loca, in quibus se explicat, an haec proba, uel improba, utilis, an inutilis. Quarto de art. com. 40. proponit eam, propter quam aliqui sanguis effunditur ex naribus. In dysenteria, inquit, causam esse mutationem membri, uel intermissionem exercitij in abundantia cibi. Itaque loquens de his omnibus excretionibus, inquit, fieri maximo istorum beneficio. Si non fiat, inquit, necessarium est, illos incurrere in alia grauiora mala.

Itaque si, inquit, huiusmodi excretio non sanguinis melancholici sit summo beneficio; igitur non semper euacuatio improba. Propterea Hipp. 3. in 6. epid. tex. 37. scripsit in eundem sensum, in quem Gal. loc. cit. inquit, Mariscis laborantes neque tentantur pleuritide, neque peripneumonia, &c. Vir excellentissimus, qui aliam tueretur sententiam, vidit, sed inquit, aduertat, uerum est: sed loquitur de pleuritide, & peripneumonia melancholica, non sanguinea.

Volo uos iudices esse, num haec responsio satisfaciat; tamen alius etiam locus: in lib. de venae sectione adu. Erasistr. cap. 5, & 6. scribit, eos, quibus sanguis copiosus coacervatur, (non loquitur de melancholico) incidere in plenitum, uel in peripneumoniam, nisi euacuetur per hemorrhoides.

Itaque ex his patet, non tantum melancholicum, sed et alium ex his locis effundi.

Quod ad aliam rationem, sanguis tantum tenuis excernitur. non satis intelligo hanc rationem, uult effundi tantum melancholicum, & postea inquit, tantum excerni ichorosum: haec mihi videntur inuicem pugnare.

Quando etiam subiungit, huiusmodi euacuationem non expurgare viscera praecipua

cipua. Primum, si sermo sit de liene, à quo ramulus tendit ad venas sedales, 5. in 6. epid. com. vi. Propterea Gal. aperte scribit, hamorrhoides sanare lienis tumorem, &c. Sed nonne etiam aperte hoc dicit Gal. 6. aph. com. 12. Huiusmodi vacuationem sanguinis posse imminuere plenitudinem iecoris, ut si retineatur, sit in causa, quamobrem gignatur hydrops, vel cachexia: Nam inquit Gal. est in ea, ut euacuetur feculenta, ac vitiosa materia hepatis. Si iecur expurgatur: Ergo & viscera.

Propterea in eundem sensum scribit Gal. lib. 2. de nat. fac. cap. 8. esse in causa hydropsis.

Et profecto, si venae sedales sunt in medio corporis, quare non existimemus posse purgare iecur? Quod dico de iecore, dico etiam de toto corpore.

Quod dicat aliquando immodicam esse hanc euacuationem: non nego per incuriam ministri posse fieri: sed oportet ut caute agant. Si ad errores ministrorum respiciamus, etiam sic in venae sectione potest contingere.

Denique quod dicat, aliquando posse induci ulcera, fistulas: consulo, ut antequam aperiantur uenae, uideatis, an locus imbecillis, necne; utrum aliquando passi fistulam, ubi abstinere: in alijs casibus non imminet periculum.

Conclusio itaque sit, in quibus sanguis uiscidus, & quibus multis abundat, posse fieri has excretiones.

An saepe assueti sunt aperienda hamorrhoides, an vero etiam re-liqua.
Sed dubium, An tantum in illis, in quibus consuetudine haec fuerit euacuatio, an in ijs, qui ea nunquam sunt visi? Apud Galen. lib. 4. de tuen. val. c. 4. non inuenio, esse tentandum in ijs, qui non sunt assueti, pariter per sanguinis missionem, cuius laudat operationem, qui assueti, & quibus suppressa euacuatio. Et ideo 4. aphor. 75. videtur improbare huiusmodi auxilium in non assuetis.

Sed ego existimo aliter sentiendum, & distinctione opus esse, quando agitur de aperiendis uenis sedalibus.

Si sermo sit de ijs, qui sunt assueti, & suppressa sit euacuatio, mittendus per loca, de quib' postea loquar, nulla alia praemissa missione, teste Gal. lib. 4. de tu. ual. cap. 4. ubi scribit, in illis, qui sunt assueti; sanguinis hamorrhoidalis tantum valet, quantum uenae sectio: Si tantumdem ualet, quantum uenae sectio; igitur quando suppressa hamorrhoides, & expediat sanguinem mittere, si vires robustae, debetis praetermittere uenae sectionem, & tentare per hamorrhoides.

Alter locus clarissimus, qui etiam de clarat praecedente, est lib. 9. meth. c. 3. ubi loquitur de curanda Syncho, non loquitur de morbo melancholico, non de quartana, inquit in hac febre, si contingat tentari hamorrhoidibus, si haec excretio per hamorrhoides sit sufficiens, non alia utendum: si non, tantumdem

A mittendum per sectam venam, ut ex duobus illis, missionis satisfiat necessitati.

Confirmat etiam hanc operationem, quia inquit, quamuis haec excretio non sufficiens, est aperienda uena. Per aperiendum uenarum non intelligit superiorem venam, sed inferiorem ad excitandam hanc purgationem, ut docuit lib. de scarif. & altero per sangu. miss. cap. 19. ubi inquit: suppressi hamorrhoidibus, oportet uel crura scarificare, uel uenas inferiores secare. Itaque non opus sectione uenae superioris.

B Sed si quispiam non fuerit assuetus, in his casibus, si corpus sit plenum, & vires robuste, consulo secetis venam; nolo, ut cum hirudinibus aperiatis hamorrhoides.

Si vires non consentiant, quamquam hamorrhoides non assueti, aperiatis uenas hamorrhoidales propter defectum virium, & propterea si aliquando etiam facta sectione uenae communis urgeat necessitas mittendi non ui sanguinis, aperiatis sedales, etiam in non assuetis: cui opinioni nec Galenus refragatur 4. aph. 25. nam aliud est sanguinem mittere aliud assuescere.

Quantum ad modum, est multiplex: Possunt enim euacuari scarificatis cruribus, uel apertis uenis inferioribus, teste Galeno lib. de cur. rat. per sang. miss. cap. 19. Aliquando excitantur frictione folij parietariae, borrag. ficus, panno aspero, potissimum si madesiat in ol. amygd. dulcium calente.

C Excitatur etiam euacuatio sanguinis quandoque scalpello, aliquando per hirudines; quomodo debeant aperi, dicam.

Si quispiam assuetus fuerit huic excretioni & tamen eo tempore, quo morbus urget, nulla adsit excretio; considerandum, an patiens sanguinem in copia effundat, ut vires patiantur, an in moderata copia.

Si non sit assuetus copiosa excretioni, considerandum, an hamorrhoides sint tumidae, an abique tumore.

Si tumide, & patiens non sit assuetus multae excretioni, sunt aperienda frictione proposita, aut per impositionem hirudinum, sed si assuetus multae euacuati, abstinere ab hirudinibus, melius est scarificare crura, uel secare uenas inferiores.

Similiter, si non sint tumidae, & patiens non assuetus excretioni, necessarium est adhibere hirudines uenis sedalibus. Et quamquam ex antiquioribus Graecis nemo mentionem faciat hirudinum in uenis sedalibus, excepto Actuatio lib. 3. meth. cap. 3. qui probat, quam validae excretioni, & non tumidae, & patiens frictionem non uoluerit ferre, per hirudines.

De tempore, si occurrat patiens assuetus, potius secetis uenas maiores in principio, postea istas.

Quantitatem sanguinis euacuabitis, prout videbitis.

Etiam in non assuetis conuenire.

Modus aperiendi hamorrhoides.

Quando hamorrhoides sunt aperienda.

Qua quā Quantum ad alias hirudines, non tantum *tuare sã* esse in usu pro eiusmodi euacuatione, sed et *guisemur* vacuandis partibus determinatis, venis nariū *tendus.* in phrenitide, maximo dolore capitis: ubi *Esse ne-* cauti debent esse ministri. nam aliquando *cessariū.* ascendunt hirudines in cerebrum, ut non *Le hiru-* possint extrahi. Adhibentur etiam venis tem *dmibus.* porum, uti in fluxionibus ad oculos, vel ad aures, & alijs omnibus parubus determinatis ad euacuandas materias, quæ in illis locis detinentur.

Sed denique nostris temporibus apponitur etiam maioribus trenis in cubito, & pedibus in pueris & mulieribus (in pueris non aperitur ante 14. annum (ligetur vena, & apponatur vna, vel altera sanguisuga in grauibis morbis, ut phrenitide, &c. Idem dico de mulieribus. Quæ dicta sint de his duobus modis mittendi sanguinem.

De curatione, qua fit Pharmaciam, & primum de medicamentis Lenientibus.

Cap. XXV.

DE fonte Chirurgico hætenus dictum est, succed. t. Pharmaceuticus, de quo dicendum. Distinguuntur auxilia ex fonte hoc desumpta in quattuor potissimum genera. Primum continet Lenientia vocata medicamenta. Secundum, Alterantia, Tertium, Purgantia. Quartum, Corroborantia. Loquar primum, de lenientibus, deinde, de alterantibus, tertio, de euacuantibus, mox vero de corroborantibus.

Quod pertinet ad Lenientia, hæc sunt vomitoria, clysteres, suppositoria, & medicamenta.

Vomitoria.

Vomitoria in febribus putridis locum habent ratione euacuationis, & ratione reuulsionis.

Ratione euacuationis, ubi materia, quæ febre, vel facit, vel auget, vel augere potest, in ventriculo continetur, & ad os ventriculi impetum facit. Sic dicebat Gal. lib. 11. meth. cap. 4. in febribus etiam continētibz expurgandos prauos humores, non tantum per aluum, vrinas, & sudores, sed etiam per vomitum. Ex quo loco colligitur, in febribus, ex vasis communibus non esse excitandum vomitum, nisi quando materia ad os ventriculi sponte habeat propensionem: non oportet attrahere materiam putridam ad ventriculum. Sic Gal. lib. 1. ad Glauc. c. 9. in febre tertiana vomitum commendat, quando materia habet propensionem ad os ventriculi.

Ceterum, quamquam vomitoria non conueniant, nisi materia ad os ventriculi habeat propensionem, conueniunt tamen gratia reuulsionis. Propterea siue laboret vterus inflammatione, siue pudenda, pro reuulsione conueniunt vomitoria, ut docuit Gal. lib. 13. meth. cap. 11. Et ratio est, quia in his casibus, quando febris ortum ducit ex loco determi-

A nato, materia in eo, etiam si putrida, per Vomitum non euacuatur, sed ea, quæ adhuc non est putrida. Non est tamen excitandus vomitus ventriculo ipso primario laborante.

Si laboret secundario, nempe cardialgia, vel alio dolore, qui proueniat ex fluxione humorum transmissa a loco determinato, affectio non est primaria.

Si autem est primaria, non oportet irritare vomitorijs hanc partem, teste Galen. lib. 13. meth. c. 11. Hæc uomitoria uaria sunt pro varietate humoris, qui educendus.

B In materia calida, biliosa, & acris, sit ex aqua hordei, mixta cum oleo, vel communi, sed dulci, vel amygdalino, quod mihi magis probatur.

In materia biliosa.

Et quamquam sunt uiri excellentissimi, qui existimant, in fluxu humoris biliosi non conuenire Vomitoria, quæ oleum recipiant, quia habet occasionem laxandi os ventriculi, nihilominus maius inuamentum præstat ad subducendam aluum, & euacuandū per inferiora, ut debeat potius eligi. Nec hæc est mea sententia, sed Galeni lib. 1. ad Glauc. cap. 14. ubi laudat hydrolæum; nos uero eligimus oil amygdalinum.

In materia crassa & pinuitosa oxymel simplex compos. scyl. mixtum cum decocto, vel anethi, vel raphani.

In pituitosa.

C In materia mixta expedit uti syrupo acetoso, cum decocto hordei, & anethi. Dosis uomitorij si ad decoctum respicimus, erit unc. vi. uel viij. si ad syrupum unc. ij. uel iij.

In mixta.

Tempus exhibendi uomitorij est, si sermo sit de euacuatione tempore propensionis humoris ad os ventriculi: propterea si iam incipiat, uel tenebrosa uertigo, uel inappetentia, nauſea, tremor labij inferioris, est argumentum propensionis materię ad os ventriculi. Pro reuulsione poteritis eligere horam, in qua patientes minus afficiantur.

Tempus exhibendi uomitoria.

Quantum ad clysteres, administrari solent in febribus ad subducendam tantum aluum, uel pro reuulsione alicuius humoris, qui impetum facit ad os ventriculi & caput, & inducit cardialgiam, & dolorem.

Clysteris.

D Si sermo sit de clysteribus administrandis pro subducendis facibus, imponi debent horis minoris afflictionis, aut intervallo.

Si scopus est reuellendi impetum humoris, in tali casu eligenda hora fluxionis humorum, in qua grauius affligantur, quamuis esset importunum (non est, quod respiciatis impedimenta) procti & nuper pasto, quæ sententia partim ex Galeni, partim Hippocratis uarijs locis. Gal. lib. de cut. rat. per sang. miss. cap. 12. docet, clysteres pro necessitate administrandas, quacumque hora. Et sicut increpat illos, ita laudat, qui imponunt clysteres quacumque hora. Hippocrat. etiam 1. acut. 45. scribit, etiam nuper pasto clysteres administrari posse, si tamen uires sustineant.

d.co,

Dico, si vires sustineant. nam reuera in principijs accessionum multoties confluit materia ad os ventriculi, & excitantur cardialgie vehementes: in tali casu opus esset clysterie pro reuulsione.

Suppositoria.

Si non sustineant, oportet confugere ad Suppositoria, quæ in hac necessitate nõ sunt semel imponenda: oportet imponere duo, tria, quatuor, quinque, &c. vnum post aliud, ita, vt semper in corpore adsit vnum, vsquequo natura incipiat transmittere ad partes inferiores.

Et quia suppositoria alia sunt communia ex mellè cum sale, alia efficaciora, eligenda in hoc casu efficacissima, quale erit hoc.

℞. diagrid.

trochis. albandal. an. g. v.

salis gemmæ g. xy.

spec. hieræ simp. drach. j.

mel q. s. M. f. supposit. 3. cum filo apponendo, vt existentibus viribus imbecillibus possint extrahi.

Clysteres promate ria calida.

Clysteres similiter possunt componi pro materia calida, & frigida ex decocto hordei, saccharo, & oleo violaceo, vel buryro, aut ex lacte cum eodem saccharo, & ol. violaceo. Exempli gratia.

℞. aq. hord. lib. j.

sacch. rubri.

ol. viol. an. ꝑ. iij.

utrell. ou. n. j. M.

Pro pituitosa.

Vbi materia fuerit pituitosa, & crassa, conueniunt communes.

Vel si status adsint, ex decocto anethi, addito melle, sacch. & ol. amygd. sale, & ouis.

Quantum ad Lenientia vocata, administratur, vbi peccant humores in primis vijs.

Lenientia

Hæc lenientia varia quidem sunt, ac alia respiciunt materias calidas, alia frigidas, alia mixtas. De his in proprio tractatu singulari febrium habebitis descriptionem, & dosin in bolo, & potione.

Vnum tamen dicam, huiusmodi medicamenta à nonnullis recentioribus existimari Purgantia, quod scil. habeant vim electiue euacuandi proprium humorem. Exempli gratia, syrupus rosatus solutiuus pro bile, mel rosatum solutiuum pro pituita, &c. Itaque dicunt esse hæc purgantia, non lenientia.

Sed decipiuntur: nam natura purgantis non definitur, quod educat hunc, vel illum humorem, sed quod attrahat, hunc, vel illum humorem etiam à longinquis. Vnum aliud addo, hæc lenientia in cura regulari, semper administranda esse, vel in die intermissionis, si habeat vnum diem intermissionis: vel in die minoris afflictionis, si singulis diebus affligat.

Et ideo non est, quod semper eligatis horas matutinas: aliquando febres inuadunt matutinis: oportet præbere medicamenta vespertinis.

De curatione per medicamenta alterantia, Preparantia, & Concoquentia.
Cap. XXVI.

Quantum ad alterantia, hic etiam quæstio estote attentæ. nam pulcherrima, difficillimaq; est tractatio. Distinguntur hæc à me in tria præcipua capita, propriè alterantia, preparantia, & concoquentia. Altissimus præter hæc tria addit quantum genus, nempe Digerentium medicamentorum. Sed quamquam digestio sit diuersa à concoctione: aliud enim est concoquere, aliud digerere: Concoctio est mutatio: digestio est motio humoris concocti, & cõsequenter distributio. Sed tamen, quando sermo est de Preparantibus, seu Alterantibus in febribus, digestio est enumeranda inter medicamenta, quæ respiciunt alterationem humorum. In febribus numquam hæc inuenietis, quando concoctus est humor, sita natura; vel si arte, sit a purgante.

Itaque loquor tantum de propriè alterantibus, quæ sunt illa, quæ respiciunt primas qualitates: tunc in febribus sit alteratio, quando intemperiem calidam, & siccam corrigimus frigidis, & humidis, frigidam & humidam calefacientibus & humectantibus; hæc est alteratio, quæ locum habet in febribus ratione febris, & ratione causæ febris.

Ratione Febris semper refrigerantibus & humectantibus utendum.

Ratione Causæ quandoque refrigerantibus, & humectantibus, quandoque calefacientibus & siccantibus, quandoque calefacientibus & humectantibus: de quibus etiam sigillatim suo loco. Nunc addo illud, considerari circa partem, quid agendum, quando huiusmodi intentiones sint inter se cõtrariæ. nam dari febrem ex materia biliosa, hoc parum est, nouerit quisque intentionem. Sed vbi pugnant intentiones, vt ex alia requiratur calefacientia, & siccantia: hoc opus, hic labor est.

Docuit hanc rem Galenus lib. 10. meth. c. 1. vbi scribit, in tali casu necessarium esse, respicere, ad id, quod magis vrget. Et propterea, si febris magis vrgeat, quam causæ, febri incumbendum per refrigerantia, & humectantia, neglecta ipsa causæ, aut saltem posthabita; interim refrigerantibus & humectantibus agendum, postea incumbendum causæ.

Sed dicetis, quando incumbendum febri magis quam causæ? Nam loc. cit. videtur incumbendum soli causæ: Inquit, si incubas soli causæ, minus errabis: si vtrique, rectè agis.

Sed dantur aliqui tamen casus, in quibus febri incumbendum, vt causæ prorsus spernatur.

Hoc euenit, quando est ita exurens, vt uti-

Proprie alterantia

res iam deiiciat, adsit colliquatio, immineat hectica, imo tabis periculum. In his, quâquâ ex potione frigida, possit longior reddi, in hoc periculo oportet feбри incumbere spreta causa: Hoc obscurè tetigit loc. cit. Et apertissimis uerbis lib. 10. meth. c. 6. in ardentibus cum inflammatione spernendam inflammationem, & potum frigida præbendum.

Itaque in hoc solo casu, ubi immineat periculum tabis, quamquam morbus debeat fieri longus, debetis esse audaces in præbenda frigida: quâquâ corrigerem auxiliū frigidum, exhiberem potius hordeaceam in maxima copia: & si obstructions adessent, adderem semina melonum, & alia frigida.

Quantum verò pertinet ad causam, huic magis incumbendum, quàm morbo, quando febris non videtur admodum periculosa. pituitosa, & melancholica, sunt admodum leues. Sic igitur agendum in huiusmodi casibus.

Distinguebam alterantia vocata medicamenta in tria præcipua capita; quorum primum continet ea quæ propriè alterantia dicuntur, eò quod respiciunt primarum qualitatum mutationem, & alterationem.

In hac enim alterationis differentia semper contrariæ qualitates contrariis mutantur.

Præparantia.

In secunda classe sunt alterationes, quæ proprio nomine Præparantia dicuntur.

Huiusmodi illæ sunt, quæ disponunt humorem, ita, ut faciliè ex corpore educi possit.

Hæc dispositio dupliciter comparari potest: Primo quidem vijs ipsis, per quas humor ipse est transurus, apertis. Deinde, quando ipsi humores reducuntur ad quandam mediocritatem substantiæ, secundum quâ sint fluxiles.

Quid præparatio.

Itaque præparatio est viarum, per quas humor est transurus, ad apertio, aut humoris exeuntis ex aquatio, ad quandam substantiæ, mediocritatem, quæ ex equatio potest consistere in secundis qualitatibus, de quibus postea.

Vias aperientia.

Nunc de vias latas apertas facientibus erit sermo. Medicamenta hæc, quæ & de obstructa dicuntur, administrantur, omnibus putridis, in quibus in cute, & in ambitu corporis, vel venis melaericis, & iecoris obstructions continentur, propter quas non libera est transpiratio. Itaque necessaria aperientia. Hæc medicamenta sunt & calida, & frigida, & temperata.

Quantum ad calida, videtur Gal. lib. 13. meth. cap. 14. suspecta habere omnia medicamenta calida aperientia, quando adsit insignis aliqua caliditas febrilis. Propterea in inflammatione iecoris, inquit, esse quidem necessaria, sed cum sint calida, oxymel. vel pitifana eligenda. Ita ut hic ad pauca confutetur pro vijs aperiendis.

Pariter lib. 8. meth. c. 4. in huiusmodi obstructions videtur omnino calidiorum usum

auerfari, & tamen idem in ardentibus synochis, quasi sui oblitus, proponit etiam calida lib. 11. meth. c. 4. Ibi loquitur de febre synocha: proponit non tantum oxymel, sed etiam radicem apij coctam in aqua. Sed quod magis est, sect. 1. aph. 24. loquitur de materia turgente, quæ est calidissima: quamquam dicit concors cum Hipp. esse euacuandum: subdit tamen, &c. Vide locum.

Itaque hæc non convenire inter se videntur, si febris ortum ducit ex humoribus turgentibus, consequenter ortum ducit ex calidis, & proponit origanum.

Pro evitanda hac contradictione, primo notandum, quod inter lib. 8. meth. & lib. 11. meth. interfit. Nam lib. 8. non mentionem facit radicis apij, sed absolute apium nominat apium: si absolute accipitur, potest intelligi ratione seminis, quod est cal. in tertio gradu, quod docuit lib. 5. de simpl. med. fac. cap. 13. Non igitur usurpandum: sed radix apij in aqua cocta, non usque adeo fugienda, si miscetur alijs.

Quantum ad caput 14. lib. 13. meth. quod in inflammatione iecoris cum obstructions, calidis utatur, & 1. aph. 24. etiam ea accipiat; dico Galen. 1. aphor. 24. dum accipit sic calida, non respicere materiam peccantem, supponit adesse tantum in primis vijs excrementa crassa. Ex alia parte supponit, materiam feruentem, & turgidam in venis contineri: ubi si adhibeantur, non possunt calefacere illum humorem in venis contentum; & si minora usurparentur, nihil proderent. Se si contingat affectio calida in iecore, prætermittenda: propterea lib. 13. meth. prohibet.

Quamquam hæc sit rei veritas, & locorum conciliatio, ego tamen consulo, ut pro obstructions superandis, vos utamini medicamentorum distinctionibus: nam nostris temporibus possunt esse tam frigida, quam calida, & temperata.

Itaque si aperiendæ viæ cum humoribus calidis refrigerantia, quæ sunt syrupus de acetola, syrupus ex acetositate citri, succus arantiorum, limonum, citri, cum portione sacchari, & permissione aliarum herbarum refrigerantium, sonchi pentaphylli, &c.

Si uolueritis etiam immiscere aliquid semulsiōis sem. melon, citrulli, aperiunt refrigerant, & penetrabunt.

Sed oritur dubium circa hæc, num admini- *Obiectio, stranda? Ratio dubitandi est: quia Gal. 1. acut. pro deob 18. uidetur prorsus renuere horum usum, dñ fruendis loquitur de medicamentis administrandis vijs in se in febribus, quæ habent vim aperiendi, in- bñb aci- quit, calidiora prorsus administranda, acida da nō es- relinquenda omnia, excepto oxymelite. Si se usur- omnia; itaque neque succus limonum, & panda. omnia proposita erunt vtilia.*

Videtur huic accedere ratio: quia videntur habere vim adstrictoriam: ergo vias non aperient, sed angustiores reddent.

Quod

Quod adstringant, docet ratio & Gal. lib. 5. loc. aff. c. 15. Si itaque adstringunt acida: Ergo uenas non aperient.

Ex alia tamen parte certum est & ratione, & auctoritate, habere vim attenuandi, incidendi, & abstergendi crassos humores omnes, teste Gal lib 4. de simpl. med. fac. cap. 11. & seq. In his locis aperte scribit, acida constare ex humiditate quadam tenui & aerea, & sequitur esse tenuissimarum partium, propter quas habent vim penetrandi omnes humores. Propterea, inquit, lib. 5. de simpl. med. fac. cap. 25. acida attenuare, incidere, & abstergere crassos omnes humores.

Et reuera, si quid est, quod lapidem in rebus confringat, est succus limonum. Si penetrat solidum corpus, multo magis penetrabit humores. Itaque etiam hic non erit inutilis.

Sed quid dicemus ad Gal. qui lib. 5. loc. aff. scribit, habere vim adstrictoriam. Aduertatis, acida possunt comparari, vel ad humores, qui sunt insensibiles, vel ad partes corporis, quae sunt sensibiles (est mea distinctio.) Sed ad humores insensibiles, habent vim attenuandi, incidendi, penetrandi omnes partes humorum, quia sunt tenuium partium. Si cum sentientibus, ratione sensus tactus dicuntur habere adstrictionem. Ratio: partes sentientes sentiunt mordacitatem, sunt saporis acida, quae est mordax. Ergo partes, qui mordacitatem sentiunt, statim adstringuntur: quae prouenit ex acido, est adstrictio, quae fit ex mordacitate, quae fit non tantum ex materia frigida, sed etiam calida. Sed non sequitur: Illud medicamentum mordax est causa adstrictionis. Ergo est adstringens. Ignis est causa adstrictionis, ut experiantur, qui manum apponunt igni, tamen non adstringit. Itaque si dixit, verum dixit; sed non sequitur, quia haec medicamenta, quae sunt tenuium partium, possunt attenuare, & penetrare.

Ad locum 1. acut. 18. primum dico, eo loco reieciisse usum acidorum absque vlla causa: non protulit causam. si addidisset, commodius possem respondere: Assignat quare praetermittenda calida & austeria; de acidis vero non. Puto existimasse huiusmodi ad differentiam oxymelitis, posse aliqua ratione partes sentientes adstringere: sed nos ad euitandum hoc, non utemur istis acidis austeris.

Itaque quidquid alij sentiant, aestimo acida cum alijs permixta, posse cum utilitate maxima administrari, ubi aperiendae sunt viae, in causa quidem calida.

In febribus vero, quae humorem habent mixtum ex calidis, & frigidis, poteritis accipere etiam syrupum ex acetosa, mixtum cum decoctis temperatis, utpote agrimoniae, pentaphylli, capillorum Veneris, cichorei, &c.

Vbi vero febris ortum ducit ex humoribus pituitosis, & melancholicis, ad efficacissima

A aperientia deueniatis, ut sunt Syrupi calidiores simplices, & compositi, oxymel simplex, compol. Syrupi de hyssopo, mentha, de pomis, de fumo terrae compositi, trochisci de rhab. eupat. ablynth.

Sed aduertatis circa horum usum. Auic. in hoc cap. 7. improbasse usum trochiscorum, nisi adlit humorum concoctio, atque conueniens euacuatio. Nomine concoctionis non intelligatis perfectam, nam administrari haec solent in febribus tertianis, quartanis, quamquam non adsit concoctio. satis est, ut non utamini in principio, sed post euacuatam humorum multitudinem, & praecipue, quae in primis uis continetur, ubi sunt maxime congrua proposita ut decoctum ex china, confectiones magnae, rotulae ex diacalamentho, elect. ex chalyb. Ibis omnibus adde decoctum ex radicibus, ex herbis, & seminibus aperientibus, ut api, petrocelini, foeniculi, asparagori, rutici, thymo, origano, tragorigano. Sic igitur sunt praeparandae viae. lib. 1. meth. c. 9. & 10. Syrupis tam calidis, quam frigidis, & temperatis, cautione hac, ut euacuetur prius prima uia.

Sed iterum aduertatis, ad superandas obstructions in ambitu totius corporis non usurpanda calida, nisi euacuatum sit corpus. Sed si humores crassi sunt in uentre, & primis uis, eas praeparetis oxymelite simplici, composito, icyllitico, absque diluto, absque purgante. Itaque haec est prima praeparatio, quarum scilicet aperiatio.

C Alia est, quae respicit Humores peccantes, qui ut facile excernantur, debent habere mediocritatem subitaneam. Propterea si in uis communibus sint lenti, oportet illos attenuare, incidere, abstergere, 3. aph. 9. lib. 2. quos & quando purgare oportet: & lib. de hum. nat. cap. 2. Agendum, ut humores crassi, uiscidi, lenti incidantur, attenuentur. Modum intellexistis.

Sed dubium est, num sicut praeparantur lenti, crassi, & uiscidi humores, ita etiam sit necessarium humores tenues incrassare, ut possint facilius euacuari.

D Ex una parte est auctoritas Gal. & Auic. in cit. cap. 7. Hanc sententiam habet Gal. lib. de const. art. med. c. 19. Persuadet hoc ipsum ratio. nam humores eo facilius educuntur, quo melius fuerint concocti: sed concoctio procedit incrassando. lib. 4. meteor. 4. acut. 4. 2. prog. 33.

Hec praeparatio tenuis humoris est species coctionis: debent procedere incrassando.

Alia ratio: humores comparantur corporibus lenibus. Addit Auic. aliam rationem: tenues imbibuntur in corpus, itaque incrassandi tenues humores.

Ex alia parte lib. quos & quando purgare oportet, hos humores quamprimum etiam euacuandos ait. & com. 2. lib. de hum. Audiat determinacionem.

Nunc hu-
mores re-
sines pos-
sunt in-
crassari.

In hac duo quæri possunt, primò, an humores possint incrassari. Secundò, an debeant incrassari arte.

Quo ad primum, quando quærimus, num possint incrassari? dico per tenues humores intelligi posse aqueos, ichorosos, & quæ sunt naturæ aqueæ.

Si de his erit sermo, dico numquam posse incrassari. Nam teste Aristot. lib. 4. Meteor. aqua & aquæ species numquam incrassantur, propterea in hydrope nec empiricus vltus vitur incrassantibus.

Si sermo sit de tenuibus humoribus, qui non sunt naturæ aqueæ, vt bilis omnis generis, dico hos posse incrassari. Igitur primum caput est resolutum.

Quæritur secundò, an arte debeant incrassari? Vbi opus distinctione; Qui debent incrassari, vel mouentur, vel quiescunt.

Si mouentur, mouentur vel ad loca expulsiõis, vel ad nobilia præcipua.

Si ad loca expulsiõis, aut mouentur in maxima copia, ita vt vires deiciantur; aut mouentur tantum moderatè.

Si in maxima copia, dico conuenire omnia incrassantia.

Dico omnia incrassantia, quia incrassantia sunt varia; Quædam incrassant, quia frigida, substantiæ lentæ, opiata.

Conueniunt omnia: gummi Arabicum, cutis animalium amylium, tragacantha, tym- pus de iuibis, pilulæ de cynaglossa, philonium, theriac.

Si moderatè, conueniunt quidem quædam incrassantia, non omnia; sed tñ, quæ habent vim refrigerandi, quæ dicuntur incrassare per accidens, non glutinosa, non opiata.

Sed si moueantur humores ad partem principem, dico statim potius agendum purgantibus, quam incrassantibus.

Hi humores vocantur turgidi, qui quantum euocandi.

Si tamen post purgationem supersit aliquis humor, facta purgatione poteritis vti incrassantibus, vt in fluxionibus ad caput syrupo de iuibis, de papauere, &c.

Sed si quiescat humor, in tali casu opus est incrassantibus, secundum artem. quia huiusmodi medicamenta, vbi humor quiescit, augent obstructiones, & vias obstruunt, exitum reddunt difficilem: igitur non administranda.

Si fluat humor ad thoracem, quia fluit ad partem nobilissimam, conueniunt adstringentia, & corrigentia.

Coccolio.

In tractandis febribus putridis nihil videtur in ore Medicorum frequentius, quam ipsa humorum Concoctio: quid tamen illa sit, aut quibus perficiatur (vt liberè dicam) paucos video intelligere. itaque in præsentia accuratè de concoctione agendum.

Concoctio & vniuersaliter, & particulariter potest considerari.

A Vniuersaliter amplectitur omnem concoctionem, tam naturalem, quam arte factam, tam propriam, quam metaphoricam.

Naturalem voco illa, quæ fit, vel in seminibus, floribus, fructibus plantarum, vel in animalibus, alimentis, excrementis.

Artificialem, quæ in obsonijs, elixatis, vel assatis.

Voco propriam secundum Aristotelem illam, quæ fit in seminibus, floribus, & fructibus.

Metaphoricam, quæ in humoribus semiputridis, vel ex toto putridis. Coctio igitur has omnes differentias sub se comprehendit.

B Hæc sic vniuersaliter accepta, est perfectio patiuarum qualitatum mixta calore. Dixi etiam perfectionem, imitatus Arist. lib. 4. meth. Et cum ratione Aristoteles dixit coctionem esse perfectionem. quia mixtum, etiamsi, vt mixtum, videatur habere propriam perfectionem, nihilominus non est ita absolute perfectum, vt perfectius reddi non possit. Explico, & ideo omnis perfectio, quæ ex concoctione contrahitur, est duplex: alia ad meliorem substantiæ conditionem, alia ad interiorem formam, & præstantiorem.

Do exemplum utriusque: Pomum, vel pyrum immaturum est mixtum perfectum, nõ est tamen ita perfectum, ut non possit requirere meliorem substantiæ conditionem: potest mutare colorem, non tamen mutat formam.

C Ex alia parte semen a propria natura est perfectum: sed tamen, quia semen diriguntur ad flores, & flores ad fructus: idcirco si coctio fiat in flore, requirit aliam formam meliorem, quæ est forma ipsius fructus.

Hac ratione in animalibus cibus, ac potus acceptus ita concoquitur, ut mutet formam: non tamen putetis ex concoctione, ut concoctus est, cibum & potum mutare speciem: disponit tantum humorem ad suscipiendam ulteriorem formam.

D Est itaque coctio perfectio. quæ perfectio significat mutationem ad præstantiorem formam: hæc mutatio habet pro subiecto qualitates passiuas. Quo modo sunt qualitates passivæ? Est primo humiditas quæ vbi mixtum non est concoctum, tres habet conditiones; aut est nimis abundans, aut nimis crassa, aut non est permixta succo terrestri. Itaque per coctionem superflua humiditas consumitur, crassities attenuatur, & propterea succum acquirit perfectiorem.

Itaque igitur dixit Aristoteles, coctionem esse perfectionem ex oppositis patibilibus. Ex quo uolo nos colligere, quomodo uera sit sententia Aristot. lib. 4. Meteor. quam accipit Galen. 4. acut. 40. omnem coctionem procedere incrassando. Videtur sententia esse falsa; cibus acceptus uidetur crassior chylo; respexit Aristoteles ad proprium coctionis subiectum.

Humi-

Propriū Humidum igitur est Subiectum proprium
subiectū coctionis.
coctionis Causa proxima est Calor, qui est calor naturalis, & præter naturam.

Si sermo sit de coctione naturali, fit etiam à calido naturali: Si de artificiali, a calore extraneo.

Et propterea dum elixantur obsonia. coctio fit à calore aquæ feruentis, non à naturali. Sed si sermo sit de coctione, hanc dicit Aristoteles loc. cit. fieri à calore naturali, & proprio. Per calorem naturalem intelligit calorem mixti, ut mixtum est. Per proprium intelligit mixti, ut tale mixtum est. Exempli gratia, caro habet formam mixti primò, & formam carnis; alia est forma mixti, alia forma carnis. De hac re diximus ubi egimus de Putredine.

Sed propterea fit etiam à calore non naturali. Adiuvat concoctionem calor aeris, medicamentorum, iunctionum, balnei, &c.

Habetis quid sit concoctio vniuersaliter accepta.

Differen Differentiæ sunt maturatio, *maturation*; elixatio, *elixation*; affatio, *affation*.
tia conco
ctionis.

Maturatio duplex est propria, & vera similitudinaria, & metaphorica.

Propria est, quæ fit in seminibus plantarum, floribus, & fructibus.

Similitudinaria, quæ fit in animalibus.

Quæ in animalibus, est multiplex: alia fit in excrementis vtilibus, alia in inutilibus.

In vtilibus fit & in semine, lacte, & excrementis semiputridis, quæ possunt ad benignum reduci. Sic materia, quæ in uasis præparantibus concoctione trahit in semen quæ maturatio.

Pariter ubi semiputrida excrementa reducuntur ad naturalem statum, huiusmodi reductio vocatur Maturatio Metaphorica.

Quod dico de semiputridis, dico etiam de putridis.

Elixatio. Elixationis etiam duæ sunt præcipuæ differentiæ: Artificialis, & Naturalis.

Artificialis est in carnibus, leguminibus, piscibus, quæ elixantur calore aquæ feruentis.

Naturalis est duplex. Alia fit in Alimentis; alia in Excrementis.

In alimentis, prima, quæ fit in ventre. Secunda, quæ in iecore. Tertia, quæ in venis totius corporis.

In Excrementis, quando vel pituita, vel succus crudus ita concoquitur, ut possit etiam alere corpus, & alij humores, ut docuit Gal. lib. 2. de nat. fac. cap. vlt.

Affatio. Affatio fit quidem magis ab arte, quam natura. Arte craticulis, &c. In animalibus non videtur locum habere, quamquam aliquo modo in temperamento calidiore iuuenili, est propriè vltio, non affatio in animalibus.

Cum igitur hæ differentiæ coctionis apud medicos non omnes considerantur, sed tantum elixatio, tam in alimentis, quam excre-

A mentis lib. 3. de nat. fac. c. 7. & 2. acut. 44. de elixatione in excrementis, quæ locum habet in febribus putridis.

Pariter maturatio Metaphorica consideratur à Medicis. Seminum enim, florum, & fructuum maturacionem non considerant.

Itaque quando quarimus concoctionem in febribus putridis, quarimus triplicem coctionem. Vnam, quæ est elixatio in humoribus crassis, quæ possunt elixari. Alteram, quæ consideratur in humoribus semiputridis. Tertiam, quæ in humoribus putrescentibus ex toto, de qua triplici concoctione in præsentia oportet uerba facere. nam qui nō distinguunt, decipiuntur.

B Si igitur sermo fiat primo de concoctione humorum crassorum, lentorumq; hæc est perfectio qualitatum passiuarum à calore naturali, non naturali, & præter naturam.

Per perfectionem intelligo mutationem huius substantiæ crudæ ad meliorem conditionem, cuius ratione sit apta ad nutritionem corporis. de qua Galen. 3. progn. 3. uerba facit, ut, & lib. quos & quādo purgare oportet.

Hæc perfectio est perfectio Passiuarum Qualitatum, quia hi humores habent humiditatem ex superantem impermixtam ipsi sicco. Fuq; hæc concoctio à calore naturali.

Per calorem naturalem intelligo calorem insitum ipsi parti, ad quam pertinet ipsa coctio. Scio Arist. lib. 4. Meteor. intelligere calorem insitum ipsi mixto, & concoquendo: vult coctionem fieri primò, & per se, à calore mixti, & adiuuare extraneum. Sed in præsentia ego suppono concurrere calorem mixti, sed tamen nō est præcipua causa in his humoribus crassis, & lentis, teste Gal. lib. 2. de nat. fac. 4. & 2. in 1. epid. 44. Calor insitus ipsarum solidarum partium est, ad quem pertinet concoctio humorum in partibus.

Fit etiam à calore non naturali. Per hunc intelligo eum, qui excitatur à sex rebus non naturalibus: sic aer non naturalis concurrat ad concoctionem, & calor cibi, & potus. Et propterea lib. de constit. art. med. c. 19. scribit, coctionem fieri à cibo, & potu calefaciente. in quā classē repono omnia assumpta medicamentosa, in quibus possit roborari calor natiuus, rotulas, conseruas, electuaria, &c.

Itaque in huiusmodi casu syrupi sunt eligendi, qui proprii parti, in qua debet fieri coctio. Dabo exemplum: apud Pharmacopolas sunt varij syrupi calefacientes. Exempli gratia, pro cerebro syrupus de storachade: pro thorace syrupus de prassio: pro uentreulo de mentha: liene syr. de pomis: utero syr. de Artemisia. Præter syropos sunt etiam rotula, & electuaria, diatrion pip. theriaca, quæ omnia Gal. laudat.

Quod dico de medicamentis, dico etiam de alijs rebus non naturalibus, potissimum de somno, qui perficit inter alia hanc concoctionem, ut etiam quies. Et in hoc sensu intelligenda.

Triplicē hic considerari coctionē.

Coctio humorū crassorū.

telligenda sententia Hipp. 4. acut. 44. ubi loquitur propriè de purgatione humorum crassorum, & frigidorum, & propterea nullam proponit, quæ habet vim hos ettenuandi.

Denique perficitur hæc coctio à calore præter naturam, à calore febrili. §. aphor. 60. Sic igitur fit concoctio in humoribus crudis & crassis, in quo omnes conveniunt.

Coctio semiputridorum humorum. Modò ostendendum, non omnem concoctionem perfici quiete. Transeo igitur ad semiputridos, & putridos.

Semiputridi humores sunt illi, qui habent mutationem in qualitatibus primis, & secundis, non sunt mutati in forma substantiali. nam humores semiputridi redduntur calidiores caliditate extranea. Itaque in istis coctio est perfectio passivarum qualitatium: Sed non à calore est perfectio, quia necessarium est, caliditatem huiusmodi superfluum corrigere. Itaque in semiputrido coquendo opus est multis auxilijs, non unico. nam corrigantur calor extraneus, nimia humiditas, ut colligitur in 6. epid. com. 6. Scribit Hippot. in eo textu, morbos, qui usque ad senectutem concomitantur, solui aut per maturationem, rarefactionem, aut solutionem. Inquit Gal. in com. Maturationis est quedam concoctio, facit æquationem in humoribus. Hoc stante, inquit, si dantur quidam morbi admodum fervidi, & calidi, dicuntur maturari. Maturationis est refrigeratio. Quare maturatur? quia recedit illa caliditas: illa igitur maturationis fit à frigido. Clarius lib. 1. 1. meth. c. 8. & 9. ubi proponit intentiones curandarum febrium. Loquens enim ibi de concoctione humorum semiputridorum, proponit refrigerantia, ventilationem, &c. Igitur semiputridi concoctio fit à Refrigerantibus medicamentis.

Fit etiam siccatione hæc concoctio. nam si hæc maturationis est æquatio humoris, ut emendetur putredo, opus est exsiccantibus. Lib. 3. de comp. med. sec. loc. cap. 1. ait, omnia putrida esse tractanda medicamentis frigidis, & exsiccantibus.

Inter tot Coctionis differentias, quæ partim à Medicis, partim à Philosophis recensentur, duæ tantum, ut dicebam, in putridis febribus considerantur. Una quidem, quæ est elixationis species, sed impropria, & metaphorica. Secunda, quæ est mutationis species, ipsa quoque metaphorica.

Prima consideratur in febribus, quæ ortu ducunt ex crassis, lentis, frigidisq; humoribus in quibus desideratur concoctio ad nutritionem.

Sed advertite, non omnes humores crudos, & pituitosos in putridis concoqui ad nutritionem, sed illos, qui semiputridi, vel adhuc nullam contraxerunt putredinem. Propterea possunt appellari materia Antecedens potius, quam Coniuncta. Hanc dixi fieri in parte, ubi continetur pituita cruda, à somno, &c. & requirere potius quietem.

A Quantum ad maturationem, dixi requiri, partim in humoribus semiputridis, & ex toto putridis.

In semiputridis est reductio quedam illius humoris, qui recessit à naturali, ad priorem; & quia ille fit calidior, humidior, quiescit, amittit proprium calorem. tunc huiusmodi coctio est nil aliud, quam refrigeratio, exsiccatio, motus, & corroboratio calidi innati. Hanc veritatem dixi esse proditam lib. 1. 1. meth. c. 4. 8. 9. 10. & alijs. Itaque cum in hac operatione quatuor operationes administrent, refrigeratio, exsiccatio, motus, & corroboratio calidi innati: de singulis agendum est. Quod ad primum pertinet, refrigeratio, seu ventilatio fit per se, & ex accidenti. Per se, ratione medicamentorum refrigerantium; Ex accidenti ratione medicamentorum deobstruentium, aut relaxantium cutem.

Refrigeratio, seu ventilatio per se.

In huiusmodi coctione, ut semiputrescens humor ad priorem statum reducat, uterque modus refrigerationis convenit: immò in priori statu sola refrigeratio curat. Lib. 1. 1. meth. c. 9. Gal. loquitur de hac putredine, & inquit, in virtute valida potionem frigidam satis esse ad expugnandam humorum semiputredinem; quia virtute valida corrigitur non tantum calor extraneus, sed etiam sequitur statim euacuatio humoris putridi, & abundantis, cui statim succedit exsiccatio, & diminutio multitudinis.

C Ceterum, ubi vires non usque adeo sunt robustæ, modus hic non probatur, neque et à Gal. loc. cit. Igitur pro corrigenda semiputredine oportet uti omnibus istis ingenijs, de quibus primò dixi.

In huiusmodi igitur casu eligenda remedia refrigerantia, & siccantia simul, quæ multa sunt, liquores succi, herbe, terræ, partes animalium, gemmæ, quæ ex mari lumuntur, & multa alia, quæ prædita facultate refrigerandi, & exsiccandi.

Inter liquores præcipuus est acetum. Propterea syrupus acetosus in huiusmodi casibus mirisidè commendatur; ut & succi limonium, arantiorum acetosorum (non dulcium, quæ sunt humida) citri, agrestis, & syrupi confecti ex his succis, ribes, berberorum, granatorum.

D Herbe frigide, & sicce, quæ conveniunt, sunt plantago, splanum, cichorium, intybus, ecetose, pentaphyllum, capillus Veneris, polytrichon, callitrichon, fumaria, &c. ex quibus possunt fieri decocta.

Ex terris sunt Samia, sigillata Silesia, &c. Istæ omnes terræ, lotæ potissimum, maxime valent.

Neque valet obiectio eorum, qui existimant, habere has aliquam vim obstruendi, & propterea esse noxias. Istæ terræ ppositæ non habent vim obstruendi, habent quidè vim adstringendi motum humorum. Aliud autem est adstringere, aliud obstruere. Adstringunt

gunt, dum absumunt superfluum humiditatem: quamquam terrea sint substantia, tamen sunt elementi aerei, teste Gal. lib. 3. de simpl. med. fac. c. de. Samia: non tamen consulo, ut administrantur, ubi ad sunt humores admodum crassi, lenti & visceri, tantum in calidioribus, & tenuioribus.

Itaque in defectu terrarum, eligatis, quæ sunt tenuioris substantiæ, ut cornu unicornu, cetinum, lapidem bezoar, os de corde cerui, uniones, seu margaritas, fragmenta saphyri, smaragdi, & hyacinti, quæ administrantur in pulueribus, & bolis, simul cum alijs consensu, aut in rotulis, de quibus omnibus proprijs locis. Hæc igitur sunt administranda ad refrigerandum, & exsiccandum.

Motus.

Quantum ad motum, dixit hunc necessarium, secundum Gal. lib. 11. meth. c. 8. & 3. in 3. epid. 1. inquit, eos, qui volunt vestes præteruare à putredine, id facere conuenienti motu. Idem de humoribus cogitandum. Per motum autem intelligit localem, & alterationis.

*Localis.
Alterationis.*

Localis fit euacuantibus, alterationis, attenuantibus, incidentibus, & abstergentibus: hunc utrumque motum esse necessarium pro semiputredine testatur lib. 11. meth. c. 10. ubi proponit indicationes pro putredine facta, & fiende.

Itaque in semimalo humore necessaria huiusmodi motio per dicta medicamenta.

Neque nomine euacuationis oportet intelligere euacuationem factam per venæ sectionem: quia humorum fluxio impedit non tantum à plenitudine, sed etiam à cacochymia. Itaque requirit ut fiat motus non solum per venæ sectionem, sed et per medicamenta aluum subducentia. Neque solus necessarius localis motus per venæ sectionem, & medicamenta interna, verum etiam per medicamenta externa, quæ habent vim calefaciendi cutem, lib. 11. meth. c. 4. ut relaxantia, aperientia, & sic corrigitur semiputredo.

*Calidum
innatum
roborantia.*

Denique corrigitur per ea, quæ roborant calidum innatum, de quibus lib. 11. meth. c. 9. inquit, si humores putrescentes in animalibus essent similes corporibus inanimatis, quæ putrescant, profecto non opus esset; & quæ sequuntur. Itaque patet, semiputredinem corrigi à virtute valida, aliquando sola potione aquæ: aliquando verò, ubi imbecillis, sunt necessaria omnia auxilia dicta.

Hæc verò, quæ calidum innatum roborant, sunt cibus, & potus conueniens paræ acceptus. Copiosus enim auget quidem vires, sed impedit coctionem. His accedat alia omnia, de quibus in præcedenti lectione, præcipue iura alterata: quamquam nonnulli prædicantes ab his abhorreant, nihilominus præstantissimum ius potest esse materia prima, in qua alterentur varia semina, radices: multis intentionibus enim ipsum ius roborat calidum innatum; nam nutrit, adæquat omnes humores, auget calorem natium.

A Venio modo ad putridos, qui ex toto concoquuntur ea concoctione quæ dicitur concoctio, seu maturatio, sed est metaphorica à floribus, seminibus, quæ cōcoctio differt ab elixatione, & maturatione putridorum: nam in elixatione pituita & succus crudus concoquuntur ad nutritionem corporis. Pariter in maturatione coctio fit ad nutritionem, vel aliquam utilitatem. Putridus autem humor neque coquitur ad nutritionem, neque ad utilitatem aliquam, sed ut facilius è corpore euacuari possit. Huiusmodi igitur coctio est victoria naturæ supra causam morificam, cuius veritas patet ex Galen. libro 3. de cris. capit. quinto, & 12. acut. 44.

*Putridorum
concoctio/enu
matura
tio.*

B Ceterum huiusmodi cōcoctio est duplex, Perfecta, & Imperfecta.

Perfecta, quando natura, seu calor innatus prorsus conuincit materiam putrescentem: ita, ut in ea totam illam cōferat gratiam, quam potest conferre, & tollat foetorem. Et propterea, si humor putrescens conuertatur in pus, vel materiam puri similem, ducitur ille humor habere absolutissimam coctionem, quamuis sit putridus.

Perfecta

Si aliqua tantum mutat, calorem non substantiam, aut foetorem, dicitur coctio imperfecta. de quibus differentijs testatur Gal. lib. 1. de diff. reb. c. 6. Primam vocat coctionem factam superante natura; Secundam partim superante natura, partim superata.

Imperfecta.

C Huiusmodi coctio fit ipsa quoque partim à calore, partim à refrigerantibus medicamentis.

A calore; nam omnis coctio videtur fieri à calido innato, 2. in 1. epid. 46. sed tamē, quia inter humores putrescentes est etiam bilis, quæ admodum calida, & ubi putrescit fit calidior, necessaria actio frigidorum medicamentorum. Itaque corrigitur caliditas potius à medicamentis refrigerantibus.

Sed unum pulcherrimum notate hæc coctio quamquam perficiatur à calido innato, & propterea lib. 11. c. 14. dicat, putredinem non tolli per sanguinis missionem, & quæ sequuntur. Ex quibus colligite, uoluisse putredinem humoris corrigi à calido innato: hoc uerissimum: sed hic querimus, num pro celebranda huiusmodi coctione in humoribus putrescentibus sit necessaria purgatio; qua de re infra plura: nunc resolute dico; huiusmodi purgantia esse administranda, quod probo & ratione & auctoritate.

Ratione primò: nam huiusmodi humor putrescens, aut est permixtus sanis humoribus, aut iam separatus. Si separatus, profecto statim necessaria est euacuatio. 4. aph. 22. Nam finis coctionis in humoribus putrescentibus est segregatio boni à malo.

Si dicatis; sunt permixti: in hoc etiam casu conuenit aliqua purgatio humoris putrescentis; non dico totus, sed alicuius partis. Ratio: quia humor permixtus non tan-

I tum

tum corrumpit bonos humores, sed etiam solidam substantiam. Ideo lib. 9. meth. med. cap. 3. & 4. consultit, quamprimum deueniendum ad venæ sectionem. Lib. 10. meth. c. 15. venæ sect. ideo inquit faciendam, ut leuata natura à tanto onere, possit melius cōcoquere: quæ etiam repetit 2. aphor. 29. Et ideo lib. 11. meth. c. 8. in tractandis indicationib⁹ febrium putridarum inquit, id agendum in putridis, & et in alijs inanimatis corporibus. Quid in his agimus? Inquit, quod putridum est, ita im eradicamus, quod reliquum, relemamus à putredine: sed quia huiusmodi euacuatio nō potest in principio integra fieri, satis est ut aliqua ratione tantum imminuatis. Et quibus patet falsam esse eorum sententiam, qui dicunt, coctionem semper debere procedere cum quiete. Est tantum vera de humoribus crudis, & pituitosis, & de semiputridis, quatenus requirunt corroborantia.

*De Curatione, quæ fit per medicamenta Purgantia:
Et quæ circa ea obseruanda.
Cap. XXVII.*

Alterantibus medicamentis. Purgantia vocata succedunt. Purgantium nomine illa intelligo, quæ electiue proprium aliquem humorem ad se ipsa trahunt, ut ex corpore educant. Dantur & medicamenta sigillatim bilem, pituitam, melancholiam ex venis in intestina, & ventriculum attrahentia. Ut propterea horum humorum euacuatio succedat: he his Galen. libro. 3. & 5. de simpl. med. fac.

Plura quidem ea sunt, quædam Simplicia, quædam Composita; sed horum cōmemoratio non pertinet ad præsentem locum, sed ad illos, qui agunt de simplicibus medicamentis, & compositionibus medicamentorum: quando erit sermo de curatione febrium in speciali, proponam in singulis Purgantia, quæ ex usu erunt. Nunc duo tantum considerabimus; quibusnam Purgantia medicamenta conueniant; & quo tempore sint administranda. Primum breuibus expedit: in secundo diutius verlabor.

Purgantia igitur remedia, sicut & purgatio ipsa, illis dumtaxat conueniunt, in quibus ad est aliqua cacochymia species. Dixi, alias duas esse præcipuas Cacochymie species. Alteram, quæ respicit humores putrescentes. Secundam, quæ humores distantes à natura sanguinis, quicumque non sunt putridi, siue bilis, siue pituita. Hæc cacochymia speciem explicauit Gal. lib. 13. meth. med. c. 6. ubi inquit, Plerhoram vocari, ubi sanguis abundat supra ceteros humores. Si abundant supra sanguinem ceteri humores, vel ichores, dicitur cacochymia, non autem plenitudo.

De hac etiā lib. 4. de tu. val. c. 5. Vitiosi succi abundātia cacochymia appellatur. De utraque autem verba facit sect. 12. aph. com. 17.

A Itaque siue adsit Cacochymia ex putredine siue sine putredine, conueniunt Purgantia, ut docuit l. c. 2. aph. comm. 17. In plenitudine sanguinis laudat venæ sectionem, in cacochymia purgationem. quod repetit lib. 13. meth. c. 6. sexcēta sunt loca. Itaq; hoc primū caput iam absolutū est. Conuenire, ubi ad est cacochymia, rōne putredinis, vel rōne succorum, qui abundant supra sanguinis naturam.

Venio ad secundum caput, in quo considerare oportet Tempus administrandi Purgantia hæc medicamenta. Et per tempus intelligo, & vniuersum, & particulare. Per vniuersum, principium, augmentum vel statū, vel declinationē febris; per particulare diem aut horam. Loquar primo de vniuersali.

Quod igitur ad vniuersale pertinet, communis est & Hip. & Gal. & plurimorum sententia, tempus administrandi purgantia esse tempus tantum concoctionis, uel tempus principij, quando materia turgeat, ita, ut liceat in duabus temporum differentijs purgantia vlturpare. Primum est tēpus coctionis, quod est tempus status opportunum; finis ipsius status, ubi est finita concoctio. In turgente materia conuenit non tantum in fine status, sed etiā in principio morbi, ut docet Hip. sect. j. Aph. 23. Cōcocta medicari non cruda, nisi in principijs, nisi turgeat. Hæc sententia explicatur etiam loc. cit. & Aph. 24. eiusdem primæ Sectionis inquit, in acutis raro, & in principijs purgare oportet, & cum præmeditatione hoc Gal. in com. explicat, licere ita, ut omnes ferè Medici post Galenum, & Hippocratem acceperint hanc sententiam. Propterea Hipp. de hac materia turgente. 4. Aphor. 1. inquit, prægnantes medicamentis purgare oportet, si turget humor, quarto mense, & usque ad septimum; minus verò has iuniores autem, & seniores forte veteri oportet. Pariter 4. aph. 10. in acutis eadem die medicari, si expedit: ubi materia turgeat. hæc manifesta.

Sed inquirendum, quod magis est occultum & inquisitione dignum: nam rectè facit ad curationem, num etiam non concocta, & non turgente materia, uti illi censent, sit necessaria purgatio in principio morborum? Quæstio maximi momenti, & quæ habeat varios fautores.

Primus omnium fuit doctissimus Manardus, 3. lib. Epistolarum, epistola 2. qui existimauit, in materia etiam non turgente conuenire: sectatus est hæc sententiam Heronym. Bonipertius, qui de hac te scripsit comment.

Ex alia parte contra pugnat, Gaspar Gabriellus, qui contra Hieron. scripsit, & oppugnat omnia. Agitat etiam hanc quæstionem Vallesius lib. 7. controu. 13. Ipsi omnes habent singuli proprias rationes, & auctoritates, quæ diligenter examinandæ.

Qui censent, materiā purgandā, quamquā non turgeat, & non sit cōcocta, in principijs morborum, habent rationes, & auctoritates, l. Ratio,

Quando administranda sint purgantia.

Quib. cōueniant purgantia

Utrū nō turgente materia in principio liceat purgare.

Argumenta partis affirmantis.

I. Ratio, vbi materia est multa, si non expurgetur aliqua ex parte, suffocat natuum calorem, prohibet coctionem: Ergo aliqua ratione purganda, vt melius fiant coctiones.

Huiusmodi argumentum videtur desumi ex Galeno 2. aphor. com. 29. vbi scribit Hipp. incipientibus morbis, si quid mouendum videtur, moue. Gal. apertissimis verbis in com. scribit, in principijs morborum, qui iam sunt deplorat, subleuandam esse naturam à multitudine humorum, &c. Et propterea lib. 1. 1. meth. med. cap. 1. 5. scribit aperte, mittendum sanguinem, vt natura subleuata à pondere possit humorem concoquere, quamquam ibi loquatur potissimum de euacuatione facta per sanguinis missionem.

Sed, Domini, eadem est ratio, si materia ipsa sit suppressa à cacochymia, quæ suffocet naturam: quæ est ratio, vt sanguis mittendus vbi multus, vt est etiam euacuanda bilis, pituita, si abundant, & suffocent calidum innatum. profecto nulla est ratio.

Itaque, secunda ratio, putridi humores, quatenus putridi, semper corrumpunt propinquos humores, & facultatem venarum: Ergo à principio aliqua ratione purgandi. Auctoritas est Galeni lib. 9. meth. c. 3. & 4. 3. in 3. Epid. 25. & 2. in 3. epid. 46. humores putridi, si in corpore relinquuntur, corrumpunt, & quæ sequuntur. Igitur sequitur consequentia, hos quamprimum aliqua ratione euacuandos.

Sed præterquam, quod sequatur consequentia, potest etiam confirmari alijs locis: Lib. 4. de san. tu. cap. 3. & 2. in 6. epid. tex. 9. id ipsum reperit, putridos humores quamprimum expurgandos, crassos verò &c.

Audiuitis etiam, quæ proximè dicta ex sententia Galeni lib. 1. 1. meth. cap. 4. & 8. Ibi inquit, id ipsum agendum in corporibus animalium, quod in externis. In externis vbi aliqua pars putrida, statim abscindimus, reliquum præseruamus: Itaque & in animalibus sic faciendum.

Itaque valet consequentia: Humores multi adsunt & putridi. Ergo euacuandi.

Hoc autem valere consequens, potestis colligere, ex Gal. com. 10. sect. 9. aphor. Nam etiam si videatur loqui de materia turgente, nihilominus proponit euacuationem debere fieri, ne corrumpat alios, & corpora.

Tertium, & vltimum argumentum est tale; humores etiam non turgent in principijs morborum mouentur ad partes determinatas, in quibus excitant, vel excitare possunt inflammationes. Ergo statim sunt euacuandi. Antecedens est manifestum: qui ortum ducunt, habent materiam fluentem; si fluit, & ad partem præcipuam: ergo statim in principio sunt euacuandi.

Probo consequentiam ratione: Nam si non euacuentur, non potest et reuelli: Sed in om-

ni fluxione conuenit in principio reuulsio.

Probatum etiam locis Galeni. Gal. & Hip. 2. acut. com. 1. vbi loquitur Hip. de curanda pleuritide; scribit, in pleuritide dolore ascendente, statim venæ sectione, descendente verò purgatione vtendum. Sed præterea Gal. ipse li. 13. meth. c. 1. 1. in inflammationibus oculorum scribit, se aliquando vnica die fluxionem curasse: Si vnica die, ergo in principio. Lib. 13. met. c. 5. in fluxionibus omnibus commendat humori euacuationem, & propterea lib. 2. ad Glau. c. 2. non vtitur in Erysipelate sect. venæ ad reuulsionem, sed medicamento tantum purgatorio.

Multa, vt dixi, sunt loca huius generis. Itaque certissimum est ex his tribus argumentis, purgationem in principio instituendam, quamquam materia non sit concocta, nec turgeat.

Ex alia tamen parte sunt rationes, & argumenta in oppositum.

Prima ratio talis est: Euacuatio nunquam conuenit, nisi præcedat separatio prauorum succorum à bonis. Ergo sequitur, purgationem non esse faciendam, nisi tempore coctionis.

Antecedens est Gal. sect. 4. aph. 22. inquit, omnem euacuationem præcedit secretio.

Consequens probatur, nam huiusmodi separatio semper sequitur concoctionem, quod Galeni est consilium & præceptum 4. aphor. 23. Itaque à principio ad vltimum non licet purgare, nisi præcedat separatio, &c.

Secunda ratio: Naturam ars debet imitari: Quod igitur non facit vtiliter natura, id nec ars potest: Sed sic est, quod in principijs morborum natura non vtiliter euacuat: Ergo nec ars ipsa.

Antecedens est manifestum; Nam Medicus est naturæ imitator.

Consequens verò probatur Galeni testimonio, 2. in 1. Epid. 45. & 46. omnes excretiones, quæ fiunt in cruditate, improbas esse scribit ex sententia Hipp. eo loco & com. 37. eiusdem libri, & 4. aphor. 22. Incipientibus morbis nihil excernitur vtiliter: si natura inutiliter in principio excernit, nec in cruditate: ergo nec ars.

Addunt tertiam rationem: Huiusmodi purgantia impediunt coctionem. Ergo non administranda.

Antecedens probatur auctoritate Hipp. 4. acut. com. 4. & Galenus reddit rationem in com. Nam, inquit, distrahere naturam à suo opere.

Adest etiam quarta ratio. Purgantia medicamenta in principijs administrata possunt colliquare partes sanas, noxium verò humorem non attingere: Ergo prætermittenda.

Antecedens si verum sit necessarium, est etiam vera consequentia. Antecedens autem est Hippocrat. aphor. 22. Quicumque, inquit Hipp. in principijs inflammationum videntur purgantibus, nihil adiungunt. Propterea in com. & in lib. quos & quando purgare oportet. Galen.

inquit fieri cum maximo patientium detrimento, & discrimine.

Rationem addunt nonnulli etiam, quamobrem sunt purgationes cum tanto labore, dum natura est intenta coctioni, retinet humorem concoquendum.

Ex alia parte purgans eundem humorem ad se vult trahere cum discrimine.

Addunt etiam, facilius educi sanos humores: Nam natura magis intenta conservare humores improbos. Haec igitur sunt rationes magis precipuae, quae proferuntur hinc inde in utramque partem.

In hac difficultate, Domini, qui tuerentur affirmatiuam partem, conuenire scilicet etiam in non concocta, putant se ipsos metitab argumētis oppositae partis, vnica distinctione adhibita, quando dicunt: Purgationem esse duplicem: eradicatiuam, & minoratiuam.

Si de eradicatiua sermo sit, inquit, eradicatiua, id est, quae prorsus possit totum humorem putridum euacuare, non conuenit.

Si de minoratiua, potest administrari etiam in non turgente, & in non concocta materia, quando ad sunt conditiones propositae.

Veritate sponso. Sed reuera opus est alia responsione ad solvenda argumenta: Et responsio in hoc tantum est posita, & dependet ex cognitione vel rationis turgentis. Video communem esse omnium sententiam, turgentes humores esse se, qui huc atque illuc mouentur per varias partes, nullamque habent determinatam partem, ut similitudo defuncta sit ex animalibus ad coitum incitatis proposita com. 1. quatuor partibus aph. 1. ubi describit conditionem materiae turgentis.

Si accipitur huiusmodi significatio, profecto, vel necessarium est ex horum sententia non purgandum, nisi concocta materia, vel rationes oppositae erunt validae.

Qua materia turgens. Quot modis materia turgens. Sed ego intelligo praeter dicta etiam alia: Primum accipio ego pro axiomate, materiam turgentem debere vocari, quae cogit nos ad importunam excretionem: nec est meum inueniunt. Est Gal. 1. com. 4. aph. Hoc stante fundamento, dico; non tantum illam materiam, quae huc atque illuc vagatur, sed alias sent habere hoc, ut nos accelerent ad importunam, & citam eorum excretionem: quod facit

I. Multitudo humorum, quae habebit rationem turgentis. Sed videatis locum, lib. 1. de cris. cap. 9. ubi apertissimis verbis proponit hanc significationem materiae turgentis, quod scilicet continet humorum multitudinem. Itaque illa materia, est turgida, quae multa est, & multos habet spiritus, & facit morbum acutum.

II. Significatio est humorum calidorum, qui quamquam non sunt multi, debent reponi inter humores turgentes, ut 3. prognost. 23. testatur.

III. Significatio praeter primam, quam omitto, est humorum, qui sunt tenues, & icho-

rosi: de quibus in lib. quos & quando purgare oportet, scribit, humores hos, quam primum expurgandos, & turgidos.

IV. Est humorum, qui impetum habent ad aliquem locum determinatum, ubi materia impetum habet in locum aliquem determinatum, dum non locus hic est princeps, haec materia habet rationem turgentis. Com. 20. 4. par. Aph. proponit hanc significationem, sunt aperuissima verba, &c. Itaque siue periculis pleuritidis, siue anginae sit, profecto materia habet praeceptum ad partem precipuam, debetque dici turgida.

V. Significatio, quae sua prava qualitate potest contumescere humores vicinos, & partes solutas.

Tota ergo ratio, ut dicebam, controuersiae inter eos, qui existimant, licere in principio morborum purgationem instigare, etiam non concocta materia, & eos, qui aliter sentiunt, posita est in vera significatione materiae huiusmodi turgentis. Quia si accipiamus nomen Materie Turgentis pro illa tantum, quae hunc atque illud in corpore vagatur, in qua accipit Gal. 4. aph. 1. & quae vnicam significationem videntur omnes admittere, si, inquam, in hoc sensu accipitur tantum, controuersia admodum est difficilis, ut neque illa, neque haec loca possint dissolui. Propterea dixi recte intelligendam materiam turgentem significationem meam.

Ego existimo, materiam turgentem non esse illam tantum, quae huc atque illuc vagatur, sed quae pugnat insigni copia, nimia tenuitate, nimia caliditate, aut motu ad partes precipuas, aut nimia putredine. Has omnes materias existimo turgidas vocari posse.

Primum quidem ex ratione. Nam 4. aph. 1. Gal. dum explicat, quid sibi velit haec materia turgens, inquit esse illam, quae expurgatio ne accelerat. quod repetit lib. de totius morbo temp. c. 2. Ex quibus verbis facio hanc consequentiam. Non solum materia, quae huc atque illuc vagatur, cogit Medicum ad expurgationem, sed etiam, quae peccat copia, tenuitate, caliditate, &c. Igitur & haec est turgida, & consequenter in principio euacuanda.

Praterea dicebam hoc confirmari Gal. testimonio, qui dum has significationes proponit, de multa materia loquitur lib. 1. de cris. c. 9. De ferui lib. quos & quando purgare oportet, ubi vult vomes, & ichorosos statim expurgandos: De calida 3. prognost. 23. de motu ad partem precipuam 4. aph. com. 10. ubi inquit, materiam turgentem non tantum esse, quae mouetur per vias communes, sed etiam ad partes determinatas. de putrida patet loc. cit. Nam inquit materiam turgentem esse illam, quae vel motum habet ad partes precipuas, vel si non euacuatur, potest febrem augere, vel uirtutem uitare. Quae haec materia? Admodum putrida, & persistens in corpore. Quod docuit etiam in precedente lectione ex Gal. 3. in 3. Epid. 25. Itaque haec omnia habent rationem turgentis, & cogunt Medi-

Medicum ad accelerandam excretionem.

His sic constitutis, statim sequi videtur consequentia; Sunt turgent materia; Ergo in principio euacuanda.

Sed nolo, ut sis contenti hoc argumento, quod est apud aduersarios efficacissimum; volo adhuc alijs argumentis, & auctoritatib⁹ confirmare.

Si de multa sit sermo, puto vos memores esse eorum, quæ dicta sunt de concoctione materiae in putridis. Scribit Gal. lib. 1. meth. c. 10. vnam in putredine facta, aliam in putredine fiēte. Dicit Gal. duas habere curationes; Inquit ibi, ante omnia multitudinem oportere destrui. vide locum. Itaque vltimum in inuentione est primum in executione. Itaque ante omnia opus euacuatione.

Sed aduertas, hanc fieri per venæ sectionē, non medicamenta. Ego quidem concedo in febris, quæ sunt cum Plenitudine, fieri cum venæ sectione; sed cum adest Cacochymia (non enim omnes febres sunt Synochi, in istis præualet Plethora:) Itaque si illa imminuenda, oportet imminuere humorem peccantem, non verò sanguinem. Hæc est doctrina Gal. 1. Aph. 2. Itaque ubi adsit hæc cacochymia ante apertionem obstructio- num purgante est vtendum.

Quantum ad tenuitatem, tenues humores absque præparatione esse purgandos probatur: Tenues ichorosi non concoquuntur Itaque non sunt concoquendi, sed statim expurgandi, teste Gal. lib. quos & quando &c.

Si de calidis, & tenuibus sit sermo, in hac re probanda non ero admodum longus. Nā de his vera sententia Hippocr. Et de his Gal. scribit, quod iudicantur per excretionē, non cōcoctionem 3. prognost. com. 23. Si in hoc præponuntur calidi frigidis, crassi tenuibus, etiam in tenuibus, & calidis non expectanda concoctio. Ideo lib. quos & quando &c. scribit, quod in longis morbis expectanda concoctio.

De humoribus, qui mouentur ad partem determinatam, res ita est clara, vt mirer doctissimos viros, qui hanc sententiam voluerunt expugnare. Tamen confirmatur ratio: Nam si adsit abundantia humorū in principio fluentium ad partes præcipuas, & non reuellatur, quis ignorat augeri inflammationes, vt nō possit amplius corrigi? Sic, ubi principium plenitudinis, aut ægine, quis in principio non statim dat purgantia? Est res manifesta.

Sed Hipp. & Gal. nos pluribus in locis docent, idipsum agendum, 2. acut. 11. vbi in pleuritide, descendente dolore, præcipit purgās, neque meminit venæ sectionis. Sed si adsit sanguinis plenitudo, vtrumque agendum, non ita accipiendum, vt intermittatur venæ sectio. Sed si ascendit, contra venæ sectio; nec etiam ita, vt intermittatur purgatio. Itaque patet ex hoc loco in plenitudine, cum esse vltim purgatione in principio.

A Sed præterea 4. Acut. 19. vbi loquitur Hip. de vario concursu symptomatum ad caput, quæ faciunt varias affectiones, utitur purgatione in principio pro retractione humorū à partibus superioribus. Galen. etiam lib. 19. Meth. c. 11. quod quoq; repetit lib. 14. Meth. cap. 8. in fluxionibus ad oculos statim utitur purgante, & tali, ut scribat, se unica die has sanasse. lib. 6. meth. c. 2. in punctura nervi statim utitur purgatione. lib. 2. de fract. Hipp. et in fracturis capitis statim utitur ueratro albo, & Gal. 2. in 1. Epid. tex. & com. 9. apertissimis scribunt uerbis, statim in principio utendum purgantibus; Vide locum. Idipsum scribit Gal. lib. per sang. miss. c. 8. circa finem, dum inquit, uniuersaliter in omnibus inflammationibus, fluxionibus, ictu uehementi statim retrahēdos esse humores uena secta, uel purgatione. Itaque sententia Galeni & Hippoc. oportet uti euacuatione pro reuellendo impetu materiae fluentis.

Quod pertinet ad putridam pariter probatur, in principio esse expurgandam.

Prima ratio; datur materia putrida, quæ nulla ratione à calore natino conuinci potest: Ergo statim est expurganda.

Quod aut talis materia detur, colligitur ex lib. 1. de diff. feb. c. 6 ubi proponit tres differentias putredinis. Vna in qua natura conuincit materiam putrescentem, & conuertit in pus, uel materiam puri similem. Alia putredo, quæ paritū superat, partim superatur, est illa, in qua materia putrescens non hēt omnes conditiones boni puris. Exempli gr. mutat foetorem, non colorem. Tertia differentia est illius putredinis, quæ prorsus superat, & conuincit ipsam naturā. Quæ si in corpore relinquatur, indices fit deterior, ut loc. cit. probatur. Itaque in tali casu necessaria est purgatio in principio. Et de hoc loquitur Gal. lib. 11. meth. c. 8. cū scribit, materiā putridā statim esse expurgandā, seu putredinem corrigendam. Itaque constat ratione, & auctoritate, materiā omnē turgentem in principio esse expurgandam.

Sed statim uideo præter obiectiones quas adduxi, nouas occurruras & sunt duæ. Prima si uera sit hæc sententia, uidetur statim Hipp. mēdax esse, qui sed. 1. aph. 22. inquit, concocta medicari oportet, &c. in fine addit. Purissima uerò non turgent. Si uera sit nostra suppositio, uidentur plurima turgere.

Præterea ex nostra suppositione uidetur concludi posse, frequēter fieri purgationes debere in morbis acutis; sed contra Hippoc. lib. de morb. acut. 4. inquit, cum præmeditatione esse faciendas.

Alia rō accedit 2. de fract. 23. 4. acut. 11. Nā Hipp. 2. de fract. quāquā paulo ante proposuisset usū ueratri albi, tamē postea limitat. Vide locum, & 2. acut. 11. propter suspicionē augmenti febris veretur uiam horum purgantium. Itaque præter obiectiones propositas sūt itē duæ rationes: nunc aut oēs dissoluemus.

*Tria sunt
fundamēta.*

1

2

3

Vt dissoluantur, tria fundamēta accipiēda. Primum dari multas febres, in quibus ratione materiæ peccantis nullo modo liceat uti purgantibus in principio, sed expectata coctione.

Secundum, dari multos morbos & febres, in quibus, etiamsi cōueniat purgatio in principio ratione materiæ turgentis, attamen propter multa impedimenta hæc administrari non potest.

Tertium, quod omnes difficultates diluere potest, continebit modum administrationis horum medicamentorum purgantium in principio.

Quod igitur ad primum pertinet, cum diximus dari febres, &c. Inter has febres sunt primò illæ, quæ habent materiam totam peccantem infixam in vno loco determinato. Hac ratione soluetur prima illa obiectio, extracta ex Hip. 4. acut. 22. qui videtur in huiusmodi inflammationib⁹ prohibere vsum purgantium, &c. Hoc inquam iacto primo fundamento, corruunt loci illi contra nos. Debent intel'igi de inflammationibus, quæ habent vniuersam materiam infixam vno loco, vbi purgantia in principio non conueniunt, quia materia vsque adeò cruda adhæret, vt non possit euacuari. Propterea lib. 13. meth. cap. 15. vtitur quidem medicamentis purgantibus, sed non in principio, sed magis in statu & declinatione. Nos autem, quando præcipimus purgationem in principio, non respicimus materiam fluentem, sed fluxuram: Itaque consulimus purgantia. Et ratio non concludit. Aliæ etiam febres non requirunt purgantia. In paruis, & vbi pauci humores, siue sint calidi, siue frigidi in principio, non deuenientis ad purgantia: Potestis permittere opus naturæ. Et hac ratione soluiuntur ferè omnia loca, & omnes auctoritates: quando inquit concocta &c. Loquitur Gal. semper de materia, quæ non turgeat: in quo casu debemus hoc naturæ permittere: Sed sic cogat nos aliqua ex causis prædictis, ad purgantia deueniendum, nisi tamen adsint prohibentia; quod est secundum caput.

*Prohibē-
tia pur-
gationē
in princi-
pio.*

Prohibentia sunt multa, sed præcipuè vires; Propterea Hipp 2. in 1. Protrhet. 37. proponit quædam symptomata, quæ potius sūt signa virtutis languidæ. Inquit nigra euomentes & deliros &c. purgare non oportet. Certissima hæc sunt, inquit Galen. in com. & illis non instituendæ purgationes. Et propter ea idem Gal 2. aph. 29. inquit: Si quid videtur mouendum, moue, in casibus non deploratis; sed non tantum inspicere oportet præsentis vires, sed etiam futuras, num purgatio talis sit, vt possit vires conseruare, ne cadant in augmento & statu, in quo calu etiam abstinendum à purgatione.

Cadunt autem vires, si adsunt praua symptomata, si adsunt vigilæ, si etiam ætas sit nimis iuuenilis, tēpus anni nimis feruidum.

A Nam vbi Hippocr. 4. Aphor. 5. ait, in cane & sub cane purgare difficillimum; Galen. in comment. addat; medicamenta calida calido tempore maximam noxam inferre: nam ducunt humores contra opus caliditatis aeris: est motus contrarius.

Præterea non sunt instituenda in admodum gracilibus, qui habent partes ad hypochondria admodum graciles; de quibus loquitur Hipp. 2. aph. 25. vbi inquit, qui debent expurgari, debent esse bene corporati.

Præterea habenda ratio ventriculi, sani, vel laborantis, præcipuè oris illius: Si enim ex medicamento acri in lipothymiam incidat facilè, abstinendum.

B Denique prætermittenda sunt in illis, in quibus purgationes etiam leuissimæ mouēt aluum in maxima copia: nam vires deiciuntur: & quod superest, non possunt à calore concoqui.

Sunt etiam alia, quæ impediunt purgationes, vt viæ ipsæ obstructæ. Supponimus in venis esse humores multos motos huc atque illuc, sed iecur impeditum; non potest fieri expurgatio, nisi per venas iecoris, 1. aph. 24. ubi non facienda purgantia. Propterea Gal. quod etiam repetit in lib. quos, & quando, &c. & vbi Hip. 2. aph. 9. inquit, atrabiliarios plenius inferiores, &c. addit Galen. in com. multo minus est facienda purgatio, si viæ iecoris sint occlusæ propter inflammationem. Propterea lib. 13. meth. c. 11. in iecore nos non idem efficere posse ait, quod in oculis inflammatis.

C Docui hætenus, turgentem materiam non esse illam tantum, quæ huc, atque illuc mouetur, neque locum habet determinatum, uerum etiam illam, quæ uel propter sui multitudinem, tenuitatem, atque caliditatem, aut motum ad partem determinatam principem, aut insignem putredinem corpori noxam inferre potest; quæ explicata etiam ab Auic. fen. 4. lib. 1. tr. 2. cap. 7. Dum enim Auic. sentit, concoquendam esse materiam, neque purgandam, nisi turgeat, & dum explicat conditiones turgentis, has omnes proponit. Itaque Conclusio sit, in his omnibus casibus, purgationes in principio esse instituendas.

D Vt verò soluerentur rationes & loca in oppositum, proposui duo fundamenta, quæ explicauimus. I. Dari multas febres, in quibus nullo pacto conueniunt purgantia in principio, sed expectata concoctione. Quæ sunt illæ, quæ ortum ducunt ex inflammationib⁹ iam factis, in quibus nihil amplius influit: aut sunt febres parue, quæ habent materiam paucam. in his casibus non conuenit purgatio ex natura propriæ febris.

Secundò, in illis etiam febribus, quibus reperiuntur quidem conditiones turgentis materiæ, adsunt tamen multa prohibentia, nempe virtus uitalis debilis, aut in presenti, aut.

aut futuro, ætas, anni tempus feruidum, habitus corporis gracilis, os ventriculi imbecillum, consuetudo patientis ad copiosam euacuationem, viarum impedimentum. Hæc omnia impediunt purgationes in principiis, quamquam materia turgida sit.

Ex his duobus fundamentis soluuntur plures rationes, & auctoritates in oppositum adductæ. Primum quidem, quando dicebat Hipp. 1. Aphor. 22. raro materiam turgere, dicebatur Hipp. voluisse materiam raro turgere, ex hac mea opinione plurimum iurgere. Solutio ex dictis, cum plurimæ febres, quibus materia non turget, concedimus materiam non frequenter curare.

Ex febris, aliæ longæ, aliæ breues.

Ex longis nulla fere est, quæ habeat materiam turgentem: quia hæc habent incrementum longum, & consequenter in principio materia est frigida, crassa, lenta, immobilis, nulla præ se fert signa turgentia. Propterea in his non conuenit purgatio.

Ex febris breuib, aliæ sunt acutæ, aliæ minimè acutæ, & plures breuis temporis absque periculo, quàm lethales, in quibus neque conuenit in principio purgatio, neque materia turget.

Sed præterea in illis, quæ sunt acutæ cum periculo, plerumque non turgent.

Supponatis febrem ex inflammatione. si materia in ista inflammatione tota est fluxa, non ampliùs turget: ideo etiam videtis, quæ raro materia turgat. Rectè igitur Hipp. dixit, raro autem turget.

Patet etiam ex dictis, cur Hipp. 1. aphor. 22. dixerit, in acutis raro, & in principiis. Dixit raro propter causas propositas; quia in acutis ex inflammatione nunquam conueniunt Purgantia, propter materiam iam fluxam: præterquam, quod non præter rationem interpretantur, ut id raro explicemus, non de morbis sed de medicamentis, id est, non esse multoties reiteranda medicamenta purgantia in acutis, quasi voluerit semel tantum, in principio turgente materia esse purgandum. Conuenit hæc interpretatio, quia consueuerunt antiqui plura medicamenta in morbo acuto repetere.

Patet etiam ex dictis, quamobrem dixit cum præmeditatione. nam si omnia proposita nobis sint obseruanda, vires, ætas, habitus, sexus, tempus anni; profectò maxima cum præmeditatione sunt adhibenda hæc purgantia: Itaque iure dixit, cum præmeditatione.

Venio ad solutionem aliarum obiectionum. Et primò, quando dicunt isti, non conuenire purgationem in principio quod necessaria sit secretio humoris putridi à sano, quæ non fit, nisi priùs præcedat concoctio. 4. aph. 22. Soluitur eo, quod huiusmodi materia, quam dicimus medicamento expurgandam, iam est separata; quod isti volunt faciendum esse per coctionem, nos supponimus

A factam esse absque coctione.

Quod sit separata, patet: quia supponimus huiusmodi materiam, vel esse multam, vel in motu ad varias corporis partes, vel determinatam.

Si multa, non est mixta alijs: quo casu licet uti purgatione.

Quod sic patet. quia, ubi sit maior copia succorum prauorum, quàm benignorum, tum cacoehymia, præualet ipsi plenitudinis, & eo minùs imminet hoc periculum. quia medicamenta habent vim attrahendi potius prauos humores, quàm vitales. Videatis lib. quos & quando purgare, liceat in principio. Neque hoc tam fit ex facultate medicamenti, quàm ex facultate propria naturali, quæ est intenta ad conservandum robur corporis, & propterea vitales humores fortius retinet, cui etiam accedit medicamentum.

Si pauci fuerint; illi pauci permixti bonis faciunt periculum. Sed dixi illos paucos non esse purgandos in principio. Itaque corrui secundum argumentum.

Quando dicunt, huiusmodi purgantia impedire coctionem, ex 4. acut. 44. Dico profectò, non purgandos illos humores, qui possunt concoqui; sed conditiones, quæ à nobis sunt propositæ, sunt humoris, qui non possit concoqui. perinde se habet concoctio, humorum putridorum in locis determinatis, sicut cibus in ventriculo; si plus ingeritur, suffocat calorem naturalem. Idipsum contingit, si in ventriculo moueatur propter flatum & multam aquositate, si non residerat in fundo ventriculi.

Idipsum quoque contingit, quando cibus fuerit potius medicamentoſus & veneficus. In his casibus etiam natura humores non potest concoquere; quia multi, quia mouentur huc atque illuc, ita putridi, ut superent naturam; in quibus casibus licet uti purgantibus. Si humor quiescat paucus, remitto opus naturæ.

Ad aliam Naturæ utiliter in principio non euacuat: Ergo neque ars.

Antecedens huius argumenti apud me est falsum.

Sed probant auctoritate Gal. qui 4 aphor. 22. scribit, euacuationes in principiis morborum semper improbas esse, & calas, & symptomata. Pro solutione ego plura profero in tertio meo Libro de Phoenigmis, quæ puto hac in parte vobis utilitatem & delectationem afferre posse; nihilominus etiam hic breuiter respondebo.

Cum igitur dicunt isti: excretiones omnes in principio morborum esse symptomatice; notandum est, nomen excretionis symptomatice, vel (ut melius) nomen excretionis dupliciter intelligi. Alia, quæ est uerè, & propriè opus naturæ; alia, quæ symptomatice dicitur.

Excretio, quæ est opus naturæ, est illa quæ fit in

Excretio duplex.

Solutio
obiectionum.

fit in tempore coctionis eorum humorum, qui morbum constituunt, in tanta quantitate, quantum sufficit ad tollendum morbum. de qua lib. de sympt. differ. cap. ult.

Symptomatica iterum duplex. Vna huic operi prorsus opposita, quæ propriè Symptomatica dicitur, in qua scilicet excernuntur, qualia non oportet, & plura quàm oportet, & absque virium & patientis tolerantia.

Impropria excretio symptomatica est illa, in qua excernuntur quidem, qualia oportet, & illa, quæ morbum efficiunt, & possunt superare, sed tamen, quia excernuntur, vel in tempore cruditis, vel in minori, aut maiori copia, vocantur excretiones Symptomaticæ, quamvis non sint propriè symptomaticæ.

Hoc stante fundamento, quando dicunt omnes excretiones in principio esse symptomaticas, propriè, & verè; nego hoc fundamentum. nō enim semper hoc est verum: potest quidem appellari excretio symptomatica ratione morbi, sed quod necessaria, falsissimū. Experientia testatur in principio biliosarum plerumque febrium bilem excerni, quis negat non esse bilem talem. qualis conuenit?

Sed faciatis hanc conclusionem, si à natura potest esse utilis: Ergo etiam ab arte. com. 1. 2. aph. com. 2. 4. aph. est pulcherrimus commentarius, requirit tolerantiam virium, & non querit tempus. non concoctionem, &c. Quando autem coningat, huiusmodi conditionem esse talem, qualē oportet, est improba, & propterea reprimenda. Patet itaque solutio. Sed qui voluerit plura, videat, vt dixi 3. meum librum de Phoenigmis.

Quantū ad aliam rationem, quæ desumitur ex Hipp. 4. aph. 2. in principiis inflammationum, si quis vtatur purgante, nihil adimit, sed augeat malum, &c. iam responsum est ad hanc: vbi materia tota est fluxa, non est opus purgatione: si adsit noua fluxio, conuenit.

Propterea ibi nomine principij intelligit totum illud tempus, quod continet integrā & perfectam fluxionem humoris ad locum inflammatum, vt testatur Galen. lib. de tot. morb. temp. cap. 3. Itaque supponit integrā fluxionem, prohibet purgationem. Sed si intelligatis tertium, quartum diem, conuenit purgatio.

Denique, quando dicebamus purgantia fugienda, quia calida; huic multis modis satisfacere possumus. Primum cum Galen. lib. quos & quando purgare, &c. & com. aphor. 24. sect. 1. Plus utilitatis asserre purgationē, quā medicamenta noxæ. Et ratio hoc etiam persuadet. Nam calor febrilis augetur ex putredine & humoris qualitate. Itaque purgato humore putrido, calor extinguitur. Sed alia est etiam solutio. Poteritis eligere purgantia mitiora. 4. acut. & lib. quos & quando &c. Nos vtumur rhabarbaro, & alijs mitioribus.

Propterea poterimus frigidis corrigere, cum cassia, syrupo viol. portione senæ: & vt

A vno verbo dicam, quando talis fuerit febris, vt purgantia videatur prohibere, deueniendum est ad magnam dosim medicamenti lenientis, & euacuantis, quæ sententia est Hip. 4. acut. 29. loc. cit. Fortè respiciens ad hanc caliditatem febrilem proponit usum lactis asinæ ad xij. vel xvj. heminas, sunt 10. uel 12. vel 13. lib. lactis. Ego nolo, ut uos accipiat is hoc, sed serum, si non ad x. uel xij. libras, ad v. ad vj. iij. iij. addito syrupo rosato solutio, aut cassia, fiet ita euacuatio, & tamen corpus non calefiet.

De purgantibus medicamentis in febribus putridis administrandis, hætenus quæsitum, nunquid conueniant in principio, & quam ratione conueniant? Nunc restat ut inquiramus, nunquid in augmento, & statu utiliter administrari possint? Dubia & controuersia reest, propterea accuratè tractanda.

Quod in augmento non conueniant, probari potest ratione, & auctoritate.

Ratione primum: quia medicamenta purgantia coctionem impediunt; At in augmento coctio ipsa celebratur; Itaque abstinendum ab his in augmento.

Purgantia coctionem prohibere intellexistis ex Hip. 4. acut. 44. Si medicamenta purgantia adhibebis, urina non maturabitur. Et in com. quod in augmento coctio celebratur. lib. 1. de cris. c. 17.

Itaque ne impediatur natura à coctione, prohibenda in augmento magis, quàm in principio: In principio enim natura nōdum adhuc aggreditur concoctionem: & uirtutum magis robusta.

Secunda ratio, purgationes in augmento distrahunt naturam à futura crisi, aut præueniunt crisin, aut illam accelerant, aut saltem prohibent.

Acceleratur quando purgans non est ita nolidum, ut totam peccatē materiam possit expurgare, cū tamen multa sit in corpore: tunc enim agitur materia, & natura cogitur, quasi exstimulata ante tempus onus deponere.

Aliquando impedit futuram crisin, quando uniuersam materiam, uel magnam partem euacuat, ut reliquum concoquatur: Galenus autem utrumque detestatur libro 3. de crisisibus.

Tertia ratio. natura utiliter in augmento non euacuat: Ergo nec ars.

Antecedens probatur ex Galeni testimonio, qui pluribus locis, præcipuè, ubi Hipp. 4. aphor. 29. scribit, rigores in sexto iudicium habere difficile, addit in comm. rigorem in sexto: eo, quod rigori superuenit excretio; excretionem autem siue hant in die non iudicatorio, siue dum non perfectè cocta, non possunt esse utiles. Itaque neque natura, nec ars utiliter euacuabunt.

Probatum hoc ipsum testimonio Hipp. & Gal. Scribit Hipp. 2. aphor. 29. incipientibus mor-

Numli-
ceat pur-
garia ad
ministra-
re in aug-
mento, et
statu.
Quod nō
i augmē-
to argu-
menta.

1

2

3

morbis si quid videtur mouendum, moue, vigentibus vero morbis quiescendum. Itaque scribit etiam Gal. in com. purgationes instituendas tantum in principiis morborum, quod tempore vires sint validæ.

In eundem sensum scribit Gal. 2. in 1. prorethet. 3. in si. Alius comm. in acutis conuenire purgantia tantum in principio.

Et profecto, si respiciamus etiam ad omnes illas auctoritates Hipp. in quibus explicat conditiones de medicamento purgante rectè ad administrando, intelligit perfecte coctæ, vt ideo etiam Galen. lib. quos & quando coctæ purgandi humores, vbi concocti fuerint. In augmento autem coctio est in fieri; Itaque non conuenit purgatio.

His tamen non obstantibus, vt resoluendi eam meam sententiam, conuenire puto in augmento purgantia. Ad hoc probandum stat rationibus, & autoritatibus: postea dissoluitur rationes inoppositum.

Rationes
in opposi-
tum.

I. Ratio.

Prima ratio. in augmento materia perinde est turgida, sicut in principio; Ergo conuenit expurgatio.

Consequentia manifesta. Nam eadem ratio, quæ etiam militat in principio.

Antecedens, quod in augmento turgeat materia, probatur triplici augmento. I. Est turgida. Acuti morbi magna ex parte incipiunt suam acutiem insignem circa tempus augmenti: Ergo tunc temporis est materia etiam turgida.

Quod in
augmento
quoque
turgeat
materia.

I. Ratio.

Consequentia est clarissima. nam acuti morbi sunt illi, qui habent materiamurgentem. Itaque si acutus morbus incipit tempore augmenti, sequitur materiam appellari posse turgidam.

Quod circa tempus augmenti materia possit esse turgida, testatur Gal. comm. 2. 1. 2. section. aph. Propterea pluribus incipit febris magna etiam in quarta, de febris pleuriticozum, phreniticorum, & tunc materia incipit esse turgida, vbi conuenit expurgatio: hoc igitur argumentum apud me est fortissimum.

2

II. Ratio; In principio materia existente turgida, plerumque non fit expurgatio, vel quia non potest fieri, vel quia Medicus non est vocatus, tunc debet fieri in augmento: Antecedens manifestè patet ex testimonio Galeni, qui 1. aph. 34. & lib. quos & quando &c. scribit, in huiusmodi materia urgente vias esse impeditas, & antequam expurgantur, &c. Huiusmodi usus medicamenti administratus, quousque viæ aperiantur, quod vnicuique potione non potest fieri, quibus apertis purgans præbendum: in hoc casu non potest fieri in principio, transijt enim principium iam.

3

III. Est vltima ratio. In febris ex inflammatione tempore augmenti, si corpus sit plenum, materia necessariò suscipit qualitatem materię turgentis; Ergo tunc tem-

A poris necessariò est expurganda.

Consequentia est clara. Probo Antecedens, primum oportet declarare, quidnam faciat inflammationes tempore augmenti. Declarauit Gal. hoc lib. de tot. morb. temporib. cap. 3. vbi inquit, esse illud, in quo materia collecta incipit putrescere, vbi putrescit humor, generantur vapores, & spiritus calidi.

His stantibus, si corpus sit repletum, quis ignorat, necessariò moueri humores omnes in corpore: quod etiam docuit lib. 2. methu. med. c. 6. & lib. 2. de febris. c. vlt. Itaque in augmento inflammationis putrescente materia excitatur dolor & calor: Ergo excitatur noua fluxio. Hinc fit, vt in augmento plura & magna sint symptomata, quam in principio: quamquam in principio tota materia iam fluxerit. Augmentum qualitate & numero; qualitate, pathognomonica; numero, quia superueniunt noua symptomata, de quibus aperitissimis verbis lib. 1. de crit. c. 3. tempus inquit augmenti est illud, in quo symptomata pathognomonica cadunt maxima, &c. quæ sequuntur.

Patet itaque argumentum primum esse probatum, turgidam esse materiam etiam in augmento.

Secundum argumentum, quod liceat vt purgante in augmento tale est. In augmento humores sunt concocti, quod docuit Gal. in lib. de tot. morb. temp. c. 3. inquit in febris, quæ non ortum ducunt ex inflammatione, &c.

C

Video dicturum, aduertat in tempore augmenti fit coctio, sed non est facta, non est perfecta coctio, quæ requiritur. Dico pro expurgatione facienda sufficere interdum hanc mediam coctionem.

Triplex autem est media coctio, in quibus conuenit purgatio. Prima ratione loci: Secunda quantitatibus. Tertia substantiæ.

Ratione loci, quando humor in vna parte reperitur concoctus, in alia autem crudus. Quæ hæc est species? Galen. 2. in 1. Epid. 84. scribit patientes illas relatas ab Hipp. (Fuit autem ancilla quædam pictoris Cymini, & Crastionacta quædam) periisse, eum habuerint parotidas concoctas, in venis fuisse materiam crudam, & proponit hanc rem pro exemplo memorabi. Inquit, in istis mulieribus &c. propterea interire.

Sed ratione substantiæ est illa, in qua humor ex parte concoctus, ex parte verò crudus non potuit à natura ex toto superari, sed tamen aliqua ex parte emendata humoris malitia. Exempli gratia, humor putridus est magis calidus, æterius, acris, &c. Vbi verò concoquitur, debet prius mutari in oppositas qualitates: quando superatur ex aliqua parte, tunc temporis dicitur media coctio, de qua loquitur lib. 1. de differ. febr. c. 6. vbi proponit humorem, qui partim superat calorem, partim superatur, vbi fit huiusmodi media coctio. In hac conuenire purgationem, æminem

Secundū
argumē-
tū, quod
liceat in
augmento
purgare.

minem puto in dubium reuocare : nam humor ita concoctus recipit totum illud bonum, quod potuit recipere. Cum natura non potuit ulterius p̄gredi, necessaria purgatio.

Tertio ratione quantitatis: quia in corpore tali multi sunt humores putridi; aliqua pars concoquitur, aliqua est inconcocta, aliqua etiam prorsus concocta. Quod etiam obseruatur in coctione naturali: neque enim calor natiuus potest omnes humores simul concoquere. Coctio enim fit in humoribus à partibus solidis: Si est multus, non potest.

Hoc stante, dico huiusmodi mediam coctionem ratione quātitatis requirere purgationem etiam in augmento, quia humor iam concoctus debet & potest medicamento purgante educi.

Quod possit, probatur ratione: Nam natura nihil patitur apud se coctum morari, lib. 3. de caus. sympt. cap. 2. quāquam ibi loquatur de concoctione naturali, sed facimus nos argumentum à Simili: Si natura non potest sustinere alimentum, quod est concoctum, multo minus poterit id, quod est noxium, &c.

Sed praterea probo idipsum fieri à natura: Ergo etiam ab arte.

Quod à natura, patet experimento: In tertiana, siue simplici, siue duplici, quis non obseruauit in fine accessionum materiam utiliter euacuari per aluum, sudorem, vrinas? Si hīc fit utiliter, cur nō in alijs febribus, in quibus non sunt excretiones, debent concoqui & expurgari?

Confirmatur: quia 2. aphor. 23. & lib. 3. de cris. c. 7. proponit crisin mediam & imperfectam, & perfectam, & absolutam.

Mediam, & imperfectam inquit fieri in media coctione.

Est perfecta, quia si fiat, non tollit statim morbum, sed aliquando fit, vt morbus in melius procedat. Si itaque hoc: Ergo etiam euacuationes eo tempore utiles. Sed ostendo hoc esse factum ab Hippocrate Galen. & Auic. Hippoc. 4. acut. 23. proponit purgantia etiam in vrine crassa & nebulosa, quod non est signum perfectæ coctionis lib. 1. de cris. cap. 17. Gal. etiam lib. 13. meth. cap. 15. in inflammatione iecoris, proponit aluum subducentia, & expurgantia per vrinas, quāquam status inflammationis non aduenerit: Nam in statu deinde proponit fortiora. Clariū in febre Tertianā lib. 1. ad Glauc. utitur medicamentis aluum subducentibus in augmento. Et Auic. c. 7. fen. 2. canon. 4. ubi abundant multi humores & crassi, quos vidit, non posse omnes simul concoqui, inquit in talibus casibus opus esse medicina forti, & debili forti inquit, quæ habeat vim purgandi: debili, quæ non insignem faciat expurgationē, ne agitet illos humores, qui adhuc crudi sūt. Itaque certissimum est, conuenire purgationes etiam in augmento.

Ad rationes in oppositum. Cū dicunt perturbari coctionem: Soluitur. Nolo, vt detis ita validum, vt euacuetis humorem iam concoctum, & non concoctum. Sed sequimini consilium Auic. Sed si materia targeat, conuenit purgatio.

Ad secundum argumentum, quod dicitur: Crisis, vel prohibetur, vel acceleratur. Quantum ad primum, existimo hoc non esse inconueniens, vt beneficio purgantis immuatis materiam, quæ pugnam facit, &c.

Quod dicunt, acceleratur crisis, dico, si certi sumus victuram naturam (in benignis morbis cum viribus valentissimis,) concedo & consulo, vt permittatis opus naturæ: Sed ubi morbi minentur perniciem, neque certi sumus, vtum natura possit sustinere, vsque ad Statum, profectō melius est imminuere materiam peccantem, quā permettere pugnam ancipitem. Itaque consulo purgationem, vt Galenus lib. tertio de Crisibus, capite septimo.

Quantum ad tertiam rationem, quod natura utiliter in augmento non excernante coctionem; soluitur: non excernit utiliter natura in morbis salutaribus, sed in periculosis, vt intellexistis, etiam à natura euacuat in augmento. Itaque sicut in augmento fit crisis, ita licebit etiam purgare.

Ad auctoritatem Hipp. & Galeni eadem est conclusio.

Controuersa res est, quamquam facile, vt arbitror, difficultas omnis tolli possit, numquid scilicet in statu febrium liceat uti purgantibus medicamentis?

Quod non liceat uti, persuadent ratio, & auctoritas.

Ratio, primum: quandoquidem tempore status materia iam est ex toto concocta. in hoc enim differt status ab augmento; sed ubi cocta est materia, natura ipsa expurgatur: Hinc orta illa Hippocr. sententia 1. aph. 20. Quæ iudicantur, & iudicata sunt integrè neque mouere oportet, neque nouare, neque medicamentis, neque alijs irritamentis, sed sinere. Cognouit Hippoc. quod etiam docuit Gal. in comm. & lib. 3. de cris. c. 5. tempore status perfectam adesse coctionem.

Adde, quod purgans medicamentum, si hoc tempore status exhibeatur, uel adiuuabit ea intentione, quam tentauit etiam natura, uel impediet si exhibeamus: si aluus excitata fuerit, periculum, ne nimium excernatur; si alio tendet natura sua excretionē, periculum ne impediat. Videntur itaque suspēcta medicamenta purgantia in statu. Hāc rem uidetur considerasse & Hippoc. & Gal. 2. aph. 29.

His tamen non obstantibus in tribus casibus conueniunt purgantia in Statu: & ex huiusmodi distinctione intelligetis solutionē. Primus casus est, quando febris ortum ducat ex humoribus, uel frigidis, vel paucis,

1 In huiusmodi casu, siue humores sint trigi-
di, siue pauci, quanquam concocti, non ta-
men expurgantur per crisin: I. talis licet uti
purgante: Loquor autem nunc de crisi facta
per excretionem sensibilem, nam possunt in
huiusmodi febribus fieri crises per decubi-
tum, abscessum, paroridis.

2 Alter casus est, ubi natura iam tentauit cri-
sin, sed imperfecta fuerit, & consequenter
morbum non sustulerit: ibi opus est purgan-
te. de quo auxilio loquuntur Hipp. & Gal.
aph. 21. lect. 1. *quò natura vergit, eò ducere oportet,
per conuenientes locos.* Scribit Gal. in comm. ea,
quæ ducere oportet, esse ea, quæ non sunt
probè iudicata. Ut dixerat Hipp. in præcedē-
te aphorismo, inquit Gal. eò ducere oportet,
quò natura vergit.

3 Tertius casus est, quando in statu iam tran-
sacta ex toto fere die decretoria in morbis
acutis & periculosis, cum maximis sympto-
matis, natura tamen adhuc nihil incepit,
opus est naturam auxiliari, & propterea hos
humores educere, quod docet Auicennas
Fen. 2 lib. 1. tract. 2. capit. 7. inquit: *Et si na-
tura non mouerit, moue tu hora tamen motus illius.*
Cognouit aliquando naturam ita infirmam,
ut non possit huiusmodi crisin aggredi. Igi-
tur inquit, *si natura non mouerit, moue tu.* Et sic
soluuntur obiectiones.

Venio modo ad tempus particulare, quod
est dies & hora.

Tempus Quo ad diem, & horam similiter aliter
particu- acquirendum in curâ regulari, aliter in coa-
lare ex- cta.

hubendi In regulari, id est, quando febris dicit indu-
purgan- cias, nihilque sit, quod urgeat, melius est ex-
ua. spectare diem minoris afflictionis, aut inter-
missionis, si aliqua sit; si non, oportet eligere
horam diei frigidioris, in qua minus vexē-
tur patientes, quam alijs horis.

Sed ubi febris admodum veget, & sympto-
mata sint grauissima, & periculum sit inflam-
mationis, eligenda qualibet dies, qualibet
hora. quod colligitur partim ex Gal. partim
Auic. Gal. lib. cur. per lang. mission. c. 12. ubi
increpat Methodicos, qui abstinebant a san-
guinis missione, quibusdam horis nocturnis,
& tamen horis nocturnis clysteres admitte-
bant. Inquit, sunt increpandi. Itaque probat
eos, qui quacunque hora postulante neces-
sitate adhibent medicamenta omnia, quod
& vos potestis facere. In cura itaque coacta
ita agendum est.

Qualitas Quantum ad qualitatem medicamenti,
medica- non differam de qualitate medicamenti ad-
men pur- ministrandi in febribus. Num de his in spe-
gantis. cie proponam omnium materias. Volo ta-
Fen. lib. men considerare, quod Auicenn. loc. cit. in-
4. tr. 2 quit: *Pro purgatione humorum eligenda esse ea re-
media, quæ non faciant habitudinem ad ipsam fe-
brem futuram, quasi dicat, eligenda esse ea
medicamenta: quæ non accelerant accen-
sionem, ut exempli gratia, anticipet lex,*

A septem, aut decem horas.

Sed dicet quis; quæ sunt hæc medica-
menta? Ego quattuor inuenio causas: propter
quas febris potest anticipare, & consequen-
ter medicamenta facere habitudinem ad fe-
brem ante tempus.

Primo, quando exhibebimus purgans ni-
mis calidum absque correctione. Exem-
pli gratia, scammonium, colocynthidem,
&c.

Secunda occasio est quantitas medicamē-
ti, quæ potest esse duplex: Maior, quam con-
ueniat; aut minor, quam conueniat. Si quis
præbeat fortissima, non tan um mouentur
humores, peccantes, sed etiam alij non pec-
cantes, ibi solet anticipare.

Similiter in minori copia, si moueat hu-
mores insufficienter.

Quartus modus, quando eligantur medi-
camenta, quæ non sint appropriata ipsi hu-
mori peccanti, in quo solet admitti error:
ubi purgatur humor diuersus ab eo, qui fe-
brem facit, ut si sit febris biliosa, & nos exhi-
beamus Agaricum, febris mouetur & antici-
pat, hæc de qualitate medicamenti.

Quantum ad modum, sunt aliqua consi-
deranda: & primum numquid expediat ex-
hibere huiusmodi, ante, post, vel cum cibo.
Omnia breuibus expediam.

Si exhibendum sit medicamentum admo-
dum leue in modica quantitate, ut pilula
mastic. de tribus, cum rhab. &c. potestis præ-
bere paulo ante cenam: Si purgantia vali-
dissima, quæ sunt calida & sicca, & corpus
non sit admodum robustum, præbantur cum
cibo, teste Galen. lib. 1. de alimen. fac. cap.
5. & 2. acut. comm. 25. Et Galenus etiam, qui
secutus hæc Hippocr. sententiam permittet
in pusana scammonium lib. 13. meth. cap. 15.
in cibo exhibet polypodium, & corticem
hellebori nigri. Oportet aliquando decipe-
re agros, & præbere fortiora in cibo. Que n-
admodum etiam in delirio oportet agros
decipere.

Præterea quantum ad modum: num li-
ceat immiscere aliquando urinam prouoca-
tia cum purgantibus, quod est vulgare in fe-
bribus, ubi multi sunt humores cum obstu-
ctionibus, res est controuersa. Ego consue-
ui uti quibusdam pilulis cum trochiscis ape-
rientibus, ut sunt trochisci de rhabarbaro, de
his est dubium, an hæc operatio sit utilis,
necne.

Quod non; probatur: sunt motus con-
trarij. Vnum enim per alium, reliqua per
urinas ducunt: Ergo, simul & semel stare
non possunt, teste Galeno, libro de crasi
methodi, cap. 11.

Ego tamen cenleo aliter, & agere soleo in
praxi, nec hæc ratio me deterret. Primo est
considerandum, purgantia cum diureticis
numquam esse in tanta copia, & tali vi, ut
possint humores a partibus distantibus ad
inte-

Propter
causas,
quas, &
quot fe-
bris pos-
sit antici-
pare.

1

2

3

4

Modus
exhiben-
di medi-
camenta
purgan-
tia.

Num li-
ceat im-
miscere
purgan-
tibus diu-
retica.

intestina trahere: expurgāt dumtaxat humores in primis vijs, & in tali casu tantum abest, vt diuertant opus (id est vt impediant diuretica) vt potius vtilitatem aliquam præbeant.

Sed aduertatis, vbi etiam medicamentum fortius sit exhibendum, si aliqua adsit suspicio, ne vię sint impeditæ, opus est admiscere aliquid ex diureticis, in hunc finem, vt aperiant vias obstructas; adhibentur diuretica, non vt moueant urinas, sed vt aperiantur vię, quæ sententia est Hipp. & Gal. com. aphor. 9. sect. 2. aphor.

Nū expediat Adstringentia permiscere purgantibus? Sic vtinur rhabarbaro, cum myrobolanis: quæ tamen non conuenire quidam putant se hoc probare argumento.

Si opus est purgatione, non erit opus adstrictione. Itaque prætermittenda.

Sed hæc res facile potest conciliari.

Adstringentia sunt tantum administranda in duobus casibus. Primum, quando exhibeatur purgans, vt alui curet fluxum, ad mouendam aluum licet vt adstrictorijs. Et nos ideo eligimus rhabarbarū, & myrobalanos.

Secundus casus est, quando ventriculus, & intestina sint admodum infirma. Sunt tamarindi, absinthium, puluis rosarum, &c.

Nū conueniat Lenientia mixta cum purgantibus? Quod quidam negant dicentes: Lenientia perficiunt suum opus, antequam purgās suum aggrediatur: Ergo omnis eiusmodi permixtio est periculosa, & molesta.

Probatur consequentia: nam patiens cogitur vexari duabus excretionibus vna post alteram: vbi si vires sunt infirmæ erit periculū, ne prorsus cadant.

Non obstante hoc, consulo, quod sic.

Quod dicunt, binas fieri excretiones, ego hoc concedo. Sed existimatis ne vos huiusmodi excretionem esse noxiam? Potius maxime vtilis. Purgans melius potest transire ad partes distantes. Neque est quod dicant, duas operationes molestas, & periculosas esse; oportet enim Medicum esse circumspicuum, vt hoc faciat absque virium noxa.

Tandem quantum pertinet ad modū adhibendi medicamenta, modus etiam est horum cibandi post exhibitum purgans, quod est de modo cibandi, ubi obseruandum, ne tum fiat euacuatio, dum est in motu medicamentum, exhibeatis cibum, ut docet Hip. 2. acut. Potest quidem misceri (ut dixi) cibo, sed si exhibeatis cibum, statim diuertitur natura: Si sitiat patiens, poteritis præbere iusculum.

De curatione febrium putridarum in genere, quæ sit per Diuretica, seu urinam mouentia.

Cap. XXVIII.

INter ea, quæ humores putridos expurgāt, sunt etiam mouentia urinas, & sudores

A Sic enim Gal. lib. 11. meth. cap. 9. de curatione putridarum sermonem faciēs, inquit. *Expellenda autem sunt, quæ putruerunt, per aluum, urinam, sudores, & vomitum.* De vomitorijs & per aluum purgantibus dictum abunde est. Nunc breuiter aicam, quid circa Diuretica, & Sudorifica agendum.

Urinam mouentia in triplici sunt differentia: quædam sunt calidissima, & siccissima; alia sunt temperata; quædam uero frigida. Calida & Sicca in tertio gradu sunt ea, de quibus agitur lib. 3. de simpl. med. fac. cap. 12. ut semina apij, petroselini, ameos, eryngium, asarum, &c.

B Temperata sunt agrimonia, betonica, origanum, pulegium, pentaphyllum, capilius ueneris, &c.

Frigida sunt omnes succi acidi, inter cetera acetum, succus limonum, arantium, omnia semina frigidorum tam maiora, quam minora. Hæc omnia mouent urinas, inter etiam connumeratur aqua ipsa, uinum dilutum, aqua hordei cocta, serum lactis, &c.

Cum igitur hæc & tot sint diuretica, quaeritur, quæ nam usurpanda in febribus putridis, & quo tempore.

Quo ad primum, dico pro temporum febris uarietate omnia locum habere.

C In principio febris quando est ardentissima, conueniunt Diuretica frigida. Habent enim uim alterandi partium intemperiem, & partes horum humorum ad vias urinae deducunt: non enim aliam ob causam urinas mouent, quam quia serosam humiditatem multiplicant.

Nam duplex est motus, per quem mouetur urinas: unus per hæc frigida. Propterea Gal. 4. aph. ult. ubi scribit Hipp. Mictio noctu multa contingens modicam alui egestionem significat. Inquit ille in com. allos, *quibus alui nimis humida est, habere paucam urinae egestionem, & quæ sequuntur.* Itaque omnia poculenta, præcipue tenuioris substantiæ, ut aqua tenuis cocta, mixta cum hordeo, alterata cum frigidis, omnia mouent urinas. Talia conueniunt in principio febris admodum ardentis.

D Temperata sunt, quæ mouent urinas, quia tollunt impedimenta naturæ, quod minus possit serum per renes excernere. Exempli gratia abundat corpus crassis succis, siue in renibus, aut uasis urinariis, qui nisi incidantur, à uis deturbentur, & euacuentur, urina non commodè excernitur. Dantur itaque temperata hæc: qualia sunt agrimonia, betonica, radix apij, pentaphyl. Est etiam terebinthina, quæ tamen in febribus non administratur. est etiam terebinthina Cypria, & aquæ thermæles, quamquam prouocent urinas, quia humores crassos attenuent. Itaque in febribus in quibus adsunt obstructiones, & crassi succi, administranda hæc, præmissa tamē sanguinis euacuatione, quamuis non appareat coctio.

Diureticorum differentia triplex.

Quæ diuretica in febribus sint vsuanda.

coctio. Quod aduertatis propter Anicennā. Vult ille, nulla Diuretica in Principio facta vniuersali conuenire.

Quod hoc verum sit, potestis colligere ex lib. 13. meth. c. 13. in inflammatione iecoris vtitur statim in principio radice apij: in progressu vero præcipit addenda Diuretica validiora, & lib. 11. meth. c. 9. in syncho statim in principio vtitur radice apij. lib. 1. ad Glauc. cap. 9. & 10. in cura Legumæ Tertianæ, & Spuriæ idem facit. Hæc itaque temperata conueniunt etiam in principio.

Diuretica autem proprie appellata, quæ sunt calida, & sicca in tertio gradu, non conueniunt, nisi iam concocta materia, & ubi iam calor febrilis remiserit, vt corpus aliquam illius insignis caliditatis partem demiserit. nam hæc admodum calida exsiccant sanguinem: Et propterea vbi febris magna & vehemens, ab ipsis est abstinendum: vbi vero demiserit, conueniunt. Propterea Galen. lib. de atten. vi. cap. 5. in fin. loquens de istis diureticis, inquit, calida fugienda, excepto eo tempore, in quo volumus sanguinem ipsum purgare. Sed sic est, quod volumus id post concoctionem præstare. Scopus expurgandi sanguinem est, quando humores iam sunt concocti. Itaque huiusmodi verè Diuretica facta concoctione maximè conueniunt, dummodo calor febrilis non prohibeat: si prohibeat, potestis corrigere eum, & tum vsurpare.

De Medicamentis Sudorificis, in quibus

Febris, & quando ea vsurpanda.

Cap. XXIX.

Quantum ad Sudorifica, hæc medicamenta sunt Interna, & Externa.

Interna sunt illa, quæ etiam enumerantur inter Diuretica, & propterea, ubi scopus est reuellere humores fluentes ad alium, administranda, quæ sudores, & urinas mouent: nam separant leuositatem à sanguine. Materia, lib. vndecimo, de simpl. med. fac. cap. de sudor. est eadem. Itaque de his nihil amplius.

Externa, quæ administrari possunt in febris (ni fallor) in triplicem vsum possunt administrari. Primo, ut cutis iam oblitata, & densata, quæ est causa prohibita transpirationis, beneficio horum relaxetur, & aperiantur. Secundo, ut materia, quæ continetur in ipsa cutè, uel ambitu saltem totius corporis, beneficio istorum euacuetur. Tertio, ut humores etiam, qui sunt in profundis partibus putrescentes, paulatim attrahantur in cutem, & per cutem digerantur.

Si sermo sit de prioribus medicamentis, relaxantia cutem, illa conueniunt statim post uenæ sectionem, & post leniens, aut purgans, si materia turgat. Lib. 1. meth. c. 10. loco cit. vult in eo ordine indicationum, quas proponit, primum debere esse, qui desumuntur à

multitudine. Secundam, vt transpiratio fiat libera: non autem fieri libera potest, nisi tollatur causa, quæ multoties est obstructio: Itaque ad hæc relaxantia deueniendum. Ideo lib. 11. meth. capite nono, statim post vniuersales euacuationes vtitur oleo chamomelino.

Verum quidem est, habuisse hoc suspectum, si febris valida, quod calidum sit. Sed si scopus est relaxandi, si hoc volueritis, potestis uti oleo amygdalarum dulcium: nam temperatissimum est oleum: si febris non valida, conuenit etiam chamomelinum.

Quantum ad secundum scopum, qui est educendi humorem in ambitum totius corporis, præcipue cutem, istos per eam partem euacuare oportet, lib. de constitutione art. med. cap. 9. Pariter colligitis ex 30. 2. in 6. epid. ubi scribit Hipp. lata pustula. Addit Galen. in com. hoc esse, humores, qui iam ad cutem confluxerunt, per ipsam cutem esse euacuandos. Propterea scribit idem Hippocr. istas pustulas latas debuisse iuuamentum suscipere a fomentis calidis. Postea subiungit Galenus, faciendam esse non vomitum, aut purgationem.

Hoc loco oritur dubium, nam in huiusmodi transmissione pustularum, & exanthematum in cutem, liceat uti vomitu, purgatorio, uel alio euacuante uniuersum corpus. Ex eiusmodi loco. Galenus uidetur nos docere uoluisse, has non esse fugiendas; nam quamquam dicat huiusmodi humores non vomitu purgari, & statim tamen subiungit, saltem hæc dico, &c. Itaque colligitur, Gal. uoluisse humorem, qui iam fluxit, esse quidem per locum illum euacuandum, non tamen desistendum à reliquis etiam.

Ex alia parte idem uidetur oppositum statuere lib. 4. de tuen. ual. cap. 6. ubi loquitur de curatione tumorum, qui partes externas obsideant: inquit, ea omnia fugienda: fugit ibi omnia leuiora, ut, metum, horrorem, animi passionem. Itaque hæc opposita priori.

Pro conciliando notandum est; humores in cutem fluentes posse esse in triplici differentia: aut sunt humores calidi, tenues, mobiles aut crassi, uiscidi, & lenti, & consequenter immobiles; ubi fluunt tenues, & mobiles, oportet eos esse admodum cautos in exhibendo medicamentum, quæ possunt huiusmodi impetum humoris retrahere. Et propterea loco cit. in 6. epid. ubi uidetur concedere usum vomitus, & purgantium, inquit, illud esse faciendum, si humores non sint calidi. Et propterea inquit, pustula uita, de quibus Hipp. sunt frigida ex humoribus frigidis, qui non facile retrocedunt, quamquam utamur vomitu, aut purgatione.

Itaque potestis ex hoc loco elicere maximum argumentum aduertatam, apparentibus. I. maculis in febre pestilente ulum attrahentium medicamentorum itare posse. Itaque

An in transmissioe pustularum & exanthematum liceat uti purgantibus, &c.

quantum ad huiusmodi euacuantia, sunt ad-
ministranda, quo tempore pustula appareat.

*Nam su-
dorifica
conueni-
t tempore
cruditati-
tis.* Scio rem alio etiam nomine esse conuer-
sam. Nam expurgantia per cutem sunt admi-
nistranda tempore cruditatis, nec ne?

Si appareant in principio, est difficultas.
Qui voluerit plura, legat 2. & 3. meum librum
de Phoenigmis. Disputabimus hoc etiam in
tract. de Pestiferis.

*Attra-
hentia.* Quantum ad tertiam operationem eorum
scilicet, quae attrahunt, administranda haec vel
in cura coacta, vel regulari.

Si de coacta loquamur, intelligo eam, quae
desumitur ab urgente, ut est febris pestilens.

Si sermo sit de illis, etiam in principio con-
ueniunt.

Si de cura regulari, id est, de febribus quae
non vrgeant, in istis expectanda coctio: Pro-
pterea Galenus loquens de his febribus praece-
pit balneum non nisi tempore coctionis ad-
ministrandum, lib. 1. ad Glauc. cap. 1. 3. acut.
com. ult. & lib. 9. meth. cap. 11.

*De medicamentis corroborantibus in febris putridis
vsurpandis. Cap. XXX.*

Purgantibus succedunt corroborantia.
Haec sunt medicamenta, quae alterant
varias intemperies partium corporis, quae
propter febrilem dispositionem relictæ sunt.
nam febrilis calor quasdam partes relinquit
calidiores, nempe iecur: alias frigidiores, ut
ventriculum & cerebrum: propterea in istis
casibus Medici excogitarunt alterantia, quae
vocant corroborantia.

*Corrobo-
rantia in
terna.* Haec sunt externa, & interna. Interna pro
corroborando ventriculo sunt contentæ de
betonica, de absinthio, species aromatici ro-
sati, diatrion pipereon: pro capite, conferuæ
ex floribus rosinarum, anthos uocata: pro ie-
core refrigerando, conferuæ rosarum, viola-
rum, ex folijs, & flor. cichorei addito puluere
ex santalis, triasantal. Confectio etiam solida
triasantalum.

Externa Extrinsecus sunt oleum mastichinum, &c.
Sed ad rem.

*Nā cor-
roboran-
tia exter-
na conue-
niant nō
purgato
corpore.* Queritur, numquid Corroborantia haec al-
terantia, seu ut melius dicam, utrum localia
haec exteriora potissimum sunt administranda,
non purgato corpore?

Pro vna parte est opinio fere omnium, nō
licere uti localibus, nisi praemissa euacuatio-
ne. Existimant verissimam, & vniuersalem
esse hanc propositionem. Ego volo esse
brevis.

Existimo, hanc vniuersalem propositionem
non accipiendam: & cenfeo in pluribus casibus
esse administranda, etiam non purgato
corpore.

Primum localia sunt duorum generum;
Quaedam scilicet euacuantia, quaedam nū-
me euacuantia.

A Euacuantia sunt vel sensibiliter uel insen-
sibiliter talia.

Sensibiliter; Exempli gratia, scarificatio
vnius loci.

Insensibilis euacuatio, quae fit per fots, vel
inunctiones calidas.

Si igitur sermo sit de localibus euacuanti-
bus; sine sensibiliter, siue insensibiliter, dico
in his veritatem habere regulam illam vni-
uersalem, non licere uti nisi purgato corpo-
re. Legatis Galenum 1. in 6. epid. com. 1. in fi.
inquit, uena secta in fronte curat dolorem ca-
pitis, in occipite est remedium locale. Itaque
si sermo sit de his, non licet ita facile ad haec
peruenire, nisi praecedat euacuatio.

B Sed tamen in duobus casibus aliter res se
habet. Primo, quando affectus est ita levis, ut
possit tolli, etiam absque purgatione genera-
li. Galen. libro primo de comp. med. sec. loc.
c. 8. ubi loquitur de alopecia. Paulo post in-
quit: si autem affectus sit parvus, licet uti localibus,
etiamsi non praecesserit euacuatio vniuersalis. Pro-
fecto si in Alopecia, qui est affectus conti-
nuus, proponit haec administranda absq; cor-
poris euacuatione, multo magis, si uobis oc-
currat leuior affectus. *Localia
sunt da-
plicia.*

Secundus casus est, quando materia sit ue-
nifica, siue ex morfu, siue in corpore sit ue-
nenum, potest uti locali in illa parte, cui ue-
nenum infusum est, ex lib. 19. meth. cap. 6.
non praemissa uacuatione. Inquit, huiusmodi ex-
tractionem fieri partim, & quae sequuntur. Et eu-
acuantia inquit esse cucurbitulas, caua cor-
nua, succus, medicamenta acra. Legite etiam
de hac re lib. 3. de Phoenigmis.

Si sermo sit de alijs localibus, quae nō eu-
cuant, fere semper administrantur, non pra-
missa uacuatione. Quod probo exemplo.

C Primum, si sermo sit de Reprimentibus,
statim in principio usurpantur. lib. 11. meth.
cap. 15. Galenus clarissime scribit in princi-
pio fluxionis statim esse utendum reprimen-
tibus propter utilitates, & quae sequuntur.

Neque est, quod quis obijciat 6. aphorif.
11. reprimentia in fluxione oculorum in prin-
cipio suspecta esse. Dico non officere: quia
ibi praecipue improbat vsum medicamento-
rum empiricorum, qui utebantur quibuidam
emplasticis, papauere, & stupefacientibus, at-
que etiam polca: alia est ratio membranae
oculi, & est alius casus.

D Denique quantum ad Alterantia quia hac
de re maior est difficultas, possunt etiam ad-
ministrari, in corpore non purgato. Aucto-
ritate prima Galeni libro 1. ad Glauc. cap. 14.
quando, inquit, opus est purgatione, si os ventriculi
imbecillum sit, &c. Ante purgationem eius
roboratione opus est; In eodem loco paulo
infra loquitur de ventriculo pinuita referto,
& idem statuit. Isti habent pro maximo pec-
cato, si ante expurgationem calorisco vte-
remur. Gal. tamen his vitatur, & sibi concos-
lib. de praecog. ad Posth. cap. 11. proponit ex-
sum

sum Imperatoris, ubi statim lanam imbutam oleo myrtino ante purgationem adhibuit. Itaque non praetermittenda haec localia.

Et ut vno verbo dicam, lib. 1. ad Glauc. 9. inquit, in tertiana legitima plus utilitatis praestare Alterantia, quam Evacuantia. loquitur ibi de febricitantibus febre Tertiana, proponit uinum balnei, ut humores calidi moderentur.

Ut concilietis Galenum, quod aliquando 3. acut. lib. 11. meth. c. 9. prohibet balneum, nisi humores sint concocti: Et tamen lib. 1. ad Glauc. cap. 9. contra statuit. Conciliatur, quia lib. 1. ad Glauc. utitur balneo tantum ad alterandum. Quando vero vult adesse coctionem, utitur balneo pro expurgatione. Si vultis intelligere causam, videatur Galen. lib. 7. meth. cap. 18. propter quam expediat vinocalibus, etiam non purgato corpore. Proponit ibi ordinem naturae.

Alter modus est, in quo vnus affectus non potest tolli, nisi tollatur alter.

Tertius urgentis, qui modus ceteris omnibus anteponendus, semperque memoriae inhaereat. Si res urgeat, ut potestis localibus.

De tertio instrumento curandi febres putridas in genere, quod est Dieta, seu conueniens victus ratio.

Cap. XXXI.

IN curandis febribus putridis victus ratio non minimam habet partem. Idcirco post Chirurgicum & Pharmaceuticum instrumentum, succedit Dieteticum, de quo in praesentia erit sermo.

De huiusmodi instrumento uideo Auicennam duo tantum pertractasse: nempe attentionem ad cibum & potum: de cibo ten. 1. lib. 4. tract. 1. cap. 8. de potu cap. sequentibus. Ego quoque hunc imitatus de alijs rebus non naturalibus paucissima sum dicturus, aliqua tamen & breuibus de aere. cetera praetermittam: nam de his in particulari, de cibo & potu plura.

Quantum ad aerem; aer in febricitantibus triplex eligi & intelligi solet, aut scilicet frigidus & humidus, aut frigidus & siccus, in omnibus uero admodum purus, & si fieri possit, lucidus atque subtilis.

Frigidus, & humidus eligitur, ut sit contrarius febre. Omnis enim febris est intemperies calida & sicca. Frigidus, & siccus ob humores putrescentes, & potissimum ob humores putrescentes in thorace, corde partibus spiritalibus nam ratione refrigerationis & siccationis corrigitur putredo in humoribus.

Denique purus, serenus & limpidus pro conseruandis spiritibus vitalibus, atque etiam animalibus. nam reficiuntur sanguine & aere puro inspirato.

Sed aduertendum, aerem tam frigidum & humidum, quam frigidum & siccum, cum

A qui per nares, & os inspiratur, tantum esse accipiendum, minimè uero eum, qui per ambum corporis. debent patientes esse testis. si talis non sit propter constitutionem vel regionem, uel tempus anni, oportet parare quibuldam refrigerantibus, rosas, uiolis, nymphaea, poterunt etiam facere assumigia, seu decoctum ex santalis, cortice citri, arantiorum, rosas in aqua rosacea, aceto, &c. Haec de aere. ibi notandum, quod non

Quantum ad cibum pertinet, cibus, ut conuenienter in agra adiungatur debet considerari, & ratione quantitatis, & qualitatis temporis, quo debet administrari, & ratione modi.

B Quod pertinet ad Quantitatem, querendum est, utrum multam uel parum cibi sit praebendum: & utrum semel, bis, an pluries. Primum pertinet ad quantitatem continuam, alterum ad discretam.

Quod ad primum pertinet, sciendum est, apud Auicennam in c. 8. tres reperiri ciborum differentias, quae ad huiusmodi uictum conueniunt, uel tenuem, uel medium pertinent. Prima uocatur plenus, Secunda tenuis, Tertia medius.

Plenus uictum intelligit illum, qui similis prout sitianorum. Et propterea si quis tempore agitudinis comederit carnes, panem, ut consueuerat, dicitur plenus.

C Tenuis distribuitur in quatuor differentias. Exacte tenuissimus, in quo nihil prorsus pauentibus datur. De hoc lennonem facit Hippocrates, tract. 44. quando in pleuritide, inquit, tertianam non esse dandam, nisi post septimam, uel nonam.

Tenuissimus non exactè est, in quo antiquiores dabant tantum oxymel, uel mullam.

Tertia, Exactè tenuis uictus est, in quo damus aquam hordeaceam, emulsionem seminum melonum cum ipsa hordeacea, uel ipso iaculo pulsa iunioris.

Quarta, Tenuis uictus non exactè, in quo damus aut psitanam aut panatellam in iure non admodum generoso.

D Datur modo uictus medius, qui ipse quoque habet tres differentias. nam datur medius qui inclinat ad plenum, qui ad tenuem, & absolute exactè medius.

Qui inclinat ad plenum, est, in quo concedimus ouum sorbile simul cum iusculo, & modicum carnis uel pullae; uel uituli.

Qui ad tenuem, in quo concedimus panatellam aut psitanam in iure meliore simul cum ouo sorbili; carnis autem nihil damus.

Medius, in quo concedimus panatellam cum modico contulo carnis.

His stantibus, cum sint tot differentiae a quantitate, queritur, quae sit eligenda in febricitantibus? Dico, in febricitantibus uictum illum plenum semper reijciendum. Alius extremus exactè tenuissimus nostris temporibus non adiungitur, imo neque potest

K amen

Qualis
debeat
esse.

stineri tenuissimus: nihilominus in quibusdam casibus, ut angina, utimus nullo cibo, quia non possunt deglutire. Alia tamen genera locum habent in putridis.

Sed cum tot sint differentie, queritur, quæ sit ratio distinguendi, an conveniat exactè tenuis, an non exactè, an absolutè medi-
us, vel qui inclinat ad plenum, vel qui ad tenuem?

Ut intelligatur modus præbendi cibum, sciendum est, cibi quantitatem continuam indicari partim à virtute, partim ab ipsa causa febris.

Indicatur à virtute, vel considerata formaliter, & effectivè, vel considerata subiectivè. Explico utrumque.

Formaliter virtus vitalis est facultas quædam effectiva: est calor innatus. Itaque si consideratur virtus vitalis, prout est facultas valida formaliter, indicat semper copiosum alimentum, & oportet præbere multum alimentum, illum uictum quem vocamus medium inclinans ad plenum. Ratio quam attulit Galenus est 1. aphor. 17. Quia multus calor, & virtus valida possunt alimentum multum conficere.

Si hæc facultas sit debilis, convenit alimentum in pauca quantitate. alias potius tenue. nam facultas languida, & virtus debilis non possunt multum conficere.

Si verò respiciamus ad vires subiectivè, oportet considerare subiectum virum, quod sunt spiritus, humores, solida. Vbi ergo huiusmodi subiectum omnino deficiat, convenit alimentum copiosum: Si abundat, non est opus copiosius alere. Nam ubi deficit spiritus, oportet reficere novo spiritu: ubi humores, novi humoribus ubi pars solida, etiam nova parte solida.

Quando autem abundant humores, spiritus, solida, non est opus huiusmodi alimentum; posset enim ager suffocari.

Notandum nomine humorum deficientium non tantum intelligi deficientes ex inanitione, quantum ex corruptione.

Itaque si convenit alimentum, quando humores euacuantur, vel sunt euacuati, convenit etiam alimentum, etiam si corpus non extenuatum est, tantum repletum pravis humoribus. Hæc est doctrina Gal. 1. aph. 17.

Video aliquem dicturum, hanc non esse Hippocratis doctrinam, 2. aphor. 10. Qui scribit, *impura corpora quanto plus nutries, eo magis lades, &c.* corpora quæ abundant corruptis humoribus, sunt impura: Ergo non sunt nutrienda. Respondeo, per impura corpora intelligenda, quæ habent corruptos & praves humores in ventriculo, tunc enim cibus corrumpitur. Sed si non sit his humoribus repletus ventriculus, licet venæ sint repletæ, cibus copiosior non nocet, concoquitur in ventriculo & rectore. Accedit etiam, quod impura corpora ex nutritione levi non ladantur,

A si parum & sæpe nutrias, qualem nutritionem hic præcipimus. Addatis tertio, corpora impura ex alimento ladi, quando tantum incumbamus in præbendis cibis, non autem in expurgandis pravis humoribus: sed nos utrumque debemus præstare.

Indicatur etiam alimentum hoc copiosum & tenue ab ipsa causa febrili, quæ est (loquor de putridis) semper copiosus humor, & putrescens. si hic abundat, semper convenit tenuis victus ratio, siue vires sint robustæ, siue debiles, in abundantia humorum, ex doctrina Galen. & Hipp. textu præcedenti 47. Dixerat maxime distinguendam imbecillitatem virium ex inanitione & suffocatione, &c. & in hoc irridet Medicos, qui non distinguunt hæc, sed pro vno accipiunt. In comm. Galen. docet, in viribus imbecillis ex inanitione convenire alimentum, ex suffocatione verò non, ut potius eo tempore subtrahere oportet. Quod etiam docuit 1. aph. 17. Et ratio duplex est: Primo, quia huiusmodi victus tenuis in abundantia humorum primo facit summopere ad concoctionem humorum. Propterea dicebat Galen. lib. 1. ad Glauc. cap. 10. tantum conferre tenue uictum ad concoctionem, quantum officit viribus. Propterea lib. de constitut. Medic. cap. 19. parcum cibum confert ad concoctionem.

C Secunda causa, cur tenuis instituendus est, quia hac ratione imminuitur plenitudo. De hac Gal. lib. 13. meth. cap. 4. & lib. de curat. per sang. mission. cap. 10. inquit, euacuat corpus purgatione, & lectio, si lectio & tenuis victus ratio: itaque instituendus. Ex quo potestis intelligere, quod quamquam ex una parte vires, & videantur robustæ & imbecilles, semper requirere plenum uictum, tamē in febricitantibus oportet uti distinctione: Si virtus debilis ex inanitione siue fluxu per nares, aut alio modo, semper convenit cibus potius accedens ad plenum. Neque oportet in hoc casu ad febres respicere. Quando autem vires consent, aut sint imbecilles ex suffocatione, causæ morbi sic incumbendum, & tunc convenit tenuis. Et hæc de quantitate continua.

D Quantum ad discretam, consideratur, ubi cibus exhibendus bis, ter, vel pluries defus- ^{Quoties} ^{cibandus} ^{ager.} mitur partim à viribus deficientibus, partim à consuetudine, partim etiam à tempore motus ipsius accessionis.

A viribus nam ubi imbecilles, oportet reficere cibo paulatim accepto, sed pluries, singulis quatuor horis oportet nutrire.

A consuetudine. quia qui sunt assueti, ter vel quater cibum accipere, bis nutriendi sunt: Qui bis comedunt, saltem alternis diebus.

Aliquando pluries nutriendum propter tempus accessionum: si non pluries uno die, pro ratione motus accessionum, oportet bis, ter, nutrire. Et hæc pertinent ad quantitatem.

Quan-

Qualis
cib. pra-
bendus.

Quantum ad qualitatem, hæc indicantur partim a virtute, partim a febre, partim a causa morbifica.

A virtute ratione solidorum, humorum, & spirituum. nam simile requirit alimentum simile: solidum solida requirunt; humores similiter humorosum; spiritus spirituosum.

Præterea, solida ratione temperamenti considerantur, quæ habent temperiem calidam calidum: frigida sunt conservanda frigidis, &c.

Quantum ad febrem, semper requirit cibum frigidum, & humidum: quamquam Hippoc. mentionem faciat tantum humidi. Sed volo intelligatis cum Gal. lib. ad Thrasibulum. cap. 4. victum liquidum.

Denique indicatur etiam a materia peccante: si sit biliola, &c. quatenus crassa & viscida, cibum attenuantem: acut. 44. pitisanam atque mulsam esse cibos febricitantium inquit.

Erat sermo de ciborum quantitate, & qualitate in putridis administrandis. Dicebam autem duplicem esse, vnam continuam, alteram discretam.

Continuam adhuc in tres differentias distinximus, quarum prima continet victum plenum. Secunda tenuem. Tertia medium.

Plenum victum, qui est sanis similis, dixi a febricitantibus esse excludendum: tenuem autem in illis, qui vires habent robustas, vel sunt in statu morbi acuti.

Sed quia acutus morbus habet quatuor differentias. Primo, exactè peracutus, qui definit in quarto; peracutus in septimo; exactè acutus in decimo quarto; acutus simpliciter, qui in vicefimo. Pro acutorum differentia convenit etiam varia victus tenuis differentia. Dixi. n. dari victum tenuissimum, in quo nihil datur, qui excluditur; exactè tenuem, in quo exhibemus cremorem pitisanæ; tenuem absolute, in quo datur pitisana aut panatella in iure non admodum generoso. Pro horum acutorum differentia varia etiam instituitur victus ratio, in exactè peracuto tenuissima: in peracuto sola panatella cum emulsione seminum melonum: in alijs acutis poterimus transire tenuissimū hunc victum, & quibusdam etiam concedere ovum: Media autem victus ratio convenit, in quibus status non admodum propinquus est. Hæc de quantitate.

Quo ad qualitatem, hæc indicatur & a virtute, febre, & causa febris.

A virtute, cibis similis & partibus solidis, & humoribus ac spiritibus: ut propterea si læguescant vires secundum spiritus, oporteat præbere cibum spirituosum; si secundum humores, humorosum; si secundum solida, solidorum est etiam præbendus similis in temperamento naturalis temperamenti: debet tamen semper esse facilis concoctionis, paucarum superfluitatum, optimi succi: sunt car-

nes pullorum, vituli, animum montanarum, ova torbilia, atque etiam pisces.

Indicatur etiam qualitas cibi a febre. nam febris requirit cibum frigidū, & humidum.

Et a causa, quæ indicat refrigerantem & humectantem. Concedant attripicem, blitum, malvam.

Quatenus aliquando materia crassa, viscida, lenta, requirit cibum attrénuantem, &c. pitisanam cum pipere, cum radice apij. Quatenus putridus, cibum exsiccantem, oxalide, succum citri, limonum arantiorum. Hæc pertinent ad ciborum qualitatem.

Sed hic multæ occurrunt considerandæ conditiones & breves quæstiones, pertinentes ad qualitatem ciborum.

Primum queritur, utrum conveniant in febricitantibus carnes? Ratio quæritur est, quia non solum ratione, sed multorum etiam experientia constat, febricitantibus putrida admodum, infensas esse carnes, facile putrefacere, & ita excellenter, ut etiam vermes generentur. Itaque noxiæ.

Accedit etiam experientia. Nam in quibusdam regionibus, ut Græcia, &c. carnes adeo febricitantibus sunt noxiæ, ut statim assumpta carne moriantur. Et in Creta Insula, irridet Medicos Italos, qui in febris præbent carnes. Quantum igitur ad hoc quæsitum, dico carnes concedendas, prout vires requirant. Ad objectionem, Carnes putrescunt: dico eligendas, quæ minus citò putrescant: non ita facilis est ad putredinem caro pullorum, animum montanarum. Addo huiusmodi carnes posse corrigi quibusdam cibarijs medicamentosis, & succis prohibentibus putredinem, oxalide, succo citri, limonum, aceto, &c.

Quod ad experimentum pertinet, illocis calidioribus moriuntur: dico id contingere propter insignem aeris caliditatem, ubi rari interiorius quam exterior carnes putrescunt: sed in nostris regionibus aliter se res habet.

Est etiam dubium de piscibus. nam facile putrescunt. Rhases lib. 3. ad Almans. & Auerrh. lib. 6. Collect. c. 18. pisces facillime putrescere inquit. Itaque siue antequam in sanguinem vertantur, putrescant, siue sanguis, utrumque malum. Nihilominus Gal. lib. 1. ad Glauc. c. 9. concedit pisces in tertiana. Puto opus esse distinctione partium desumpta a febre, partim a natura piscium.

A febre, si fuerit ex humoribus calidis, & biliosis, puto cum Gal. esse concedendos.

Habenda est etiam distinctio piscium: nam cartilaginei non bene conficiuntur, palustres etiam facile corrumpuntur, de quibus loquitur. Auerrh. lib. 6. Collect. cap. 41.

Sed de quibus loquitur Galenus? de petrosi, qui non facile corrumpuntur. Possunt itaque concedi apud nos febricitantibus.

Licet etiam de ovibus dubitare, non propter

K 3 cu-

Verum
liceat da-
re febricitantibus
carnes.

Num pi-
sces.

Nūc ena-

curiositates tantum, sed Medicorum est heresis. Fui sex annis Venetijs, ubi semper prohibent oua: est ibi periculum exhibere: si quaratur quare, obuium eleunt.

Quidam etiam non semper prohibent, sed eo die, quo assuntur medicamenta. Itaque si vobis aliquando occurrant huiusmodi Medici, quaratis causam. Nam oua à Gal. & omnibus scriptoribus probatis conceduntur, modo recentia, nec frigida, sed tremula sint, in quibus etiam album est candidum, & conspissatum; hæc sunt optimi alimenti. Neque consulo, ut permittatis hæc coqui sub cineribus, est modus deterior ceteris: nam spiritiosa humiditas ratione ignis, & cinerum tota exhalat, & ouum redditur infirmius, potius in aqua calida coquendum est.

Num ole-
ra.

Est etiam dubium de oleribus. Nam Gal. lib. 1. ad Glau. concedit olera (ut dixi) maluam, lapathium, &c. tamen idem lib. 2. de aliment. fac. c. 50. inquit, omnia olera esse paucissimi alimenti, atque multi excrementi. Sed quod magis refert, lib. de cibis boni, & mali succi dap. 8. omnia olera generare prauos succos: tamen inquit aliquos esse ceteris minus malos, ut atriplex, lapathium, malua, & lactuca, quamquam rejiciat endiuam, cichoream: & Medici his notis temporibus sunt prouisi in his præbendis.

Sed nec hæc olera indifferantissima sunt præbenda, sed in ardentibus ex biliosis humoribus possunt concedi, ubi abundat pituita, humores frigidi, prauis succi, quod in lib. 1. ad Glau. concedit. Concedat in tertianis exquisitis, & potius ad delitias.

Nū fr-
gus.

Eadem dubitatio est de fructibus: nā dantur fructus frigidi, & humidi, qui aliquando admittuntur. Alex. Trallian. hæc in parte est valde indulgens, & Auicennas concedit cucumeres, cucurbitas, & melones. Gal. lib. de cibis boni & mali succi, cap. 3. inquit, eos nisi citò excernantur, generare succum veneno non dissimilem. Itaque non facile concedendi.

Pro extinguenda siti nimia, aliquando modicum cucurbitarum, anguræ concedimus, exceptis ijs, qui habent aciditatem, ut quædam pruna. Igitur intellexistis, quæ fuerint ratio dubitandi.

Quando
cibandus
eger.

Venit ad tempus exhibendi alimenta; aliud est uniuersale, aliud particulare.

Vniuersale principium, augmentum, vel status, vel declinatio.

Particulare, hora unius cuiusque diei, in qua debent nutrir.

Loquitur primo de tempore uniuersali, quod sumatur partim à viribus aegrotantis, partim à natura morbi.

Si scimus sit de viribus aegrotantis, quando fuerint infirmæ, nutriendus est quocumque tempore morbi, quamquā Status adsit morbi. Ratio, quia semper prima indicatio sumitur à viribus, si vires non consent, nihil con-

stare potest Gal. lib. 9. meth. c. 13. sect. 11. aph. 17. & lib. 10. meth. cap. 3. atque alibi.

A natura morbi tempus nutriendi est potius tempus principij, quam Augmenti, vel Status. Si Hipp. Gal. & Auicenna credimus Hipp. 1. aphor. aph. 4. usque ad 10. loquitur de huiusmodi tempore curationis aegrotantium. Et inquit in 10. ubi status adsit, semper tenuissimo victu utendum. & lib. 11. meth. c. 5. Auicenna in præfati. c. 8. sed semper tenuissimo victu utendum. Hæc sententia non videtur absque dubitatione prætereunda. Si quis intelligat potius in principio morbi nutriendos patientes res non caret dubitatione. Primum quidem certum est, in principio omnium febrim putridarum, & morborum corpora omnia esse impura. Et dicebat Hipp. 2. aph. 10. Impura corpora, quanto plus nutries, tanto magis lædes. Ergo non est conueniens alimentum.

Præterea febres ex inflammationibus, si in principio tractentur cibo copiosior, quā in statu, nonne euadunt deteriores? Ratio: nam in principio fluit materia ad locum affectum, augeat inflammationem: & nihil est, quod magis adiuuet fluxionem, quā copiosum alimentum. Accedit, quod sicut in principio morborum necessaria est purgatio per medicamentum, per sanguinis missionem, ita etiam imminutio humorum per dietam. Ergo in principio non conuenit victus plenior, quā in statu.

Sententia itaque Hipp. aliter intelligenda: Non puto voluisse in illis morbis, in quibus itatus distat, nutriendos patientes statim in principio: hoc dumtaxat voluisse puto, ut non nutriantur in statu, nec paulo ante statum, sed tamen ante statum nutriendos esse. Nec hæc tamen ualerit consequentia: Iubet Hipp. esse nutriendum ante statum. Ergo, statim primis diebus est nutriendum. Et ideo ex sententia Hipp. 1. aph. 14. per principium ego intelligo, uel ultimam partem principij, uel initium augmenti. Ideo, si corpus impurum est, & repletum excrementis, delectorio, uel uomitu vacuandum. Pariter, si febres ortum duxerint ex inflammatione, tubera hendum in principio alimentum, sed tamen eodem tempore, quo iam cessauit fluxio, & incipit tempus maturationis (quando enim hæc incipit, non sit absque calido innato, & calidum innatum debet sustineri à mediocri cibo). Ex tunc potius præbendam alimentum, quā in principio, dum sit fluxio & ideo per principium intelligo non primam partem principij, sed ultimam, & primam partem augmenti.

Quod si status sit propinquus, tenuissimo victu utendum. 1. aphor. 7. 8. ubi morbus peracutus est, statim etiam extremos labores habet, & extreme tenuissimo victu uti necesse est.

Sed aduenite, per victum tenuissimum possumus

possumus intelligere, & illum tenuissimum, A de quo dictum est, in quo nihil omnino damus, aut tenuem panatellam cum semine melonum, aut pulnam hordeaceam.

Si de priori sermo sit, videtur nobis & Hip. suspectus, qui 1. aph. 4. inquit, in tenui victu agros delinquere, difficile est; Et in sequenti, in tenui victu agros delinquere: quāquam oppositam habeat sententiam 2. acut. 3. 6. semper incumbendum potius detractio ciborum, quā additioni: & minus malum esse, ut inquit Gal. in com. cibos imminuere. nam etsi cibus magis parcus exhibeatur, quā conveniat, citius error corrigitur, quā ex pleniori victu, quia statim plus potest addi: quā sententia superiori est contraria. Hanc rem viderunt plures ex recentioribus, ut Manardus lib. 4. epist. 2. Card. lib. 1. Controu. cap. 8. Vallet lib. 8. Controu. c. 1. Ego nolo referre quid dicant. Puto conciliari sic posse 1. aph. 5. respexisse potissimum ad tenuem victum instituendum in patientibus, quibus vel vires non sint admodum constantes, vel saltem suspicio, & periculum sit, ne in posterum possint esse constantes, 2. acut. 3. 6. respexit ad vires, & in praesentia constantes, & quae in futuro possunt constare.

Dicemus, qua ratione cognoscemus in futuro constare, vel defuturas? Optime: Si ad regionem, constitutionem, habitum corporis, consuetudinem, sensibilitatem, & oris ventriculi respiciamus. Nam si, exempli gratia, tempus anni frigidum, regio temperata, constitutio ad frigidum, aetas consistens potius quam puerilis, temperamentum inclinet ad frigidum, habitus sit densus, consuetudo, & non assuetus sit multo cibo, humores etiam non admodum tenues, & calidi, & os ventriculi sensibile admodum, certi eritis, si fuerint valida, posse etiam in posterum sustinere ad sustinendum victum tenuem. Sed in oppositis conditionibus non possunt patientes diu in diem sustinere, & si uirtus semel cadat, periculum ne vires concidant.

Nūc de horis cibandi in putridis febribus agendum. Suae autem illae, uel coactae uel regulares. Coactae sunt, in quibus propter virium defectum cibum exhibere cogimur siue principium sit, siue augmentum, lib. 1. meth. cap. 10. ne vires concidant. In cura regulari, id est, ubi vires robustae, uel saltem non ita infirmæ. Alia est in febribus continuis continentibus, alia in periodicis proportionatis ratio.

In continuis continentibus, quia nulla est exacerbatio, sed calor continuè affligit, idcirco Gal. dicit lib. 1. meth. c. 5. eligendam esse horam, in qua patiens minus à symptomatis vexatur: aut etiam eligenda est hora consuetæ, quando nec febris, nec symptomata declinent. Eligenda est etiam, quando cetera deficiant, hora diei frigidior, ita ut melius sit nutrire manè, si tempus aestiuum, aut vespere.

Sed si febris habeat exacerbationes, & periodos, videndum, num febris habeat interualla, an his careat: Si habeat, unusquisque nouit nutriendos patientes, tempore interualli; si non habeat interualla, sit continua, sed continua per subingressum, considerandum, an habeat saltem sensibiles & manifestas declinationes, an his careat: si habeat, quāquā careat interuallo, tempus nutriendi est tempus declinationis: in principio, augmento, & statu semper à cibo abstinendum. Est doctrina Hipp. 1. aphor. 11. repetita in aph. 19. His, qui in circuitibus exacerbantur, nihil dare oportet, neque cogere, sed auferre de appositionibus ante indicationes. Sed pluribus B his hæc sententia est repetita ab eodem, vel saltem auctore 6. lib. acut. tex. 39. Ibi interpretatur sententiam propositam 1. aphor. Inquit enim cibum non esse prabendum, dum pedes sunt frigidi, sed quando iam calorem contraxerint &c. Incalescunt enim etiam in augmento, & statu, quæ omnia sunt deteriora circuitus tempora. Per pedes autem calidos non oportet intelligere pedes iam incalescentes, sed 1. aphor. 11. quando dicit per accessionem, intelligit deteriorem circuitus partem, quæ continet tria tempora principium, augmentum & statum. Propterea in cura regulari oportet abstinere à cibo per hæc tria tempora.

Itaque quando scribit auctor, in exacerbationibus subtrahere oportet victum nam apponere noxa est: absolute intelligendum, ut scilicet pedes sint calidiores, quā thorax. C Sed quid agendum in febribus, quæ habent exacerbationes absque declinatione, in quibus statim post statum superuenit noua accessio. In ijs nullum videtur tempus nutritionis? Res est difficilis; oportet diligenter attendere febris magnitudinem, locum affectum, affectionem, causam affectionis, & ipsas vires.

Quantum ad magnitudinem, considerare oportet, utrum tempore status febris sit maxima an potius facta minor, calorq; febrilis aliqua ex parte euauerit.

Quantum ad locum affectum, considerandum, num locus sit uel uentriculus, uel iecur, uel alia quævis pars.

Quantum ad affectionem, considerandum, num laborante uentriculo, uel iecore, affectio sit inflammatio, uel intemperies cum materia absque inflammatione.

Quantum ad materiam considerandum, an sit tenuis, an crassa, & præterea multa, an pauca.

Quantum ad vires, an sint debiles, an robustæ.

His stantibus dico. Quod si febris in statu fieret adhuc uehementissima, & huiusmodi febris, neque ortum duceres ex uentriculo, nec iecore, sed alia quauis parte, adesset præterea copia humoris tenuioris, cuius ratione possent

possent imbecilliores vires reddi: dico prætermittendam cibationem tempore status, & nutriendos in principio, ubi multo minus ualium. Ratio clara lib. 11. meth. cap. ult. ubi febris est vehemensissima, est ardens in statu: Hic calor admodum ardens prohibet alimentum: nam magis augetur calor, carnes collquantur, alimentum non conficitur.

Ex parte alia, si exhibeatis in principio, dum humores tenues, &c. comprimit fluxionem tenuem, præseruat syncope. Propterea lib. 10. meth. cap. 3. cibauit iuuenem temperamenti calidi, & sicci, &c. Vnum tamen ex Auic. desumi debet, quod pertinet ad huiusmodi nutritionem febrientium cum humoribus tenuibus. Gal. loco cit. & c. 4. vult paulo ante, & in accessione esse nutriendum, alioquin cadunt in syncopen, &c. Auic. tamen quamquam concedat huiusmodi nutritionem in principio, aliquando tamen expedire ante nutritionem. Addit, præbere quædam vomitoria. Puto Auicennam considerasse fluxionem aliquando esse parua, aliquando secus.

Si parua, in principio statim offam sufficit offerre.

Si magna, antequam cibum præbeatis, melius est partem illius materie prius vomitu educere: fieri autem vomitio potest ex aqua hordei cum oleo amygdalarum: sed ubi status potius fuerit squalidus cum calore febrili, non admodum quieti, id est, quando patientis videatur contraxisse faciem Hippocraticam, ex alia parte in principio accessionis fluunt humores multi ad os ventriculi, in tali casu expedit nutrire potius in statu, nam si non, subeunt ea ipsa pericula, quæ subeunt ali, in principio accessionis.

Contra, si nutriantur in principio accessionis, augetur inflammatio copia ipsorum humorum, & suffocantur.

Sed si quis querat, quid agendum, quando duo hæc mala simul conueniunt, ut status cum feruore ingenti, patientis sit squalidus, & in principio imminet periculum fluxionis humorum? In summis necessitatibus omnia, quæ periculosa, tentanda: debent nutrirī debent autem magis nutrirī in statu, quam in principio, ubi non tot pericula impediunt. Ratio est: quia si adest inflammatio, in hac nullum tempus alimenti, tam perniciosum, & periculosum, quam principium inflammationum. Præbeatur autem cibus mediocris quantitatis, & optimi succi, modica portio pitana: hordeacea, emulso seminum melo cum cochleari destillati: Si vires non consent, omnia prætermittenda.

Modus
cibandi.

Quantum ad modum exhibendi cibum, exhibendus sapè, sed in pauca quantitate illeq; potius sorbulis, alteratutq; & refrigerantibus & siccis, ratione putredinis. Siue imponatis succum limonum, citri, acetum, omnia in febris conueniunt.

Potus.

Potus ipse quoque debet à nobis conside-

rari, sicut cibus ratione quantitatis, qualitatis, temporis, & modi.

Quod ad qualitatem, hæc indicatur, & à viribus, & febre, & causa febris.

Qualitas

A viribus, qui sit optimi alimenti, facilis distributionis & concoctionis.

A febre refrigerans, & humectans.

A causa, si frigida, calefaciens: si crassa, incidens: si putrida, contraria putredini.

Materia potus indicatur à virtute, qui debet esse nutrens. Materia huius est duplex, est uinum, & us, uel destillatum, uel non destillatum.

Materia
potus.

Quantum pertinet ad uinum, indicatur à virtute, quando iam concidat. In febribus, si vires content, siue mediocres sint, non conuenit, nisi in declinatione.

Interim hac in parte considerandum, num excludendum uinum etiam in viribus deficientibus, propter conditiones propositas à Gal. lib. 1. ad Glauc. cap. 19. Loquitur ibi de vino exhibendo in syncope, & inquit, in quatuor casibus non continere: primo in delirio. Secundo, in inflammatione ventriculi. Tertio, in insigni humorum copia. Quarto, in dolore capitis.

Idem de febre potest cogitari: sed tamen cum paulo ante dictum sit, vires plus posse, quam cetera omnia indicantia, & esse primam indicantis dignitatem à viribus, ubi vires concidant, nulla habita ratione uinum est concedendum. Sententia, lib. 11. meth. cap. 11. & apertissimis uerbis lib. 12. meth. c. 12. Ratio, ne uinum collabentium, uti oportet cibo, & potu uini quamquam non existimem in illis qui non sunt deplorati, omne genus vini esse concedendum, sed quod possit vires reficere, nec tamen ledere, quod morbo, & symptomatis non officiat. Si deplorati sint, potestis concedere, quod uis vini genus, quod satisfaciatur necessitati restituendi vires. Tale est, quod vocat antiqui oligophorum, 3. acut. 23. Est uinum, quod vocant etiam pauciferum, quod sustinet modicam aquæ portionem, quod nulla ratione, aut febribus, aut symptomatis potest officere: non febrī, quia refrigerat, non calefacit. 3. acut. 20. quia multam habet humiditatem in vite minime concoctam, & modico terrestri admixtam, quasi dicat, substantia aquea, quæ recepta est in vite, est fere immutata.

D

De hoc ipso uino lib. 3. de loc. aff. c. 6. quod ventriculum corroboraret, & minime caput la dat, & ibi profiteretur, se sanasse Grammaticum. Vos potestis legere, in lib. de puero epilept. & tamen huc Grammatici uinum concedit. Et propterea etiam Hipp. 3. acut. 41. in capitis gravitate, & dolore prohibet uinum. Sed paulo post inquit, concedendum aquotum, tenue, quod reficit caput, superbibendo quam.

Itaque censeo in syncope, concedendum uinum. Vbi non admodum collapsæ vires, potius melius

Quantitas

melius est vriare, uel non destillato, uel destillato. Destillatum erit satis iucundum, si destillatur cum oxalide, & succo limonum, Quantitas exhibenda pro necessitate patientis, potissimum in prandio, & coena. Quantum ad febrem, indicat potum refrigerantem, & humidum. Huius materia est multiplex, est aqua cruda, uel cocta, uel simplex, uel mista.

Crudam videtur recusare Hipp. 3. acut. c. 40. ubi multa refert mala ex aqua, Propterea etiam Gal. lib. 8. meth. cap. 3. videtur magis commendare usum uini tenuis: sed ibi est sermo de aqua cruda cocta, non usque adeo repudianda de qua Hipp. 4. in 6. epid. c. 13. cum inquit, in calida natura refrigeratio pro potu frigida. Aqua igitur cocta concedi potest, & si alteretur hordeo, est adhuc melior; quae Auicenna ita dilecta, ut integrum de hac confecerit caput, quod est 9. quae ipsa quoque aliquando alteranda pro necessitate patientis, nam est flatulenta, & facili accendit in uentriculo, incoquatis pipet, sceniculum, alarū, &c. & ut pro consumenda insigni caliditate, & siccitate expedit, prebere largam portionem ad libram integram etiam.

Quantum ad vinum oligophorum, habet vim refrigerandi, & humedandi; sed id prorsus fugietis, siquidem in ore omnium est id calefacere: in continuis abstineatis saltem usque ad tempus coctionis; nam si postea periculi erunt, dicerent astantes, eum interfecit, propter vini portionem.

Quantum ad potum indicatum a causa morbifica, requirit varias indicationes. Debet omnino aliquando incidere, & aperire obstructions, & pro qualitate materiz modo refrigerare, modo calefacere.

Si opus sit simul refrigerare, & sudores cingere, conuenit aqua cocta cum radicibus petroselinī, apij, sceniculi, &c.

Pasiter si opus attenuare & aperire, coquantur aqua cum succis limonum, citri, arane. acetum ipsum, ut iucundior fiat, immisceatis saccharum, ut Exēphi gratia accipiat lib. v. aquae sacch. vnicas v. succ. limonum, & citri ronden. Quod si materia frigida & crassa, coquite aquam loco sacchari cum melle, & adde hyssopum, pulegium, sceniculum, petroselin. &c. Si per urinas euacuandum, conuenit uinum oligophorum. Ita Galen. lib. 1. ad Glauc. c. 9. & lib. 11. meth. c. 9. In continuis apparente coctione hoc uinum conuenit.

De febribus putridis in specie. & primum, De Tertianā intermittente, & Continua legitima.
Cap. XXXII.

Specierum putridarum tractationem ab his febribus inchoabimus, quas est Gal. lib. 3. de differ. febr. cap. 2. & Auic. sen. 1. lib. 4. tract. 2. cap. 34. distinguemus in tres differentias: quarum prima conuenit Tertianā inter-

mittentem, secunda Tertianā Continuum periodicam declinantem. Tertia Causonidem, uel Ardentem.

Singula ipsarum in duas adhuc subdiuiduntur species. Nam alię Exquisite sunt, alię Nothę. Exquisite sunt, quę ex bile syncera impermixta producuntur. Spuria uero, quę ex bile mista alijs humoribus. Loquemur primo de exquisitis, & incipiemus cum Auic. 2. Tertianā Intermitte.

Tertiana igitur intermittens legitima est febris, quę ortum ducit ex flaua bile excrementitia putrescente transmissa ad extra venas.

Dixi hanc fieri ex flaua bile. Nomine flauę bilis intelligo, & humorem, & ichorem bilis. Dantur enim febres, & tertiana intermitteutes, atque etiam continuę, in quibus putrescit humor, & ichor bilis, de quibus Hipp. 4. acut. 2.

Hac in parte etiam animaduertendum, me dixisse, ex flaua bile, non quacumque. datur enim vitellina, æruginosa, coerulea, & alia species, nam ex his nunquam produciuntur febres, quidquid alijs sentiant.

Porracea generatur in uentriculo ex quibudam edulys excrementitijs, atque eorum corruptione, beata, brassica porris, coepis, de qua bile com. 39. secundi prognost.

Alia est bilis porracea, quę generatur in iecore, & uenis propter feruorem insignem, ex qua etiam generatur bilis æruginosa, & vitellina. Ex his non fit tertiana, quia Galen. lib. 3. de alim. facie de melle, in si. scribit, in febribus salutaribus nunquam excerni bilem æruginosam, sed tantum flauam, uel pallidā. Si enim hæc designat leuem morbum. Propterea inquit lib. 5. de loc. aff. c. 3. huiusmodi humores esse indicium inflammationis iecoris. Quod si quis dicat, saltem posse fieri tertianam ex porracea in uentriculo genita: dico, excitari potius Tertianā Notham, quia bilis, quę habet multum crudi succi admixti. Legitima itaque fit tantum ex flaua bile sincera, uel ichore si uia bilis.

Sed quia flaua bilis est alimentalis & excrementitia, dictum est fieri ex excrementitia. Ratio, quia tertiana intermittens est periodica. non esset intermittens, nisi esset periodica. Periodus est tempus intensiōis & remissionis; itaque habet periodica hæc suas intensiōes & remissiones; ubi intenditur, fit, quia aliquis humor noxius mouetur motu locali, uel alterationis, & irritat facultatem expultricem: nihil, quod est alimentale, irritat facultatem expultricem. Itaque quod irritat, excrementum est, quod colligitur in parte, uel per generationem ex intemperie calida, & sicca, uel per retentionem, uel attractionem, uel transmissionem, calefactionem, aut dolorē. Quæ res conitatur ex Gal. lib. 3. de differ. feb. c. ult. lib. de cur. rat. per lang. miss. cap. 8. Est igitur bilis excrementitia.

Quid Tertiana
modus.

Sed

*Contin-
etur in re
nis pro di-
stributio-
ne signi-
nis, &
pro nutri-
tione par-
tium ca-
lidarum.*

Sed quia hæc adhuc duplex, excrementi-
tia utilis, & inutilis: utilis, quæ adhuc in cor-
pore retinetur pro distributione partis, & præ-
terea ad nutriendas partes; sed hæc non est,
quæ facit periodum: nihil enim ab utili ledi-
tur: itaque inutilis.

Causa verò, propter quam hæc inutiliter
colligatur, est temperamentum iecoris, vel
torius corporis, calidum, & siccum. Propte-
rea lib. 1. ad Glauco. cap. 5. Gal. scribit *Tertianas*
fieri semper iecore laborante.

Generatur præterea ex habitu corporis
gracili, in iuuenilitate, tempore regione-
que calidis, vita exercitata, post iras, vigilias,
post victum, qui habet vim calefaciendi, &
siccandi.

Augetur etiam hoc excrementum, quan-
do retinetur, siue retineatur propter obstru-
ctionem meatus fellei, siue propter constitu-
tionem totius corporis. Sic enim comment.
2. in 1. Epid. text. 20. Tertianas generari ait,
quando bilis in vniuerso corporis ambitu
transmissa non potest digereri.

Sed istæ causæ possunt quidem nos do-
cere, febrem esse biliosam, sed non magis
continuant, quam intermittentem, quæ
etiam ex hac bile excitatur: propterea addi-
di, *transmissa extra venas*, quæ conditio distin-
guit tertianam intermittentem à quacunque
aliâ.

Aduertite, quia suscit non disputabo.
Auicennas, & plurimi existimant, in hoc di-
stingui Tertianas Intermitteutes à Continuis;
quod in intermittentibus extra venas: in
continuis materia putrescat intra venas. Re-
ieci aliâs hanc sententiam. In uniuersum sal-
tem hoc dico, in hoc distingui tertianam in-
termittentem ab alijs, quod in hac materia
biliosa, quæ hanc facit, semper transmitta-
tur extra uenas, & non in principio accessio-
nis, ut isti existimant, sed in fine. Si aliqua
pars retineatur, sit tertiana continua dec. inâs:
Si nihil excernatur, sit causon. Galenus libro
secundo de Crisibus, capite tertio id eo in-
quit, tertianam intermittentem fieri, quod
materia transmittatur extra venas: Si hoc fit,
statim febris intermitte. Et citat locum Hip-
poc. lect. 4. aphor. 58. *à febre ardere habito, rigore*
accedente, solutio fit.

Sed aduertatis, quod, quamquam ma-
gna ex parte Tertianâ Intermitteutes, fiat ex
hac bile, fieri tamen potest, ut hæc bilis
excrementitia corumpat etiam alimenta-
lem. Et in eo casu tunc ipsa tertiana inter-
mitteutes, fiet ex duplici humore bilioso, uti-
li, & inutili.

*Loci affe-
cti.*

Ex his patent modo etiam causæ remo-
te, & locus, in quo continetur biliosa mate-
ria, quæ febres excitat. Nam contingit ali-
quando in uniuerso corporis ambitu, quan-
do ibi colligitur, quia non potest euacuari,
com. 2. in 1. Epid. text. 20. aliquando in par-
tibus naturalibus viscerum ignobilium, ut tunc

A Fernelij sententia; aliquando colligitur in
venis, & ibi continetur, usquequo incipit pu-
trefcere.

Ex quo colligitur, differentias varias esse
huius tertianæ exquisitæ, quæ desumuntur
partim à loco, ubi putrescat, partim à causis
mediatis.

*Differen-
tia à ma-
teria quæ
excitat.*

A materia putrescente, considerata aut ra-
tione quantitatis, aut qualitatis.

Quantitatis: nam, ubi est satis copiosa ma-
teria, quæ putrescit, facit tertianam exquisi-
tam, quæ durat saltem horas duodecim. Si
minor sit portio huius humoris, fit tertiana
exquisita, quæ durabit aliquando, nec decem,
nec octo, nec septem horas, teste Gal. lib. 3.
de Cris. cap. 7.

Ratione qualitatis nam si materia est mix-
ta ex ichore & humore, febris semper est fa-
cilior, & breuior, quam quæ provenit ex sim-
plici humore, absque ichore. Propterea vidi
aliquando tertianas, quæ non pertransibant
tres horas, quæ ex ichore erant.

*À quali-
tate.*

Si sermo sit de qualitate materiz, aliæ sunt
differentiæ. Nam aliquando peccat tantum
excrementitia bilis inutilis, ubi febres sunt
satis mutes, quas Galen. lib. 1. ad Glauco. cap. 8.
vocat tertianas omnium benignissimas: lib.
2. de caus. pul. cap. 1. dari quasdam inquit ter-
tianas, in quibus pulvis nullam facit mutatio-
nem ad inæqualitatem in principijs accessio-
num. Quod sit ortum ducant ex humore ex-
crementitio utili; tertianæ valde molestæ sunt,
patientes valde inquieti, anxij. De quibus agit
Galen. lib. secundo de Crisibus, cap. 3. Quod
non distant istæ continuis ardentissimis, &
acutissimis, quia istæ quoque habent maxi-
ma symptomata.

Si bilis alimentalis corumpatur, sunt ex-
quisitæ quidem, sed omnium deterrioræ.
Nam in principio accessionis statim uiden-
tur in tabem incidere, libro 10. meth. med.
cap. 3 & 4. fit quando bilis putrescens est ali-
mentalis.

Sumuntur etiam differentiæ à loco. nam
aliquando materia est collecta circa partes
naturales: hæc quando excitatur, habet om-
nia symptomata, quæ pertinent ad has par-
tes. libro de morb. temp. cap. tertio, per me-
senterium circa pancreas, est ibi pulvis retra-
ctio habent vomitus biliosos, anxietates, osci-
tationes, habent horrores potius; Sicut, quan-
do materia est in ambitu totius corporis, sunt
rigores vehementissimi, statim in principio,
libro 1. ad Glauco. cap. 6. præcedit inæqualitas,
& lassitudo.

À loco.

Denique differunt ratione causarum re-
motarum. Nam ex exquisitis quasdam ha-
bent omnes causas, quæ conspirant ad faci-
endam febrem exquisitam, & exquisitæ exactè
vocantur, aliæ non omnes. Si fiat ex staua bi-
le, temperamento sanguineo, & deficiat ex-
conditio: onibus aliqua, est quidem exquisita,
sed non exquisita exactè.

*À causis
remotis.*

Huiusmodi febris est facilis cognitionis. Cognoscitur enim ex temperamento regioneque calidis, uita autem calida, cibis calidis, & siccis precedentibus. Item si adsint etiam excrementa biliosa, urina ignei coloris. Adsint præterea sitis uehemens, dolor capitis, uigilia, inquietudo totius corporis, calor aeris, & mordax; pulsus uehemens, celer, & frequens.

Numquid uero sit continua periodica, an intermittens, cognoscitur. Si Periodica: quod de tertio in tertium. Si Intermittens ex interuallo, præterea pulsus, ubi nulla inæqualitas systematica, & nullus pulsus præter febrilem. Hæc habet quantum sit sui ratione: Nam potest præterea contingere aliud ratione alterius. lib. tertio, de prælag. ex puls. capit. 7.

**Signa differentia-
rū ex materia.** Cognoscetis etiam facile differentias huius: si ex humore & ichore, erit omnium mitissima, & breuissima. Si ex bile excrementitia inutili, pulsus nunquam degenerat ad paruitatem, uel imbecillitatem: Si putrescat humor accidentaliter excrementitius utilis etiam, statim post primam accessionem sentiunt maximam uirium affectionem.

Ex loco. Cognoscetis etiam differentias ex loco; quia, si materia putrescat in partibus naturalibus, incipit febris potius ab horrore, quam rigore, quamquam postea etiam rigor incidat: postea habent dolores tensuos, grauitatem circa hypochondria, aliquando uomitum, oris amaritudinem. Si in ambitu totius corporis, præcedit rigor uehementissimus, & facilius sudores erumpunt, quam uomitus, quam alui deiectio.

Prognosis. Hæc est ex sui natura salutaris sect. 4. aph. 95. septenis enim circuitibus ad summum absoluitur.

Dico ad summum, quia pro materia tenuitate consumitur aliquando in tribus, aut quatuor accessionibus.

Dico ex se, esse salutarem, quia ratione motus materię non admodum salutaris. Si moueatur maximo cum impetu ad os uentriculi, qui habent os ualde sensibile uentriculi, fit cardialgia talis, quæ desinit in syncopen, & mortem: quale exemplum meminisse uidisse, dum essem iunior. Alius etiam, qui principio incidit in hæmorrhagiam sanguinis, propter hanc incidit in syncopen, nec adstrictioris potuit præseruari, philonio fuit à morte præseruatus.

Curatio. In curanda exquisita tertiana, cuius naturam, & signa in precedentibus proposui, eū seruabo ordinem, quem etiam in ceteris omnibus curandis, sum seruaturus, ut scilicet primo de Chirurgico instrumento, deinde de Pharmaceuico, demum de Diata uerba faciam.

Num cō- Itaque, quantum ad chirurgiam; oritur ueniat uel consideratio, num in tertiana exquisita cō- ueniat uenæ sectio, nec ne? Ratio huius dubi-

rationis est: quia neque Gal. huius uenæ sectionis meminit lib. 1. ad Glauc. cap. 9 ubi ex na exquisita profectio hanc curationem proponit. Præterea uerò ratio etiā id persuadet: Nam in tertiana exquisita corpus est caco-chymum, bile abundat: In caco-chymia autem tam inu- tellixistis sect. 2 aphor. 17. lib. 4. de tuenda ual. cap. 4. non licere sectionem uenæ.

Ex alia parte Auic. suadet hoc loco, quando datur occasio secandi, illam esse ante tertium paroxysmum secandam.

Pro controuersia dirimenda distinctione est opus, neque semper abstinendum est, neque semper secanda. Primum distinguere oportet, an exquisita tertiana sit exacte exquisita, an simpliciter & absolute exquisita. Est exacte exquisita, quando habet omnes conditiones, quæ requiruntur ad huiusmodi febrem constituendam, habuit scilicet, aetatem, & tempus calidum, cibum, mediam, iniquitates, &c. Conspirantibus his omnibus conditionibus sit exacte exquisita, in qua non licet uenam secare, quia corpus est uere caco-chymum, necessario generatur bilis in maxima copia, propterea sanguis non abundat: Accedit, quod libro primo ad Glauc. capit. 4. in constitutione, regione, tempore anni calido, prohibet secandam uenam in febribus quibuscumque. Si in quacumque febre; multo magis in tertiana exquisita.

Sed si huiusmodi tertiana non sit exacte exquisita, sed simpliciter fiat, exempli gratia, in corpore sanguineo, sed tamen, in quo amara bilis sit, facta propter uictum, aerem calidum & siccum, uel retenta bilis propter excretionem consueta reientas, licet secare uenam, seruatis tamen alijs conditionibus, de quibus nunc dicam.

Itaque quādo non exacte est exquisita, adhuc oportet distinguere. Primum, utrum hæc materia, quæ facit febrem, sit excrementitia sola, an utilis, & salutaris alimentalis. Si excrementitia, potestis euacuare per uenæ sectionem: Si bilis utilis, eandem agendum, uires facile concidunt, patientes facile in syncopen incidunt; abstinendum ergo. Vbi uero excrementitia tantum, potest secari. Secunda conditio est, ut consideretur, in quo continetur materia hæc excrementitia. Nam si in ambitu totius corporis bilis contineatur, com. 2. in 1. Epid. text. 10. quidquid alij sentiant, non secanda. Ratio de supra partim ex lib. 4. de tuenda ual. cap. 6. partim ex 5. de tuenda ual. cap. 10. In cap. 6. ubi abundat humores in ambitu corporis, prohibet omnia illa auxilia, quæ possunt humores intro trahere, inter quæ etiam est uenæ sectio. Quod autem uenæ sectio trahat intra uenas, testatur etiam lib. quinto, de tuenda ual. cap. 10. Vult his secari debere uenam in latitudine phlegmonosæ; Primo enim euacuatur humor in uenis, & attrahit humorē, qui est extra uenas: Si debet ille uacuari, iterum uenæ sectio fieri debet.

Dicetur

Dicetis etiam, in hoc casu mittamus bis A sanguinem. Profecto, quia febris ex humore bilioso non conueniet, ibi loquitur de synocho, ubi alia est ratio.

Id ipsum agendum, ubi biliosi humores abundant in primis vijs circa pancreas, mesenterium, in his casibus, quorum ratione vsus, verëor, ne venæ sectio trahat istos humores in venas. Lib. 4. de tuend. val. c. 3. subdit, humores sunt in primis vijs, igitur potius opus est alia euacuatione per medicamenta. Sed si humores generentur in iecore, transmittantur in venas, ut semper excrementum collectum transmittatur in venas, admitto venæ sectionem. Est, quando febris non exactè exquisita.

Que re- Secunda autem cōmunis, vel basilica dex-
nascan- tri lateris, parceq. mittendus in die intermis-
de- sionis, ante, uel post tertiam accessionē. Auicenna vult, ante tertiam accessionem: Si tamen vires consent, etiam post tertiam, quartam, & quintam secunda.

Cucurbi- Cucurbitulæ in hac febre, si adhibeantur
in. gratia reuulsionis, possunt adhiberi in quacumque tertiana, siue exactè, siue non exactè exquisita, pro reuellendis humoribus calidioribus, qui impetum habent in cor, caput, os ventriculi, & in partes inferiores. Sed aliqui sunt casus, in quibus conueniunt cucurbitulæ, etiam dorso appositæ, & lumbis, quando materia sit in ambitu totius corporis, ibi colligatur, quia non diffletur, cutis sit constipata: in tali casu consulo, ut facta euacuatione per medicinas leues, adhibeantur cucurbitulæ dorso, & lumbis, ut euacuetur materia peccās per locum affectum. Lib. de cōstit. art. med. cap. 1. Gal. scribit serofos humores, & tenues, qui peccant per ambitum totius corporis, per cutem euacuandos esse: Biliosos aut præmisso leniente, & quæ sequuntur. Et propterea, quando lenita fuerit alius, poteritis adhibere cucurbitulas.

Pharma- Quantum ad Pharmaciam, leniatur pri-
cia Leni- mum alius. si bolos voluerint, hoc sequenti;
ens bol.

*℞. flor. cass. rec. extrah. Drachm. x.
pulp. tamarindor. Drachm. iij. M. & cum
sacch. s. bol.
exibeantur in die intermissionis,
vna uel altera hora ante cibum.*

Totio la- Si potum magis desiderent.

nit. *℞. syr. ros. sol. ꝑnc. ij.
viol. sol. ꝑnc. ij.
seri caprini, aut aqua cichor. q. s. Misc.
fiat potio.
capiat quattuor horas ante cibū.*

Syrupus Præparandi deinde sunt humores syrupis
præparās refrigerantibus, & humectantibus, quales sunt syrup. uiolac. simplex, syrup. de Endiuiā, de cichor. oxyfaccharū, syrup. ex acetosa, &c. ut Exempli gratia.

*℞. syr. viol. simpl.
acetos. simpl.
de endiu. an. ꝑnc. ss.*

aq. endiu.

cichor.

*portulan. ꝑnc. j. vel si multum siciant,
ꝑnc. j. & si*

In magna siti potestis etiam intermittere vsus syruporum dulcium, & præbere aquas illas stillatias ad viij. vel x. ꝑnc. ad lib. j. vel simplices, vel mixtas, cum emulsione seminum melonum cum ꝑnc. iij. Potestis etiam præbere ꝑnc. x. vel lib. jaque hordei, vel simpl. vel mixtæ cum iulepi uiolati ꝑnc. j. aut iulepi acetosi.

B Denique pro alterando potestis præbere lib. j. uel alteram seri caprini, aut simpl. vel mixti, cum emulsione seminum melonum. Hæc omnia habent vim præparandi humorem biliosum.

Neque hoc tempore prætermittenda externa refrigerantia, & humectantia, lib. i. ad Glau. cap. 6. Galen. inter externa proponit vsus balnei. Aduertatis. Ibi proponit duplicem usum balnei. Primum est ad alterandam caliditatem, & siccitatem corporis, quod vult administrari ante cōctionem humorum: secundum ad digerendos, & euacuandos per cutem humores biliosos putrescentes. Primum genus debet esse uix tepidum. Secundum calidiusculum. Propterea Auic. mentionem facit huius balnei digerētis, nūquam nisi post cōctionem. Gal. altero etiam ante cōctionem utitur. Hoc tempore non est in vsu, nihilominus consuetis, & in istis febribus, quæ habeant intermissiones, consulo, ut concedatis, præcipuè tempore æstiuo. Debet autem adhiberi tantum in die intermissionis, & esse uix tepidum, & post balneum conuenit inunctio totius corporis ex oleo uiol. & amygd.

Si quis non potest uti balneo, epithemati-
bus refrigerantibus, ad cor, & recurrit vtdum. Pro corde conuenit tale.

℞. aq. acetos.

nympheæ ana. lib. ss.

res. ros. ij.

spec. diatrion santal. drach. ij.

aceti ꝑnc. j.

camph. gr. vj. M.

D & cum lincolis duplicatis madefactis in huiusmodi aqua non admodum frigida, madefiat regio cordis. idq; sæpius faciendum. Pro iecore conuenit hoc.

℞. succor. andiu.

cichor.

hepat. an. ꝑnc. ij.

spec. diatrion. santal. drach. ij. Misc. s.

Epithem. icoris.

Hi succi pariter per lincola madefacta & frigida tempore æstiuo imponenda: tempore frigidiore tepida, & multoties, ut dixi, de corde.

Facta humorum Præparatione, conuenit expurgatio per uomitum, aluum, sudorem, & urinas.

Vomit

Vomitus

Vomitus in illis tantum Tertianis tentandus, in quibus materia biliosa impetum habet ad os ventriculi, secus non. Et tempus excitandi vomitum est illud, in quo iam materia ipsa habet huiusmodi propensionem. Itaque cum magna ex parte circa principium accessionis moueatur hic vomitus, licebit hunc excitare sequenti Mixture.

℞. aq. bord. vnc. vj.

olygd. dulc. vnc. ij. M.

Clyster.

Educat per aluum, aut clysteribus, aut medicamentis. Clysteres sint refrigerantes qualis erit iste.

℞. decocti hordei

Violarum.

Afalua.

Beta lib. j.

℞. rafs. vnc. ss.

sacch. rubr.

ol. viol. an. vnc. ij. M.

Purg.

Pro Purgante medicamento vtebatur oilum Galen. noster absint. mixto cum meliorato: qua in parte accusatur ab Alexandro Trall. Nos hoc tempore loco absinthij vtimur rhabarbato, quod plus potest. Vitamini autem in Bolo secundum hanc formam.

℞. rhab. el. maturi pulu. drach. j.

℞. cass. nou. extr. vnc. j.

pulp. tamarind. drach. ij.

M. & cum sacch. f. boli.

Bolis.

Si libenter superbiberint serum, concedatur ad lib. j.

Potio.

Si potum desiderent. *℞. rhab. el. drach. j. infunde, vel in sero caprino, vel aq. Endiu. f. a. & facta expressione, adde syr. viol. sol. ana vnc. ij. vel vnc. ij. M. f. potio.*

Purgat. per urin.

Expurgatur per urinas, exgibeatis singulo mane serum caprinum mixtum cum emulsione seminum melonum, quæ emulsio sit extracta cum decocto apij, anethi, petrosel. aut fenic. vel simplex, vel mixta cum sero, vel aqua hordei.

Per sudorem: Corroborantia.

Ad prouocandum sudorem vtebatur Gal. balneo, apud nos non est in vsu.

Et sic expurgatur materia; cui succedit Corroboratio, seu Alteratio, quæ fit internis, & externis.

Interna

Interna sint refrigerantia & humectantia: quia causa calor, & siccitas iecoris, & vniuersi corporis. Id fiet nunc hac Conserua.

℞. conseru. uiol.

cichor. andrach. j.

℞. triasane. drach. j. M.

Externa

Accipe singulo mane vnc. ss. duabus horis ante cibum.

Externis etiam poterunt vti eo ipso epithemate, quod proposui.

Vitus ratio.

His accedat Vitis ratio conueniens, refrigerans scilicet & humectans. Quadam olea, potissimum facta imminutione humorum, conueniunt, vt bera, lactuca, &c. Vx fructibus frigidi, & aliqua siccitate præditi, grana granatorum, citrangu, limones, cerasa acida. Quic,

etiam melones concedit, sed scilicet corrumpuntur. Quantum ad reliqua, concedi possunt uua, pisces, quandoque carnes teneriores.

Quando autem febris fuerit ex putredine humorum alimentalium, nutries paulo ante, vel in accessione. Propterea diligenter attendendus motus accessionis.

Hæc est curatio tertianæ intermittentis legitima, ex qua potestis intelligere & naturam, & curationem Continuum. Loquor de exquisita. Hos tantum differunt, quod continua, licet fiat ex bile, quatenus periodica, itaque in hoc conueniunt. Differunt autem, quod in exquisita continua, bilis non est tantum bilis flaua, sed etiam porracea, æruginosa, vitellina. Omnes denique species bilis, quamuis prauæ:

Differunt etiam loco. In continua enim materia hæc biliosa materia peccat in venis, & non transmittitur extra venas, vel saltem non tota; & non transmittitur in declinatione accessionis extra venas:

Per venas intelligo communes, & determinatas: per determinatas, non determinatas cordi proximas; nam fierent ardentissimæ: Itaque in venis magis distantibus: Igitur habet easdem causas remotas, & habet etiam eadem signa, quam intermittens tertiana. Hoc tantum differt, quod Continua nunquam deuenit ad infebriationem, habetq. symptomata omnia grauiora, & est magis periculosa.

Quantum ad curationem in nullo differt, nisi quod huiusmodi continua necessarium est vt venæ sectione absque tor distinctionibus. Similiter, quantum ad Alterantia debet esse victus ratio tenuior.

De tertiana Notha Intermittente, & continua. Cap. XXXIII.

Febris tertiana, vt dictum est, exquisita est, & notha: & vtrique est tam intermittens, quam continua. De exquisita tam intermittente, quam continua hæcenus dictum est: succedit in præsentia tractatio de biliosa notha, pariter tam intermittente, quam continua.

Est huiusmodi febris (biliosa notha intermittens & continua,) producta ab humore bilioso permixto putrescenti maiori ex parte excrementitio.

Quatenus itaque sit a bile, distinguitur a ceteris omnibus febribus pituitosis, sanguineis, melancholicis. Vt sit a bile permixta, differt a tertiana exquisita: vt ab excrementitia, à continua conclusa, quæ vocatur febris ardens, orta ex pituita salsa: Nam huiusmodi habent originem, vel ex vasis communibus, vel cordi proximis, quando caret accessionibus: sed omnia diligentius sunt examinanda.

Per bilem permixtam, intelligo permixtam, & cum pituita, & melancholia, & cum

L vtrouque

Conti-
nua.

Differen-
tia inter
tertiana
intermit-
tentem,
& conti-
nuam.

Curatio
continua.

Quid no-
tha?

quid per-
mixta?

utroque succo quamquam lib. 1. ad Glau. A
non videatur mentionem facere alterius mi-
stionis, quam bilis cum pituita.

*Causa
materia
lis.*

Per pituitam vero intelligo & tenuem,
& crassam. Nam ex aqua, & tenui pituita fit
bilis pallida. Ex crassa permixta cum bile fit vi-
tellina. Ex quibus inuicem mixtis vera mi-
stione (per veram mistionem autem intelli-
go miscibilium alteratorum veram vnionem,) fit
febris hæc notha tam continua, quam in-
termittens; a differentiam earum, quæ etiam-
si proueniam ex duobus humoribus, sunt ta-
men febres separatæ: quia tunc humores non
sunt commixti, sed iuxtapositi. Itaque est
mixtio pituitæ tenuis, crassæ, & melancho-
licæ.

Huiusmodi mixta, si in fine accessionis ex
toto transmittantur extra. vel ex toto dige-
rantur, faciunt notham intermittentem: Si
retineantur, pariter notham, sed conti-
nuam.

*Locus
fectus.*

Locus, in quo facit hæc materia febres,
sunt venæ communes, & determinatæ. Quan-
do communes, sunt distantes à corde, quæ
magis proximæ carnibus totius corporis: non
sunt illæ inter alas, & inguina: ubi sunt cau-
sonides: Et huiusmodi materia ibi non ge-
neratur, sed transmittitur, ut docui, in vniuer-
sum ab aliquo loco determinato. Semper est
locus, qui generat, & transmittit excremen-
tum in venas remotas. Et propterea facit pe-
riodicam. Si mittatur extra venas, erit sta-
tim intermittens. Pariter potest huiusmodi
febris continua, & intermittens fieri ex locis
determinatis, sed ignobilioribus. Hæc itaque
materia, loci, & causæ, propter quas intermit-
tat, & sit continua.

Ex his etiam patet, quomobrem huiusmo-
di intermittentes nothæ sint aliquando lon-
giores, aliquando breuiores. Nam omnis,
quæ transit horas duodecim, est notha: Le-
gitima enim non transit. Si paulo plus duo-
decim horis duret, vel quattuordecim, sex-
decim, vocatur notha simpliciter: Si viginti
quattuor, protensa; si triginta, valde, & mul-
tum protensa.

*Causa
mediata* Causæ mediatae sunt ex parte temperamen-
ti, ætatis, sexus, vitæ antea, cibi & po-
tus, somni, otij, &c. Possunt enim augere ex-
crementum pituitosum, biliosum, melancholi-
cum, vel omnia simul.

Signa: Cognoscitur primum quidem, ut notha, ex
causis prægressis, ex symptomatis concomitan-
tibus ipsam febrem. Ex causis prægressis, ut
si præcessit victus ratio varia, si vbi fuerint ci-
bis acerbis, edulij crassi succi, placentulis va-
rij, coniiciamus adesse pituitam.

Quod dico de hoc, dico etiam de Melan-
cholico. Quale etiam erit temperamentum:
Nam admodum calido possunt augeri bilis,
& melancholia lib. 2. de cr. sc. 12. Ex sympto-
matibus præsentibus, si respiciatis primum
ad excrementa alui: Nam excrementa varia

erunt, partim biliosa, partim melancholica,
partim pituitosa; vomitus mixti: vrinæ erunt
quidem rubræ, attamen habent sedimen-
tum crassum; sudores erunt copiosiores, &
fæcentiores; sputa copiosa. Accedunt etiam
signa ab Actionibus læsis, vigiliæ non admo-
dum intensæ, habent capius dolorem grau-
ium, non delirant. Propterea habent mo-
tiones corporis magis impeditas. Corpus est
grauē: Lassitudinem habent tensuam, in-
æqualitas est maior, pandiculationes frequen-
tiores, sitis non adeo ingens, nec oris amari-
tudo nec calor febrilis ita mordax. Præter-
ea principium accessionum non fit cum rigore
vehementi, sed potius cum horrore, & in-
crementum inæquale, tempus inæqualitatis lon-
gum.

Cognoscetis autem huiusmodi febrem esse
Intermittentem, quando intra 48. horas ad
minus habet duas, tres, quattuor, intermissio-
nes; ad differentiam continuæ.

*Signa in
intermittē-
tis.*

Hæc febris, si sermo sit de intermittente,
est semper salutaria: Sed tamen pro varie-
tate, & quantitate humoris permixti cum bi-
le, & parte, a qua generatur valde potens
aliquando, ut secundum Galenum sex menses
aliquando duret. lib. 1. ad Glau. capit. 8. Vbi
intercedit tanta longitudo, multi errores com-
mittuntur.

*Prægn-
antia.*

Continua verò, quatenus continua, quan-
quam periculosa, manifestè declinans, est mi-
nus periculosa, quam reliquæ.

Curatio tam intermittētis, quam conti-
nuæ, perficitur tribus instrumentis propositis.

Curatio

Quod ad Chirurgiam; in hoc instrumento
est aliqua difficultas, utrum conueniat? Nolo
vos diuini detinere: Gal. lib. 1. ad Glau. c. 10:
proponens curam tertianæ nothæ, inquit, ali-
quando conuenire: sed non docet nos, semper
administrandam, nec docet, quando, & quando
non administranda: quod ego vos docebo.

Considerare oportet, numquid huiusmo-
di tertiana notha habeat humores biliosos
peccantes, genitos ex temperatura naturali,
calida, & sicca, atque habitu corporis gracili;
pituitosos vero ex errore in victu. Tunc enim
abstineat a venæ sectione, quia vniuersum
huiusmodi corpus est cacochymum ex du-
plici causa. Prima est cacochymia naturalis:
altera est acquirita, & præter naturam, facta
ex prauis edulij. Non igitur opus venam se-
care. Sed si contra in temperamento calido &
humido sanguineo aucta sit bilis, pituita, & me-
lancholia, ex errore in victus ratio; ut facilius
corriganetur: in his casibus, tunc adest cacochy-
mia spuria, & plenitudo aliqua, & licet venam
aperire, dummodo vires permittant, & libenti-
us secabitis in continua quam in intermittente.

*Venæ se-
ctio num
est quan-
do conue-
niat.*

Et si vobis videatur, venam sectam in cubi-
to posse nimium corpus debilitare, consueui se-
care venam saluatellam, si hæmorrhoides non
sint innata: si vires sustineant, communem,
vel basilicam.

Cucurbi-

Cucurbitulæ conueniunt etiam, sed nunquam lumbis & dorso imponendæ, ut in exte.
qualita tertiaria, ubi humor est subtilis, syncera bilis, simul cum tenuibus ichoribus, per cutem expurganda: sed humor crassus non per cutem expurgandus, propterea adhibeat is infernis parubus, quando reuulsione opus fuerit.

Pharmacia. Quantum ad Pharmacia, lenienda aluus hoc Bolo;

Re. spec. hiera simpl. drach. ij.

et. lenit. ꝛnc. j.

manna El. ꝛnc. ss.

M. sine sacch. f. Soli. accipiantur duabus horis ante cibum.

Potio sit talis:

Re. mel. ros. sol. ꝛnc. iij.

syr. ros. sol. ꝛnc. ij.

aq. beton. q. s. M. f. potio.

Preparantia. Preparabuntur humores hoc syrupo.

Re. oxymel. simpl.

syr. acet. simpl.

de beton. an. ꝛnc. ss.

Syrupus

decoct. beton.

agrim.

cichor.

origani.

borrag. ꝛnc. iij.

M. pro syrupo.

Nec miremini, in febre tertiana nos uti ijs, quæ potius pituitam, quam bilem respiciant: Et si enim bilis videatur prævalere, ratione tamè quantitas superat pituita.

Preparatos humores licet deinde expurgare vomitu, clysteribus, medicamentis diureticis, & sudorificis.

Quantum ad Vomitoria, debent administrari potius à cibo, quàm ante cibum. Est doctrina Gal. lib. 1. ad Glau. c. 10. Imò tantam præbet Gal. istis vomitorijs fidem, ut dicat solis his, quandoquæ longas febres fuisse expugnatas. Ut profecto hoc ego propria obseruatione obseruauim, in quo etiam maximè confido, & consulo, ut vos etiam insistas, & à cibo: Nam præterquam, quod facilius sit vomitio, accedit, quod tunc pituita viscida, & lenta melius euacuetur. Nam post adhaeret tunicis, ut faciliè possit tolli.

Vomitorium. Vomitorum sit tale;

Re. oxymel. simpl. ꝛnc. iij.

decoct. anethi in iure ꝛnc. vj. M.

Præter vomitoria sunt clysteres, qui maximè conueniunt, ubi materia peccat in venis meseraicis, ut;

Clyster.

Re. sol. chamom.

anethi an. p. j.

malu.

mercur. an. M. ss.

susaris M. j. decoct. f. a.

Re. dicti decoct. lib. j.

sacchari.

mell. ros.

ol. communis an. ꝛnc. iij.

salis drachm. j. M. iso f. clyster.

A Quod ad medicamentum Purgatorium, potest quidem eligi ex efficacioribus, diatri-dium, colocynt. Sed oportet sequi consilium Auicennæ & Gal. ut quamquam sit fortis, eligatur debile. Galen. lib. 1. ad Glau. cap. 10. ubi proponit curationem tertianæ nothæ: sicut vidistis me pluries facientem, ut parum & sape euacuarem.

Ego etiam utor hac medendi ratione. Conficio pilulas tales;

Re. pil. aggreg. drach. j.

mastrich.

de trib. cum rhabarb. an. drach. ss. M.

cum mell. ros.

f. pil. vi. & deurentur.

B Præbeo duas ex his hora vna ante cenam in die intermissionis, nam mouent aluum, etiam antequam adueniat sequens accessio; si horæ sint valdè tempestiue, manè præbeantur. Eo ipso die intermissionis oportet insistere in præparando, attenuando, tam internis, quam externis, ut exhibeo istos trochiscos cum syr. sequenti.

Re. trochisc. de absynth.

de rhab.

de cupat. an. drach. i. M.

cum syr. byzant. f. pil. x.

& de aurentur. harum præbeo duas summo manè, post quas statim super bibant hunc syr.

Re. syr. de cichor. Nicol.

absque rhab. drach. j.

oxymel. simpl.

syr. byzant. cum acet. an. ꝛnc. ss.

decoct. origani.

pulegij.

agrim.

absynth.

cichorij.

borrag. drach. iij. M.

Externis adhibenda fomenta, & inunctio- nes calidæ præcordijs: quod est etiam Galeni consilium loc. cit. ex quo obiter volo vos intelligere, huiusmodi febres nothas magna ex parte ortam ducere ex obstructione viscerum.

Fomentum sit tale;

Re. malu.

althææ an. M. j.

flor. chamom.

anethi.

melil. an. p. i.

absynth.

spica.

calam. arom. an. M. ss.

sem. lini ꝛnc. iij. f. decoct.

f. a. f. expressione per spongas ac pennas laneos. fiat fomentum mesenterio, & præcordijs ante cibum manè & vespere, in die intermissionis, vel si febris sit continua in horis declinationis.

Postea fiat talis inunctio;

Recip. ol. amygd. dulc.

amar. an. ꝛnc. iij.

uini arom. drach. iij.

L. a. succi

Fomen- tum.

Inguen- tum.

*succi cib. vnc. j.
absinth.*

Spica an. M. ff. bul. vsque ad consumptionem vini, & succi, & facta expressione fiat inundo, quæ facienda est non superficialiter, sed cum aliqua compressione & impulsione partium abdominis versus ilia: sic paulatim euacuando per aluum, urinas & sudores, expurgabitur materia, nec augebitur.

Vidus ratio.

Quantitas cibi.

Qualitas

Potus.

Si adhibeatur conueniens vidus ratio, quæ in hoc est posita, vt, si vires sint robustæ, nutriatur tantum alternis diebus in tertiana intermittente. In continua melius est diuidere cibum, & paululum præbere: sed in die accessionis non nisi in horis, vbi febris declinabit.

Quantum ad qualitatem cibi, est etiam manifesta. Oportet abstinere ab oleis, à fructibus, & etiam à piscibus, & concedere dumtaxat oua & pullos iuuenes.

Pro potu potius bibant mulsam. Hæc de curatione febris continuæ & intermittentis, &c.

De febre ardente, seu caustionide, aut caussa.

Cap. XXXIII.

Biliofa febres cum Galeno lib. 2. de diff. febr. cap. 2. & lib. 2. de crisibus. capit. 3. & cum Auic. fen. 1. lib. 4. tract. 2. cap. 34. in tres differentias distinximus: quarum prima continebat tertianam intermittentem tam legitimam, quam spuriam. Secunda tertianam continuam periodicam declinantem, pariter tam legitimam, quam spuriam, de quibus omnibus iam dictum est. Tertia differentia continebat febrem Caustionidem, vel caussam, vel ardentem, de qua nunc. Et quia huiusmodi febris multiplex est; quamquam genere vna videatur, idcirco peto vestram attentionem.

Febris ardens, quæ & causton apud Galenon dicitur, quandoque etiam lypytia vocatur. Dico apud Galenon quia apud Auic. est multo diuersa a lypytia Gal. quia a Gal. inter ardentem numeratur, ab Auic. inter pituitosas; quamuis scribat etiam Auic. ex bile fieri, tamen non est ardens. Est tamen apud Gal. ita species ardens, vt valeat consequentia: est lypytia: ergo ardens non e conuerso.

Febris ardens dupliciter accipitur

Febris igitur ardens quandoque a Gal. accipitur improprie, quandoque proprie. Improprie pro omni febre biliosa exquisita, dummodo habeat insignem ardorem: Hac ratione febrem intermittentem vocat ardentem lib. 2. de diff. febr. c. 3. & lib. 8. de plac. Hipp. & Plato. c. 6. & lib. de palp. rig. &c. cap. 7. Proprie tamen accipitur tantum pro febre continua, & continua non declinante, cuius definitionem integram subiungo.

Quid causus.

Causus propria accepta est febris continua exurens, non declinans, ex quacunque bile, & ex pituita falsa putrescente in venis, vel omnibus, & maximis, vel saltem proximis cordicem, & ci-

Atra inflammationem. Est definitio satis longa, quam necessarium fuit asserere, vt complecterer omnes febres, quæ sub nomine febris ardentis comprehendi possunt.

Dixi esse continuam ad differentiam biliosæ intermittens.

Exurentem ad differentiam synochi sanguineæ, & pituitosæ, & aliarum, quæ non habent æstum ita vehementem.

Continuam non declinantem) Per hanc intelligo & continuam conclusam, & continuam periodicam. quod detur febris continua conclusa biliosa (nam de hac est sermo) legit Galeno sect. 4. aph. 58. & 59. omnium maxime lib. 2. de diff. febr. c. 1. & lib. 2. de cris. c. 6. His locis febrem biliosam ardentem inquit, appellari synochum. Aliquando etiam hæc febris hent periodos, sed non declinat, in quo distinguitur à Tertiana Continua Periodica iam explicata, q̄ declinabat: hæc verò, quamquam hæat exacerbationem, periodos; nihilominus nunquam declinat, semper est ardentissima. De hac periodica sermonem facit Gal. & Hipp. com. 1. in 1. epid. 1. 75. Ibi proponit Hipp. naturam febris ardentis omnium periculosissimam, quam tamen inquit habuisse accessiones diebus paribus, intelligit febrem ardentem, quæ singulis diebus exacerbatur, & hæat vehementes accessiones diebus paribus magis quam imparibus: de hac & idem Hipp. com. 3. in 3. Epid. text. 36. quando loquitur de febre ardente. Itaque datur febris ardens & conclusa, & periodica, quæ non declinat.

Causa huius febris est omnis bilis. Sic. n. dixi, ex quacunque bile, per quamcumque intelligo lyceram, & mixtam, lyceram tum naturalem, tum genitam ex vitione.

Quod fiat ex bile naturali, patet lib. 2. de diff. febr. cap. 2. lib. 2. de cris. c. 6. & sect. 4. aph. 58 & 59. vbi scribit, ex bile flaua putrescente fieri huiusmodi febrem.

Sed fit ex bile etiam exusta, siue sit prassina, æruginosa, vitellina. De hac com. 3. in 3. epid. text. 75. quod vomitio æruginosa bilis est proprium ardentium, loquitur de malignis.

Fiunt etiam ex bile pallida, quæ est bilis mixta, ex bile flaua, & humore tenui. com. 1. in 1. epid. text. 9.

Sed præter eam sunt etiam febres ardentes, ex pituita falsa. De hac loquitur Hipp. & Gal. 4. agur. a text. 13. vsque ad 19. vbi Hipp. proponit duas causi species ex bile & pituita falsa. Cæterum pulchra oritur consideratio, si fit ex pituita falsa, qualis sit huius generatio? Grauiissimi medicinarum parentes digladiantur. Auicennas in Galenum inuenitur. Valeriolam lib. 1. Enar. c. 7. ipsum Gal. defendit. Gal. lib. 2. de diff. febr. c. 6. existimauit pituitam fieri falsam ob duplicem causam: vel ob putredinem, vel perimissionem falsæ sexosæ humiditatis cum pituita. Auicenn. fen. 1. lib. 1. tract. 4. cap. 1. aliam proponit sententiam, & inquit fieri ex mistione humoris aquei cum bile quæ: s

Causa:

Quo pituita fiat falsa.

por-

portionibus mistis. Hanc eandem sententiam explanat Fen. 1. lib. 4. tract. 2. cap. 41. Ego nolo fufius hanc quæstionem tractare neque disputare, an fiat ex miftione aquæ cum bile. Primum, ut ingenuè dicam, quid sententiam. Non accipio libenter Auic. sententiam in medium allatam; quandoquidem præterquam, quod experientia ipsa docet, nihil amarum miftum cum aqua recipere saporem salsum. ratio etiam id persuadet. Nam sapor salus lib. 4. meteor. cap. 3. & lib. de sens. & sensibili est sapor, qui oritur ex materia inconcocta:

*Quid fa-
por sal-
sus.*

Non potest igitur fieri, ut ex sapore, qui iam vltimorem suscepit coctionem fiat (si caliditas agit in amarum saporem, fiet magis amarus.) Propter non placet opin. Auic. Melior itaque Gal. videtur, pituitam salfam fieri ex salsa serosa humiditate admixta. Nec accusandus, quasi principium petat (Gentilis hoc facit) cum inquit Salsi saporis causam esse salsum humorem. assignat causam falsedinis in pituita. Siquidem ait fieri ex miftione siccæ & terrestris cum humido aqueo cum partibus siccioribus.

Quantum ad aliam causam falsedinis, quæ est putredo, aliqua ratione est corrigenda. Primum, non existimo salfam pituitam solam semper ex putredine fieri: nam ita in quotidiana omni esset pituita falsa. Non omnis putredo est causa falsedinis. Præterea non est hæc causa perpetuè veritatis. Nam si putredo causa falsedinis esset, esset causa, quia deficit calor innatus pituitæ, vel quia superabundet calor externus. Si dicat, quod contingat primo modo, hoc est falsum: nam potius fieret acidum (lac enim fit acidum, dum amittit propriam caliditatem.) Si secundo modo: hoc quidem est verum; nec tamen hæc causa sola, sed omnis caliditas vehemens externa agens in hanc pituitam, etsi non sit putredinalis, est falsedinis causa. Et propterea siue resideat pituita in capite, venis communibus, potest fieri, ut pituita euadat falsa, quæ est falsa ex permissione serosæ humiditatis, aut ex putredine, aut quacunque alia caliditate existente in corpore vehementi. Hactenus de causis.

*Locus af-
fectus.*

Quantum ad locum affectum: dixi eum aliquando esse venas communes, vel omnes, aut saltem determinatas, sed cordi proximas. De venis communibus loquitur Galen. sect. 4. aph. 3. & 9. lib. 2. de diff. febr. c. 2. & lib. 2. de cris. c. 6. De omni quæ sit ex vasis determinatis, & cordi proximis loquitur 3. in 3. Epid. text. 33. 2. in 1. epid. 2. o. quibus locis scribit, febres ardentes fieri ex venis iecoris, ventriculi, pulmonum. Denique dixi huiusmodi febres ardentes cum, vel sine inflammatione. Quod fiant cum inflammatione, & ardentes vocentur, testatur Gal. lib. 2. de cris. c. 7. ubi febres ardentissimas fieri ex erysipelate iecoris. Istæ ardentes (ut tandem veniam ad lipurias) vocantur etiam a Gal. lipyriæ. Dico istas, quæ scilicet ex vasis determinatis cordi proximis siue cum, siue citra inflammationem fiunt. Potestis hoc colligere

A ex sect. 4. aph. 48. Vbi Hipp. scribit, in febribus non intermittentibus, si externæ quidem partes frigide fuerint, internæ verò ardeant, ac sitim habeant, lethale est. Inquit Gal. hoc esse proprium illarum febrium, quæ vocantur lipyriæ, quas in fine cominquit esse febres inflammationum; & clariùs 2. prognost. text. 4. in fine, quia loquitur ibi Hipp. de febribus quæ habent refrigerata externa cum ventre, & costis calidis: sed aliquando vocat etiam lipyrias, quæ sunt ex putredine humorum in venis contentorum absque inflammatione: quinimo scribit, hanc magis propriam esse significationem lipyriæ. 7. aph. 42. Inquit enim, antiquos nullam febrem ex inflammatione vocasse febres, sed tantum Epalitudem, &c. Febres autem vocabant tantum principales, quibus dederunt postea varianomina, Typhoden, Eloden, Lipyræ, &c. & quæ sequuntur.

Hactenus habuistis omnes differentias, & Differentias causas febrium ardentium. Itaque ut colligamus: Ardentium febrium hæc differentia. Aliæ sunt quidem continuæ, continentes, conclusæ Synochæ; aliæ periodicæ, sed non declinantes: aliæ ex bile syncera, vel flava, vel exusta; aliæ ex bile pallida mixta pituitæ: nonnullæ ex pituita falsa; aliæ ex venis communibus, quædam determinatis: aliæ cum inflammatione; alii citra eandem.

Harum omnium signa proponenda modo sunt: & primum Ardentium ut ardentia. Secundum, continuarum conclusarum. Tertium, Periodicarum. Quarto, biliosarum syncerarum. Quinto, biliosarum ex admixtione. Sexto, biliosarum continuarum. Septimum, ardentium ex pituita falsa. Octauum, earum, quæ sunt ex venis communibus, & determinatis. Nondum, earum, quæ cum, vel citra inflammationem.

Ardenes, ut ardentia sunt, duo habent Pathognomonica signa: sium incæpugnabilem, & ardorem maximum, vehementissimum, numquam deficientem, quæ prodosita partim ab Hipp. partim Galen. 4. acut. 13. 3. in 1. epid. 34. & alibi.

Continuæ, ut conclusæ, habent vnicum signum quod scilicet nullas unquam habeant exacerbationes.

Periodicæ etiam si non declinent, habent tamen singulis diebus, vel alternis quasdam leues exacerbationes.

Quæ sit ex flava bile syncera, habet omnia signa proposita in tractatione febris biliosæ intermittens.

Quæ ex bile exusta, habet omnia signa vehementissima, & Pathognomonica, & Superuenientia. Quantum ad Pathognomonica, adest sitis omnium vehementissima, ardor febrilis vix tolerabilis. Superuenientia etiam maxima deliria, dolores, vigilæ, inquietudo corporis, excrementa colligatiua alui, crocea, pinguis, fetentia, corpus emaciatum.

*Signa ar-
dentium
ut arden-
tes sunt.*

*Signum
continua-
rum con-
clusarum
Periodi-
carum.*

Ex bile pallida, febris est quidem ardens, sed omnium mitissima, & ita mitis, ut Hipp. 3. in 3. epid. 34. videatur aliam febrem hanc abardentes constituere. Inquit enim fuisse tunc temporis constitutionem, &c. Galen. in com. querit, & iure, qua ratione hoc cognosci possit, si deficient hæc signa pathognomonica, scilicet si & ardor? Ego non potui intelligere G-l. utrum soluat hoc dubium, necne. Nam eius verba non ostendunt: Puto tamen solui posse. Et puto dixisse Hipp. in febre ardente hac deficere sitim, & ardorem: sed comparatiuè locutum respectu, & ratione aliarum, ratione enim aliarum non est ita vehemens.

Dicitis, qua ratione ergo differt ab alia continua spuria? In hoc, quod in ardente, quamquam sitis non vehemens, calor non exurens, tamen perseverat toto febris tempore, nulla est hora, in qua non sentiat patiente sitis, & ardor. In alia potest aliquando adesse sitis & calor maior, sed non est perpetuus, habet intervalla: Preterquam quod ad sunt alia signa proposita ibi ab Hipp. (non vigilans, sunt comatosi, vrinæ non inflammatae.)

Cognoscitur ardens ex pituita falsa. 4. acut. 13. & 14. in quo casu sitis adest, lingua est arida & sicca, sed non est amara, sed falsa. Præter ea aliud est soluta, lubrica, ex materia pituitosa, viscida, & lenta, ut observavi, & notavi sentiunt maximam lassitudinem in universo corpore: vrinæ præferunt insignem crassitatem, aliquando adest stranguria. Hipp. loco citato.

Cognoscitur ex venis communibus ad differentiationem, quæ ex locis determinatis, omnium maximè ex symptomatis. Nam quæ ex determinatis, habet propria symptomata. Quæ ex pulmonibus, difficultatem respirationis maximam, pulsus omnium maximè inæquales, patientes videntur suffocari: Et sic, quæ fiunt ex iecore, ventriculo, &c.

Ardentis febris Prognostica capiuntur a genere, causis, tam proximis, quàm remotis, à symptomatis, & locis patientibus.

Prognostica febris ardentis a genere. A genere primum: Nam omnis febris ardens, proprie accepta, quatenus continua, absque vlla declinatione semper est periculosa. 4. aphor. 13. Febres quæcumque tertio quaque die fiunt fortiores, periculo non vacant. Galen. in com. dicebat esse eas, quæ vel ex viscerum inflammatione, vel maligna putredine oriuntur.

A causis proximis: A causis quidem primè proximis. Nam ardentes ex flava bile sunt ceteris benigniores, si comparantur cum illis, quæ ex vitellina, exusta, portacea, æruginosa, crocea, quæ periculosiores.

Remotis: Quantum ad causas remotas, periculosior ardens in ætate senili, tempore anni frigido, quàm contra. Sententia Hippocr. & Gal. sect. 2. aph. 34. Et ratio est quam assignavit Galen. in comm. quod scilicet, ubi ardens febris sit in senibus, magnus est recessus à naturali statu.

A symptomatis: Quantum ad symptomata, ostendunt huius febris perniciem, siue sint pathognomonica, siue superuenientia. Ex Pathognomonica duo sunt præcipua: sitis inexplebilis, & calor vehementissimus, quæ quo vehementiora, eo periculosior est febris. Sed non modò periculum ostendunt hæc symptomata, quando ad sunt, sed etiam quando præter naturam absunt: ut sit in lingua arida absit sitis ratio 1. in 3. epid. text. 5. Et, ubi lingua est arida, nec sitis adest, alterum duorum est necessarium; vel facultatem appetentem oris ventriculi esse extinctam, aut gravi delirio patientes vexari. Potest tamen fieri quadoque, ut in lingua arida, & febre ardente tussis parva aliqua ratione sitim imminuat. 4. aphor. 54. Hippoc. in febribus tussis sicca parum irritans, sium mitigat. Nam ex huiusmodi tussi excitatur aliqua humiditas, vel ex pulmonibus, vel cerebro, quæ fauces irroret; propterea oportet vos esse attentos, quando videatis sium non adesse, & lingua sit arida.

Cognoscitur etiam periculum ex superuenientibus, quæ proposita 2. in 1. epid. 75, quorum aliqua sunt critica importunè apparentia, & imperfectè, alia absolute prava.

Prioris generis sunt rigor in principio, sudor deiectio alui.

Inter Imperfectè apparentia stillicidium sanguinis narium: quia euacuatio sanguinis narium est propria crisis salutaria febrium ardentium, ubi copiose excernitur: contra ubi parum.

Alia signa pessima, refrigeratio extremorum, sudor circa nates tremor, & conuulsio, delirium, vigilia, inquietudo, colliquatio excrementa, vrinæ oleosæ pingues, vomitiones, & alia, de quibus in vniuersalibus.

A locis affectis: Quantum ad locos affectos: periculosior est, quæ ex locis determinatis scilicet pulmonibus, ore ventriculi, iecore, quàm quæ ex venis communibus.

Iudicatur huiusmodi febris, quando est salutaria, tribus modi; vel per fluxum sanguinis narium, ut docuit Galen. 4. acut. 11. & 1. in 1. epid. 75. Secundò, aut per sudores. Tertio, & alui excretionem. 4. aph. 58. Idem Galen. Ardens, quæ ex pituita falsa, potius iudicatur per abscessum, vel ad partes superiores, quàm inferiores. Dico potius, quia Hipp. 4. acut. 17. inquit, febrem ardentem ex pituita iudicari etiam per fluxum sanguinis narium, &c. sed in com. inquit Gal. huiusmodi iudicationem esse admodum raram.

Curationem distinguemus in duo præcipua capita. Primum continebit ardentes ex bile syn-ardentis cera, siue sit naturalis, siue exusta. Secundum ex bile ex bile spuria, & pituita falsa. Syncera si

Quantum ad priorem, dubium est, num in hac conueniat venæ sectio? Et dictum est, si siue ex qua Auic. sen. 4. lib. 1. de Phlebot. scribit, cauendum in venæ sectione ne æger ad alterutrum deducatur extremum, vel periculum cholæ.

choleericum. Sed sic est, quod nulla est febris, in qua magis impendat choleoricorum periculum, quam in hac. Itaque videtur Auicem. prohibere venæ sectionem. Et profecto in causonidis curatione, inquit, *non secabis venam*: nam fortasse iuuabit, fortassis non.

Ex altera parte Hipp. conuulit secundam, vique ad animi deliquium: nam facilliter iudicatur huiusmodi febris, per fluxum sanguinis narium.

Nec tamen accusandus Auicem. tamquam stupidus, ut eum accusat Alimarus, & Valesius. Non debetis secare in ardente quacunque, sed habita distinctione: quando febris ardens sit exquisita exacte, non conuenit propter causas propositas, id est, si sit in temperet calido, & sicco, atate temporeque calidis, &c. omnia conspiciunt ad bilem, non conuenit venæ sectio. Propterea lib. 1. meth. med. cap. 6 & lib. 2. ad Glauc. cap. 2. in legitimo erysipelate non secat venam, sed cholagogum proponit. Quod si ardens non exacte exquisita, facta in temperamento sanguineo, propter conuersionem tenuioris partis sanguinis in bilem lib. 2. de different. febr. capit. 9. expedit sanguinem mittere: Propterea Auic. inquit, quandoque nocebit, quandoque iuuabit.

Cucurbitula. Quantum ad Cucurbitulas, affigendæ ad Reuulsionem: quandoquidem hi humores semper impetum habent ad caput, scarificatæ inferturum partium.

Vesicantia. Idem dico de Vesicantibus, quamquam res apud multos dubia: ego tamen is sum, qui his vtor ad reuulsionem. libro 2. de phlegm. res est disputata.

Pharmacia. Quantum ad Pharmacia: in hoc casu considerandum, num in principio conueniant lenientia tantum: an purgantia statim à principio. Nam ut intelleximus in vniuersali, in acutis morbis eadem die medicari expedit: nulla autem est febris, in qua humores possunt esse ita turgent, ut in hac febre. Propter ea, necesse est purgare statim in principio, sed cum distinctione. Aliæ benigniores, aliæ maligniores. Si benigniores, lenientibus in principio, & refrigerantibus est vitandum, ut cassia cum samarindis, syrupo rosato, violato.

Sed quando materia biliosa exusta, imminet periculum delitij, oportet à principio statim uti purgante, & in bolo poteritis exhibere

Bolus purgans

Be. fl. cass. nou. extr. vnc. j.

diaprun. solus. aut

el. de succo ros. drach. iij. M.

& cum sacch. s. boli. accipiantur quinque horis ante cibum, & superbibilibus j. vel alteram feri caprini præparati.

Si potionem voluerit.

Potio.

Be. rhab. el. drach. j. ss. infus. s. in sero caprino, & s. expres. adde syr. ros. sol. vnc. iij. M. s. potio. superbibat iij. vel iij. lib. feri caprini, & accipiat similiter

quinque horis ante cibum.

Vomitoria sint eadem, quæ in tertiana exquisita.

Vomitaria.

Similiter & clysteres aluum mouentes.

Quantum ad Alterantia: possunt esse ea, quæ proposita sunt in tertiana exquisita. Sed pro symptomatum varietate, etiam alia eligi possunt. Si adsit cum febre ardente fluxus alui, accipe syr. de granat. de ribes, de agresta, de succo limon. Si adsint vigilæ accip. syr. de papaner. ad vnc. j. ss. simul cum alijs aquis de stillans refrigerantibus propositis.

Alterantia.

Sed quia in huiusmodi ardentibus nihil præstantius quàm aqua frigida, propterea de hac etiam differendum. nam Gal. nihil præstantius inuenit pro curatione.

Frigidæ igitur ratio quandoque conuenit, & est administranda absque vlla exceptione: aliquando multa sunt, vel aliqua præcipua, quæ prohibeant: quandoque res est dubia, in quo casu opus est iudicio, & studio.

Conuenit, quando febris sit Ardens biliosa, atque viscerum inflammatione, parus imbecillitate, absque visceris alicuius obstructione, cum consuetudine bibendi aquam, cum viribus admodum valentibus.

Quando conueniat potio aqua frigida

Non licet deuenire ad hanc, quando vires prorsus imbecilles, inflammatio, vel obstructio insignis ex humoribus frigidis, imbecillitas oris ventriculi, & non sint assueti.

Quando aliqua horum indicantium adsunt, aliquando non, in hoc casu opus est, ut expendatis, & numerum & vires eorum, quæ de sunt & deficiunt. Et expendatis, utrum conferat. Exempli gratia, sit febris, vires consistent, sed sit alicuius partis inflammatio. Exempli gratia, iecoris, vel pulmonis, oportet ut consideretis, quodnam magis vrgeat. Si ardor febrilis talis, & tantus, ut si non extinguatur, incidant in hecticam, etiam si adsit inflammatio, utendum tamen potione frigidæ. libro 10. meth. med. c. 6. inquit satius, ut inflammatio illa cradescat, & morbus fiat longus. Si non vrgeat, oportet respicere potius ad inflammationem, lib. 9. meth. med. cap. 5. Pariter, si febris, ex alia parte vires non admodum robustæ; quando periculum, ne patientes incidant in marasum, satius erit uti frigidæ: id ipsum dico de febribus, ubi ad sunt obstructions lib. 10. meth. med. cap. 10. Sed volo ut in his adhibeatis aliquem modum, ut scilicet corrigatis aquam pro intentione. Exempli gratia, si ardens cum inflammatione iecoris, poteritis exhibere aquam hordei, aut serum factis copiosissimum. Et si coniuncta cum obstructione, permiscenda aliqua aperientia, gutta vna vel altera olei ex chalcanto, habet vim penetrandi, aperiendi obstructions, & est vehiculum: si vires imbecilles, præbeatis ius ex pullo longum: si non potestis semel, bis, & ter.

Tempus exhibendi aquam est apparente Nā percoctione. Per tempus coctionis non intelligi.

git

etione na-
tura ali-
a est vi-
srix.

coctione
ex pulsu
cognitio.

Quanti-
tas aque

Amulio
remum.

Balnei.

Vitus
ratio.

Curatio
febris
dentis ex
pituita
falsa, &
pituita
cum bile
mixta.

Num &
ubi con-
ueniat sa-
guinis
missio.

git Gal. perfectam coctionem, quæ est tempore A
Status, sed coctionem inchoantem, lib. 9. meth. med. cap. 16. in si. inquit, incipiente conco-
ctione posse aquam exhiberi: Et propterea in
augmento incipit concoctio, potest igitur præ-
beri. Sed quia lib. 9. meth. med. cap. 5. in-
quit Gal. coctionem cognosci ex pulsu, sunt qui
non possunt intelligere. Cognoscitur conco-
ctio ex pulsu, quando pulsus ex parvis euadunt
maiores, & vehementiores.

Quantitas aque est in robustis, quantum pos-
sunt haurire, in infirmioribus minor. Præter
pouonem frigidæ, opus est refrigerare intrinse-
cus, & extrinsecus.

Interius conueniunt clysteres refrigerantes,
confecti ex solo succo plantaginis, aut portu- B
lææ, aut ex pusana hordei, aut sero caprino
mixto cum olei violacei aliqua portione. Con-
ueniunt præterea ea omnia epithemata, de
quibus in præcedentibus, & eo ordine, quem
lib. 10. meth. med. cap. 10. Galen. habet. Qui-
nimò in hoc casu etiam renes sunt refrigo-
randi: ut

Re. infrig. Galeni vnc. j.

rosati Mesua vnc. ss. M. f. linim.

Pro purgatione conueniunt proposita, elect.
diaprun. de succo rosarum, Mesuz. cum cassia,
sa ratione, ut proposui.

Conuenit etiam balneum aquæ dulcis: Sed
ego in nulla febre ardente perseverante ardo-
re vsus sum hoc balneo. Profecto nunquam C
conuenit, ubi ardens initium ducit ex loco af-
fecto: habet enim vim fundendi humores ad
locum inflammatum. Itaque ego aliquando
vsus sum balneo post ardentem quando erat
suspicio hæcticæ.

Vitus ratio tota sit refrigerans, alteretur
aer ad frigidum & humidum conspergatur cō
clauæ folijs vius, &c.

Oportet etiam maximè prospicere sympto-
matibus. Pro siti conuenit detinere in ore folia
lactucæ, aut oxalidis madefacta in mucilagine
psyllii, aut super lingua acidum limonis, vel ci-
tri: Et si saccharum placeat, aspergantur fru-
stula: alii crystallum, alii pruna in ore deti-
nent. Quantum ad aerem, cibum & potum, D
in tertiana exquisita de his est dictum.

Perficiam hodie, iuuenes studiosissimi, quod
superioribus diebus fueram aggressus, Arden-
tium febrium curationem scil. Supererat, quæ
ex pituita falsa ortum ducit. Et quia parum
distat ab ea, quæ producit à Pituita mixta cū
bile ardente spuria, idcirco vtriusque audietis
curationem simul & semel.

Tribus illis instrumentis perficitur. Quod
ad Chirurgiam: quamquam de hac admini-
stranda aliqua sit dubitatio, nihilominus quod-
alias dictum fuit, nunc repero, semper in his cu-
randis distinctione opus esse. Si ardens ex pi-
uita falsa habeat humores sallos: in commu-
nibus venis putrescentes absque vlla plethora
etiam spuria: in tali casu cum adsit cacochy-
mia exquisita, abstinendum à missione san-

guinis. 2. aph. 17. lib. 4. de tuen. val. capit. 4. &
alijs locis. Quod si pituita hæc falsa in venis
communibus abundans habeat aliquam san-
guinis mixtionem, aut etiam habeat humo-
rem salsum, putrescentem in venis pulmo-
num, ventriculi, ecoris, secunda vena. Quod
etiam agendum in Ardente spuria ex pituita
mixta cum bile. Sed si ita præualeant, ut nul-
lus sanguis adsit, dimittatur sanguinis mis-
sio. Si adsit alibua portio sanguis, mittatur:
At quando locus venæ sectioni nullus sit, oportet
Cucurbitulas adhibere ad Reuulsionem: Cucurbi-
nam hic scopus semper in ardentibus locum tula.
habet in paribus infernis, eam non ex stento
plethora.

Quantum ad Pharmaciam, leniendæ aluus. Baln.,
si bolum voluerint, hoc modo.

Re. flor. cass. nou. extr. vnc. j.

man. el. vnc. ss.

sem. citri. drach. ss. M. &

sin. sacch. f. boli.

Si potionem.

Re. mel. ros. sol. vnc. iij.

syr ros. sol. vnc. ij.

decoct. beton.

cichor.

sem. citri in sero capr. vel aqua cich. q. s.

M. f. posio.

Præparandi sunt humores hoc syr.

Re. syr. acetos. simpl. drach. j.

de cich. f. vnc. ss.

Decoct. beton.

cich.

endiu.

acetos.

hepat.

hordei vnc. iij. M. pro syr.

Loco decocti cum syr. propositis vii potestis
aquis stillatitij, betonice, endiuiz, acetosæ. an.
vnc. ij. M. pro syr.

Si sitis admodum urgeat, quod sit in omni
ardenti, istis syr. patientes non erunt contenti.
Si tamen largum potum præbeat, periculum
erit, ne ita refrigeretis humores, ut non possint
concoqui. Serum caprinum potest præberi, sed
ita dum præparatur, ebulliant rad. apij, semini-
culi recentis, aut semina ipsius fœniculi, hac
ratione præbe ad ij. iij. vel iij. lib.

Pariter in aqua hord. incoque beton. agrim.
radices apij, aut vnam, vel alteram guttam o-
lei eochalcanto.

Præparatos humores oportet expurgare per
vomitum, aluum, vrinam, sudores.

Quantum ad vomitum: quamquam mate- Vomitus
ria sit calida, quia tamen admixta pituita, at-
tenuanda vomitoriis, non aqua hordacea,
ut supra, vsus syr. acetos. simpl. cum iure apij
vel simili, vel ex consilio Gal. prouocatur post
cibum.

Clysteres non sint admodum acres, Clyste-
nec admodum refrigerantes. Non acres, nam res.
periculum est, ne ex acerbis falsa pituita in in-
testina ducatur, & dysenteria subsequatur.
Debent

Debent itaque esse moderati, ex decocto hor-
deis si status adsint, adde mel. ros. sol. cham.

Quantum ad medicamentum Purgans, in
bolo erit tale:

℞. fl. cass. nou. extr. vnc. j.
diaphn. drach. iij.
man. el. drach. j. ss.
sem. citr. drach. ss. M.
Et ssacch. f. boli.

Pono.

Recip. agar. troch. scrupul. iij.

rhob. el. drach. ss. infundantur f. a. in de-
coct. fl. & fruct. cordial aut infero ca-
prino. & f. express. adde mel. ros. sol.
vnc. iij. syr. ros. vnc. ij. M. s. potio.

Diureti-
ca.

Quantum ad Diuretica, & Sudorifica, vi-
dendum dum febris ardens ex pituita salsa ha-
beat vrinae interceptionem, seu stranguriam,
notae: Nam intellexistis ex Hipp. 4. acut. 13.
inter cetera signa esse stranguriam: sit dasti,
non est impedienda, imo adiuvanda, quia vi-
lites quandoque materia hos humores per
has vias expurgat. Nam Gal. 2. in 1. epid. 41.
febres ardentes soluebantur in ijs, quibus stre-
bat stranguria. Itaque Symptoma non pernicio-
sum: sed tunc debetis saltem acrimoniam
humoris mitigare decocto ex seminibus fri-
gidis, tam maioribus, quam minoribus; ex se-
minibus inquam cucurbitarum, endiuiz, sca-
riola, cicchorij. Emulsiō etiam ex istis semini-
bus, serum caprinum cum his emulsionibus,
aut decoctum cum plantagine, nymph. por-
tul. liqueritia, malua, granis sebesten, potest
vrinam prouocare. Si nulla adsit stranguria,
mouendae vrinae etiam efficacioribus remedijs
adde praedictis radices apij, asparagi, petroseli-
ni, feniculi, &c. Obseruanda praeterea om-
nia, quae a natura tentantur. Nam Hippoc. 4.
acut. c. 17. aliquando in his febribus fiunt abs-
cessus: dicit in com. fieri abscessus ad partes
inferiores, &c. Itaque in huiusmodi casu pro-
naturae propensione debetis & vos remedijs uti
ut si abscessus sit post aurem, diachylone, cu-
cubitulis non scarificatis; si non soluentibus,
viendum, ut dixi, quae textu sequenti Hipp. vo-
cantur sorbitiones attractoriae.

1. Pisana apud Hipp. vocatur sorbitio, quan-
do commiscantur medicamenta, est attractoria
sorbitio.

Sudorifi-
ca.

Quantum ad exteriora per cutem euacuan-
tia attinet, est contradictio insignis inter Auic.
& Gal. 3. acut. vlt. balneum in ardentibus ex pi-
uita salsa non conuenire, & ratio, inquit, quia
haec natura non est apta, ut possit digeri. Ta-
men Auic. in causi curatione probat, & nemo
hoc dicit, praeter Auicennam, ut putem, textum
esse mendosum, & legendum minus viendum
balneis, quia nec tarat, nec refutat Galenum, ut
solet in alijs. Patet id in febre sanguinea, qua
statim describit post biliosas, & ego quoque
concoro cum Auicenna de hac nunc dicam,
&c.

De febre syncho, seu sanguine a continente con-
clusa. Cap. XXXV.

Est febris sanguinea febris synochus, conti-
nens, conclusa, a continuo quodam fer-
uore, quod nullas prorsus a principio ad finem
habeat exacerbationes.

Huiusmodi febris proprie accepta est febris
continua continens ex sanguine putrescente in-
tra vasa magna, vel communia, vel saltem ma-
iora, & cordi proxima.

Quatenus est continens, distinguitur ab
omni periodica, scilicet, sanguinea, biliosa, pi-
uitosa, melancholica, quatenus a sanguine pu-
trescente: a sanguinea non putrida, quae ex sen-
tentia Galeni lib. 9. meth. cap. 3. media est in-
ter ephemerarum, & spurias. Per vasa commu-
nia intelligere oportet venas communes totius
corporis, ut praedas, aut saltem maximas, quae
sunt in vtero, iecore, ventriculo, pulmonibus, &c.
sequenter a locis cordis proximis. Haec est ex-
plicatio rudis febris sanguineae.

Diximus esse ex sanguine. Per sanguinem
intelligimus ichores sanguinis, & corpoream
substantiam ipsam sanguinis.

In praesenti casu est dubium, an ichores, vel
humores intelligantur. nam scriptores varij sy-
nochos benigniores ex ichore sanguinis fieri
dicunt. Ego existimo, posse quidem in febris
synochis ichores sanguinis putrescentes: sed
quod fiat febris synochus benigna, falsum apud
Gal. 2. in 6. epid. 38. vbi citat locum Hip-
poc. 2. epid. sect. 1. vbi vult, ichores putrescentes
aliquando malignas febres excitare. Itaque
non valet: Ichor putrescit: Ergo febris non
potest esse pestilens.

Sed praeterea dico, posse etiam massam san-
guinis putrescere, abique eo quod febris sit pe-
stilens. Nec accipio eorum sententiam, qui ex-
istimant, huius ebullitionem esse tantum se-
miputredinem. Docuit exemplo viui accescen-
tis 2. aph. com. 17.

Verum maior difficultas: num, cum putre-
scit sanguis, putrescat sub propria, an aliena
forma? Nam quod putrescat, patet ex lib. 9.
meth. cap. 1. vbi loquitur de vtraque synocha,
& repetit lib. 1. meth. cap. 9. quando inquit:
Initium a putredine, quae totum corpus occu-
pat, sumemus, quae ipsa continua quoque
febres, quas synochos vocant, excipit, &c.
Sed num putrescat sub propria an aliena for-
ma? Quid intelligendum per propriam for-
mam, quid per alienam? Per propriam, quan-
do putrescit quatenus est sanguis, sicut bilis
sub propria forma, facit febrem. Sub aliena,
quando, cum putrescit, conuertitur ratione
partis tenuioris in bilem, crassioris in melan-
cholicam; tum sanguis dicitur putrescere sub
aliena forma, quia mutatus est aliqua ex par-
te in bilem, aliqua in melancholicam. Quae-
ritur numquid huiusmodi sanguis putrescat
sub hac propria, an sub aliena forma? Existi-
mauit

Quid sy-
nochus?

Num pu-
trescat
sanguis
sub pro-
pria for-
ma.

mauit Auic. & alij, Gal. putasse semper sanguinem posse putrescere sub aliena forma. Quod accipiunt ex 2. loc. lib. 2. scil. de diff. febrium. c. 9. & lib. 2. de cris. c. 12. In his videtur satis aperte docuisse, febrem sanguineam, vel sanguinem nunquam sub propria forma putrescere, vt lib. 2. de cris. c. 12. Tandem subiungit, omnes tandem febres tres tantum esse. Hoc cum arbitraretur Auicennae inuectus est in Gal. Et varia habet argumenta, quae satis valida, si Galen. hoc senserit. Sed nunquam hoc sensit, sed lib. 1. de diff. febrium cap. 6. in principio capituli inquit. *Humorum autem putredo, quae in vasis sit, similis est ei, quae in inflammationibus atque abscessibus accidit, aliisque collectionibus, duplex quidem secundum genus. Ex duorum autem generum miscella alia tertia secundum speciem euariet, quoniam & innumerabiles miscella modi in eo, quod magis, & minus, reperiuntur. At duorum generum alterum, quod fit superante natura, alterum vero superata. Sed sic est, quod in inflammatione sanguis non semper conuertitur in materiam bilis, vel melancholiae, sed in pus. Experientia hoc docuit. Sicut et nos hoc. Ergo sequitur, sanguinem posse putrescere sub propria forma. Et constituetur febris diuersa à Quotidiana, Tertiana & Quartana. Si hoc non concesserimus, non potest Galenus vindicari à contradictione. Loquitur itaque Gal. loco citato de febribus omnibus periodicis, & cognouit, quandoque etiam sanguinem putrescentem posse facere febrem periodicam, quando est biliosus, & mittitur ad locum aliquem determinatum. Tunc temporis sanguis pro parte conuertitur in bilem, quae habet naturam tertianam. Et hac ratione habentur tantum tres febres, si loquimur de periodicis. Sed non sequitur, ergo non datur continua lib. 2. de diff. feb. c. 2. Synochus febris, vt dicebam, non fit ex ichoribus putrescentibus tantum, verum etiam ex ipsa sanguinis massa; neque ex semiputredine saltem, quae facit febrem synochum imputridam; neque etiam ex sanguine tantum sub aliena forma putrescente, vt Auic. Galeno imputauit: verum ex sanguine sub propria forma putrescente, quando conuertitur in pus vel materiam puri similem. lib. 1. de diff. feb. cap. 7.*

Quod sit

Nec dicat quis, hanc febrem tunc appellandam febrem, quia aliud est fieri ex sanguine, qui mutatur in pus; aliud fieri iam ex toto in pus mutato. Non dico, fieri febrem ipsam ex pure ipso, sed ex sanguine, qui iam in pus mutatur. Propterea Hippocrat. 2. aphorif. 47. dum pus fit, dolores & febres exacerbantur, inquit, circa generationem puris dolores & febres magis contingunt quam factio iam ipso.

Habetis itaque, dati synochum ex sanguine putrescente in propria forma lib. 9. meth. c. 4. 5. 6. & lib. 1. meth. c. 9. Datur tamen e-

tiam synochus, in qua putrescit sanguis sub aliena forma, de qua nunc non loquimur, sed sumus locuti de hac in febribus biliosis.

Putrescit hic sanguis in vasis communibus, indeterminatis, extra vasa aliquando. De communibus agitur lib. 11. meth. capit. 9. & sequentibus.

Locus affectus.

Sed de illo in loco determinato cum, & citra inflammationem. 1. in 6. epid. comm. 2. fere in fine, vbi scribit: inter omnes corporis partes, plurimae grandissimaeque venae vteri habent. Cumque eos aut menses, aut a partu purgamenta suppressa, aut phlegmose aliqua, ut cumque orta, male accipiunt, ipsos sanguine compleri necesse est: quo deinde putrescente, si febris excitetur, in synochorum speciem ipsam connumerare opus est (nam id genus febrium, ex sanguine accendi ostensum est.)

Ex quibus colligo differentias synochi principales & causas mediatas. Nam hauriuntur differentiae, partim à modo motus: quia omnia synochus, aut semper augetur, imminuitur, vel semper in eodem statu manet.

Differentia à modo motus.

Febrem, quae semper augetur, vocat Gal. lib. 2. de cris. capit. 6. Epacmasticam: eam quae semper in eodem statu, *epacmasticam*, seu acmasticam: Contra eam, quae semper decrescit, paracmasticam.

Fiunt. Differentiae pro varia transpiratione, vel retenta, vel excreta. Nam si plus retinetur, facit Synochum, quae semper augetur: & sic de ceteris.

Ratione loci desumitur; quia Synochus, quandoque fit ex sanguine putrescente in vasis communibus, vel determinatis.

Quantum ad Causam, quia aliquando fit ex sanguine praesente ceteris omnibus humoribus, siue seruata, siue non seruata veteri proportionem: aliquando autem hic sanguis putrescit acceptus non pro quarto humore, sed tota sanguinis massa.

Causae putredinis sunt ex parte Facultatis, Obiecti, vel Instrumenti.

Causa putredinis.

Facultates, quando scilicet, venarum temperies est ita imbecillis reddita, vt non amplius possit regere sanguinem in ipsis contentum. Galenus de hoc libro secundo, de different. feb. cap. 9.

Obiecti, quando sanguis ipse ita abundat, vt propternimiam copiam suffocet calorem naturalem venarum.

Tertio, ex parte loci: vbi hic est admodum calidus, & humidus. Si quis quaerat causas, propter quas huiusmodi sanguis mirandum in modum augeatur, vt fiat putredo in vniuersalibus: Breuius ad hoc respondeo; sunt omnes propter quas sanguis augetur, vel non potest transpirare. Augetur ex temperamento cibus optimi succi, excisione alicuius membri, & propter suppressas excretionem.

Ratio calidus, & humidus.

Signa huius febris, alia sunt febris, vt est continua continens, alia vt est sanguinea, alia vt est

Signa continua continens.

ut et sanguinea putrida, alia ut continua putrida, sanguinea benigna.

Continua continens cognoscitur ex continuo seruire.

Sanguinea. Ut sanguinea ex habitu corporis pleno, colore rubicundo, copioso victu.

Putrida. Putrescens ex pulsu potissimum, quem oportet habere systolen celeriore diastole: Præterea ex urinis, quæ sunt magis rubicundæ & crassæ, Præterea calor sanguineæ putridæ est magis mordax, adsuntque symptomata graviora.

Putrida benigna. Cognoscetis denique etiam, putridam, sed benignam ex pulsibus, & calore, nam pulsus, quamquam obtineat illam inequalitatem, in qua systole celerior est diastole; sunt maximis, suntque æquales, præterea vehementes, in maligna debiles.

Differunt etiam calore. In maligna exteriora non calent, in his secus.

Prognostica. Hæc febris, quatenus continua, est periculosa: sed cum benigna fuerit, si à principio debitis remedijs tractetur, est facilis curationis, nisi tamen sit spuria. Si exquisita sit, raro transit septimum diem: si spuria: pervenit ad decimam quartam.

Curatur potissimum chirurgico instrumento: quod si non sit satis, ad pharmaciā etiam est accedendum.

Pena seculi. Quantum ad Chirurgiam. Galen. quem imitatur Auic. laudat venæ sectionem usque ad animi deliquium. Et profectò, si in illo casu convenit, in hoc convenit in quo præ ceteris humoribus abundat sanguis. Sed quia raro omnes istæ conditiones simul & semel inveniri possunt, ut plenitudo quo ad vasa ad sit sique legitima, vires constantes non adsint putredo admodum insignis; ideo tutius, ut infra mittatur: propterea lib. 9. meth. c. 10. scribit, multa mala ex huiusmodi sanguinis evacuatione quandoque successisse, & quæ sequuntur, ita ut fugienda, quod & ego consulo.

Itaque, si corpus plenum mittatur ad lib. j. ad unc. xvj. ad lib. ij. etiam: ad lypothymiam verò usque non degenatis, sed potius repetitis bis, ut venam secare, semel cucurbitulas adhibere, tutius est.

Quantum ad usum secandi venam: In synochis ex vasis communibus eligatis venam communem in cubito. Si synochus ex vitio, quæ sit absque inflammatione partium. Si incipiat inflammatio primum in cubito, postea inferiores.

Hirudines. Præter sectionem venæ, quo secetur etiam statim à principio, sin minus quarto, 5. 7. die, si non citius fueritis vocati præmissa tamen evacuatione per clysterem, sunt etiam aliæ operationes chirurgicæ, Hirudines, & in ijs in quibus venæ hæmorrhoidiales solent sanguinem evacuari, & in ijs, in quibus non; & Cucurbitulas, quas Galenus proponit, quoniam non potest secari venâ; ego tamen magis laudo hirudines.

Pharmacia. Quantum ad Pharmaciā; lenienda est alvus eo modo, quo in febre biliosa; sanguis enim non habet proprium medicamentum, quo possit leniri: sed quia sanguis feruidus, in quo semper bilis dominatur, propterea conveniunt ea, quæ biliosis, syr. viol. pulp. tamar. vel in bolo, vel potu. serum caprinum, &c.

Alterantia. Quantum ad alterantia, in febribus sanguineis, sunt multiplicia, Auic. proponit incrassantia, attenuantia, refrigerantia, & exiccantia, quæ omniam conveniunt.

Quantum ad incrassantia, alias dixi meam sententiam. Nam quamquam Auic. proposuit incrassationem in his moribus tenuibus: mihi tamen in his humoribus non probantur, & potissimum in synocha. quia incrassantia augent obstructionem; alia tria conveniunt, sed quodam ordine singula singulis locis, & temporibus.

Refrigerantia. Quantum ad refrigerantia summa, non conveniunt in principio synochis; Refrigerans in summo est frigidæ potus, qui non convenit in principio, sed conveniunt attenuantia, & exiccantia. attenuantia, ut apperiant obstructiones, & præbeant aditum medicamentis: sed hæc attenuantia non debent esse calida. Convenit syr. acetosus, teste Gal. lib. 11. met. cap. 9. probat syrupum acetosum cum aqua hordeacea, in qua incoquantur acetosa, capillus veneris (dimittatis apium) cichorea, Endivia, semina frigida, melonum, cucurbitarum, &c.

Siccantia. Quantum ad siccantia inter hæc probat Auic. decoctum lentium ex corticatarum, quæ materia præsidij est accommodata ad exiccandam sanguinis humiditatem. Quo in loco cogor dicere, ut euellam errorem eorum, qui in omnibus variolis etiam apparentibus his, toto tempore præbent decoctum lentium, nescio quo fundamento. Dicunt, quia excitat, & promouet excretionem materie noxiæ ad cutem. nesciunt quid dicant. potius impedit decoctum lentium. probatur Arabibus in sanguine ebulliente ut compescatur antequam fluat ad cutem. Conveniunt igitur exiccantia, eligerem tamen ego præstantiora, ut sunt succi, de quibus superius, citri limonum, arantiorum cetos. decoctum acetosæ, quæ exiccant & simul refrigerant. Attenuatis humoribus, & exiccata humiditate, tempus est præbere aquam frigidam, & eo modo, quo in febre ardente.

Hoc facto, si febris adhuc persistat, oportet uti purgantibus per alvum, urinas, sudores, & cutem ipsam appetire. Ad expurgandum conveniunt quæ bilem educunt: ad sudores & urinas, declinante ea, ad radicem apij etiam potestis devenire, & exterius aliqua inunctione relaxante uti.

His addenda victus ratio admodum tenuis, prisana absque ovis, pro potu aqua simplex, si sint assueti.

De Febribus pituitosis, seu quotidianis, intermittentibus, & continuis, Epiala, Syncopali humerosa, &c. Cap. XXXVI.

Post biliosas, & sanguineas febres, cum Auic. de pituitosis agam: sunt autem Pituitosæ febres in duplici potissimum differentia: frequentiores & magis vulgares: minus frequentes, minusq. vulgares. Inter frequentiores reperio Quotidianam Intermittentem, Quotidianam continuam periodicam, quotidianam continuam continentem, quam ego puto apud Auic. esse Laticam.

Minus frequentes apud Auic. variz sunt; apud Galenum est vnica Epiala. Auic. tres commemorat differentias febrium, quibus adest insignis quædam calor, & frigoris inæqualitas, prima in qua frigus internum est maximum, exteriora calent, quæ Auic. Epiala.

2 In qua interiora calida, exteriora frigida sunt. Auic. vocat lypriam.

3 In qua eodem tempore, eodemq. loco tam interiore quam exteriori calor, & frigus ad sunt, quam innominatam relinquit. Præter istas est febris syncopalis humerosa, & diurna & nocturna, quæ differentiæ nil constituunt reale.

Loquar primo de frequentioribus & magis vulgariter grassantibus, deinceps de cæteris.

Quotidiana intermittens antiquioribus, Amphimerina vocatur. Quotidiana autem continua, sed periodica pariter antiquis, & Gal. lib. 2. de diff. febr. c. 7. dicitur amphimerina continua, quamquam Medici sui temporis hanc catameniam vocarint,

Continua vero pituitosa continens apud Auic. latica dicitur à latendo, quod est ita occulta continua, vt quemadmodum docet proprio capite, sit similis hecticæ. Græcis puto duobus nominibus esse vocatam, ἡδμή, id est, impuram humidam scilicet & Typhoden. Elodes à continuo madore, seu sudore, quem habet perpetuum ex vniuerso corporis ambitu, aduersus Glycum cap. 2. vocatur etiam Typhodes, quasi succensa quod habere videatur materiam, quæ per partem post partem paulatim incenditur de hac Gal. loc. cit. & sect. 1. aph. 12. vbi inquit esse continuam, & longiorem, &c. de his etiam febribus Elode, & Typhode, com. 4. 2. aph. sect. 7

Causa.

Istæ omnes febres ex vnica oriuntur causa ex materia Pituitosa, sed vel insipida, vel dulci.

Vt hanc differentiam intelligatis. sciendum est varias dari pituitæ differentias, insipida, dulcis, mucus narium, vitrea, acida, mucilaginosæ, salsa. Adest præterea succus crudus, qui est distinctum quid ab hæc specie pituitæ lib. 2. de nat. fac. c. vlt. lib. 4. de tuend. val. c. 4. & lib. 3. de alim. fac. cap. 33. His locis dingui ostendit succum crudum à pituita, quod hic est materia magis crassa, lenta, frigida, concoctum difficilius, quàm pituita: propterea lib. de alim. fac. dicebat hunc succum generari

A præcipue ex vsu piscium crustaceorum.

Quamquam autem tot Pituitæ differentiz reperiantur, nihilominus, vt lib. 2. de diff. febr. cap. 6. testatur, omnes tandem redigi possunt ad tres, quarum prima continet pituitatem, vel dulcem, vel insipidam vocatam, in qua specie ponitur pituita dulcis, insipida, & mucus narium. In secunda vitrea, mucilaginosa, acida, & succus crudus. Sub tertia est pituita salsa, & consequenter calida, & aeris. Itaque cum tantum tres sint differentiz, oriuntur etiam tria præcipua febrium pituitosarum genera. i. Quod fit ex pituita salsa, de quo in superioribus lectionibus diximus, & pertinet ad ardentes. Ex vitrea, vel mucosa, vel succo crudo, vel acida fit Epiala Galeno vocata de febribus enim Auic. loquitur postea, ex insipida, dulci, & mucus narium quotidiana intermittens, periodica, & latica.

Materia Epiala.

Porro hæc pituita dulcis, vel insipida potest esse excrementitia, aut alimentalis. Excrementitia vtilis, inutilis. Inutilis est mucus narium: vtilis pituita dulcis in ventriculo, & venis. Alimentalis est illa, quæ in venis continetur pro quarto humore. Itaque huiusmodi febres propositæ oriuntur ex pituita vtili, inutili, & aliquando alimentali.

Inutilis facit intermittentes, aliquando tamen etiam continuas periodicas, & locus putredinis est cerebrum. Tunc febres pituitosæ catarrhales, quarum aliquæ sunt intermittentes, quando materia est ita pauca vt possit digeri, antequam noua proueniat motio humoris; si crassa faciet etiam continuam periodicam.

Vtilis quandoque facit Quotidianam intermittentem, periodicam, laticam, qui humor magna ex parte in ventriculo colligitur, vbi abundat; aliquando facit Intermittentem, quando portio mittit vapores & minoris portionis substantiam in venas.

Fit Continua periodica, si magna pars huius humoris transmittatur in venas, vt tota ante nouam accessionem non possint digeri.

Fit Latica, quando hic humor peccat in venis totius corporis, vel saltem maioribus.

Causa igitur & locus, ex quibus fiunt tales febres sunt istæ.

Mediæ vero causæ sunt naturales, & non naturales.

Naturales, temperamentum frigidum, & humidum: habitus obesus, sexus muliebris, ætas senilis.

Non naturales, regio, constitutio, tempus anni frigidum, & humidum, pluuiosum, australe, vsus olerum, piscium, lacticiniorum, nimis aque potus, nimis cibi assumptio, otium, exercitij intermissio, retentio euacuationum consuetarum. Huc pertinent ad quotidianas magis vulgares.

Quantum ad alijs Galenus vnicam proponit Epialam: Auic. tres. & in proponenda Epiala differt à Gal. & Epialam Gal. relinquit

quit innotuitatem, & aliam Epialam nominat. **A** Apud Galenum Epiala est, in qua vno tempore in omnibus corporis partibus frigus, & calor simul sentiuntur, ut propterea, sicut docet lib. de inq. intemp. c. 8. quamquam in omnibus putridis adsit inaequalis intemperies in alijs non reperitur omni tempore, nec omnibus partibus, sed tantum in Epiala: nam Exemplis gratia reliquae habent inaequalitatem tantum in principio, Epiala vero toto morbi tempore.

Causa Epialae Galeni. Causam retulit Gal. lib. 2. de diff. feb. c. 8. & est pituita vitrea, mucosa, acida, vel succus crudus, quae pituita ex parte putrescit, ex parte non. Ratione eius, quae putrescit sentitur calor: ratione eius, quae non, sentitur frigus: vel locus non sit vnus, sed omnes corporis partes. Oportet in hac febre distribuam esse materiam pituitosam per totius corporis partes. Hanc Gal. lib. de inq. intemp. c. 1. inquit vniuersalem, & totius corporis inaequalem intemperiem esse:

Quando in Epiala dicitur esse calorem & frigus. Si quis quærat causam, cur portio putrescat, portio non? Est dissimilitudo partium. Terrestris contrahunt putredinem; tenuiores non: nec miretur aliquis in vna parte posse humorem puridum, & non putridum, calidum, & non calidum reperiri: nam loquimur de parte organica. Causa generationis huius humoris non differt à causis paulò ante relatis. Hæc est Epiala Galeni.

Epiala Auicennae mihi videtur esse somnium ego non potui videre: Inquit, est febris, in qua interiora sunt frigida, exteriora calida: primum res videtur admodum dura, reperire febres tales, &c. Videtur prorsus febris contraria; nam febris est propria passio cordis.

Quæritur. Dicitur quæ poterit esse calor in corde, non in ventriculo, intestinis, &c. Est imaginatum, si est materia in corde, vel parte proxima, oportet vehementissimum excitari calorem, huic esse vehementissimum, ostendit etiam ipsius Auicennae consilium: dum scribit communicari partibus externis, quamobrem non est partis propinquæ.

Si dicat, quod materia non sit cordis proxima, dico si materia est ita calida, ut possit cor calescere, multò magis calidus erit locus, in quo continetur. Gal. quidem lib. 2. de diff. feb. c. 6. inquit, abundante pituita vitrea aliquando fieri rigorem vehementissimum absque febre: sed non scribit, propterea eo tempore exteriora esse calida. Et puto Auicennam fuisse deceptum ab aliquo textu deprauato. Itaque apud me non datur huiusmodi febris.

Quantum ad secundam Lipyrîam, datur apud Galenum, sed diuersa ab Auicenna. Galenus non nouit aliam nisi ardentissimam, in qua exteriores partes algent, interiores vruntur. Idque fit 2. casibus. 1. quando viscera inflammatione tentantur. 2. quando est maligna. 4. aph. 43. 48. Auicennas hac etiam in parte est quædam commentatus; nihil ad rem: imaginatur aliam lipyrîam, & tertiam præter istam.

Prima quando materia pituitosa, vel biliosa pauca putrescit leui putredine, ut non possit calor communicari partibus exterioribus; quam suppositum falsum: nam si calor sit ita exilis, ut non communicetur partibus externis, non communicabitur etiam cordi.

Alia quoque & secunda est prorsus imaginaria; Inquit, sit lipyrîa ex materia pituitosa propter huius ebullitionem; dum ebullit, eleuantur quidam vapores, &c. aliud est loqui de calamis, aliud de humanis corporibus.

Tertia est, potest admitti, adesse calorem in materia pituitosa interius, non posse communicari externis propter abundantiam succi frigidi pituitosi, &c. Tertia illa febris est Epiala Galeni, propterea illam non explico, & finem facio.

Inter pituitosas febres, reponit etiam Auic. Syncopalem humorosam vocatam: loquitur quinetiam de syncopali minuta, quas duas etiam describit. Gal. lib. 1. 2. meth. cap. 3. locutus est de illa, quam Auic. Humorosam vocat cap. 6. quâ Minutam.

Syncopalis humorosa.

Et sanè licet mirari, cur Auic. in tractandis febribus pituitosi syncopalem minutam connumeret: cum tamen & ipse doceat, & colligatur ex Gal. lib. cit. quam ex humoribus calidis tenuissimis excitatur, qui ad os ventriculi cõfluunt, ut propterea videatur potius inter biliosas enumeranda. nihilominus puto Auicennam excusari posse, quia arbitratus est, hanc febrem ex quibuscumque tenuibus humoribus excitari posse, de vtraque tamen loquemur ad plenioram febrium naturam.

Syncopalis minuta est febris, cui annectitur syncope, quæ fit ex humore calido tenui ad os ventriculi, quod os exsoluitur, & communicata materia arterijs sequitur syncope.

Syncopalis minuta.

Syncopalis autem humorosa, in qua syncope connectitur ex leuissima quacumque causa quacumque motione statim incidunt in syncopen. Fit huiusmodi febris ex fluxione humoris pituitosi putridi corrupti ad os ventriculi cum eiusdem imbecillitate, qui humor est vitreus, humor crudus, pituita ipsa. Hæc de causis pituitosarum febrium. Venio ad Signa.

Syncopalis humorosa.

D Pituitosæ febres varia habent signa, quorum aliqua ostendunt febrem pituitosam, ut pituitosa est alia pituitosam ex pituita dulci intermittentem distinctam à Continua, Periodica, & Latica.

Signum.

Aliarum producitur à pituita mucilaginosa, vel vitreata, quæ syncopalem humorosam & minutam.

Quantum ad priora Signa, capiuntur à rebus Pituitosis non naturalibus, naturalibus, & præter naturam. Naturalibus, temperamento frigido & humidum habitu obeso, pingui, & carnoso, etate est à re senili, sexu muliebri.

bus natu

Non naturalibus: constitutione frigida, & calida, humida, longitudine somni, omnia ex- Non ne citatione, suppressis consuetis euacuationibus, & à vita antea, quando scilicet facit

M assuetus

affluens vsui fructum, si fuerit vsus aqua in maxima copia. Possunt istæ omnes causæ manu ducere nos in cognitionem:

Præternaturalib.

His annectuntur res præter naturam: capiuntur autem ab actionibus læsis, excrementis mutatis, & qualitatibus.

Quantum ad Actiones læsas: pulsus sunt parui, non admodum frequentes, semper inæquales, & inæqualitate systematica, ut inæqualitas vnius pulsus. Quæ signa ex Galeno lib. 3. de diff. febrium capite 3. & libro 2. de crisc. 3. habentur. Non sunt tamen perpetuò parui, sed tantum principio, & parte augmenti, & in illis pituitosis, in quibus focus putredinis est circa os ventriculi, in alijs secus. Nam quod lib. 2. de crisc. 3. scribit intelligendum est de pulsibus Quotidianarum. Quantum pertinet ad alias actiones, somni admodum profundi, corpus ignauum ad quascumque motiones ineptissimum, oscitationes frequentissimæ, & valde longæ, habetq. febris multas superexacerbationes vna & eadem die, quod fit, ubi locus materię putrescens est circa ventriculum.

Quantum ad excrementa: in istis lotium est magna ex parte in principio tenue absque contento, in progressu, præcipue post vsum diu reticorum, incipit fieri album quidem sed crassum: progrediente adhuc magis febre, vrina est varia. Hoc fit, quando natura iam aggreditur concoctionem huius humoris pituitosi, & uertit pituitam in sanguinem.

Excrementa etiam alui, & quæ per vomitum exeunt, omnia sunt pituitosa.

In his etiam partibus est quidam mador. non dico esse sudorem: nam Auicenn. scribit non apparere sudorem in pituitosis in declinatione, non in principio, quia sermo est de sudore critico. Galen. autem loquitur de declinatione particulari. Itaque si sermo sit de huiusmodi sudoribus criticis, profectò non apparent in principio, nec declinatione. sed, si sermo sit de quodam madore, concomitatur perpetuo febrē pituitosam etiam in principio.

Quantum ad calorem, non est admodum intensus, & principio apparet mitis, & paulò post insurgit. Propterea Hippocrat. 1. in 6. Epid. 29. vocauit has febres post insurgentes: Calor in his non est æqualis, quasi videretur hic calor exire per cribrum, libro secundo de diff. febr. capite 9. & Auicenn. nam dum pituitosa materia ebullitionem facit, aliqua pars tantum ebullit. Sic cognoscuntur pituitosæ, ut pituitosæ.

Signa pituitosæ ex pituita insipida, vel dulci.

Cognoscetis autem esse pituitosam ex pituita insipida, vel dulci, quia ex tali pituita non incipiunt cum horrore nec rigore, sed refrigeratione tantum, libro secundo de diff. febr. capite quinto.

Præterea ex symptomaticis sunt mitiores, non habet syncopen connexam, præterea cognoscetis illas ex pituita vitrea, quia adest calor, & frigus inæquæ, ac incipiunt cum validis-

limo rigore, sed non cum refrigeratione, ad differentiationem biliosarum, ut videantur quasi gela-scere. Accedit, quod habet connexa symptomata proposita, præcipue syncopen inam non pro-uenit ex materia alimentali.

Accedit aliud signum, quod proponit Auicenn. cap. illius febris, quam vocat Epialam: inquit hæc febris non inuadit quotidie, sed quandoque de tertio in tertium, quarto in quartum. vidit Auicenn. statum dubium, & dicit: ergo erit febris tertiana: aut quartana. Solutum dubium Auicenn. eo modo, quo & ego: Quamquam inuadat de tertio in tertium, in 4. non debet appellari tertiana, nec quartana, sed quodiana, quatenus nomen quotidianæ applicatur febribus pituitosis, qui locus manifestissimus.

Accedit quod in febribus ex pituita vitrea vniuersum corpus est pallidum, aliquando coloris plumbei, sunt valde ignaui ad quascumque actiones.

Ex dictis conoscetis omnes febres pituitosas, nam quodidianam intermittente cognoscetis, quado 18 horas affligit, 6 enim intermit-
*Quotidiana intermitte-
ntia.*

Periodicam, si satis grauiter affligat 18 ho-
*ras, & 6. habeat intermissionem non manife-
stam tamen.*

Latica, si habeat omnes conditiones febris pituitosæ, & tamen sit continua sine omni exacer-
Latica.

Est pituitosa continua continens, quas febres ego sæpius vidi, & aliquando etiam curauit. Sed existimo esse erratum in textu Auicenn. in descriptione huius febris, inquit, est cum refrigeratione, &c. & est similis besticæ, & propterea pro hoc legendum esse puto sine horrore, rigore, & refrigeratione, & esse similem besticæ.

Synopalis Humorosa cognoscitur ex li-
Synopalis
gnis, quæ dixi concomitari febrem Epialam
seu ex pituita vitrea, habitus est cachecticus to-
*lis humo-
rosa.*
tus corporis, & contingit illa syncope ex leuissi-
ma occasione.

Synopalis Minuta cognoscitur ex habitu gracili, naribus acutis, quod propter inedia-
Minuta
statim incidunt in syncopen: Propter inter-
nam causam statim exsoluuntur, quasi diu vi-
giliassent, vel immodica venere vti essent. Ex-
crementa quoque in his apparent valde tenuia,
calida, & biliola.

Omnes pituitosæ sunt satis prolixæ, curatio
Progr.
difficiles, apud Auicenn. quidem terminus die-
rum 64. sed nullus est certus, quia materia pi-
tuitosa valde in se est diuersa, & ratione sub-
stantiæ, quantitatæ, loci, in quo continetur; &
ratione insignis labis partium: nam aliquando
intemperies est confirmata, diuturna: Denique
est propter errores in viuendi ratione, quæ est
fere vnica, & præcipua causa, quamobrem fe-
bris quodiana in longius procedat.

Exempla ego habeo multa in Virginibus
menialibus quibus non potui persuadere videri
tenuem, & semel indie.

Nisi accedant alie conditiones, ex sui natura non sunt lethales, sed Latice admodum periculosa, & facile potest desinere in hecticam.

Periculosa etiam est Syncopalis humorosa, quia expectant ista validissimas euacuaciones, & tamen non possunt ad ministrari.

Curatio
quotidia
na ex pi
ritu adu
ci.

Venio modo ad Curacionem, quæ habet tres precipuas intentiones (nam pro nunc omitto intentionem à febre sumptam: à calore magis urget causa, quam febris.) Prima, ut humor pituitosus euacuetur: secunda, ut calefiat, & exuaceatur; tertias attenuetur, & incidatur.

Vene se
tio.

Quantum ad euacuacionem, Græci de nulla prius sanguinis missione mentionem faciunt. Arabes inquirunt, ubi apparet vrina rubra & crassa, mittendus sanguis. Resolutio est, in purissima exquisita exacte, non conuenire. Est exquisita exacte, in qua omnia conspirant ad demonstrandam puritatem.

Vbi sit vel exquisita non exacte, vel spuria & cum sanguinis admixtione, in quo casu potest esse vrina crassa, & rubra, conuenit aliqua euacuatio: nec tantum, quando apparent tales, sed etiam, quando non apparent tales, quod cognoscitur ex facie, res respiciens potissimum ad vires.

Quando
secunda
vires.

Sed quantum ad tempus mittendi sanguinem, considerate oportet, an ventriculus sit refertus pituita, necne. Si sit, antequam leceatur vena, sunt eradicandæ ventriculi superfruitates, vel vomitu, vel deiectionis. Est autem leniens in potione.

Clyster.

℞. mel. ros. sol. vnc. iiii.

Aq. beton. q. s. M. f. potio.

Hoc leniens conuenit ubi abundat pituita crassa.

Si suspicio sit etiam, si crassa adesse tenuem,

℞. mel. ros. sol. vnc. ii.

man. el. vnc. ij.

aq. beton. vel iuris altesati cum drach. j.

sem. citri. q. s. M.

f. potio.

Si bolum voluerint.

℞. El. enis. vnc. j.

man. el. vnc. ss.

Spec. biera. semp. drach. j. ss.

M. & sine sacch. f. boli.

Vomitibus est præparandus vnc. ii. oxymel. simpl. commixtis cum vnc. vii. vel x. iuris con-
sti cum anetho, & cum porticor raphani.

Si intestina murmuraciones frequentes habeant, his clysteribus emendandæ.

Clyster.

℞. flor. chamom.

anethi.

melil. an. p. j.

sem. cart. bami. drach. ii.

f. decoct. f. a.

℞. supradicta decoct. lib. j.

mell.

sacch. quod vocant mellaceum vel mel. ros.

ol. chamom. an. vnc. ii.

salis tunc. j. M. f. clyster.

A. Toto febris tempore hi clysteres poterunt esse in usu.

Præparandi deinde sunt humores primo solo oxymelite simpl. absque vlla decocti ad missionem singulis diebus in diluculo ij. vel iij. vnc. si pituita vitrea sume vnc. ij. oxymel. simpl. & vnc. i. oxymel. scil. vel corop.

Verum euacuandum deinde vel vomitu, vel deiectione leniente: postquam euacuacionem expediat ut syrupo attenuante humores in partibus magis distanubus.

℞. oxymel. simpl.

Syr. de beton.

de mentha an. vnc. ss.

decoct. betonica.

menth.

agrimonia.

rad. apij.

petroselin.

senecula.

orig. vnc. iij. M. pro syrupo.

Syrup. de
tenuans.

Dubium est de Purganubus medicamentis, vitum administranda ante perfectam concoctionem, necne? nam ex vna parte Galen. quem sequitur Paulus & Aeuus, volunt expectandam esse perfectam concoctionem. Alexander. Trall. quem imitatus Auicenna. voluit vi hanc frequentes, sed parum: per Episcrasin, quamquam humor adhuc non sit concoctus.

Et profecto hæc sententia mihi magis probatur; nam si expectatus perfectam concoctionem: primum oportet huiusmodi humorum concoctionem valde diuturnam esse, non potius expurgare ante 30. 50. dies, quid dicat altantes, dicent aliqua arte vos vult, ut accipiatis pecuniam.

Accedit ubi concoctus est, potestne euacuari unico medicamento? Melius est paulatim & sæpe, prout materia concoquitur, paulatim expurgare. quod consilium & ego sequor, & vitor pilulis sequentibus.

Recip. pil. mastichin.

aggreg. an drach. j. cum mel. ros. f. pil. 6. deaur.

D

Exhibeo ij. ex illis apparente etiam aliqua rudi concoctione.

Sequenti autem die medicamentum præparatorium quod præscriptum.

Si intentio magis urget.

℞. troch. de eupat.

de capp. an. drach. j.

cam. syr. byzant. f. pil. vi. deaur.

Duas pariter ex his præbeo paulo ante syrup.

Sed ubi iam manifesta sunt signa concoctionis, expurgandam medicamento fortioris, quale erit:

℞. agar. troc. scrup. iij. f. inf. f. a. in oxymel.

aut in decoct. beton. aut sem. citri.

facta colatura adde mel. ros. sol.

man. el. an. vnc. ij.

M. & f. potio.

Si bolam volueris:

*℞. El. lenit. drach. vij.
el. indi. aut diaphan. drach. iij.
mann. el. drach. ij.
spec. hiera. f. drach. j. ss. M.
Et cum saccharo f. boli.*

Verfabar in curanda Quotidiana, & erat sermo de Purgantibus tempore Status administrandis: proposui autem meam sententiam de purgantibus. Superest in præsentia, ut de vomitorijs hoc ipso tempore administrandis, diureticis, sudorificis, ac victus ratione sermo fiat.

Vomitória administrantur in principio, & tempore coctionis.

In principio leuiores tantum ad euacuandam materiam in ventriculo, non ad purgandas putridorum humorum reliquias in longinquis partibus.

Vomit. Tempore Status, qui & in remotis partibus persistant: Ideo lib. i. ad Glau. proponit vomitoria ex radiculis, infusione raphani cum decoctione, vel iure. De quibus tamen vomitorij est dubium, num grauiora in quotidiana administranda? nam ventriculus perpetuo laborat, ut lib. i. ad Glau. cap. 5. & est sententia lib. i. 3. meth. cap. i. 1. numquam esse educendum per partem laborantem. Quando conuenient vomitoria ventriculo tam insigniter laborante? Galenus, ut arbitror, inquit non esse administranda, nisi prius ventriculus roboretur. Sed est in hac parte dubium: nam si ventriculus roboratur, non erit facilis ad vomitionem: accedit, quod patiens generat semper pituitosum excrementum, & corroborare ante expurgationem est contra regularem curationem. Itaque horum vsus mihi est suspectus: sed tantum in Principio, & Augmento: in Statu iam concocta materia tentari potius, & illam superare, & euacuare per clysteres, sudorifica, diuretica. Itaque si vomitus conueniat, potius debet tentari post cibum leuioribus, ut oxymel. simpl. vel scil. Ita censeo de vomitorijs.

Corroborantia. Quantum ad Corroborantia, conueniunt interius, & exterius.

Interius, diatrion pipereon diaspoliticum, aromaticum ros. Ego exhibui aliquando hoc ipso anno Theriacam ad scrup. j. & drach. ss. per 4. horas ante accessionem. Et profecto si conuenit in febre Quartana, multo magis in Quotidiana. Nam Quartana ortum ducit ex sicco humore, hæc ex humido, & frigidissimo.

Diuret. Se præterea conueniunt ea ventriculum roborantia, quæ simul, & semel possunt vrinas, & sudores mouere. Decocta quæ in morbis diuturnis, paralyti, &c. vsurpantur decocta ex china, sassafra, ligno Indico cum alijs oleis, & radicibus, & seminibus accommodatissimis. Oportet autem semper respicere temperaturam, ætatem, tempus anni, nam si frigi-

A

℞. lign. Indici vnc. vij.

sassaf. vnc. ij.

infund. in aq. lib. x. bull. usque ad conf. 3.

partis. adde.

rad. apij.

petroselin.

feniculi.

rusci.

assar. an. p. ss. iterum bull. usque ad conf.

med. & in fine adde absyn. co. M. ij.

methasice.

agrimon. an. M. ss.

sem. anisi.

dauci.

san. an. vnc. j.

Facta express. seruetur pro syrupo. Dosis singulo mane erunt vnc. vi. vij. & si obstructions vrgcant, prebe pil. ij. ex trocis. confectas, & fomenta, & limenta;

Si temperatura calidior, tempus anni calidum, & ætas iuuenilis, parabis decoctum magis temperatum; ut

℞. rad. chinorum. vn. j.

sassaf. vnc. j.

infunde in aq. lib. vi. bull. usque ad conf.

3. quartis addendo rad. apij.

fenic. an. p. ss.

iterum bull. ad conf. med. addendo

beton.

agrimon.

mentha an. M. ss.

sem. anisi. vnc. j. f. express. seruetur pro syr. præbeantur vnc. vi. ut supra dictum est.

Interim exteriora non sunt prætermittenda, & pro ventriculo, & toto corpore.

Pro ventriculo conuenit fomentum.

℞. absint.

mentha an. M. j.

calam. arom.

squinant.

spic. an. M. ss.

sem. anisi.

fenic.

dauci.

cimini an. vnc. j.

bull. parum in s. q. vini albi aromatici. Et

f. express. seruetur vinum pro fomento.

Post fomentum adhibe hoc ceratum,

℞. lendani.

massich. an. vnc. ss.

aloes. drach. j.

cinnamo.

garyoph.

zingib. an. drach. ss.

cera.

resing.

tereb. q. s. M. f. Cer.

Pro toto corpore adhibenda sunt fustiones ex oleo relaxante modice digerente, quale est chamomelinum, anethiaum, amygdal. dulc.

Et

Ubi
sunt

Et his omnibus addatur conueniens ratio, quæ in hoc est posita, ut utantur tantum cibi alidis: & siccis, & propterea ex condimentis conueniunt condimentum ex sinapi, Patruini vocant mostardam, capparum aceto conditi, asparagi.

Vinum etiam post primos illos dies.

Sed quantum ad copiam, attendendum videtur admodum tenui. Nam quando peccat humor pituitosus, qui potest in sanguinem conueri, maximus est error frequenter patientem nutrire: oportet semel tantum cibum præbere hora declinationis febris, & debet esse talis, qualem instrui.

Et aduertatis, quod quamquam febris huiusmodi habeat statum remotionis, & videatur in principio requirere plenioris victum, tamen oportet sano modo intelligere. Per Principium non intelligetis primos dies. Est error maximus, oportet tunc vi tenuissimo, & omnibus euacuantibus, sed antequam adueniat status, possunt largius nutiri. Et hæc est curatio Quotidianarum ex pituita dulci.

Quantum ad Quotidianam ex pituita vitrea, ad quotidianam laticam, hæc non differt à priori, nisi quod remedia debent esse magis temperata.

Et quantum ad victum, quia humores etiam alimentales peccant, & propterea corpus emacriatur, licet vi copiosior alimento.

Pariter quo ad Epialam, non differt à priori, nisi quod requirit efficaciora remedia, quam ex pituita dulci. nam ortum ducit ex humore vitreo acido, omnium frigidissima, propterea conueniunt, oxymel scill. syr. de stoch. conf. ex organo, clysteres efficacissimi, purgantia validissima.

Victus sit potius tenuis quam plenus.

Curetio Pariter syncopalis humorosa requirit aliam diligentiam. Est febris, in qua peccant humores pituitosi corrupti. Et quamquam corpora egent purgatione, nihilominus, si purgantur, incidunt in syncopen; propterea curatio est difficilis.

Oportet in hac re esse cautos, nec unicam seruare regulam, considerandum an sit cum viribus iam deiectis, an habeant vires satis constantes.

Si collapsæ, non est quod tentetis. satius est paulatim nutrire, & potius vino, nam bene nutrit, calefacit humores, nec augeat pituitam.

Quod si vires non vsque adeo sint collapsæ, consideretis, num humores sint corrupti, ut minimè possint conueri in alimentum, an quod possint.

Si fuerint corrupti, cognoscitur ex febre insigni, calore oris, vigilis, calore extremorum, mordicatione ventriculi, inquit Gal. lib. 13. meth. cap. 3. rem esse desperatam: non possunt sanari, nisi euacuatio fiat, & tamen vires non sustinent.

Si tamen ullus datus curandi locus est per

A clysteres, ex iure cum melle rosac. oleo chamæm. sale, & ouo.

Potestis etiam vi cibo medicamentofo, ut est pituita ipsa cum pipere aqua mulla non admodum cocta.

Neque in presenti mihi improbaretur alia qua portio mellis ros. sol. quod Gal. non tribuit in usu, ad vnc. j. vnc. j. ff. & sic paulatim expurgare, deinde corroborare.

Sed si humor non sit corruptus, oportet considerare, an sit inflammatio circa ventriculum, vel iecur.

Si non, oportet bene sperare.

Si adsit, casus est desperatus. nam non potest expurgari neque propter vires, neque propter inflammationem.

Si non adsit inflammatio, modus curandi est lib. 12. meth. c. 3. & accipitur ab Auic. per frictiones validas totius corporis in hoc casu tantum, ubi vires satis mediocriter consent, non adsit inflammatio: quæ faciendæ, primo incipiendo à costis, & descendendo ad crura validissimè vsque ad ruborem carniū, postea ad dorsum, & brachia, & iterum redeundum ad costas, & crura singulo die ter & quater: nam hac ratione paulatim corpus digeritur pituita concoquitur. Cibus tamen paulatim præbendus, & clysteres administrandi.

Denique Syncopalis Minuta, curatur opposita ratione, videlicet conuenienti alimentis incrementis humores tenues, roborante os ventriculi, tertio constringentibus & non distillantibus cutem vniuersi corporis. Ad incrementum humores conueniunt cerebella animalium, ut agni, vituli, & partes carilagineæ, capita vitulorum: edulia ex alicæ, & oryza, farina triticea, &c.

Quantum ad astringentia, omnes fructus austeri, cydonia, pyra, poma quædam, cerasa, sorba, & confectioes ex his, conuenit vinum austerum, & extrinsecus fouendus omnibus ipso vino austero cum myrtis, rosæ, balaustris, & corticib. granatorum coctis. Ad cutem densandam aer frigidus, aspersiones ex aqua frigida alterata cum rosæ, pampinis vitis. Et hæc est curatio omnium febrium, quæ reponit Auic. sub titulum quotidianarum.

Curetio
syncopalis
humorosa

De Febris Melancholicis. Cap. XXXVIII.

Post pituitosas febres Auicenam secutus de melancholicis tractabo.

Sunt autem melancholicæ sicuti, & pituitosæ quædam magis frequentes & vulgares, alie minus.

Frequentius contingunt Quartanæ siue intermittentes, siue continuæ periodice; siue etiam continuæ continentes, quamquam raræ.

Infrequentius, quintana, sextana, 7. 8. 9. & ceteræ deinceps.

Agam prius, & diligenter de Quartana, paulatim etiam de Quintana, & ceteris.

M 3 Quarta:

Quartanae febres ex humore melancholico putrescente ortum ducunt. Per humorem melancholicum intelligo Naturalem, excrementum: per naturalem tam alimentalem, quam vtilem, sed non alimentalem; per excrementum omnem praternaturalem ex vitione genitum, siue ex vitione bilis, melancholice naturalis, sanguinis, pituitae, ita vt ex his omnibus melancholiis speciebus Quartana exci-
setur.

Et si quis vltius querat, qualis sit humor alimentalis, qualis vtilis, sed non alimentalis. 4. Fen. 1. can. cap. 1. *Naturalis, & Alimentalis est duplex, qui distribuitur a iecore, & quae sequuntur.* Alius qui distribuitur ab eodem iecore in lienem. Naturalis, sed non alimentalis ipse quoque est duplex: vnus distributus in venas communes totius corporis, vt det aliquam crassitiem sanguinaliter est, qui distribuitur ab eodem iecore per venam portae, & mesaraicas ad lienem, non vt nutriat, sed vt possit appetentiam excitare. Ex his putrescentibus fit quartana. Sed si putrescat Humor Alimentalis in venis communibus, fit Quartana Continua continens, quod tamen rarissime accidit. Quod si huiusmodi humor peccet in liene, facere potest Continuum, sed fteridicam. Nam necessarium, si peccet in his locis, etiam corrumpi excrementum. Pateret si putrescens humor sit Excrementitius, sed vtilis, ille quandoque potest facere febrem quartanam Intermittemem, quandoque Continuum periodicam continentem. Fiet intermitteus si putrescat huiusmodi humor vtilis, & post triginta horas desinat, erit intermitteus, &c. Ex his humoribus fit quartana exquisita.

Sed quandoque fit etiam ex Melancholia praternaturali, de qua loquitur Gal. 3. progn. com. 27. dum inquit, quartanas fieri ex humore auro, & melancholico genito ex vitione bilis, vel melancholice; & lib. 2. de diff. febr. 9. vbi loquitur de febribus sanguineis, vult quasi sanguinem crassum ex vitione in melancholiam transire; & lib. 2. de cris. 1. 2. & lib. 3. de sym. caus. 2. Itaque de melancholia praternaturali genita ex vitione bilis, sanguinis, melancholice naturalis, nemo dubitat.

Quando
ex pitui-
ta fiat me-
lancholia

Est difficultas de melancholia genita per vitionem pituitae. Auic. fen. 4. lib. 1. tract. j. cap. 4. est peculiari tractatu concedit febres Quartanas ex Pituita est tamen res difficilis, quomodo humor ex sui natura frigidus, & humidus possit in calidum, & siccum transire? Responderetur a nonnullis, quibus subscribo, non ex omni pituita melancholiam generari, sed ex falsa dumtaxat. Salsus humor habet nescio quid siccitatis, vbi corpora falsa vehementius exsiccantur, amarorem contrahunt (- vt aff. sequi naturam bilis possunt ex qua potest fieri melancholia, vltiore aditione) & fit humor hic. Nam ex pituita falsa vltius co-
xusta fit sapor amarus: vltius progredi-

te, fiet etiam melancholia. Propterea videmus in externis corporibus corpus cinereum, quae natura humoris melancholici. & propterea summa cum ratione scribit Gal. 3. progn. 27. Quartanas fieri potest febres Etraticas, quia in febribus eptaticis humores incinerantur, & quartanae excitantur, siue cineres sint ex sanguine, pituita, melancholia, &c.

Itaque haec sunt causae, propter quas fit quartana. Ex quibus colligitur, vnde nam febres quartanae excitentur: nimirum alia ex melancholia naturali, siue sit alimentalis, siue vtilis melancholia non alimentalis: alia ex melancholia exusta, quae postea distinguitur in quatuor differen-
tias.

Itaque febris quartana quae generatur ex melancholia naturali, Causae magis Remotae sunt ex parte temperamentum habitus, aetatis, temporis, vitae, & neceat. Quia in temperamento vel calido, & siccato, vel frigido, & siccato potest huiusmodi humor concervari: praeterea habitus corporis gracilis, venaeque lae multo sunt faciliore ad comparandam melancholiam. Ex aetate, illi, qui iam 40. annum transeunt 3. prognost. 28. tempore etiam autumnum frequentius, quam aestivo, & vernali.

Quantum ad Victus rationem, omnia cibaria, quae succum melancholicum augent, vt brassa, lentes, carnes leporinae, animalia palustria, omnia impenso calida, vina admodum generosa, & crassa substantiae. Praeterea cetera cura, anxietas animi, timor, studia, &c. Augeur etiam melancholicum excrementum ex retentis consuetis excretionibus, siue sint haemorrhoides siue impedita sit defluxio ad crura, siue obstru-
ctus lien, potest generari quartana.

Cognoscitur primum quidem vt Quartana est ex melancholica ex causis iam dictis, si adit temperamentum ipsum ad generandam melancholiam, etas accommodata, tempus autumnale praecesserint cibaria iam dicta, retentae excretionibus, adque tumor lienis, est quartana.

Sed habet propria etiam signa. Inter cetera etiam incipit primis diebus absque horrore cum refrigeratione vehementissima, simul cum lassitudine vniuersi corporis ostocopo. Nam humor cum semper adhaereat periosus ossium, non potest eo loci excerni, & facit extensionem validam.

Pulsus huius febris in principio sunt admodum parui, tardi, inaequales, praecipue inaequalitate illa febrili, in qua Systole est celerior diastoli: ad differentiam tertianae. Pulsus praeterea ad differentiam quotidianae sunt duri. Progrediente tempore inuadit febris cum rigore, aliquando diu durat cum ostocopo de lassitudine: calor est multo magis mordax, quam in pituitosis. Propterea quo magis detinetur manus supra pulsum, eo calor deprehenditur vehementior. est calor qualis in testa ignita.

Lotium a principio est crudum tenue.

Vomitus

Causae
febres
mote
bris
ex
cholia
naturalis
siue
sit
alimentalis
siue
vtilis
melancholia
non
alimentalis
alia
ex
melancholia
exusta
lia
natu-
quae
postea
distinguitur
in
quatuor
differen-
tias.

Signa.

Pulsus.
Progrediente febre fit rigor vehementiss. cum lassitudine diast.

Vina.

Vomitus Vomitus sunt magna ex parte pituitosi, quamquam abundet succus melancholicus. Nullum vidui vomuerit nigrum humorem. Tentantur præterea melancholia; tumore lienis, vigilis. Hac ratione cognoscitur febris melancholica ex naturali.

Signa continua.

Non est difficile distinguere Continuum ab intermittente: Nam continua non intermittit. Distinguetis Quartanam ex melancholia exusta à naturali, quia in exusta pulsus sunt frequentiores, celeriores, sitis admodum vehemens, vigilæ magis intensæ, calor maior, præcipue si exustio fiat ex bile exusta, vel sanguine.

Vt verò distinguatis humores exustos inter se, oportet respicere ad habitum, & temperamentum corporis. In calido & humido exustio facta est ex sanguine exusto. In frigido & sicco cum macie corporis, colore fusco corporis. Si addit sitis, facta exustio in humore melancholico naturali. Si temperamentum sit pituitosum, & tamen sit febris, sit ex pituita falsa in melancholiam conuersa.

Prognostica. Huiusmodi febris magna ex parte obsidet viros, in ætate consistente, in autumno, & superuenit aliis febribus, sequitur erraticas: est tamen ex sui natura salutis, teste Hipp. 3. in 1. epid. 4. nisi ut dicit Gal. in com. habet adnatum lienis tumorem, cuius ratione, præsertim vehementis, potest superuenire infirmitas iccoris, ut transeat in hydropem.

Est etiam periculosa, quando tumor est inflammatorius. Si vero periculosa cum tumore, multò magis periculosa, quæ habet tumorem iccoris inflammatorium, vel non inflammatorium, ut ego habui patientes Venetiis, unum ex familia Maurocena, qui obiit ex inflammatione spuria iccoris. Habet tamen hoc bonum, quod ex sententia Hipp. 6. epid. tex. 6. alii qui quartana capiuntur non tentantur aliis morbis, & si his superueniant, liberantur, & Galen. in com. inquit multos epilepticos fuisse liberatos superueniente quartana. Idem dico de aliis, ut lepra, varicibus tumore lienis, &c. Non tamen liberantur, nisi rigores huius febris mitescant. In 6. epid. 2. Rigores non mitescunt, sed propè statim, inquit in com. propriè sermonem esse de febribus. Quartanis, &c. Non recedit tamen breui temporis spatio, durat aliquando quatuor, 6. & ut Auic. vulg. 1. 2. Interdum annos. Itaque instituenda diligens huius febris curatio.

Curatio. Intentiones huius febris Curatiuæ sunt duæ: prima spectat ad Materiam peccantem, quæ præcipua: altera ad Febrem ipsa. Nam de viribus non sumus solliciti, quia non admodum cadunt, magis sumus solliciti de causa, ratione cuius oportet euacuare, attenuare, incidere, calescere, & humectare.

De nescio. Quantum ad euacuationem, primum oritur consideratio de sanguinis missione: volo esse brevis, audietis resolutionem. Considerare oportet primum, qualisnam sit locus, in

quo materia putrescens reperitur: an venæ communes, an verò locus determinatus, siue pars iccoris sinit, vel concaua, nempe venæ mesenterii.

Quando focus putredinis sit in venis communibus, & addit aliqua portio sanguinis cum succo melancholico, mittendus est statim in principio: nec opus ut veramini quia sanguis exiens sit melancholicus.

Vbi autem focus putredinis sit circa lienem & Melaraicas, & Portam, caute agendum, non euacuandum, nisi vbi humor prius euacuetur in venas communes. Et hoc innuit Auic. dum non mittendum nisi tempore digestionis, voluit respexit ad focum putredinis. Si mittatis antequam materia mittatur in venas communes, nil ageris: imò perniciosè ageris, ducetis prauum sanguinem in venas.

Locus missionis ex sententia Gal. lib. 1. ad Glau. est mediana, vel basilica sinistri lateris *Quæ uenæ secantur* habita ratione lienis. Ego existimos venas omnes ortum ducere ex iccore, propterea melius est d. se, ut ex iccoraria dextri lateris. potest tamen etiam secari saluatella sinistræ manus, ut scil. hæmorrhoidibus suppressis euacuetis.

Cum febris quartana fiat ex humore melancholico naturali, vel exustione aliorum humorum, primum tractabo de illa, quæ ortum ducit ex succo melancholico naturali, & postea ex usta. Deinde curatione Quartanæ ex bile, sanguine, &c.

Primum alius lenienda huiusmodi medicamento in potione.

Re. Syr. de polyp. vnc. iij.

mel. ros. vnc. ij.

Decoct. fl. & fruct. cord. q. s.

M. & s. potio.

Leniens in succo melancholico naturali

Vomitus etiam statim ab initio in hac febre tentandus est vel post cibum, vel saltem leuioribus vomitoriis, ut oxymel. simpl. ad vnc. iij. cum unc. vj. aut viij. iuris alterati cum anetho, prouocandusq. est uomitus non semel tantum, sed bis & ter, donec postea prorsus ex ventriculo fuerit euacuata.

Quod si hæc admodum crassa, viscida, & læta, ut leuioribus vomitoriis non facile cedat, preparabitur hac ratione.

Re. oxymel. simpl. vnc. ij. ss.

scil. vnc. i. M.

Exhibeatur hic syrupus, per 3. aut 4. dies, postea vel vomitus excitetur, vel leniens propositum exhibeatur.

Vel si bolum voluerint.

Recip. el. lenit. vnc. i.

man. el. vnc. ss.

sem. citri dracq. ss. M. sine sacb. sal. boli. *Bolus.*

In his leuorib, à principio est insistendum. nam ex Gal. consilio lib. 1. ad Glau. c. 10. grauioribus potius exasperatur, & ex simplici febre fiunt duplices, vel triplices.

Euacuat is humoribus hisce deinceps oportet ad alia transire, preparare humores in partibus magis distantibus, hoc syrupo:

Re. Syr.

Vomitus

Vomitorium fortius

Syr. præ-
par.

*Re. Syr. byzant. cum aceto vnc. i.
syr. de 2. vel 5. radiub.
de succo borrag. an. vnc. ss.
decoct. borragin:
buglosse:
melisse.
mentha.
agrimonia.
beton. vnc. iij. M. pro syrupo.*

Facta hac præparatione, debetis inchoare aliquam euacuationem, non tamen admodum ualidam, potius uti leuioribus saepe repetitis, quod etiam est consilium Auicenn. in curatione Quartanae.

Ego itaque post syropos do leues, & post syropus istos compositos.

*Re. Syr. de pom. compos.
de sum. terr. comp. an. vnc. i.
decoct. Epith. Mesue vnc. iij. pro syrupo.*

In valentioribus exhibeo ij. ex istis syr: in duobus diebus intermissionis: in die accessionis abstinens: in debilioribus vnum tantum ea die, qui antecedit febrem, & sic prosequor vsque ad 5. & 6. Syrupum.

Re. troch. de absint.

de cupat.

de capper. an. drach. i.

M. cum syr. byzant. f. pil. x. deurentur.

Exhibeo ij. singulo mane, exceptis die accessionis, & postea præbeo hunc Syrupum.

Re. oxymel. comp:

syr. byzant.

de 5. rad. an. vnc. ss.

decoct. rad. apij.

petros.

sanic.

rusch.

assar.

agrim.

meliss.

borrag. vnc. iij.

M. pro syrupo.

Si iam incipiat apparere concoctio, de purgantibus, & simul corroborantibus internis, & externis est cogitandum.

Purgantia tamen validissima, nisi perfecta sit concoctio, non administrantur ut pro bolo.

Re. el. lenis. drach. vi.

conf. hamech.

man. el. an. drach. iij.

M. sine sacch. f. boli.

Proportione.

Re. cort. elsch. nig. drach. i.

agar. troc. drach. ss.

infunde in decoct. fl. & fr. cord. cum sene drach. ij. & f. expressio adde mel.

ros. vnc. i. ss.

syr. de polyp. vnc. iij.

M. & f. potio.

Conuenit quoque hoc tempore expurgatio validior per vomitum, & sicut purgans præberi debet ante diem accessionis, ita vomitus in

A die accessionis, non tamen præbeat per duos dies medicamenta.

Si vomitorium habeat locum, fiat ex rad. raphani coctis in iure, add. oxymel. simpl. & scil. an. drach. j. ss. & præbe in die accessionis post assumptum cibum, ut eum euomant. Nam nihil præstantius in quartana, quam ut in die accessionis abstineant à cibo: si tamen illum euoman. præstantissimum remedium. Accipiat itaque cibum horis quinque, vel 6. ante accessionem, postea euomat.

Conueniens itaque salsa cibaria, & quæ recipiunt sinapi.

Post vomitum, vel medicamentum statim conuenit corroborans ventriculum, & viscera

B In tali casu incipiendum à mitioribus, inter quæ est diatriopiperaon, diaspolicum, lib. i. ad Glauc. præbeat statim à vomitu vna rotula ex his. Diaspolicum accipiat absque nitro.

Sequentibus autem diebus iterum insistendum in Præparantibus, & si alius interea non sit lubrica, autendum clystere, vel pilulis leuioribus.

Ego leuissimas in usu habeo, & sunt istæ:

Recip. pil. alephang.

maslich. an. drach. j. cum melle ros. pil. vj.

deurentur: duæque præbeantur

hora vna ante cenam in die, qui sequitur accessionem.

C Si voluerint magis clysteres, non sint admodum calidi.

Recip. decoct. chamom.

anethi.

melisse lib. i.

el. lenis. drach. vi.

mel. ros.

el. cham. an. vnc. iij.

salis drach. i.

Ditell. ou. numero i.

M. & f. clyster.

Interim ex præcepto Auicennæ tria membra roborentur, ventriculus scilicet, iecur, & lien.

D Ventriculus hoc fomento.

Recip. ementa.

absint.

spica an. M. j.

calam. arom.

squinan. an. p. ss.

sem. anis.

coriand. præpar.

fenic. an. vnc. i.

bull. in vino albo aromatico leui bullitione, deinde f. expressio & fomentum ex spongijs.

Post fomentum vero inunctio ex oleo nardino, & mastichino.

Pro iecore hæc inunctio conuenit:

Recip. ol. amygd. dulc.

amar. an. vnc. ij.

Vini aromat. vnc. iij.

Pilule.

Clyster.

Fomentum
cum robo-
rans ven-
triculumInunctio
pro ieco-
re.

absint.

absin.

spica an. M. ff. bull. ad conf. vini, & f.

functio
pro liene

expressione sexuctus pro inunctione.

Pro liene accipias oleum de cappar. sic palatim preparando, leuiter euacuando, & intus, ac extrinsecus corroborando Status adueniet, quo tempore euacuancia efficaciora, & corroborantia conueniunt. Antiquitus erat in usu albus helleb. infusus cum radiculis, aut decoctis. præbere solent in zoulis, in placentulis, in ferculis.

Non displicet modus viri excellentissimi nostri temporis, qui præparat helleborum, facta primò decoctione in aqua communi, deinde addit ouis, & fiat finalia cum oleo, aut butyro.

Probat etiam Auicennas usum lapidis armenii, & lazuli, & consequenter pilulas ex his.

Sed, ut ingenuè dicam, quod experientia comprobauit, nil præstantius inueni, quam si uel vomitio ipsa, illam non prætermitto à principio, sed aduentante Statu iterum repeto, præbens oxymel propositum, de quo dixi, & singulis accessionibus, vel saltem alternatim, excitato soleo vomitum à cibo, & post præbeo diach. yetheriacam, & hac ratione plures Quartanarios curauit, & intra spatium duorum mensium Otto sanauit.

Mihi itaque magis probatur hic modus purgandi quam ceteri per helleborum, & lapides nam ventriculum valde infirmum reddunt. Post vomitum, ut dixi, præbeatur theriaca. confect. mithr. & conf. ex succo cyrenaico, quæ constat ex pipere, myrrha, ruta, succo cyrenaico & quibus portionibus admixtis.

Quid intelligat Galenus per succum cyrenaicum dubium est. aliqui belzoin intelligunt.

His addatur victus ratio, & primis duabus hebdomadis victus sit tenuis, si tamen vires sustineant, abstineant in principio à carnibus & ouis, & accipiant aliquod ferculum in iure, vel panatella, & exhibe potius aliquem piscem laxatilem, ut est perca, aurata.

Exhibeantur etiam, quæ habent vim attenuandi, ut cappares, &c. hæc diætā primis diebus conuenit; postea plenior victus ratio, & conueniunt ea, quæ conficiuntur ex sinapi, & salita, quamquam de hoc Alexander taxet Galenum, nec tamen eius habuit causam.

In die accessionis abstinendum à cibo, vel, si præbeatur, statim euomant. non prohibetur exercitatio cibum vinū potius album, nec prorsus oligophoron. Et hæc est curatio quartanæ à melancholia naturali.

Curatio In melancholia exusta, siue ex sanguine siue ex bile eadem conuenit victus ratio, quæ sit ex me proposita est in febribus biliosis. Confugietis melancholia ad curationem tertianæ febris legitime, propere exusta. ita etiam corroborantia non sint admodum calida, victusq. sit humectans.

In die accessionis non conuenit victus adeo tenuis.

A Quantum ad quintanas, sextanas, septimanas, &c. proueniunt ex eodem humore melancholico, sed magis crasso, magisque pauco.

Quantum ad curationem, sit ea ratione quæ & in Quartana ex melancholia naturali, &c.

De Febribus Pestiferis. Cap. XXXIIX.

A Vicennas post absolutam Quartanæ febris tractationem, statim aggreditur Hæcticas, cuius ordini in præsentī non prorsus adhareo.

Quandoquidem pestilentes talē habeant cum putridis communicationem, lib. 1. de diff. feb. c. 5. idcirco de pestiferis tractandum puro.

Pestiferæ febres sunt illæ, quas Hippocrat. r. in 6. Epid. 29. περιττωδιν aspectu horribiles vocat. Est cacochætes, & Galeno 3. in 1. Epid. 18. dicitur, ubi scribit urinas nigras in Philisco ostendisse. &c. & eodem com. 3. in 1. Epid. 7. cacochætem morbum illum esse.

Vocatur etiam maligna, seu mali moris, lib. 3. de cris. c. 3. & 4. Cum enim scribit quatuor in febre esse consideranda: Ideam, magnitudinem, motum, & morem. Per Morem intelligit malignitatem, vel benignitatem febris, quæ nihil aliud significat quam pestilitatem.

Notandum tamen nomen maligni apud Galenum dupliciter accipio pro febre tantum acuta. 2. in 3. Epid. 1. febres ex cerebro, iecore, &c. malignæ. Sunt hæc malignæ, quod sine magnæ, velocis motus, & acutæ, & propterea quod non sint malignæ, corrigi hoc dictum 2. in 2. Epid. 21. Non ex omnibus partibus maligna, sed tantum ex iecore, & quæ sequuntur, ubi propriè accipit nomen maligni. De propria significatione 2. in primo prorrh. 14. quando inquit malignum spem salutis adimere: propterea addit affectiones illas, de quibus loquitur Hippocrat. non esse appellandas ferinas, sed perniciosiores. Vocantur etiam exitiales, perniciosissimæ, exitialissimæ 1. in 1. Epid. 21. & lenticulares, periculares, ab exanthematis periculis, lenticulis, &c.

Habet huiusmodi febris omnis generis febres & omnis speciei cum occulta, seu venefica qualitate.

Per febres omnis generis, & omnis speciei, ut vulgare Epidemicas, Endimias Ephemeræ, Putridas, Hæcticas intellige, quæ omnes possunt esse pestilentes. Pro iunioribus explico, quid intelligam nomine Epidemici, cum Hippoc. & Galeno 1. in 1. Epid. 1. & 1. acut. text. 9. quæ vno & eodem tempore multas regiones simul & se melinuadunt, Endimias, quæ multos singulares homines vno tempore affligit in vna tantum regione determinata, aut in vna vrbe.

Sporadicas appello, quæ neque plures regiones, neque vnicam vnicō tempore ita affligunt ut multi vnā laborent, sed quod quisque possint incurere. Itaque febris pestilens potest

Unde 5.
6. 7. 8. 9.
&c.

Quæ febres pestiferæ.

potest esse Epidemica, Endemica, Sporadica.

Quod Epidemica, apud omnes clarum est libro primo de febr. Quod Endemica, experientia docet Byzantii & in Cairo, possunt appellari Endemica, ubi singulis annis affligunt, & statutis horis desinunt.

Quod Sporadica, præter quotidianam experientiam vocabitur Febris pestilens Sporadica, Propterea 3. in 4. Epid. § 7. dari febres pestilentes absque peste, id est, dantur Sporadica absque peste, & clarius lib. 3. de prælag. ex puls. capite quarto, proponit primum pestilentem vulgarem.

Postquam dari pestilentes absque peste intellexistis, non de Sporadicis.

Dixi esse has cuiuscunque speciei, putridas, B Ephemeræ, Hæticæ. De Ephemeris apud Galen. nihil manifestè invenire potui, quicquid dicat Alimarus: ut si ad ipsius auctoritatem respicimus, non dabitur libro primo, de diff. febr. § 5. Nam febris Ephemera, aut Putrida, aut imputrida, Si putrida est contra Galenum, qui loco citato excipit Ephemeræ.

Si dicatis sunt imputridæ, non propterea potestis effugere auctoritatem eiusdem Galeni, qui loco citato scribit, oriri febres, quæ omnes ex putredine oriri ducunt, &c. tamen ratione, & experientia huiusmodi pestilentes sunt concedendæ.

Ephemeræ pestilentes. Nam huiusmodi qualitas, quæ constituit febrem pestilentem, primo, & per se est intensa spiritibus. Propterea lib. de sem. cap. 16. quæ agunt à tota substantia, inquit, momento temporis per uniuersum corpus permeare, quia distribuitur qualitas & vis, & is spiritus est, qui primò & per se suscipit huiusmodi alterationem.

Accedit experientia. Nam Anglicæ sunt species febris Ephemeræ pestilentis, quæ 24. horarum spatio interficiunt, vel cessant, & nisi sudent, omnes interficiunt, propterea dicuntur sudorificæ. Itaque nec Valesij aurtitas, nec ratio accipienda, qui libro 5. controu. 2. negat, prorsus dari pestilentes febres Ephemeræ hac sola ratione quod sint saluæ, &c. iam si adiungitur spiritibus occulta qualitas, omnes moriuntur, ut obseruatum est Anno 1565. & 66. in qua qui prorsus sani videbantur, interire. De qua etiam Thucydides lib. 2. histor.

Verum huiusmodi sint putridæ, an non, res est dubia. Dicam spiritus posse putrescere cum Valesio lib. 1. controuer. 19. Alimarus prop. tract. de pestil. admittit pestilentes ex putredine ex admixtione vaporis putridi cum istis spiritibus.

Sed non sequitur, spiritus inficiuntur putredine. Ergo erunt causa putredinis febris Ephemeræ. Si putrescat propria substantia, non est subiectum illius febris. nam statim, ac putrescit, corrumpitur.

Nota, si spiritus in substantia putrescit, non est amplius subiectum febris. Spiritus non

A sunt tales, ut partim sint in putrefieri, partim putrefacto esse: & idcirco non retinent focum putredinis. Spiritus igitur in propria substantia non erit subiectum huius febris.

Cum autem dicam Alimarus misceri vapores putridos cum spiritibus, concedo. sed tamen hi spiritus non sunt subiectum huius febris.

Itaque datur febris pestilens, sed spiritus tunc tantum in calefacto est, aut totus putridus est.

Dantur & pestilentes hæticæ lib. 3. de prælag. ex puls. cap. 3. in fine, & 4. & lib. 10. meth. cap. 11. De quibus quaeritur, an putridæ sint, *An pestilentes hæticæ* an verò imputridæ. Et ratio quæritur, quia omnes Galen. lib. 1. de diff. febr. cap. 5. aperte scribit, putridæ se accipere dogma Athanæi, omnes esse putridas, & qui scribit hæticæ esse pestilentes, debet etiam concedere, esse ex putredine. Sed non supponunt hæc febres putridæ, quod in omni putrescant omnes humores cordis lib. 4. de prælag. ex puls. cap. 3. Dari quasdam statim in initio, & ostendit, quomodo huiusmodi putridæ sint hæticæ.

Si datur putredo, quæ obsidet cordis substantiam, potestne vlla seruari pars, quæ ad solidas pertineat, potest putrescere substantia cordis, carnea.

Si humiditas dispersa per substantiam cordis, potest fieri, ut liberentur debitis remediis: si seminalis pars iam putredinem contraxerit, nulla excogitari potest medicina, quæ superet.

Nec est, quod quis dicat, cor non posse sustinere hanc putredinem in propria substantia. Concedo quidem, absque quod patiens non moriatur: sed quod non possit, falsissimum esse anatome docuit, &c. interibunt tamen.

Denique dantur putridæ ex putredine omnium humorum: non dico febrem pestilentem putridam esse tantum synochum: alix enim febres ex inflammatione sunt cum sanguinis putredine.

Dicunt, sed falsò, sanguis in benignis non putrescit. Sunt nugæ: putrescit, & conuertitur in pus. Itaque pestilentes omnis speciei dantur.

Propterea Nicolaus Massa lib. de peste cap. 3. scribit se obseruasse febrem Quartanæ pestilentem usque ad 64. diem perdurare. Dantur itaque febres pestilentes omnis speciei, quod præbatur. Pestilentia non est certum genus morbis. est quid commune, quod coniunctum est cuius morbo, ut bubo pestilens, asthma pestilens. synochus pestilens, &c. cuiuscunque morbo connectitur huiusmodi qualitas, facit hunc morbum, tertio in tertio Epidemiorum, longo sermone proponit factum ignem, qui fuit valde diuersus ab Erysipelate propter pestilitatem. Vide Galenum in Commentar. connumerantur enim malignissimi, Tandem Hippocrat. & Galen. com. 16.

etiam. 16. multas febres varias vagatas esse omnes pestilentes, ita, ut omnis febris possit appellari pestilens. Quae sit causa, quae hanc faciat, intelligetis in sequentibus.

Antequam ad proximam pestiferarum Causam me conuertam, dubium erit inquirendum, quod ex dictis emergit: num febres pestilentes possint quandoque intermittentes esse? Emergit ex dictis, cum dictum est veneficam qualitate vnicuique febris connecti posse: si omnibus febribus: Ergo & intermittensibus.

Hæc res apud Medicos est satis dubia, & pauci ita stant. Vnicuique est Georgius Agricola, qui arbitratus est, dari febres pestilentes intermittentes. in Galeno & Hippocrate nullus est manifestus locus: nihilominus videtur Galenus hoc voluisse com. 46. 3. in 3. Epid. quando enim Hippocras. ibi ponit febres in constitutione illa grassantes, inquit Galen. in Comm. Hippocras. mentionem fecisse febrium, quæ vagabantur in hac constitutione, & præcipue Intermitentium: Non tamen dicit fuisse pestilentes, sed cum Hippocrate videtur concludi posse, quod sic.

Sed quidquid sit de autoritate, adest experientia & ratio, quæ hoc docet.

Quantum ad rationem, argumentor sic: *Num se* Datur pestilentia absque febre: Ergo magis potest dari febris pestilens intermittens. Maior est clarissima ex Hippocrate & Galeno 3. in 3. Epid. 74. Quam sententiam amplexati sunt doctissimi viri Mercurialis, & Andreas Gallus, ibi manifestè proponit litem pestilentem: quæ grassabatur in internis partibus, inquit, huiusmodi fuisse formidabiliora quam deteriora; & quæ sequuntur. Si igitur pestilentia talis potest contingere, quæ vniuersum membrum corrumpt siue febre, potest etiam contingere, ea ipsa virulentia in febre intermittente, dum natura transmittit ad partes ignobiliores. Et ego somel obseruari febrem tertianam intermittentem cum exanthematibus nigris.

Causa. Venio ad causam huius febris: hanc dixi esse veneficam qualitate. De hac est dubitatio magna. Plures existimant nullam esse veneficam qualitate, sed insignem & excellentem putredinem, quæ superat gradum communem putredinis aliarum febrium. Ego semper existimaui hos esse in errore. 2. meo libro de Phlegmatis fusiis, nunc breuibus repeto quasdam rationes.

Esse uent Primum, si ad rationes spectemus, potest confirmari, febres pestilentes ex venefica qualitate pro producti, duplici argumento.

fic aqua- 1. Febris pestilens habet proprietates cuiuslibet veneni: Ergo habet venenum annexum.

2. Febris pestilens habet effectus cuiuscunque alterius veneni. Ergo habet venenum.

Quo ad proprietates veneni, præcipue sunt, ut curetur alexipharmacis, libro decimo tertio meth. cap. sexto. Sed sic est, quod febris pestilens ipsa quoque curetur Alexipharmacis;

Ergo etiam venenum.

Quod curetur alexipharmacis, patet experientia quotidiana: curatur enim lapide bezoartico, terra lemnia, terra Silefiata. Galen. libr. de Ther. ad Piso. capite decimo sexto. inquit, curari has febres theriaca tanquam igne purgatorio. 6. in 6. Epid. & libro nono simpl. cap. de terra Samia scribit, pestem curatam bolo armenico. Alij alias habent antidotos, nec valent quod dicunt aduersarij, curare hæc secundaria siccatione magis quam occulta qualitate: nam reiecit hanc rationem Doctissimus Scaliger Exercitat. decima quarta, quem locum videatur.

Præterea, ut dixi, habet effectus veneni, quales libro sexto de loc. aff. capite quinto, de scribuntur: venenum momento temporis mutat malo modo corpus ipsum, reddit illud liuidum, nigrescens, diffuens, propterea corrumpt & mortificat: hæc omnia facit febris pestilens; quinimo in magna pestilentia, corrumuntur etiam partes solidæ, seminales, & qui vult videre patientem, legat Hippocras. 3. in 3. Epid. nam videbitis quanta fuerit corruptio ex hac lue pestifera. Itaque habet proprietates veneni. Ergo est venenum. Sed confirmatur etiam Galeni & aliorum testimonio libr. de Ther. ad Pis. capite decimo sexto, pestem esse quasi feram quandam venenatam, & quæ sequuntur. Secundo etiam Commentario sectione secunda, epid. loquitur de constitutione admodum pestilente, 3. in 3. Epid. Constitutio fuit magis australis, & subiungit, nomine ichoris intelligi succos pestilentes text. 38. secundi in 6. Epid. ubi loquitur de sanguine ichoridie, ibi in commentar. intelligit sanguinem venenatum, & citat locum in 2. Epid. Id ipsum facit libr. de cib. bon. & mali succi, capite secundo, ubi referens symptomata & morbos in pestilentia, inquit, mirum non esse apparuisse; quandoquidem mirum non est cibos prauos in ventriculo conuersti in veneficam qualitate.

Multa alia loco essent pro confirmatione, quædam tamen producemus infra; propterea nunc hæc sufficiant.

Si volueritis aliorum authorum iudicium, sunt Aetius 2. Tetra. 1. cap. 96. qui causam huius pestilentis febris scribit esse venenosam qualitate. Paul. lib. 2. cap. 9. & Doctores omnes recentiores, Fernellius, Andreas Gallus, Oddus, de Oddis, Fracastorius, Mercurialis, &c.

Itaque cum constitutum, sit esse veneficam causam, superest, ut declaremus, quid sit hæc qualitas venefica. Ea dupliciter consideratur, 2. absolute, & in relatione ad corpus humanum.

Absolute est proprietas totius substantiæ malitiosa, uenefica, ex improbis succis, aut vitioso aere in humano corpore genita.

Dixi esse proprietatem totius substantiæ, quia cum huiusmodi qualitas sit venenata, omne venenum

uingsit
liuida e-
rumpit
macula
liuida.

quid quæ
lita, uene
fica.
Quid ab-
solute.

Atentes, in quibus nulla adest humorum putredo. Igitur non necessarium est, omne venenum pestiferum sequi insignem putredinem. Propterea lib. 1. de diff. feb. c. 3. inquit Gal. quasi velit aliud esse pestilens, aliud putridum contra opinionem huiusmodi recentiorum.

Sed ego addo rationem aliam consideratione satis dignam. In humano corpore potest reperiri causa prorsus illi similis, quæ generat venenam qualitatem in animalibus. Ergo generari poterit hoc venenum absque putredine. Antecedens probatur. quandoquidem eum in animalibus generetur venenum ex quodam certo determinato temperamento, quod naturaliter in homine reperitur: fieri tamen potest, ut detur temperamentum præter naturam in quodam subiecto, parte determinata, loco, cuius ratione generetur venenum, prorsus simile ei, quod ciaculantur bruta animalia: hoc non est præter rationem. hoc concessio, si in animali sit ex putredine. Ego etiam in homine, ut contra res sit clara.

Venenū vipere non esse excrementum putridum, est naturale, sicut mucus in homine & profecto si huiusmodi substantia generatur in cane rabido, etiam potest in homine. Spuma canis rabidi non generatur ex temperamento proprio, sed determinato, & tamen virulenta non est necessarîo putrida, est calida & succissima: ita etiam in humano corpore potest aliquando reperiri talis intemperies, cuius etiam exempla in historicis, in febribus quæ inducunt ad tabem, & tamen absque putredinis signo.

Cum itaque venenum absque insigni putredine generetur, solvamus rationes, quæ in oppositum solent adduci: Si Galenum legamus lib. 7. de diff. feb. c. 4. & 5. videtur c. 4. aliam veneni naturam non intellexisse, quàm quæ sit ex ingenti putredine: & propterea citant Hipp. auctoritatem 3. in 3. epid. 50. ubi post relatas omnes affectiones in ea pestilencia concludit omnia fuisse excellentis putredinis in 6. epid. 29. Domini, pro solvendis his locis duo dici possunt: Primum Gal. lib. 1. de diff. feb. c. 4. respexisse ad pestilentes, quæ magna ex parte contingunt. Nam æquæ sunt ex insignis humorum putredine, ex ænium patientibus reperiuntur 90. qui hac putredine tentantur, ad quod respiciens dixit cum Hipp. esse sobolem insignis putredinis: sed non est vera consequentia: magna ex parte. Ergo nulla est febris pestilens, quæ non fiat nisi ex putredine, nam dantur etiam huiusmodi.

Est tamen secunda solutio & melior, febres pestilentes esse cum putredine, potest intelligi dupliciter.

Quod omne venenum pestilens fiat necessario ex causa præcedente putrida: aut possumus intelligere, quod semper habeat putredinem annexam. Si primo sensu intelligatur, hoc dixi esse falsum rationibus & auctoritatibus. In 2. conclusio est vera. Ratio autem

A quanquam venenum pestiferum non generetur ex causa putrida, nihilominus, ut venenum est, & venenum calidum, habet vim putrefactoriam, quod maxime proprium veneno calido. Propterea setica medicamenta, quanquam non generantur ex putredine, sunt siccissima, tamen statim putrefaciunt: ita etiam huiusmodi venena in humanis corporibus genita in ea parte putredinem insignem faciunt. Propterea hectica pestilens est cum putredine: itaque omnis febris pestilens est cum putredine.

Hactenus satis explicavi, quid sit venetica qualitas absolute considerata, venio in relationem ad humanum corpus.

Huiusmodi venetica qualitas est causa seu principium omnium gravissimorum malorum & symptomatum quorquor in humano corpore reperiri possunt coniegitosa, magna ex parte interficiens.

Dixi esse causam, non dixi esse morbum. quia in parte, non accipio Fernelii & Argenterii sententiam, qui constituunt quantum genus morbi præter Galeni tria, quod vocant morbum à tota substantia. Datur quidem proprietas, sed non est morbus: est Causa, & Principium morbi.

Sed advertatis, quando est principium omnium gravissimorum malorum seu morborum, dupliciter contingit. 1. Est principium gravis morbi 2. Et morbi & gravis morbi. Explico.

C Quando pestilencia ortum ducit ex aere venefico, qualitas est principium gravis morbi potius, quàm morbi.

In constitutione ex aere morbi multi vagantur, ut & in hac constitutione satis commoda. Sic in constitutione vagantur ex proprio cuiusque virus, quæ magna ex parte salubres: Si tamen huc accedat qualitas venetica aeris, tunc incipit morbus quanquam salutaris, evadit gravis, ut anno 1575. & 76. multi eiusmodi morbi grassabantur. Si erat bubo, erat pestilens, &c. Propterea dixi esse principium non morborum sed graviorum morborum.

Quandoque vero est principium morbi, & gravis morbi, quando causa ortum ducit ex eructis succis in corpore genitis, propter causas dictas ex improbo victu. Itaque ex aere magna ex parte graves morbi, sed non morbi. Ex succis vero gravis morbi, sed non gravis, morbi generantur.

Dixi autem esse principium omnium morborum, quia nullum est genus morbi, quod non possit fieri ab huiusmodi succo venenato. Nam sunt febres, morbi omnes, ulcera, quæ aliquando totam depascuntur carnem, omnia membra corrumpunt; & incipit hic affectus aliquando à causis externis: aliquando internis, & præcipue à corde, thorace, capite, quando suscipitur per inspirationem: quando incipit à pravis succis, semper incipit à causa externa.

Si natura valida transmittit excrementa ad partes

Quid venenū cōsideratum ad corpus humanum?

Venenū vipere non esse excrementum putridum, est enim excrementum naturale.

Solutio. nes ratio nū in contrariū ad ductarū.

partes exteriores; ut scribit lib. quinto de usu A patrum capite tertio, fuisse pestem qua grassante in pedes in constitutione relata apud Hipp. patres varix tentabantur, 3. epid. 26. Itaque dixi esse principium morborum, & symptomatum.

Dixi etiam esse contagiosum, sed quando dixi esse principium contagiosum, non intelligaus semper huiusmodi febres esse contagiosas. Nam est falsum. Dantur pestilentes sporadicæ, quæ non sunt contagiosæ. nunc habeo huiusmodi patientem:

Aliquando etiam Epidemicæ, non sunt contagiosæ, ut superioribus annis Pisauri.

Cur aliquando contagiosa, aliquando non.
Quinimo scribit Procopius, lib. 2. de bello Persico, nihilominus magna ex parte Epidemicæ pestilentes sunt contagiosæ; quandoque etiam sporadicæ, ut annis superioribus Parauij contrahebantur ex panni tegulis infectis studio a quibusdam huc transportatis, qui etiam sunt suspensi, causa quod aliquando contagiosæ, aliquando non.

Quid contagium?
Contagium est actio quadam qualitatis morbosa in corpus humanum dispositum & præparatum, quæ fit per contactum.

Dixi esse actionem, ut explicarem genus contagij, quod continetur sub actione tanquam proprio genere. Quid nemine actionis intelliga n? Est impressio huius qualitas morborum in subiecto corpore. Hæc qualitas morbosa quandoque habet tres conditiones, quandoque duas.

Tres, quando est calida, putrida, venefica.

Duas, quando vel calida & putrida, vel calida & venefica. Est calida & putrida & venefica in febribus pestilentibus putridis. Est calida & venefica in virulentia animalium, quæ venenum ei aculantur. Itaque actio huius est compressio.

Subiectum qualitas venenata.
Huiusmodi qualitas est posita in aliquo corpore, quod est potius vaporosum. Nam contagium fit ad distans.

Itaque contagium potius in corpore vaporoso, & quia hoc & rarum est & densum, & viscidum, huiusmodi qualitas in denso & viscido potius est, quam raro, propter quam causam facile adheret, unde reteruatur in tegulis, pannis, & alijs rebus.

Quando fiat contagium.
Quia tamen mouetur ad distans, mouetur per aerem; aer, qui defert hanc substantiam vaporosam contagiosam, aliquando est similis ipsi qualitati contagiosæ, aut saltem non contrarius: & in tali casu fit contagium, quia nihil est quod possit illam oppugnare.

Quando non.
Sed si aer habeat oppositam qualitatem, secundum quam possit illam corrigere, non fit contagium.

Hinc fit quod, ut audio, Byzantii, ubi grassatur pestis singulis annis, ingrediente sole in leonem, tollitur non solum pestis, sed tota etiam virulentia. nullum amplius est contagium, sed si vehantur merces ad nos, retinent contagium.

Causa, quia in hisce regionibus aer noster non habet hanc qualitatem alexipharmacam, ut ibi. Quæ causa cur morbi Epidemici sopradici aliquando contagiosi, aliquando non.

Dicit quis, cur si aer infectus est, non omnes afficiuntur? soluitur à Galeno & definitione nostra. Diximus agere tantum in corpus dispositum, ut & Gal. lib. 1. de diff. feb. c. 4. qui inquit, non omnes tempore pestis peste tentari.

Quæ est hæc dispositio? Est similitudo humani corporis ad huiusmodi qualitatem contagiosam.

Quæ corpora omnia habent moderata, non capiuntur pest vel ea lenissima. itaque oportet adesse corporis dispositionem.

Dixi denique fieri per contactum. per hunc intelligo aliquando contactum corporis tantum vaporosi, quando scil. contagium fit ad distans; quandoque est contagium corporis.

Denique dixi magna ex parte interficere. Nā reuera etiam lues venerea est principium omnium morborum, tamen non magna ex parte interficit. Ad cuius differentiam hoc addidi.

Ad signa me iam conuertam. Pestilentis febris seu pestis signa quedam sunt Prænunciatiua, quedam Demonstratiua, & diagnostica. alia prognostica, & prænunciatiua: alia quæ de monstrant febrem fieri posse ex parte aeris, alia ex parte succorum in humano corpore.

Quantum ad aerem, præcognoscitur pestilentia, si est constitutio omnium humidissima, vel præcesserit talis, vel adhuc persistat à ventis in totum silens. Si hoc potissimum tempore & constitutione animalia completa ex putri genita appareant, ut sunt infecta; si fructus, olera, carnes & pisces facillimè putredinem contrahant: si stagnantes aquæ & fetorem exspirent, prauum & virulentum habeant colorem. Cognoscitur præterea futurus status pestilens ex frequentibus & maximis terræ motibus: Fit enim ut simul cum exhalatione, quæ hunc facit, etiam prauus halitus hominibus insensibus exspiroret, quanquæ etiam aliquando vel pecudibus, & animantibus possit esse molestus. Id ipsum colligitur, quando multa apparent animalia, quæ in cauernis degunt, in terræ superficie, quando propria deserunt loca, antea, cuniculos, & præter consuetudinem in superficie apparent. Ex plantis, si pauciores, minores, decoloratiores apparent. Ex cometis etiam duplicem ob causam potest prædicti pestilentia. Primum, quia cometa est signum copiosæ exhalationis quæ potest etiam antequam accendatur, veneficam qualitatem contrahere. Secundò, etiam ipse calor cometæ accendi potest putredinem in corpora humana inferre, superante calore extraneo natuum. Ex his igitur potest prædicti status pestilens futurus.

Quantum ad præsentis febres pestilentes, multa proponuntur à scriptoribus signa quibus

Quæstio cur ab infectione non omnes afficiantur.

Signa prænunciatiua, & diagnostica. alia prognostica, & prænunciatiua: alia quæ de monstrant febrem fieri posse ex parte aeris, alia ex parte succorum in humano corpore.

Terræ motus.

Cometa.

Signa febrium pestilentium.

le is pra
sentis.
Pulsus.

quibus huiusmodi cognoscuntur, sed tamen A
omnia diligenter ad pentum sunt reuocanda
etiam incerta & dubia sunt. Examinabimus
ignur singula. Primum quidē sūc pulsus, qui
semper sunt parui, & imbecilles, quandoque
inaequales, quandoque ita aequales, vt hac in
parte sanis sint similes; Sunt parui & langui
di, quia de ratione vniuscuiusque veneni &
cōsequenter pestilentis febris est, vt proprie
taut. cordis aduerletur. Propterea & spiritus
& substantiam solidam atq; illius temperiem
corruptit. Hinc pulsus sūt parui & imbecil
les, sunt inaequales non secundum omne in
aqualitatis genus, sed tamen secundum illas
differentias, quae potius pertinent ad faculta
tem & vsum, quam ad instrumētum, & faculta
B
tatem. Declaraui ni fallor in *Libro de pulsibus*
hac prolixi. Hoc saltem dico, pulsus febrium
pestilentium inaequales esse, pulsus inaequales
in vnico ictu, vnica pulsatione, diuerfos vo
catos, non duos nam sunt pulsus diuersi du
xi vno & eodem tempore cor laborat inaequa
li intemperie calida & frigida: hinc talis sit

Frigida: pulsus. Sūt pulsus inaequales in vnico ictu sub
quia fe- variis digitis, qui vocantur decurrant: sunt e
minatis tiam eminuli & prominuli: sūt & inaequales
pars a- in pluribus pulsationibus myuri, qui, vbi proxi
mittit ca mi fuerit, mori, deficiunt etiam tandem in
lorem: ca vermiculosos & formiculosos. Aliae differen
da ab ex tiz intercepti sunt potius ex instrumētis ob
seruo. structis vel repletis, & propria ratione non

ostēdunt pestilentias sicut relati, sed ut dixi,
sunt etiam aequales sanis similes lib. 3. de praef.
ex puls. 4. Si quērat. causā, retulit. l. 3. 4. 5.
Causa est inaequalitas temperaturae, quae ca
dit in solidam cordis substantiam & propin
quas partes Propinquas partes oportet intel
ligero humores in sinibus cordis cum Galē.
4. sub finem, vbi hae pares viciniae habent vnā
intemperiem, cordis substantia aliam, sunt
aequales: quae contingunt tribus modis, vel cō
tingit solidam cordis substantiam esse cali
dam, & humores propinquos frigidos, in quo
casu pulsus sunt aequales, & febris hectica pe
stilens. Ex quo colligetur veritatem, quam do
cui superius, posse dari febrem pestilentem
libiq; humorem putredine. Quod si contra,
humores calidi, solida substantia frigida, febris
erit pestilens, sed putrida, faciuntque simili
ter rursus aequales. de hac lib. 8. de praef. ex
puls. 5.

Sed dicetis, si detur, vt pulsus sint similes
sanis, quomodo cognoscuntur? Si praeterea
hi pulsus in hectica, & pestilente, quomodo
distinguntur? Cognoscetis febrem pestilen
tem, cū pulsus sunt aequales, ex paruitate &
imbecillitate Non intelligit Galen. esse simi
les sanis omnimodo c. 4.

Oportet igitur in his casibus comprimere
pulsus nam compressus resistit, si febris non
sit pestilens.

Propterea cognoscitur ex calore thoracis si
regionem thoracis tangas, partes sunt calido-

as: Praeterea oportet obseruare fauces. Nam si febris
ad sit pestilens, in faucibus apparebit exulcera
tio, color luidus, rubicundus, erysipelaceus. Si
ad sit febris anelius praeter consuetudinem, ma
ximam est signum.

Quod ad hecticas, vt has cognoscatis esse
pestilentes. Cognoscuntur primum ex pul
sus celeritate, quanquam hectica pestilens ha
beat pulsus aequalem, & vna pulsatio non si
frequentior altera, quanquam parua est ta
mē celer. Ratio h. e. cum solida cordis substan
tia sit calidissima, quanquam homines frigit
di contemperant illam caliditatem, vt non
excurrat: Contra si pestilens putrida, pulsus
Signa fe
br. li pe
stilentis
hectico
rum.
Signa fe
bris pesti
lentis pu
dani febrem, semper solidam substantiam eli
tridg.
se in calefacto, ut notauit suo loco Gal. lib. 3.
de praef. ex puls. 4.

Sed reuertor ad proponenda signa, quo
rum aliqua sunt proposita, & primum sunt
celeritas pulsus. Secundū ignorant se febrici
tare, quanquam febricitent, & non delirant

Praeterea quando ad sit inaequalitas colle
ctua, &c. non tamen inaequalitas, quae cadit
in systolen & diastolen, adest, nam in hac dia
stole est celerior systoli, in putrida contra.

Sunt & alia signa: vrinae variae, turbatae, con
fusa, quales iumentorum, non sunt crassae ab
soluē possunt enim etiam esse crassae in febre
miti, quandoq; sunt etiam cruae, tenues, al
bicanes, aliquando prorsus similes sanis: de
causa diuersitatis, quidquid alii dicant, verita
tem refero.

Reperuntur vrinae turbatae & confusae ex
putredine in vasis communibus in venis om
nibus vel maximis cum domino sanguinis. Crassa
subiuga
lis.
in tali casu expurgantur per vrinas, fit insignis
humorum agitatio & consequenter pertur
batio. Sunt cruae, quando aut focus putre
dinis est in aliqua parte determinata, aut in
iecore & venis, sed cum abundantia humo
rum crudorum, vbi hi non expurgantur. Sūt
prorsus sanis similes in hectica pestilenti. Nā
virulentia malefica obsidet tantū cor, nō recur
nec venas lib. 3. de crisi c. 2. tamen moriuntur
propter extinctionem caloris innati. Consi
derandum lib. 3. de praef. ex puls. c. 4. proponit
inter vrinas prauas, quae habent sedimentū li
uidū, & quae habent sublimamentū telis aranē.
Cur vri
nae telam
araneam
referat
sua ma
la.

Apud scriptores tales non offendi. Deinde
vellem scire propter quam causam reponant
tur inter prauas. habent sublimamentum
in formam circularem, idē vult in forma
emulari telas, propterea scribit in forma tela
congesta. Tale contentum saepius obseruau
in pestilenti, & certē primis annis ignorau
causam, eam tamen iam dicam.

Arbitratus sum esse perniciosum propter
triplicem causam, figuram, situm, colorem
propter figuram, nam contentum naturale
debet esse pyramidale, quod indicat coctio
nem: si obtinet formam circularem, ostendi
humorum

in eorum insignem agitationem in corpore, A
 & venis.

Ex situ. nam huiusmodi sublimamentum
 est crassum: si esset tenue, non esset tantum
 quod ascenderet. cum igitur ascendat, sit pro-
 pter impetum caloris exsiccatum & attenuan-
 tis substantiam crassissimam.

Ex colore etiam. nam materia cruda, debet
 potius tendere ad fuscum significat itaq; mate-
 riam valde exsiccatam. I. sec. de vitiis.

Calor.

Quantum ad calorem, hic magna ex parte
 in externis non apparet propterea Aujc. habet
 quietem exterius, turbas interius: nihilomi-
 nus dantur etiam feruentissimæ, ut Thucydi-
 des meminit, febre pestilenti laborantium,
 qui propter insignem caliditatem exteriorum B
 in puteis se extinxerunt: tamen plerunq; ut
 lib. 4. de pract. ex pull. cap. 4. lib. 3. de crit. cap. 4
 & lib. 7. de simpl. med. fac. c. de terra. Samia.
 quimmo 4. pcur. com. 17. febres ardentes, om-
 nes habere externa frigida & 4. aph. 48.

Fluxus
 colliqua-
 tus.

Cognoscitur præterea ex fluxu colliquati-
 vo. 3. in 3. Epid. comment. 27. hoc signum ne-
 que consequitur omnibus pestiferis, nec semper,
 nec solis. Non semper, quia dantur pestiferæ,
 quæ nullum habent prorsus alui fluxum: sed
 præterea non omnibus, quia dantur, in qui-
 bus adest potius fluxus materię nigricantis aut
 alterius coloris, quam colliquatus scilicet 4. aph.
 com. 21.

Non solus, quia ex sententia Gal. lib. 10. met.
 med. c. vlt. & li. 8. de comp. med. sec. loc. c. 7. sit
 etiam colliquatio in febribus ardentibus. C

Itaque fluxum colliquatum febris pesti-
 lentis distinguetis à cæteris. primum, si febris
 non admodum ardens: nam proprium fe-
 bris pestiferæ est, ut inflammet, & mortifi-
 cet, putrefaciat, lib. de cib. bon. & mal. suc.
 cap. 1. Et quanquam ex sui natura febris non
 sit ardens, potest talis esse ratione veneni. Ac-
 cedit, quod ubi adest febris pestilens, colli-
 quatio magis fuerit. Hæc præcipua signa fe-
 bris pestilentis.

Petientia

Præter quæ manifestior apertula variis co-
 loribus in cute, exanthemata quædam acumi-
 nata in cute, quæ sunt crassioris materię, carbun-
 culi, bubones, paronides, abscessus insignes. Si
 accedat etiam insignis inappetentia, cum lin-
 gua arida, nam malunt mori quam cibum ac-
 cipere.

Prognos-
 tica.

Omnis pestilens perniciofa, & magna ex
 parte ad necem deducit. Vna spes salutis est
 virium robur.

Curatio.
 Præser-
 uatio pe-
 stis.

Cum nobis institutum sit de omni febre
 pestilente verba facere, propterea etiam de
 Epidemica, quæ pestis nuncupari potest. Id-
 circo congruum est non solum febris pestilen-
 tis curationem, sed etiam pestis præservatio-
 nem proponere: de qua primo, deinde de cura-
 tione erit sermo.

Præser-
 uatio.

Ad præservacionem pestis nihil aliud con-
 fert, quam conveniens victus ratio in omni-
 bus sex rebus non naturalibus. Idcirco si ex

parte aeris huiusmodi affectio communicari
 debeat, quantum quidem suspicamus in pri-
 mis qualitatibus & oculis primum huius ra-
 tio est habenda, quod sit, si quando veneficam
 qualitatem contineat, à caliditate fugiant, vi-
 tent aerem, longè, citò, tardè, dicunt illi, est
 consilium, quod desumitur ex Hippoc. com. 2.
 lib. de nat. hum. tex. 4.

Alter modus est per correctionem aeris, qui
 corrigitur partim exsiccatibus, partim etiam o-
 doratis.

Tempore Hipp. ad extirpandam hanc, in-
 cendebant nemora ex lignis potissimum odo-
 ratis, iunipero, cupressu.

Conferunt ut dixi, quæ exsiccat, & odorem
 habent. Sed quia his temporibus non facile
 nemora incenduntur, altereitur aer liquoribus
 accensis: Propterea utantur suffumigijs ex la-
 dano, styrace, belzoino, gariophyllis, ligno z-
 loes, aut decoct. aq. nenuph. rosaceæ, melissæ,
 cum santalis, rosæ, myrtis, cortic. citri, ozymo-
 catiophyllato, cinnamomino, & pomis odora-
 tis, quæ continuè detineantur in manibus, &
 conficiantur ex ladanis addito moscho & am-
 bra, styrace, nunc mulcata gariophyllis. Forma
 sit talis.

Be. ladani vnc. ij.

garioph.

lignialoes

nucis mosch. an. dras. j.

styracis dras. ij.

moschi

ambre an. scrup. j.

M. & cum aq. ros. & flor. citri aut cum vi-
 no odorato fiant pil.

Tempore calidioris convenientior poma ma-
 gis temperata, quæ recipiant simul cum lada-
 no camphorem, santalos, flores rosarum & vio-
 larum, addito tamen moscho & ambra. Pos-
 sunt etiam componi globuli quidam perforari
 aut ex ligno aut ex ligno aut argento, in quibus
 includitur spongia madefacta in aceto & a-
 qua ros. vel aceto & aq. si citri, vel alia aqua
 magis odorata, detineatur semper sub manibus.

Conuenit etiam continuè in ore gestare a-
 quam radicem odoratam gentianæ, imperato-
 ris, zedoariæ, costum, zinziber, cinam, nucem
 mokhigarioph. radicem angelicæ.

Præterea cordi extinguitur imponendum,
 quod inhibeat aeris præhæm qualitatem: Pro-
 bat ut vsus inunctionis ex theriaca, multida-
 tio, addito succo citri, vel limonum. proba-
 tur vsus inunctionis, factæ cum oleo. magni
 Ducis Eleuteris aut ex oleo, quod vocant oleum
 vitæ, vel oleum hypericonis. Laudant nonnulli
 gestacionem artemisia in sacculo impositi supra
 cor.

Quia hac ratione venenum nunquam pos-
 sit in cor recipi: sed venenum attrahit ve-
 nenum: propter substantiæ similitudinem.
 Sed quanquam ratio probabilis, sum eius opi-
 nione: nullam medicamentum venenatum
 posse attrahere venenum, nisi attrahatur. Si attrahatur

debet

debet attrahere, oportet ut tangat carnem, ca-
lescat & rubefaciat locum. Propterea non
improbo usum venenari, sed consulo, ut per-
misceatur cum portuuncula mithridati ol. pio-
posio, theriaca.

Sacculi. De sacculis nihil dico, quia mihi videntur
parum prestare posse.

Quantum ad reliqua, si corpora ab extre-
mentis sunt munda, neque purgatione, ne-
que sanguinis missione indigent, sed aliis
perpetuo lubrica est seruanda: si sit astricta, pro-
clysteribus vel pil. moueatur pestilentialib.
de 3. cum Ruffi. Quod si corpus sit impurum,
cacochymia & plethoricum, conuenit venæ
sectio, & purgatio. Propterea lib. 1. de diff. febr.

Cibus. c. 4. se in statu pestilentiali hoc obseruasse inquit
Galen. esse necessarium. Itaque secunda vana &
euacuandum. In cæteris conueniens victus
ratio seruanda, ut vtiuntur cibis optimi succi,
abstineant ab omnibus fructibus horariis, ab
oleribus quæ faciliè putrescunt, sicibus persi-
cis, cucum. &c. à lacticiis, casco, venere: vtiun-
tur exercitationibus moderatis; nec manè nec
vesperi exponant se aeri, & vtiuntur vita fruga-
lipoterunt etiam vii anudon antequam domo
exeat, de quibus in curatione, ad quam nunc
venio. In qua curanda ego non versabor cir-
caephemeris, quia citò iugulant, vel ad sanita-
tem transiunt.

Curatio
putrida-
rū pesti-
lentium. Distribuida curatio est in duas partes 1.
ad Putridas pestilentes. 2. ad Hæcticas pestilē-

tes. Primum in Putridis pestilentialibus locum
habent Indicationes, quæ propositz sunt in
singulis putridis. Sed præter illas indicatio-
nes, adest etiam alia desumpta, quæ quid indi-
cet, docuit Galen. lib. 13. meth. cap. 6. lib. 4. de
simplic. med. fac. cap. 18. & lib. de constit. art.
cap. 19. His locis inquit, curari venena vel alte-
ratione, vel euacuatione per manifestas qualita-
tes, vel quæ agunt - proprietate occultas, seu totius
substantie. Euacuatio autem fit per medicamē-
ta attrahentia in cute, siue sint calida & actia,
siue caua cornua, aut cucurbitulæ, aut caute-
ria, aut alia attrahentia. Itaque intentio ratio-
ne veneni est alterare ad oppositas qualitates,
alterareque à tota substantia, & attrahere ve-
nificam qualitatem ad cutem. His suppositis
venio ad curationem.

Q. Num Ratione putredinis, quatenus pender ex
humoribus, conuenit euacuato etiam per a-
liceas se-
care ve-
nam. lias vias. Quæritur itaque, num expediat san-
guinem mittere, & per sectam venam? Si ego
vellem multum morari in singulis quæstioni-
bus, per duos menses integros finem non fa-
cerem. Nam nullum est remedium, quod nō
habeat varias diuersitates. Quia tot sunt pe-
stus facies, ut quod semel profuit, in alia non
profit, quod vni alteri non. Hic fluctuant autho-
res. Ego dicam per quasdam distinctiones, quid
tūd & conuenienter agendum.

Quantum ad venæ sectionem, quanquam
res ita controuersa, ut reperiantur, qui sem-

per abhorreant & nihil existimēt pernitentius.

Ego rem hanc egere distinctione puto,
quæ fere tota ex viribus petenda, aliquando
etiam ex occasione, propter quam facta fe-
bris pestifera. Ex viribus. nam ubi constant,
citò & tūd potest secari: si infirmæ, semper
abstinendum.

Ratio est in promptu Nam ubi in febre pesti-
fera putrida vires sunt collapsæ, non solum ve-
nenum ipsum superauit facultatem cordis, sed
venarum solida substantia etiam est corrupta.
In hoc casu sectio est intermittenda, q. docuit
Galen. libr. aduers. Iulianum cap. 8.

Hac ratione 2. etiam aph. 17. in cacochy-
mia, quæ etiam significat insignem humorum
putredinem, Galenus fuit venæ sectionem, &
vitiur tantum purgatione. Propterea libr. de
cib. bon. & mal. succi. cap. 1. inquit in ea pesti-
lentialia, quæ suo tempore contigit, paucis mis-
sum esse sanguinem, & id summa cum ratio-
ne factum esse: quia quibus secabatur, morio-
bantur.

Ratio, quia cum huiusmodi febris pestilens
ortum duceret ex prauis edulij, eo corruptio-
nis venerunt humores in venis, ut nihil boni
superesset. Ex quo, ut obiter dicam, accipio
sententia doctissimi Erasmi, qui scribit in qua-
da n epistola ad Conradum Gesnerum, tutius
esse mittere in illa, quæ ex aere, quam quæ ex im-
probis alimentis profecta sit.

Ratio, nam ubi ex aere, non est necessarium,
omnes humores in venis esse corruptos. In
quo casu potest mittere, missus potest attrahere
virulentiam à corde ad venas.

Sed si ortum ducit ex prauis alimentis, om-
nes humores sunt corrupti, propterea pericu-
losa. Idem lib. 9. meth. cap. 3. consulit mitem-
dum quamprimum in febris synochis, ante-
quam putredo venas ipsas aggrediatur.

Itaque ex illis, quæ scribit 3. in 3. Epidem.
79. patet, non vsque adeo Galenum reprobas-
se sectionem in pestiferes. Nam scribit Hippo-
crat. 1. in 3. Epid. id fecisse, & eum laudat pro-
pterea non improbauit à principio tantum,
quando vires adhuc sunt constantes. propte-
rea etiam Aetius Paulus, Oribasius, Aui-
cen. Celsus, Mercatus, & Vidus Vidius ad-
mittunt hanc; quanquam Cardanus; & alij
aliter sentiant.

Inspicienda enim est occasio fabricis. Si or-
tum duxerit ex prauis succis, magis timenda,
quàm si ex aere adde. Si virulentia sit suscepta
per inspitationem, mittatur: si per transpiratio-
nem, non, ne virulentia in ambitu retrahatur in
venas. Secunda igitur vena hac ratione.

Sed quæ? Quidam secandis inferiores, alij
superiores, & ex his putant potius magnas
quam paruas. alij saluatellam. In hac re opus
est distinctiones: si ortum duxerit febris pesti-
fera ex vasis communib. secantur inferiores, ut
eò trahatur venefica qualitas. Nam si curum
scarificatio probatur propter eandem intentio-
tionem, conueniet & sectio.

N 1 Idiosum

Quæ ve-
na secan-
da. Quæ
do inferi-
ores.

hiplum est faciendum ubi sunt suppressi A
menles, sed si obideat locum determinatum,
aperiatur superior. Virum verò in cubito
vel saluatella, oportet respicere ad vires: si sint
constantes, communis; si imbecilles, aut ve-
reamur in posterum tales reddi, non displicet
sectio saluatellæ; quanquam Aloysius Mun-
della, & Hieronymus quidam Epistolas scri-
pserunt contra Iosephum Valdanium contra
hanc rem: nihilominus eorum rationes nihil
valent contra nos. Nam nos non requirimus
ad eam copiosam euacuationem, saltem vj. ve
vii. vnciatom.

Tempus
mittendi

Tempus mittendi, si fieri possit, est prima
dies, aut si vires constet, secunda. nam statim
concidunt.

Ludovicus Mercatus tract. 4. febris mali-
gnæ consilium, ut reiciatur sectio, cuius sen-
tentiam improbo quia febris progreditur, ve-
nenum diffunditur.

Q. Nam
dicat ve-
nam seca-
re appa-
rentibus
periculis
carbuncu-
lis, bubo-
nibus,
etc.

Vnum quaeritur, an apparentibus periculis,
exanthematibus, carbunculis, bubonibus, li-
ceat venam secare: quæ ipsa quoque sententia
habet proprios auctores. Io. Baptista Salsus in-
legium de hac re libellum scripsit, qui hanc
rem probat. quod accipit Vidus Vidius lib. 6.
& Mercatus prædicto tract. 4.

Ex alia parte non desunt auctores & ratio-
nes in adversum, quod non. Nolo proferre
rationes, quia longum. Dicam tamen rei veri-
tatem. Apparentibus periculis adest plenitudo
quo ad vasa, vel non. Si adest, mittendus san-
guis per venæ sectionem etiam apparentibus
periculis: si non, abstinendum.

Quod debeat aperiri in plenitudine, ratio est
in promptu, quia in tali plenitudine, si sanguis
mittatur, citius materia transfunditur extra ve-
nas ad cutem.

Ratio quia, ubi adest plenitudo quo ad va-
sa, ea ita extensa ut fibræ non possint fungi
suo officio. Exemplum simile est, libro 4. de
loc. aff. cap. 4. inquit inter ceteras causas, quæ
faciunt difficultatem urinae, esse copiam urinae,
& quæ sequuntur: ita etiam contingit venis
nimium repletis: accedit quod ubi admodum
sunt repleta, officia ita adstringuntur, ut illud
quod est conclusum, non possit euacuari.

Accedit etiam, quod cum tota putredo sub-
sistat in ipsis venis, si intermitatur sectio in
tali plenitudine, quid erit tandem? non
euacuabitur focus totius putredinis per cucur-
bitulas. Propterea Galenus lib. 14. meth.
cap. 10. in carbunculo pestilenti secatur venam,
& lib. 3. de comp. med. sec. loc. cap. 2. in paro-
tidibus etiam secatur. in 6. Epidem. tex. 30. in
apparentibus pustulis in cute etiam. Quando
tamen aut non adest insignis plenitudo, aut
quando existat insignis plenitudo, si quis vult
facere largam euacuationem, periculum est,
ne materia retro cedat, Propterea lib. 4. de
tuenda val. cap. 6. respiciens ad statum corpo-
ris, in quo non adest tanta plenitudo, prohibet:
pariter lib. 4. de tuenda val. cap. 10. in lassitu-

dine phlegmonose inquit secta vena retroce-
dere.

Sed in tali casu non mittatis, nisi corpus sit
plenum quoad vasa, & miratis, mediocriter.

Inter chirurgicas operationes, quæ in pesti-
feris locum habent, præter venæ sectionem, Cuius
sunt etiam cucurbitulæ, hirudines, cauteria, &
vesicantia.

Cucurbitularum nomine intelligo tam scar-
rificas, quam non scarificatas: & per scarificatas
tam illas, quæ infernis admonentur (quas di-
xi substituendas in locum scarificationum) &
quæ lumbis, dorso, & natis apponuntur, om-
nes locum habet. Nam si sermo sit de ficiis,
poplit, malleolis adhibendis, aliquando locum
habent, etiam si nulla præcesserit venæ sectio,
quando vires eam non sustinuerint, ad fuerint,
symptomata graviora.

Eligitur etiam scarificatio post sectam ve-
nam, quando dicta symptomata iam appa-
reant.

Quod ad cucurbitulas dorso, lumbis, & na-
tibus adhibendas, disputari alias, num liceat
his partibus affigere, atque etiam obiectiones
dissolui: una restat, de qua inferius num ad-
ministranda apparentibus exanthematibus &
periculis: quod sunt potius symptomatice quàm
crucis eiccta: solam inferius, pro nunc satis
sit intellexisse adiuvandum esse huiusmodi mo-
rum.

Si mulier gerat vtero, in hoc casu non ita mu-
tum est cucurbitulas eo loci affigere, poteritis
applicare brachis.

Venio ad Hirudines, quæ possunt affigi-
venis sedalibus, narium, temporum, & post
aures.

Sed talibus quæ consueverunt sanguinem
per hæc loca excernere nulla præmissa sangui-
nis missione, teste Galen. lib. 4. de tuend. val.
cap. 4. ubi scribit in plenitudine totius corporis
euacuandum per sectam venam.

Sed aperiri non possunt huiusmodi venæ,
quando fuerit secta vena, quando urget co-
ma, delirium, nec appareant maculae, ubi ad-
hibenda cucurbitula. De hirudinibus adhi-
bendis venis narium habeo maximum dubi-
um. Scio hæc esse in usu, mihi tamen minimè
probanur: Moueor autoritate & ratione, ex-
perimento quinetiam.

Quantum ad rationem, non solent adhi-
beri nisi ubi iam morbus est in augmento. Cuius
quia adhibentur ad euacuationem sanguinis
in capite, post vniuersales adhibentur: tunc
gignitur febris pestilens, de qua nunc est sermo,
est consummata, absoluta, & putredo admo-
dum progressa. Si itaque superius diximus in
hoc casu non secandam venam, multò minus
licet euacuare sanguinem per huiusmodi lo-
cos eo ipso tempore: Quia euenit, ut magna
ex parte compesti non possint, nec sunt fig-
menta. Proximis mensibus quidam obiit apud
Seruos statim post adhibitas hirudines venis
narium, non vi morbi. Si urgeat necessitas, po-
terius

teritis adiuuare setis porcinis, aut phlebotomoi; A
nam est minus malum.

Accedit, quod euacuatio sanguinis narium in pestiferis, numquam est salutaris. in hoc dis-
ferunt ab acutis, quod hæc magna ex parte iu-
dicari solent feliciter per sanguinis narium ex-
cretionem composissimè 3. in 3. Epidem. com.
35 74. scribit fluxum sanguinis narium copio-
sissimum esse proprium signum benignarum, &
& quæ sequuntur. Et rationem attulit locis
cit. & com. 67. 4. libr. acur, ubi docet, sangui-
nem, qui excernitur ex naribus stillatum, vel
effunditur ita stillatum, semper malum quippi-
am esse, &c. Per locorum densitatem intelligit
inflammationem cerebri. Propterea non adiu-
uetur, vel non adiuuanda hirudinibus propte-
rea addiuuetur setis porcinis scarificatis narium,
aut venis post aurea.

Cauteria

Quantum ad Cauteria, solent administrari
potius in pelle ad præseruationem, qui modus
rutilissimus, ut est obseruatum in pestilentibus pro-
ximis. Sunt valdè familiaria in brachijs & cru-
ribus, nihilominus aliquando etiam vlturpan-
tur in ipsa actuali febre, in comate, leihargo,
&c. adhibentur etiam aliquando in bubonibus,
carbunculis pestilentibus.

Vesicantia

Quantum ad Vesicantia, hoc tempore non
ero longior in comprobando horum usu, vltra
satiatatem scripti confugie ad tres libros, dicā
tamen hic quædam principaliora.

Primum existimo huiusmodi medicamen-
ta debere in omnibus febribus pestilentibus
(loquor de pestiferis) siue sint ardentes, siue
non, administrari. Si non pestilentes, tantum
malignæ, non probo, sed alias reuulsiones. Ra-
tiones in meo libro videre.

Tempus Principium morbi, non Status, vel saltem tem-
ad mini- pus, in quo patientes sunt extinctioni proximi,
strand. quod faciunt medici.

Oportet in pestilenti statim post vniuersum,
deuenire ad vesicantia: à me in hoc casu ad-
hibentur partibus infernis, ut venefica qualitas
deriuetur ad partes ignobiliores.

Progrediente febre si augeantur symptoma-
ta capitis, adhibeo etiam brachijs supra carpū,
aut supra cubitum; vrgente adhuc magis ne-
cessitate etiam post aures, & syncipiti.

Vai d li- Ego aliquando infixi nouem cauteria patien-
iam mi- tibus, & Deus testis est, maxima cum felicitate
rum. in vs, quo etiam primatu huius vrbis pro-
fessores deservere.

Materia vesicantium est varia, sed ego ha-
beo infrequenti usu expertum. Nam pasta
ex cantharidis, fermento, sinapi requiritur et
ceratum, ut possit seruari supra locum, & est ef-
ficacissimum, nec molestum.

*Re. canthar. prepar. vne. ss.
euphor.
sina p. an. drach. j.
sem. amicos. drach. ss.
cera.*

*resina
terebin. an. q. si
M. f. ceratum.*

Hoc medicamentum habet multas difficul-
tates, quas nō propono, dumtaxat duas aut tres
audieris, breuis ero.

Prima ratio, quod hæc medicamenta im-
pediant motus naturæ, secundo quod coctio-
nem; tertio quod febris calorem calorifica ad-
augeant.

Quoad primum: quando dicunt impedi-
re motus naturæ, aduertatis. Vesicantia ex
nostro consilio adhibenda in principio mor-
bi: in principio petam ab istis num existiment
esse viles, & criticas, an symptomaticas? Si
respondeant symptomaticas, profecto argu-
mentum nihil concludit: si criticas, ego osten-
dohuiusmodi excretionēs in principijs pesti-
ferarum omnes potius adiuuari, quàm impe-
diri in principio: addo vesicantia in principio
posse prohibere fluxiones saltem symptoma-
ticas, & viles adiuuare. Videmus excretio-
nes pestiferarum, quæ sunt per nares, vomitum,
alui fluxionem, sudores, exanthemata,
& carbunculos, subones, parotidas, vel vri-
nas, quæ sunt principales excretionēs. Ex his
quales viles, & quales inuiles? Inutilis stilli-
cidium sanguinis narium, fluxus alui, & vo-
mitus. De stillicidio sanguinis narium iam
intellexistis, Gal. semper explodit. hanc retra-
huit vesicantia. Vomitus quoque est excre-
tio, quæ aliquando solet contingere in pestife-
ris, sed rarè admodum. videbimus paucissimos
patientes, nihilominus hæc quoque excretio
perniciosa lib. 11. meth. cap. 4. in febribus sy-
nochis, quæ non sunt pestilentes, consulti vt
ducantur excrementa per aluum.

Per vomitum autem rarè inquit: nam ve-
retur lationem, hanc retrahit vesicans. Pro-
pterea Aetius sermones. in affectu cardia-
co vtiur his. Tertia euacuatio improba, fluxus
alui colliquatiui ex 3. in 3. ep. 59. est si-
gnum pessimum, in com. 53. autem debilita-
ta retentrice, fieri henterias didicistis: Est etiam
consentaneum, sicut extincta erat facultas
ventris nutritiua, vnde cibos proflus ait Hip-
poc. paulo post eos fastiduisse. sic retentricem
etiam fuisse lesam; & 57. pestis quoque
inquit illa longissima, quæ nostra ætate vulga-
ta est per excrementa alui omnes propè pere-
mit.

Fluxus colliquatiui estne vtilis? Profe-
cto non: oportet hunc retrahere, & impedi-
res, quod faciunt vesicantia: alix euacuatio-
ne excitantur à vesicanibus: vrina, quæ vili-
lis vt Hipp. 2. in 1. epid. 109. 4. & sequentibus,
dicit in illa pestilentiā illos tantum esse serua-
tos, quibus superuenit stranguria, &c. quod
adiuuent alias excretionēs, maculas, bubones,
iam clarum. Potestis legere meum tertium li-
brum.

Quod verò istæ sint viles, iam probo. Pri-
mum

rum 6. aph. 25. Galenus scribit omnem excretionem ab internis ad externa vtilem esse: protulit hæc verba occasione eorum, quæ scribit in Hipp. aphorismo, ubi ait, ignem factum ab externis intro conuerti, non bonum; ab internis vero extra bonum. inquit Gal. huiusmodi sententiam non tantum in Erysipelate locum, sed vniuersum in omnibus habere excretionibus. Itaque omnes excretiones, quæ sunt in cutem, viles sunt; & com. 17. eiusdem 6. lect. exemplo anginæ, & 3. progn. tex. 17. vsque ad 20. Propterea Galen. habet pro signo perniciosissimo, si excretiones aliquando retrocedant: hæc, quam ipsi vocant symptomaticam B

Respon *sio ad 2,* quam apparuisse, &c. Sed dicunt, adfuit in principio, & in principio nihil vtile excernitur. Nihil concludit argumentum. Quis hæc docet? Si talia, qualia decet vacuantur, & cum tolerantia vinum, semper sunt viles. Repetit Gal. pluribus locis 1. aph. 2. qui est locus præcipuus, & egregius in febre pestifera. si excernitur venenum, nonne excernitur, quod debet excerni? Si maculæ bubones, &c. Nonne ea, quæ debent excerni, neminem puto hoc negaturum.

Sed si verum est in materiaurgente posse Medicum ut purgante statim in principio, quæ ratio, ut statim in principio non possit euacuanti Vellei audire rationem.

Sed quod maioris est momenti, alio tempore viles esse non posse nisi in principio, si loquamur de pestifera adhuc cum periculo.

Nam duplex in principio, in declinatione potest sponte sua excerni. 4. aph. 2. 1.

Sed si supponamus pestiferam in suo vigore inter principium, & augmentum. illud verum tempus in quo debent fieri salutes crises, & qui has non habent, moriuntur. loc. 2. de phœnig. 1. com. in 1. libro proth. text. 12. ubi scribit Hippocr. in phreniticis, & quæ sequuntur in com. considerat, quæ sit permutatio crebra, & inquit potest fieri à partibus nobilibus D ad ignobiles, vel contra.

Si priori modo, morbi sit levis, benignus, si posteriori, sit periculosus, lethalis. His declaratis, subiungit postea quamobrem dixit Hipp. in principiis: quia (inquit Galen.) aliter fieri non potest. quid clarius? propterea vesicæ, quæ adiuuant, sunt prorsus amplectenda, ut lib. 3. de comp. med. sec. loc. cap. 1. in parotidibus loquitur de parotidibus benignis in abscessibus. libro decimo tertio meth. c. 5. viuit pariter attrahentibus. Qui plura voluerit, legat, ut dixi, meos lib. de phœnig.

Pharma *cia.* In pestiferarum cutitione nihil fere caret dubio: audiuitis quæstione circa chirurgiam contingentes: audietis nunc quæ ad Pharma-

Q. Vtrum *ciam,* *conueniât* *euacuanti* *me-* *dicamentis,* *utrum conueniant?* Ratio quæstionis est, quia Hip. 3. in 3. Epidem. 56. & 57.

assent omnes fere peste illa laborantes ventris purgatione fuisse exuncti. Hippocr. 6. purgationes multos offendebant: quorum qui sic habeant subito multi peribant: multis malum producebatur. 57. vniq. verbo: qui longis morbis, vel acutis tenebantur, ventris viuo omnes præcipue exanimati sunt. Cunctos namque venter sustulit. Galen. etiam in com. illo 57. inquit, *quod contingit in hac pestilentia Hippocratica,* & quæ sequuntur.

Itaque si omnes, qui ventris purgatione tentantur, intereunt, non administranda.

Ex alia parte cum hæc febris ex cacochymia humorum valde putrescentium ortum ducat, ex sententia Galen. 2. aphor. 17. aliter non tollitur, quam purgatione. Idcirco lib. 1. de diff. feb. cap. 4. vult corpora omnia esse siccanda purgationibus; & lib. 5. meth. c. 10. ubi sermonem facit de viceribus pulmonum, quæ continebant in pestilentia, inquit idem, *ut ex hoc loco videatur posse colligi purgationem esse vtilem.*

Resolutè dicam. Distinguendum primum, utrum febris pestilens ortum ducat ex partibus succis propter praua edulia, an ex acre, vel eam extrinsecà. si primum, suspicandum febrem hanc semper habituram fluxum colliquantium periculosum connexum, in quo casu maxime C cauendum à purgationibus.

Cognoscens autem superuentura hæc, non tantum, si febris ortum duxerit ex prauis succis, quantum etiam si sit valde ardens, & adfint ventris tormina, rugitus, murmurationes: In his casibus cum purgationibus cautè agendum, si autem ortum duxerit ex causa extrinsecà, vel intrinsecà, ubi talia non adfint, licet deuenire ad euacuanda.

Sed dubitatio etiam est de qualitate, utrum in principio sint danda lenientia, vel electiua purgantia? Sunt rationes: quidam enim volunt, quod purgantia, quia materia turgida, statim euacuanda, deinde est venefica, quæ non potest concoqui; tunc in principio vires magis constant, quam in progressu. Accedit, quod in principio non adest ille fluxus colliquantium qui superuenit in augmento. Q. Vtrum in principio danda lenientia an electiua purgantia.

Dicunt alij è febris hæc maxime omnium vires deieci, quarum habenda ratio. Accedit, quod cum videatur maxime proprium fluxus colliquantium, verendum ne corrumpant in intestina, & veniant ante tempus.

In hac re etiam distinctione est opus.

Si ortum duxerit ex causa extrinsecà, & homo sit probis humoribus, non improbo medicamentum purgans.

Ei quia etiam post dubium, utrum in hoc tempore adhibenda purgantia validissima, quemadmodum faciunt Paracelsiste, antimonium scilicet diatubith minerale, an miora? Quamquam magna pars Medicorum explodat, nihilominus in peste in corporibus, quæ corrumpunt ex aere extrinsecò, si statim accipiant hæc validissima, puto in his casibus

libus posse esse proficua, ut potuit obferuare in proxima peste, vſurpanda autem in robuſtiſſimis, etiam ducat à cauſa externa.

Itaque melius eſt vi purgantibus minoribus, ut pilulis Ruſſi, diacathol. rhab. agarico, &c.

Si febris ſit valde ardens, imminetque ſuſpicio fluxus colliquatiui, vitamini lenientibus illiſq. refrigerantibus, & humectantibus: & quia in tanta humorum putredine vnica euacuatio non ſufficit, ſingulis aut alternis diebus eſt vitendum leniente ſubducente aluum. tale, quidquid alij ſentiant, poteſt eſſe caſſia: improbant quod ſit humida nocēter, ſi perſeueraret in corpore, & putreſceret, aut loco eius ſume ſyrup. roſ. ſol. mel. roſ. ſol. ſerum caprini cum melle, vel ſyr. roſ. ſol. exempli gratia, primo die ſyrup. roſ. ſol. vnc. ij. cum lib. ij. aut ij. ſeri caprini preparati, aut pari ratione mel. roſ. aut manne. Si vires permittant, ſequenti die vnc. ii. decocti cum alijs ij. aut 3. lib. ſer. caprini. Si infirmiores, abſtineatis, & tertio præbeatis.

Si vires hanc euacuationem non ſuſtineant agendum clyſteribus refrigerantibus, & humectantibus, ſunt poſſimum ex pulſanę hordeaceę lib. i. cum ſacchari vnc. ij. & butyri vnc. ij. accommodatiſſimi etiam ſunt ex lib. j. lactis, ſacch. vnc. ij. & butyri vnc. ij. Vbi cōtra aliud ſit lubrica, vel vires non permittant, ad his deueniendum.

Sudorifica. Euacuanda etiam eſt materia per ſudores, cum totius corporis, partim per cucurbitulas, per veſicantia, inunctiones.

Inunctio nes. Inunctiones ſunt varię, ſed his temporib. in frequenti vſu habetur Aetii ex ol. aq. & nitrio vnc. ij. ol. dulc. ol. amygd. dulc. vel chamom. vnc. ij. nitri drach. ij. Ex hac inunctione inungetur vniuerſalitas totius corporis, qua ratione euacuatur materia ad circumferentiam, & quamquam non deſint recentiores, qui horum vſum improbant propter nimiam excaleſcentiam, quia tamen ſcopus magis vrget pellere venenum ad eum, admitto.

Verum eſt, in febris ardentibus potius: ol. chamom. quam amygd. dulc. vſurpandum. Et ſi hyems non ſit admodum rigida, ſatis apud Germanos in hypocaustis poſſunt ad miſtrari, accipienda etiam diuretica.

Alterantia. Alterantia in febre peſtifera ſunt refrigerantia, & humectantia ratione febris ſiccantis, catdiaca, & alexipharmaca.

Quo ad refrigerantia, & humectantia non deſurro, qui exiſtimarunt locum habere aquā ipſam frigidam: inter hos eſt Cornelius Celſus lib. 3. cap. 7. accipit ex Auic. c. de cur. febr. peſtilent. Gal. vero & Hippocrat. nullibi de hac verba fecere, quamquam in ardentibus conceſſerunt, mihi tamen (pace noſtri Auic.) non poteſt probari, primum enim certum eſt in peſtifera febris, ut dicebam, excretionis viles magna ex parte fieri in principis, 1.

in 1. Epidem. 12. Si ſunt in principis excretionis viles, aqua frigida, quæ præberi in huiusmodi morbis, præbetur gratia alterationis, vel euacuationis. Gratia euacuationis in omnibus il. ec. 1. acut. 41.

Et propterea vult præberi huiusmodi aquam tempore tantum coctionis: inſurgit enim natura ad expulſionem huiusmodi humorum.

Si itaque res ſic ſe habe in peſtifera, in quibus vires admodum imbecilles, natura non admodum valida, ut poſſit frigidum humorem ſuperare, potius inferretur caſſia, 2. acut. 10. 40. quam ut poſſit prodeſſe. Periculū enim, ne retineatur in ventriculo, & omnia mala producat, quæ ibi recententur: in tali igitur caſu mihi non probatur. Si ſitiant, probatur magis aqua hordeacea, ſtillantia ex acetofa, ſoncho, cichorea, ſyrup. acetofus, de acetof. citri, ſuccus limon. deſtillatum ex carne cum acetof. citri, quæ bibant vſque ad ſatietatem. Itaque de aqua ſic ſentio.

Quantum ad ſiccantia, partim calida, frigida, in actiuis qualitatibus temperata. Calida ſunt amara, ſalfa, acia, frigida, auſtera, acerba, acida.

In febris ratione ſiccationis amara, ſalfa, acia non eligenda. nam augent calorem febrilem. accipienda quatenus alexipharmaca.

Quantum ad frigida, auſtera, & acerba, qui dquid alij ſentiant, & Auic. dum curat febres ex variolis vitur astringentibus. Itaque dicit iſte, cum eadem ratio poſtiferum & harum, idcirco conueniunt hæc astringentia. Domini mihi non probantur, exiſtimo aliam eſſe rationem variolarum, aliam februm peſtiferaum.

Obſeruabitis variolas ſalutares non apparere ante quartam diem, itaque nobis licet eo tempore medicamentis vi, ſed in his febris aliter res ſe habet. Si exhibebitis hæc, prohibebitis excretionem exanthematum, itaque relinquenda. Poteſtis tūc accipere refrigerantia, & ſiccantia, acida, ſuccum limonum, arantiorum, citri acetofa, acetum, & omnes confectiones ex his. ſyrupum etiam de ribeſi nam ribes eſt potius acidius, quam auſterus, alii vero auſteri, cotonea, meſpila, granata improbantur: iſti ſucci etiam probantur, quatenus habent vim aperiendi permiſticum de coſto ex pentaphyllo, agrimonia, acetofa, borragine, capillo veneris, meliſſa, ſem. citri, & ſic moueatis mediocriter vrinas.

Quantum ad ſiccantia, ſunt alia, quæ ſunt neque admodum frigida, nec admodum calida, ſed in actiuis qualitatibus temperata, terra cornua. &c. varia.

Sunt omnia ſiccantia, nec habent vim refrigerandi, aut calefaciendi. Sed quia omnia etiam inter alexipharmaca locum habent de his diſputationem inſtituam lectione ſequenti.

Plurima ſanè ſunt cardiaca medicamenta quæ

Proban-
tur ex ſic-
cantia a-
cida.

Aqua
frigida
potio nō
probat

*Differe-
tia simpli-
cia.*

quae in pestiferis administrari solent, & hae parum sunt calida, parum frigida, suntq. vel simplicitia, vel composita. Ex simplicibus, nulla sunt apud Medices probatissima, quae tamen aliquam habet difficultatem. Inter hae est lapis bezoaricus ab Arabibus quidē celebratissimus, & nostris temporibus à Ioan. Manardo, & Garcia ab Horto de quo lapide contra febres pestiferas, & omne venenum plura dicuntur.

*Lapis be-
zoaricus.*

Ego tamen, ut ingenuè dicam, dum Venetijs praxim exercereim, maximam huius copiam consumpsi, nec egregiam operam scisci. Scio plurimos, quibus exhibui, fuisse sanatos: sed non reuli in lapidem.

Causa quia reperio apud scriptores, quòd eo sumpto sudor copiosus excreatur, post quem statim subleuantur. Ergo tamen non vidi sudorē prorumpen-tem, vel si apparebat, erat sudor imperfectus. Itaque quantum ad me, abiecti non est spes huius lapidis in his febribus.

Fieri potest, ut ego inciderim in sophisticum & adulterinum. Sed cum Venetis medicinam facerem in primatum adibus, persuadebant esse omnium excellentissimum.

Itaque si genuinus reperitur, fortē habet illas doles, quas tribuunt. Notē non possunt ita rursū proponi.

*Differe-
tia lapi-
dis.*

Sunt tamen duae praecipuae differentiae: unus qui extrahitur ex ventre animalium ex Indijs orientalibus: alter ex occidentalibus.

Ex Indijs occidentalibus sunt admodum inefficaces, coloris cinerulenti, & multo viliores quàm orientales: & scribunt duplum ponderis, respectu orientalis praebendum. Qui ex India orientali, color fulvus inclinans ad fuscum, videtur annulari colorem castaneū: qui solet adulterari.

Nota.

Scio Lusitanos scriptores habere signum, si cortex interior sit politus sicut exterior, argumentum esse Sophistici: si rudis, probi. Addunt etiam cognosci lapidem, si frangatur, si in medullis reperitur granum, festuca, Sophisticus: si pulvis, probus.

Ego inveni aliquando, quos existimaui omnium praestantissimos, & tamen in medullis reperiebantur folia exiccate. Ego mihi persuasi hoc signum non concludere.

Ratio: quia congerunt in ventre animalium post assumptum alimentum: assument autem varia alimenta.

Itaque fieri potest, ut huiusmodi materia in ventriculo concreseat circa folium. Ergo non concludit argumentum. Itaque si lapis reperitur probus, mihi etiam probatur. Quando reperiantur ex otoid, praebentur gr. vi. viij. cum aq. cordialis, scorzonerae acetosae, aut mea cordiali, de qua nunc dicam.

*Terra si-
gillata.*

Est etiam difficultas de Terra sigillata. Nam ex vna parte Matthaeus in Diele, cui etiam adhaeret Brasauola, existimant terram Lemniam postea temporis, distine à Galeni. Ra-

tionēs, quia color non idem: amor, ex quo erunt, non eiusdem coloris, quem describit Galenus hanc rem polo sanus disputare. Scio Georgium Agricola aliter sensisse, esse eandem cum sphragide Galeni: si aliquo modo diuersa, eruitur in Lemno ex monte, semel in anno seruari exactē, non esse venalem, Cum etiam sit valdē triabilis potius vult. Propterea probatur quantitas scrup. j. & drachiss. Dosis. dissoluta, similiter in aliqua aqua cordiali, acetosa, &c.

Idem dico de alijs terris. Nam vnus, & eiusdem sunt facultates Vrgarica, Silesiaca, Samia, Bolus armen. &c. probantur in eadem quantitate.

Est etiam difficultas de cornu unicorni de quo multa scribuntur. Existimant talia praestantissima aduersus venena, & praecipue aduersus pestilentiam.

*Cornu
unicorni*

Sed difficultas. Quandoquidem etiam si reperiantur animalia, quae habeant vnum cornu, nihilominus differunt magnitudine, colore, figura, ut vix ab vno & eodem animali possint extrahi, ut non possit asseri, vtrum magis efficax. Siquis tamen experientiam fecerit pluries profuisse, poterit hoc in vso habere, si non certiora habeat.

Inter cordialia sunt & aurum, argentum, gemmae variae, praecipue hyacinthus, carbunculus, smaragdus, c. r. allia, &c. De his etiam dubium, num aliquid praestare possint in febre pestilenti, & omnibus venenis.

Nam ex vna parte Erasius disp. 4. contra Paracelsum, multis arguens, probat in his posse nullam vim cardiacam reuereri. Rationes inter ceteras, quod scilicet huiusmodi omnia sū propetia talia excreantur ex corpore qualia recipiuntur. Si nō edicamentum debet agere in corpus, debet actuari, vbi actuatur, dissoluitur, & dissolutione simul manifestetur cum qualitate venetica.

Dicit quis, quanquam videantur talia excreta, aliquid tamen remittunt in corpore vtile, hoc etiam insinuat Erasius. Nam inquit post excretionem habere eandem pondus.

Ex alia tamen parte omnes conuicti esse cardiacae omnia asserunt. Scio Paracelsum, qui voluerunt huiusmodi aurum potabile reddere, vbi possit vehementer prodese. Sed hic modus minus praebatur, quàm alius, vel per folia, tabellas, infusa, decoctione. Nam non potest reddi tale, nisi post aquas omnium ardentissimas causticas &c.

Itaque, etiam si in huiusmodi rebus assumptis per os non multum fidam, nec habeam in vso, nihilominus us, quia non possunt obesse, non improbo. Mihi magis praebatur cornu cerni preparatum, es de corde cervi, testae omnes praepresae, & succi tria quum, plantarum radices, & pulueres, in quibus maxime confido.

*Cornu
Cervi*

Ex his igitur sumenda sylvia praescribere potest, si scia.

stifera. Itaque hoc constituto cum dixi aliqua ex his medicamentis esse frigida, aliqua calida in pestilentibus, quæ sunt ardentissimæ, consulo ut habeatis in usu aquam meam, qua sum usus satis feliciter in febribus pestilentibus, ut

*Aqua
cordialis*

*℞. succor. borraginis,
buglossæ,
melissæ,
acetosæ:
oxylap.
trinitat.
bistortæ.
cyanæ ma. & min.
ruscæ caprinæ.
calendulæ.
limon.
citri an. lib. j.
acetæ lib. j. ss.
sem. citri. vnc. ss.
sem portul. drach. ij.
flor. nymphae pulueris.
viol.
ros. an. anc. j.
terra sigill.
bol. arm. oriens.
ter. Sam. an. drach. iij.
spec. triasant. drach. ij.
camp. drach. j.*

*Infundantur species in succis propositis
& macerentur per horas 24. tempore æstivo.
per 3. dies verò hyeme in loco calido; deinde
destillentur per alembicum vitreum in dupli-
ci vase, cuius aqua potius is præbere vnc.
ij. siue simplicem, siue mixtam cum pulueribus
propositis. erit efficacissima.*

In febribus itaque ardentissimis hæc frigidiora sunt in usu.

Quantum ad pestilentes, quæ videntur potius habere nescioquam frigiditatem, multa repertiuntur præstantissima apud scriptores, quæ non recensco.

Legatis inter ceteros Andream Gallum

*Febres in suo fasciculo de febribus pestil. lib. 5. præ-
pestilens cipuè. Nihilominus si quis statim voluerit
te s. qua parare aliquod genus medicamenti, fortè non
habet aliè facile repertiuntur apud Septharios, ut ol. de
quam fri ouo, Papæ. Regis Gallæ, Basiliense, vos ad libi-
giditat. tum parabis aliquot bolos. rotulas, pulueres,
aut electuaria.*

Si volueris pillulas, sint tales.

Pilula.

*℞. sem. citri. drach. ij.
rad. tormentul. drach. j.
scordij cretici.
marg. præpar. an. drach. ss.
cum syr. de acetos. cum f. pil. xij. & deaur.*

Dentur ij. semper ante cibum, & syrupos.

Si voluerit potius rotulas.

Rotule.

*℞. marg. præpar. drach. j.
diastami cretici.
scordij cret. an. drach. ss.
rad. tormentul. drach. j. ss.
moschi.*

ambra an. gr. iij.

sacch. dissol. in aq. fl. citri & acetosæ q. s.

M. & f. conf. in rotulis.

Conserua.

℞. Conf. acetos. citri.

fl. borrag. an. vnc. j.

spec. cord. comp. drach. j.

M. dosis est. vnc. ss.

semper ante cibum, & syrupos.

Conserue

Inter ceteras antidotos, quæ sunt venales, & magis egregiæ est Theriaca, & Mithridatum, de quibus inter Iosephum Valdanum, & Calzauellum, & post illos inter me, & Excellentissimum Massariam.

B Ego censeo esse in febre pestilente, quæ non habet colorem adeò excellentem, omnium accommodatissima. Lib. de Ther. ad Pis. cap. 16. Galen. extollit theriacam miris laudibus: & profectò hanc sententiam recepere omnes posteriores, Ficinus, Iubertus, Valdanus, Capellus, vnus Trineauellius, & Iulius Alexandrinus contrarium statuunt; præbe ad drach. ss.

Exterius etiam sunt vsurpanda illa cordialia, de quibus dixi in præseruatione.

Hic accedat victus ratio, de qua breuiter.

Primum est dubium, an conueniat victus tenuis, an medius, an plenus. Persuadent multi tenuem, quia morbus acutus, quod argumentum militat in illis morbis acutis, in quibus vires cõstant.

Itaque si incideritis in laborantes cum viuum tactura, statim vtamini victu pleno, qui alteretur siccantibus, & alexipharmacis, imponetis acetosam, succum, citri, pulueres propositos.

Si fiant contusa, misce succum citri, & pulueres cordiales.

Si non collapsæ, victus tamen debet esse mediocrius, non admodum tenuis, saltem panatella in optimo iure, ouum forbile manè, & vesperi.

Vinum non conuenit, nisi in collapsu viuum. De ceteris nihil: aliud quotidie sit lubrica.

Hæctica pestilens curatur Alexipharmacis attrahentibus in cutem, refrigerantibus, & humectantibus, præter victus rationem debitam: ex refrigerantibus, & humectantibus est serum caprinum cum succo limonum vel citri.

Ex alexipharmacis si corpus non admodum fetidum, potissimum probatur vsus Theriacæ pro attrahendo venena ad exteriora. Vesicantia, & Frictiones laudantur.

De victus ratione nihil dico. Nam de hac agetur in proprio tractatu de Hæctis, quem nunc aggredior.

*Hæctica
pestilens*

De Febribus Hecticis. Cap. XXXIX.

Vnde he-
ctica di-
ctas.

Absoluimus iam Dei auxilio duo simpli-
cium febrium genera, Ephemeræ scilicet
ac Putridas. Tertium in præsentia succedit,
Hecticarum nempe. Denominationem autem
sumpserunt istæ febres, non, ut plures existi-
mant, ab habitu, sed magis à solida substan-
tia, quam occupant. Quandoquidem, si ab
habitu sic dicerentur, omnis hectica esset in
habitu, & consequenter difficillimè amouere-
tur. Consequens tamen est falsum. Nam
dantur Hecticæ lib. 1. de diff. febr. c. 9. lib. de
marcore c. 7. & lib. 10. meth. cap. 5. quæ ex bal-
nei aquæ frigidæ administratione statim vno
die solvuntur. Itaque denominationem sumunt à
partibus solidis.

Non om-
nes febres he-
cticas sunt
in habitu
& cum
tabe.

Quid fe-
bris he-
ctica.

Non inficior quidem, dari plerasque hec-
ticas, quæ cum tabe sunt, & in habitu, sed quod
omnes tales dicantur, falsissimum est. Quod
si Gal. lib. 1. de diff. febr. c. 7. dixit, febres hec-
ticas tales dici, & ab habitu, & solidis partibus,
alterum dicendum, dici ab habitu propter ta-
bidas, vel, quod magis placet ab habitu, quem
potentia semper contineat, quanquam actum
non semper habeant.

Est hæc febris intemperies calida & sicca so-
lidorum cordis, & totius corporis aqualis.

Per intemperiem siccam possumus duo in-
telligere, aut scilicet intensionem qualitatis sic-
cæ absque defectu humidæ substantiæ, aut intem-
periem, quæ est qualitas, & simul etiam substan-
tiæ humidæ defectum.

Omnis hectica est intemperies sicca, ac-
cepto nomine siccitatis per intensionem Quali-
tatis. Neque enim sola hectica, se omnis febris
est intemperies calida & sicca, sed accepto no-
mine siccitatis pro defectu substantiæ humidæ,
non omnis hectica est intemperies sicca. Hoc
explicavit Gal. lib. 1. de diff. febr. c. 9. ubi scri-
bit, dari hecticas absque siccitate, & in princi-
pio illius cap. scribit, dari febres hecticas abs-
que tabe, in quibus torida humiditas non est
consumpta, sed tamen effervescentiam patitur.
Non nego quidem & in prima hectica specie
posse aliquem defectum huius humiditatis toridæ
reperiri, sed datur tamen etiam absque hac. Ita-
que est intemperies sicca accepta quandoque
pro qualitate intensa, & defectu partis solidæ.

Sed dicetis, quid intelligis nomine partis
solidæ? Tribus modis accipitur à Gal. aliquan-
do pro seminali tantum. Sic membrana, ner-
vus, vena, arteria, dicuntur verè partes solidæ:
hoc modo accipit lib. 10. meth. c. vlt. prope fi-
nem, quando scribit, in vero Marasmo partes
solida exsiccari, 2. Aliquando pro seminali, &
carnosa, & adiposa. Hac ratione 1. aph. com. 7.
dum interpretatur locum Hip. qui breui exte-
nuantur, breui reficiuntur: quia humorosa, vel
spirituosa tantum substantia est deperdita, non
autem solida. Et tertio accipitur pro aggre-
gato ex illis omnibus, quæ concurrunt ad con-

stituendum membrum simile, ita ut etiam se-
cundæ humiditates vocatæ comprehendantur in
ter partes solidas, de quibus lib. 1. de diff. febr.
c. 9. & 10. meth. c. vult.

Cum igitur tot sint significata solidæ partis, si quis quærat, quod subiectum febris hecticæ? Dico omnia proposita, & sigillatim, & coniu-
ctim esse subiectum. Dantur in quibus hæc
tria recipiunt caliditatem, & siccitatem; Dantur
in quibus duo tantum: & in quibus substan-
tia sola seminalis recipit caliditatem, & siccita-
tem. Explico, febres Hecticæ, quæ non sunt ta-
bida, & vocantur febres hecticæ primæ speci-
ei, habent pro subiecto, & substantiam toridam,
& simul carnosam & adiposam & seminalem.
Ratio quia huiusmodi febres sunt intemperies
æquales, ut intelligetis postea. Si æqualis: Ergo
debet obsidere omnem substantiam? Si enim
non obbdet, non erit æqualis. Sed sic est, quod
sint omnes humiditates substantiæ in corde. Et
subiectum hæc tria.

Dicit quis, quænam est hæc substantia tori-
da, quæ humiditas distribuita per membrum?
Auc. videtur aliquantulum dissentire à Gale-
no. nam fen. 1. lib. 1. doct. 4. cap. 1. & fen. 1. lib.
4. tr. 3. c. 1. ponit quatuor humiditates, præ-
ter carnosam, & seminalem. Prima, quæ
conuenit in extremitatibus venarum, quæ ad-
huc non exiit ex venis. Hanc dicit esse hu-
miditatem nomen non habentem. 2. quæ iam
exiit ex oriñcijs, & diffusa est per substantiam
membri, & vocatur Ros. 3. quæ iam distribu-
ta est carni, & adipi appositæ, hanc vocat Cam-
bium. Est quarta, quæ iam assimilata, & ha-
bet vim vivendi omnes partes similes, & di-
citur Glutien. Itaque videtur Auc. voluisse no-
mine secundarum humiditatum intellexisse
has omnes. Sed res non sic se habet. 1. ex-
cluditur prorsus ab Auc. quia non habeat lo-
cum in febre hectica. Videatis locum. Sed si
ebulliat, facit synochum non putridam: si pu-
rescat, facit synochum putridam. Hanc co-
gnovit etiam Galen. lib. 7. meth. capit. 6. circa
principium. Secunda explicatur ipsa à Galeno
partim lib. 7. meth. 6. & 8. meth. vlt. & lib. 1.
de diff. febr. c. 9. quam vocat Toridam materi-
am. Substantiam aptam ad membri nutritio-
nem. Alias duas non ponit amplius inter secun-
das humiditates, sed inter substantia solidas
membri, & summa cum ratione. Itaque febris
hectica non tabida habet pro subiectis huius-
modi humiditatem.

Si autem tota humiditas torida consumpta
transit in secundam speciem, quæ dicitur he-
ctica cum tabe, intemperies calida & sicca car-
nosæ adiposæ, & seminalis substantiæ cum ex-
siccatione humiditatis toridæ.

Sed hoc loco dicit quis, si intelligitur hæc
soluta consumptio, quomodo possit hoc in-
telligi? namque febris hectica tabida, in
qua non colliquata caro est adeps, est cura-
bilis. Si sanabilis, dicit quis, oportet, ut par-
tes carnosæ, & adiposæ nutriantur: Si non nu-
triantur,

Subiectū
huius fe-
bris

Subiectū
febris he-
ctica non
tabida.

trinitur, statim exsiccantur: non possunt A
nutriti, nisi ex substantia torida, quæ distri-
buitur per membrum. Si hæc est tota con-
sumpta, ex qua materia nutritur: in febre
tabida semper humiditas torida est ex toto co-
sumpta. Sed quamquam hæc & quotidie cen-
sumatur, non sequitur propterea, quod quotidie
distribuat. Ergo non sequitur: Quamquam
exsicetur tota, quotidie tamen noua distribui-
tur. Propterea lib. 1. de diff. febr. 9. constitu-
it tres differentias huius febris tabidæ: (non lo-
quor nunc de marasmo) quæ etiam differentia-
re tres. maximam habent latitudinem: possunt adhuc
distribui in minores.

Ego tamen istas res tantum proponam. Pri-
ma est, quæ appropinquat Febri Hæctica non B
tabidæ. Secunda quæ magis appropinquat
Marasmo. Tertia est media inter utramque. In
prima specie adest tantum consumptio humi-
ditatis toridæ. In secunda iam est consumpta
& colliquata tota humiditas, quæ pertinet ad
carnem & adipem. Tertia, in qua propter
consumptionem humiditatis toridæ, caro & ad-
eps ipsa sunt in colliquefieri, non colliquata
adhuc.

*Quidma-
rasmus.* Tertia differentia est Febri, quæ vocatur
Marasmus, quæ est febris in qua non amplius
adest humiditas torida, nec in carne nec adipem
sed intemperies calida, & sicca obsidens nervos
& arterias, ut si fieri posset, ex illis partibus
etiam colliqueficeret. lib. vnde. meth. capite vlti-
mo. Itaque Marasmus est intemperies calida
& siccissima, quia alie humiditates sunt con-
sumptæ.

Simplex Huiusmodi Marasmus aliquando est sim-
plex, aliquando Compositus. Simplex, quan-
do adest siccitas, absque excessu vel caliditate
vel frigiditate, quod fit in nimis ieiuniis, & su-
perpurgantibus.

*Composi-
tus.* Marasmus compositus componitur vel cum
caliditate, vel frigiditate. Si cum caliditate di-
citur propriè febris marasmodes, de qua nunc
loquimur: quandoque simplex est, seu absolue
sic dicitur: vel syncopalis, quia habet syncopæ
annexam, lib. de mat. Vbi connectitur siccitas
cum frigiditate, contingit duplex: Ex senio,
& morbo.

*Maras-
mus ex
senio.* Ex senio, ut contingit in ætate decrepita.
Marasmus ex morbo autem fit ille marasmus, qui voca-
tur marasmus Philippi lib. 7. meth. c. 4. & lib. 1.
de diff. febr. 8. Quia Philippus Medicus exco-
gnitus Philagitaui huiusmodi nomen. Hæ sunt differen-
tiæ febris hæcticæ omnium specierum.

Dixi esse intemperiem solidorum & cor-
dis & tonus corporis. Nam ex corde commu-
nicatur, qualis in toto, talis est in corde lib. de
mat. c. 1. Dixi æqualem. Non est tamen impos-
sibile reperiri hæcticam cum inæquali intempe-
rie. Nam intelligenda illa propositio nisi quid
prohibeat: Si quid prohibeat, non necessariò.
Demus hydropicum laborantem hac febre. Au-
thor lib. 3. de pres. ex puls. ca. 1. inquit: sicuti
quando calor est in humoribus, & quæ sequuntur

Si supponit dari Hæcticam, in qua humo-
res sunt frigidi: Ergo non omnis intemperi-
es æqualis, sed æqualis est, quando nihil pro-
hibeat.

Ex dictis Dubium emergit, an scilicet, si fe-
bris hæctica est æqualis intemperies, sit etiam
necessariò cum hæctica connexa: Ergo Epheme-
ra sit putrida?

Ratio dubii est: Quia si hæctica est æqualis
intemperies: Ergo consequenter obsidet non
solum solidam substantiam, sed etiam Humo-
res & Spiritus: Vbi verò humores & spiritus
sunt in calefacto esse, videtur adesse Epheme-
ra, & Putrida. Respondetur. Hæctica connecti
quidem semper Ephemeram tam legitimam
quàm spuriam. Per Legitimam intelligo, quæ
fit ex spirituum accessione: per Spuriam, quæ
ex humorum effervescencia. In Hæcticis na-
quæ ubi humores ebulliant, semper cum his
adest Ephemera & spuria & legitima.

Non tamen valet consequentia. Ergo etiam
tiam adest Putrida. Nam in hæctica quamquam
humores sunt calefacti, non sunt putridi.

Causæ vel sunt Communes vel Propriæ.

Communes intelligo, quæ pluribus hæcticæ Communes
differentiis conveniunt: Propriæ, quæ vnitati
tium differentia.

Communes causæ duntaxat sunt generum.
Internæ, & Externæ Lib. 1. de diff. febr. 2. &
9. inquit quædam hæcticas fieri ex progredi-
entibus morbis, alias incipiendo ex procatarchi-
cis causis.

Vbi igitur Hæctice ortum ducunt ex præ-
cedentibus morbis, aut sunt Acute, aut Chroni-
cæ. Si acute, vel sunt ex vasis communibus
vel determinatis. Ex communibus ex genere
biliosarum & ardentium, quæ fiunt in corpori-
bus calidis & siccis, squalidis & emaciatis:
quales faciliè transeunt in Hæcticas tam ex pro-
pria natura, quàm Medicorum inicitia. Ex pro-
pria natura: quia intemperiebus calidis & sic-
cis, faciliè possunt toridam humiditatem depas-
cere. Ex Medicorum incuria, quando non ad-
hibent aquam frigidam in tempore oportuno.
Secundus error Medici est, quando cogit puen-
tem ultra debitum tempus ieiunare. Ex loci au-
tem determinatis, quando isti loci tententur, vel
inflammatione, vel erysipellate, vel mixto. Ita-
que si sit ventriculus, iecur, pulmo, colon, intesti-
num, mesenterium, &c. laboret inflammatio-
ne vel erysipellate, trahit in consensum cor, ut
excietur febris hæctica. Docuit id Galen. lib.
10. meth. med. cap. 8. lib. 9. de diff. febr. c. 9. & lib.
de mat. cap. 7. ubi disputat pro hac re contra
Philippum.

Cæterum, non tantum ex propria febrium
natura febris hæctica sequitur has febres:
verum etiam errore Medicorum, ut testatur
idem Gal. lib. 1. de diff. febr. c. 9. si admi-
nistrentur cataplasmata ex melle ultra modum,
&c.

Similiter usus importunus vini generosi
administrati à Medicis, est in causa, ut febris
transcat

transiant in hecticam? Sic igitur febres actu A
possunt in hecticas transire. Idipsum etiam fa-
ciunt febres chronice, siue exonerentur ex vlcere
pulmonis, sanguine putrido, & abscessu. De
distillatione in thoracem lib. 2. de prat. ex puls. c.
8 & 1. in 1. ep. com. 17. & 2. in 1. ep. com. 13. in
locis docuit fieri ex his 4. causis.

Fit præterea hectica ex inflammationibus
spuriis, quod docuit Il. cc. sed non tantum ex in-
flammationibus spuris, verum etiam aliis febrili-
culis, cum coniunguntur cum aliqua euacua-
tione.

Quantum ad euacuationem, scribit Gal.
lib. de diff. febr. c. 9. Fit etiam absque euacua-
tione ex febribus longis, aut nimis obstru-
ctionibus, & longis, siue sint quodidiane, siue
tertiane, siue etiam quartane, si corpus sit di-
spositum. Hæ sunt causæ hecticæ internæ vocatæ.

Causæ Aliæ verò, quæ dicuntur Procatartice sunt,
quæ excitant febres hecticas, quæ sunt incipien-
do, & sunt ex sententia Galeni Il. cc. iræ lassitu-
do, moror, nimia exercitatio, vigilæ, & inedia.

Nū fiat Quartur tamen hoc loco, nunquid huius-
modi causæ faciant hecticam absque præcedente
Diaria? Fuerunt qui existimant fieri absque
præcedente Diaria, quod Galen. Il. cc. distin-
guat hecticas in duo genera, quorum alia se-
quitur alias febres, alia non. Sed ratio est in
oppositum, quia spiritus multo promptius calidi-
tatem suscipiunt ex causis relatis, quam solida,
propterea lib. 2. de cris. c. vii. scribit, nullam
febrem hecticam fieri in primis diebus, sed cla-
rius lib. 1. de diff. febr. c. 9 ubi proponit caus. 3. pro
catarticas Postea subiungit, tunc primum est fe-
bris hectica, quando iam superueniente eo tem-
pure febris deberet desinere, non tamen desinit.
Itaque supponit præcedere Ephemeram. Est
locus clarissimus. Causæ igitur in genere hæ
sunt.

Causæ Quantum ad speciales causas: primum, si
seruio sit de hectica primæ speciei, sunt ma-
gna ex parte ex huiusmodi causis procatartici-
cis, nec in omnibus subiectis, sed calidioribus
& siccioribus tantum, in corpore humido
nunquam fit febris hectica incipiens, inquit
Gal. Centra verò causæ internæ vocatæ arden-
tes communes ex inflammationibus, vlcere,
&c. possunt producere febres hecticas primæ. 2.
3. speciei.

Maras- Quia tamen diximus præter febrem Hecti-
cam, & Tabidam adesse etiam Marasimum
simplicem, qui est intemperies sicca, fieri
solet ex nimis euacuationibus siue alui, sudo-
ris sanguinis narium. Nimia inedia vigilæ ex-
siccant corpus, faciunt marasimum simplicem.

Silicis Marasimus compositus cum frigiditate est test.
Frigidi Gal. lib. 1. de diff. febr. c. 9. ex importuno vsu a-
Et sudi. que fructa in ardentibus. Quis est iste importu-
nus vsus? Est duplex, aut nimius vsus, quan-
do Medici progrediuntur ultra terminum
debitum. Alter, quando nimis tempestive se.
in principio ante notas coctionis, Marcor au-

tem compositus cum caliditate producit Calid. &
ex morbis acutis, & chronicis. Marcoris syn-
copalis causa est syncope, quæ aliquando in-
copalis. uadit tentatum febre marida, & patiens euacua-
fit, & postea iterum & denud incidit synco-
pen.

Hactenus de causis quo in loco vnum re-
stat considerandum; Num febris, vi habet
causas, ex quibus producit, ita etiam ha-
beat ex quibus conseruetur? Hoc dico pro-
pter eos, qui sinistrè intelligunt locum Gal. 8.
met. 1. Febris hectica caret causa, & habet cau-
sam conseruantem. Caret causa, quia, potest
esse absque causa, quia est morbus in facto es-
se, & propterea ex ira, morore, lassitudine, po-
test fieri præcedente ira, tamen manet hecti-
ca, tamen non valet, ergo febris hectica sit
absque causa: in obstructione habet causam.
In quo igitur a putrida differt, quæ semper ha-
bet causam? in hoc, quod hæc est aliquando
absque, hæc putrida scilicet semper cum causa:
Vemo ad Signa.

Signa quædam sunt Communia, quædam
Propria differentiarum.

Quantum ad communia: primum quidem
proponitur à Gal. lib. 1. de diff. febr. conuulsi-
caloris. Febris hectica habent calorem conti-
nuum vnius tenoris à principio ad finem quod se-
quitur lib. 3. de prat. ex puls. c. 3. Hoc signum ne-
que conuenit solis hecticis, neque semper. Non
solis, quia etiam Ephemeræ & synochi cuius-
cumque conditionis habent calorem à principio
ad finem absque exacerbatione. Non semper;
quia plerumque hecticæ copulantur cum putri-
dis. Itaque ad alia signa confugiendum.

Aliud desumitur ex pulsu Sunt pulsus par-
ui frequentes, & celeres: In Synochis, & Ephe-
meris sunt maximi, vehementissimi. Aliud si-
gnum ex parte caloris, Hectica habent calorem
primo aspectu mitem, qui tamen paulatim exa-
cebatur: in Ephemeris & Synochis, calor in pri-
cipio est vehemensissimus, postea mitescit. Di-
stinguuntur præterea siccitate: nam in Ephe-
meris, & Synochis corpus nulla ratione fit siccus;
in Hectica adest aliqua cutis siccitas.

Sed dicentis, adestne etiam huiusmodi siccitas
in prima hecticæ speciei, ubi non adest Tabos?
Sic lib. 1. de diff. febr. c. 9. propterea si duxerit fe-
bris ultra 2. 3. diem, signum hecticæ. Sed dice-
tis, quomodo potest apparere, si est febris tantum
primæ speciei? Duo possumus dicere: primum,
adesse aliquam consumptionem tantum humi-
ditati stordæ: secundo, huiusmodi ariditatem
adesse in ambitu, sed non in partibus solidi
corporis. Rationem cor omne maximè se tu-
etur ab iniuriis omnibus.

Aliud signum hecticarum est incalescentiæ
à cibo. scribit Gal. lib. 1. de diff. febr. c. 9. febrici-
tates hora vna vel altera post cibum incales-
cere: in qua incalescentia pulsus sunt celeriores
&c. Auer. 4. Collect. 33. inquit incalescere 3.
horis à cibo. Sed hæc in parte queritur causa,
propter quam huiusmodi calor excutitur à cibo?

Authores sunt discordes, potissimum Auer. dissentit à Galen. nam Auerth. l. c. fieri asserit, cum alimentum quod apponitur partibus siccissimis, & partes calidæ ex vicinia calidi cum calido pars incalescit: Gal. lib. 1. de diff. febr. c. 9. aliam asserit causam: Quia materia humida est materia alimenti caliditatis & sic citatis membri. & quia postea subiungit exemplum de calce, propterea Auerth. accepit occasionem impugnandi Galenum, & malè eum intellexit, voluit ideo fieri, quia huiusmodi alimentum tanquam frigidum sit in causa, ut calor in partibus solidis concentratur, perinde ut sit in calce. Calx tactu non est calida, concentrantur partes igneæ affusione aquæ frigidae. Item Auerth. voluit sensisse Galenum fieri in partibus solidis. vide ipsius Auerth. rationem: valeret, si ita intelligeretur Galen. vult Gal. id, quod supponit Auic. solida esse actu calida, & recipere alimentum partis calidæ, & sic, ex quo alimento pars fit calidior. Sed dicit quis: Si hoc est verum, caliditatem excitari ex appositione alimenti, quomodo fit laboris ab assumpto cibo, dum cibus adhuc est in ventriculo? Propterea dicit quis, si hoc verum esset, porteret reddi calidius post 6. 7. horas, cum tamen oppositum contingat. Terribè dicit quis, posse etiam in ardentissimis absque hæctica huiusmodi caliditatem apparere.

Quod ad primum, dico accepto cibo non distribui crassorem partem in ambirum, nec solidas partes sed tantum vapore transmissum & eleuatum ob copiam ciborum. Est certissimum, in syncope hoc apparet. Sed dicetis cur non sit post extretionem cibi ex ventriculo? Ratio in promptu: augetur hic calor, dum pars solida est exsiccata.

Ad tertium dubium dico: quod augetur in ardentibus, sed in his hæc res non consideratur: in hæctis, in quibus calor parvus, obseruatur huiusmodi calor, & est certum & proprium signum febris hæcticæ. Si incrementum caloris absque horrore, pulsus concentratione, & augmentum fiat quibusvis horis, est certissimum signum febris hæcticæ. Quod incalescentia cum pulsus concentratione, suspicandum est de Putrida.

Versabor in examinandis Hæcticarum signis, quædam proposui, plura supersunt consideranda.

Inter cætera est vnum, quod proponitur à Galeno tanquam præcipuum lib. 3. de præf. ex puls. c. 3. *Hæctica laborantes febrem non sentire.* Ratio: quia Hæctica febris, ut dictum est est Intemperies æqualis, qualis nullam infert molestiam: tristis enim sensus fit ex inæquali intemperie.

Cæterum hoc signum quanquam potest esse fallax. Nam in Phreniæ adest etiam hoc signum. febricitant illi, quod tamen non putant. id non coniungit ex æquali intemperie, sed mentis læsione. Contingit etiam a-

quando in febribus paruis non hæctis absque delirio. Sic febres, quæ consequuntur Lienterias, obstructions, vix ab ægrotis percipiuntur, cum tamen febricitent. Hoc tempore habeo nobilissimam matronam continua febre laborantem ex imbecillitate iccoris, nec putat se febrere. Istæ tamen febres habent quidpiam admodum diuersum ab Hæctis: nam etiam si non sequantur, per quædam tamen interval- la habent accessiones.

Aliud signum est, quod calor febricitantium Hæctica non est ita magnus in partibus circumstantibus arteriam, quemadmodum circa arteria corpus. Si tangas totum brachium, non ita est calidum, ut arteria, quæ emittit calorem sat acrem lib. 1. de diff. febr. c. 9. Hoc signum adhuc manifestius in his Hæctis, qui nuper loti sunt aqua frigida: & est signum certissimum nec tantum sequitur, tunc febres Hæcticas esse intemperies inæquales, nam fit ex aqua frigida.

Hæc sunt Signa in genere: Superest, ut veniamus ad species omnium Differentiarum simplicium, & Complicatarum. Primo inter simplicia est Hæctica primæ speciei seu hæctica absq; tabe. Cognoscitur ex calore vniformi, quando non sentiunt calorem vniformem; Præterea pulsus non sunt admodum parui, neque admodum imbecilles, quemadmodum in aliis differentijs. Ratio: quia adhuc seruetur humiditas carnea, & adiposa; & propterea non est insignis excessus intemperantiæ cordis. Propterea lib. de marc. c. 7. inquit, in hac differentia abundare multo sanguine, ut liceat vii frigida.

Non sunt etiam duri pulsus, tantum in Tabida sunt duri, & caro, quanquam sit facta siccat non tamen est consumpta.

Secunda differentia habet quoq; signa illa generica, quæ sunt proposita. Sed pulsus in hac iam sunt languidi, parui duri, propter arteriæ, & corporis eordis imbecillitatem oculi incauantur, tempora collabuntur, cutis frontis fit aridior, caroque vniuersi corporis consumitur modò plus, modò minus.

Vnum considerandum, vtrum in hac secunda differentia adsit colliquatio vel in aliquo excrementis, vel saltem in vrinis? Ratio hoc persuadet, nam si secunda differentia illa est, in qua consumpta est humiditas torida; & calor, & siccitas obsideat carnem, & adipem; vbi colliquantur, secedunt in ventrem, vel vias vrinæ. Propterea Hippo. 2. progn. 34. inquit pinguedinem in vrinis supernatantem instat telæ aranearum, significare consumptionem, per consumptionem tabem intelligens. Et Gal. 7. aph. com. 34. inquit: pinguedo innata in vrinis potest etiam vniuersi corporis colliquationem significare, nec renum tantum. Quod confirmat Auic. fen. 1. lib. 4. tr. 3. c. 3. qui inquit in vrinis oleoginositatem esse indicium huius febris. Nihilominus Altimarus par. 1. de feb. c. 21. fuit alterius opinionis: in his febribus nun-

Signa
specialia
Signum
primæ
speciei.

Signum
secundæ
differentiæ.

quam apparere colliquationem in urinis. **M**o-
uetur auctoritate Hal. lib. 80. meth. c. vi. circa
finem, ubi scribit tam ardentem, quam Maras-
modem esse febres colliquativas, sed hoc di-
scrimine, quod quæ portio carnis in tabidis fe-
bribus colliquatur, ea semper vaporis vice di-
geratur, in ardentissimis vero, & malignis fe-
bribus, quod liquatur, defluit in ventrem; &
quæ sequuntur. Sed est deceptus Altimarus,
qui existimavit id, quod scribit de marasmo
tertiæ speciei, dictum fuisse de tabe secundæ
speciei. Legatis Gal. eo loci, inquit ardentem,
quæ habent huiusmodi colliquationem, nisi
recte tractentur desinere in marasmodum tertie
speciei. Ego petam ab Altimaro, num possit es-
se transitus ardentium in marasmodum torridum
absque quod febres hecticæ accipiant primam,
& secundam differentiam.

Signa Venio ad signa tertie peciei marasmo-
dis, quæ omnia facillima. Oculi in summo
differe concaui, ut propterea ossa videantur promine-
rentia. re, tempora collapsa, nates acutæ, aures exsic-
catæ, & parvæ; cutis frontis arida, & tensa; co-
lor corporis mutatus ad lividum & plumbeum;
totâ cutis arida instar corii, ut circa abdomen
nullus musculus appareat, vno verbo Gal. lib.
Pulsus. 1. de diff. febr. c. 9. esse pellem & ossa huius-
modi febres. Pulsus duri, debiles, parvi atq;
frequentes, quales illi qui vocantur decurtati,
Muri, deficientes.

Signa Marasmius simplex absque intemperie ca-
marasmi lida, & frigida ex siccitate, cognoscitur ex pro-
simplicis simplicis positus, sed differt à marasmode tantum pul-
exsiccita tu. In hoc pulsus celeres, in marasmo tardi,
te. ut Gal. lib. 3. de prax. ex puls. c. 7. circa princi-
pium.

Maras- Marasmius syncopalis cognoscitur, quod ex
mi synco levis causa incidat in syncopen.

palis Cognoscuntur Hecticæ compositæ cum
alijs febribus: quia, cum his complicentur,
vel ardentibus conclusis, vel proportiona-
tis, illisque vel acutis vel chronicis. Nemo
est, qui non possit cognoscere febres illas pu-
tridas.

Signa he- Sed cognoscitur febris Hecticam cum Ar-
cticarum dente si colliquatio tam in excrementis quam
composita urinis, pulsus imbecilliores, tardiores, cutis in-
rum. cipiatur arefcere, & caro consumi. Si febris ha-
beat exacerbationes, cognoscitur febris He-
ctica connexa huic febre, quod tempore decli-
natiquamquam sudent, si tangas locum arte-
riz, semper remanet caliditatem acrem.

Si connectatur cum morbis longis cognosci-
tur inter præputio, an adlit Hæmorrhæa, obstru-
ctio, &c.

Quod non propono tantum, quæ conne-
ctatur cum vlcere pulmonum, vel suppuratione,
quæ cognoscitur à ceteris tabidis, primo
quod in huiusmodi febre maxillæ rubeant:
rubeant autem 1. progn. com. 69. quod spiritum
remittatur, & pulmones ruborem & calorem
ad genas mittant.

Præterea isti febricitantes sunt alati lib. de

caus. morb. cap. 7. dicuntur alati, qui habent os-
sa scapulatum prominentia, ut videantur alas
gerere.

Quærat quis, quæ sit causa, propter quam
huiusmodi alati ostendant hecticam cum
phthisi? Cui responderetur, alatos, & præcedere
& subsequi in phthisi, quando præcedunt,
habent rationem causæ huius febris tabide, &
phthisis. Causa proponitur à Galeno 2. in 6.
epid. com. 13. ubi scribit huiusmodi alatos ha-
bere thoracem angustum, in hoc continentur
cor, & pulmones angusti: ubi cor est angu-
stum, etiam habent exillem caliditatem, ut di-
cat l. c. huiusmodi alatos esse flatuosos. In hac
parua caliditate necessario coaceruantur excre-
menta, verum non solum coaceruantur, sed et-
iam retinentur ex imbecillitate caloris, & in-
strumentorum angustia.

Sequuntur etiam phthisicos, nam qui sunt
phthisicos, emaciuntur, ex macie ossa magis pro-
minent.

Aliud signum est febris, quæ exacerbatur
magis nocturnam quam interdiu, quod proponitur
ab Hipp. 2. progn. 60. & confirmavit Gal. 1.
aph. 12.

Ratio tamen, quam proponit Gal. 2. progn.
com. 60. certe mihi non probatur. Inquit cau-
sam esse eam ipsam, quam genericè proponit
omnibus hecticis. genericè proposuit causam
lib. 1. de diff. febr. c. 9. Mihi non placet: nam pe-
to, cur non augeretur calor post prandium.

Ego aliam invenio causam. In phthisicis
adest hectica, & causa hectica, quæ est materia
purrida. Hæc est materia suppurationis, quod
docuit Halen. l. c. Itaque febris augetur nocturnam
non ex assumpto cibo, sed ex materia suppura-
tionis.

Sunt & alia signa: quædam tamen leuiora,
pedes inlumescent, vlcera apparent, & sudor ex-
ciatur circa cervicem, & pedes.

Tentantur etiam iussu, & vocem etiam amit-
tunt ex nimia laryngis cruditate. Hæc sunt Si-
gna omnium hecticarum.

Inter cetera febris Marasmodis signa Auic.
Fen. 1. lib. 4. tit. 3. c. 3. proponit etiam hoc si-
gnum, videlicet pediculos in istis apparere.
Huius rei causam multi inquirentes ambi-
gunt, propter quam causam id fieri possit. E-
tenim in tabidis deficiente alimento deficit
etiam excrementum, ex quo pediculi gene-
rantur: Itaq; tantum adest, ut in phthisicis ge-
nerentur, ut potius deficiant. Ceterum cau-
sam affert Alexand. 2. probl. 3. qui inquit, reant in
ju marcidis non gigni, sed apparere pediculos: nam
si pediculi adsint, ea defectu sanguinis, & caloris
deserunt caput, & petunt pulsatina, quæ est ca-
lorem, & pabulum.

Aliud denique signum est in istis vngues in-
curvati. Incurvantur com. 60. 2. progn. ex car-
nis siccitate: nam cum caro dignorum hinc in-
de exsiccecur, vngues contrahuntur, & exsiccantur.

Aliud etiam signum colligitur l. c. scilicet
patientes, habere semper etiam eandem
manuum

Cur pedi-
culi appa-
reant in
ju marcidis
non gigni,
sed apparere
pediculos: nam
si pediculi
adsint, ea
defectu sangui-
nis, & caloris
deserunt ca-
put, & petunt
pulsatina, quæ
est calor, &
pabulum.

manum partem calidam : sed interior adhuc A continet nescio quid humida substantia.

Progn. Ex febribus propositis hectica prima speciei quæ Putridæ non sit connexas omnium facillime curatur: & si statim cognoscantur, statim etiam curatur. Quæ verò connectitur putridæ potissimum Ardentis, & difficultis curationis est, & nisi rectè tractetur, transit in tabem. Ex tabidis in secundo gradu ipsa quoque curabilis: quæ accedit ad tertium, prorsus insanabilis ex sententia Galen. lib. de marc. 23. & lib. 3. meth. c. 10. & 11. quia pars seminalis, ubi consumpta, & exsiccata est, non potest amplius ex alimento refici. Itaque hæc species ternas, sicut & marasmus senilis, est insanabilis.

Dubium est, num febris tabida secundæ B speciei connexa cum phthisi sit insanabilis, an secus. nam lib. 5. meth. med. c. 8. & 11. scribit, vlcus pulmonis nulla ratione posse sanari: eruptiones in principio posse quidem consolidari: ubi autem inflammatio superuenit, & vlcus neminem sanari posse.

Ex alia tamen parte sunt autoritates eorum qui asserunt quosdam phthificos fuisse sanatos, ut Au. 13. c. 18. ubi scribit, se vidisse mulierem usu facchari rosacci sanatam. Idipsum scribit conciliator Diff. 194.

Philippus Ingrass. in consilio pro Duce tertæ nouæ, scribit se mulierem sanasse phthificam usu decocti: & alii auctores hoc scribunt. Itaque si vobis huiusmodi febris cum phthisi superueniat, ne relinquatis istos: nam ego religiosum Venetijs etiam integrè restitui.

Malum signum in istis phthificis, si capilli decidant, & si spiritum super carbones proiectum sit fetidum 5. aph. 11. Pessimum etiam si alui profluuium tententur eadem 5. & per fluxum alui non intelligit fluxum colliquatiuum, sed Diarrhæam aliquam, quæ superuenit ex defectu facultatis alteratricis & retractoris.

Curatio primæ speciei.

Venio ad Curationem.

Et quia variz Hecticarum febrium sunt differentiarum ratione gradus, ratione simplicitatis, vel compositionis: propterea distinguenda est curatio. Primum de simplici primæ speciei seu primi gradus: deinde secundæ gradus tertio de tertii gr. quanquam sit insanabilis, & eo loco de omni Marasmo, postea transibo ad Hecticas Complicatas cum aliis putridis & alijs morbis, in quo summa est curandi difficultas.

Quod ad hecticam primæ speciei simplicem, curatur refrigerantibus humectantibus, & re-nutrientibus, sed præcipuus scopus est refrigeratio. Nam in hac differentia corpus non est adhuc exsiccatum, nec consumptum, sed tamen consumptio verenda, itaque tollenda causa, secunda humectatio, tertia re nutritio.

Hanc refrigerationem & humectationem oportet præstare potius cõuenienti victu, quàm medicamentis: cû Alterantia non prætermittenda.

Propterea ex omnium consilio aer frigidus, & humidus est eligendus: eligatur oportuno tempore æstiuo septentrionem versus.

Seratus naturaliter non sit, pareat arboribus, plicibus, folijs, & floribus nymphet, violarum, rosarum. Eundem aer frigidus suscipitur in ambitu totius corporis, quod putant desumi ex Trall. l. 22. cap. 4. Sed non est ita: dicit hic tantum in aere calido alterationem fieri debere ad frigidum: quæ sequuntur. Non inquit igitur non accipiendus aer frigidus.

Somnus sit moderatus. Exercitatio nulla. Aluus lubrica cõseruanda, aut clysteribus molibus, quales essent isti.

Somnus.
Clyster.

Recipe Iuris cast. aut alterius lib. j.

facchari rubri.

ol. viol. an. vnc. ij. M.

Loco olei potestis etiam accipere butyrum, loco iuris lac.

Potest etiam aluus lubrica cõseruari Medicamentis leuioribus, ut sunt cassia drac. vj. cum drac. ij. manna. Nullus erit error, licet præbere vnc. ij. manna in iure. Conuenit etiam Sympus, vel mei ros. simpl. ad vnc. j.

Præter hæc est habenda electio cibi & potus. Concedantur olera refrigerantia, ut lactuca, endiua, beta, atriplex, fructus humidi, poma coctæ, cucurbitæ, melones, cerasa, pisces saxatiles, fercula ex lacte amygdalino, nucleorum pinus, caprino, asinino, carnes & pulli & agni & vituli, testes potissimum, & cerebella animalium.

Cibus.

Pro potu eligibilior est aqua quàm vinum. Bibant communem, si sint assueti, vel alteratam cum mastiche vel coctam cum hordeo, vel destillatam ex pullo, vel stillatam aquas ex eichoreo & endiua. Si vires imbecilles, concedatis aliquam portionem vini albi aut rubri oligophori.

Potus.

Inter cetera, quæ magni momenti sunt, est vsus frigida, lactis, & balnei, de quibus dicam.

Quantum ad frigidam, Gal. in huiusmodi differentia commendat lib. de marcore c. 7. & lib. 10. meth. c. 5. & 6. quando inquit, corpus adhuc abundat multo sanguine, non est adhuc tabes, est tamen calidum, & siccum, & periculum ne transeat ad marasum. necessaria Ignor pono aqua frigida, & scribit se hac multos curasse & præteruasse à marasmo. Dicit in hac specie, quia in marasmo non conuenit. Itaque lib. 10. meth. c. 5. maximo detrimento dederunt Medici frigidam in Marasmo. Eligenda igitur tantum in prima specie, ubi cor adhuc non est consumptum.

Aqua frigida.

Quantitas aquæ est ab vna hemina ad duas & plures: vna hemina sunt 9. vnciæ. Itaque potestis vos præbere vnc. x. vel. xj. vel. xij.

Si huc non sint assueti, præbeatis aqua stillantem propositam: Endiua, postula, cõchichian. vnc. ij. iulep. viol. vnc. j. M. aut lib.

aquæ hordeaceæ vel simpl. vel mixti cum eodem inlepo violato. Nam in hoc casu dulcia omnia, præcipue mel, est fugiendum lib. 10. meth. c. 11. nam facile in bilem vertitur, inflā- maq; ipsum corpus.

Quantum ad lac, conuenit in huiusmodi casu. Nam etiam si corpus non valde sit consumptum, quia habet vim humectandi & calorem febrilem exinguendi, vbi recesserit ad primum gradum secunde differentie, licet usurpare. Sit humanum, alinum, caprinum. Debet autem aut ex vberibus fugi aut emulgi in eodem conclaui, & calidum præberi, ne corumpatur. Gal. lib. 10. meth. c. 11. vult admisceri aut mel, aut sal. Cum autem mel sit suspectum, & sal possit inflammari, loco mellis erit sacchari vnum cochlear. In primis diebus quantitas sit pauca, & videatis an etiam possint eam ferre sine noxa, quod cognoscitur ex pulsus lib. 10. meth. cap. 11. sunt parui, inequales, imbecilles. Itaque si tales sunt, desistendum.

Quantitas est vna, seu vnciæ duæ, sequenti die ij. ita, vt ascendatis ad quatuor, & quinque vncias.

Quantum ad Balneum; summo opere commendatur: vitum verò debeat esse tepidum, an frigidum, an utroq; modo, differentia est. Trall. lib. 12. cap. 4. probat tepidum, alii frigidum. Gal. lib. 12. meth. c. 10. vult, in hac prima differentia balneum quatuor modis debere administrari. Primum vult ingredi patientes in conclaue, in quo suscipiant aerem calidum, cuius ratione atra hantur omnes humores à profundo in ambitum, & fuliginosi halitus discutiantur, ne ex aqua frigida accedentes sint in causa, vt aliqua febris putrida exciteretur, aut saltem rigor: Postea vt imponantur in labro aquæ tepidæ, vt hac ratione corpora humectentur, & solida etiam recipiant hanc mediocritatem. Tertio immergantur in labrum aquæ frigidæ, vt retineant hanc mediocritatem. Quarto vt recipiantur in aliud conclaue, in quo adsit aer calidus, cuius ratione excrementa, si qua supersint, possint digeri.

Nobis, qui hoc non habemus, satis est accipere labrum propè focum plenum aqua calida, in qua immergantur, ita vt nullus rigor excitari possit; permittendum, vt aqua paulatim tepescat, vbi vsi fuerint hac tepida aliquo temporis spatio, superinfundatur frigida, vt humectationem possit continere, vt est consilium Rondeletii proptio ur. de febr. Hæctica.

Quarta illa operatio à Gal. de aere calido mihi non probatur. Melius est, vt post huiusmodi balneum inungantur corpora ol. amyg. cum portione aquæ acetosæ, vt penetret: ponantur in cubili & post quietem cibus præbeantur.

Sed quia aliquando huiusmodi febres orum ducunt ex insigni intemperie partium propin quarum, in quo casu balneum quidem prodest, sed iuuat etiam partes externis aliquo epithemate vel linimento fouere. Pro le-

A core conueni Epithema tale.

Recipe Succ. end.

epauca

fontib.

portulacæ

cichory an. vnc. ij.

spec. triasant. drach. iij.

aceti vnc. iij. M. lin teolis duplicatis madefactus in succis potius frigidis foueatur locus multoties die.

Si fuerint Renes, refrigerentur vrguento rosato Mesuæ, aut infrigidante Galeni, quod constat ex cera, ol. ros. & aqua. Melius est vii succis. Exempl. gr.

Recipe Succ. nymph.

folatri.

portulac. vnc. ii.

aceti vnc. j. M. linteoli pariter madefaciendi, & applicandi hinc inde circa dorsum.

Si fuerit Ventrículus, foueatur hoc seq.

Recipe fol. labrujca.

folani

semperuini an. M. j.

ros.

myrtilan. M. s. bull. in f. q. aq. fæta

pres. f. fongnum. post quod inungatur ventriculus oleo ros. & melino, seu decy donis.

Quia verò Cor suscipit caliditatem & siccitatem, conuenient etiam Epithemata Refrigerantia.

Recipe aq. ros.

nymph.

viol an. vnc. iiii.

spec. triasant. drach. ij.

aceti vnc. j.

camph. gr. iij.

M. pro Epithemate cordiali.

Proponitur curanda febris Tabida, aut Marasmus senilis, seu senium Philippi, qui duo affectus in fieri sunt considerandi, non in facto esse confirmato. Et enim febris tabida & marasmus senilis in facto esse sunt prius in sanabiles nihilominus, vt, qui his tentantur, saltem vitam longiorem habeant, & minore viuāt cum molestia, vtantur medicamentis, & diætā, quibus tam tabidi in secunda speciei, quam marasmodi in fieri. Verlabimur itaque primū in tabida, quæ in secunda est differentia. Huius ratio parum conuenit cum Hæctica primæ speciei, partim etiam differt. Conuenit quidem in præcipuis scopis, qui sunt refrigeratio, humectatio, & reuolutio. in his conueniunt Differunt quidem medicamentis, parum & cibis & medicamentis non solum in materia, sed & modo administrationis. Singula explicabo.

Quod ad medicamenta, dixi differre ab Hæctica ratione materiae medicamentorum. Quia in tabida non conuenit vsus frigidæ Diæcæ Gal. lib. 10. meth. med. c. 1. & lib. de mar core c. 7. in illis, in quibus conuenit vsus frigide necessarium aabue multum sanguinis in venis

Epithema locum
ris.

Renum.

Curatio
tabidæ
2. differ-
rentia.

contineri, carnes non esse consumptas. alioquin
 usus frigida pertingit ad partes feminale. Et quæ
 sequuntur. Conueniunt quidem iura altera-
 ta & in maxima quantitate octo vel 10. vncijs
 alterata malua, hordeo, passulis, nymphaea, eu-
 diuia, cichorio, addatis istis emulsionem seu.
 melonum, amygdalarum dulcium. Differunt
 secundò, ut dixi, etiam in modo administratio-
 nis medicamentorum. Nam cum in hac tabi-
 da conueniant etiam balnea, ut in priori he-
 ctica, est diuersa administrationis ratio 10.
 medi. 10. in hectica audiuitis ex sententia Ga-
 leni imponendos primum patientes, &c. in ma-
 rasmò neque conuenit aer calidus; & quantum
 ad aquam, aqua tepida, in quam sunt immer-
 gendi, debet esse declinans ad frigidum, &
 præterea in hac non debent longam moram
 trahere. in quo errant multi practicautes. Gal.
 10. meth. 11. scribit huiusmodi febrem tra-
 ctandam balneo, ita, ut bis vel ter immergatur
 in aquam inuoluti in sindone, quæ contineat-
 ur 4. robustis hominibus. Ratio, si longam
 moram traherent: paulatim relaxatur cutis, a-
 periantur meatus, dissoluiturque corpus. Præ-
 terea quantum ad frigidam, in hecticis permi-
 tendum, ut aqua frigida imponatur in folio, ut
 vos docui: in tabidis hoc Galenus prohibet;
 quia corpus non sustinet, sed satis est leui & v-
 nica perfusione. Sed ubi corpus est emacia-
 rum & exsangue, potius utramque inunctione v-
 niuersi corporis, quæ quidem idem præstabit
 quod perfusio.

Lac.

Quantum ad usum lactis, quia conuenit, si-
 cut in hectica lac asininum, & caprinum, abs-
 que vlla coctione. ita in tabida cum sit scopus
 maior renutriendi, conuenit potius humanum,
 quàm caprinum & asininum. Lequor de fe-
 bre tabida simplici. & nutrienda etiam nutrit
 optimis alimentis. Quod si forte abhorreat,
 eligatur potius caprinum, quàm asininum: &
 in hoc casu, siue adsit fluxus alui, siue imbecil-
 litas, usurpetis lac chalybeatum, aut coquatis
 lac ad tertias. Hæc igitur est differentia, quan-
 tum ad ea, quæ vocantur medicamentosa. Quan-
 tum ad Cibus, etiam est diuersitas.

Cibus:

Quantum ad materias alimentorum: pro-
 bantur varix ciborum materia à practican-
 tibus communiter, usus crancorum fluuiatiliū,
 cochlearum, testudinum, ranarum. Per cran-
 cros autem non oportet intelligere veros cran-
 cros fluuiatiles, qui sunt formæ rotundæ, sed
 de quibus loquimur communiter, vocantur
 Gambari. Isti probantur in febribus tabidis
 nam ex Galeno sunt humidæ substantiæ &
 ex crusta, ut inquit Gal. lib. 2. de temp. c. vlt. nō
 est arguendum esse substantiæ siccæ, sed con-
 trarium arguendum. Cum itaque humidæ &
 frigidi, summopere commendantur: & quia
 sunt crassi succi, non facile digeruntur. Ex-
 cogitarunt Medici varios modos præbendi.
 Primum debent diligenter coqui, non in aq-
 simplici, sed vel in lacte vel iure bono; post
 contundi & pulpa transmitti per setaceum;

Gambri:

A huic deinde adde, vnc. iij. vel vnc. v. lactis ca-
 prini aut amygdalini, aut coque supra prunas
 vsque incipiat spissescere, addito saccharo, sit fec-
 culum accommodatissimum.

Quantum ad limaces seu cochleas, huius-
 modi medicamentum seu cibus habet maxi-
 mas difficultates. video recentiores vii. A-
 ueniant. Limaces
 num cum
 pud Gal. nullum inuenio locum in quo ap-
 probentur, lib. de cib. bon. & mal succ. c. 4. scri-
 bit generare succum crassum, quod 2. aph. 18.
 repetit. & quia crassus succus est pituitosus, vel
 melancholicus, existimo colligi melancholicū
 succum, ita ut nocuus magis, quàm si esset pi-
 tuitosus. Quod si melancholicus, colligo ex
 lib. de atrabile c. 4 loquens ibi de eduliis, quæ
 generant prauum succum, ponit etiam co-
 chleas. Propterea lib. 5. de tu. val. c. 6. prohibet
 usum cochlearum senibus. sed apertius lib. ii.
 de simpl. med. fac. c. prop. de cochleis, ubi scri-
 bit cochleas contusas cum lactis & tota carne
 valere ad fluxus dysentericos, appositæ ventri
 extrahere aquam hydropicis. Si essent humidæ
 non extraherent aquam. Ergo sunt succissimæ,
 propterea l. c. scribit partibus tumefactis extra-
 here humiditatem. Ergo sicci temperamenti.
 Quod autem lib. 8. de comp. med. c. 4. scribit
 cochleas præbere alimentum, si legatis tantum,
 textus est corruptus. Fieri enim hoc non potest
 nam conuatum ubique scripsit. Stauendum
 igitur cochleas frigidi esse & sicci temperamē-
 ti, generare succum crudum; propterea non
 conuenire.

Sed dicetis, quid respondebimus ad obie-
 ctiones practicanum? Nihil aliud reciperem
 ex cochleis, quàm solum decoctum, vel aquam
 stillantiam. itaq; aqua, quatenus refrigerat &
 humectat, probatur. Decoctum non simplici-
 ter, sed mixtum potest præberi. Non tamen
 improbo usum vel carnis testudinis, vel rana-
 rum, quæ multò humidior. Eligantur testudi-
 nes terrestres, non aquaticæ. Præparatio simi-
 lis quam proposui de gambaris. Oportet pri-
 mum testudines diligenter elixare, vsquequo
 possint extrahi, extractæ in frustra incidendæ,
 mundandæ, & iterum coquendæ cum iure ca-
 ponis, vel vituli, vel pulli, contundendæ &
 transmittendæ per setaceum, fiatque confusum
 addito lacte vel saccharo: Nec obiciat quis
 lib. 7. meth. c. 6. quod videtur improbare usum
 eduliorum crassi succi in his laborantibus in
 temperie sicca. Nam loquebatur Gal. ibi
 de eiusmodi eduliis non præparatis hoc mo-
 do.

D

Soluam contradictionem in Gal. Li. 27. met.
 6. & lib. 14. met. c. 16. in principio, ubi loquitur
 de nutriendis corporibus inquit: Cum tamen 7
 met. 6. dicit euitanda, quæ generant succum
 crassum. Per ea, quæ generant succum crassum
 non intelligit omnia cibatorum genera, sed rā-
 tum lactis. Veritas est lib. de marcore c. vlt. lac
 est crassi succi quod intelligit per crassum suc-
 cum.

Hactenus ostendi, quomodo distinguat

curatur Tabidæ ab Hectica nuue dicam, quod A
diuersitas etiam sit in modo administrationis
ciborum. In præfenti casu oportet vii cibo sapi-
tis, sed paulatim 4. aut 5. vicib. singulo die na-
turali, aliquando lacte exhibitio ad vii. iij. vnci-
as, post 4. 5. horas illam emulsionem amygd.
dulc. cum pulpa crancorū. Post alias quatuor,
quinq; aliam portionem lactis: & post accipiat
emulsionem amygd. dulc. cum petrufo caponis,
perdicis, &c.

Conficiuntur etiam variaz confectioes re-
nutritiuæ. Inter ceteras commendatur vsus
huius confectiois.

*Re. pulpa testud. nemoral. coctæ, confusa
& per cribrum transmissa, vt dictū
est. vnc. iij.*

pulpa caponis vnc. iij:

nucl. pinus.

amygd. dul. an. vnc. ij.

sem melon. mundat. vnc. j. ff.

sacch. sin dissol in aq. viol.

& nymphae q. s. fiat confectio in morsellis.

Erunt iucundissimi præbe vnc j. tam in præ-
dio, quam cæna.

Nutrienda etiam animalia sunt ex farina
hordei mixta cum aliqua portione lactis, f. bo-
li, quibus impingentur hæc animalia: & pro-
pou accipiat aut distillatum, aut in virium im-
becillitate aliquam vini portionem.

**Curatio
marasmi
senilis.**

In Marasmo autem Senili Intentiones va-
riant. Nam cum nulla adsit febris, vtendū ca-
lescentibus, humectantibus, & renutrientibus
quæ renutritio non tantum sit cibo, & potu cō-
uenienti in quantitate, qualitate, & tempore:
verum etiam magis medicamentis attrahentibus
alimentum in cutem, qui vnica scopus est
curandi Senium Philippi.

**Attrahē-
tia in cu-
tem sunt
4.**

Quæ sunt ista medicamenta attrahentia in
cutem? Sunt quattuor generum, frictio, balne-
um, plicatio, & ligatura ex aduerso; quanquam
quatuor modis conueniat potius parti vnica e-
maciatæ, quam toti corpori.

**Frictio.
Inunctio**

Frictio igitur administranda vniuerso cor-
pori vsquequo caro rubescat, lib. 7. me. h. c. 6.
nam vbi rubescat, sanguis attractus à frictio-
ne adhibita. vinctio oleo humectante & poros
claudente amygd. fiat post cibum bis in die,
vel loco frictionis, administretur secunda ope-
ratio, quæ est balneum, quod debet esse me-
diocriter calidum. Terminus balnei, vt docuit
lib 7. meth. c. 6. sit calor. Sic scribit, terminus
frictionis rubor, terminus balnei calor. Sed
maius Hipp. 3. de off. med. tex. 16. proponit
modum cognoscendi terminum.

**5. Bal-
neum.**

Cum primum, inquit, extrema caro digitorum
incipit flaccescere, sunt extrahendi ex balneo; &
quæ sequuntur.

**Quando
balneum
admini-
strandū.**

De Tempore vsus balnei est contradictio
Galen. 14. meth. 16. scribit in istis, quæ refici-
untur, balneum debere administrari post cibum.
10. meth. 10. lib. de mac. c. 7. & alius locis 3. de
officina medica, 32. semper proponit vsus bal-
nei ante cibum.

Pro resolutione, duo dicenda: vnum est, Gal.
10. meth. c. 10. vbi proponit vsus ante, loqui de
curanda febre marasmode. 14. meth. 16. De
curando marcore semper aduerteris, quando
sermo de balneo administrando, & nullus ali-
us scopus, quam refrigeratio & humectatio,
quæ non posset haberi si exhiberetur balneum
post cibum; funderet enim calorem in vniuer-
sum corpus, augereturque calorem.

Et quia adest aliqua suspicio de calculo re-
nali, viatur, inquit, capparibus cum oxyme-
lite. Videte doctissimum Alpinum, qui scribit
Aegyptios balneo vii post cibum, & maxime
impinguari.

B De plicatione, quæ operatio admodum præ-
stat, vt aqua lib 7. de san. tu. c. 8. nullum præ-
stantius, de hac in lectione sequenti.

Quattuor sunt modi, vt dicebam, quibus e-
maciatæ partes attracto alimento iterum nutri-
untur, frictio, balneum, plicatio, & ligatura. De
balneo & frictione hæcenus. De Ligatura pau-
ca sunt dicenda.

**3 Ligatu-
ra du-
plex.**

Hæc etenim vni tantum magis parti ema-
ciatæ, quam vniuerso corpori satisfaciunt. Est ad-
hibenda in vno membro gracilitatem patienti,
in toto corpore nequaquam. Siquis obiter vo-
luerit intelligere quid nomine ligaturæ apud
Hipp. & Gal. intelligi debeat: dico ligaturam
hanc, quæ administratur ad impiguandam par-
tem, quæ duplicem, diuersam à diuerso factam.

C Vxor verbis Hipp. & Gal. 3. de off. med. tex.
32. 33.

Ligatura diuersa est quæ administratur par-
tibus emaciatæ, quæ iam fracturam sunt passæ.
in humiliori parte, quæ fracturam sunt
passæ, dum illam partem vinctum, vinctum parti fra-
ctæ admodum strictum conuenit, sanæ verò
nullum, vel admodum laxum. Vbi fracta pars
confidenda, vbi debet et cōtrahitur, oportet vt vin-
cu o diuerso, sanæ scilicet, vinctum, infirmæ laxum;
propterea dicitur vinctum diuersum.

Vinctum autem è contrito conuenit istis
partibus, quæ fracturam non sunt passæ, sed ex
defectu alimenti huiusmodi noxam incurrunt.
Ex. gr. b. h. hum, aut crus fractum sit in parte
D opposita in enim impeditur alimentum, ne
transcat in partem sanam, sed cogitur adhi-
re.

Veniamus ad Plicationem, quæ administra-
tur tam in partibus determinatis, quam vniuer-
so corpore. Propterea conuenit in Marcore se-
nili.

Hæc operatio est attractio alimenti cōueniēs
in partes emaciatas, quæ sit à medicamento vis-
cido & calentico.

Dixi esse attractionem, quia huius operatio
gerit locum operationis naturalis. Naturali-
ter corporis partes nutriuntur, quia attractrice
possent facultate: vbi hæc non adsit, non pos-
sunt nutrir, neque enim alimentum distribui-
tur, cō quod transmittatur, sed quod attrahatur
teste Gal. lib. 3. de nat. fac. c. 11. & 13. q. repetit
lib. de marc. vlt. vbi enim corporis partes trigi-
da &

da & sicca laborant intemperire, nulla vel exigua sit sanguinis attractio. hinc macies, atrophia: hinc medicamentis est opus, cuiusmodi est viscidum, & calidum. Quatenus est viscidum adhæret paribus, quatenus calidum, attrahit.

Materia huiusmodi describitur à Galeno pluribus locis, præcipuè lib. 6. de tu. val. cap. 8. & 3. de off. med. com. 3. 2. recenset potissimum picem, & propterea ratione huius habet visciditatem. Huic annectuntur pro necessitate attractentia alia, & calorisifica, ut Thapsia 14. meth. 16. Euphorbium, sulphur, pyrethrum, piper, atque alia omnia calorisifica, de quibus 3. de off. med. 3. 2.

Ex his fiunt cerata, quæ quidem adhibita partibus determinatis, vel vniuerso corpori, habent validissimam vim attrahendi alimentum, & consequenter reficiendi.

Sed quærat quis, quibus nam maciaris conueniat huiusmodi operatio? non conuenit febri marasmodi ubi adest intemperies calida, & sicca, non conuenit picatio. Conuenit tamen ubi corpus intemperie frigida, & sicca laborat.

Cæterum quia hæc intemperies potest introduci, aut ex imbecillitate alimentis parvis principalis, aut ex nimio otio aut ligaturis artibus circa vniuersum corpus: quantum ego potui colligere ex lib. 6. de tu. val. 8. huiusmodi operatio conuenit tantum in illis extenuatis, ubi si concoctrix valida illis, qui laborant frigida, & sicca intemperie.

Dicit quis, ubi partes non nutriuntur, existente intemperie frigida, & sicca, quid poterit hoc medicamentum? non nutriuntur; quia non probe coquitur alimentum in ventriculo.

Obiectio alicuius momenti. tamen oportet supponere alimentum probe succi, ut possit concoqui.

Modus administrationis picationis duplex est: aliquando fit cum præcedenti percussione, quam 14. meth. 10. vocat *επιπνευσις*, aliquando absque hac: fit huiusmodi percussio, ubi macies tentat potius partem determinatam, quam partes communes: & propterea fit potius in macie naturali, quam in in quibus ex aliquo modo est subsecuta. Propterea lib. 6. huiusmodi modum administrandi inquit esse inuentum à mangonibus puerorum, qui reficiebant partes naturaliter extenuatas.

Quærat quisquæ sit hæc percussio? Gal. significauit quidem qualis hæc, sed obiculis verbis, ut præbuerit occasionem dubitandi, fieri per ferulas modicè illitas. Lib. de phleg. existimaui huiusmodi ferulam esse cunctam in modum tabellæ, & excipi ex hac planta.

De Illinitione quomodo fiat, existimaui hanc factam esse aliqua portione picis: alij contra nos existimarunt ferulam fuisse virgultum; illinitionem non picem, sed oleum. res dubias, sed ratio magis persuadet, quod, ego sen-

tio, præterquam quod semper viuit hac voce illinitionis 7. meth. 17. & 14. meth. 16.

Sed ut hoc obiter dicam, inueni tamen in Hippoc. clarissimum, quod illinitio facta per picem. 3. de off. med. tex. 35. ubi Hippoc. proponit duos modos reficiendi partes attenuatas; frictionem scilicet & perfusionem, postea in fine inquit citra ferulas. Gal. in com. quarit quamobrem Hippoc. mentionem non fecerit aliorum auxiliorum, quibus potest macies tolli? Inquit ratio est, quia proponit tantum modum reficiendi, qui pertinet ad operationes manuales; alios, qui ad medicamenta non proponit. audiatis conclusionem. Si verum est ab Hippoc. proponi tantum modum pertinentem ad operationem manualementem citra ferulas, profecto si nec ferulæ fuissent virgultæ, & oleo illitæ, non possent administrari, nisi ope ipsius manus.

Excludit tamen ferulas tanquam operationes non manuales, itaque oportet fuisse illitas pice. Sed redeo ad rem.

Administratur aliquando præcedente hac percussione, aliquando absque. Sine, quando macies est in vniuerso corpore.

Quando adhibetur pica-
tio sine
preceden-
te percus-
sione.

Modus administrationis, ut apposita pice eius quantitatis, quæ sufficit parti, vel totio corpori ad singulas picis libram vnâ addere vnc. j. vel alteram olei, vel communis, aut chamomelini. Si volueritis, addite pulueres calidiores pro singula picis libra. Ex. gr. vnc. ss. euphorbij, & hysiz drach. ij. sulphuris, drach. j. pyrethri. Cum iam efferverit medicamentum, accipienda lintea crassiora, & imbibenda pice calida, & apponenda parti emaciata: ubi ita calet, auellendum. Si pars rubeat, non; si non rubeat, iterum apponendum. Id faciendum est æstare æternis diebus tantum, ac de quarto in quartum diem, hyeme singulis. Hæc ratione lib. 6. de tuen. val. cap. 8 & 3. de off. med. partes ita reficiuntur, ut nullum inueniatur præclarior auxilium, propterea scribit quosdam diuites potentes exquisuisse aliud, tamen, inquit Galenus nullum præstantius excogitari possit; adhibetur & non sic, aut etiam singulis partibus determinatis, ut propterea etiam in intemperie frigida, & sicca ventriculi sit conueniens, teste Gal. lib. 7. meth. cap. 7. in fine.

Hoc dico: quia excellentissimus vir, qui contra nos inquit, falsissimum est, Galenum vnquam proposuisse picationem pro intemperie frigida & sicca ventriculi; vidit tantum caput quartum, septimum non, aut si vidit finxit se non vidisse.

Hæc igitur pertinent ad picationem, præterquam conuenit etiam victus ratio conueniens, quæ talis, ut calefaciat, & humectet: omnia edulia in intemperie calida, & humida, iacura optima, testudo, gambari. propterea conuenit etiam vltus melis, & sacchari, quod pertinens in Febris marasmodis. Itaque in hoc

videtur

Modus
admini-
strandi pi-
cationem
duplex.

D

hoc differunt, quod conueniunt calidifica, & humectantia.

Curatio marasmi syncopalis. Marasmus Syncopalis habet curationem partim, quæ conuenit febrī marasmodi, partim, quæ marasmo senili; quando habent syncopem anæmiam, curatur ut marasmus senilis extra hanc, sicuti febres marasmodes.

Itaque mixta est curatio.

His expeditis, venio ad id, quod est maioris momenti, 10. meth. 10. Scribit Gal. simplices affectus febres heclicas posse quidem facile curari, & ratione, & experientia. Sed si complicati, inquit, neque ratio, neque experientia sufficit. Non ratio, quia etiam si probè noscatis naturam affectus, indicationes curatiuas, eritis tamen ancipites, cui primum sit occurrendum.

Non experimentum, quod satisfacit in simplicibus, in complicatis non concludit. Itaque oportet in hac diu versari.

Curatio heclicæ complicatæ cum Ephemeris. Si connectatur heclica cum alijs febribus, connectitur cum acutis, vel diuturnis. Si cum acutis, connectitur cum ardentibus. Intelligimus autem per Ardentibus, biliosas. Huiusmodi ardentibus biliosis possunt esse putridæ, & non putridæ. Puto aliquem existimaturum esse paradoxum, non est paradoxum. Dantur itaque febres biliosæ putridæ cum heclicis, & non putridæ.

Quod putridæ, 8. meth. 3. longo sermone mentionem facit temperamentorum calidorum & siccorum.

Legatis caput. Has febres tertianas esse colligitur lib. 10. meth. c. 3. 4. & 5. ubi proponit tertianam non putridam, sed Ephemeram; quam inquit habere expeditissimum iter ad tabem. vide locum, & in huiusmodi casibus inquit non conuenire euacuantiâ, sed cibum exhibiturum in principio accessionis.

Videatis præter alia loca c. 5. ubi quando loquitur de huiusmodi febre biliosa, quam curat solo cibo, inquit, hunc modum conuenire, ubi febris non ortum ducit ex putredine quod clarius locutus est omnibus illis locis. Est itaque rei veritas dari Ephemeram tertianam, in hoc casu conuenire balnea aquæ dulcis, potionem aquæ frigide lib. de mar. c. 7. & lib. 10. meth. capit. 5. dummodo huiusmodi Ephemeram non transierit in tabem, sed tantum in heclicam: non quidem medicamenta, nec venæ sectio, sed balneum, & frigida, & aqua hordeacea, aut destillat. aquarum iuris, aut feri caprini. Sed si connectatur putrida, hoc

Cum putrida continua ardente. opus, hic labor. Putrida febris biliosa erit, vel continua ardens, vel proportionata. Si continua ardens, necessariò ortum ducit ex venis communibus; si ex venis communibus, in huiusmodi casu non abstinendum prorsus neque à sectione; neque à medicamento leniente; quanquam febris heclica adsit primæ speciei. Quia, ubi febris habet iam humorum putredinem, non potest adesse temperamentum calidum, & siccum; habitus est ita gracilis

A non possunt concurrere tot causæ, ut in Ephemeris. Vbi omnia concurrunt, temperamenta astrotum, inedia, corpus gracile, temperamentum calidum & siccum, cuius rei exemplum vidi hodie & heri, & describitur lib. 13. meth. c. 3. Obibit. Est curatus à febre putrida spatio 7. dierum, transijt in tabem. De balneo, & aqua frigida, quia est aliqua difficultas, differam in sequenti.

Difficilis est putridæ febris curatio, cui heclica in prima specie connectatur: difficilius tamen cui tabes, seu febris tabida coniuncta, de utraque complicatione sigillatim loquimur. Primò autem, quod heri incepimus, putridæ cum heclica primæ speciei, circa manifestiora non versabor. Dixi enim in huiusmodi febribus, quæ complicantur cum heclica in prima specie, conuenire sanguinis missionem, & purgantia: de hac re non est difficultas. Propterea Auicenna in curanda hac febre connexa cum putrida: *Curatio huius, inquit, debet incipere a curatione apostematis.* Difficultas de administratione medicamentorum, quæ propria febris heclicæ.

Curatio putridæ cum heclica primæ speciei.

Et si sermo sit de connectione ardens ex venis communibus cum heclica primæ speciei, duo veniunt consideranda, vtrum conuenit vltus aquæ frigide, balnei, Quod pertinet ad potum frigidum, res est controuersa quia ex vna parte 10. meth. 6. proponit vltum frigidum, ubi non adsit neque viscerum inflammatio, nec humorum putredo. Ex alia tamen parte certum est probari potum frigide, à Gal. 10. meth. 5. probatur etiam in ardentibus, quæ non sunt complicatæ cum heclicis. Si igitur conuenit sigillatim in heclica, & sigillatim in ardentibus, ergo etiam in complicatis. Hanc ita soluiimus, quod ratio contradictionis tota pendeat ex temperie exhibitionis frigide. Galenus quando abique Heclica probat, id facit apparetibus signis coctionis.

Sanguinis missio.

Utrum conueniat potio frigida.

In heclica consulti statim in principio.

Itaque ratione huius diuersitas 10. meth. 6. veretur vltum frigidum in putrida connexa cum heclica, quia ratione heclicæ in principio; ratione putridæ deberet expectari coctio. ad hac in re oportet vos vni iudicio. Si in temperamento sicco, tempore æstiuo, periculum est ne transeat in tabem, si frigida non exhibeatur, etiam in principio potestis exhibere. Nec obstat authoritas Gal. 9. meth. 5. Nam potio frigida potest exhiberi in duplicem finem, ad expurgandos humores noxios putrescentes, quod tantum in signis coctionis, ubi dantur multæ libræ; aliquando tamen gratia eximæ coctionis suæ & refrigeret, & humectet: quoniam casu non in maxima quantitate, sed vna, vel altera hemina; quod facit in heclica 10. meth. 5. & 1. acut. com. 43. ubi proponit vltum frigidum tantum ad extinguendam suam. Quod si virium imbecillitas, aut aliter parus videatur prohibere accipe loco frigide serum caprinum, aquas stillantes,

iur

ius destillatum cum herbis simul refrigerantibus. Hæc de frigida.

*Nū bal-
neū sim-
pliciter
admini-
strandū
in hec-
tica & ar-
dens.*

Quantum ad balneum, est difficultas num administraretur similiter in hectica, & ardenti. Sed tamen Gal. 10. meth. 10. proponit balneum in febribus hecticis, quando non ex tempore, sed qualitate balnei; in hecticis i.e. administratur primo tepidum, deinde frigidum, & finis balnei refrigeratio.

Nam quod præstat vsum, est vsus frigida; in putridis non exhibetur frigidum, sed calidum, ut habeat vim per halitum digerendi l. c. Et propterea cum diuersas hæc ad sit, prohibetur in febribus hecticis, quæ habeant putredinem connexam. Sed hæc etiam in re sequendum consilium Galeni lib. de marc. c. 3. ubi non improbat vsum balnei in declinatione saltem.

Nam eo tempore excrementa iam concocta, & ex tempore facile possunt euacuari: ubi euacuata, ubi superuenit frigida, præstat utilitatem pro febre hectica. Hæc de frigida, & balnei in febribus putridis cum hectica primæ speciei.

Si putrida ortum ducat ex erysipelate, vel inflammatione viscerum cum hectica primæ speciei, triplex occurrit difficultas, ex parte frigida, balnei, ex parte comis victus. Nam quantum ad medicamenta in hmoi prima speciei, quando adsit Erysipelas, licet mittere sanguinem, & vti medicamentis Lenientibus.

*Vena se-
rio.*

*Nū cōue-
niat fri-
gida.*

Difficultas de his tribus: primum quantum ad frigidam est difficultas, vtrum conueniat in Erysipelate, & inflammatione viscerum, quia potius frigida habet vim incitandi inflammationes, facit inflammationes inexpugnabiles pars. vlt. com. 43. acut. 1. ubi fiunt rebelles, febris progreditur: Itaque non conuenit.

Ex altera parte: ubi Erysipelacea viscerum affectio, quis negat tabem subsequi posse, lib. de marc. c. 5. 6. & 7. ut nihil clarius, itaque extinguetur frigida.

Hæc in re dicam, quid ex Gal. potuerim haurire. Si affectio Erysipelacea lib. de marc. c. 8. potius frigida conuenit. Ratio ex Gal. 13. c. 8. ubi scribit in Erysipelate intentione refrigerandi superare scopum euacuationis: in inflammatione contra res se habet. Humor Erysipelaceus est tenuis valde, credit facile, non incitatur. Inflammatio potest indurari ex potu frigida. Nilominus perpendas periculum patientis. Si properet iam ad tabem patiens, secundum Galenum 10. meth. 6. melius est illos præseruare ab imminente tabe, quam permittere, & conuenit potius frigida.

*Tempus
hibito-
nis frigi-
da.*

Sed quo tempore administranda? loquens de frigida præbenda lib. de marc. c. 8. præbenda in declinatione, in inflammatione non in declinatione. Ratio, quia si profectio nullum amplius periculum immineret tabi, & si inflammatio magna, ut possit suppurari, transit scitum. Consilio igitur ut vitamini frigida prouideat circa principium, ut prohibeatur incrementum inflammationis, vel si hanc vereamini, aqua hordei, Aut caprimo; iure destillato; sed frigida cæteris

A præstantior.

Quantum ad Balneum in hoc similiter in his affectibus est suspectum 3. acut. com. vlt. lib. 1. 1. meth. c. 9. & 20. lib. 10. meth. 10. nam ex vsu balnei funduntur humores, & præcipites in partem inflammata ruunt. Itaque in hoc casu est sequendum Galeni consilium lib. de marc. c. 7. ut parubus quæ sunt foci febris, adhibeantur in principio refrigerantia, de quibus dixi in curatione hectice. In distinctione etiam balneum aquæ calidæ conuenire factis vniuersalibus euacuationibus l. c. sed pro febre hectica non conuenit prima. In quo casu, si humores adsint in visceribus, vitamini quibusdam fomentis ex meliloto, chamomilla, anetho, fenugr. semini additis absinth. & spicæ humectantibus ex oleo anethino cum portione olei de absinthio: toto autem tempore balneo, quod conuenit hecticis, potestis vti.

Balneū

Quantum ad victum, est difficultas quia ex sententia Gal. 10. meth. 5. in hecticis, quæ connectuntur cum temperamento calido, & sicco, & habitu gracili nihil præstantius cibo. Ex aduerso, ubi in his intemperamentis adsit Erysipelas, vel Inflammatio, nihil deterius cibo l. c. Propterea dicebat in hoc casu, vnicam salutis spem esse vitium robur. In his itaque casibus oportet quidem cibum præbere, sed cibum medicamentiosum, ut putanam hordeaceam cum emulsione sem. melon. pro potu aquam hordei & sapius in die, sed parum.

*Vitæ
potus*

Venio modo ad eandem hecticæ primæ speciem connexam cum febribus diuiniis, ex obstructione, &c. In his est insignis difficultas. Curantur minores ipsi ipsis medicamentis, quibus putridæ abique hectica; hoc mutato, quod corriganur quibusdam humectantibus. Vno verbo, tractantur per medicamenta mitiora, temperata humectantibus, & quod victus rauo sit humida: Et ideo, si corpora tententur pituitolis, pituita expurganda. Præparandi humores syrupo de betonica, admixto decocto ex iure opimo. Præterea aperientia eligenda temperata, & victus potius pius quæ tenuis: sed plura de hac re dicam cum loquar de febre hectica secundæ speciei.

*Curatio hec-
tica primæ
speciei
cum fe-
bribus di-
uiniis
obstructione,
&c.*

Hectica secundæ speciei connectitur cum Ardentibus, vel Longis.

Si cum ardentibus, difficilis est curationis. Nam ratione tabis corpus emaciatur, quanquā febris putrida, non conueniunt medicamenta generosa, non venæ sectione licet vti quæ ratione tabis non conuenit.

*Curatio
hectica
2. speciei
cum ar-
dentibus.*

Pariter quantum ad medicamenta purgantia, omnia relinquenda: tantum Lenientia, & Refrigerantia eligenda, ut Manna, serum caprinum, electuarium, diaprunum lenitiuum, cetera relinquenda.

Quantum ad remedia, quæ sunt proposita pro Hectica curanda, non conuenit vti frigida, quanquam ardens videatur requirere vsus frigida; quia connexa tabida est. Gal. cap. 10. lxxi. 5. quæ scribit præbenda frigidam

in suspitione hectica, usque quo corpus non fuerit A
conscriptum; & quæ sequuntur.

Pariter non habet locum usus balnei. Nam
in hoc casu si exhibeatur usus balnei frigidi,
retinentur excrementa purrida: Si calidi, cor-
pus colliquatur. Itaque non convenit: conue-
niunt Epuhemata, & inunctiones.

Numla c
convenit.

Est dubium de lacte, an conveniat, Hipp.
5. aph. 64. prohibet usum lactis in acutis, & bi-
liosis. Nihilominus potest tunc preberi lactasi-
ninum. Nam hoc est valde serosum, nec facili-
ter transit in nidorem. Qua ratione prohibue-
runt Gal. & Hipp. potius transit in acorem:
non in nidorem; nam abundat parte serosa. Ita-
que in febribus etiam ardentibus 4. acut. 9. u-
sus est lacte in maxima copia. Quod si in ipsis B
profecto multo magis iaculis complicatis cum
hectica secundæ speciei cum tabe.

V. Quæro

Quantum ad victus rationem pertinet: con-
uenit plenus, quamvis febris putrida ad huius-
modi cum confuso destillato, pro potu destil-
latum ex carne pulli refrigeratum cum soncho,
endivia, &c.

Cum lon-
gis.

Quod si coniungatur febris hecticae secundæ
speciei febris longa; potest etiam ex obstru-
ctione, destillatione, aut ulcere Pulmonis, ut
preuenerint alias complicationes; quæ com-
prehenduntur sub his. Si ortum ducat ex ob-
structione, non cogitandum de sanguinis mis-
sione; utendum minoribus euacuantibus primas
vias, ne augeantur obstructions, singulis sex,
aut septem diebus conveniat vii, aut vnc. j. si
calis cum vnc. ij. manne, aut vnc. ij. mellis ros.
solicum vnc. ij. manna.

Exobstru-
ctione.

Intermediis vero diebus vii clystere deiecto-
rio quidem, sed molli, qualis conficitur ex iure
castrati, aut lacte aliquo cum vnc. iij. sacchi.
rubri, & vnc. ij. olei violati.

Alias euacuationes prætermittimus in apo-
rientibus; quæ, quia calida, frigida, & tem-
perata, oportet quidem vii fortioribus mixtis cum
temperatis aut trochil. apertentibus.

Recipe troch. de rhubarbaro.

de Eupat. an. scrup. ij.

de camphora, aut

ex rosis, aut viol. drach. j. β.

M cum syr. de cich. comp. f. pil. x. præbei.
ante decoctum ex optimiore coëctu

Quod ius recipiat huiusmodi medicamen-
ta, nempe agrimoniam, filicem, beron. melis. ta-
marile cetrach. petroselinum (nun semen, sed
folia & rad.) apium hortense, hord. etiam &
endiviam, & hepaticam: nam hac ratione ape-
ritis, nec multum calefacietis.

In magnis necessitatibus aperientes, & hu-
mectantes trochisci propositi, aut electuarium
meum de chalybe, & post præbe lac alinum,
quod non obstruat. & si habes hoc medicamē-
tum qual- meum elect. poteris aperire obstru-
ctiones, & corpus nutrire.

Externis aperientia sunt fomenta, emplastra,
&c.

Alinum lactus usum in hecticis connexis cum

longis ex obstructione non tantum confir-
matur 4. acut. 7. & 109. verum etiam sec. 5.
aph. 64. ubi scribitur convenire in tabidis lon-
gis, ac parvis. Neque obstat, quod citato loco
dicitur prohiberi, quibus hypochondria suspensa
non tantum flatibus, sed etiam tumoribus
vexata. Vumur lacte præcedente aliquo aperi-
ente, ut est dictum. Neque etiam huiusmodi
lac obstructions augere potest lib. 3. de alimi-
fac c. 15. ubi scribitur lac multæ serositatis non
obstruere.

Oritur etiam, & conuertitur febris tabida
cum Destillatione, & Phthisi. Ratione destil-
lationis opus esse vii siccantibus repellentibus
reuellentibus alterantibus: ratione tamen tabi-
dæ febris requiruntur contrariæ Indicationes,
de quibus iam vberius.

Euacuationes, ubi tabes facta, prætermitten-
dæ validiores. Nam in principio lib. 5. meth. 14
possumus vii Pilulis trochis quando vires me-
dicerint constanti fluxione sientie acti, rhubarb.
agari, ubi consumptum corpus viendum mel-
los, viol. manna.

Quantum ad Reuellentia, & Deriuantia:
considerandum an fluxio fiat primario cere-
bro, an aliunde suscipiatur. Si prius, non est o-
pus vii reuulsionibus infernarum partium, ut
frictionibus, balneis, cucurbitulis, cauteriis. Ca-
piti reuulsio adhibenda lib. 5. meth. c. 13. & 14
coronali future. Vbi tamen quaeritur, an con-
ueniet tam in fluxione calida, quàm in frigida.
Trall. lib. 5. c. 2. impugnauit Galen. qui voluit
ibapsiam sinum columbinum in calidis fluxio-
nibus convenire. Non tamen ita culpandus.
In fluxione calida ista administranda non sem-
per, sed quando periculum imminet, ne patien-
tes fiant phthisici: Oportet enim humorem
staut reuellere, & plus potest euacuatio illa,
quàm suspicio caliditatis. Non indè est, si
ad sit phthisis, quæ hisce potius augetur, quod
cognouit Gal. lib. 6. de tu. val. c. 9.

Idem dicode Cauteriis. Obiciat aliquis hæc
calefaciunt: Cuiò definit calor ille, & poterimus
munere linteolo partem oui albumine succi
portul. planiag. bol. arm. Perforato linteolo, in-
figetur cauterium.

Pro Deriuatione oportet vii effluxione per
nares. In fluxione calida succo betæ, malux;
in frigida, succo maioranæ. ebull. rad. cyclam.
tabaco. Licet etiam gratia deriuationis vii fri-
ctionibus, & cauteriis in brachiis.

Si materia transmittatur ad cerebrum à ven-
triculo, vel iecore, vel vtrique parte, conueniunt
frictiones, aq. cal. balnea, cauterium partium in
fernarum externæ, vel interne, præsertim si ab
vtero proficiatur.

Clysteres sint acres. 5. meth. 14.

Quantum ad prohibentia ascensum hu-
morum, & vaporum, lib. 5. meth. c. 13. viciatur
fructibus austeris, ut sunt pyra, sorba, poma,
mispila.

Medicamentum præstantissimum in flu-
xionibus calidis, iecore calido, est hoc
post

post cenam antequam cubitum eat.

Re. vini granatorum vnc. j.ß.

aq. viol. vnc. j.

penidiarum. drab. ij. M.

Intercipientia fluxum destillantem materiam in calida, & acris, sunt confectio saponum ex farina amyli vnc. ij. cantali albi vnc. viij. cum aq. viol. redactis ad spissitudinem. Diacodium nostrum cum saccharo. Galeni quoniam alia compositio in forma Elect. vel cum sapa. vel melle, lib. 7. de mod. comp. per loca c. i. mihi maxime commendatur Rosule, ut

Rosule.

Re. amyli.

tragacanti.

gum. arab.

bol. arm. an. drach. j.

succi liquir. drac. j.ß.

Mucil. psylli.

typhac. an. drach. ij.

iulepi. viol. q. s. M. f. rosule parue exsic-

cate in umbra, quarum una continuè contineatur sub lingua, quæ in crassandi vim habet.

In fluxione frigida, myrrhe, oliban. Syracis drach. j. potest accipi pulueris, addita succi liquir. drach. j.ß. cum syr. de farsa. rosule, quæ contineantur in ore.

Quantum ad siccantia, conueniunt, & pro fluxione, & in temperatura, & vlcere quæ sunt suspecta admodum possunt etiam in usu esse primo in eclegmaus, Elect. lambicis ad quantitatem grani cicutis, sepius tamen in die.

In fluxione calida huiusmodi.

Re. amyli.

tragacanti. an. drach. ij.

penid. vnc. j.

bol. arm. orient.

ter. lem. an. drach. j.ß.

chine optime puluer. drach. ij.

syr. liquir.

papen. an. p. f. M. pro lambicis.

Frigida.

In causa frigida poteris vi sequenti.

Re. thuris.

oliban.

Syracis an. drach. j.

myrrhe. drach. j.

assilag.

borid. pulueris an. drach. j.ß.

syr. de byssob.

looth. de pinu. an. q. s. M.

Gal. lib. 5. M. cap. 13. & 14. ad exsiccatas fluxiones, virtut. Diapermate, quæ recipi quædam semina lib. 3. de paratu facit. Descriptio est talis:

Re. sem. lanij.

feniculi.

ameos.

byosc. an. drach. j.

apq. drach. ij.

opq. drach. j.

Diaperma.

Terantur hæc, excipianturq. Vino f. trochisc. j. Et vnus dissolutus vel in aq. farsa. vel vino, vel iure, exhibeatur.

A Alia est descriptio lib. 7. de comp. med. sec. loc. quæ recipit alia etiam. Potest hæc confectio conferre, & fluxioni calidæ, & frigide. puto tamen ea non vitendum, nisi corpus admodum consumptum, adsit maxima tabes.

Quantum ad exsiccantia exteriora, possunt capiti adhiberi. ubi queritur in calida fluxione an conueniant frigida, & sicca, astingentia, galla, thus, alumen, hypocistis, rosa, quæ solent administrari à practicantibus. Galen. improbat lib. 6. de tuend. val. c. 9. & laudat potius aquæ calidæ balneum, vel tepidæ gratia aperitionis pororum, quod etiam mihi probatur. Nō enim possunt pulueres progredi ad cerebrum & illud, sed tantum exteriora siccate. Balneis incoqui possunt malua, althæa, semen lini, & alia laxantia.

Exsiccatia exteriora:

B

In frigida, probantur ex lixiula maior stichas.

Ceratum etiam hoc, quod tamen non est vesicatorium, ut

Recipe laudani. vnc. ss.

massich. drach. ij.

thuris.

Syracis an. drach. j.

sulphuris.

smap. an. drach. ss.

resina.

picis naualan. q. s. M.

f. ceratum.

Dubitat de decoctis exsiccantibus, an conueniant, per quæ intelliguntur decoctum chinæ, ligni salis.

Decocto chinæ iuualuit opinio, quod existeret quidem, sed impinguet etiam; quod puto fieri, non ratione chinæ, sed quia occasio morbi tollitur.

Præparatur sic.

Recipe rad. chynarum. vnc. j.

Infunde in aq. bord. lib. v. deinde ponatur in uentrem pulli, cui adde

amili.

tragac. an. drach. ij.

amygd. dulc.

mel. pinar.

sem. melon. purgat an. vnc. j.ß.

farsa. M.

bull. ad perfectam carnis elixationem. Ex primantur, & vitatur patiens abiecit singulo mane decocti. vnc. vj.

Vfus etiam decocto ligni sum in ciue Venetorante ij. annos, quem leniter prius expurgauit farsa capino per 3. dies delectorio; postea paratid decoctum in hunc mundum.

Recipe aq. bord. lib. xj.

Infunde & bulliant ad conf. med. adde carnis cellud. nemoralis. & lota cum aq. farsa. vnc. viij. carnis vituli, vel pumi lib. ss. farsa.

Pulmonaria an. ss. facta absorptione medicatis exprime omnia, & decoctum exhibeatur secundum

dum communem consuetudinem vnc. viij. ma-
ne, vj. vespere.

In cibo dedi pisanam hordeaceam manè
cum emulsione amygd. dulc. vespere cum vnc.
j. farinæ amyli. Proportu singulis tribus diebus
dedi decoctum propolis, & spatio 36. die-
rum cum aliis affet phthisicus, fuit curatus.

Sed si macies magis vigeat, sunt alij quat-
uor modi, secundum quos potest præberi de-
coctum. Vnus, ut loco aquæ hord. accipiat
aq. limac. & simul cum ligno imponatur ca-
ro testudinis, ac pulli vel vituli. Secundus mo-
dus est Electuarij, lib. 3. de morb. contag. 8.

Fracastor.

Meum est tale.

*De ligni Indici raspati optimi ex mediu-
lio lib. ff.*

pasul. pingu. lib. j.

sebesten numero xxx.

liquirit. rasa. vnc. ff.

bordei mundi M. j.

limaciar. num. xx.

carnis testud. vnc. viij.

Si casuant languinum, potest addi

polygoni portulacæ.

symphyt. an. & j. m.

Si non, farfara & pulmonaria est vitendum
facta coctione, & expressæ colature adde

penid.

amyli an. vnc. iij.

amygd. dulc.

nuci pinus.

sem. melon. mundat. an. vnc. iij.

Contusa hæc bulliant ad moderatam spissitu-
dinem, adde postea sacch. fini q. s. coque ad debitam
consistentiam. Et cuius singulo manè exhibea-
tur vnc. ij. vel drach. vj. Post quod præbeantur
vnc. ij. aut iij. iuris optimi.

Alius modus est olei ex ligno sancto, cuius
administratio est, aut in lacte, aut morcellis hoc
modo.

*Morsel
lib.*

De pulp. nucis Indici. vnc. 6.

nuci pinus.

pislac.

sem. melon. mundat. an. vnc. ij.

ol. ex lign. sanct. de Rill. vnc. ff.

sacch. fin. dissol. in aq. viol. q. s.

*Et f. confect. in morsellis, cuius ac-
cipiatur drach. ff. circiter.*

Ex lacte visus sum etiam hoc oleon in nobili
quodam Germano, qui phthisicus planè erat ex
lue Gallica, & desperatus ab omnibus, & quidè
felicissime vsus sum.

Accipiantur guttæ olei destil. iij. vel iij. mi-
sceantur cum vnc. j. lactis, post quod præbean-
tur vnc. ij. iij. vel v. lactis alimini progressu
scil. temporis. Si destillatio imminuta est, po-
test balneum adhiberi. teste Gal. libro quinto
meth. cap. 14.

Quod prohibetur, si adhuc perseveret fluxio
ll. cc.

*Visus
ron.*

Visus sit conueniens tabidis, &c.

De Febribus compositis. Cap. XL.

EXpediui hætenus, Deo inprimis autho-
re, deinde verè authoribus omnibus be-
nè fauentibus potiora omnia, quæ ad simpli-
ces attinent febres: quædam etiam de compo-
sitis, nunc superest, ut compositas breuibus ex-
pediamus.

In hac autem parte potius de Differentiis,
& signis, quàm de Natura & curatione verba
sunt facienda. Etenim quæ ad naturam in
vniuersalibus est explicata. Quæ ad Curationem
ex dictis ex tractatu de Febribus Noctis
partum de Hæcticis cum putridis innotebant,
ut propterea de differentiis, & signis duntaxat
agendum.

Componuntur igitur febres, vel cum aliis
morbis ut cum inflammationibus, aut humo-
ribus, ut propterea dicantur febres sympto-
maticæ, seu accidentales: de hac lib. 2. de cris.
c. 7 Gal. de hisce febribus loquens 7. aph. 42
inquit antiquiores Medici præcipue Hippoc.
nullam ex istis febribus propriè nuncupasse,
sed à loco affecto.

De hac complicatione in præsentia non est
sermo, sed de altera compositione febrium cum
febribus: quæ aut est febrium diuersi generis
aut eiusdem diuersi, quando simul coniungi-
tur Putrida cum Hæctica, vel Ephemera: Eius-
dem vbi Putrida cum Putridis.

De compositione putridarum cum Hæcti-
cis satis in præcedentibus locis. Compositio
Putridarum cum putridis quatuor modis con-
tingit præcipuis: aut enim componuntur fe-
bres putridæ eiusdem generis cum putridis e-
iusdem speciei: aut febres diuersi generis cum
febribus eiusdem speciei: vel diuersi generis
cum febribus diuersæ speciei: vel eiusdem de-
nique generis cum diuersæ speciei. Sunt qua-
tuor complicationes. Per diuersum ego intel-
ligo illud genus, quod in priori transcendens,
seu genus non transcendens, explico, vnum ge-
nus accipitur pro febre continua, vel intermit-
tente. Nam dicuntur eiusdem generis. Qua-
tenus eiusdem generis: sunt in duplici différen-
tia, ambæ continuæ, vel ambæ intermittentes.

Quatenus eiusdem speciei, ambæ biliosæ, vel am-
bæ pituitosæ, vel ambæ melancholicæ. Hæ sunt
differentiæ, quæ sumuntur ex primo membro
Febrium eiusdem generis, & speciei. Ceterum,
hoc loco quaeritur, nunquid possint dari febres
compositæ eiusdem generis continuæ, & eius-
dem speciei? Ratio dubii est, quia continuæ or-
tum ducunt ex putredine humorum in vasis
communibus: vbi putrescit humor in vasis
communibus, nulla ratio, vnde putrescat in
vno hoc, in alio tempore, debet esse vna acces-
sio. Apud Auic. Fen. primo, lib. 4. tract. 4. cap. pro-
prio soluitur, quod febres continuæ alia sunt
continue continentes, aliæ continuæ periodi-
cæ. Si sermo est de continetibus, non dantur
plures

*Febres
contin-
tæ cum
alijs mor-
bis.*

*Composi-
tio pu-
tridarum
cum pu-
tridis fit
4. modis.*

plures continentes vno tempore. vnica est febris continens, sed possunt complicari febres continuæ periodicæ, aut vna, aut plures, cum vna continua continente. hoc etiam docui in vniuersalibus.

Quod plures, quia materia augetur in pluribus locis, & non potest euacuari antequam noua accedat, & potest fieri duplex febris, potest etiam fieri, vt compliceur vna continua conclusa, & vna continua periodica vno tempore ubi, insignis putredo, vt pars determinata contineat focum periodicæ.

Intermittentes copulantur 3. modis.
1. Per viam confusionis.
2. Cōplicationis

Quantum ad intermittentes, possunt copulari tribus præcipuis modis: aut per viam confusionis, aut per viam complicationis, aut per viam subalterationis. Per viam confusionis, quando, duæ accessiones eiusdem speciei inuadunt patientem vna & eadem hora. Per viam complicationis, quando fiunt quidem duæ accessiones eiusdem naturæ eodem die, sed tamen secunda accessio non inuadit in Principio accessionis prioris, sed tantum in Augmento, vel in Statu.

3. Subalterationis

Tertia compositio est per modum subalterationis: & fit, quando febris e uisdem speciei complicatur simul in declinatione prioris: vbi iam prior accessio, vel declinat, vel ex toto definit, noua superuenit. Hinc Galen. lib. de typis dixerat febres, compositas alias esse duplices, alias duas & tres: duplices vocat febres eiusdem naturæ, quæ vno die plures inuadunt, si quem tentat febris biliosa bis, vel ter vnico die erit triplex tertiana. Quando singulis diebus accedant, vocat potius duas tertianas; quamquam res parum referat.

Dua tertiane.

Vento ad secundum modum diuisionis, qui erat diuersi generis, sed eiusdem speciei, fit quando E. G. duæ febres, biliosæ pituitosæ, aut duæ melancholicæ differunt in continuitate uel intermittencia, altera est continua, altera intermittens.

Tertium membrum erat diuersi generis, & diuersæ speciei, continetur in hoc febris Hemitriticus vocata, quæ dicitur diuersæ speciei, quia coniungitur vno tempore febris biliosa, & pituitosa; dicitur diuersi generis, quia altera eorum continua est, altera intermittens.

Ceterum hæc cōplicatio potest fieri duobus modis, ut febris biliosa sit continua, pituitosa, sit intermittens; & vt biliosa sit intermittens, & pituitosa continua quod sæpius fit.

Quod hemitriticus legitime.

Si primo modo, fit quidem Hemitriticus sed non legitima, Verum spuria nam hemitriticus legitima fit ex biliosa intermittens, & cotidiana continua; aliæ omnes complicationes faciunt hemitriticos spurios ex Hippocr. 1. in 1. Ep. d. text. 23. et ex Galeno in eodem cum. 3. in 1. Epid. text. & com. 5. ex Gal. pluribus verbis libro 2. de diff. febr. c. 8. his locis ostendit veram hemitriticum esse cōplicationem biliosæ intermittens & pituitosæ continuæ.

A Hinc fit ex sententia Hipp. ut huiusmodi febris duas contineat conditiones. prima, ut sit horrida, secunda, ut continua, inquit Galen. lib. 2. Si biliosa esset continua & pituitosa intermittens, hemitriticus esset continua quidem, sed non horrida. Quæ est ratio? inquit Gal. in contrario enim sensu ratione tertiana intermittens deberet fieri rigor, sed quotidiana moderatur mordacitatem humoris, propterea loco rigoris fit horror quæ sententia est accepta ab omnibus, sed ego improbo.

Primum falsum, in continua biliosa rigores fieri non posse, puto vos legisse meum tractatum de rigore, in quo loco fusiùs hanc rem disputavi, num possit etiam fieri rigor intermittens continuus.

Rigorem posse fieri in continua biliosa.

Quod sic, probavi, quia materia siue sinistra buatur in totum corpus, siue vellicet membranas viscerum, potest rigores excitare. Si igitur hæc febris potest etiam rigores excitare, E. non valet: Est tertiana continua. E. non horrida, quia habet rigores, & habet rigores per circuitus.

Pariter, quantum ad pituitosam, eodem tractatu & de febre pituitosa, quæ ex pituita dulci, non habere rigorem, vel horrorem, sed ex vitrea, seu acida cum rigore maximo superuenire lib. 2. de diff. febr. c. 6. Si igitur sic inuadit E. non valet consequentia: febris ortum ducit ex quotidiana; ergo non poterit habere rigorem.

Itaque, duobus modis illis quos proponit Gal. vos poteritis petere solutionem ab aliquo, quem ego non inuenio.

Ego existimo utroque modo id fieri posse.

Erat quartum membrum eiusdem generis sed diuersæ speciei, E. G. febris biliosa, & pituitosa, sed ambæ continentes, uel intermittentes.

Huiusmodi complicatio facit etiam Hemitriticum, sed spurium ut libro 2. de diff. febr. cap. 8. ita, ut apud Galenum sint quatuor hemitritici differentia, quarum una legitima, reliquæ tres spuria.

Porro, ut dictum est de febribus eiusdem, idipsum dico de febribus diuersæ speciei. Componuntur per modum confusionis, aut complicationis. Confusionis, quando duæ accessiones bilis, & pituitæ uno tempore inuadunt: complicationis quando in Augmento alterius, superuenit altera.

Habuitis Differentias, de causis pauca dicam nam habuistis de his diligentem tractationem. Dixi ortum ducere compositas febres ex pluribus locis patientibus: uel unico, sed varias affectiones patientes. Ex pluribus tam febris eiusdem, quam diuersi generis. Vinus, quando iecur auget bilem, ex qua fit biliosa: auctabile attrahitur à ventriculo, & fit pituitosa.

Causæ cōpositarum Locarum.

Poterit etiam fieri duplex eiusdem generis si excrementum generetur in iecore, deinde attrahatur.

Quantum

Signa.

Quantum ad Signa, pauca dicam. Nam febres compositas per modum confusionis cognoscetis ex grauitate, & multiplicitate Symptomatum, quæ contingunt in principio accessione. quando accessiones duæ confunduntur, oportet symptomata grauisima, & varia esse, qualia sunt, ut is, sopor, anxietas ventriculi, humorum iuxta posui.

Cognoscetis autem complicationem febrili diuerfitate quia cum primò accedit febris, sunt excreta singula, pedes incipiunt incalescere, & tamen noua superuenit accessio.

Quantum ad Febres ipsas in specie, vtrum complicatio Biliosa cum biliosa, aut pituitosa cum pituitosa, aut biliosa cum pituitosa, sius diligenter in accipiendis, signis, quæ vnicuique febri conueniant, propterea oportet semper respicere ideam vniuersaliq; febris.

*Signa he**merito*

Hemitticus cognoscitur primùm ex accessione horribilis, & habet reduplicaciones

quandoque bis, quandoque pluries; & huiusmodi febres satis sunt longæ, & periculosa. quæ ratio, ut existimamus, fieri hanc non tantum quantum ex tertiana continua, & intermittente ex pituita vitrea dulci, quæ lethales.

Si enim ex quotidiana continua, & tertiana intermittente, non video cur possint esse lethales, quod scribit Hipp. 3. in 1. Epid. 5.

Nam quantum ad primum, si coniungantur duæ febres, vna maior, altera minor: ex his duabus minor cessabit citius, quam longior.

De Curatione nihil dicam, quia non distat à curatione simplicium, qui nouit illam, nouit & hanc. Et quantum ad Hemitticas etiam si videtur diuersa earum curatio, conuenit tamen cum Tertiana Notha Continua, ad quam confugatis. Itaque Dei Optimi maximi auxilio hunc volo esse præsens anni finem, meorum lectionum.

F I N I S:

ELENCHVS

CAPITVM.

PROEMIVM.

- Cap. 1. **D**E Febribus in genere. pag. 1
 Cap. 2. De febre Ephemera, siue Diaria exquisitè Legitima. 6
 Cap. 3. De febre Ephemera non exquisitè Legitima, & Periodica. 7
 Cap. 4. De febribus Ephemeris, seu Diarijs spurijs. 13
 Cap. 5. De Febribus Putridis in genere. 16
 Cap. 6. De Differentijs simplicibus Febrium Putridarum in genere. 28
 Cap. 7. De Causis Differentiarum Simplicium Febrium Putridarum in genere, & primum de Continuarum tam Concluserum, quam Periodicarum. 29
 Cap. 8. De Causis febrium intermittentiũ in genere. 40
 Cap. 9. De Differentijs Febrium Putridarum Periodicarum ratione ordinis, quem in reditu, & intermissione seruat. 45
 Cap. 10. De Causis Circuituum Febrium Intermittentiũ scilicet Quotidiana quotidie, Tertianade tertio in tertium, Quartana de quarto in quartum &c. reuertatur, & accetone sua repetat, & simul de Causis Febrium Copositarum. 50
 Cap. 11. Breuis repetitio eorum omnium, quæ de Causis febrium putridarum hucusque dicta sunt. 54
 Cap. 12. De Magnitudine, & Paruitate Febrium. 55
 Cap. 13. De Motu Febrium Putridarum, cuius ratione dicuntur Acute, Breues, aut Longæ, siue Chronica. 55
 Cap. 14. De Causis Febrium ratione motus, curs. quædam sint Acute, quædam Breues, quædam Longæ, siue Cronica. 58
 Cap. 15. De Differentijs Febrium Malignarum. 61
 Cap. 16. De Signis Febrium Putridarum in genere. 62

- Cap. 17. De Prognosticis in genere, & primum de presagio future mortis, & salutis. 77
 Cap. 18. De Signis Modi future mortis, & salutis quomodo scilicet ager sit moriturus, aut euasurus. 74
 Cap. 19. De Signis Temporis salutis, & mortis, quando scilicet ager sit euasurus, aut moriturus. 75
 Cap. 20. Breuis repetitio eorum omnium, quæ de Signis, & Pronosticis dicta sunt. 76
 Cap. 21. De Indicationibus, seu inuentione auxiliorum. 77
 Cap. 22. De Curatione Chirurgica, & primum de Venæ sectione, quæq; cam indicare, & prohibere possunt. 79
 Cap. 23. De administratione Scarificationis, & Cucurbitularum in febribus. 85
 Cap. 24. De apertione Venarum sedalum seu Hemorrhoidalium, & appositione Hirudinum. 88
 Cap. 25. De curatione, quæ fit per Pharmaciam, & primum de Medicamentis Lenientibus. 90
 Cap. 26. De curatione per medicamenta alterantia, Preparantia, & Coccoquentia. 91
 Cap. 27. De curatione, quæ fit per medicamenta Purgantia; & quæ circa ea obseruanda. 98
 Cap. 28. De curatione febrium putridarum in genere, quæ fit per Diuretica, seu Urinam mouentia. 108
 Cap. 29. De medicamentis Sudorificis: in quibus febribus, & quando ea usurpanda. 109
 Cap. 30. De medicamentis in Febribus Putridis usurpandis. 110
 Cap. 31. De tertio instrumento curandi febres putridas in genere, quæ est Dieta, seu conueniens Vetus ratio. 111
 Cap. 32. De Febribus Putridis in specie, &



pri-

<i>primū de Tertianā Intermittente,</i> <i>& Continua Legitima.</i>	117
<i>Cap. 33. De Tertianā Notha Intermittē-</i> <i>te, & Continua.</i>	121
<i>Cap. 34. de Febre Ardente, seu Caufoni-</i> <i>de,</i>	124
<i>Cap. 35. de Febre Synocho, seu Sangu-</i> <i>inea Continente conclusa</i>	129
<i>Cap. 36. de Febribus Pituitosis, seu Quo-</i>	

<i>tidianis Intermittentibus, & Continuis,</i> <i>Epiala, Syncopali, Humorosa, etc.</i>	132
<i>Cap. 37. de Febrib⁹ Melancholicis.</i>	137
<i>Cap. 38. de Febribus Pestiferis.</i>	141
<i>Vbi modus componendi aquam cordia-</i> <i>lē Auctoris in febrib⁹ pestiferis.</i>	155
<i>Cap. 39. de Febribus Hecticis.</i>	156
<i>Cap. 40. de Febribus Compositis.</i>	170

INDEX RERVM NOTABILIVM.



A Cida aperitiuum febribus cōueniant. 91. d. 2.
 Aetiones lasa. 72. a. 2.
 Aetiones Naturales. 2. d. 1.
 Acuta febres. 56. b. 1.
 Extensa. 59. a. 1.
 Causa earum 60. c. 1.
 Acutus morbus quadruplex. 59. c. 1.
 Alui fluxus. 12. a. 2.
 P. Alpinus. 86. a. 1.
 Altimarus refellitur. 25. b. 2.
 Alterantia. 91. a. 2.
 Aperientia rias. 92. c. 1.
 Aqua frigida potus. 15. d. 2. 127. b. 2. 155. d. 1.
 166. b. 2. 167. c.
 Aqua Cordialis Auctoris. 155. 1. 1.
 Auctores de Febribus commendati. 1. b. 2.
 Ardens febris. 29. d. 2. 124. d. 1.
 Eius significatio. 34. d. 2.
 Astringentia purgantibus permixta. 108. b. 5.
 Attrahentium usus. 110. a.
 Augmenti Symptomata. 205. b.
 B.
 Balnei usus. 164. d. 1. 167. a. 1.
 Bezoar. 154. c. 1.
 Bilis putrescit. 24. b. 2.
 Bubo. 8. d. 2.
 Bubonis benigni, & pestilentis discrimen. 11. a. 2.
 C.
 Cacoehymia. 79. c. 2.
 Cancro. 163. d. 1.
 Cardanius resutatur. 25. c. 2.
 Calor quid. 1. a. 1.
 Calor extraneus. 2. c. 1.
 Eius synonyma. 2. a. 2.
 Caloris natui subiectum. 3. d. 1.
 Synonyma. 16.
 Caliditas natina duplex. 16.
 Calor natuius cur elementaris, & celestis. 3. a. 2.
 Caloris gradus in febribus. b. 2.

Perseuerantia. 8. a. 1.
 Calor à cibo. 158. d. 2.
 Calor ambiens. 19. d. 2.
 Coctionis, & cruditatis Signa. 7. c.
 Coctionis excrementa. 54. a. 2.
 Quarian febrium Causa. 36. d. 1. c. 2.
 Signa. 28. a. 1.
 Cause. 36. d. 1. b. c. 2.
 Coctio media. 105. c.
 Concoctio. 94. c. 1.
 Continuarum Proportionatarum causa. 54. b. 2.
 Continuitas perniciofa. 59. d. 2.
 Continuarum signa. 63. b. 2.
 Continuarum exacerbationes sine declinatione. 38. d. 1.
 Continuarum declinatio unde. 39. d. 1. 54. c. 2.
 Signa. 63. b. 2.
 Colchicum. 6. b. 2.
 Huius subiectum. 95. a. 1.
 Differentia. 61. a. 2.
 Continentis continua febris causa. 29. c. 2. 32. b. 1. 4.
 54. a. 2.
 Continua conclusa causa. 31. d. 2.
 Continentium signa. 64. c. 1.
 Proportionatarum. d. 1. ibid.
 Compositarum, & duplicium signa. 67. c. 2.
 Compositarum causa. 52. d. 2.
 Contagium. 146. b. 1.
 Cornu cerui. 154. d. 2.
 Critica signa duplicia. 73. c. 1.
 per effluxum. 75. c. 1.
 Cucurbitula scarificata. 85. d. 2.
 Non scarificata. 86. d. 1.
 Cucurbitularum usus. 87. a. 1.
 D.
 Decoctum Auctoris in Hectica. 170. b. 1.
 Dieta febricitantium. 111. c.
 Diaperma. 169. d. 1.
 Diuretica sintne purgantibus permiscenda. 107. c. 2.
 Diuretica duplicia. 108. a. 2.
 Qua, & Quando in Febribus usurpanda. b. 2.
 Pur-

Purgantibus miscenda. 107. a. 2
Diaria. V. Ephemera.
Dolor Ephemera causa. 9. c. 2
Duastres; duplices, triplices Febres. 31. a. 2
Duplicium signa. V. C.

E.

Elixatio. 95. c. 1
Ephemera. b. c. 2
Legitima non exalta. 7. c. 2
Ephemera ex putredine. 2. b. 1
non tamen putrida. c. 1
Ephemera Causa. 9. c. 1
Ephemera Periodica causa. 9. d. 2
Ephemera Sporadica. 10. b. 2
Ephemera Extensa signa. 16. 11. b. 1
Ephemera Pestilens. 142. c. 1
Ephemera curatio. 12. b. 1
Ephemera Spuria definitio. 14. a. 1
Epiale Materia. 132. b. 2
Causa. 14. c. 1
Signa. c. 2. d. 2
Erratica febris quid. 43. a. 2
Eius causa. 46. a. 2. 55. a. 1
Differentia. 46. c. 2. 47. b. 1
Signa. 67. d. 1
Extensionis febrium causa. 60. d. 1
Excretionem quadā extra coctionis tempus bonū. 73. a. 2
Excretio duplex. 103. d. 2
In Exanthematis Purgantia. 109. c. 2
Euentus futuri signa. 72. c. 1

F.

Febris contemplatio. 1. b. 1
Etymon. 2. a. 1
Definitio. 2. b. 1
Natura. 68. b. 1
Qualis in temperies. 2. b. 2.
Actio deprauata. c. 2
Subiectum. 3. a. 1.
Num vniversum corpus. 16.
Essentia. 4. c. 2
Causa. 16
Generatio. 5. a. 2
Differentiæ Essentiales. b. 2.
Accidentales. 6. d. 1
Tempora. 7. c. 1. 36. d. 1. 57
Curatio. 77. d. 1
Febres qua die pari mouentur longiores ac difficiliore.
48. d. 1
Febris ultra 4 diem mouens. 49. c. 2
In Febre quatuor notanda. 54. b. 1
Febris Idea. c. 1
Magnitudo, & Paruitas. 55. b. 2
Motus. 55. d. 2
Febres breues, & chronice. 56. b. c. 2
Earum causa. 58. c. 1
Signa. 68. a. 1
Febres composite. 170. a. 2.
Fernelius notatur. 30. d. 2. 30. d. 1
Factor e venis. 24. d. 1
Formam mixto corrupta. 20. d. 1
Fluxus colliquatiui. 148. b. 1

G.

Galenii Libri de Febris. 1. b. 2

Generatio simplex. 17. 1. 1

H.

Halitus aeris causa. 9. a. 2
Hæmorrhoidum apertio. 88. b. 1
Etiam in non assuetis. 89. a. 2
Modus. 89. b. 2
Tempus. d. 2
Quantitas. 90. a. 1
Hemorrhæus. 171. d. 1
Hellica. 3. d. 1
Non semper in habitu. 156. b. 1
Pestilens. 142. a. 2
Hirudinum vsus. 90. a. 1
Hirudines naribus adhibita. 150. d. 2
Humores tenues possint inspissari. 94. a. 1
Humorum crassorum concoctio. 95. 4. 2
Humor Alimentalis quid. 35. a. 2
Humorum putredo. 20. d. 1
Humor non putrescit. 23. c. 1

I.

Inflammatiō partium principium. 60. c. 2
Inflammationum Signa. 66. c. 2. 67. b. 1.
Discrimen ab Ephemera. 67. b. 1
Indicationes in Febris. 77. d. 1
Inæqualitatis signa. 69. c. 1
Intermittentis febris causa. 30. a. 2
Incrementa. 68. b. 1
Locus. 40. c. 2
Intermittens febris pestilens. 143. b. 1

L.

Lac. 163. c. 1. 168. a. 1.
Latica 134. b. 2
Laurent. Iouertus Patadoxus. 24. d. 2
Lenientia medicamenta. 90. c. 1
Sine addenda purgantibus. 108. c. 1
Limaces in hellica. 163. a. 2
Lipyrina. 125. d. 7
Ligatura. 164. b. 2
Locorum signa. 64. c. 2
Localia. 110. b. 2
Longæ febres. V. F.

M

Malignarum Februm differentia. 61. b. 2
Signa, 67. d. 2. 68. c. 1
Mammarium grauitas sine sanguinis deficientis signum. 32. d. 1
Mannus. 86. a. 1
Marasmus. 3. d. 2. 157. b. 1
Mater aurgens. Vid. T.
Melancholia ex Pituita. 138. d. 1
Morbi Appropriati. 1. c. 2
Morbi, & Salutis signa. 74. c. 1
Motus Februm. F.

N.

Non exquisitè legitima febris Ephemera. V. E

O

Obstructio Febrisne causa. 32
Obstructio partium principum. 60. c. 2
Ordo Februm. 1. a. 1

P

Pandiculationis causa. 77. c. 1
Paroxysmus. 37. d. 2. 38. c. 1
Pediculi phibiscorum. 160. d. 2

Peracuta febris causa, & periticia. 59.c.2
Periodus quid. 35.b.2.d.2.117.d.2
Hius causa. 62.c.2.27.b.1.38.c.2.49.d.1
Pestifera febres. 141.b.3
Picula. 148.c.1
Phyma. 8.d.2
Phygethon. 16.
Puuitosa febris signa. 134.d.1
Picatio. 165.c.1
Pituita putredini obnoxia. 50.a.2
Pituita sanis copiosior. b.2. & cur. 52.b.2
Pituita salsa. 124.d.2
Plenitudinis quo ad vires Indicatio. 78.a.2.
Plenitudinis differentia. 79.a.2.
Pororum obstructio. 5.d.1
Pregnantibus febres correptis non conueniat sanguinis missio. 81.d.2
Præparantia. 90.b.1
Præparatio. 16.c.1
Prognostica. 73.a.1
Purgantium usus. 98.d.1.107.a.2.104.c.2
Prohibentia. 102.d.1
Purgantibus nam permiscenda sint adstringentia.
Purida febris definitio. 17.a.1.28.a.2
Putredo quid. 23.d.1.129.a.d.2
Causa. 54.d.1
Signa. 62.c.2.63
Putredo duplex. c.1.54.d.1
Triplex. 21.d.1.c.d.2
Putredo Naturalis. 17.a.1.18.c.1
Hius subiectum. c.2
Duplex. 22.c.1.2
Causa interna proxima. d.2.25.b.1
Externa. 19.b.2.26.c.1
Putredinis Naturalis, & præternaturalis discrimen. 20.a.1.
Putredo in cordis uentriculis. 23.a.1

Q

Quartanarum duarum vel trium duplicis vel triplicis causa 52.b.1
Quartana morus. 53.d.2
Quotidiana infebriatio. 40.a.2
Quotidiana causa. 52.a.2
Quotidiana intermittens. 132.c.1
Quotidiana curatio. 133.a.1
Qualitas veneficia. 143.d.1

R

Recidua etiam contingit in febribus qua desinunt diebus imparibus. 47.c.2
Recidua frequentior febribus que die pari mouentur. 48.c.1
Rigor in febre continua. 171.a.2
Rondeletij opinio regitur. 41.b.2
Roborantia externa. 110.c.

S

Salutris signa. V.M.
Sanguinis missio in quibus puridis febribus necessaria. 79.d.1
Hius tempus. 82.b.2
Quantitas. 83.a.1
Locus. 84.a.1

Sanguinis missio ad animi deliquium. 15.d.2
Sanguis non putrescit. 23.d.1.2
Sapor falsus. 125.a.1
Satietas nauſeatina. 9.b.1
Scarificatio. 85.c.2
Siccantia acida. 155.c.2
Signorum summa. 76.d.2
Somni indicatio. 84.a.1
Prohibitia. 16.
Spiritus putrescunt. 22.b.2
Sudorifera. 109.c.1
Substantia solida. 25.a.1
Suppositoria. 91.a.1
Synochus 129.a.2
Synopalis humorosa. 133.b.2
Mitura. 16
Systoles obseruatio. 63.c.1
Symptomata febrium. 68.a.2

T

Tempora Febrium. V. Feb.
Horum signa. 69.a.1.70.
Temporis salutis signa. 75.c.2
Mortis. 76.a.1
Terra Sigillata. 154.d.1
Tertiana quotidie accedens. 51.c.2.53.c.1
Tertiana intermittens legitimæ. 117.a.2
Continua. 121.a.1
Sputa. 121.c.1
Transpiratio prohibita. 5.b.1
Sola non est causa putredinis 25.d.1.
Transpirationis prohibita causa. 26.d.2
Trincauellius notatur. 85.d.1
Turgente materia sitne purgandū in principio. 91.d.2
Turgens materia. 99.c.1
In Augmento 105.b.1
Typus quid. 45.d.1
Typica febris. 45.d.1
Hius causa. 55.c.1

V

Velox Febris. 59.d.1
Vena sectio. V. sangu.
Vena magna quid Galeno. 34.b.1.
Vena sectionis indicatio. 80.c.2.81.d.1.
Vena remotioris apertio. 84.b.1
Vena proxima, & remotæ. d.2
Vena proxima quam primum aperienda. 85.d.1
Venenum cum corpore comparatum. 145.a.1
Vesicantia. 151.b.1
Ventriculi acceptio. 16.d.1
Vicinia corporis calidi. 4.d.2
Viperæ venenum. 145.b.1
Virium conseruatio. 79.c.1
Virium futurarum indicatio. 80.c.2
Vnicornu. 154.b.2
Vomitoria. 90.c.1
Horum usus. c.2

Pag. 78. Col.2. lit. D. uersu penultimo. in Putredine, lege, in Plenitudine.
 Casera leuiora aquas Lector emendabit.

HERCVLIS SAXONIÆ

Patauini Medicinæ Professoris Primarii

DE MELANCHOLIA.



*Caput Primum, In quo proponitur agendum de Melancholiâ, eius
afferitur communis sententia, & propria etiam Auctoris.*



MENTE M humanam A
omnium consensu di-
uinam, ad scientiam,
sapientiam, artem, ac
prudentiam natam, &c.
(vt dicebat Ficinus) re-
rum immortalium ac
mortalium amore do-
natam, aliquando tan-

topere à propria natura transmigrare, vt om-
ni veritatis lumine deposito, religione, socie-
tate, ac necessitudine hominem relinquat in-
scium, inhumanum, ferum, seipsum, & alios
odio habentem, res est admiratione, & misera-
tione digna. Quot modis id contingat, ac
quam vi, & causis, nostrum est in præsen-
tia institutum explicare, vt deinde propo-
sitis signis, Deo duce, ad inuenienda tantorum
malorum præsidia vos conuertam, & quoniam
huius partis functiones cum febre, & si-
ne febre læduntur, ac de læsis functionibus
principibus cum febre dictum est hætenus,
versabimur nunc circa actiones istas læsas si-
ne febre. Non ignoro Gal. l. de diff. sympt. c.

*Trib. mo
disa. Ho-
ner prin-
cipes læ-
dantur.*
1. rectrices functiones læsas trifariam distin-
xisse, vt quandoque imminuantur, sicut in
fatuitate, quam Græci *μωρία* dicunt, aut
pollantur vt in amentia, aut deprauentur, cum
timore, & mærote, vt in melancholia, vel cum
furore vt in mania; nos tamen breuitati, & fa-
cilitati studentes de his omnibus agemus sub
melancholiæ titulo. Et primum quidem erit
de melancholia sermo ex communi omnium
sententia, deinde verò ex propria. Melan-
colia igitur, quod vt ait Gal. 2. meth. 2. ab humo-
re nomen sumpsit, est functio princeps depraua-
ta, cum timore, & mærote ex spiritu animali te-
nebricoso: definitionem hanc, licet colligere
partim ex 2. de causis sympt. 2. partim ex 3. de
locis affectis 7. Dicitur deprauata functio ad
differentiam fatuitatis, & amentię, dicitur cum
timore, & mærote ad differentiam manię, si-
ne febre, ad differentiam phrenitidis spurie,
tamen, vt suo loco vidimus, functionis princi-

pis nomine Attimartus, & vt video recentio-
res ferè omnes solam intelligunt imaginatio-
nem, vel imaginationem per se, discursum ex
accidenti, nec sanè iniuria, nam Galen. & Ac-
tius, Paulus, & Alexander melancholicorum
affectiones inquiunt fieri ex varietate priua-
rum imaginationum, ideo melancholici bo-
nas videntur inferre consequentias. Quid de
hoc sentiendum sit, suo loco explicabo. Cau-
sa huius prauæ functionis, si Gal. credimus lo-
cis citatis est spiritus animalis tenebrosus red-
ditus, nam sicuti in exterioribus tenebris ti-
meq; pueri, & ex adultis indocti: ira ait Gal.
tenebræ per spiritum animale mentis circun-
fusa terrorem, ac mærorem inferunt, id quo-
que inferius examinabitur. Tenebrarum cau-
sæ sunt vapores melancholici spiritibus mi-
sti, qui aliquando ex melancholia naturali,
quandoque ex genita per astustionem eleuan-
tur, sed vbi iam deposuit vim caloris exuren-
tis, nam ex ea, quæ adhuc exurit, & est cali-
da fit mania, non melancholia, ideo Gal. in 3.
de locis affecti 7. docet flauos, & eos, qui ca-
lidiori sunt temperamento melancholiam fa-
cilè incurrere, ob quam causam omnes cibi
acres, salsi, & amari, & aromatici, & immodi-
ce corporis exercitationes, & animi ingentes
motus melancholiam inferunt, non tamen eo
ipso tempore, quo humor exurit, sed paulo
post. Hinc ait Gal. 3. aph. 12. autumnio melan-
choliæ fieri genito humore tempore æstatis:
sic 3. aph. 30. & 3. Prognosticorum 28. in æta-
te consistenti fit melancholia, cum tamen in
ætate iuuentutis humor peruratur: sic post
cerebri inflammationes, & insolatus vehe-
mentes, & calida medicamenta capiti adhibi-
ta, fieri solent melancholiæ ex 1. de humori-
bus 1. in primum epid. 79. melancholia verò
naturalis aliquando generatur ex calida intem-
perie, aliquando ex frigida, aliquando ex mor-
bis instrumentarijs, aliquando ex errore ex-
terno. ex calida intemperie humorem gigni
naturalem docet Galen. 3. de causis symp. 2.
2. de scrib. 12. de atrabile 2. 4 & 6. 3. in tertium
De Melancholiâ, A 3 epid.

Epid. 2. &c. Ex frigida, & sicca cum aliqua sit dubitatio propter Gal. 2: de temperamentis ultimo, qui ait temperamentum frigidum, & siccum pituitam gignere, non melancholiam; recentiores hunc nudum solvunt frigidam, & siccam intemperiem naturalem pituitam producere, ascititiam verò melancholiam. hæc quoque inferius erunt examinanda. Augeatur quoque hic humor ex morbis instrumentarijs, qui ad iecur, mesenterium, & lienem pertinent, ad iecur, nam ubi iecoris pars concava obstruitur, aut tumore laborauerit, succum melancholicum ad lienem transmittere non potest, idem contingit si ipsum mesenterium eodem tumore, vel obstructione sit affectum, immo & lien tumidus, & obstrictus, & per aliquam intemperiem imbecillis succum melancholicum ad se trahere non valet, denique augeatur humor hic ex errore externo, nempe cibus temperamenti frigidioris, siccioris, & crassioris succi, ut sunt bulbi, tubera, legumina, carnes bubulæ, salix, brassica, &c. quæ apud Gal. videntur 3. de locis affec. 7. & lib. fac. res. Cæterum obstructiones istæ, & tumores, qui vel in mesenterio, vel liene, vel cava iecoris fiunt, aliquando ex ipso succo melancholico terreantur, & crasso producuntur, nonnumquam verò ex chylo inconfecto, qui aut crudus aut fabitur propter immodicam iecoris caliditatem, aut inconfectus manet propter ventriculi insignem intemperiem vel frigidam, & humidam, vel frigidum siccam, vel propter errores in cibo, potu, somno, v. eneris, &c. Ex quibus iam licet colligere locos, in quibus generatur humor melancholicus, & ex quibus sit hic affectus, nam sunt tres precipui, caput, totum corpus, & iecur, ac hypochondria. Hinc Gal. 3. de locis aff. 2. tres statuit melancholiz, sicut pilepsiz differentias à loco desumptas, ut una fiat primariò ex cap. alia quidem ex capite, sed secundariò affecto recipiente materiam à toto iecore, & à toto, tertia verò per solum consensum à vaporibus, qui ab hypochondrijs elcuan-
 tur, quam propterea melancholiam hypochondriacam, seu ut Arabes dicunt mirachialem, siue statuosam. Ex hæc est brevis, ac facili melancholiz delineatio ex communi omnium consensu.

*Melan-
cholia 3.
differen-
tia a loco*

*Propria
sententia
authoris
de melan-
cholia.*

Primum igitur, quod non accipio, id est, melancholiam esse vinum solius imaginationis, non etiam discursus, quod si verum esset, sequeretur pueros, & bruta melancholiz subijci, cum non careant phantasia, & tamen nemo affirmabit pueros, vel bruta hoc affectu tentari; accedit quod imaginatio versatur circa speciem sensibilem absente obiecto, at verò melancholicorum affectiones versantur etiam circa speciem insensibilem, concipiunt enim speciem boni, vel mali fugiendi, aut prosequendi ex specie sensata extrahere, quandoquidem quidquid sentiant Averroes, D. Thomas, & Albertus, qui hoc in brutis tribuunt non imaginationi, sed æstimationi. Accedit, quam pro rei veritate bruta non

A extrahunt hos conceptus, sed ex proprietate naturæ consecutiue illos concipiunt: sic ovis inspecto lupo ex propria natura lupi inamicitiam concipit, in melancholicis alia est ratio: nam ipsi intellectus partis beneficio extrahunt huiusmodi conceptum boni, vel mali, & propterea ad differentiam brutorum hoc concipiunt in illo subiecto, quod reuera neque bonum, neque malum ipsis inferre possunt, exempla sunt clara. opinatur quis casurum aliquando cælum defatigato Atlante, quis non novit hanc esse fabulam Adantem sustinere cælum, itaque melancholici omnes speciem mali in illis reponunt subiectis, quæ nil mali habent, & propterea patrem, uxorem, medicum, & amicum putant esse hostem, aut diabolum. Hæc itaque fiunt non per naturam, aut concomitanter, sed ex mentis depravata officio. Accedit quod imaginatio ex Arist. 2. de anima, neque affirmat, neque negat, componit quidem species sensibilibus inter se, & illas quoque, quæ nunquam simul stare possunt, fingit sphingem, chimeram, centurum, & alia, non tantum affirmat, aut negat, at verò opinionem sequitur fides, fides non fit absque ratiocinio, ideo tandem, ut docet Arist. in 2. de anima, opinio, fides, & ratiocinium à phantasia distinguuntur, & ad intellectum pertinent, neque quis dicat depravari quidem discursum, sed ex accidenti per vitium imaginationis, nam id quoque est falsum, imaginatio ex Arist. 2. de anima ultimo regit bruta animantia, & aliquando homines, ubi mens est velata, aut impedita, est velata propter aliquam animi ingentem perturbationem, itam præcipue, est impedita veluti in phrenitide, & melancholia, igitur si mens propria ratione non labore, corrigit phantasia, hinc dicebat philosophus eodem loco imaginationes nil magis lædere mentem, quam faciant picturæ, ut propterea sicut quispiam intuens picturam terrificam, si sanus fuerit, ac prudens, non horret illam: ita & imaginationes internæ quamquam multæ & terribilæ non perturbant mentem, nisi ipsa propria ratione labore. Hinc factum est, ut intellectus sensum, & phantasia corrigere possit, sensus, & phantasia putat lignum in aqua esse fractum, solem esse bipedalem, intellectus hæc omnia corrigit, & ideo falsa imaginatio mentem non lædit, nisi mens primariò sit affecta, neque quis dicat hæc non pertinere ad intellectum, quia intellectus non cognoscit singularia, in qua opinione fuit Averroes; nam ut optimè docet Scaliger exercitatione 307. intellectus agens non potest universales formare notiones, nisi cognoscat singularia, etenim illas ex singularibus elicit, præterquam quod infra ostendam intellectum practicum necessario versari circa singularia propria, & medici quotidie circa singulares internos locos affectos, causas, & affectiones versantur sed præterea nil magis ostendit melancholicos discursu laborare, quam actiones illæ, quæ ad prudentiam pertinent, quæ omnes in melancholicis, aut depravantur, aut abolentur, aut imminuuntur; Ad
 pri-

*Intelle-
tus ver-
satur &
circa sin-
gularia.*

prudentiam pertinet perspicacitas, consultatio, iudicium, circumspectio, cautio, providentia, æquitas intelligentia, videamus quomodo se habeant circa hoc; Melancholici per spicacitatem utuntur, ut modos inueniant interficiendi seipsos, utuntur quoque deprauata consultatione, ut inueniant media idonea ad consequendum finem, utuntur iudicio prauo, ut tandem operi finem imponant, prudentia carent, quia nullam habent curam aut Reip. aut domus, neque curant filios, neque uxores. De circumspectione quid dicam? Plerique ex istis male morigerati sunt in actionibus, & sermone, minus cauti sunt: nam plerique noctu ambulant per silvas, & loca periculosa, æquitatem non seruant, nam aliquando in dando sunt profusissimi, B quandoque usque adeo tenaces, ut neque obolum quidem ab ipsis elicere possis. De intelligentia singularium quid dicam? ad prudentiam pertinet cognoscere statum, dignitatem, ætatem, conditiones particulares cuiusque individui, ut unicuique quod suum est detur, isti non modo has condiciones ignorant, sed ut dixi amicum putant inimicum, & ab unoquoque facile decipiuntur. Si quis enim dicat se esse tegulam, aut cadauer ut cogat illos ad comedendum ipsi hoc credunt. Itaque clarum est hoc ad phantasiam non per tinere, sed ad discursum, cuius sunt partes opinio, prudentia, & scientia, de qua nonnulla sunt dicenda. Deprauatum igitur habent quoque melancholici discursum in his, quæ attinent ad scientiam, cum falsas accipiant præmissas, & propterea errorem quoque committunt in simplicium apprehensione; nam illa prædicata attribuunt subiectis, quæ minimè sunt tribuenda, & propterea cum quispiam dicat, melancholici non peccant in discursu, quia bonas faciunt consequentias, conceda illos non errare informi sophistica, sed errant in materia; materia autem sunt propositiones necessariæ quas ipsi omnino falsas concipiunt. Denique melancholici plerumque diminutum, & ablatum habent discursum, propterea simul cum melancholia, morosi, siue fatuitate, & amentia tentantur, tales sunt, qui nil ferè loquuntur, vix audent se mouere, pigri iacent, & inertes, stupidi, & balbi, ut propterea quidam animo concipiunt, se esse testas, vel quid simile, in quo casu manifestè ostendunt se neque primas intelligere dignitates; quis enim ignorat carnem non esse testam, aut mortuum non sentire, & tamen ipsi cum sint carnes, & sentiant, credunt se tales esse, satis puto probatum est in Melancholicis phantasiam non esse læsam, quod etiam censuisse Aui-cennam videtur, qui scribit melancholiam esse vitium imaginationum, & cogitationum, cum quo sunt & alij Arabes & quod ad Gal. attinet puto ipsum non sine imaginationis etiam opinionem comprehendisse more Platónico. Plato enim aliquando opinionem cum phantasia confundit, quamquam in Thæteteto, & Sophista, hæc duo distinguat. Phantasia igitur

Melancholici plerumque imminutum habent discursum.

A quatenus cum opinione coniungitur ad intellectum pertinet, ut propterea Gal. lib. de symp. differentiis 3. connumeret imaginationem inter facultates principes ad differentiam sensiuarum. Et si vos consideretis exemplum Theophili ibi à Gal. propositum, cognoscetis in Theophilo non solam imaginationem, sed & opinionem fuisse læsam, opinabatur enim & opinioni fidem adhibebat Tibicines in conclavi adesse, & tamen Gal. proposuit illum, ut exemplum solius imaginationis læsæ.

Caput 2. Impugnatur proposita definitio melancholice, & proponuntur varice species Melancholice.

D Vm varias melancholicorum differentias intueor, in quibus recensendis omnes ferè medicinx scriptores conueniunt, non possum non mittari, quomodo in hac definitione conueniant melancholiam esse insaniam cum timore, & mœrore, cum tamen mihi dignitius hanc rem consideranti visus sint inuenire quosdam melancholicos, qui neque insania, neque mœrore, aut timore laborant, alios, qui prauas habeant imaginationes aut cogitationes, tamen timeant, aut tristenentur, alios præterea inuenio perpetuè tristes, & timidos sine prauis imaginationibus, & opinionibus, quosdam inuenio tristes quidem, sed non timidos, ut propterea definitio melancholice prolata non careat accusatione. Inter Melancholicos reponuntur illi, qui nulla arte, aut studio futura vaticinantur, non loquor de prophetis, quos impium esset melancholicos vocare sint beati, & diuino spiritu afflati, sed de viris, & mulieribus à cultu Dei seiunctis, quos vaticinio donatos antiquitas semper inter melancholicos reposuit. Hinc Cic. 2. de diuinatione insanos vocant. Phanaticos vocant eò quod in phanis furore agitati futura prædixerint. Tales fuere Cassandra Trojana, Manto, Eufise, Nicostrata, Marfa, & ex viris Mopsus, Poltius, Proteus, & alij id genus. De his agens Arist. lib. 3. Problematum primo, loquitur enim de sybillis, has atra bile percitas fuisse docet. Inter Melancholicos reponuntur illi, qui sine præceptore, & studiis Astronomiam, aut Philosophiam, aliam ve artem, & scientiam sibi ipsis comparant. Aretius primo de acutis 6 hos omnes furore agitos fuisse docet & Petrus Aponensis in comentario primo 3. Problem. scribit mulierem omnino indoctam latinam linguam absque præceptore comparasse, quam melancholicam vocat. Cardanus 8. de subtilitate omnes homines, qui incognitis loquuntur linguis, ac scientias, & artes sine præceptore addiscunt, melancholicos vocat, hinc factum est, ut Arist. in illa trigesima Problem. parte ingeniosos vocauerit melancholicos, & Plato in Theeteto dicit, omnes, qui valent ingenio esse

impugnatio definitionis melancholice quæ non sit insania, neque continuo. Ita cum timore, & mœrore ostendit proponens quinque differentias, seu species melancholice. Melancholice prima differentia.

nio esse furorē pereitos, ad quos respiciens Cic. 2. de diuinatione, non me poenitet, inquit, hebetiore esse ingenio. In eadem classe reponuntur naturales poëtae, aut qui sine studio carmina componunt, dicebat Plato in Phædrō frustra absque furore pulsari poeticos fores, & in Hione vates ea, quæ scribunt, sublato furore non intelligere. Inter Melancholicos reponuntur etiam illi, qui sacris iugiter incumbunt, mortalia, & caduca spernunt, & in Dei amorem, ac cultum se ipsos conuertunt. Propterea Plato in Theeteto, siue dialogo de scientia quatuor constituit amoris differentias; vaticinium, misterium, poësim, & amorem. Hos omnes, si quispiam attentè considerauerit, inuenient, neque insania laborare, neque timore, aut mœrore affecto. Nam si de vaticinio fiat mentio, quid quæso insaniæ in vaticinio? Qui inueniat Sibyllarum carmina, docet Clemens Alexandrinus sexto Stromatum, ex sententia D. Pauli perlegenda esse, vt in his videamus quanta, ac qualia sint vera de Christo nostro Redemptore; & quas, Aristoteles dixit atrabile vexatas. Pariter si quis ex indocto, & inerudito fiat doctus, & Astrologus, quod nam erit in illo aut imaginationis, aut discursus vitium? Idem de poësi dico, de religionis cultu, & amore, quem nemo sane mentis insaniam vocauerit.

Secunda species melancholiae sine timore, cum mœrore ostendit exemplum amantium. Cæterum datur quoque melancholia, quæ est vitium imaginationis cum mœrore, & sine timore, qualis est perditæ amantis melancholia. Hi enim in hoc decipiuntur, quod tanam putent esse Dianam, tristantur præterea quod desiderata re potiri non valent, nusquam tamen timent, immo in cæteris maximè valent ingenio. Idem Plato in conuiuio cum constituat hunc amorem ex Perica, & ex Paro, hanc inquit amantibus sagacitatem contrahere, scientiam, prudentiam, artem falcinandi, præstigiatoriam, aliaque id genus artes, quibus proprium consequantur finem.

Tertia species melancholiae sine mœrore, aut timore ex sola deprauata imaginatione. Dantur quoque melancholici prauas habentes imaginationes, ac opinioniones sine vlllo timore, aut mœrore, in hac classe sunt illi, qui putant se esse reges, Principes, Cardinales, & Antichristos. Noui ego Venetis ciuem Venetum doctorem, qui putabat se esse Antichristum, Alium noui seruum, qui quotidie clauso conclauis vnâ horam solus ibi manebat, & acceptis picturis omnium Principum sedens pro tribunali, tanquam Pontifex responsum omnibus dabat: noui alium nobilem Venetum, qui cunctas nobiles, ac pulchras mulieres illum requirere dicebat perpetuè lætus, ac minime timens.

Quarta species melancholiae sine timore, sed non conceptu præsentis mali, itaque qui insunt in est differe extremo omnium malorum, nihil timent, quia sententia di nihil deterius expectant, propterea melancholici, sicut etiam dicitur, qui iam credunt se esse mortuos, & regulas nil secunda

A amplius timent.

Denique alij sunt perpetuè timidi, & mœsti sine illa praua imaginatione, plurimos tales non ui non hanc, vel illam determinatam rem timentes, nec hac, vel illa re tristantes, sed aiunt omnia illis timorem incutere, hos sane omnium maxime voco melancholicos. Postquam & ipse Hipp. 6. aph. 23. timorem, & mœrorem si diu permanferint melancholiam efficere docuit, cuius sententiæ subscripsit Gal. & eoloco, & 3. de imaginariis affectibus 7. & 2. de causis symp. vltimo. Neque quis dicat, quod tamen aliquando in consultationibus audiui, hos vocari morosos, non autem melancholicos, nam morosos vocat Gal. lib. de differentiis symptomatum 3. fatuos. Hip. 3. in 3. epid. stocat tetricos, impatientes, de quacunque res sollicitos, quæ potius sunt melancholiarum initia, quam confirmata melancholia, nos autem de illis loquimur, qui iam diu absque vlla interna, aut externa causa, per internum intelligo prauam imaginationem perpetuè mœsti, & tristes sunt.

Caput tertium, afferuntur causæ specierum melancholiae superius propositarum.

EX tam varijs melancholicorum differentiis iam licet colligere quantum à veritate declinauerint illi, qui in proponendis melancholiarum causis vniuersaliter dixerunt eam fieri ex animali spiritu tenebricoso reddito, quod enim fieri potest, vt eadem tenebræ in spiritu homines reddant ingeniosos, vates, poetas, summos artifices, alios verò stupidos, ignaros, & amentes; quosdam faciat hilares, alios autem perpetuè tristes, nonnullos perpetuè timentes, alios omnia audentes, vt de amantibus dictum est, ideo nostrum est in præsentia omnium causas sigillatim exponere exordium summentes ab ijs, quæ rariora sunt vaticinio .i. deinde transeuntes ad ingeniosos. 3. ad amantes, deinde ad reliquos. Quod ad causam vaticinij attinet, minime audiendus est Plutarchus, qui in lib. de oraculis causam communem vaticinij retulit in halitum terræ in ano retentum, qui mentem occupet, hoc cogitauit Plutarchus, quia videbat antiquos vates in antris degere, & ibi responsa dare, vanam esse hanc sententiam docet vanitas vaticinij, siue prædictionis istorum, quandoquidem non modo sacrarum litterarum scriptores, vt Eusebius Cæsariensis, & Clemens Alexandrinus, Lactantius Firmianus hæc irrident, sed ipse Cic. 2. de diuinatione ad Apollinem Pythium conuersus illum falsitatis manifestè arguit, qui inquit vsum fuisse in prædictionibus obscuris verbis, perplexis, stæxeloquis, quæ in vitam hæc partem intelligi poterant, vt est illud, quod Pyrrhus acceperat.

Aio te AEacida Romanos vincere posse.

Neque referenda est eam, vt voluit Plato in participationem idearum nam anima de dono creata nullas habet ideas, præterquam quæ vel omnes, vel plerique hac ratione essent diuinatores, non

specie.
Quinta species melancholiae cum tristitia, & timore.
Melancholiae causæ ex propria sententia.

Vaticinij causa ex aliorum sententia.

non defuerunt, qui existimant diuinationem fieri homine in ecclasiis raptis, quasi mente à corpore seiuncta: sic scribit Plinius lib. 7. cap. 52. Clauomenium quendam, quodcumque voluisset, mentem à corpore separasse, & quæ longè futura erant, prædixisse, hoc eorum modo scribit Aulus Gellius presbyterum Patauinum eo ipso tempore, quo in Tessalia Pompeius cum Cæsare pugnabat, dum Patauij esset, mente emoritur pugnam vidisse totam, illamque adstantibus narrasse, & exitum simul. His concors D. Augustinus 14 de ciuitate Dei ca. 24. scribit se presbyterum vidisse, qui quodcumque vellet, mentem vsque adeo à corpore seiungere, ut corpus punctum, & inustum nil prorsus senserit. Ceterum præterquam quod mihi non videtur hoc rationi consentaneum, ut possit vnusquisque pro suo arbitratu mentem à sensibus seiungere: accedit quod neque in omnibus, in quibus fit hæc separatio sequitur vaticinium, res est certissima, sagas mulieres, quæ in conuentibus Dæmonum noctu plerumque reperiuntur, hanc mentis emotionem pati, neque tamen futura prædicunt. Itaque cum vaticinium sit quid supra naturam humanam, oportet, quin etiam ut si certum, & infallibile sit, habeat quoque causam supra humanam naturam, si sit incertum, & fallax, poterit habere aliquam quoque causam naturalem.

*Vaticini-
cæ ex pro-
pria sen-
sentia.*

Certi vaticini cæ est diuina vel per mētis illustrationem, vel per imaginum impressionem, vel per sensum materialia. In his igitur qui vera, & infallibiliter vaticinantur, nullam oportet aliam constituere causam, quam Deos, & Angelos, siue id agant illustrando humanam mentem, siue aliquas imprimendo imagines, vel in somnis, vel in vigilia, quibus deinde futura prænuntiantur, siue etiam denique quædam signa sensui visus conspicua in corporibus materialibus, talis erat apud antiquos Hebræos vaticinatio per Vsim, vel Tumulum vocata, id est per doctrinam, & veritatem, quæ comparari poterat inspectis 12. gemmis, quæ continebantur in sacerdotali sacerdotis, in quibus dum eluceret nomen Dei tetragrammaton, docebat, quid futurum esset circa ea, quæ sciri cupiebant. Hæc vaticinationis spēs ad melancholicos non pertinet, quamquam enim non tantum bonis, & sanctis, quam etiam improbis concedi possit. sic enim & Saul. & Balan, & Caiphas, & Sibylæ prophetico spiritu fuerunt donati: attamen melancholicorum vaticinium non est vsque adeo certum, ut fallere non possit: idcirco duplicem oportet esse causam, aut Dæmonem, siue obsideat corpus illius, siue mentem illorum eo modo, quo potest, illuminet; alter modus melancholicis magis proprius est assidua alienarum rerum cogitatio, nam sicuti dantur quidam melancholici, qui imaginantur se esse principes: ita dantur quidam, qui putant se esse prophetas, aut Deos isti itaque propriis dimissis negotijs toti sunt in speculatione alienarum rerum, cuncta obseruant præterita, & præsentia, noctu, & diu in illis versantur, ut propterea sicuti dicebat Cælius Rhodiginus lib.

27. antiquarum lectionum 1. plerumque tanquam boni venatores, qui emissio iaculo norunt vitum feram sint inter secturi vel ne: ita ipsi quoque ex principiis quibusdam cognitis, & attentè consideratis, ut plurimum futura prænuntiant: hæcenus de causa vaticinij.

Transio ad ingeniosos, qui cum inter melancholicos referantur, sunt tamen in multiplici differentia, quidam enim sunt qui ab ineunte ætate studiis, vel artibus seipso dedunt, & maxime in illis proficiunt; alij sunt, qui indocti & ineruditi momento ferè temporis, & quasi miraculo sapientissimi euadunt, vel artifices egregij primi triplicem ob causam aliquando dicuntur melancholici, vel quia soli degunt, neque libentior cum amicis conuersantur, aut quia timidi- res, & mæsti præter consuetudinem sunt, aut 3. quia de rebus philosophicis, vel de propriis artibus plus iusto loquuntur, & ad satietatem vsque. Melancholici in prima classe morboſi non sunt, solitudinem amant, ut studiis incumbant, si quis causam quærat cur plus cæteris, valeant ingenio, causam attulit Cælius Rhodiginus lib. 17. Antiquarum lectionum, à quò Valerius 6. Enarrationum Medicinalium, nosque hoc tempore dilucidabimus. Ingeniosi sunt tales ex humore melancholico naturali sed in decenti quantitate, & in conuenienti qualitate genito. Quartus hic humor, qui sex sanguinis dicitur, ubi multum non exsuperet, neque plus iusto aduratur, neque implus debito concoquatur, est corpus siccum, splendidum, quòd cæteris humoribus firmitatem, & stabilitatem tribuit, est enim quasi cæterorum gluten, & ut dicebat Ficinus, est quasi autum ignitum purpureo colore suffusum, ex hoc humore spiritus generantur propter siccitatem purissimi, propter quandam terreſticitatem non resorbiles, aut distillabiles, idcirco hominem reddunt ad inueniendam aptissimum, ad comprehendendam, & percipiendam promptissimum, ad iudicandam conuenientissimum, qui labores, & longa studia omnium maxime sustinent. Propterea dicebat Democritus, lux siccæ, anima sapientior, si hic humor aliquando incaleſcat, & quasi igneſcat, tunc furor excitatur, aliquando quidem poeticos, philosophicos, vel alterius scientiæ, aut artis etiam sine præceptore: hinc quoque nonnulli incognitis loquuntur linguis, non tam diu humoris, ac spiritus tenuitatem, ac luciditatem, neque enim credatis istos qui incognitis loquuntur linguis multa, & aptè in illis loqui, incognitis differere, sed ex huiusmodi spirituum illustratione hoc tantum contingit, ut quæ ab aliis audierunt, memoria repetant, & ideo cætena loquuntur, quæ alias audierunt. Denique melancholici, qui sapientes cum sint, mæsti, & timidi euadunt, id sortiuntur imminuto, ac refrigerato propter vigilias, & studia calore,

*Ingenio-
si inter
melan-
cholicos
referun-
tur.*

*Melan-
cholici
naturale
loquuntur
linguis
tenuita-
tem.*

& spiritui, sicuti qui de Philosophia, & suis artibus ultra omnem satietatem disputant, id faciunt ex forti imaginatione illis impressa per longa studia.

Caput, 1111. continens causas reliquarum specierum melancholia.

D Vm exteras melancholicorum differentias considero, omnes inuenio ad septem causarum genera reduci posse, ut propterea si ita res se habeat, ut puto me iam demonstraturum, sponte unusquisque intelligat, quam varia melancholicorum debeat esse curatio, Primum enim sunt quidam melancholici ex frequenti, & assidua alicuius rei cogitatione, alij ex inordinata appetentia, quidam ex affectu corporis, nonnulli ex causa extrinseca, plurimi ex spirituum animalium inordinato motu, non pauci ex eorumdem impuritate, denique complures ex tenebris spirituum occumbentibus, quam solam causam proponunt medici, ex frequenti, & assidua cogitatione incidunt in melancholiam, qui putant se esse reges, vel ut ille Venetus qui putabat se esse Antichristum. Hec enim sunt imaginatione, & cogitatione assidua, & diuturna in habitum mutata, & propterea complures ex istis absque medicamentis sola opinione & cogitationis mutatione sanantur: nam si audis nuncientur pecunie, vel, ambitiosis honores, sanitatem recuperant. In eadem classe sunt perditæ amantes, quem affectum Arabes vocant Illisi, Latini quidam ut Gordonijs, Valascus, &c. passionem heroicam, siue heros, hi tunc melancholici dicuntur, cum incipiunt emacari, decolores fieri, oculos habere concauos, consuetudines fugere, aut nihil loqui, aut de amatorijs tantum loqui, quandoque absque vlla causa in risum erumpere. Auicennas in hac classe reposuit tam eos, qui amant humana, quam illos, qui diuina, quod tamen impium esse existimo. Viri enim sancti si hominum consuetudinem fugiunt, & extra seipsos quandoque se esse videntur, hoc faciunt, ne ex colloquutionibus, & consuetudine peccata committant, ut Deo fruantur obiecto omnium optimo, in cuius contemplatione usque adeo toti sunt, ut præ iucunditate sine causa rideant, quandoque ecstasim patiantur; sed qui dirigunt, hunc affectum in res humanas plerumque decipiuntur, qui turpem putant esse pulchram, itaque potius à seminis abundantia, & à spiritu calido, & sanguinis feruore in hunc animi affectum impelluntur, quam ab obiecti excellentia, dum itaque hoc priuantur, mæsti sunt, anxii, quorum affectiones optimè descripsit Plautus in Cistellaria, dum scribit: Iactor, crucior, distrahor, versor in amoris rota, vbi sum non sum, illic sum, vbi non sum. Caterum qui plura de amoris

natura, & differentijs, legere voluerit, adeat Marsilium Ficinum in commentario in conuiuium amoris, & Cælium Rhodiginum lib. 16. antiquarum lectionum cap. 24. & 25. & lib. 23. cap. 2. 3. & 4. Tertia causa extrinseca est, Ex causa est autem triplex aut potio venefica, aut morsus, extrinseca aut fascinatio, veneficas potiones, quas vocant tripli philtrea amatoria homines dementare posse satis docet exemplum Lucretij philosophi, & poetæ, ne veneficum quem scribunt hac potione fuisse dementatam. Ex causa Morsus potest quidem esse varius nihilominus omnium maximè melancholiam videtur afferre morsus canis rabidi, qui illam melancholiam speciem infert, quæ hydrophobia, seu timor aquæ dicitur, in qua patientes licet nulla alia ratione melius sanari possint, quam aqua epota, eligunt potius mori, quam aquam bibere; immo neque illius visum sustinent: Cælius Aurelianus 3. acutorum 9. scribit non tam ex cane, quam ex vrsu, & lupo, & leo pardo, & asino, & equo rabidis hanc fieri affectionem, quin immò non tantum ipse morsus, sed & spuma, siue pannis infusa, siue alteri corpori eandem infert rabiem, addit Aurelianus id quoque fieri ex vnguibus, cum tamen mihi non admodum hoc probetur. Probabilius est fieri ex inspiratione, qui ingreditur incalcescente iam ex motu thorace, & presente iam animali rabiem continente, quod scribit Theodorus, Praxianus, & Euporistus, Ex serpentibus hoc etiam fieri non inuenio bonorum scriptis, aut experientia comprobatum. Tertia causa externa est fascinatio, de hac nonnulla sunt nobis dicenda, nam magna res est, quæ humanum superat caput, & id mihi hæc in parte contigit, quod refert Alexander Trallianus lib. 9. cap. 4. contigisse Gal. qui in quodam libello, quem inscripsit de medica Omerica tractatione, quæ ad nos non uenit, scribit se fascinationibus aliquo temporis spatio nullam præbuisse fidem, postea experimenti certitudine ductus, cum videret incantationibus spinas gutturi infixas sponte sua decidere, & alia id genus, tandem coactus est credere. Itaque cum ego quoque sepius audirem quosdam aulicos perpetuo in cubili iacentes, extenuatos, nulla ope medica adiutos, tandem usu sagatum, vitas, clauos funiculos, acus carbones, capillosque inuolutos vomuisse, & tandem sanitati restitutos, putabam omnia hæc figmenta. Sed tandem cum Venetijs certa quædam huiusce rei viderim experimenta, tandem diligenter perlegi doctissimorum hominum scripta, & inueni non modo necessarium esse id credere, sed & impietatis, & infidelitatis argumentum esse id negare. Primum quidem inuenio in sacris litteris Exodo, & Leuitico maleficas detestari mulieres, & Deum præcipere, ut lapidibus obruantur. Concilia verò omnia Laodiense, Cartaginense, Mediolanense, Thuronense, & alia omnia de hac re admodum sollicita sunt, & Parochijs præcipiunt, ut maleficas inquirent, ex-

turbent, & si aliquam inuenerint, quæ ex maleficio quem piæ interfecerit, sacrosancta communione non doneatur. Idem censent Idorus 8. Etymologiarum c. 9. D. August. 8. de Ciuit. Dei. 19. Io Chrysost. in lib. de Fato, sermone 8. D. Th. 4. sentent. distin. 34 q. 3. Et si Philosophis credendum sit, Plato 2. de legibus, quem sequitur Iamblicus, in lib. de Diuinis mysterijs, & Plotinus, & Proclus, & Marsilius Ficinus assentiuntur, maleficos, & maleficas dari, qui plura hominibus mala inficere possint. Huius rei exempla habetis apud Bodinum in lib. de Demonomania, & Gulielmum, Scribopium in lib. de Phisologia sagarum. Io. Baptistam B Columbium, in lib. de Morbis venenatis, præter alios. Apud Medicos quoque huius rei exempla legere potestis apud Aufonium Leniuenum lib. de Admirandis, cap. 8. Fernesium lib. 2. de Abditis rerum causis, c. 16. Cornelium Gemmam 2. de Diuinis naturæ characteris, & alios plurimos, ut propterea, cum ipsa sit clara, reliquum sit quætere modum, quò fascinatio hæc à maleficis in aliud corpus transferatur; nam si modus sit causa naturalis, naturalibus remedijs occurrendum, si sit supra naturam, frustra de hac re medici laborant.

Caput V. In quo agitur de causis fascinationum, & quomodo fiat.

Qui maleficos ac maleficas concedit mulieres, hic quoque maleficium negare non potest; cum autem varij sint maleficij effectus, ut secunditatem adimere, genitalia absumere, semen exsiccare, abortum parere, homines dementare, ac varios inficere morbos, varique symptomata, præcipue verò ventriculi anxietates, & extraneas vomitiones clauorum, actuum, funiculorum, capillorum, vitrorum, aliæque id genus; reliquum est, ut modum, & causam, seu vires, & per quas hæc fiunt, inquiram.

Quoad modum, & causam pertinet, nemo inficiabitur, maleficia aliquando oculis inferri, quandoque tactu, nonnumquam verbis, plerumque signis, ac figuris, vel careis, vel alterius materix, variò modo concinnatis, propulsis, transfixis aculeo, & clauis milio repletis, &c. Sed de facultate propter quam hæc fiunt, maxima est difficultas, dum quidam existimant in illis ipsis spiritibus visorij, in tactu manus, in prolatis verbis, in signis illis, & figuris vim quamdam inesse maleficij inferendi, quæ ut probabiliora euadant corporum celestium influxione, & viribus confirmata esse putant, & ideo superstitione admodum. In quare Alexander Trallianus excelluit, annulos componunt, atque corpora ex varijs metallis huius, vel illi planete dicatis, subceris quibusdam Zodiacis signis, quorum figuras in annulis, vel alijs figuris imprimunt, & ad-

ditis superstitionis verbis, vel litteris, putant se materiam componere, quæ insitam habet maleficij inferendi facultatem, quæ omnia signa sunt superstitionis plena, nullamque vim continentia, nisi quatenus malefico his fidem præstanti Diabolus vim inferat, ut hac ratione obsequium, & adlectionem ab his accepisse videatur, & ideo nemo quidquam per huiusmodi characteres, aut debent signa peragere, qui pacto aut tacito, aut Diabolo expresso cum Dæmone habito obedientiam illi non polliceatur; hinc factum est, ut illa verba, re. quæ proferunt, & litteræ quas scribunt nullas habeant significationes, vel si quid significant, & proferantur ab eo, qui Dæmoni non fuerit ad dictus, nihil agunt, ideo, falsissimum est affirmare, hominem, qui sanus fuerit, aut victus, aut tactu morbum alteri inferre, nisi causa accedat superioris, propter quam hoc fiat, morbus enim ex vno in alterum transit per contagium, quod fit, vel per tactum corporis solidi, vel vaporose substantiæ existente primum affectione in agentem, mox in patientem transeunte, sed malefici sani sunt, ergo maleficium non fit ex contagio, multo minus fieri potest, ut corporum celestium, quæ omnia à Deo in tutelam nostri corporis sunt ordinata, ipsaque debent hæc sublunaria regere, non autem cogi à sublunariis. At si corpora celestia ex signis, aut figuris factis cogentur ad inferendum maleficium sublunaria regerent celestia, quod à Philosophia

C & Theologia alienum est; itaque tandem fatendum est omnem vim maleficij à Dæmone proficisci, qui quidem ut morem gerat maleficis alimone. quando corpora lædit ingrediendo corpus illud, aliquando sine ingressu, & dum ingreditur aliquam suscipit auram; latetque potissimum in tur Dæspatijs innanibus humani corporis, ut propterea bolus suad motum illius auræ moto etiam Dæmone mescepiens, lancholicorum operationes innotescant, quando auræ hinc que prophetiæ, aliquando linguarum, aliquando alterius generis: si non ingrediat corpus tunc varia lædit hominem aliquando mutando operationes inq, linanima, quandoque mutando statum corporis, quarum nonnumquam tantum apparentiam exterio-sermones rem; aliquando plura. Animæ operationes mutat dum prauas, & extraneas infert imagi-Si nō innationes; & inter ceteras plerique sunt melan-greditur cholici, qui putant se esse vel Dæmones, vel à mutat a-Dæmonibus obsessos, quamquam nec sint, nime ope nec Dæmones habeant; Mutat statum corpora-rationes. ris tripliciter, aliquando terrorem inferendo: inferunt terrorem, aut per mediam facien Mutat statū cor mulieris, quæ turpis sit vetula, ac truces habeat poris tri oculos, hæc pueris, & natura timidis adeo ne-gotium faciunt, ut ex subito terrore aliquan-pliciter & do retractis spiritibus animalibus à cerebro vel terro ad cor, cerebri sinus, & anfractus, ne detur rem incu vacuum impuro aere replentur, hincque sequi-tudo, vel tur vel subita conuulsio, vel melancholia, vel insensibi-fatuitas; alijs refrigerato celebri calore sequi-biter, vel tur sopor quidam, & stupor, paralytis, aut tor-p succos por, barbarū.

por, insignis plerumque etiam omnium capil-
lorum, & pilorum defluuium. Hunc ipsum
terrorem infert aliquando Dæmon fingendo an-
te oculos imagines terrificas, aut gigantis, aut
Dæmonis, præcipue in tenebris, & pauidis ho-
minibus. Secundo mutat statum corporis insen-
sibiliter, inferendo intra corpus, acus, clauos,
pilos, vitra, &c. quæ deinde omnium admiratio-
ne euomuntur, & non fictitia, sed realia esse de-
prehenduntur. Tertius modus quo mutat cor-
pus est per liquores, aut succos plantarum, ac
mineralium, quæ omnia ipse nouit esse homi-
nibus insensa, ex quibus tamquam doctus ar-
tifex quintam, vt dicunt essentiam extrahit, &
dum corporibus infert, quæ deinceps maximo-
rum est causa malorum, mutat apparentiam
exteriolem, quia facit vt quispiam arbitretur
hunc, vel illum esse conuersum in bestiam,
cum nemo ex Philosophis, & plures etiam ex
Theologis concedat hanc transmutationem ho-
minum in formam bestiarum, vt est D. Augu-
stinus 18. de Ciuitate Dei, & Eusebius Cæsari-
ensis quarto de Preparatione Euangelica, & I-
sidorus 8. Etymologiarum, nemo tamen as-
serit mutari hominum formam substantialem.
Solut enim Deus hoc potest facere, vt ille red-
datur vel asinus, vel aliud brutum, & propte-
rea ludibrio habeatur, & verberibus cædatur,
immo & aliquando mutat, & apparentiam ex-
teriorem, & animæ operationem, vt quispiam
arbitretur se re vera, aut lupum, aut canem, aut
asinum factum. Quod in loco licet aliqua dice-
re de eo affectu, quem antiquiores Græci, Acti-
us 2. tetrab. 2. & 11. Paulus lib. 3. cap. 16. vo-
cant Lycanem, seu Lycanthropiam, Auicen-
na coturub, seu cotourub à similitudine cuius-
dam animalis in aquis degentis, quod perpetuo
quodam motu agitur. Hic affectus cogit
patientes noctu tantum ambulare, fugiunt e-
nim hominum consuetudinem, iacent inter se-
pulchra, cadauera extrahunt, & carnibus illis
vescuntur, dicuntque se iam in lupos esse con-
uersos, & anno 1541. rusticus quidam Patauij
dicitur fuisse, qui obuios impetebat, & deuora-
bat, tandem captus dicebat se lupum esse, vulgo
Patauij dicuntur, lupi rapaces, isti non contra-
hant lupi figuras, quamquam mores habeant
lupos, sed tamen ex prauo humore hæc nas-
cuntur, est autem humor duplex melancholia
naturalis, ob quam perpetuo mæsti, & timidi
sunt, & noctu tantum ambulant, & hu-
mor exustus propter quem in huma-
num genus sauiunt, siue cor-
pora sint defunctorum,
siue viuenti-
um.

*Lycan-
thropia.*

*Caput V. Traduntur cause corruptæ imaginationis
ex parte, hoc est ex intemperie spirituum
animalium.*

TRansco iam ad causas corruptæ imagina-
tionis ex parte spirituum animalium, qui
tenebrositate prætermittitur, de qua ultimo loco
dicam imaginationem corrumpunt, vel propter spirituum
intemperiem, vel propter motum, aut propter animi
confusionem, aut denique propter admissionem malium
alienæ substantiæ, de intemperie dubitatur, intempe-
numquid imaginationem corrumpat: nam ex riem esse
recentioribus, illi, qui subtilius rem hanc rimantur, antiquiores enim de hac re non agunt, & melancholici
inquit ex spirituum intemperie imaginatio-
nes melancholicas non fieri: ratio est, quia in-
temperies, autem, vel est calida, vel frigida, ex
calida fit furor, mania, ex frigida fit fatuitas, &
amentia, itaque nullo modo, ex intemperie spi-
rituum deprauatur imaginatio: sed decipiuntur:
nam si ex sententia Gal. omnis actio ani-
malis, præcipue autem princeps, inter quas an-
numeratur imaginatio, fit à spirituum anima-
lium intemperie, 3. de locis affectis 7. cur que-
so intemperato spiritu reddito non vitabitur im-
maginatio: idcirco Gal. 8. de vfu partium, cap.
13. non quantitati spirituum animalium, sed
qualitati, & temperamento tribuit vim, & Ex cali-
cultatem operationum animalium. Ceterum da intem-
id ipsum confirmant variæ melancholicorum i-
maginationes; quam enim putamus causam i-
maginationis melancholicæ cum risu, & iucunditate, in qua putant se esse Reges, præter ca-
fit melan-
luditatem spirituum animalium: neque valet cholica.
ratio: ex caliditate fit furor & furor enim, & ma-
nia fit ex intemperie calidissima cum fluxione
vaporis exusti, siue eleuetur ex bile, aut atrabi-
le exusta ex Galeno 3. de locis affectis 7. 6. A-
phor. 3. 3. & 2. de causis symptomatum 8. Me-
lancholica autem deliramenta, quæ cum risu, &
iucunditate fiunt, calidam quidem sequuntur
intemperiem, sed moderatam, & potius ex san-
guine quam ex bile, vel flaua, vel atra genitam.
Quod etiam pertinet ad intemperiem frigidam,
ex hac fiunt imaginationes melancholicorum, i-
moris ac mæstæ plenæ. Imaginantur isti se pro-
pediem morituros, vel carceribus se daturus, vel
quid tale, quæ omnia in solam spirituum ani-
malium frigidam intemperiem sunt referenda)
& propterea dicebat Aristoteles quarto de part.
animalium, capit. 11. & lib. de Respiratione, cap.
8. metuentibus cerebrum refrigerari, propterea
2. sectione Problem. proble. 3. scribit, timentibus,
sanguinem deferere ipsum cerebrum, at ubi
sanguis deserit cerebrum, necessario spiritus re-
frigerantur. Ad argumentum quidem quod ex fri-
gida intemperie fiat fatuitas, & amentia, fa-
reor intemperiem hanc, prout lædit discursum,
stoliditatem, & amentiam parere, sed quid probi-
bet, quo minus hæc intemperies frigida et imagi-
nationem

*Ex frigi-
da in-
tempe-
rie.*

nationem vitiet, imagines, vt dixi timoris, ac metoris continuo suggerendo, & ideo inuenientis non paucos melancholicos, stupidos, & bardos, insipientes, & fatuos: nam ex hac intemperie melancholica imaginatio coniungitur cum fatuitate, & amentia: accedit quod ex hac frigida intemperie opiniones Melancholicorum sunt magis prauales; dicebat etiam Gal. lib. artis medic. cap. 12. ex calida cerebri intemperie fieri opinionum mobilitatem, ex frigida constantiam: itaq; frigida, & calida spirituum intemperies imagines producit melancholicas.

De causa pp quam spiritus intemperatus red datur est pariter dubitatio, vt etiam de loco; de causa quidem nam negant quidam intemperiem cerebri sine materia posse spiritus intemperatos reddere, vt ex his fiat melancholia, dicunt enim ex intemperie frigida absque materia spiritus reddi pauciores, ex paucis ent spiritibus seque fatuitatem, non melancholiam, addunt hanc intemperie esse cum materia, ex qua spiritus tenebrosi reddunt, & propter tenebras melancholiam faciunt, non propter intemperiem: sed vtrumque est falsum, ex intemperie absq; materia paucos reddi spiritus nemo negabit: sed frigidam intemperie cerebri spiritus est frigidus non gignere ab omni ronne est alienum. Itaq; sicut ex paucitate fit fatuitas, ita ex frigiditate, & fatuitas, & delirium melancholicum, vt dixi, fieri pot: falsum est quoq; quod secundo loco dicitur, hos spūs nō propter intemperiem, sed pp tenebrositatem tantum melancholiam efficere quod scilicet ex frigiditate densentur, & tenebrosi fiant, cum sint densati, spūs animales, vt nostis, sunt corpora luminosa, & similia, corpus luminosum, & simile arc, vbi densatur, tantum abest, vt fiat tenebrosum, vt potius fiat magis lucidum, sicut enim rara ignis substantia minus lucida est, quam densa: ita etiā animalis spiritus, quo densior, eo magis luminosus; ppea falluatur, qui frigidam cerebri intemperiem dicūt spiritus densare, & ex densitate tenebrosos reddere. Decipiuntur tertio, qui putant solam siccam intemperiem posse ad melancholiam conferre, quod ratio doceat, & autoritas, nā cū proprius character melancholiam sit timor, & metor, dum moror immediata ad sit metoris, & timoris causa; adest quoq; melancholia; timor autē, & metor sequuntur spirituum animalium refrigerationem propterea qui sunt mori propinqui, aut qui lethali morbo laborant, omnium maxime timent spiritu refrigerato; vt propterea Auic. dixerit mortis timorem in egro esse signum malum. Itaq; nihil refert, siue hac refrigeratio sit cum intemperie humida, vel sicca. Propterea Galen. lib. artis medic. 35. inter signa frigidi, & humidi cordis, timorem reponit, & argumento sanē clarissimo timorem posse, & in spiritu animali consistere intemperie frigida, & humida affecto, neque enim potest timor melancholicorum absq; cerebri consensione fieri. Itaq; tales sunt spiritus animales, quales vitales, vitales sunt frigidi, & hu-

A midi, ergo & animales tales, hoc vtrum exemplo confirmari posse. Heraclitum enim (qui totam in lachrymis vitam degisse scribitur, & tanquā melancholicus ab omnibus profertur, non modo ex lachrymarum copia, sed hydrope, quo morbo interijt,) conijciendum est frigida, & humida spirituum animalium intemperie laborasse, & tamen melancholicum fuisse.

Caput VII. Soluuntur argumenta contra allatam sententiam, & iterum præsens opinio confirmatur; quod melancholia fiat ex intemperie spirituum.

V Erfabar in superiori capite in hoc argumento, vt probarem contra comunē ferē omnium sententiam melancholiam ex intemperie animalium spirituum fieri. Reieci contrarias quasdam opiniones, & argumentam aliqua supersunt refellenda, nonnulla ent, quibus præsens opinio, quid maximē ad curationem facit, confirmetur adferenda. Erasius itaque & alij cum eo prima primi disp. 13. pluribus vtitur argumentis ad hanc sententiam refellendam, quæ tandem hæc sunt; melancholiam ex intemperie non fieri ed, q̄ habet accessiones, & remissiones, momento temporis accedat, & recedat, intemperies autem non nisi longo temporis interuallo, aut generatur, aut corrigitur. Præterea, Melancholicorum imaginationes sunt propemodum infinitæ, at verò intemperies sunt tantum octo, neque ex his omnibus sit melancholia, idcirco intemperies non potest esse melancholiam causa. Accedit cum melancholia sit actio princeps vitiosa, actiones principes vitiantur lesa cerebri structura, conformatione ipsa; vt apparet in apoplexia, epilepsia, &c. ergo vitiantur ex mala compositione, non ex intemperie. Confirmatur, quia actiones principes non sunt naturales, sed voluntariæ, & operatio, quæ proximē sequitur temperiem non posunt esse voluntaria, neque enim voluntas potest temperiem ipsam tam vario modo mutare, vt modo vna, modo alia sit imaginatio. Itaque non ex intemperie, sed ex alijs causis ait Erasius fieri melancholia: sunt verò aliæ causæ in eodem spiritu animali, mutatio coloris lucidi in opacum, & subiectæ materiæ subtilis, & tenuis in densam, & crassam; præterea spiritus sua natura nobilis, si præter naturam quiescat, poterit esse vitiosæ operationis causa: confirmat hoc Erasius, quia Gal. primo methodi 6. primam videndi causam non tribuit humoris cristallini temperaturæ, sed colori, & propterea primo de vsu partium, capit. nono: idem docet actiones quasdam non fieri primo ex temperamentis, sed ex consequentibus temperamentum, vt est visio in oculo, quæ fit propter colorem, itaque sic temperamentum spiritus non est mediata causa melancholiam, sed mutatio in luciditate, &c. hæc sententia non mihi videtur admittenda, neq; argumenta hæc concludunt.

Ad primam rōnem: melancholia accedit, & recedit, dico id verum esse de melancholia
De Melancholia. B per

per consensum, at melancholia per essentiam perpetua est. Ad secundum, intemperies sunt paucæ, imaginationes infinitæ: dico non omnem melancholiam fieri ex intemperie, neque omnes imaginationes in intemperiem referri, sed remotum tantum, & maiorem, & ea, quæ ad timorem, & maiorem reducuntur, hæc duo sequuntur melancholiz characterem, intemperiem spirituum consequuntur, ut paulo post superius ostendam; multiplices aut imaginationes alias habent causas partim relatas, partim adhuc referendas. Ad tertium cum dicunt actiones principes malæ cerebri sequuntur conformationem, ergo non spirituum intemperiem. Consequentia negatur, fieri enim potest, ut una, & eadem actio primo, & per se fiat à temperie, conformatio autem usus præbeat, & tamen actio lædatur, siue læsis spiritibus, siue læsis partibus usus præstantibus, siue læsa temperie partibus præcipue, ut in oculo apparet, cuius visio non tantum læditur ob crystallinum, quantum propter albuginem, corneam, pupillam, & reliquas partes, neque valet, quod dicit Erasius posse quidem lædi actiones principes, ex spirituum intemperie, sed non excusa immediata, immediata verò est vitium luminis. Hoc enim habet contra se Galenum, & rationem, qui 8. de usu partium. cap. 13. præcipuam actionum principum rationem in optimam temperaturam animalium spirituum esse referendam, non in conformationem; inquit enim asinos quoque eandem habere cerebri conformationem, quam habet homo, sed spirituum animalium optimam temperiem illam esse à qua actiones principes emanant. Præterea si ex intemperie non fieret immediata actionum principum læsio, ergo sequitur eos, qui sunt temperamento secundum animales spiritus frigido, & sicco, neque esse melancholicos, sed consequens est falsum, nam ubique Gal. & 2. de temperamentis 6. & de causis sympt. ult. & 3. de loc. affect. c. 7. melancholiam vocat affectum, seu intemperiem frigidam, & siccam. Consequentia probatur: nam ait Erasius ex intemperie fit melancholia quia mutatur luciditas spirituum, peto, quæ sit hæc mutatio, an fiant lucidiores, an opaci, si lucidiores, ergo, nunquam tales erunt melancholici, si opaci, probò, quod non sint opaci: ex intemperie frigida spiritus densantur, at spiritus sunt ex propria natura lucidi, & sunt corpora similitaria, corpus similitare lucidum quo densius, eo lucidius, accedit siccitas quæ omnem tollit alienæ substantiæ missionem, omnemque impuritatem, hinc seriptum est: lux sicca anima sapientior. ut propterea nullæ sint argumentationes Erasii. Denique cum inquit, esset actio naturalis, non voluntaria, in hoc argumento opus est distinctione: actiones principes dupliciter considerantur, vel quo ad facultatem, quæ est principium actionis, vel quo ad instrumentum, quo fit actio: respiciamus eam mouentem, hæc est voluntaria, hæc non sequitur temperiem, aut intem-

A periem est enim appetitus, qui mouetur ab obiecto vel interno, vel externo, & voluntarium est, cognita re sub ratione boni, vel mali, aut cognoscibilis, aut sensibilis prosequi, aut fugere, &c. plus, & minus agere pro arbitrio, sed si respiciamus instrumentum, quo fit operatio, quod est animalis spiritus, istud dum operatur, operatur per propriam temperiem; non inficior concurrere lumen, & substantiam, & motum, immo inferius ostendam, melancholicos fieri ex horum omnium mutatione, hoc sat sit, nunc probasse ex spirituum intemperie immediate fieri posse melancholias. Confirmatur in singula specie intemperatorum. Dantur melancholici, qui perpetuo rident, hos Auic. ut alias dixi vocat Illisi. De his Hipp. 6. Aphaph. § 3. dum ait desipientes cum risu securiores, hanc aliquam fieri ex calida spirituum intemperie ostendit ipse risus; nam risus fit calcfacto, & toto simul sanguine, & spiritu, propter conceptum obiectum detestabile, & iucundum. Sed isti melancholici, qui nullam habent eam, aut obiectum extrinsecum, à quo moveantur, necesse est, ut habeant intra se. Causa autem est, ut dixi calor, & motus spirituum, in hoc tantum differens à naturali quod in naturali excitatur hic motus, & calor ab obiecto extrinseco iucundo, in istis verò gerit vicem obiecti perpetua spirituum intemperies calida: neque obijcias hanc melancholiam fieri potius ex materia calida, quam ex spiritu calido; nam præterquam quod contradicit hoc naturæ ipsius risus, quæ sequitur temeriem spirituum calidam, accedit etiam, quod nunc loquimur de illa desipienti specie, in qua adparet letitia, & risus, id quod non contingit quando fit ex materia; materia prout aliquando ascendit in cerebrum, aut retrahitur à cerebro habet accessiones, & interualla: præterea isti de quibus loquimur vigiles sunt, oculos habent concauos, & ut scribit Auicena, frequenter in cælum aspiciunt, aut aliam quam propria imaginem, & quod maius est, curantur tristitia, quod est dicere, curantur illis, quæ possunt mutare spiritus temperiem calidam ad frigidam, ut motor inducatur: nam si esset humor, in hoc casu proponitur euacuatio. D ubi intemperies sola, alteratio, per ea, quæ contristant.

Melancholiam, frigidum & siccum esse affectum nemo inficiatur, fieri autem ex intemperie spirituum animalium frigida, & sicca, intemperiem vix vnus aut alter inuenitur, qui hoc concedat; spirituum hoc itaque nunc muniendum ratione, & auctoritate; ratione quidem sic, frigida spirituum intemperies est prorsus opposita calidæ, eæ eam & humidæ, sed ex calida, & humida fit hilaritas, ergo ex frigida, & sicca fiet motor melancholicus. Hinc Galen. tertio de locis affectis septimo, lib. inquit, melancholiam esse morbum partis similis, ad differentiam epilepsiz, fieri ex intemperie cerebri frigida, & sicca, ergo, & animalis spiritus erit frigidus, & siccus, sed huius

huius temperatura est causa proxima, & immediata actionum principum, ut docui ex Gal. 8. de usu partium 11. ergo vitium temperaturæ in spiritu erit causa melancholiæ; nam si cerebrum animalium spirituum est opifex, tales oportet esse spirituum temperiem, qualis est temperies cerebri. idcirco Auicenna in principio capitis de melancholia inquit fieri melancholiam non tantum ex tenebrositate, quantum ex frigida, & sicca intemperie, quæ est contraria naturali temperaturæ spirituum, sed videamus quid isti obijciant, & nobis respondeant.

Primo obijciunt vnum ex intemperie frigida: actio, inquit, non deprauatur, sed imminuitur, vel tollitur, melancholia autem est actio praua, ergo non fit à frigido, addunt secundo ex intemperie frigida, & sicca cerebri spiritus animalis imminuitur, ex imminutione fatuitas, non autem melancholia subsequitur. Ad Gal. & Auicennam, qui ut vidimus apertè dicunt melancholiam ex intemperie frigida, & sicca cerebri fieri, tripliciter redendent. Primo dicunt, per intemperiem frigidam, & siccam intelligi intemperiem in materia, non in substantia cerebri. Confirmant ex 7. de loc. aff. 7. quia epileptici fiunt melancholici, & ex consequenti melancholici, epileptici, non aliam ob causam, quam transmutata materia a ventriculis, ad porositates cerebri, vel à propositatibus in ventres, secunda responsio cerebrum frigidum, & siccum facit melancholiam non alterato spiritu, sed genito humore melancholico: tertia responsio ex cerebro frigido, & sicco inquit fieri melancholiam refrigerato primum corde, ad cuius refrigerationem sub sequitur spiritus vitalis tenebrositas, ex quo deinde fit spiritus animalis tenebrosus.

Frigida intemperies est cæpraua actionis. Ad quæ omnia respondendum Ad primum cum dicunt in frigido non deprauatur actio, falsa est suppositio, acida ciborum corruptio in ventriculo fit à frigido, & tamen est praua actio, id docuit Gal. 8. meth. 8. qui propterea scribit nullum ex corruptione acida in febrem incidere ephemeram, quod ex frigidityte fumositas non generetur. Ad rationem aut dicendum est, ex frigidityte quidem insigni nullam fieri prauam actionem, sed ex moderata duntaxat; propterea corruptio ad acidum non fit prorsus extincto calore, sed ex moderata refrigeratione, ut propterea Hip. 6. aph. aph. 6. in lienteria acidum ructum existimet esse bonum signum, eo quod, ut scribit Gal. in commento, indicum sit alicuius caloris. Ad secundam rationem, ex intemperie frigida, & sicca cerebri spiritus diminuunt, concedo, ergo non refrigerantur nego consequentiam. Cum addunt, sed ex defectum fit fatuitas, ad hoc dupliciter respondeo. Primo ex defectu quoque desipientiam fieri inquit Gal. 7. aph. aph. 9. comment. ex sanguinis profluuiio eodem modo fieri desipientiam, quo fiunt tremores in partibus musculosis ex defectu substantiæ spiritus. Secunda respon-

A sio est connecti posse hæc duo simul, fatuitatem, & melancholiam, sicuti magna ex parte connecta esse experientia obseruatum est: nam stolidi isti magna ex parte timidi, & mæsti sunt, ut ex defectu fatuitas, & intemperie melancholia fieri possit aliam quoque possumus subiungere solutionem; melancholici ex frigida, & sicca spirituum intemperie, illi sunt qui hoc tantum habent, ut perpetuò timeant, ac tristentur. at verò timor, & mæror potest dici diminuta actio non deprauata: nam timorem possumus dicere defectum animositatis, & sicut animositas sequitur temperamentum calidum, & siccum, ita timor, & mæror frigiditytem consequuntur. Quod verò dicunt isti Gal. sniam de intemperie frigida, & sicca semper vno ex trib. illis modis esse intelligendam, hoc non admitto, concedo quidem melancholiam, quæ fit post epilepsiam ex transmutatione materiæ ortum ducere, sed quod dicunt ideo cerebrum frigidum, & siccum melancholiam facere, vel quod primo alteret cor, vel quod gignat succum melancholicum, verumque respōdo esse falsum: primum quidem non modo est falsum, sed ridiculum cerebrum frigidum, & sic- *Falsū est quod frigida, & sicca cerebri intemperies generet melancholiam* cum, quod propriam spiritibus animalibus tribuit temperiem citius, & facilius cordis temperiem transmutare, quod longè distat, solidum est alienis qualitibus resistit, quam ipso spiritus in eodem cerebro existentes tenues, & ad illius partibus alterationem natos est ab oī ratione alienum: *res melā. cholicos, vel refrigerando* & profectò mihi verum Gal. ipse 8. de usu partium 2. hanc reiecit sententiam, quando disputans contra illos, qui dicebant cerebrum esse fatigatum, ut cor refrigeret, præter alia argumenta his cor.

duobus potissimum hanc sententiam impugnat, quod cor longè distat à cerebro, & quod ossibus durissimis partes istæ sint distinctæ, & disparatæ. Alia quoque suppositio facillè cadit, si causas, & effectus melancholiæ consideremus: nam Gal. ait. 3. de loc. aff. 7. fieri quandoque melancholiam ex curis, sollicitudinibus, inedia, quæ omnia alterant partis humores euacuant, corpus refrigerant, ut de inedia sigillatim docet 2. acutorum 22. & 24. Gal. & de mærore, 1. de tuenda valetud. 12. Hinc Sapiens. Spiritus tristis ex siccatur ossa, ex effectibus etiam temperaturæ frigiditytem, & siccitatem absque materia possumus cognoscere; quia dantur melancholici ex prædictis causis perpetuò vigiles, emaciati, consumpti, oculi caui, quæ omnia temperaturarum frigiditytem, & siccitatem ostendunt, & materiæ defectum, idcirco dantur melancholici, qui absque purgatione solis humectantibus, & calefacientibus tractantur.

Sed de intemperie frigida, & humida maior est difficultas, cum hoc tamen fortioribus argumentis, & rationibus confirmari possit: *Melancholia fit ex in- frigida temperie & humida*, sed character melancholiæ est timor, ergo: maior probatur ex Galen. in lib. 6. artis medic. cap. 38. inter signa cordis frigidi, da.

& humidi timorem reponente, & Aristotele, qui 2. de partibus animalium 4. ostendit animalia frigidiora, & humidiora esse timidiora, exemplo damarum, piscium, ex Hipp. in lib. de dietis, qui aquam ait superantem ignem in humido corpore esse fatuitatis causam, si adhuc magis superet, desipientiae, melancholice cum timore connexae, qui propterea lib. de aere populos ait, qui in regionibus frigidis versantur, aut victu humido vtuntur timidiores esse. Hinc Gal. 2. de temperamentis 6. obesos, molles, albidos omnium maximè esse timidos idcirco pueri, & mulieres, quo humidiores, eo timidiores. Accedit, quod scribit Gal. lib. de Melancholia, qui tamen liber est Possidonij, & Rufi balbos esse melancholicos obnoxios, quod etiam docet Auicenna, vocatque ipsos tremulos, at balbi cerebro frigido, & humido sunt donati, propter quam causam scribit Hip. balbos longo alui profluvio corripì, & Gal. in cō. aprè docet balbutiem fieri ex nimia humiditate.

Caput VII. adducuntur argumenta probantia melancholiam non fieri ex intemperie frigida, & humida spirituum, & solvantur, & probatur melancholiam etiam fieri ex motu spirituum.

Qui melancholiam ex frigida, & humida spirituum intemperie non fieri posse existimant, tribus potissimum argumentis nostram impugnant sententiam, primum sumitur ex Gal. lib. 3. de locis affectis, ubi scribit, ex intemperie frigida, & humida fieri defectam memoriam, fatuitatem, & stoliditatem, ergo non fit melancholia ex intemperie. 2. melancholia ab humore melancholico nomen desumpsit, at cum intemperie frigida, & humida nullam habet convenientiam humor melancholicus in passivis saltem qualitatibus, quia siccus. 3. idem non potest esse causa duorum prorsus inter se diversorum, sed antea diximus intemperie frigidam, & siccam esse causam timoris, & mæoris, ergo non frigida, & humida, quia unius effectus unica est causa immediata, & propterea si timoris causa est siccitas cum frigiditate non poterit esse humiditas, idcirco poterunt etiam nostris rationibus respondere cum dicebamus melancholiam fieri in cerebro frigido, & humido, dicunt isti fieri in tali cerebri temperatura cum corde calido, & sicco, in quo casu cor fumosam gignit qualitatem, cerebrum suscipit, sed nihil horum, nostram infringit sententiam. Ad primum, cum dicunt ex cerebro frigido, & humido, fit insipientia, defectus memorie, fateor, sed cum adducunt, ergo non melancholia, negatur consequentia, utrumque simul coniungi potest, & propterea facile videas quosdam timidos, ac perpetuè mæstos, albidos, molles, obesos, somnulosos, & stupidos, in quibus melancholia cum fatuitate connexa est. Ad secundam rationem dico melancholiam ab humore nomen sumpsisse, non quod semper ab humore melancholico fiat. Audistis hactenus plures melancholicas causas absque humore melancholico, audietis etiam infe-

Arius, sed quia magna ex parte hic affectus fiat ab humore melancholico, hinc est, ut ab eo denominationem sumpserit. Ad tertium idem affectus non potest fieri ex multiplici causa immediata, dico unum, & eundem affectum secundum rationem consideratum, non posse prodire nisi ab unica causa immediata, sed si diuersam habeant rationem, diuersas quoque habent causas, idatur itaque timor, & mætor duplex, vnus cum odio, auersatione hominum, inuidia, indignatione, hic prouenit ex intemperie frigida, & sicca, alius coniungitur cum misericordia, fletu, & acidia, & sequitur intemperiem frigidam, & humidam. Hoc colligi potest ex Arist. 2. Oeconom. 2. quod etiā quotidiana confirmatur experientia. Quod verò obijciunt cum cerebro humido melancholiam fieri, quatenus fumosam qualitatem ex corde suscipit, aliquando veritatem continet, aliquando autem non, quandoquidem raro inuenies eos, qui cerebro frigido, & humido sunt donati naturaliter, cor calidum, & siccum obtinere, sunt ita partes propriè constitutæ, ut vna alterius temperamentum corrigere, & emendare possit. Sed hoc etiam concessio, posse cor calidum & siccum, perpetuè cum cerebro frigido reperiri, peto numquid hæc qualitas fumosa, quæ in cerebrum recipitur, alteret ipsum, an potius alteretur ab ipso, si cerebrum alterat, ergo siccum redit contra Auicennæ & Galeni hypothesein, balbos, similiter, seu cerebro humido donatos melancholicos esse. Quod si dicamus cerebri intemperiem fumosam substantiam transmutare, tunc non erit melancholia, non inficior quidem fumosam ex partibus infernis ascendentes in cerebrum frigidum, & humidum posse momentaneam inferre melancholiam, sed de hac non loquitur Auic. qui ut potestis apud illum legere profiteatur hanc melancholiam esse continuam, & essentialem itaque iure optimo constituendum hanc frigidam, & humidam intemperiem cerebri, ac cordis sanguinem gignere tenuem, ac spiritum frigidum, atque humidum, timori, ac mæori apulsum, ut superiora Hip. Arist. ac Gal. loca demonstrarunt, ut tandem ex dictis manifestum sit, ex spirituum intemperie melancholiam fieri posse. Postea Gal. toto illo integro lib. quod morres animi, &c. ostendit has animi perturbationes intemperie sequi, & intemperie illius substantie, quæ animæ instrumentum præcipuè esse docuit 3. de locis affect. 7. & 7. de placitis 8. de usu partium, &c.

DHis ita constitutis, reliquum est, ut probemus melancholiam fieri non tamē ex intemperie spirituum, quantum ex motu. Hic motus spirituum duplex est, Localis vnus, alterationis alter primus adhuc duplex est vnus Dilatationis, & Constrictionis, alter Confusus, & omni ordine carens, tertius contra naturæ leges. Quod ad primū pertinet, quantum possit caloris, & spiritus dilatio, & contractio in affectibus, & perturbationibus animi, docuit abundè Gal. 2. de causis sympt. & 12. meth. ubi docet in nimia spirituum, & caloris dilatazione, profusam

Melancholiam fieri ex motu spirituum.

Ex dilata-
tione
spirituum
cantus
gallorum,
volatus,
opinio
vacuita-
tis.

fusam fieri lætitiā, atque talem, cui aliquando moris succedat, contra verò in timore, & mœrore constrictiōem fieri. Caterum nos in præsentia melancholicorum, ex dilatatione spirituum, aut contractione differentias non tantum, sed & alia quædam, quæ medici ante nos putarunt in explicabilia, attingemus; sunt quidam qui putant se esse corpora inania, aut aues, putant se volare, aut cantus gallorum imitantur, brachia pandunt, quasi alas, ut euolent, hæc omnia nos in nimiam spirituum dilatationem referimus: sicut enim moderata dilatatio lætitiā parit, adhuc maior risum efficit perpetuum, ut de Xenophano quodam scribitur, qui perpetuo ridebat: si adhuc magis augeatur facit lætitiā cum risu gestientem, in qua homines currunt, saltant, quasi volaturi. Itaque ubi hæc dilatatio modum excedat, ut partes cerebri interiores quasi deserantur, ex terioresque sensus, & motus instrumenta spiritu, & caliditate repleantur, tunc imminuitur facultas æstimationis, & augetur hæc motiva, & sentiens, ut isti putent se esse aues, aut corpora leuia, & volare, neque imaginationem possunt corrigere, non colligente se spiritu ad interiores partes, sed in exteriores diffuso. Hoc est quod docuit aliquando Arist. decimo Ethicorum 5. ubi scribit profusam lætitiā mali causam esse, neque dimittere ut sensus amplius seipsum colligat, in quo casu hæc praua operatio subsequitur.

Ex cōstri-
ctione spi-
rituum o-
pinio cor-
poris te-
stacea, fa-
sticiosa
& i-
mobilitas.

Quod si nimium constringantur spiritus, præter timorem, & mœrorem accedunt aliæ prauæ imaginationes, aliquando patientes putant se esse corpora artificialia, saxea, testacea, immobilia, id posse spiritus retractionem facere, potestis colligere ex Arist. 3. Ethicorum, 8. quod desumpsit ex Herodoto exemplo Amasis Aegyptiorum Regis, qui captus à Cambise, cum videret filium ad necem ductum, immobilis mansit, cum videret seruum plorauit; ratio est quia ex intenso dolore adeo densatur, & constringitur spiritus, ut minimè ad misericordiam, vel ad fletum hominem mouere possit, ubi autem minor est doloris causa, & contractionis spirituum; quasi solutis habenis spiritus mouentur, & miserationis, ac fletus causa esse possunt.

Caput VIII. explicantur species melancholiae ex confusione, motu præter naturam, & alteratione spirituum pendentes.

Alter spirituum animalium motus, ex quo melancholiae species variae fiunt, est confusio quædam, & agitatio, per confusionem intelligo, inordinatum illum motum, dum alij superiora, quidam inferiora, alij anteriores partes, alij posteriores petunt inordinato quodam motu, & confusio est aut insignis, aut moderata;

Ex nimia quando insignis fuerit rerum omnium sensibilibium, & intelligibilium imagines delet, nam si confusione cut in aqua vehementer agitata nulla apparet imaginum imago, ita in spiritibus valde confusis, & agitata abolitio,

Aut delentur imagines; hinc fit, ut quidam melancholici euadant certis quibusdam locis, & temporibus, siue enim in foro, siue apud Principes, vel alias personas de rebus propriis, quarum habent peritiā sint acturi, vel verba facturi ab opere, vel verbo prorsus cadunt, & mæsti, timidi, & quasi attoniti manent. Sic scribit Aræteus cap. de melancholia artificem quendam in propriis ædibus apud omnia concinnasse, extra ædes artis omnem peritiā amisisse, & cum iterum domum rediret, semper iterum artem recuperasse, fit hoc potissimum ex verecundia insigni fit etiam ex flatibus vel vaporibus vel in cerebro, vel in infernis partibus genitis, ex verecundia quidem, nam cum verecundia moueantur species contrariis motibus ad intra propter timorem, & ad extra propter spem, si diu perseueret hic affectus, diu perseuerat hæc affectuum lucta, fit confusus motus, qui ut dictum est, omnes rerum imagines mente conceptas delet. Hanc eandem ob causam factum est, ut doctissimi viri, & discretissimi apud Principes locuturi, statim ab oratione ceciderint. Quod Theophrasto contigit, dum apud Athenienses orationem esset habiturus, & Demostheni, dum apud Philippum Regem, Herodi Attico coram M. Ant. Heraclito Lycio coram Seuero Francisco Barbaro, coram Philippo Duce Mediolani &c. Quod si moderata sit confusio non delentur imagines, sed aut disiunctæ vniuntur, aut coniunctæ disiunguntur, & primo quidem modo, varij fiunt melancholici, qui si bi ipsis varia fingunt monstra, sphinges, centauros, hircoceruos, &c. ob eandem causam quosdā ego vidi melancholicos, qui animo concipiunt se quædam egisse, quæ numquam egerunt, meminisse vidisse Venetijs clariss. virum ex familia Superantia, qui putabat nullum scelestum facinus, aut peccatum se omisisse, cum tamen innocentissimus esset; fiunt hæc insensibilis simul variis speciebus in mente existentibus peccati similiter, & obiecti, cum quo potest committi peccatum, nam ubi hæc duo disiuncta simul vniuntur, deprauata hæc imaginatio subsequitur. Aperto id videor exemplo explicare posse ab Arist. accepto lib. de somnijs cap. 3. scribit Arist. somniantibus monstra plerumque apparere coniunctis simul speciebus in vigilia separatim receptis; addit phreneticos lineas, quæ in muris sunt, vario modo in mente propria formare, atque ceritò arbitrati illa esse animalia, aut plantas &c. quia scilicet species receptæ in spiritibus agitatæ intrinsecus coniunguntur, ipsi verò putant exteriores illas lineas copulatas esse. Itaque quod somniantibus, & phreneticis per somnum, & acutum contingit morbum, melancholicis contingit longo temporis spatio, propter internam causam quæ spiritus ipso agit, & confundit, est verò vtdicebam hæc interna causa, aut in cerebro, aut extra cerebrum; in cerebro quidem spiritus vaporosus, aut statuosus ad confusionem faciendā aptus ex inequali intemperie produciunt, est aut

Ex pro-
prijs ar-
tis obli-
uio.

Ex mo-
derata
spirituum
confusio
ne imagi-
nes disiū-
ctæ vniū-
tur, vniū-
disiūgu-
tur sic fi-
unt mon-
stra, &
homines
putant se
fecisse ea
quæ nū-
quam se-
cerunt.

inæqualis intemperies calida quidem in substantiam cerebri, frigida, & humida, aut frigida, & sicca in humore pituitoso, vel melancholico ipsimet substantiæ imbibito; dum itaq; calor agit in hanc materiam, status eleuatur qui spiritus confundit aut illos vniendo, aut disgregando, quod ipsum contingit siue status iste à ventriculo, siue à iecore, intestinis, meseraicis, liene, vtero, & toto corpore ascendat. Cæterum sicuti quando vniuntur imagines, delirant patientes, qui putant se fecisse id, quod nunquam fecerunt: ita vbi nimium disgregantur imagines, putant melancholici se nihil egisse, aut agere eorum, quæ quotidie agunt, aut egerunt. Vidi ego Venetijs clarissimam & pulcherrimam mulierem viduam, quæ hac melancholiæ specie vexabatur, vt crederet sediũ non posse viuere, quod neque ederet, neque biberet, neque dormiret, neque deieceret, & tamen ab ancillis doctus eram illam optimè cõedere, totam noctem dormire, aliquandò etiam interdium, nam de alui excrementis ipse sui ocularis testis, qui plurima illius excrementa quotidie videbam.

Agitatio spirituum est quid diuersum à confusione, nam agitationis nomine intelligo quasi titubationem, vel trepidationem quandam sicuti in aqua videmus post vehementem agitationem, quæ aliquandò motu hoc trepidationis aliquo temporis interuallo mouetur. In hac a-

Ex agita gitatione imagines multo maiores representatione spirituum, quam sint, vt exemplo aquæ manifestum fit: itaque ex huiusmodi imaginis amplificatione ita imagine fit, vt patientes quædam maiora esse animo ginantur concipiant, quam re verà sint, sic referunt quædam imaginatum esse nasum sibi vsque adeo esse quàm magnum existare, vt omnem credulitatem superet, fuit & alius, qui putauit vniuersam corporis molem aded inereuisse, vt per portam exire non posset, hæc vt censeo in aliam referti causam non possunt, quàm in has imagines amplificatas, & propterea sola imaginatione mutata sanantur isti, vt videbimus suo loco.

Naturalis motus spirituum.

Tertius motus spirituum animalium est motus præter naturam; vt intelligatur, qui nam sit motus præter naturam spirituum, primum intelligere oportet, quinam sit naturalis, naturalis autem motus sit per circulum quendam à rete mirabili ad priores cerebri ventriculos, à prioribus ad medios, à medijs ad postremos, & cerebellum, ab his in totam cerebri substantiam priorem, posteriorem, & mediam, quàm spiritu esse repletam, docuit Gal. 8. de usu partium 13. dum inaque sit hic motus spirituum ordinatus, & naturalis, cuncta rectè procedunt, vna species aliam non confundit, sed si contingat, vt spiritus aliquam ob causam, vel ab ipso cerebro, vel à postremis ventriculis ad priores partes repellantur, & circulus fiat opposito modo illi, quem iam proposuimus, ex huiusmodi motu quandoque fit fatuitas, vel infania, siue furor, quandoque

A melancholia, proit patientes, vel illi temperamento, hoc, vel illo humore donati fuerint, etenim propositiones isti, & conclusiones opposito prorsus faciunt modo, quam prudentes, & sapientes; ideo neque copulant congrua prædicata cum subiectis, aut ex falsa præmissa conclusionem inferunt, aut ex vera præmissa falsam conclusionem faciunt, vt denique omnia sint opposita naturalibus, & consuetis cogitationibus mentis, hinc vulgus apud nos dicere consuevit (gli hà dato volta il ceruello) causæ autem propter quas fit hic motus naturali contrarius, aut sunt impedimenta circa cerebrum, & ventriculos existentia, aut sunt ingentes animi affectus, impedimenta sunt insignes cerebri obstructions, & rumores, ex quibus causis spiritus quasi repelluntur, ne possint per totam cerebri substantiam transire hinc repulsi retrocedunt. Atque ideo post phrenitides, & lethargos, fatuitas, & melancholia solent succedere, non tantum deustis humoribus, quantum obstructo cerebro, & liberum spiritibus motum prohibente: idem fit ex ingenti animi affectu præsertim timore, reuocatis enim spiritibus à cerebro ad ipsum cor, cerebrum densatur, & ne detur vacuum, humore, & vapore excrementitio impletur, qui deinde locum consuetum spiritibus prohibet.

C Alter motus spirituum ex quo frequenter sunt imaginationes deprauatæ, est alteratio à specie facta; hæc autem species, quæ spiritum alterat, vel est humoris, in corpore prædominantis, vel est morbi, quando confirmatus, atque magnus est morbus patienti ignotus, qui propterea cum imprimat & continuò, & vehementer sui speciem in spiritum, impellit patientem ignotum ad quædam extranea animo concipienda, quæ cum illo morbo aliquam habent similitudinem: sic qui frequentes habent in ventre rugitus, putant se habere ranas, vt proximè superiori anno Germanus quidam auditor noster; alii, qui morsus in ventre sentiunt ex vermicibus, dicunt se habere serpentes, vt de quadam muliere scribit Alexander Trallianus, alii, qui laborant tympanitide dicunt se totos esse ex corio, & quasi tympanum essent, ventrem sibi pulsant, vt refert Marcellus Donatus secundo historiarum mirabilium, cap. primo. Quidam si cruris, aut brachij stupore, torpore, aut paralyti laborent, certò asserunt se sine brachio esse, aut crure, sic ille, quem Philolimus curauit ex Gal. lib. de Melancholia, composita galea plumbeæ super caput, quod existimaret se sine capite esse, id concipiebat ex multis vaporibus calidis, & tenuibus ascendentibus in caput: Plura id genus proferri possent, sed pro exemplo hæc satis sint, fit quoque alteratio à specie humoris in corpore prædominantis, quæ quidem pro sui varietate varias in spiritu fingit imagines, & quamquam tota medicorum schola, vt alias dixi ad vnicum

Ex alteratione spirituum à specie morbi facta opin. ranarum serpentis, tympanitis, &c.

Ex latetione spirituum ex speciebus

tene-

moris pec- tenebricolum spiritum, atque ideo ad solam cō-
cantis di- fugiat melancholiam: ego tamen luce clarius
uersi ge- ostendam & ex sanguine, & semine, & pituita
neris. melancholica fieri deliramenta.

Melan- Primum quidem quod ad sanguinem spe-
choliā ctat, nemo in dubium vertit sanguineos esse me-
fieri ex lancholicos: sic Gal. 3. de loc. aff. 7. rubros ad me-
sanguine lancholiam propensos esse scribit, atque ideo ex
 suppressa quacumque sanguinis consueta excre-
 tione siue per hæmorrhoides, siue per nares, aut
 uterum melancholia succedit. Hinc Hipp. lib.
 de morbis Virginum: Virgines ait, quibus mē-
 ses debito tempore non fluxerint fatuas, & me-
 lancholicas fieri. Confirmatur ex quibusdam
 melancholiz differentiis, quæ in alium humo-
 rem referri non possunt, quales sunt illæ, in qui-
 bus patientes putant se Reges, Cardinales, &c.
 delirant cum risu, atque ideo Auicenna propo-
 nit differentiam melancholiz sanguineam, quam
 inquit non fieri ex vitione sanguinis, potuisset
 enim, quis dicere melancholiam ex sanguine, qua
 tenuis exustus, transire in melancholiam. Auic-
 cenna distinguit hanc differentiam, & ait hanc
 fieri ex sanguine per concoctionem, non per v-
 sitionem: quasi dicat, in istis redditur quidem
 sanguis calidior, non tamen exurit, ideo cu-
 ratur hæc species etiam sola sanguinis missione
 ad animi defectum. Sic scriptum est in lib. de
 Melancholia Gal. adscripto: convenire aliquan-
 sectionem venæ ad animi deliquium, quod non
 decet facere, nisi in sanguinea melancholia, &
 propterea natura ipsa aliquando & mulieres, &
 viros menstrua, & hæmorrhoidali purgatione à
 melancholia liberauit. Sed video posse obijci,
 causam melancholiz, quæ cum risu, & iucun-
 ditate fit, superius nos in solam spirituum calidā
 intemperiem retulisse, nunc autem in sanguinem,
 quibus respondeo utrumque verum esse, intem-
 peries sine materia delirium facit melancholi-
 cum continuum, & sibi æquale, quod verò fiat
 ex sanguine, intermittens est & inæquale, itaque
 melancholia fit etiam ex sanguine, sed ebullen-
 te, & calidiore reddito.

Melan- Fit quoque ex semine, & sanè quantum pos-
cholia ex sit semen præter naturam, aut consuetudinem
semine. retentum, ad inducendam melancholiam do-
 cet Gal. alijque plurimi, atque experientia, &
 observatione confirmatum est. Gal. n. 6. de lo-
 cis affect. 1. apertè docet, ex retento semine
 in his, qui deliriosè, & otiosè viuunt, si ad Ve-
 nerem fuerint assueti, timorem, & mororem
 non quidem cum causa, sed citra omnem causa
 in melancholicotum modum contingere posse,
 hac ratione frequentes sunt in muliebus, vte-
 rinæ affectiones, non tantum ex sanguine, quā-
 tum ex ipso semine, immò hoc ipso argumen-
 to Gal. lib. citato confirmabat hæc omnia re-
 tento semine potissimum fieri, quod viduis
 potissimum vterinæ istæ affectiones superue-
 nient illis autem, quibus retinentur mentes, ne-
 quaquam, ideo illius viduæ historiam pro-

A fer, quæ post partium genitalium atrectionē
 factam, multo effuso semine, à symptomatis fuit
 liberata. Idcirco Christophorus à Vega 3. de
 arte mendendi 14. scribit se mulierem vidisse
 melancholicam ex vasis seminariis. In cuius
 confirmationem Vesalius lib. 5. Humanæ fabri-
 cæ c. 15. scribit se in duabus puellis à præfocatio-
 nevterina extinctis, omnium malorum causā in
 uenisse, semen in vasis seminariis corruptum, &
 Hollerius quoque ad cap. 59. lib. 1. de morbis in-
 ternis oēm causā deliramenti, vel cum risu, vel
 cum clamore, & auium voce emulantur enim
 mulieres istæ aliquandò gallorum voces aliquandò
 aliorum animalium: hæc omnia inquam in vte-
 rum præcipuè copioso semine plenum referre cō-
 suevit. Idem confirmant quædam mulierū ima-
 ginationes, scribit Marcel. Donatus 2. hist. mira-
 bilium 1. mulierem fuisse, qui Venerem se esse
 prædicabat, propriam pulchritudinem ostenta-
 bat, cunctis publicā faciebat, hanc inquit facile
 curari potuisse eo modo, quo scribit Alexander
 Benedictus curatam fuisse aliam, quæ hoc modo
 cum per multas Italiæ vrbes incederet, tandem
 in meritoriam incidens officinam, à mulis com-
 pressa integrè sanitati est restituta.

B Sed & expituita ad caput euaporationem fa-
 ciente melancholiam fieri partim quidem con-
 stat ex supradictis de frigida & humida in tem-
 perie, partim etiam constabit ex dicendis. Nam
 si pituita, sicuti & intemperies frigida, & humi-
 da meticulosos reddit homines, & metus proprius
 est melancholiz character, quis inficiabitur pitui-
 ta redundantes non pariter timidos, consequen-
 ter melancholicos esse, id docet Gal. 2. de tempe-
 peramentis 6: pituitosos omnes esse timidos, &
 3. in 6. epid. 30. ubi scribit Hipp. de sanguine i-
 coroide, quod in pallidis malus, docet Gal. in Cō-
 mento pallorem ex pituitæ sero oboriri, & ut di-
 stet hæc melancholiz species ab ea, quæ fit ab
 intemperie frigida, & humida spirituum absque
 materia, idem obseruandum, quod antea dixi ex
 frigida, & humida intemperie absque materia,
 nihil habere aliud melancholicos, quàm timo-
 rem, & mororem continuum, sine alijs priuatis
 imaginationibus: sed ubi spiritus animalis re-
 pletur, & affunditur pituitoso vapore in alia quæ-
 dam deliramenta sanè extranea, deueniunt,
 Quidam putant se constare ex glacie, aut ex
 niue, aut habere clunes vitreas, ut nolint sede-
 re, alij confectos se ex butyro ex Marc. Dona-
 to, alij verentur mictionem, putant enim tan-
 tam esse in proprijs corporibus serosam hu-
 miditatem, ut totum mundum submergant,
 sunt ex abundantia pituitosi seri, sicut & alia
 huiusmodi, & propterea iure dictum est tot es-
 se melancholiz species, quot sunt somniorum
 differentiæ at somnia sunt varia ex humorum
 varietate & qui somnia faciunt niuis, pluuiæ,
 glaciei, auctore Arist. iib. de somno, & vigilia,
 & Gal. lib. de dignotione ex Insomnijs, hæc
 patiuntur ob pituitam: itaque, & deliramen-

Melan-
cholia ex
pituita
Gal. 2. in
6. epi. 37
& Auic
in tracta-
tu pro-
prio vi-
de locum

ta melancholicorum, quando niuis, aut plu-
uiz, aut glaciei fuerint, in pituitam sunt refe-
renda.

Caput IX. Alia ratione probatur melancholiam fieri ex pituita, ostenditur fieri ex tenebrositate spirituum. Soluuntur argumenta Auerois contra hanc sententiam, & ostenditur quomodo spiritus tenebrosus fiat.

Nihil est, quod magis confirmet fieri melancholiam ex pituitosis humoribus quam affectus Hypochondriacus. Quamquam enim huiusmodi affectus, ut plurimum sensum habeat caloris circa ventriculi regionem admodum ingentem, & molestum, ut refert Gal. 3. de locis affectis 7. & confirmatur experientia; aliquando tamen nec raro huiusmodi flatuosae melancholiae sine ullo caloris sensu reperiuntur, neque aliud redolent praeter pituitam, humoresque frigidos, hinc facile videas plerosque hypochondriacos vomitus habere pituitosos, acidos, perpetuo ex puerse, siti nunquam tentari, flatibus abundare, ex pituitoso vomitu subleuari, somnolentos, torpidos, & pigros esse, omnia sane pituitosi succi argumenta. Idcirco recte Auic. hanc melancholiam scribit fieri ex superfluitate ciborum, quasi dicat ex crudo, & inconcocto chylo mesceraicas obstruente, hinc etiam istorum vrinae perpetuo crudae, & alui excrementa mucosa, ut tandem omnia ostendant vnius pituitae redundantiam, idcirco Rufus & Possidonius in lib. de melancholia Gal. adscripto hos curare consueverunt attenuantibus fortissimis oxymelite scyllitico, & alijs calidis ut infra, quae aliquam in humore melancholico perniciem afferunt: neque quispiam putet uellum esse modum. quo pituita melancholiam inferre possit in hypochondriaco affectu, modum enim docuit Gal. & primo de causis symp. & 5. de locis affectis 6. cum ait ex ore ventriculi fieri melancholias: neque quis obijciat tunc fieri melancholias ex ore ventriculi, cum humor melancholicus hanc partem obsideat, non autem cum pituitosus, vel alius, quando quidem docet experientia, & auctoritas, ex quocumque humore os ventriculi infestante vitium fieri melancholicum: quis non videt in Cardialgia, & affectione Cardiaca ore ventriculi tunc temporis à calida intemperie, & humoribus calidis vexato, maximum induci timorem, ac maestitiam, desperationemque animi multo maiorem, quam in ceteris omnibus melancholiarum differentiis: sedet in anxietate, quam cum Hipp. 7. aph. aph. 55. ex frigidis humoribus fieri ostendimus, nonne certum est timorem, ac maestitiam adesse, propterea frequentem illam iactationem ex animi perturbatione simul cum corporis affectu procedere. Hinc scribit Gal. 3. aph. 24. ex vitiosis humoribus os ventriculi infestantibus somnia fieri terrificae, & pa-

A uores. Quod etiam scribit Hipp. 4. aph. aph. 67 aliquando in febribus fieri per somnum, atque esse prauium futuri exitus signum. Ex quibus iam satis constare puto melancholiam in humorem etiam pituitosum aliquando referendam esse.

Transeo ad spiritus tenebrositatem, in qua parte nobis primum cum Aueroe certandum est qui 3. collect. 40. improbat Gal. sententiam, dicentis melancholiam ex tenebris ortum ducere. Ibfringit Aueroes hanc sententiam tribus argumentis. Primum est: color non est substantia facultatum, sed temperies, ergo non potest esse causa actionis praua, sed erit intemperies. II. Anima nihil videt, ergo neque tenebras videbit, ergo à tenebris non potest deterresci. III. Si per nigrum colorem fieret melancholia, ergo per album fieret laetitia, at laetitia fit ex sanguine, ergo sanguis esset albus, haec omnes rationes claudicant. Ad primum cum dicit color non est substantia facultatum, sed temperies concedo, ergo non potest actionem vitare, consequentia falsa est, docui enim supra vnam & eandem actionem fieri posse à temperie, & a consequentibus temperiem: sicuti visio fit à temperie crystallini, & à colore eiusdem, non valet ergo consequentia, spiritus agit per temperiem, ergo non agit per colorem, agit enim per utrumque immo verò & per conuenientem motum, & substantiae mediocritatem, ut antea docuimus. Ad

C 2. Anima non videt, quamquam oculis non videat, intuetur tamen internas species sub quibusdam coloribus vel relictis in sensoriis, vel extrinsecus genitis, sicut enim quispiam inspecto lumine, clausis etiam oculis coloratam retinet speciem, ac sic de singulis, & propterea in somnis frequentes fiunt visiones modo rei coloratae ad colorem nigrum, modo ad flavum, non nunquam ad rubrum, vel ad albidum pro varietate humoris dominantis: hanc eandem ob causam illis, quibus sanguis ex naribus fluxurus est splendores ante oculos apparent, phreneticis verò propter fumosa corpora nigra etiam imagines ante oculos obuersari videntur. Itaque cum inquit

D Aueroes in tenebris neminem timere nisi ob defectum rei sensatae, decipitur: hanc enim ob causam timent tantum pueri, aut indocti, ex melancholia etiam prudentes, & docti viri siue in tenebris, siue in lumine, siue praesenti obiecto sensato, aut non praesente, meticulosi sunt ob nigredinem, quam intrinsecus gerunt. Idcirco falsa etiam est consequentia ultimi argumenti: fit melancholia ex nigredine ergo laetitia ex albedine, valebit quidem consequentia, ergo laetitia ex splendido, & luminoso corpore, sanguis autem naturalis ac spirituosus, lucidus, ac splendidus est, fit itaque melancholia ex tenebroso spiritu: Quomodo autem fiat tenebrosus hic spiritus nunc dicendum est, & in re admodum difficili subtiliter disputandum. Video duos à scriptoribus proponi modos quibus niger fiat animalis spiritus vnus quidem

Spiritus tenebrositatem esse causam melancholiae.

Quomodo fiat tenebrosus spiritus ex aliorum

*sententia,
quæ refel-
litur.*

quidem in propria substantia, alter verò ex per-
mitione fuliginosa, & ingratæ substantiæ. Pri-
mus modus est, in quo spiritus animalis aut
propter causam effectiuam, aut propter mate-
riam substantiam contrahit tenebrosam, & ni-
gram, quod ad effectiuam pertinet, conueniunt
in hoc doctiores, ex illa spiritum tenebrosum
non fieri, inquit enim spiritum animale in
cerebro esse corpus simile, neque enim est
permixtus sanguini, itaque si calidius sit cere-
brum, hic spiritus, digeritur, aut pariter calidior
redditur, & est causa aut phrenitidis, aut fu-
roris, quod si frigidius sit cerebrum, inquit,
spiritus diminuitur, & propterea fatuitatem
inducit, quid de hac re sentiamus, hætenus
intellexistis. Nunc id nos quoque accipimus

*Spiritus
non fit
tenebri-
cosus ex
intempe-
rie sine
materia.*

animalem spiritum ex nulla cerebri intempe-
rie sine materia tenebrosam reddi, ex mate-
ria autem dicunt illum fieri tenebrosam, &
quia materia est duplex, aer similiter, & spiri-
tus vitalis, ex aere turbido dicunt fieri spiritus
tenebrosam, ex spiritu vitali similiter. Ante-
quam ulterius progrediamur, examinemus
hanc partem, ex aere turbido, ac nubiloso
spiritum fieri crassum, ac nubilum docet ra-
tio, & Gal. 1. in 1. Epid. 8. fieri autem tene-
brosam nulla aut ratio, aut autoritas docet, si
tenebrosam posset fieri spiritus ex aere, deberet
perfecto tenebrosam gigni tempore nocturno,
hanc ob causam omnes essent melancholici,
præcipue hoc tempore, quod tenebræ sunt
super terram longiores, quam lux ipsa, non
fit ergo ex aere tenebrosam spiritus tenebrosam,
& deinde affirmabimus ex nubiloso fieri tene-
brosam. iam dixi fieri crassum, impurum,
& turbidum, nigrum verò, & tenebrosam mi-
nime.

Multa nobis in præsentem hoc discursu pro-
ponuntur discutienda, ac refellenda, quæ Aui-
cennæ, atque alijs doctis Medicis sunt accepta,
quorum primum est, animale spiritum ex vi-
tali tenebrosam fieri; secundum, tenebrosam
in spiritu vitali ex intemperie cordis calida obo-
riri, tertium eandem tenebrosam fieri ex in-
temperie cordis frigida, quartum, reddi spiri-
tum vitalem tenebrosam aliquando ex sangui-
ne nigro, & melancholico, hæc omnia quam-
quam omnibus accepta, sunt reprobanda. Pri-
mum quidem, non valet consequentia, spiritus
vitalis est tenebrosam, ergo & animalis, quan-
do quidem etiam si vitalis sit animalis materia,
non est tamen materia, quæ in animale tran-
seat absque alteratione, & transmutatione, ut
propterea sicut non valet consequentia sanguis
est in her, ergo ossa, & nervi, & membranae, &
glandulae, quæ albae sunt, debent esse rubrae:
ita non valet consequentia, materia spiritus ani-
malis est nigra, ergo & idem spiritus, potest e-
nim dum elaboratur spiritus animalis in ple-
xurechroidæ in ventriculis cerebri mutari te-
nebrosam in luciditatem, sicuti videmus ex

A ligno nigro, aut carbone, aut elijchnio, qui sunt
ignis splendidi materia atra quidem, & nigra
fulgorem emicare, ut pari ratione animalis spi-
ritus igneus, & lucidus, dum in cerebro perfici-
tur, & conficitur, posset ex atra materia splendi-
dus euadere. Sed nunc probemus hanc materi-
am in propria substantia nullo modo tenebro-
sam esse. Dicunt isti, sit tenebrosam spiritus aut
ex intemperie calida, aut ex frigida, aut ex ma-
teria, proba quod non ex intemperie calida, in-
temperies cordis calida dum agit in spiritum vi-
talem ipsum calefacit, attenuat, rariorem reddit
& spiritus, quo subtilior, & rarior, eo magis di-
aphanus, diaphaneitas tenebrositati est contraria
si augeatur caliditas spiritum absorbet, hoc est
placitum illorum, qui ex calida cordis intempe-
rie spiritum vitalem tenebrosam fieri affirmant,
vel nimiam caliditatem posse spiritum consume-
re, aliud autem est spiritus consumptio, aliud te-
nebrositas, sed nec ex frigidity potest fieri hæc
tenebrositas, nam frigidum aut condensat, aut
extinguit, si condensat, spiritum efficit magis
lucidum, nam corpus lucidum & diaphanum,
quo magis densum, eo lucidus, si dicant ex-
tingui, tunc non erit tenebrositas in spiritu, sed
defectus, cum enim extinguitur calor, ideo ex-
tinguitur, quia deficit materia proxima caloris,
proxima autem materia est spiritus, ergo extin-
cto calore extinguitur & spiritus, hoc nisi sint
immemores, talia philosophantes concedere co-
guntur. Qui dicit ex intemperie frigida, & sic-
ca cerebri fatuitatem subsequi, eo quod ex hac
intemperie consumatur spiritus animalis, ergo
pari ratione dicam ego ex frigida, & sicca cordis
intemperie spiritum vitalem diminui, sed ad in-
frigendam hanc sententiam illud etiam addo,
in corde totius caloris fonte nunquam talem
posse inueniri frigidam, & siccam intemperiem
inmanente vita, quæ calorem innatum, & spiri-
tum, in quo potius est, extinguere valeat, quod
si dicant isti, deficit quidem spiritus siue à cali-
ditate, siue à frigidity, sed remanet sanguis
crassus, niger, ac sæculentus, dissoluta enim à
caliditate parte magis spirituosam, aut fulgorem à
nimio frigore exuncto, sanguis, qui remanet cras-
sus, & nigricans est, concedamus hæc omnia. Se-
quitur ne ex hoc, spiritum vitalem in propria es-
sentia tenebrosam fieri? nequaquam, probant
quidem sanguinem, qui est materia spiritus tene-
brosam fieri, non probat spiritum esse tenebro-
sum, si dicant, talis est spiritus, qualis est materia,
est alia ratio, hoc saltem habeo, quod ipsi putauerant
se probasse ex cordis intemperie neque calida,
neque frigida spiritum immediate absque alienæ
substantiæ mitione tenebrosam reddi, sed ut
antea monui, neque valet hæc consequentia, ma-
teria est melancholia, ac tenebrosa ergo spiritus
est tenebrosam, nam sicut ad generationem
spiritus animalis opus est alteratione, & trans-
mutatione in corde, in qua transmutatio-
ne, quod est nigrum, potest transire in lu-
cidum

cidum, sicuti antea diximus carbonem, & el-
lychnium, & alia id genus nigra dum flammam
recipiunt, splendorem recipere: at spiritus est
igneus, flammæ comparatur, & propterea ma-
teria nigra accensa, & ignita lucidam possit e-
dere flammam, non inficior, immo hoc est il-
lud, quod probare intendo, hanc flammam te-
nebricosam reddi ex fuliginosa substantiæ admi-
stione, hoc quidem concedo, sed lucidum spi-
ritum in propria substantia tenebrosus esse, a-
død absurdum esse existimo, perinde ac si dica-
mus ignem, ac lumen in propria substantia te-
nebrosus esse.

Spiritus itaque spiritum omnem siue animale, siue
fir tene- vitalem dicamus in propria substantia lucidum
brosus quidem esse tenebrosus verò euadere propter
propter tenebror substantiæ admistionem, hæc tenebro-
tenebro- sa substantia est tantum vapor, nam cum spiritus
fit sub stā sit corpus tenue, ac mobile, à minera vaporis
tie ad mi conspiciari, & fadari non potest, sed ab alio
stionem corpore mobili, qualis est vapor, aut fumus, qui
ex sentē- quidem necessariò tria habet considerata, ma-
tia antho teriam ex qua, efficientem causam, propterquam
ris. & locum, in quo. Quod ad materiam perti-
net, duplex constituitur, vna quidem propria, al-
ia impropria, propriam dicunt materiam melan-
cholicam, ac tenebrosam illam, quæ & colo-
rem, & substantiam & primas qualitates hêt me-
lancholiæ proprias, talis est melancholia natu-
ralis, fex sanguinis vocata, nigra, densa, frigida,
sicca, sanguinis subsidencia, à calore iecoris ge-
nita, vt docet Gal. 3. de causis sympt. 2. & 2.
de crisib. 12. &c. atque etiam ex ciborum substā-
tia, ac qualitate, nempe crassioris succi frigida,
& sicca, quales sunt lentes, brassica, salita om-
nia bubula caro, leporina, de quibus Gal. 3. de
loc. affect. 7. & in tribus libris de alimentorum
facultatibus, & de cibis boni, & mali succi.

Melan- Impropria melancholia illa est, quæ habet qui-
cholia na dem melancholiæ conditiones aliquas, non tamen
turalis. omnes; aut enim deficit causa efficiens, aut qua-
litas frigida illa, & sicca, aut insignis crassities,
& propterea hæc generatur, vel ex adustione, vel
ex refrigeratione ex adustione melancholiæ na-
turalis, & bilis, apertè colligitur ex multis Gal.
locis præcipuè 6. aph. aph. 3. de sanguine non
eadem ratio est, quidem similis, nam sanguis
transit in melancholiam propter ingentem
caliditatem, non quod exustus euadat cinis,
sed quia absumpta parte sanguinis tenuiore,
& calidiore, quod remanet crassum, & tene-
brosus est. Propterea hic sanguis est vt dicit

Pituita Gal. 2. de diff. febrium 9. in consinio adustio-
non posse nis, non est tamen verè adustus. De pituita
per adu- quidquid sentiat Auic. 1. 1. doc. 4. cap. de
stionem humoribus, &c. de melancholia pituitam s. exu-
trāfire in stione transire in melancholiam, hoc ego non
Melan- amplector, quandoquidem duobus tantum mo-
choliā. dis potest Auicenna hoc affirmare, Primo,
quod pituita ipsa omnes ammittat humiditates
primas, & sic ex siccata, & in cinerem versa

transcat in melancholiam, quod præterquam
quod vix animo concipi potest, in internis cor-
poris partibus tantam esse caliditatem, & siccita-
tem, quæ frigidam, & humidam substantiam
siccissimam reddat, Accedit, quod, vt apparet in
priuatis quibusdam abscessibus, & in tephace-
is articularum, tumoribus, pituita exsicca-
ta in gypseam conuersa, colorem non mutat,
sed semper alba remanet, vt propterea ex albo
humore, quamquam ex siccatō tenebrosus spi-
ritus eleuari non possit: sed video quid dicant,
caliditatem dum agit in siccum, dealbare; sic i-
gnis dum accendit oleum, fuliginem facit ni-
gram, dum agit in calcem, facit illam albam -
sed hæc fuga nihil concludit. Aliud est loqui,
de corporibus homogeneis, aliud de heteroge-
neis: corpus humidum simile quantumuis ex-
periat vim ignis, numquam fuliginem emit-
tit, videas aquam, & aquæ species igni appositæ
facient quidem fumum vaporosum, illum fuli-
ginosum nequaquam. Itaque fuligo omnis ni-
gra aut ex siccō corpore, aut ex humido cum sic-
citate misto eleuari solet, vt docuit Galen. 8.
Meth. 5. & Arist. 4. Meteorum 3. Itaque cum-
pituita omnis sit corpus frigidum, humidum,
terreo, & siccō minimè commistum, quam-
quam caliditatis facultatem experiat, eu-
aporabit quidem, fumosum verò corpus non e-
mitter, non ergo expituita per adustionem fiet
melancholia. Huius sententiæ est Manardus 9.
epist. 2. & Valsius 1. controuers. 21. Verum
contra hoc decretum ex pituita per adustionem
non fieri melancholiam, est Gal. authoritas, &
experimentum, nam Gal. 2. de differentiis fe-
brium, vltimo, 3. de præfagio ex pulibus, 7.
vult ex putrescentibus omnibus humoribus per
adustionem cineres quosdam relinqui, præci-
puè autem in crassioribus, quales sunt pituita,
& melancholia, at cineres frigidi sunt, & sic-
ci. Itaque ex putrescente pituita cinis, melan-
cholia gigni poterunt. Ideo Gal. 1. de diff. fe-
br. inquit tot esse cententorum in vniuersis diffe-
rentias, quot sunt humores putrescentes, at cen-
tentia vinarum in febribus sunt cineres humo-
rum exustorum. Itaque & pituita exusta in ci-
neres transit: idem confirmat & experientia;
nam pituitosæ febres, nonnumquam transeunt
in quartanas quod colligi potest etiam ex Gal.
1. ad Glauconem 5. & Hip. 3. Prognost. 27.
quorum vterque scribit, quartanas febres subse-
qui ad erraticas, & erraticæ, vt experientia do-
cet, sunt magna ex parte pituitosæ. His omni-
bus rationibus facillè respondere possumus, quæ-
sisse nos hætenus causas veræ; & propriæ me-
lancholiæ, quæ s. non modo frigida, & sicca,
sed nigra sit nam querimus causam nigredi-
nis in spiritu animali, at cineres propriè acce-
pti sicuti frigidi, ac sicci sunt: ita ex immensa
frigidityte, & siccitate albi euadunt, licet con-
cedamus pituitam in cineres conuersam pos-
se dici melancholiam, & ex ea fieri affectum

melancholicum; non erit tamen ex nigredine, confirmabitque nostram sententiam supra propositam, absque nigredine posse fieri melancholiam.

Caput X. Proponuntur alie differentie melancholiae spuriae, & ostenditur locus, ubi melancholia generetur. Et agitur de causis efficientibus melancholiam.

Sed cum iam incidit sermo de melancholia spuria, ceteras eius differentias prosequamur. sit melancholia spuria, quando color, non autem substantia mutatur: sic volunt Medicinæ scriptores omnes, sanguinem ob quamvis causam denigratum dici melancholicum, licet in alienam substantiam non mutetur. Auic. verò etiam pituitam à nimia frigiditate, ut ait ipse inspissatam vult naturam melancholiam subire, & ideo ponticum, siue austerum saporem suscipere: hoc patet ex 1. 1. cap. de humoribus. Quod pertinet ad sanguinem fateor illum iam denigratum euadere melancholicum, denigratur autem, ubi tenuior, & calidior eius pars euanescit, quæ euanescit, aut ubi nimium constringitur, aut ubi est extra venas, aut quando alia vehementi caliditate dissolvitur, ac dissipatur, vel quando calor, & spiritus consuetus ad ipsum non confluit; constringitur autem, ubi in aliquo loco arcto, & concluso continetur: sic enim in magnis inflammationibus sanguinem nigrescere, & partem ipsam gangrenam, & sphacelo affici videmus: sic quoque in Apoplexia, & in omni venarum interceptione, ac quacumque causa suffocante, siue collo laqueo constricto, vel ob aliam causam sanguinem, & corpus nigrescere videmus: idem fit ubi sanguis extraveneratur. Dicebat Hipp. 6. aph. aph. 10. sanguinem extra venas aut nigrescere, aut putrescere, aut in grumos verti: idem docuit 3. de crisi 2. qui propterea inquit sanguinem ex intestinis exeuntem 4. aph. aph. 25. nigriorem excerni, eo quod antequam excernatur, in intestinis extra venas fuerit collocatus, nigrescit quoque ob nimiam caliditatem partem tenuiorem absumentem: hanc ob causam scribit Gal. melancholiam fieri post phrenitidem, & alias cerebri calidas intemperies; ad quod respiciens Hipp. 2. Porther. 14. dicebat faciei colorem bonum cum multa mæstitia malum esse; ait Gal. mæstitiam cum colore bono faciei, esse indicium flammæ caliditatis sanguinem exurentis; sed per exustionem non est, quod intelligamus sanguinis, transmutationem per veram exustionem factam tunc enim fit atrabilis, ex qua furor, non melancholia succedit. Hoc igitur tantum vult Galen. ex immensa caliditate sanguinem denigrari, non autem in atrum humorem conuertere. Ad quod respiciens idem Hipp. 1. in 3. epid. emiorum 10, melancholicos vocat subsanguineos, si etiam nigredo in sanguine

Sanguis
eius niger
euadit.

A non confluente spiritu, & calore, non confluit autem vel propter refrigerationem externam, vel propter caliditatem, aut venenosam qualitatem internam, ex refrigeratione externa prohiberi spiritum, & sanguinis nigredinem subsequi, quotidiana docet experientia eorum, quibus extrema corporis, nasus, & aures, immo pedes ipsi refrigerati, & nigrefacti prorsus cadunt; idem fit per magnas viscerum inflammationes, venenosas qualitates, quæ spiritum introducat & calorem, externis refrigeratis, & nigrefactis. Hoc itaque sicuti libenter admittimus; Sic Auic. non subscribimus, qui, ut ante dixi, inspissatam pituitam vocat melancholiam, etenim si pituitam accipiamus homogeneam, hæc nunquam euadet pontica, ut scribit; rationem desumo ex illius dictis: inquit, fieri ponticam, quia à frigido absumuntur humidiores partes, relictis terrestribus, sed in pituita simili, quæ melancholiam admissionem num habeat, nil terrestris unquam inueniemus: nam omne terrestre frigidum est, & siccum, & ideo austerus sapor, quem ponticum appellat Auic. in frigido, & sicco reppointur, salsa pituita, quæ bilis non est expers facilius absumptis partibus humidioribus, ac calidioribus in hanc transibit, quam vera, & simplex pituita, quam inspissatam videas conuertere in vitream mucosam, non tamen melancholicam. Cum igitur hæc, & tot sint melancholiarum legitimæ, & improprie differentie, certum est ex melancholia, quam diximus esse sanguinis fecem nigram posse eleuari fumum, qui sit causa melancholiarum: idem fieri potest ex melancholia genita propter adustionem vel naturalis conditione, ut bilis, hac tamen seruata conditione, ut iam recesserit actio causæ efficientis: nam si perseveraret ipse calor exurens, fit furor, mania, & phrenitis, non autem melancholia, recedente autem causa vrente, potest humor refrigerescere, cinerulentus fieri propter melancholice materiam. Hinc Gal. cum Hipp. 3. Prognos. 28, & 3. aph. 39. docent quomodo in ætate consistenti, & autumnio vigeant potissimum melancholiarum, quod s. his ætatibus, ac temporibus humor antea genitus per exustionem ætatis iuuenilis, & ætatis retineatur, & melancholicas faciat affectiones; sic conciliatur Auic. qui in cap. de Melancholia scribit humorem exustum melancholiam parere, quod in capite de Mania negauerat. Quod verò spectat ad differentias melancholiarum improprias censeo quidem ex sanguine denigrato propter causam calidam spiritum absumentem frequentissimas fieri melancholias; sic Gal. 3. de locis affectis 7. scribit rubros ad melancholiam esse propensos. Hæc tota Arabum familia, & Latinorum, qui horum doctrinam sectantur, ut Nicolaus Florentinus, Gentilis, Matthæus de Gradibus, & alij, hanc causam, ut omnium præcipuam proponunt, quod quidem notandum est, quia facit ad curationem, etiam si in numerandis differentijs

*Locus,
ubi gene-
ratur me-
lancholia
triplex
est.*

ferentis humoris melancholici, quædam dicta sint de causis, obiter tamen dicta sunt. Nunc autem accuratius, & ex professo omnia sunt pertractanda, quæ ad locum generationis, & ad effectiuas causas pertinent; & quamvis locus generationis multiplex esse possit, triplex tamen à Gal. constituitur, quem cæteri omnes medici imitantur, cerebrum scilicet totum corpus, & Meleraicæ: Hinc 3. de locis affectis 7. triplex constituitur melancholia à loco desumpta; 1. essentialis in cerebro; secunda per consensum à toto, 3. per consensum ab hypochondrijs, nomine autem totius intelligo etiam iecoris partem gibbam, in qua sanguis perficitur, in vniuersum corpus distributus, ut cum talis sit sanguis in toto, qualis in gibba iecoris parte producit, melancholia per consensum à toto dicitur, etiam per consensum à iecore; nomine autem hypochondriorum amplector ventriculum, mesentericas omnes, partes concavas iecoris, mesenterium, intestina, omentum, & pancreas. In hac ipsa classe cum Auic. ut erum repono, quamquam vterus reponi possit sub melancholia à toto corpore prodeunte, posteaquam eundem recipit sanguinem, quem & totum corpus. Quo ad causas effectiuas duplices sunt, quædam ex nigro humore nigrum eleuant vaporem, aliz vero eundem nigrum humorem generant. vel gentium retinent in corpore, quæ vaporem eleuant sunt semper causæ calidæ, siue intemperies, siue errores externi, nempe vina generosa, cibi acres, & aromatici, motus animi, & corporis ingentes, balnea calida, &c. quæ verò humorem generant pro humoris diuersitate distinguendæ sunt, triplicem enim diximus esse humorem nigrum aut naturalem, aut ex exustione gentium, vel ex inspissatione. Naturalis humor melancholicus generatur vel ex intemperie, vel ex errore externo, ex intemperie, caliditatem aliquam præferente, non exurente, ut colligitur ex 3. de causis symptomatum 2. 2. de crisi 12. Error externus vel est in excrementis, vel in alimentis, in excrementis, quia idem ipse humor melancholicus alium gignit humorem sibi similem, & quia frigidus, & siccus est, alimentum sibi proximum in frigidum, & siccum conuertit, non dico intemperiem frigidam, & siccam partis solidæ, ad quam pertinet alteratio alimenti, frigidum, & siccum humorem producere, hoc enim falsum est, pars enim solida ad frigidum, & siccum conuersa pituitosum auget succum, quod alibi explicauimus hæcticæ ventriculi exemplo, dum de ipsius intemperie loqueremur. hæctica enim ventriculi intemperies est frigida, & sicca, quæ pituitam auget non melancholiam, idcirco dicebat Gal. 2. de temperamentis 6. frigidos, & siccos à nativitate pituitosos esse, non melancholicos, contra verò eos, qui acquisitionem habent intemperiem frigidam, & siccam, melancholicos esse, non pituitosos; quæ

*Causa
efficiens
melancholiam.*

A sententia sic tantum est intelligenda, frigidos, & siccos ex eo tantum esse melancholicos, quod propter abundantiam frigidi, & siccis excrementi in iecore propter calidam intemperiem geniti, ista corporis substantia euadat frigida, & sicca; quia huiusmodi error externus, siue obiectum improporcionatum, sanguis scilicet melancholicus frigidus, & siccus, plus potest quàm facultas alteratrix membrorum: Ita ut quemadmodum ex sola alimenti paruitate nullo existente in partibus corporis vitio, generantur vitiliginæ, cancri, elephantiasæ, aliæque cutaneæ affectiones, ut docuit Gal. 3. de causis sympt. 2. ita ex abundantia humoris melancholici naturalis, in iecore geniti totum corpus reddatur frigidus, & siccus, & quamuis progressu temporis partium quoque temperatura frigida, & sicca euadat, generabit tamen adhuc succum melancholicum, non autem pituitosum; nam intemperies frigida & sicca naturalis, aut acquisita, ex qua fit pituita, nihil aliud est, quam defectus calidi innati, propter defectum humidi substantifici, hæc verò intemperies in toto corpore inducta ab humore melancholico, non est defectus humidi & calidi, sed est superabundantia frigidi, & siccis excrementi. Itaque tandiu persistit corpus melancholicum in frigido, & sicco humore, quamdiu perseverat illius generatio in iecore, & isto corpore partim ex intemperie, partim ex errore externo. C Quod si calidum innatum tam refrigerat, & humidum dissoluatur, vel pituitosum euadet corpus, vel pituitosus simul & melancholicus generatur quoque hic humor ex alimentis, quæ frigida, & sicca sunt acerbæ, & austere, terrea, & crassioris substantiæ, ut sunt mespila, sorbæ, caro bubula, legumina omnia, tubera &c. enumerata à Gal. 3. de locis affectis 7. Humor autem melancholicus exustus, siue fiat exustione bilis, siue sanguinis, aut naturalis melancholiz, generatur pariter vel ex intemperie, vel ex errore externo; & intemperies quidem semper est calida, & ad differentiam humoris melancholici naturalis est calida, vltima; error autem externus, si fuerit in excrementis, est idem humor melancholicus per exustionem genitus, qui alium sibi similem producit; si in alimentis sunt omnia amara, acris, aromatica, & salsa, vno verbo calida. At si sermo sit de humore genito per inspissationem, qualis est sanguis, dum pars illius tenuior evanescit, hic dupliciter inspissatur, vel à caliditate partes tenuiores digerentæ, vel à frigido exprimente, siue hæc frigiditas accedat sanguine extra venas exunte, siue in venis existente, sed suffocato; aut etiam à causa externa, aut aere frigido, vel ab interna, ut opio, vel alia causa simili impense refrigerato: & hæc sunt, causæ generantes. Retinentes verò variæ sunt, & illæ quidem vel in iecore, aut in liene, vel in utero, & hæmorrhoidibus; reuocatur enim quandoque hic humor

mor, quia iecur non transmittit ad lienem, non tranſit in utrumque, vel quia habet imbecillem facultatem expultricem, vel quia impediunt sunt quædam ab obſtructionibus, & humoribus varijs, vel quia lien non poteſt attrahere, aut quia infirmam habet attracticem, aut quia tumidus eſt, & obſtructus, idcirco neque poteſt ſeipſum expurgare, cum neque ad ventriculum, neque ad inteſtina ſuccum mittat melancholicum, ſicut naturalis requiritur ordo. Retinetur quoque ſuppreſſis menſibus, & hæmorrhoidibus, & dum retinetur, vel in eodem loco, in quo retinetur, melancholiam facit, comunicatis ad caput vaporibus, vel ſaltem materia tota melancholica in venas, & totum corpus diſtributa, vel in caput ſuſcepta, aliquam faciet ex tribus melancholiarum differentijs antea propoſitis. Quod ſi quæras, quando Melancholia in determinatis locis ſubſiſtens, neque toti corpori, neque cerebro comunicata, affectum faciat melancholicum, dico id fieri per vapores, eleuari autem vapores à cauſa calida, ut quamquam humor fugidus ſit, & ſiccus cauſam habeat & generantem, & mouentem ſemper calidam, quoadque & ſiccam. De cauſis itaque melancholiarum iam ſaus diximus, neque eſt cur de differentijs ſigillatim loquamur, ea enim facile eſt colligere ex ſupradictis à forma, loco, & cauſis.

Caput XI. De ſignis Melancholiæ, & primum de Diagnosticis, hoc eſt de ſignis indicantibus ipſam melancholiam in genere.

Melancholia ſigna.

Confero me iam ad petraſtauda melancholiarum ſigna, quorum aliqua ipſum demonſtrant affectum in genere, in ſpecie, & gradu, quædam diſtinguunt locos, & cauſas: alia ſunt prognostica, vel futuræ melancholiarum, vel futuri euentus; & prima quidem parum ex ipſa melancholiarum definitione capiuntur, alia verò ſunt extra definitionem, quæ ex definitione capiuntur, ſunt praua imaginatio cum timore, & metore, in qua parte tria veniunt conſideranda. Primum, quis ſit hic timor, & metor. Secundò, quædò ex his ſignis melancholiarum gradus dignoſcantur; Tertio, quò ex iſdem habeantur variaz melancholiarum ſpecies. Quod igitur ad primum Hipp. 6. Aph. aph. 23. non omnem timorem, aut metorem melancholiarum ſignum conſtituiſſe viſus eſt, ſed illi, qui diu perdurauerit. Ceterum non valet conſequentia, timor, & metor diu perdurat; ergo id melancholicum eſt quandoquidem perſeuerante cauſa manifeſta longo temporis intervallo poteſt etiam perſeuerare triſtitia, aut timor ſine melancholia ombola, præterquam quod Gal. in com. aperte docet, melancholiam dici poſſe etiam ſi diu timor, & metor non perſeuerauerit, dummodò non fiat à cauſa manifeſta. Itaque videndum, quænam ſit hæc cauſa manifeſta; duplex eſt hæc cauſa, vel externa, vel

A interna, externa eſt obiectum, interna eſt morbus, aut cauſa morbiſica. Itaque ille dicitur timere, ac triſtari abſque cauſa manifeſta extrinſeca, qui ſibi proponit obiectum triſtabile, quod tale non eſt, vel ad illum non pertinet, neque illi noxam inferre poteſt, in eadem claſſe poſſumus reponere obiectum quidem triſtabile, & verendum, ſed quod tanto tempore antea præceſſit, ut non debeat amplius ſui ipſius veſtigia in animo relinquere, & hoc eſt quod voluit Hipp. quando dixit, timorem, & metorem diu perſeuerantem melancholicum eſſe, quia ad obiectum reſpexit triſtabile quidem, & verendum, ſed quod iam receſſit. Interna cauſa eſt affectus corporis, ſive morbus, ſive cauſa, ſive ſymptoma, quæ tunc cauſa manifeſta propter ſui magnitudinem, propter diuturnitatem, & malignitatem iure abiicit omnem ſpem ſalutis ipſi patienti, ſi talis mæret, & triſtatur, quamquam longo temporis tractu melancholicus non eſt: ac verò qui nihil tam egregium patiuntur, etiam ſi aliquam ſentiant labem perpetuam tamen timidi, triſtes, & quæſuli ſunt, iſti dicuntur abſque cauſa manifeſta in ſe metorem, & timorem continere. Hic itaque timor, & metor ſimul cum prauis imaginationibus tres declarat melancholiarum gradus, quorum primus dicitur incipiens, ſecundus augeſcens, tertius iam factus habitualis, & hæticus. Primus gradus ex omnium ſententia cognoscitur quando praua imaginatio cum timore, & metore eſt tantum in mente; ſecundus quandoque ſunt in mente, verbis quoque explicantur; tertius quando verbis, & menti, acta reſpondent, & melancholici id faciunt, quod animo concipiunt, & oratione exprimunt, magna ex parte hæc graduum diſtinctio veritatem continet, aliquando tamen falſa eſt: reperiuntur enim melancholici quidam confirmatiſſimi, qui proprias imagines prauas, neque verbo explicat, neque opere ſignificant, ſed alta mente recondunt, ſuntque viri natura prudentiſſimi, qui melancholiam iam factam diſſimulare voluerunt, tandem in Epilepſis, & acutas Phreniudes inciſiſſe, & tandem obiiſſe.

Melancholia tres gradus.

D Quod verò ad differentias, ſeu ſpecies, non omnes melancholiarum ſpecies, ut ab initio vidimus, habent hæc melancholiarum ſigna omnia ſimul iuncta, dantur enim aliquando prauæ imaginationes abſque timore, & metore, ut docui exemplo eorum qui putant ſe Reges eſſe; dantur etiam Melancholici meſti quidem, ſed abſque timore, ut amantes, & qui animo concipiunt ſe mortuos eſſe, aut regulas, vel vaſa teſtacea, nam qui in ſummo miſerie constitutos ſe eſſe putant, nil timent, timor enim futurum reſpicit maius malum, qui mortuos ſecredunt, vel corpora inanimata, nullum maius expectant malum. Dantur præterea alia melancholicorum ſigna, qui in definitione melancholiarum non continentur, ſi enim tota medicorum ſchola inter melancholicos reponit Vates, Poetas, eos, qui varijs loquuntur linguis, qui mor-

De Melancholia.

C men.

mento temporis varias discunt artes, & scientias, in his profecto neque prauam inuenio imaginationem, neque timorem, aut metorem; sed de Diagnosticiis satis, nam a capite eorum, quæ de signis causarum dicenda sunt, diagnostica specierum melius intelligi poterunt:

Caput XII. De signis ostendentibus partem affectam in melancholia, tam per essentiam, quam per consensum, & de signis distinctiuis causarum melancholice ex rabie, fascinatione, & Demone, & etiam aliarum differentiarum.

LOci autem ex quibus fit melancholia tres sunt præcipui, cerebrum, totum corpus, hypochondria; si cerebrum primaria affectione laboret, melancholia est continua, vehemens, pili capitis nigri, hispidi, quandoque crispi, oculi mobiles, venæ amplæ, somnia turbata, tinnitus aurium, lingua balbutiens, atque alia plura infra proponenda; si fiat ex toto corpore, totum est nigricans, hispidum, ex carne, sed amplis venis, tumidis, ac tensis donatum, calidum, pulsus celetes, ac frequentes, duri, urina rubra, excrementa, exusta, perpetuè iracundi, in appetentes hæmorrhoidibus, ac varicibus expositi, aut his deficientibus impetigini, psoarum, elephantiasi, cancris, phagadenis, alijsq; id genus morbis, qui si absque causa sanantur, melancholiam aut gignunt, aut augent. Quod si fuerint hypochondria, signa ex Diole proponuntur à Gal. 3. de locis affect. 7. Vomitus frequentes, nausea, rugitus, eructationes, inflationes, ardor, circa pilorum erosio, circa omentum, aut intestina, ab accepto cibo vomitus acida, adstrictio alui, dolor circa ventriculum, & hypochondria præcipue autem circa sinistrum; & quamquam multe sint partes in hypochondrijs à quibus potest fieri melancholia, tamen omnes ferè hæc ipsa habeat signa, quædam plura, quædam pauciora, quædam maiora, quædam minora, nã verbi gratia, si lien tumidus, & melancholia plenus sit, huius affectionis causa omnes ferè status, rugitus, & cetera accidentia in sinistra parte colliguntur, & hoc est frequentissimum, propterea appetentiam habent isti validam, & tamè omnium maximè tristes sunt, & si dormiant, somnos habent admodum leues, & turbatos, & somnia terrificæ, acidum euomunt succum propter melancholice copiam, quæ à liene ad ventriculi os transmittitur. Qui verò id patiuntur ex iecore, habent astuationem circa fundum ventriculi, perpetuum sentiunt ibi calorem, quasi inflammatione laborarent; euomunt biliosa, & biliosa deiciunt, sunt amarulenti, & inappetentes, vigilantes, siuibundi, omnium maximè iracundi, de his propriè loquitur Gal. ex Diole sententia 3. de loc. affect. 7. alij verò, qui ex ventriculo, & meseraicis hæc patiuntur morbi sunt, & timidi, sed stupidi, tardi, & segnes,

A somniculosi, ad omnia pigri, & inepti, solam pituitam euomunt, & deiciunt, neque siti, aut fame laborant, immo verò sponte sua ad assumendum cibum, & potum non mouentur; & si ad illum accipiendum cogantur, statim inflantur, extenduntur, stare non possunt, decumbunt, & ut plurimum decumbentes, nunquam antea quiescunt, quam cibum euomuerint assumptum. Isti tres loci ad hypochondria pertinentes, lien, iecur, & ventriculus, sunt diligenter distinguendi, quia triplicem requirunt curandi rationem.

Ex immediatis melancholice causis, pro quarum diuersitate varia instituitur curatio, quædam sunt Externæ, aliæ verò Internæ, Externæ quidem sunt morsus canis rabidi, potio venenata, philtum dicta, veneficium, & Dæmon. Melancholia ex morsu canis rabidi inducta facillè cognoscitur ex timore aquæ, formidant enim patientes usque aded aquam, ut malint mori, quam bibere, neque illam quidem inspicere audent. Melancholia ex philtro amatorio hoc habet peculiare, ut effugiatum amorem, quamquam etiam insuperabile odium concitet, maleficæ enim istæ mulieres, quæ huiusmodi potionibus vtuntur, in eum finem eas exhibent, ut erga se ipsas amorem concitent: erga alias odium, his quoque succedit ventriculi insignis perturbatio, nausea, vomitus, angor erosio vertigo, singultus, cordis palpitatio, quandoque furor, desperatio omnium rerum. Cum enim componantur hæc philtura ex menstruo sanguine, qui gramolus, & coagulatus alijs quoque veneficijs commisceatur, & hoc, & alia plura mala inferre possunt, ut quidam inuenit sint hæc potionis tabe confectæ, & post mortem in fundo ventriculi substantiam duram, qua si pilam quædam rotundam continent. Melancholia quoque ex maleficijs hoc habet peculiare, ut vomitus, & deiectiones hiant extraneæ, & ab omni ratione alienæ, deducuntur enim per vomitum atusæ rines, ferramenta, clauis, lingas, eaque ipsa per inferiorem aluum deiciuntur: ut propterea scribat Cornelius Gemma in Appendice operis Cosmographici, puellam quandam post detectos lapides, & ligna, membranas varias, & tandem anguillam deiecit sexpedalem, & profecto qui admittit elauos, quandoque externi maximos, ut inter Medicos fatetur Alexander Benedictus lib. 7. cap. 35. & Antonius Benuenus de Admirandis 8. & Langius 1. epist. 38 possunt etiam concedere anguillam aliquando fuisse eiectam, sunt enim hæc omnia præstigia, & fascinationes opera Demonum, factæ, qui nos illudunt, & speciem illius rei ante oculos ponunt, quæ in ventriculo stare non poterat. Denique signa Dæmonis sunt, ut quispiam sine præceptore artem aliquam, *Signa De* vel scientiam momento temporis doctus esse *moniaci.* se videatur, si linguis incognitis vocatur, non dico, si vnum, aut alterum verbum tantum proferat, etenim rudes etiam homines, sine

Signa causarum.

Rabiei signa.

Fascinationis signa.

sine Dæmone id facere possunt ex speciebus in memoria referuatis eorum, quæ aliquando audierunt, sed si quis etiam indoctus Latinam, aut Græcam linguam ex tempore loquatur, & de philosophicis rebus disserat, cum Dæmone vexatum iure optimo affirmabimus, præterquã quod isti frequentibus convulsionibus tentantur, epilepsia, vertigine quandoque præfocari videntur, guttur intumescit, fauces, & oculi rubei, atque prominentes fiunt, & momento temporis hæc recedunt, & in alias corporis partes transferuntur, quandoque nihil mali sentiunt, quandoque sunt in summo omnium malorum. Internas causas omnes redigo ad tria capita, ad operationes, & actus, ad instrumenta, & ad facultatem. Omnes enim melancholici ex causa interna, aut sunt tales propter animi operationes, & actus, vel propter instrumentũ, quod est spiritus, vel propter facultatem, quæ est temperies substantiæ solidæ cerebri. Multum interest distinguere has causas; nam qui melancholici sunt propter operationes, & actus animæ, non curantur medicamentis, sed potius deceptionibus quibusdam, & prudentia quadam medici, de qua suo loco dicemus. Vt ergo cognoscamus vitrum melancholici ex operationibus, & actibus animæ in hanc passionem inciderint, considerare oportet studia, cogitationes, mores, appetitionesque ipsorum patientum & tempore sanitatis, & tempore agitudinis: præterea ipsam delirii formam, & speciem, nam exempli gratia, si quis studiis deditus & sedulo illis incumbens deveniat eo, ut iam indiscretè de philosophicis disserat, nihil aliud loquatur, & domi, & foris, & cum doctis, & cum indoctis, hunc dicimus melancholicum non ex alia causa, quam ex frequenti actu, & operatione mentis, & quod dico de philosophiæ studiis, idem dici volo de alijs; pari modo si quis valde eruditus, & regendæ Reipublicæ dicatus, iam plus nimio in rebus publicis se ingerat, ultra modum sit sollicitus, multa cogitet, & faciat, quæ potius imprudentiam, quam prudentiam præferant, hic quoque ex intellectu practico nimium exercitato in hanc passionem incidit. Quod etiam dico de ijs, qui proprias regunt familias, & de alijs, qui proprijs instruendis moribus incumbunt, dum enim in his ultra modum student, tandem desipiunt. Eadem est ratio operationis animæ intellectiue appetentis, quæ voluntas dicitur, licet enim obiectũ huius facultatis sit optimum, amor scilicet celestium, & Dei Opt. Max. aliquando tamen in nonnullis ita excedit modum, ut & curæ familiaris, & filiorum, & propriæ vitæ conservandæ, & corporis cultum obliuiscantur, id quoque fit in actibus frequentibus ipsius voluntatis, pari ratione existimandi sunt incidisse in melancholiam illi, qui longam retinent memoriam alicuius obiecti præteriti, quod timorem, & maiorem induxerit, siue fuerit mors amicorum, aut parentum, siue pecuniæ amissio; dum

A enim in his diu versantur, ac singulis horis memoria repetunt, tandem ex hac causa in melancholiam morbosam incidunt, eodem modo possumus asserere quosdam fieri melancholicos, qui se Reges putant, Cardinales, & Antichristos, nam isti sunt homines leues, ineruditi, otiosi, qui dum illam dignitatem, mentem, & animo volunt, & contemplantur, tandem habitum quendam illius speciei in animo faciunt, ut tandem se tales esse putent, quales multo tempore se esse cogitarunt, qui & melancholici sunt nimium appetentes illa, quæ pertinent ad partem concupiscibilem, vel irascibilem, & ideo perditè amant honores, ambitiosè quærunr, de pecunijs comparandis valde solliciti sunt, de nulla alia re cogitant, & loquuntur, & proferunt eam interdiu, & noctu, huc illuc vagantur, hos quoque certò scire oportet non habere aliam suæ melancholiæ causam, quàm assiduas cogitationes ex estrani, & immoderato appetitu sensus, vel irascibili, vel concupiscibili. Itaque ut antea dixi, non erit difficile cognoscere melancholicorum causam esse in operationibus, & actibus partis intellectiue, aut appetentis, vel in operationibus animæ sentientis, vel memorantis, vel imaginantis, vel appetentis, si priuata deliria, & præcedentes hominum mores, studia, cogitationes, ingenia, & appetitiones fuerint cognitæ.

Caput XIII. De signis reliquarum specierum melancholiæ.

D Vm transeo ad signa melancholiæ ex parte instrumenti, & facultatis simul, ante omnia distinguendæ sunt intemperaturæ sine materia ab illis, quæ cum materia, & calidæ à frigidis, & humidæ à siccis. Ostendunt autem melancholiam ex intemperie spirituum, & cerebri absque materia defectus somni, insignis leuitas capitis, ut idcirco putent patientes se aliquando esse sine capite, aut caput vitreum, vel cauum habere; nullum est sputum, non mucus ex naribus, non lachrymæ, immò oculi ipsi siccæ, & concaui sunt, tempora collapsa, nates acutæ, curis densa, ac dura, præcessit aut inedia, aut sollicitudo insignis, curæ, mærores, timores, euacuationes effatu dignæ, & sic patientes in perpetuo versantur affectu melancholico, nullum habentes aut noctu, vel interdiu interuallum, ab euacuationibus leduntur & mitum in modum exacerbantur. Calida, & sicca intemperies sic cognoscitur, quia patientes isti delirant cum aliquo gaudio, & rebus quibusdam puerilibus, vel leuioribus delectantur, quidam continuo inspicunt picturas, quidam delectantur herbis, aut rebus virentibus, quidam ea sine musica, & cantu, alij lectione alicuius rei iucundæ, diuque in his persistunt, & si aliquando ab his distrahantur, statim in timorem, & maiorem

Signa melancholiæ ex intemperie spirituum sine materia.

Signa melancholiæ ex intemperie calida, & sicca sine materia.

incidunt, & ratio est, quia cum spiritus etiam si calidi, sint tamen pauci, dum illi pauci ad sensoria distribuuntur, quandam hilaritatis speciem effingunt, sed cum primum distrahuntur, quia iam deficiunt, mastrum, ac timidum relinquunt patientem. Ad differentiam verò eorum, qui delirant cum risu, propter sanguinis abundantiam, isti ut antea dixi, gaudio quidem afficiuntur, sed non profusa letitia, non gaudio aliquo gestiente, & risu, aut iactatione corporis, aut saltu, sicuti faciunt illi, qui ex sanguinis abundantia, hanc passionem incurrunt, potest quidem fieri, ut isti sint ex illis, qui arbitrantur se aues factos, & propterea voces animum emulantur & quandoque brachia extendunt quasi volaturi; potest inquam hoc fieri ex calidis spiritibus absque materia, dum enim se expandunt ad sensoria, & musculos, & deserunt ipsum cerebrum spirituum fontem, deficiente materia, tria hæc succedunt, ut muscoli ex abundantia spiritus, & defectu materiae leuissimi reddantur, contra verò deficiente spiritu circa cerebrum deficiat quoque facultas disquisitiva, ut faciliè possint isti arbitrari se aues, & alia corpora leuia euasisse. Intemperies aut frigida, & sicca absque materia cognoscitur pariter ex vigilijs, excrementorum defectu, facie extenuata, oculis cauis, sed ad differentiam priorum isti oculos habent immobiles, & siue terram respiciant, siue parietes, aut celum, adeo intentis oculis id faciunt, ut vix amoueri possint, nihil loquuntur, supercilium aut submissum, & si spiritus admodum cogantur, & constringantur, putant se iam euasisse, aut vasa testacea, siue fœtalia, aut tegulas, vel alia inanimata corpora, alij etiam putant se iam obijisse & sepultos esse. Quod si intemperies fuerit frigida, & humida, videntur isti habere aliquam in somno propensionem, perpetuò decumbunt, oculos habent clausos, neque tamen dormiunt, facies est plumbea, admodum pallida, suntque isti omnium maximè timidi, ut ex quouis minimo strepitu exterreantur, quasi maxima habuerint terroris causam hæc de intemperie simplici.

*Signa ex
intemperie
frigida,
& sicca
sine ma-
teria.*

*Signa ex
frigida,
& humi-
da intem-
perie sine
materia.*

*Signa
melancholice
ex motu
spirituum*

Possent prætermitti omnium signorum enarrationes, quæ pertinent ad spiritus vel valde confusos, vel moderatè confusos, vel agitados, vel speciem mali recipientes ex interna corporis affectione; nam ex supradictis omnia hæc patent; cognoscuntur enim spiritus valde confusi melancholiam facere, cum certis tantum quibusdam locis, ac temporibus, & coram quibusdam tantum personis hæc dementia accesserit: mediocriter perturbatio ex eo etiam cognoscitur, quod, ut antea dixi, isti chimæras fingant varias, ut animo concipiant se id fecisse, quod nunquam patrarunt, aut contra, constanter negent se id fecisse, aut facere, quod in omnium conspectu quotidie faciunt; pari ratione non est difficile cognoscere ytrum aliquis falsam concipiat imaginationem ex statu corporis morbofo, ut qui

A dicunt se habere ranas in ventre, quia habent flatum, vel habere serpentes, quia habent vermes, & sic de singulis. Hoc tamen nunc est dicendum. modum similiter esse sciendum distinguendi causam confusionis, & agitationis spirituum, vtrum sit vapor quidam frigidus, aut calidus, nam si sit flatum frigidus adest tinnitus aurium grauis, vertigo satis prolixa suffusio oculorum, grauitas capitis, abundantia sputi, facies pallida, rugitus in ventre, & alia cruditatis signa; quod si vapor sit calidus, adest sibilus quidam aurium acutus, si quæ est vertigo ea citò accedit, & recedit, facies ipso accessionis tempore rubra fit, venæ intumescunt, arteriæ pulsant, & totum corpus ad cladium inclinatur. Ceterum, si ex abundantia sanguinis, non aut ex vapore calido hæc fiant, delirium est cum risu, cum letitia gestiente, cum iactatione, & saltu, inconstantes sunt, inquieti, ad iram valde proni, dormiunt, sed somnia fere omnia sunt necis, aut sanguinis, memini matronam, cui à successione mensis succederat melancholia, quæ per septem menses continuos quotidie se videre dicebat exercitus duos simul pugnantes, ac necem plurimum intuebatur, cruoremque ex corporibus manantem; idcirco magna ex parte isti, aut superfluas habent hæmorrhoides, aut consuetum sanguinis effluuium ex naribus, aut si fuerint mulieres, defecerint menses, venosi sunt, rubicundi, urinas reddunt crassas, ac rubras, pulsus habent celeres, magnos, frequentes, oculorum venas valde tumidas, & tensas, nasi prurium sæpe sentiunt, & à causis caloricis læduntur. Quod si materia fuerit seminalis primum cognoscas ex vita casta, præterea totum ferè delirium est amatorium, & si fuerint mulieres, aliquando in affectum illum incidunt, qui dicitur furor vterinus quo ego vidi virginem quandam pro toto vitæ suæ tpe tentatam intercedente, inter vnā & aliam accessionem, plurimum annorum spatio, qui tandem in apoplexiam incidit, & per quosdam continuos dies absque motu, & sensu, absque omni cibo, & potu superuixit, & tandè obiit. Quod si materia sit pituitosa cognoscas, quia isti sunt quidem timidi ac mastrum, sed simul sunt etiam stupidi, & amentes, omnium rerum ignari somni culosi, nā ad doctrinam, eorum, qui intemperie humida laborant, absque materia dormiunt, & profundè, oculi lachrymantur, immo ad lachrymas sunt promptissimi, nares perpetuò sunt humidae, caput graue, facies humida, oculi inflati, mucosis excrementis repleti, vno verbo totum corpus ad frigiditatem, & pituitam ex superantiam tendit, siue inspicias urinas, siue alui excrementa, siue vomitum, aut etiam cutem, quæ mollis, alba & glabra apparebit. Melancholici ex tenebroso spiritu, faciliè cognoscuntur ab imaginationibus; quandoquidem præter mærorem, & timorem; omnium maximè solitudinem àmant, libenter in obscuris locis degunt, imagines habent mortis, & mortuorum, diaboli, infer-

*Signa
melancholice
ex spū
tenebro-
so.*

ni, omnium maximè timent carceres, vt propterea curauerim ego anno superiori presbyterum quendam, qui fugiens carceres, quas tamen non merebatur, tanto fuit timore percussus, vt saepe in itinere voluerit se submergere, dein de fenestra se proijcere, quorum neutrum cum successisset, tandem laqueo se suspendit, sed semiuivus inuentus, laqueo inciso superiuit, post à me curatus est. Sunt quidam ex istis, qui carceres amant, & fingunt se scelus patrassè, vt carceribus dari possint, hæc vero omnia inæqualiter affligunt pro varia quantitate fuliginis

Signa melancholice animalis spiritus inficientis. Cæterum si fuligo ex humore melancholico eleuetur, isti frigidum, & siccum habent temperamentum, ex-

melancholia naturalis. carnes sunt, exangues, pilosi sunt, & nigri, ad tactum frigidi pulsus habent paruos, raros, & surdos, & duos, soli degunt, taciturni, cogitabundi, supercilio demisso, vigiles, quieti tamen neque iracundi. Quod si melancholia hæc aliquando accendatur aliquantulum non tamen exuratur, sed quasi ignitus carbo igneo quodam fulgore splendeat patientem efficit melancholicum quidem sed egregium artificem, sique sapientie studiis sit deditus summum Philosophum reddit, quod si ulterius exuratur, cum portio illius adhuc sit frigida, & sicca, pars verò exusta facillè cognoscitur ex illa melancholice specie, quâ

Signa Lycaonis. Arabes cucubat, Græci Lycanem, vel Lycanthropiam dicunt, in qua patientes interdum aliquantulum quiescunt, moesti tamen, & taciti, oculis cauis, & siccatis, colore citrino, inappetentes, anxij, desperatione cotrepti, noctu huc, & illuc vagantur, petunt sepulchra mortuorum, aliquando in homines seuiunt, quos lacerant, & interimunt, dicuntque se esse in lupos conuersos, erura habent semper vlcibus plena vel quod à canibus morsum patiantur, vel quod incedentes, incautè allidunt erura ad saxa, vel quod propter exusti humoris copiam, qui etiam grauis est adinquantè continuò motu crustosa hæc vlcera indicantur. At si melancholia fiat ex vapore nigro ex sanguine eleuato, qui à causa calorifica inspissatus sit, quel exustionem aliquam patiatur, isti ad differentiam illorum, qui cum risu, & iucunditate delirant, quamquam sint succi pleni, venas habent latas, tensas, sunt rubicundi admodum, pilosi, sunt tamen timidi, & moesti, & in hac sanguinis abundantia, nil ioci, aut hilaritatis conuenit: præterea habent isti oculos nigros, prominentes, mobiles, coniunctiua venas inflatas, prompti sunt ad lachrymas, quandoque ad iram, parum dormiunt, nulla habent somnia, & ea quidem omnia conspicua, vt propterea nunquam credant se dormisse, labia sunt crassa, quasi inuersa, lingua est incontinens, nam magna ex parte balbi sunt, ad hæc proni sunt in Venereum, & ad differentiam hypochondriacorum, ab usu veneris non læduntur. Existant medicis scriptores hanc sanguinis inspissationem, quæ sit à causa calida facillè etiam co-

Signa melancholice a vapore eleuato ex sanguine inspissato.

A guosci ex causis prægressis, vel presentibus, vt si quis exempli gratia fuerit Phreneticus, aut actu sit delirans, inquirunt calorem phrenitidis, aut delirij tenuiores sanguinis partes absumere, & sic reliquam substantiam crassam, & faculentam reddi. Ego verò etiam absque his, vel presentibus, vel prægressis causis existimo vaporem nigrum ex sanguine, & ex semine etiam non inspissatis eleuari posse, vt tandem fiat melancholia: nam dantur temperamenta naturalia valde humida, & calida, quæ ad melancholiam omnium maximè sunt propensa. De his loquitur Auic. quando inquit eos, qui sunt cerebro humido, & corde calido, & propterea sunt balbi, siue naui ad melancholiam valde procliuves esse, quia fuligo non eleuatur necessario ex corpore nigro, sed ex pingui, & vinctuoso, vt propterea in corpore calido, & humido pleno sanguine, & semine pingui, si caliditas accedat siue naturalis, siue non naturalis ex cibo, potu, medicamentis, balneis, siue præter naturam potest ipsa fuligo eleuari, quæ spiritum animale inficiat. Cognosces autem humorem melancholicum ex vitio genitum melancholiam parere, quia consuevit hic affectus autumnino inuadere, & in ætate consistenti, eo, quod vt dicebat Galen. 3. Prognostic. 28. æstate, & in iuuentute humores exuruntur, tunc autem pars tenuior propter aeris caliditatem, & ætatem iuuenilem dissipatur, & insensibiliter digeritur, crassior manente substantia, quæ deinde melancholiam efficit, quod si huiusmodi humores augentur in corpore propter retentis consuetas excretiones id ex relatione scies, & sanè diligens sis in interrogandis ægris, numquid ante melancholiam paterentur aliquam sanguinis fluxionem ex naribus, hæmorrhoidibus, vtero, antipitus impetigines, vel antiquas scabies, vlcera phagadenica, vel caucros, vel varices, & an sublatis sint fonticuli antiqui. Hæc omnia quamquam melancholice causa fuerunt, non dissimili ratione diligens esse debes in explorandis visceribus, vt videas numquid, aut iecur, aut lien intumescant: nam si iecur sit tumidum, lien verò non sit affectus, indicium est humorem melancholicum in corpore augeri, quia à iecore non purgatur, vel propter obstructions, aut tumores, vel propter aliquam imbecillitatem, quæ intemperiem sequatur, quod si lien sit tumidus cognosces augeri humorem melancholicum vitio lienis non amplius attrahentis ad se hunc humorem, quod si ex corde calefacto huius humoris sit generatio, pulsus sunt admodum celeres, frequentes, & inæquales, nam patientes præter melancholiam palpitatione etiam continua vexantur, & simul cum timore, & maiore ad iram sunt valde procliuves.

B

C

D

Signa melancholice genitæ ex humore melancholico per aduersionem genito.

Caput XIV. De curatione, & primum de curatione diuinorum, & melancholicorum ex studijs, ex ambitione, ex amissione pecuniae, & ex amore.

AD curationem tam varij, & multiplicis affectus tandem me conuertens vniuersalem curandi methodum, ac materias medicas pariter in communi praetermittam, cum animo concipere non possim species melancholiae tam inter se diuersas, tam varias causas, ac locos affectos ad vnam curandi methodum dirigi posse. Itaque in speciebus duntaxat versabimur, & quia ex melancholiae speciebus quaedam curantur sola Medici industria, & arte quadam, seu diligentia absque medicis praesidijs, aliae vero naturalia requirunt auxilia ad curationem, in primis de illis erit sermo, quae medici industria, & iudicio sanantur, a quibus breuissimè me expediam. In hac classe sunt qui prophetiam, seu diuinationem profitentur, sunt quoque sapientiae studijs vsque adeo addicti, vt omnium consuetudinem fugiant, sunt & illi studiosi qui ultra modum de proprijs studijs disputant, & contendunt. In hac classe sunt & illi, qui ex forti, & continuata imaginatione putant se Reges euasisse, aut maximos Principes, nec minus absque naturalibus remedijs illi sanari possunt, qui cum ultra modum honores, dignitates, pecunias, aliaque id genus quærant, neque sibi ipsis hæc comparare valeant, tristantur, & semper sunt solliciti, in quo ordine repono etiam illos, qui mæsti sunt redditu propter amissas pecunias, aut alia fortunæ bona, quin immò etiam perditæ amantes ad hoc caput redigo, illòsque omnes, qui vitium aliquod in corpore, se habere animo concipiunt, cum tamen illud minimè habeant, qua ratione singulis prospiciendum sit, nunc statim subiungo, & primo quo ad diuina-

Quomodo sanentur diuinatores. natores pertinet, nisi melius eos curare potest, quàm negotijs, & exercitijs eos implicare, sunt enim isti, vt dixi otiosi homines (Sanctos enim relinquo prophetas) qui proprijs amissis negotijs, aliorum actiones speculantur, & è longinquo putant se, quod futurum est prævidere posse, si isti pro eorum vario statu cogantur fodere, remigare, vno verbo, corpus, & mentem in alijs exercere, à diuinatione statim

Quomodo sanentur melancholici. desistent. Quod pertinet ad sapientes melancholicos nihil aliud tentandum, quàm si fieri illi, potest, amouenda solitudo, seiungendi à continuatis studijs, tentandum omni arte, vt ambolici versentur cum amicis, exeant domo, ambolici sunt ex lent per loca amœna, ludant, vno verbo studiis intermittant: sed qui ultra satietatem de suis studijs disputant, non faciliè corrigi possunt, nisi ab audientibus spernantur, si quisquam illis porrigit aures, morbum fouebit, si spernat, si rideat, contumelijs afficiat, sic paulatim resipiscet ille, & ad mentem propriam

Quomodo sanentur illi, qui euasisse credant, si fieri possit primum ratio-

Anibus conuincendi sunt, disputandum cum illis, quales sunt Principum conditiones, & quales illæ quas ipsi habent, vt tandem videant se esse in errore, si id non sufficiat, isti quoque otiosi nunquam relinquendi, nihil magis nutrit has cogitationes, quàm otium, & vacatio à curis, implicentur igitur varijs negotijs, & præcipuè illis, quæ longè distant à natura illius, quem se esse putent. Si hæc non proficiat, aliqua ignominia afficiantur, & tandem etiam fustibus eadantur. Quod si ex ambitione aut amissis pecunijs quispiam euaserit melancholicus, difficillimam existimo horum curationem, quia naturalia remedia nihil proficient, artes autem Medici nihil iuuant, consulunt autem medici, vt pro his sanandis, ex improviso illa nuncientur, quæ grata esse possint, vt pecuniae, honores, &c. Sed cum hæc non inuenerint melancholici perseverabunt in suo affectu: poterunt quidem eo breui temporis spatio, quo res iucunda nunciatur, lætari, sed cum non videant pecunias, aut honoribus illis, & commoditatibus non fruuntur, nihil actum erit. Itaque etiam isti potius diuertendi à suis cogitationibus, & ea omnia peragenda, quæ pro curatione amantium subiungemus. Cum enim hæc passio sit aliquandò tanti momenti, vt homines ad tabem, & aliquandò ad mortem violentam ducat, medicis certè spernenda non est. De remedijs amoris multa scribunt medici, & quædam ex his habentur apud Marfilium Ficinum cap. ii. commentarii de amore, & sunt parum naturalia, partim verò ad industriam pertinentia, de naturalibus postea, quod autem ad industriam pertinet, ante omnia tentandum est, vt amantes locum fugiant, in quo versatur res amata, nihilq; in hac re efficacius est, sic enim Lucretius scribit.

Et fugitare decet simulacra, & pabula amoris, Abstineri sibi, atque alio conuersere mentem.

Dum dicit aliò conuersere mentem, intelligi potest, vt aliam amet, sic enim scribit Quidius.

Successore nouo vincitur omnis amor.

DNos autem satius arbitramur, vt mentem dirigat potius ad seria, ad studia, negotia, exercitia, castitatem profiteatur, nil enim his esse præstantius per symbolum quoddam significauit Horatius cum ait neque Mineruam, neque Dianam, neque Deam Vestam veneris vnquam implicari, nam Minerva studiis, & armis est dedicata, Diana exercitijs, & venationibus, Vesta castitatem proficitur. Si itaque amantes aliquam ex his partibus profitentur, nunquam eo infamiae deuenient, vt ex amore melancholici fiant, laudat quoque Ficinus, vt aliquando isti inebrientur, hoc fiet, vt ipse ait, vt sanguis ille, vetus digeratur, & in illius locum nouus substituatur, sed melior est ratio, quæ ex Quidio colligitur.

Vina parant animos Veneri, si plurima sumas, Et stupeant multo curda sepulta mero.

Nam

Nam qui inebriatur neque est aptus moueri, neque rei amata amplius recordatur, sed cum non conferant, ad naturalia confugiendum, sunt naturalia quæ sanguinis copiam minuant, & feruorem extinguant. Itaque secunda his vena in cubito, & pedibus, vt genitalia refrigerentur, præbenda intrinsecus, refrigerantia, cassia, serum, & coniungenda tenuis victus ratio, humidus tamen victus hic, & ad soporem inducendum aptus, nam amantes fere semper vigilanti, idcirco humectantibus balneis, ac soporiferis sunt tractandi in quibus incoxerit lactuca, nymphaea, viola, málua, hyosciamus, papauer, mandragora folia vitis, salici, & alia. Quod spectat ad illos, qui putant se aliquo graui morbo laborare, vel vitium habere quod non habent, vt qui putant se esse sine capite, aut pergrædem nasum habere, vt ranas in ventre, aut serpentes, his omnibus melius conducet deceptio, quàm remedia, propterea si putant se esse sine Capite, imponatur galea plumbea ponderosa, vt fecit Philotimus apud Galenum lib. de Melancholia ex Rufo, & Possidonio, si putant se habere ranas, aut serpentes præbeat medicus medicamentum, & in alui excrementis clam imponat illud animal, quod putat esse similius illi, quod asserit melancholicus se in ventre habere, neque etiam istis vnquam vis inferatur, vt scilicet ad tollendam imaginationem prauam cogantur aliquid agere, quod ipsi putent propter morbum non posse proficere, nam sic faciliè exstingui possent, & huius rei habemus exemplum Excellentissimi Fracantiani olim professoris primarij huius Gymnasi, qui incidit in melancholiam, quia putabat se habere corpus adeo vastum, vt per valuas transire non posset, & volens illum statim sanare, iubet seruis, vt illum accipiant, & portent per valuas, obediunt serui, inuitum patientem, & affirmantem se per eum locum transire non posse ducant quidem, sed vix transcurrentem, & defunctum.

Caput XV. De curatione melancholia ex morfu canis rabidi.

MOdò deuenientes ad curationem illorum, qui à cane rabido fuerint morfi, tria tempora dicimus esse obseruanda in illorum curatione, quæ curationem diuersam reddunt, primum tempus est statim post morsum, post morsum per aliquod tempus aliud, cum tamen adhuc non superuenit aquæ timor. Tertium est in quo iam aquæ timor superuenit, etiam si longè distet à morfu. In primo tempore quædam extrinsecus, quædam intrinsecus sunt agenda, & extrinsecus ipsi vulneri nuper inflicto attrahentia venenum sunt adhibenda, horum maxima est sylua, primum quidem conueniunt cucurbitulæ vel scarificatæ, vel non, suctus, si quispiam sugere voluerit, sed periculosus est, appositio podicis gallinæ, quidam summo cum fructu

A emplastrum imponunt ex cepta cocta admista cum allio, cum succo marrubij, & fermento, alij accipiunt theriacam succo allij commistam, neque præter rationem quidam adhibent vesicatoriū vel ex flammula, vel ex cantharidibus, laudo summopere vsum cauterij actualis pro vulnere magnitudine, fiant duæ vel tres vstiones, conuenit & lotio ex aqua salita, aut vino, in quo incotum fuerit marrubium, calamentum, scordium, dictamnus, aristolochia. Commendat Aetius tetrablibo 2. 24. vsum oxalidis, siue decocto vtamur ad abstergendum vlcus, siue intrinsecus succum præbeamus, & quia necessarium est vlcus apertum saltem per 40. dies continere, ideo si quis caustico etiam medicamento vtatur, vel arsenico sublimato, vel alio ruptorio nuncupato & post escharæ casum ad extrahendam virulentiam, accipiat præcipitati drach. j. butyri recentis drach. s. & vlcibus imponat, circumstantibus autem partibus ceratum adhibeat attractorium ex pice, gummi, ammoniaco, opopanaxo sinapi ex pipere confectum, nihil præter, mittat, quod ad externa auxilia pertinere, & magnum adiumentum præstare possit. Eodem tempore interiora auxilia, quæ venenum ad exteriora propellant, & cerebrum, ac contineantur, non sunt prætermittenda, proponuntur quædam communia, vt theriaca, quidam laudant etiam allium intrinsecus acceptum, ego non possum non summopere laudare antidotum à Gal. propositum 11. simplicium cap. de canceris. sit autem ex parte vna thuris, quinque partibus gentianæ, & decem partibus cancorum fluuiatiliū in suis testis crematorum, quæ omnia in puluerem redigantur, daturque drach. 1. vel ij. ex aqua ad dies 40. continuos, huic tantum confidit Gal. vt dixerit neminem eorum qui acceperit hanc medicinam, in aquæ timorem incidisse, laudat iecur canis rabidi assi, & pro cibo exhibitum, hoc ipso tempore nil aliud agendum puto nec circa venæ sectionem, neque circa purgationem, & propterea quæcunque de hac re disputantur à Cælio Aurel. 3. de acutis 26. si intelligantur de exercendis tempore morsus oīno sunt refutanda, quia & venæ sectio, purgatioque venenum introducit, contra quam agere oporteat in quocumque morfu venenato. Itaque si post dies 40. quis purgatione vti voluerit, & sanguinis missione pro varia corporis cacochymia, & plenitudine, non improbo, dummodo eo temporis spatio, quo virus euocare intendimus fortiora dimittantur omnia, & si alius non sit fluida, vel clysteribus tantum, vel cassia syr. ros. sol. & medicamentis benignioribus vtamur. Quod si iam post multos etiam menses aquæ timor inuasit, fuit Celsi, & aliorum quorundam antiquorum opinio nil esse præstantius, quam vt patientes etiam inuiti aquam bibant. Cælius Aurelianus ad illos decipiendos fingit pocula occulta, ne aquam videant, alios inscios patientes in aquam

mer-

mergunt, sed nugæ sunt omnes; nam non educendi sunt patientes, ut aquam bibant, neque etiam ut velint bibere; nam scribit Aurel. pro curatione hoc non esse præstandum, ut bibant, sed ut velint bibere, ego verò dico neque hoc sufficere, sed ita agendum ut velint, & possint bibere: Obijt Veronæ ante paucos menses Comes Beuilaqua morsus à cane rabido, & cum esset valde doctus, & in hac parte mente constaret, adstantes rogabat, ut aquam illi præberent, ipsi aquam infundebant per canaliculos quosdam, ut ab ipso videri non posset, & ipse libenter tubulos illos ori appropinquabat, nec tamen unquam potuit bibere. Itaque huius affectionis talis est natura, ut non tollat voluntatem, sed naturam impediat, quo minus possit aquam recipere, & ideo Petrus Salius Dinersus in suo de affectibus partium, & alij cum eo hanc immersionem patientum in aquam inuilem experti sunt, Plinius lib. 25. c. 2. in hoc casu tanquam remedium diuinitus reuelatum proponit cynorhodon radicem rosæ siluestris, hac ait militem quemdam in Hispania iam aquam timentem illico sanatum, dari potest in puluere ad drach. j. vel ij. Palmarius de ventis quamdam proponit compositionem, quam ait adeo celebrē, & experientia confirmatam, ut etiam sine multa externorum remediorum diligentia possit quisque sanari, & à rabie futura præseruari, C descriptæ est pag. 271. datur à drach. s. ad drach. ij. vel cum saccharo, vel cum butyro spatio octo dierum. Omitto remedia, quæ sacra nuncupari possunt, quandoquidem reperiuntur quædam loca Ditto Bellino sacra, ad quæ si accesserint mors curantur, & præseruantur omnes, talis locus est in agro Rhodigino in loco, qui dicitur vulgo la Frata.

Caput XVI. De curatione melancholice ex intemperie spirituum calida, & sicca.

EXternis causis succedunt internæ, & inter primas erunt spiritus intemperantiæ absque materia. Indicatio ab his desumpta inuentu est facilis: nam si spiritus sint iusto calidiores, & sicciores refrigerandi, & humectandi sunt. si frigidiores, & sicciores calefaciendi, & humectandi. Cæterum sicut auxilij inuentio facilis est, & conspicua: ita quispiam hoc loco etiam facile habitare poterit, liceat ne vlllo tempore, vel in aliqua melancholice specie statim ab initio ad alterantia se conferre communibus totius purgationibus non præmissis quibus primum respondeo id ex omnium consensione aliquando debere fieri, quando scilicet melancholia sit cerebro essentialis: Distinxit Gal. ut proprio loco audiuius melancholiam in tres species, aliam dixit esse in solo cerebro, aliam per consensum à toto, tertiam per consensum ab hypochondriis, si cr-

Quæritur vtrum in melancholia liceat ad

A godatur melancholia, in qua solum caput est affectum, ad quid purgabimus totum corpus humores etiam esse dispersos? tunc enim confunderetur essentialis cum ea, quæ est per consensum à toto, datur itaque ex omnium consensu, ut etiam nos ostendimus melancholia soli capiti adeo competens, ut reliquæ corporis partes ab omni humore melancholico sint immunes, idcirco si in hoc casu corpora purgentur, exsiccantur magis, ut in melancholicis nil siccitate deterius. Hinc Gal. ad hanc melancholice speciem respiciens præcipit, ut si secta vena sanguis ruber appareat, supprimatur, non enim non laborante toto corpore, sed tantum capite nedom inutilem, sed perniciosam esse sanguinis missionem. Hinc Auic. & ante illum Mesue, & vno verbo sola Arabum familia melancholicorum curationem primam, ac præcipuam dicunt esse impinguationem, & humectationem, & addunt tunc primum melancholicos fore sanos, cum impinguati, & humectati fuerint, non improbo quidem, ut ante vsu altèrandum vtamini lenientibus quibusdam ad ea expurganda excrementa aptis, quæ in omnibus corporibus varia pro varietate temperamenti augeri consueverunt. Sed hæc purgatio non immediate dirigitur ad superandam melancholiam, nos autem hoc in præsentia querimus, vtrum dentur melancholici, qui solis alterantibus curari possint, prætermisissis euacuationibus, quæ ad educendam melancholiam administrari solent, hæc igitur in essentiali melancholia inutilia, & periculosa essentiali melancholia inutilia, & periculosa esse censeo, quod si quis dicat, nonne in melancholia essentiali potest cerebrum esse hoc humore repletum, nonne ergo licebit uti purgantibus saltem ratione materię, quæ est in capite, proinde nemo ibi inficiat melancholiam cerebro essentialē aliquando ex intemperie cum materia fieri, idcirco hanc materiam esse euacuandam, sed quantum ego censeo duo sunt addenda, primò non semper intemperiem esse cum materia, ut nos suo loco contra Erasum, & alios abundè probauimus, alterum est hanc materiam non debere purgari sectione venarum communium, aut purgantibus validis per os exhibitis (mitiora enim nihil proficerent) nam valida purgantia antequam ducant humorem, qui in corpore continetur, propinquos euacuant humores, at verò hi sani, & viles sunt, itaque distantes ratione vacui attrahentur in venas, & sic vel humor bonus euacuabitur, & relinquetur in venis melancholicus, & si uterque duci debeat, opus est euacuationem esse adeo immoderatam, ut corpus colliquet, exsiccet, & ex consequenti ad deteriore melancholiam prouum reddat, quod si intemperies fuerit absque materia, nil perniciosius excogitari potest, etenim exsiccatur vsque adeo cerebrum, & imminuuntur spiritus ut melancholice fatuitas, & amentia succedat.

Quod

Quod autem detur melancholia ex intemperie cerebri absque materia probauimus suo loco, & nunc quoque ex iis, quæ de curatione dicuntur fufius probati potest. Conueniunt omnes Medicinæ Scriptores in melancholia siue ex cerebro, siue ex toro; sed nunc loquimur de cerebro, præmissis euacuationibus, medicum esse debere diligentissimum in alteranda cerebri intemperie, tunc quæro, aut post purgationes hæc intemperies est cum materia, aut sine materia, si dicant esse cum materia, ergo per suam hypothefim tamdiu debes in purgantibus insistere, quàm diu materiam educas, vt deinde alterantibus vti possis, quod si dicant, iam educta est materia, tunc arguo sic, sublata materia, remanet melancholia ex nuda cerebri intemperie, ergo potest aliquando dari melancholia ex intemperie sine materia, quod si hoc concedant, vt negare non possunt, fateri coguntur, sicut talis aliquando est post purgationem, ita talis aliquando esse potest, nulla facta purgatione, & ideo qui ex recentioribus aliter sentiunt, & maximo ægotantium periculo Arabum placita innouare, & in prauum sensum trahere voluerunt, ægotantes possunt in maxima discrimina deducere: nam sicuti Auic. apertè docuit dari melancholiam ex intemperie cerebri absque materia, ita quoque curationem subiunxit eiusdem intemperaturæ per sola alterantia, nulla præmissa euacuatione. Itaque cum res ita sit, vt dentur melancholici, quorum signa vidimus ex nuda intemperie vel calida, vel frigida cum siccitate, tractandi sunt isti semper humectantibus quandoque frigidis, quandoque calidis, idè si intemperies fuerit calida, & sicca, aer eligatur frigidus, & humidus, alteretur violis, nymphaea, salice, foliis vitis, papauere, &c. exercitium sit moderatum, balnea capiti administrantur, quotidie non bis tantum, sed quater, & quinquies ex diuicia aqua, in qua decocta fuerit plantago, lactuca, portulaca, salix, folia vitis, fiores nymphaeæ, maluarum, si maior fuerit æstus, adhibeantur succi commissuræ coronali ex portulaca, plantagine, semper uiuo minori, parentur emulsionem seminum extractæ cum decocto lactucæ, solani maioris, semper uiui, nymphaeæ, hyoscyami, violatum, & si somnum capere non possint, addantur etiam poma mandragoræ, nam somno nil præstantius, ideo intrinsecus quoque humectentur sero caprino, emulsionibus frigidis, & victu refrigerante, & humectante. Concedantur omnia olera frigida, lactuca, endiuia, cichorium, beta, malua, atriplex, fructus omnes frigidi, cerasa, pruna, cucumeres, cucurbitæ, melones, vux recentes, quæ vux plerisque melancholicis adeo contulerunt, vt ego nonnullos cognouerim, solo hoc remedio integrè curatos. Carnes eligantur humidæ, præsertim agnina, vinum sit valde tenue, & si abstinere possent, aqua mulsa conducibilior esset. Constat verò in

A hoc casu abstinendum à coitu, ab ira, ab ingenti animi perturbatione, à salicis omnibus acerbis, & aromaticis, neque prætermittenda sunt quædam medicamenta frigida ad melancholiam inuenta, Rasis, & Auicenna, alijque complures præbuerunt quibusdam vsum alimentorum, quæ faciliè concoquuntur; si quis autem est casus in quo eligenda sunt potius, quæ succum concoctu difficilem gignunt, quàm illa, quæ facile alterantur, est intemperies ista calida, & sicca absque materia, est enim opus alimento non tam frigido, & humido, quantum non facile resoluibile; nam si faciliè resoluitur, spirituum siccitas augetur. Idcirco quando prædicti auctores laudant in melancholia carnes agni, aut veruecis, & alias humidiores, sicuti & in ferculis oriza, alicam, & alia, de melancholia intelligendi sunt ex nuda intemperie, nam si adsit materia, hæc quæ sunt crassioris succi aliquam inferre possent obstructionem, & sic materiæ melancholicæ euacuationem, vel distillationem prohiberent. De lacte est etiam aliqua dubitatio. Rases in 9. Continentis cap. de Melancholia lac nuper multum adhuc calens melancholici, concedit. Sed Rabbi Moyses, cui ad stipulatur Matheus de Gradibus in commentario ad caput de melancholia, prohibent melancholicis vsum lactis, & lacticinorum, eod quod faciliè corrumpitur, & cum vaporosum sit, varias possit producere imagines; ego quidem in intemperie hac calida, & sicca absque materia nihil præstantius esse puto lacte nuper multo, in præsentia materiæ illud dimitto, facilius enim corrumpitur, & euaporat in caput ex permissione aliene substantiæ, quàm ex nuda intemperie. Adde quod lac adhuc calens ex vbere sumptum non faciliè corrumpitur; & præterea melancholici ex intemperie calida, & sicca à variis imaginibus nõ perturbantur, sicut illi, qui melancholiam patiuntur ex multis euaporationibus in caput factis, idcirco lac, & lacticia istis concedi debent. Præter victus rationem medicamentorum quoque interna, & externa frigida, & humida sunt administranda, ex internis præstantissimum est remedium confectio illa in rotulis, quæ manus Christi dicitur, quæ sit ex margaritis, saccharo, & aqua rosacea; conueniunt quoque conserua rosarum, ex flo. violarum, nenupharis, cum margaritis preparatis, hyacintho quoque conuenit ipsa confectio de hyacintho, electuarium de gemmis, datur ad drach. i. in aqua violarum, rosarum, nymphaeæ, vel acetosæ. aqua mea cordialis in hoc casu non est prætermittenda, valent etiam varii pulueres ex margaritis, sandalis, flore nymphaeæ, hyacintho, & aliis gemmis preparati, addito osse cordis cerui, & saccharo modico, possuntque hi pulueres præberi ad drach. i. vel cum succo citri, vel limonum, vel aliqua ex aquis præscriptis, extrinsecus cordi fiant epithemata ex aquis, succis, & speciebus refrigerantibus.

An lac
conueniat

Medica
mèta in-
terna q.

Extrinsc
cus conue-

Qualis
digna.

Lotio ca-
pitis ex
balneore
frigeran-
te.

nicepithe gerantibus; epithema conueniens esset, si hoc *A*
ma cordi modo fieret.

Re. Aquarum violarum:
Nimphaea } in vnc. iij.
Acetosa. }
Rosarum. }
Margaritarum preparatarum:
Sandalorum rubeorum }
Florum nymphaea puluer. } an. drac. j.
Corallorum rubeorum, }
Camphora, gr. iij.
Succi limonum vnc. ij.

Somnum
concilian
tia.

Post epithema adhibetur inunctio ex vnguento rosaceo, aut sandalino misto cum succo citri, & quoniam in hac intemperie, ut plurimum vigilae vrgent, ad alterandam hanc intemperiem, & somnum conciliandum abrasis capillis fiat stillicidium ex oleo rosaceo, nenupharino vel ex lacte nuper multo, aut detineat lintea madefacta succo lactuca, oleo violato, & succo limonum; quidam putant omenta animalium, pulmones, catulos, pullos dissectos, immo nonnulli probant partem agni nuper dissecti, laudant etiam si haec animalia inspergantur puluere florum nymphaea, hyosciami, seminis papaueris albi, erit fortius medicamentum; laudant quoque ut turunda naribus indantur, quae sint imbibitae vnguento populeone, aut oleo nenupharino, in quo granum vnum, aut alterum opij sit dissolutum, quod si turundas abiciant, fiat euaporatio ex decocto violarum, lactuca, nymphaea, hyosciami, mandragorae, papaueris albi, in aqua rosacea, violaceae, & quando haec non proiunt, ad interna opiata est deueniendum, laudo quidem, ut primo tentes emulsionem amygdalarum dulcium, papaueris albi, sed si somnum non concilient, deueniendum tandem ad requiem Nicolai, vel Theriacam recentem saccharo violaceo mistam dosi sit drac. s.

Caput XVII. De curatione melancholia ex intemperie frigida, & sicca & frigida, & humida spirituum animalium, & ex dilatatione eorumdem; & habetur sermo de quodam morbo, qui Germanis dicitur Chorea S. Viti.

Curatio **S**ed si intemperies sit frigida, & sicca, humectantibus, & calorificis est tractanda, ita talia ex in men, ut humectantia longe superent calorifica. *temperie* Hoc autem Arabum consilium in eum finem di frigida rigitur, ne à calorificis humor melancholicus & sicca augeatur, ego verò, qui nunc loquor de melancholia ex intemperie frigida, & sicca spirituum animalium, & vitalium absque materia, idcirco calorifica improbo, quoniam spiritus pauciores iam redditos digerunt, tota igitur haec curatio posita est in victu, & in quibusdam alterantibus, ad quod respiciens Rhases primo conueniens, & alii cum eo asseruerunt se melancholicos non admodum confirmatos solis humectantibus medicamentis modicè calorificis pristinae sani-

tati restituisse. Eligatur itaque aer humidus in actiuis temperatus, moderata sit exercitatio in nauicula, in curru, ut sanguis moueatur à profundis partibus ad totum corpus, & caput. Cibi sint humectantes, & calorifici moderatè. Idcirco probant Medicinæ scriptores Arabes carnes perdicum, phasianorum, & aliarum auicularum montanarum, quae in calida, & sicca intemperie non conueniunt: immo verò laudant maximè pullos accipitris, & noctuae, & volunt à proprietate melancholicos iuuare, sicuti & cor lupi dicunt prodesse à tota substantia, conueniunt ex omnium confesui turtures, siue autem istae, siue aliae carnes accipiantur, in istis concoquendis debent addi quaedam cordialia, ut melissa, & ocymum, gariophyllatum, immo laudant Arabes, ut primo coquantur cum vino odorato modico, & postea superaddatur aqua cum herbis propositis, conueniunt etiam ex oleribus radix buglossae, quidam vitur floribus, & foliis, sed buglossae virtus in cortice radice est posita, idcirco coquendae sunt radices, & loco ferculi vel acetarii cum passulis sunt comedendae, in hoc etiam causa conueniunt nucleipinei, amygdala, pistachia, & ea omnia dulciaria, quae ex his, & saccharo fiunt, addito etiam musco, & ambra, & cinnamomi momento, vinum sit album vetus, odoratum, non admodum generosum, abstineant à Venere. His quoque somnus conciliatur balneis humectantibus, in quibus coquantur malua, althaea, chamomelum, melilotus, & anethum. Ex his quoque possunt fieri lotiones capitis, & si pro capite herbae istae coquantur in iure castrati, fiantque lotiones ex illo iure fiet fortius medicamentum, lac & intrinsecus, & extrinsecus etiam in hoc casu conuenit, dummodo sit nuper multum, admiscendum verò in hoc casu est saccharum, aut mel, ex antidotis conuenit diamuscus dulcis, & amarus; confectio alcherimes, electuarium lactificans, Mithridatum theriaca, dummodo haec omnia, tanquam calidiora corrigantur, aut saccharo rosato, aut violato, aut conferua nenupharis, vel succo citri, & temperatae aquae superbibantur, ut aqua borraginis, buglossae, & melissae, aut iuscula alterata ex his herbis, extrinsecus cordi adhibeantur epithemata proportionem respondentia, ut.

Re. Aquarum melissae,
Buglossae,
Borraginis,
Ocymi, gariophyllati an. vnc. iij.
Vini maluatici, vnc. ij.
Specierum cordialium temperatarum vnc. ij.
Croci grana, iij.

Post epithema adhibeatur inunctio ex theriaca, aut Mithridatica confectio mista cum rosaceo, & succo limonum. Melancholice curatio, quae nunc proponitur primo omnino contraria videtur esse omnium Medicorum præceptis, qui de melancholia aliquid tradiderunt, *Curatio*
melancholice ex intemperie frigida, & humida.

derunt, loquemur enim de curandis melancholicis ex frigida, & humida animalium spirituum intemperie, qui propterea siccantibus tractandi erunt, cum tamen sit commune preceptum melancholicos esse humectandos, cum tamen, & rationibus, & autoritatibus, & experientis sit confirmatum dari melancholiz speciem ex frigida, & humida spirituum animalium, & vitalium intemperie, ideo audacter hanc curationem proponemus, & eo magis cum videam neque Galenum, neque Auic. aut alios Arabes, Græcos, aut Latinos euisse medicamenta siccantia in fatuitate, stultitia, & amentia, quando cum sopore fuerit connexa, at vero paucissimi sunt fatui, & amentes, stupidi, & soporati, qui pariter non sint timidi, & mœsti, ac proinde melancholici, ut nemo scire possit curationem fatuitatis ab hac melancholiz curatione sciungere, itaque in subeunda hac curatione semper ante oculos habenda sunt signa humiditatis, & refrigerationis cordis, & cerebri, non autem ad solum symptoma mœroris, & timoris animus conuertendus; sicut enim certum est timorem, & mœrorem & cum siccitate, & cum humiditate, cum frigidityte, & caliditate stare posse: ita & facillimum & incurandis ægris decipi, nisi medicus attentè omnia repetat omnino signa, quæ frigiditatem, & humiditatem, vel contrarias qualitates sequuntur, conspirantibus ergo simul cum mœrore, & timore vel omnibus, vel pluribus, aut saltem præcipui frigidityte, & humiditatis intemperiei signis, melancholici sunt exsiccandi, & nunc non erit faciendus à nobis sermo vllus de purgantibus, quia de nuda intemperie loquimur, quæ & victu, & medicamentis corrigitur. Victus autem in sex rebus non naturalibus est positus; aer eligatur calidus, & siccus, qui si talis non sit, alteretur suffumigiis ex styrace, belzoino, myrrha, cypero, & croco, &c. cibi sint & tenuioris substantiæ, & attenuantes, carnes potius auicularum montanarum, olera calida, & sicca, crucea, ocymum, petroselinum, pulegium, non prætermittantur salita, condiantur aromatis, cibaria, præcipuè cinnamomo, gariophyllis, & gingibere, vitentur omnia lacticia, placentule, pisces, vinum sit generosum, aut simplex, aut alteratum melissa, ocymo, tormentilla, &c. exerceatur corpus, pectinetur caput, & lauetur ex lixiuijs alteratis betonica, rose marino, stæchade, saluia, maiorana, sisymbrio, inspergantur commissuræ coronari pulueres ireos, cyperi, synapis, pyrethri, naribus indantur linimenta facta vel ex trociscis de gallia mpschata, ex trociscis hedyeroi dissolutis cum vino maluatico, aut aqua maioranæ, vitantur somno moderato, & balneis toti corpori alteratis cum herbis caloricis, vel si nauales habeant, theriacas sulphureas, vel aluminosas, in his lauari poterunt. Medicamenta alterantia sunt Interna, & Externa, interna conueniunt in hoc

A casu calida, & sicca, theriaca Mithridatum absque correctione medicamenti frigidi, diamoschum amatum diamargariton calidum, electuarium latificans, possunt quoque parari aquæ distillatæ, quas vocant Elixir vitæ, sunt enim species aquæ ardentis, cui adduntur herbe calidæ, & cordiales, & aromata varia, suntque admodum accomodate. Extrinsecus cordi aptantur epithemata califica, & siccantia, ut sunt.

℞. Vini maluatici, }
Aquarum melissa, } an. ꝑnc. vj. ʒ
Florum citri }
Buglossa } an. ꝑnc. iij.
Specierum cordialium temperatarum, drac. ij.
Cinnamomi, }
Gariophyllorum, } drach. s.
Croci, gr. vj.

Post epithema apponatur hæc inunctio

℞. Theriaca, }
Mithridati, } an. drac. j.
Specierum cordialium temperatarum, drac. s.
Vini aromatici parum, misce.

Possunt quoque gestare in regione cordis sacculos ex serico rubro confectos, qui repleantur pulueribus factis ex semine citri, cortice eiusdem, melissa, ocymo cinnamomo, Xyloaloe, gariophyllis, nuce moscata, thure, myrrha, & croco, addito pro ditioribus moscho, & ambra.

Quod pertinet ad melancholiam, quæ sit ex motu spirituum animalium, hic motus aliquando sequitur affectus animi, aliquando humores corporis, & cum sequitur affectus animi, curatio ipsius est curatio affectus animi, sed si affectus ortum ducat ex temperamento corporis mutandum est temperamentum aut ad frigidum, aut ad calidum ut antea docui; nam verbi gratia nimia spirituum constructio sequitur frigiditatem, & siccitatem, hæc itaque curatur calidis, & humidis; nimia Curatio dilatatio quando sequitur intemperiem, quæ calida vltra modum sit, superatur solis refrigerantibus, quæ omnia supra dixi, sed quando hæc dilatatio eò accedit, ut patientibus inferat immoderatum dilatatione. motus in hoc casu necessarium est præter intemperiem spiritum adesse copiosum, vaporem, & humorem, in neruos, musculosque distributum, qui inopinatas, & extraneas istas motiones efficiat, dedi exemplum illorum qui putant se anes factos, propterea brachia pandunt quasi volaturi, in hoc ipso sunt illi, qui certis quibusdam temporibus in tripudium incidunt, vitiosum, quod Germanis propterea vocatur choreas S. Viti, estque omnino similis illi, quam habent morfi ab illa phalangii specie, quam tarantulam vocant, coacti sunt quidem ostendere hunc affectum etiam fuisse cognitum antiquis, præcipuè Herodoto, qui putatur fuisse author libelli finitionum medicarum, qui Gal. adscriptus est. Hic enim in fine illius libelli scribit ex musica & cantu affectum fieri.

fieri, quem Enthusiasmum vocant; in quo patientes, quasi diuino spiritu afflati agitantur, & ad sacra mouentur, sed longè distat hic affectus, neque enim author iste meminit tripudii, dicitque hos moueri ad sacra, cum primum harmoniam sentiunt, sed in chorea S. Vidi etiam sine harmonia fit hic motus, nam de repente homines, & mulieres propria relinquunt munia, & ad hos saltus, & tripudia adedò inordinatè se conuertunt, vt & in lapides impingant, & crura, & caput collidant aliquandò in flumina se ipso precipitent, neque verò est similis affectus ille, quem describit Aretæus primo de causis, & signis acutarum passionum cap. 6. circa finem, qui Enthusiasmum parit, dicit fieri in quibusdam diuino afflatu in spiritalis, qui proprium corpus dilacerant, cum putet se placere Deo, addique excitari hanc passionem non tantum à Musica, quantum à temulentia, & persuasionibus; nihil itaque meminit Aretæus saltationis, & tripudii, putant etiam cognitum fuisse hunc affectum Gariophano Medico antiquissimo Græco, qui tamen describit quidem insaniam, seu furoris speciem, in qua patientes existimant se sonum quemdam in auribus sentire, vt propterea confestim surgant, gladium arripiant, & obuios feriant, non dicit tamen istos tripudio incumbere, neque ab exteriori Musica aut irritari, aut demulceri; noua itaque vt ego sentio est hæc melancholiæ species, & vt noua incognitam habet adhuc curationem, sicuti & causas. Ego tamen libentissimè refeto hanc speciem ad nimiam spirituum dilatacionem propter eorundem spirituum & sanguinis copiam, ac feruorem: quia audio mirandum in modum exacerbari hunc affectum ex inspectione rubri coloris, vt propterea si quis rubio indumento indutus illis obuiam fiat maximum inferat damnum: nostis autem quantum possit hic color ad dilatandos spiritus, & sanguinem, neque enim aliam ob causam in variolis, & morbilis præcipiunt Medici, vt in frequenti vsu habeant nostræ mulieres, vt rubri panni lectulis, & muris patientum apponantur, quam vt ex illius coloris inspectione expandantur humores, idem ostendit curatio, quæ dupliciter absoluitur aut industria, aut medicinis, industria, id est, ipsa musica, dum enim inueniuntur aliqui adedò fortes, & patientes vt tamdiu possint instrumenta Musica pulsare, quam diu isti saturantur, desitescit morbus, at verò nulla alia est causa ob quam desitescat, nisi quod partim ex musica, partim ex illo continuato motu spiritus ille multus digeritur, & ad digestionem, & euacuationem ex accidenti euacuatio succedit, idcirco etiam remedia naturalia eiusdem facultatis esse debent, vt similiter corpus inaniant, & aliqua ratione refrigerent, siue inanitio fiat per corporis ambitum, siue per alias partes, hoc parum refert.

A Caput XVIII. De curatione Melancholiæ ex nimia constrictione spirituum, & etiam de curatione Melancholiæ ex nimia confusione eorundem non pendente ex vapore aliquo ascendente.

Q Vi ex nimia spirituum constrictione melancholici sunt, vt suo loco declarauimus, imaginantur esse mortuos, aut corpora inanima, regulas, testas, &c. idcirco oculis clausis immobiles iacent, & cibum renuunt, his ergo quam primum opulari oportet auxilijs, quæ spiritum, & sanguinem à centro ad circumferentiam ducant, sunt autem hæc partim attrahentia, partim impellentia, ex attrahentibus, sunt omnia, de quibus Gal. 4. de tuenda val. 6. tum ait, duci humores ad extra vsu vel balnei, vel frictionis, vel fomenti calidi, vel inunctionis, vel iracundiæ, & ideo si in balneum imponi non possint, & fomentum, atque inunctio minus valida fuerint, adhibendæ cucurbitulæ, vel scarificatæ, vel non, sinapismi, vesicantia, cauteria quæque potissimum actualia, duo enim præstant hæc cauteria, ex propria natura foras attrahant: deindè patientem ad iracundiam excitant, quæ, vt ex Gal. dixi, foras ducit humores, idcirco Arabes quæque nonnunquã iubent melancholicis verbera infligi, qui etiam si minimè distinguant, quibus propriè hæc verba conueniant, de his tamen sunt intelligendi, qui hac forti imaginatione obsessi putant se esse corpora insensibilia, cum enim experiuntur ignem, aut funes, atque vno verbo dolorem in corpore, tunc coguntur sententiam mutare, & fateri se esse corpora viuentia. Et ego scio, excellentissimum Capiuaceum cuidam Tarussino, qui se mortuum dicebat, & tamquam cadaver iacebat tria cauteria inussisse eo tempore immobili immanente, sed cum inureret quantum profundiori visione, oculos aperuit, & moueri cepit. Sic ergo tractandi sunt Melancholici huius conditionis, & ideo præter cauteria, vesicantia in pluribus locis adhibita cruribus, brachijs, occipitio, sinapiti, scapulis prodesse possunt. Vbi eam resipiscere in coeperint, tentandum omni studio eodem spiritus mouere partim lætitiâ, partim cibis, & medicamentis; quæ conferunt ad lætitiâ, nota sunt, cantus, sonus, inspectio oblectorum pulcherrimorum, ambulatio per loca amena, ludus, & alia. ex vobis conueniunt illi omnes, qui calidi sunt, & tenuium partium, ex carnibus auiculæ aromatis calidis, præcipuè autem croco, tanta enim est vis croci ad dilatandos spiritus, & ad circumferentiam mouendos, vt immodica illius quantitas Sardonicum risum, & mortem accersere possit. Sicuti verò in spirituum tenuitate, & facili motu crocus est exitialis; ita in hac constrictione spirituum siue in vino epotus, siue in iure, siue cibarijs admixtus inuabit, & quia video Gal. 2. de comp. per loca, primo inter ea, quæ perturbant mentem repositis, non tau-

Curatio Melancholiæ ex nimia constrictione spirituum.

tum crocum, quantum etiam lentisci fructum, & peucedanum, & cyclaminis radicem, adeo in hoc casu, in quo ad mouendos spiritus probatur crocus, neque sunt alia proposita reiicienda, perturbant enim spiritus, qui sunt in motu, ut laesio subsequatur, se immobiles mouent motu potius utili, quam noxio, conducit præ ceteris vinum generosum ad ebrietatem, si quid enim est, quod spiritus moueat, fundat, agitet, est vinum ad ebrietatem.

*Curatio
melancholice
ex confusione
spirituum.*

Transeo ad melancholicos ex confusione spirituum; hæc confusio vel est interpellata, vel continua, interpellata vel fit in quibusdam tantum locis certis, & determinatis temporibus, aut fit quocumque loco, & tempore. Exemplum primi habetur apud Areteum lib. primo cap. de signis acutorum 6. qui fabri lignarii exemplum proponit in propriis adibus optime ligna aptantem, extra ædes omnem artis vim amittentem, ut de alio scribit Seneca, qui inter rudes egregie philosophabatur, inter sapientes stolidus fiebat, & insipiens; nam potest id fieri ex verecundia, in qua spiritus inordinate mouetur modo ad intra propter timorem, modo ad extra propter spem, & sic confunduntur species. Itaque horum curatio est curatio verecundia sed verecundia hæc est vitiosa facta ex nimia spirituum caliditate, & tenuitate, propterea enim facile intro, & foras feruntur, quia rari, calidi, & tenues sunt; itaque refrigerandi sunt spiritus, & aliqua ratione incrassandi, & quia crassities potest induci vel à frigidis humidis, vel à frigidis siccis, frigida humida non sunt accipienda, mentem enim obtundunt, & ut ait com. 19. primi de natura humana Gal. ad confirmandos mores non sunt apti, frigida, verò, & siccæ, vitiose, quæ melancholiam augent corpori robur, & firmitatem tribuunt, est doctrina Gal. lib. citato, qui scribit hominem melancholicum actionum constantiam, & firmitatem tradere, & sanè experientia obseruamus istos nimium verecundos, rubicundos esse & sanguineos, sanguinemque habere subtilem, ut propterea facile & pallescant & rubescant, contra verò melancholici semper sunt eodem vultu, & actiones suas audacter perficiunt. Idcirco pro his quædam fieri possunt pro ipsa accessione, quædam pro causa accessionis, verbi gratia, si quis sciat se vires ingenii amittere, dum vel apud Principes, vel in loco aliquo publico aliquid sit dicturus, vel facturus, tanquam id faciat, ut præseruetur ab accessione uti debet partim reuellentibus, partim repellentibus internis, & externis, foueat caput rosaceo, & aceto, accipiat vnc. ij. vel ij. succi granatorum, aut citoniorum, aut alterius fructus adstrictorii, utatur reuulsionibus factis vel per lotiones pedum, vel per frictiones, ligaturas, cucurbitulas, aut etiam veuncantia, tempore interualli his ego laudo illa cibariorum genera, quæ

A Gal. 3. de locis affectis 7. cæteris omnibus melancholicis prohibuit, concedantur carnes vaccinæ, leporinæ, & omnia, quæ sanguinem crassum, & melancholicum reddere possunt, videbitur paradoxum: sed habita ratione causa non est. Arabes, apud quos omnia ferè medicamenta, quæ nos ad melancholicos proponimus, indistinctè tamen prolata inueniuntur, in alienatione mentis proponunt succum motorum, celebrant mirificè vsum omnium myrabanorum nosi ex eo tantum, quod purgent, sed quia myrobalani frigidi sunt adstrictorii, ut propterea molum spirituum nimis velocem adstringere, & compescere possint. Cæterum si indistinctim fiat hæc mentis perturbatio, non fit ex verecundia, sed potius ex vapore aliquo ascendente siue calidus sit, siue frigidus, curatio autem huius vaporis ascendantis proponetur in tractatu de Melancholia hypochondriaca ubi etiam curationem proponemus illius melancholice, in qua propter agitationem spirituum melancholici varias fingunt sibi imagines, & aliquando animo concipiunt se id fecisse, quod non fecerunt, vel non fecisse quod fecerunt. Curatio autem illius melancholice, quæ fit ob motum spirituum præter naturam, in qua ut dixi patientes discuntur opposito modo, quam pronaturali statu quisque debet discurrere, perficitur primum euacuantibus totum, & cerebrum deinde deobstruentibus, dixi enim hoc fieri quando spiritus inueniunt cerebri angustiam magna ex parte ex obstructione factam, quandoque etiam à compressione, propter tumores, in quo casu retrocedunt, & sic confunduntur species, falsæque et prauæ inferuntur consequentiæ, de qua sicuti, & de reliquis, quæ requirunt euacuantia & totum, & caput tam ex chirurgia, quam ex pharmacia infra dicendum.

Caput XIX. De curatione Melancholice ex confusione spirituum animalium pendente ex humoribus.

D

PROcuranda melancholia ab humoribus spirituum animale confudentibus, versabor primum in chirurgicis, mox in pharmaceuticis, deinde in dieteticis. Circa chirurgica ante omnia occurrit venæ sectio, de qua dicendum, quibus nam melancholicis conueniat, & quo loco, quo tempore, & modo, denique, in qua copia sanguis mitui debeat. Dum autem quaerimus quibus conueniat venæ sectio, duo quaerimus, quibus ratione loci, & quibus ratione materię, nam quod ad locum pertinet, cum duplex, sit melancholia essentialis in cerebro, & per consensum a toto, & hypochondriis, quaeritur an in omnibus, an in quibusdam tamen venæ sectio locum, habeat multa de hac re dicuntur, resolutio est in me-

*Utrum
conueniat
venæ
sectio,
& qui venæ
secunda.*

De Melancholia.

D

lancholia.

lancholia essentiali, cum qua non adsit corporis plenitudo, neque contentus pretermittendum esse vniuersalem venæ sectionem, pari ratione in hypochondriaca, quando materia residet tantum circa miseraicis sectio venæ pretermittenda est, trahit enim succum melancholicum à partibus determinatis in venas communes, siquæ totum inficit sanguinem. Hinc Rhasis primo Continentis, prohibent in hypochondriacis sectionem venæ, non possum tamen doctissimos quosdam recentiores probare, qui in hypochondriacis prohibent quidem sectionem venæ in cubito; concedunt autem in pedibus; quasi melancholicus ille sanguis, qui est circa viscera, possit per infernas euacuari venas, non attractus in vasa communia, quod si concedant attrahi, eadem est ratio sectionis infernarum, & supernarum. Itaque ster conclusio proposita ratione hypochondriorum, vt tales sunt, non conuenire sectionem venæ, dixi, vt tales sunt, quia hæc regula ferè semper patitur exceptionem, ita vt & in essentiali, & in hypochondriaca melancholia conueniat venæ sectio, primum quidem plerumque est necessaria, vbi adest corporis plenitudo, hæc enim quamquam primo, & per se non faciat melancholiam, illam tamen iuuat, & fouet, nam vbi multus est sanguis, multa quoque est fex, & loci affecti in sanguinis multitudine pronitius replentur, 1. conuenit quia essentialis melancholia in capite quandoque est secundaria, id est communicata à vitio sanguinis in toto corpore abundantis, 3. conuenit etiam in hypochondriaca, quia siue fiat hypochondriaca lienæ non attraheate succum melancholicum, siue recore chylum, & sanguinem exurente necessarium & non modo viscera, sed & venas omnes feculento hoc sanguine redundare. Itaque tunc educitur sanguis non pro euacuando succo in miseraicis contento, sed pro illo qui in venas totius distribuitur. Hanc ergo difficultatem cum vidisset Gal. 3. de locis affc. 7. proponit regulam, qua possit medicus aut mittere sanguinem, aut òn non potest autem regula locum habere nisi aperiatur vena, aperta vena, ait Gal. si sanguis sit ruber, statim supprimendus, si niger educendus, hæc regula nò est vniuersaliter accipienda, sed vbi ex colore cutis, & venarum, exturgentia, alijsque signis conicias sanguinem melancholicum in venis communibus contineri, etiam si ab initio ruber appareat, non est statim supprimendus, consuevit enim tenuior ab initio excerni deinde crassus succedere, propter quattuor causas, prima quia fex sanguinis semper subsidet, & nisi agitur, & toti sanguini misceatur, nunquam est prima, quæ educitur, vt propterea ad hoc respicientes nonnulli docti viri, inter quos est Gilbertus Anglius consulunt, vt antequam secetur vena in melancholicis corpus agitetur, & medicamentis, & syrupis, vs ex

A agitatione, fex sanguinis cum tenuiori portione misceatur. Secunda causa est timor, timor enim introducit humores, & qui grauioribus sunt minus facile ad exteriora mouentur perseverante timore. 3. causa est arcta ligatura, qua vruntur ministri, ideo monendi sunt medici, vt post sectam venam, aliqua ex parte laxetur vinculum, altera causa est angustia foraminis, cui prospiciendum est ampliore facto foramine, si itaque hæc seruentur leges, & tamen sanguis floridus appareat, occludatur vena. Quod ad materiam pertinet etiam si in cacoehymia Gal. 4. de tuenda val. 4. sectionem venæ prohibuerit, vt propterea neque in biliosa, neque in melancholica, neque in puitosa, sed in sanguinea tantum venæ sectio locum habere videatur, tamen vbi vires consent in omni melancholia sanguis est mittendus, si enim constet cacoehymia nò est exquisita, habet ergo sanguinem ad mistum, qui si non est causa principalis, est causa sine qua non, quia est mixtus succo melancholico, aut est etiam adiuuans, quia illi misceri potest, & in eundem verti. Itaque in quacumque humoris abundantia, dummodo subsit plenitudo etiam si spuria, licet venam aperire. Quo ad locum, vel est sermo de præseruatione, vel de curatione, si de præseruatione semper ex infernis partibus mittendus est, longe enim ducendus est sanguis à cerebro, & corde. C. Præseruationis tempore teste Gal. lib. de curat. per sanguinis missionem. 19. si de curatione loquamur, cum melancholia sit per consensum à toto secatur vena communis aut vnus tantum, aut vtriusque brachii; potest etiam in magna plenitudine secari superior, & inferior, sed quando vtrumque præstare liceat, mihi magis probatur, vt primo secantur venæ inferiores, quam superiores, contra quam senserit Mesue, nam si secantur primo infernæ; sanguis crassus ad inferna ducitur. Præterea reuulsio præcedit deriuationem, aut vena inferna secta in melancholia ex toto habet rationem reuulendi, superior deriuandi, si tamen menses, aut hæmorrhoides sint suppressæ, semper inferiores aperiuntur, in essentiali tamen pretermittitur quidem sectio venæ communis, non pretermittitur determinata, & ideo secari potest vena frontis, aut loco illius aperiuntur venæ narium, adhibeantur hirudines venis temporum, & post aures, sacrificatio quoque in occipite, & circa scapulas in hoc casu prodelle, potest, quando autem vires non possint sustinere, hæmorrhoides sunt aperiendæ. Hæmorrhoides si innatæ, siue non, quandoquidem si innatæ fuerint, imitatur naturam, si aperiendæ non ed ducendus humor, quod natura illud licet purgare consuevit, conuenit autem nigrum sanguinem per hæmorrhoides educere. Hinc scribit Hipp. 5. in 6. ep. 25. atræ billis simile hæmorrhoides effundunt. Itaque iupanda est natura per hunc locum; consulit id Gal.

id Gal. qui in com. 25. aph. inquit illis educendum esse sanguinem per hæmorrhoides, qui suæcum melancholicum in corpore congesse-
runt.

*Quantitas
sanguinis.*

De quantitate habenda est ratio naturæ morbi, temporis, vitium, atque aliarum rerum naturalium, & non naturalium. morbi quidem, nam in melancholia illa, quam lycanthropiam dicunt, expedit multum sanguinem detrahere, in melancholia stupida parum admodum, ut propterea cū hæc melancholia stupida prope accedat ad defectum memoriæ, ex intemperie frigida cerebri neminem inuenies qui in defectu memoriæ sanguinem mittat, medio modo agendum in melancholia cum risu, aut cum aliqua rixa, nam copio-

*Tempus
mittendi
sanguinē.*

sus quidem sanguis est detrahendus, non tamen sicuti in lycanthropia. De tpe antea dixi nunc repeto magnam scriptorum partem in hoc inclinasse, ut sectionem venæ in melancholicis præcedat purgatio, & syruporum quorundam assumptio, ut fex sanguinis tenuiori sanguini miscetur, quod & ego suadeo. Quod ad modum missionis pertinet, præterea, quæ diximus de foramine amplo, & ligatura luxanda addo consultum fore, melancholicis sanguinem mittere aut præmissa corporis exercitatione, aut balneo, aut saltem fomento calido circa partem in qua secanda est vena.

Modus.

His succedunt cucurbitulæ, quæ ad extrahendum sanguinem melancholicum ferè nihil præstant, ad reuulsionem tamen aliquid conferunt. Idèd Cælius Aurelianus 1. iunct. capit. de infania, laudat & cucurbitulas, & hirudines appositæ varijs corporis partibus, quia loquitur de infania per essentiam in capite, & ideo vitur his auxilijs tanquam reuulsorijs; in eundem vsum veniunt vesicantia, & cauteria pro varietate loci, in quo est melancholia, varijs etiam locis affigenda, ut propterea Possidonius, cuius sententiâ recepit Aetius in hypochondriaca affectione vatur sinapismo super regionem abdominis ad extrahendam materiam, quæ ibi continetur.

Dum ad pharmaciam me confero loquar in primis de vomitorijs, deinde de clysteribus tum de purgantibus per inferiora, mox de diureticis, & sudorificis, ubi erit sermo de præparantibus, ultimo ad alterantia me conferam. Quod igitur ad vomitoria pertinet, dubium est, an conueniât in melancholia vomitoria locum habeant, necne, & quænam sint ista, & quando, vel quo tempore administranda, quod in melancholia non conueniant vomitoria, videtur docuisse Hipp. 4. aph. aph. 9. dum ait: melancholicos per inferiora purgabis: rationem verò assignat Gal. in commento, quia humor iste ad differentiam bilis, sui gravitate inferiora petit; accedit quod cum triplex sit melancholia ratione loci, vomitus non conuenit in ea, quæ est per essentiam in capite, quia si exhibeatur vomitorium adeo validum, ut educat materiam in capite existentem incolumi existente corpore colliquefaciet

A partes sanas, antequam melancholiam educat, bin Hip. & Gal. 4. aph. 16. helleborum prohibent ijs, qui incolumi sunt corpore, sed neque videtur conuenire vomitus in melancholia per consensum à toto, neque enim ducendus est humor ex natura, & ex accidenti noxius, & prauus per os ventriculi, consueuerunt enim ut docuit Possidonius apud Gal. lib. de Melancholia plures euadere melancholici propter solam vomitionem, multo aut facilius id facient, si humoriam diu in venis moram duxerit, & à natura alienus sit factus: nec verò videtur conuenire vomitus in melancholia hypochondriaca, omnes enim hypochondriaci ventriculum habent imbecillū valde: non sunt autem purgandi humores per locum debilem 13. meth. 11. Ex alia tamen parte experientia, & omnium contentione scriptorum melancholicis imperatur vomitus. Itaque distinctione opus est. Primò sciendum, sermonem aut esse de vomitu materiæ in ventriculo collectæ propter ventriculi imbecillitatem, siue imbecillitas sit facultatis alteratricis, siue attracticis, aliud verò est loqui de materia melancholica, ex qua proximè fit melancholia; primo modo licet & melancholicos, & alios quosuis euacuare, dummodo leges illæ seruentur, quæ à Gal. & Hip. sunt propositæ lib. de salub. diæta lib. quos, & quando &c. & à 4. aph. ad 17. quartæ particulæ aph. ut similiter tabidi, & angusto pectore, & insueti, & difficillimi ad comedendum, nunquam cogantur ad vomitum, sed si de materia melancholica fiat mentio, primum concedo melancholiam, quæ sit tantum per essentiam in capite nullo modo vomitorijs tractandam propter dictas rationes, in reliquis duabus speciebus vomitoria locum habent, & quia hæc sunt in triplici differentia, mitiora, mediocria, & fortiora, mitiora prætermitto; quia non purgant humorem peccantem, sed dumtaxat humores sponte sua ad os ventriculi ascendentes, vel in cavitare contentos faciliè adducunt, sed si de mediocribus sit sermo, ut est vel infusio, vel decoctum raphani, florum genistæ, puluerum radicum asari &c. Hæc quoque seruatis propositis legibus tam in hypochondriaca, quàm in melancholia à toto administrari possunt, dummodo os ventriculi non sit adeo sensibile, ut patientes ex illius sensibilitate palpitationem, lipothymiam, syncopen, epilepsiam, aut melancholiam incurrât Hinc Possidonius ex Gal. cuius sententiam acceperunt & Aetius, & Arabes, in hypochondriaca laudant vomitum factum ex radiculis, ex decocto calamenti, vel alterius similis. Sed si de fortissimis fiat mentio, ut est antimonium, helleborus albus, lapis lazuli, lapis armenus, antiquioribus medicis probatissima sūt, dummodo in eorū exhibitione leges quadā seruentur, primum quidem moneo, mihi summo opere probari vsum vel hellebori albi, vel antimonij, potius quàm lapidis armeni, vel lazuli. Ego enim sepe expertus sū album helleborum deploratissimos melanco-

B
C
D

Vomitoria sunt triplica.

Vomitoria media diocria.

Vomitoria fortissima.

licos sanasse, sed ante hellebori assumptionem A
debet humor preparari, & corpus, preparantur
humor, si incidantur, & attenuenter crassi hu-
mores oxymellite scillitico, & composito, cuius
dantur singulis diebus vnc. ij. vel tres, prapa-
ratur autem corpus si humectetur. Hæc est sē-
tentia Hip. 4. aphor. aph. 14. ante helleborum
humectanda esse corpora, humectantur, & per
se, & ex accidenti, per se cibis, & potionibus
humidis, & copioso alimento, per accidens quie-
te, & somno; preparato sic corpore exhibean-
tur hellebori albi scrup. ij. aut dra. s. aut in for-
tioribus, & difficilioribus drach. j. non in substan-
tia, sed infusa in vino maluatico, vel alio simili,
& statim præbeatur aliquod alimentum, siue pti-
sana, aut panatella, aut oua forbilia, aut quid ta- B
le, quo facilius, & sine ventriculi labore pa-
tientes vomere possint; non est autem præbendus
helleborus circa melancholiam initia, sed tantum
ubi confirmatus sit affectus, quasi in cuta coacta,
ideò Auicenna qui in Mirachali, ut ipse inquit,
vel hypochondriaca melancholia, videbatur ti-
mere propter ventriculi imbecillitatem vomito-
ria, tandem subiungit in inueterata album hel-
leborum conuenire, at si conuenit in hypochon-
driaca, in qua ventriculus est, vsque adeo langui-
dus, conuenit multo magis ubi humor melan-
cholicus in icore ex toto laborauerit, & sanè
huius melancholiam per helleborum album cura- C
ta meminit Galen. lib. de atra bile cap. 7. quan-
tū ait Proeti filias albo helleboro à melancholia fu-
isse sanatas, celeberrimumquē fuisse hoc reme-
dium ante, & post Erasistrati tempora. Ad ra-
tiones in oppositum facile hac vnica solutione
possumus respondere, satius esse in desperatis
casibus aliquid periclitari, quàm insanos homi-
nes relinquere, sed tamen si in hypochondria-
cis vereamur ventriculi imbecillitatem, statim
post vomitorum muniendus est ventriculus mu-
nientibus internis, & externis, si vereamur no-
xam humoris melancholici, poterimus os ventri-
culi roborare non quidem adstringentibus, quia
prohiberetur vomitus, sed præmissis pinguibus,
& oleosis, quæ habent vim corrigendi acrimo-
niam humoris melancholici, ut sunt brodia pin-
guia, fercula cum butyro &c. Quo ad Clysteres, D
in omni quidem melancholia possunt Clysteres
iuuare, sed nulla est, quæ maius sentiat iuua-
men, quàm hypochondriaca, & consulo, ut ali-
quando pro curandis hypochondriacis, adhibe-
antur clysteres; debent aut clysteres esse quando-
que molles, aliquando acres, in melancholia hy-
pochondriaca cum exustione icoris sic fiant,

Clyste-
res.

Rx. Violarum, }
Maluarum, } an. m. s.
Mercurialis, }
Beta, }
Florom camomeli, }
Anethi, } an. p. j.
Meliloti, }

Seminum lini, var. ij. f. d. s. a.

Rx. Diſſa decoctioni, lib. s.

Olei violati, }
Camomelini, } an. vn. j. s.

Cassia extracta, drach. vj. misce fiat clyster.

Quod si fiat hypochondriaca vel ex liene, vel
ex multis ventriculi cruditatibus, clyster sic pa-
rari poterit.

Rx. Seminum cartami, drach. iiij.

Pulegij, }
Calamenti, } an. m. i.
Origani, }
Ruta, }
Cimyni, }
Anisforum, } an. vnc. i. s.
Feniculi, }

Fiat decoctio f. artem.

Rx. Diſſa decoctionis lib. i.

Hiera pro clystere, vn. s.

Diaphanici, drach. iiij.

Mel. ros.

Olei canomelini, drach. iiij. misce f. clyster.

Caput XX. Curatio Melancholia per essentiam in
capite, & per consensum à toto, quatenus spectat
ad pharmaciam.

V T tractatio, quæ de purgantibus in melan-
cholia adhibendis, ordinatè procedat, illam
distinguiam in tres præcipuas partes, in prima mo-
dum proponam tractandi melancholicos per es-
sentiam, & primariò in capite qui laborant, dein-
de verò erit terminus de melancholicis à toto cor-
pore, & de hypochondriacis. Quo ad priores, cū
melancholia in capite generetur aut ex intempe-
rie calida absumente partes sanguinis subtilio-
res, & lucidiores, vel relinquatur post inflam-
mationes, ut suo loco diximus, duplex etiam re-
quititur curandi modus, nā in prima specie nul-
lum ferè locum habet pharmaciam, sed tantum ve-
næ sectio, potissimum aut ex partibus capitis, ut
vena frontis, narium &c. post quas euacuatio-
nes occurrendum alterantibus frigidis, de quibus
supra, sed si relictus sit humor melancholicus post
inflammationes, tunc expedit illum eodem mo-
do preparare, & expurgare, quo licet etiam præ-
parare, & purgare illum, qui in toto corporis am-
bitu continetur, de quo infra, nunc illud adden-
dū, quod præter vniuersales euacuationes, in hoc
casu conueniunt etiam priuatæ, quæ per nares fi-
unt, os, & per alias capitis partes, ideo parentur
gargarismata ex decocto thymi, epithimi, maio-
ranæ, stæcadis cum oxymelite vel simplici, vel
composito, quandoque cum scillitico fiant masti-
catoria, adhibeantur nasaria, quæ potissimum re-
cipiant puluerem epithemi, senæ, hellebori nigri,
immo in contumaci affectu licet imponere na-
sarijs album helleborum, si non in pulvere, sal-
tem in decocto, in hoc casu lotiones capitis, quid
quid sentiat Rondeletius, non debent esse refri-
gerantes; nā etsi præcellerit inflammatio, desijt ta-
men

men causa calida, & resolutis partibus tenuioribus relictus est frigidus, & crassus humor: itaque sicut in externis inflammationibus iam inueteratis, & refrigeratis præcipit Gal. 2. ad Glauconem 2. ut utantur scarificationibus, medicamentisque calidis, & emollientibus: ita & in inflammatione interna transeunte in melancholiam opus est uti calidis digerentibus, & tandem sensibilibus euacuantibus, ideo Auic. proponit decoctum ex calamento, & alijs herbis calidis, ex quo potest fieri lotio, aut fomentum, & in eundem usum insperguntur futura coronali pulueres ex eodem calamento, maiorana, stæcade, beronica, adhibentur cerata, quamquam etiam vesicantia locum habent, setacea, cauteria capiti affixa, vel sincipiti, vel occipiti, curatur enim hæc melancholia, ut & epilepsia ex humorem melancholia, ut & epilepsia ex humore melancholico, nam epilepsia ut dicebat Gal. 3. de loc. affect. 7. ex sententia Hip. 1. epid. sunt melancholici, & melancholici vicissim epileptici, hinc ni fallor scribit Gord. se quendam vidisse, qui tamdiu à melancholia est liberatus, quamdiu vlcus in capite apertum habuit, sanato vlcere iterum melancholicus est factus Sed transeo ad prouidentiam totius, in qua parte curatio distinguenda est tripliciter, melancholia enim quæ in toto abundat, vel frigida est & sicca ratione propria essentia, & ratione causæ generantis, quæ similiter producit ex proprietate ciborum, aut est frigida, & sicca, sed genita à causa calida, aut tertio & materia, & causa calorem continent, quia materia est deusta, in prima specie lenita aluo electuario lenituo, aut syr. de polypodio præparandi sunt humores hoc syrupo.

Curatio
melancholice
per cō
sensum d
toto.

Præparā
tia.

℞. Syr. Sabor Regis
De corticibus citri
De pomis simpl.
Decocti boraginis
Buglossa
Melissa
Corticum citri
Satyrionis
Maluarum

an. unc. i.

an. vnc. iij.

Acetum
melan-
cholicis
malum.

Cupio ut ratio intelligatur præparationis huius humoris in quacumque differentia hic, quid omni ex parte frigidus, & siccus est, requirit calida, & humida, quatenus aut durus attenuantia, humectat aut, & cal facit syrupus de pomis, alij duo attenuant, decoctio item ex humectantibus calorificis, & moderatè attenuantibus constat, acetum, neque syrupi acetum recipientes in hac specie conueniunt, quia refrigerat, & exsiccant, idè erit iudicium omnium plantarum, & seminum, quæ calida, & sicca sunt in tertio gradu, sola enim fugienda sunt, & de aceto est sententia Hipp. clarissima tertio acutorum 38. quam recipit Gal. 1. simpl. 3. melancholicis nocere, facta præparatione sic purgetur.

purgātia

℞. Corticum belleb nigri scrup. ij.
fiat infusio f. a: in decoctione cordiali, facta
expressione adde

Syr. de polypodio vnc. iij. m. i. sec f. potio.
Aut in bolo.

℞. Specierum hieræ simplicis drach. j:

Confectionis hamech drach. iij.

Electuarij lenitiui drach. vj.

M. F. B.

Laudant Arabes usum alicuius hieræ magnæ, omnium celeberrima in hoc casu est illa hieræ Pachij, aut Rusi, sunt valentissimæ, ideo dosis ipsarum erit drach. ij. superbibant tamen aut iusculum, aut prisanam, iterum præparentur humores syrupo de pomis composito. Sabor regis, syrupo de epithimo cum decocto proposito, & repetenda purgatio, postea roborandum cor internis, & externis, quæ omnia sunt calida, ideo probatur in hoc casu theriaca, confectio alchermes, diamusculus amarus, diamargariton calidum, diambra, & cætera calida; de externis epithematibus alijs diximus.

Quod si materia ex caliditate iecoris genita sit, permiscendi sunt syrapi quidam refrigerantes, qualis est violatus, & in decoctis præter violas adde nenupharem, sonchium, endiuinam; in purgatione verò, si tempus permittat, licebit vi sero caprino, sin minus, fiat infusio ex helleboro nigro in decocto cordiali addendo syrupum de polypodio, rosar. sol. an. vnc. ij. m. i. sec f. p. Hieræ magnæ in hoc casu mihi non probantur, sunt nimis calidæ, confectio hamech cum cassia, aut lenituo, tuto præberi potest, sed quia ubi melancholia generatur ex intemperie, sicut euacuatur, ita etiam in dies producit, nisi intemperies corrigatur, id post primam purgationem, consulo ut adhibeantur syrapi compositi, sic vno die accipiant syr. viol. simpl. de pomis, & Sabor regis cum decocto proposito, sed sequenti die accipiant syr. de pomis, & de fumo terre composito ad vnc. j. cum vnc. iij. decocti epithimi Mesue, utanturque his syr. alternatim per x. dies, deinde iterum accipiant helleborum, aut confectionem hamech ut supra. Parum differt curatio melancholiæ quæ fiat ex humore adusto vsque ad propositum terminum: nam ipsa quoque est præparenda, & purganda, ut iam dixi, hoc tamen excepto, quod in hac specie vsus aceti, vel syrupi acetosi non improbat; quia in maxima adustione opus est medicamentis frigidis, quod cum etiam attenuet crassitiam humoris admixtum alijs humidis cōcedi potest, sed aliqua est differentia in alterantibus, & consequenter purgantibus per lotium, & per sudores, ubi enim melancholia non sit exusta & si iecur calidum fuerit, non sunt necessaria impensè frigida, in exusta verò frigidissima quoque conueniunt, dummodo sint humida, idè intrinsecus nil præstantius sero lactis, si constituitur. Aque frigida temporis non impediatur, serum caprinum ac- gidge ther cipe bobulum destillatum, alteratum variis herbis frigidis, non tamen cordialibus prætermittis, snia aquæ naturales frigida omnes conueniunt, & thoris in sanè miratus sum doctissimos viros in proximis melanch. consultationibus, quas pro melancholicis habui- ex adust. mus

mus semper aquam virginis improbasse tamquā exsiccantem, longe superat humiditas actualis modicam illā facultatem exsiccantem, quam ex ferro contrahit hæc aqua, præterquam quod illa ferrea facultas obstructions iuuat, & mista humiditati crassos humores attenuat, ut propterea Rases, & Auic. pro confirmandis visceribus aquas istas ferratas laudent, & si naturales non adsint, illas substituunt, in quibus chalybs ignitus ex stingitur; neq; valet, quod dicunt Gal. nō proposuisse has aquas, multa alia non proposuit Gal. quæ à posterioribus sunt inuenta, neque unquam inuenies illum prohibuisse aquas similes aluminosas, & sulphuratas melancholicis, concedit quidem esse infensas frigidas, istas nequaquā itaque suadeo vsum harum aquarum, sicuti & balneum aquæ dulcis, vel simplex, vel alteratum malua, uiolis, nenuphare, folijs salicis, uitis, sitque repidum, in his, qui melancholia laborant adusta, in reliquis etiam si calidiusculum fuerit, & moderatè digerens prodesse poterit, sed cum hæc non conferant, tandem in his casibus ad album helleborum est confugiendum. In Melancholia per solam essentiam in capite, improbauimus quidem hellebortum album pro uomitorio, nam difficillimum puro, & periculosum attrahere materiam ex capite, ut purgetur per os uentriculi, alia est ratio purgationis per aluum; nam attractoria medicamenta multo facilius ducunt humorem quamquam longinquum ad intestina, quam ad os uentriculi, & quod maius est, pars illa ignobilis à transitu humorum nullam sentinnoxam, helleborus ergo si exhibeatur deiectionis in melancholicis deploratis conceditur eo modo, & tempore, ut supra.

Cap. XXI. Curatio Melancholia hypochondriacæ.

Summa profectò est in administrandis pharmaceuticis auxilijs pro hypochondriacis difficultas, totaque oritur ob pugnantes indicationes, quæ à uariis locis patientibus, affectionibus, & causis desumuntur; ego breuiter docebo modum hypochondriacos sanandi adhibita partiū, affectionum, & causarum distinctione, & ut facile me expediam ab illis, qui minus propriè hypochondriaci vocantur, melancholici aut sunt propter semen retentum, aut menses ut mulieres, breuissimus in his est curæ modus, ut priores nubant, mulieribus verò menses prouocentur, veri aut hypochondriaci cum ex tribus præcipuis locis tales fiant iecore, ventriculo, & mesenterio, ac liene, triplex etiam, & ea quidem diuersissima debet esse curandi ratio: in prioribus enim qui ex iecoris caliditate humores exurentes in hanc acidunt passionem, præcipuus dēt esse scopus, humoris euacuatio, intemperaturæ verò calidæ, & siccæ refrigeratio, & humectatio: obiciet quispiam summum uentriculi languorem, vomitiones, cruditates, inflationes, sciant omnia hæc fieri potius ex obiecto, seu errore ex-

A terno, fluxione s. bilis flauæ, & atræ ad ventriculum. quam ex propria uentriculi intemperie, ut propterea sublata fluxione, & fluxionis causa hæc hypochondriacæ quamprimum curetur. De hac Diocles apud Gal. 3. de loc. aff. 7. quando illam ex inflatione pylori oriri existimauit; euacuabitur ergo materia in hoc casu, aut cassia, quæ etsi statiosa sit corrigi pōt, vel drach. j. specierum hieræ, vel seminum citri, aut syrup. rosat. sol. aut sero cum infusione senæ, epithimi, & polypodii, cui ad corrigendum flatum imponi pōt ante semen citri, aut recens fœniculus, aut coma absinthii, utebatur enim Gal. absinthio 1. ad Glauc. in tertiana etiam exquisita, hoc ipso sero possumus etiam tanquam alterante, vel simplici, vel cum infusione seminum frigidorum. Pōt verò alternatim præberi modo diureticum, modo deiectionem addita sena epithymo, & polypodio, aut syr. ros. sol. interim refrigerandum iecur, & totum corpus, balneo aquæ dulcis, epithematibus ex succis endiuæ, sonchi, & cichorei addito aceto, & speciebus trium santalorum, quia verò in magno iecoris actu uentriculus, quandoque exsiccat, sicque laborat frigida, & calida intemperie simul, defectu similiter calidi innati, & præsentia calidi extranei: in eo casu prospiciendum est uentriculo extrinsecus stillicidiis ex oleo lana succida imbuta nardino, & mastichino, aut rasura purpure eodem oleo imbuta, intrinsecus conuenit lactis usus, vel humani, vel caprini, cum modico saccharo, & si status urgeant, ante lac accipiant, aut gingiber viride conditum, aut conseruam ex toto citro, vel conseruam ex floribus, aut acido citri, sed admissio in unc. j. conserua gran. j. musci, aut ambre. Sed si melancholia ex uentriculo, & mesenterio oriatur, tota curatio per hanc hinc euacuandis priuatam, attenuandis, licet hypochondriacis, & detergentibus flatum discutientibus, caloricis, & siccantibus. Idcirco non sunt audiendi quidam, qui cum primum habent melancholicum curandum, statim fugiunt omnia siccantia, dicuntque neminem Medicinæ scriptorem pro melancholicis exsiccantia proposuisse. Hæc dicta sunt de melancholicis ex melancholia naturali, vel deusta, non de hypochondriacis ex cruditate uentriculi mesentericas obstruente, quos & antiquiores Græci, & Latini, & Arabes tractant medicamentis, de quibus nunc dicam.

Primum quidem pro lenitione alui conueniunt diach. iij. uel iiij. specierum hieræ, cum unc. i. elect. lenitiui, aut in potionem mellis ros. sol. ad unc. iij. cum syr. de polypodio unc. ij. addita decoctione cordiali cum drach. i. seminum citri. Præparetur pituita syropls sine diluto per tres, aut quattuor dies, ut

Rx. Oximelis comp.

Syr. de beton.

de menta

} an. unc. s.

Deinde s. purgatio, aut hoc bolo.

Rx. Specierum hieræ simpl. drach. ij.

Diaphi-

Cursus melancholice hypochondriacæ ex iecoris caliditate,

Diaphinici drac. iij.
Electuarij lenitini drach. vj.

M. F. B.

Iterum præparetur humor hoc syrupo.

℞ Oximelys squillitici

Syr. de beton comp. an. vnc. s.

de menta

Decoctionis menta

beta

agrimonia

pulgeij

centaurea

radicis apij

petroselini

vnc. iij. m. pro syr.

Repetenda est purgatio per hieras magnas, aut Ruffi, aut Archiginis, aut Pachij, vel Iusti, dantur verò drach. ij. tunc verò adhuc fortius incumbendum in decostruentibus, roborantibusque ventriculum, locum habent in hoc casu aquæ thermæ, primum Tetutiana per duos, vel tres dies, deinde alitæ sulphureæ, saltæ, & nitrosæ, quales sunt apud nos Aponenses, & S. Petri, ex magno balneo in defectu aquarum ius pulli, aut columbi sic parentur.

℞ Radicum apij

fœniculi

petroselini

asparagorum

pulegij

centaurea

sisymbrij

calamentib.

agrimonia

menta

seminum cimini

ani formi

fœniculi

an. p. j.

an. m. j.

Si adsit magna frigiditas, addo

cinnamomi

gariophyllorum

nucis moschata

gingiberis

an. drach. ij.

Bulliant in ventre galli antiqui flagellati, & exenterati ad perfectam carnis coctionem, & facta forti expressione, ponatur ius in vase vitriato, donec subsideat, & ex parte puriori dentur singulo mane vnc. vj. quatuor horis ante cibum, ex crassiore autem parte parentur clysteres.

℞ Prædicti decocti crassioris lib. j.

Hiera pro clystere an. vnc. s.

Benedictæ an. vnc. s.

Mel. rosati an. vnc. iij.

Oleicamomelini an. vn. iij.

Fiant autem hiclysteres in magno humorum

A prouentu singulis diebus, ubi minor est humorum copia, alternis. Interim extrinsecus fouda hypochondria spongijs imbutis in decocto proportionato, cuius nuper meminimus; Conueniunt quoque stillicidia, ex aquis thermalibus linimenta, olea, emplastra, & dropaces, sinapi smi vsque ad rubificantia, & vesicantia, neque hæc est mea doctrina, sed desumitur tota ex Gal. ex sententia Ruffi, & Possidonij ex Actio, Paulo, Auicenna, Rase, & alijs. Quod si ex liene ortum ducat hic affectus, quia similiter transmittat ad ventriculum humoris melancholici copiam, quæ coctiones perturbet, & melancholicas imaginationes excitet, in his est posita potius curatio quæ induratum lienem emolliunt, & aperire possunt, quàm alijs vel melancholiam, vel imbecillitatem ventriculi respicientibus; & hæc quoque est Rasis, Auic. & aliorum Arabum doctrina, denianda ergo alijs, aut elect. lenit. aut syr. de polyp. præparandi humores oxymel vel corap. vel simpl. & scillitico. neque obiciamus nos superà ex Hipp. & Gal. acetum in melancholia improbasse, quod melancholia sit naturalis, quia frigida, & sicca, quale est acetum non officit hæc instantia nam acetum, & consequenter oxymel in melancholia ex naturali melancholia, aut adhibetur pro obstructione, & scirrho, aut pro ipso humore, in alijs amplis locis contento. Si melancholia naturalis in venis amplis contineatur, acetum est noxium, illa enim magis refrigerat, & sicca, si in venis angustis contineatur, ut obstructionem, & scirrhum faciat, iuuat, nam dum humorem hunc magis exsiccat, consequenter facit, ut minorem locum obtineat, namque exsiccatum constringuntur, dum angustiores locum sibi comparat vas illud, in quo continetur, redditur latius, nam quo magis astringitur humor, eo locus, in quo continebatur, amplior redditur, & sic facilius obstructio, & tumor superatur. Itaque contrarium est acetum primis, qualitatibus melancholiz, sed iuuat ad scirrhum, & obstructionem propter dictam causam, immò ob eandem causam puto & chalybem, & calybeatam aquam, & ferratam induratos humores sanare, non utendum tamen solis exsiccantibus, sed attenuantia miscenda, ut syr. de cortibus citri, de quinq; radicibus, neque his solis fidendum, sed euacuatio frequens per epictasim facta est subiungenda, ne ventriculus à multis excretionibus validis patiatur: idcirco necessarium est hunc humorem purgare iure galli antiqui preparati ut supra, sed cum additione fol. senæ, epithymi, & polypodii, de reliquis induratum lienem respicientibus alias, & hæc sufficiant de Melancholia.

Curatio
melancholiz
hypo-
chondria
ca ex lie-
ne asse-
cto.

TABVLA CAPITVM;

Quæ continentur in hoc Tractatu.



- Apud Primum; In quo proponitur agendum de Melancholia, eius affertur communis sententia, & propria etiam Authoris. pag. 5.*
- Caput II. Impugnatur proposita definitio Melancholia, & proponuntur*
- varie species Melancholia. 7*
- Caput III. Afferuntur causa specierum melancholiarum superius propositarum. 8*
- Caput IV. Contineas causas reliquarum specierum melancholia. 10*
- Caput V. In quo agitur de causis fascinationum, & quomodo fiant. 11*
- Caput VI. Traduntur cause corruptæ imaginationis ex parte, hoc est ex intemperie spirituum animalium. 12*
- Caput VII. Soluuntur argumenta contra allatam sententiam, & iterum præsens opinio confirmatur; quod melancholia fiat ex intemperie spirituum. Pag. 13*
- Caput VIII. adducuntur argumenta probantia melancholiam non fieri ex intemperie frigida, & humida spirituum, quæ solvuntur, & probatur melancholiam etiam fieri ex motu spirituum. 16*
- Caput VIII. Explicantur species melancholia ex confusione motu præter naturam, & alteratione spirituum pendentes. 17*
- Caput IX. Alia ratione probatur melancholiam fieri ex pituita, ostenditur fieri ex tenebrositate spirituum. Soluuntur argumenta Averrois contra hanc sententiam, & ostenditur quomodo spiritus tenebrosus fiat. 20*
- Caput X. Proponuntur alia differentia melancholia spuria, & ostenditur locus, ubi melancholia generetur. Et agitur de causis efficientibus melancholiam. 23*
- Caput XI. De signis melancholia, & primum de diagnosticis, hoc est de signis indicantibus ipsam melancholiam in genere. 25*
- Caput XII. De signis ostendentibus partem affectu in melancholia, tum per essentiam, quam per consensum, & de signis distinctivis causarum melancholia ex rabie, fascinatione, & Damone, & etiam aliarum differèntiarum. 26*
- Caput XIII. De signis reliquarum specierum melancholia. 27*
- Caput XIV. De curatione, & primum de curatione divinatorum, & melancholicorum ex studiis, ex ambitione, ex amissione pecuniarum, & ex amore. 30*
- Caput XV. De curatione melancholia ex morsu canis rabidi. 31*
- Caput XVI. De curatione melancholia ex intemperie spirituum calida, & sicca. 32*
- Caput XVII. De curatione melancholia ex intemperie frigida, & sicca & frigida, & humida spirituum animalium, & ex dilatactione eorundem; & habetur sermo de quodam morbo, qui Germanis dicitur Chorea S. Viti. 34*
- Caput XVIII. De curatione melancholia ex nimia confusione spirituum, & etiam de curatione melancholia ex nimia confusione eorundem non pendente ex vapore aliquo ascendente. 36*
- Caput XIX. De curatione melancholia ex confusione spirituum animalium pendente ex humoribus. 37*
- Caput XX. Curatio Melancholia per essentiam in capite, & per consensum à toto, quatenus spectat ad pharmaciam. 40*
- Caput XXI. Curatio Melancholia hypochondriacæ: 42*

F I N I S.

HERCVLIS SAXONIÆ


Professoris Medici Patauini Primarij

DE LVE VENEREA.



De Essentia Luis Venerea absolutè accepta.

Cap. I.



Affectiois iam annos centum vniuersum ferè orbem obsidentis, quam plurimi Gallicam, nonnulli Italicam, vel Neapolitanam, alij Hispanicam, vel Indicam, quidam, Pudendagicam, alij aliter

vocant, naturam, causas, signa, & curationem traditurus, ab ipsa rei essentia exordium sumens illam sub triplici capite comprehendam; quorum primum huius affectus absolutè considerati definitionem continebit; secundum verò naturam illius explicabit relatione habitam ad causas, ex quibus producit; in tertio demum, & vltimo erit sermo de eiusdem quidditate in relatione ad effectus, quos infert. Principio igitur Venerea Lues absolutè accepta, causa est occulta, malefica, atque calida. Est causa, non morbus, aut symptoma, quia extra humanum corpus in linteis, vel alijs id genus indumentis, in sudore praterita, semine, ac sanguine iam à corpore secretis potest subsistere. In humano autem corpore partes etiam non viuentes, morbisque non subiectas, humores, inquam, & spiritus inficit, & obsidet: Ideirò vel morbos præcedit, ac generat, vel si quos iam reperiatur, auget, ac deteriores reddit. Quæ omnia iure optimo vnusquisque non morbo, aut symptomati, sed causis adaptauerit. Est verò occulta, id quod inexplicabilis sit illius natura, ideirò non contrariis curatur sed alexipharmacis tantum, & experientia, ac longo usu, non methodo, aut indicatione inuentis. Ceterum quando occultarum qualitarum alia amice, & benefica, alia verò inimica, & malefica constituantur, hæc sanè inter deleterias est reponenda, vtpote quæ in corpus humanum agens, momento ferè temporis illud malo quodammodo commutat, ac tandem in manifestissimam aggit perniciem: Id autem facilius præstat, quo calidius sit illius temperamentum, vt propter ea & corrumpere, & putrefacere, omnesque affectus

A calidos producere possit, quos doctissimus Gal. venenis calidis tribuit, inflammationes, inquam, Erysipelata, caries, vlcera, pustulas, pruritus, scabies, impepignes, atque alia id genus plurima, quæ tamen longo temporis tractu recedant, frigideque affectiones demum consequantur, alias hæc habent causas, de quibus infra dicemus. De absoluta essentia hæc satis: transeo ad secundum caput.

De Essentia Luis Venerea in relatione ad causas efficientes. Cap. II.

Venerea Lues duo obtinet causarum genera, effectuum vnum, materialium alterum. Et effectuum quidem duplex est, remotum, & proximum. Remotum autè minimè fuit influxus syderum, aut Saturni, Martis, & Veneris coniunctio, sed Indicarum congressus mulierum, quæ ex Indis primum in Hispaniam, mox Neapolim nauigarunt, & Caroli VIII. Gallorum Regis exercitum infecerunt. Proximum multiplex est, semen, sanguis menstruus, lac, lactatio, vsus Veneris, simplex vuluæ fricatio, profusum osculum ex muliere circa oris partes laborante susceptum, dormitio in stragulis, vel linteaminibus venefico hoc sudore infectis. De dormitione cum infecto absque vilo contactu dubium est; Vtrum contagiosa esse possit, tamen linteamina munda fuerint sicuti quoque ambigunt nonnulli de poculis, & mensæ accubitu, vt voluit Rondolet. Quinimò obstetrices quoque dum præbent parentibus auxiliares manus, contagio infici posse existimauit Fernel. quæ omnia nos tanquam minimè probabilia omnino rejicimus, qui neminem vnquam manibus Luem hanc contrectantem (inter quos sunt præcipue Chirurghi) hanc ob causam infectum cognouimus. Neque verò pocula, vel mensæ accubitus Luem hanc comportantibus, vel sedentibus conferre posse, quispiam iure affirmauerit, quando nulla ferè dies est, in qua Venerea Lue infecti ad eorum non sedant mensas, qui inculpata hanc in parte habent valetudinem neque tamen aliquid ex hoc mali patiuntur. De dormitione illud quidem probabile mihi videtur, contagiosam esse posse, quando infectus patiens scabie, alio ve simili affectu curaneo labore, vel ab eo copiosus sudor erumpat.

De Lue Venerea

A

De

IN declarando Luis Venerea subiecto maxima inter scriptores varietas reperitur, ego tamen paucis rem expediam. Luis subiectum tripliciter considerari potest, vel in causa, quae in aliud agit, vel in eo, quod recipit, vel denique in eo, quod dispositum est ad suscipiendam Luem. Primum subiectum est excrementum putridum, & praeter naturam. Per excrementum, praecipue tenue intelligo, & vaporosum, quod propterea facile communicatur in poros corporis, ac meatus omnes momento ferè temporis ingreditur, subinde tamen potest esse crassum. Diximus esse putridum, nam cum Lues caloricam habeat qualitatem, consequenter putrefacit: ideo hoc excrementum propriam amittit formam si non ex toto, saltem ex aliqua parte, & quia putridum est, & quia veneficum. Non tamen ideo, sequitur Luem morbum formae esse vocandam, quod voluit Fernel. Morbus enim est affectus partus viuentis, Luis autem subiectum non semper est pars viuens. Hactenus de subiecto Luis, ut agit. Subiectum autem receptivum Luis triplici modo consideratur, aliud est in principio, aliud in medio affectionis, aliud denique in affectu confirmato, & antiquato. In principio, primò, & omnium maximè afficitur vaporosa substantia, fumosum excrementum, spiritus naturalis, si quis datur, sin minus, massa sanguinea vapor. Huic succedit ex contentis ichor, vel humor, qui pro naturali temperamento in eo corpore abundauerit, magis tamen, & prius inficitur excrementitius quam alimentalis, & inter excrementitios primum inuulsi, deinde vero utilis, ut id eo verè dixerit hic, Matthiolus dari Luem veneream sanguineam, biliosam, pituitosam, & melancholicam. De continetibus partibus magna est lis. Quidam volunt primò affici pudenda, alij cutem, alij caput, magna pars, ut est Nicol. Massa; Montan. Brasaul. Fallop. Tomitan. putat primam sedem esse iecur. Decipiuntur tamen. Licet enim naturalis facultas, & consequenter illius instrumenta primò, & per se affici videantur, non tamen semper ex iecoris affectione coafficiuntur, sed potest esse Lues in pudendis, in cute, in faucibus, in ore nulla adhuc existente laesione in hepate. Itaque non semper est iecur, sed aliqua dumtaxat ex partibus naturalibus, quaecumque tandem ea sit. In Lue autem iam vterius progressa subiectum est humor vsque adeò à priore statu, & temperamento mutatus, ut non sit amplius distinguenda secundum quattuor humores sicuti incipiens, sed pro certo asserendū Luis progressa, subiectum esse humores exustos: habet enim venenum hoc vim calidam, & exurentem, ut propterea si moretur in corpore humores etiam temperatos ad putredinem consequenter caliditatem, & exultionem inducit. Ex continetibus aut partibus laborat

iecur ipsum, & ventriculus ut membra principalia, praeter cetera, quae pustulas, vlcera, aut tumores contineant, hincque fit, ut & chylificatio, & sanguificatio vniuersa partim imminuatur, partimque deprauetur. In antiquata autem Lue subiectum proprium ex contentis sunt humores pituitosi tantum, & melancholici. Sicut enim hoc venenum, dum aliis ponit radices putrefacit, & exurit ita etiam temporis progressu innatum calorem exsoluit, & dissipat, naturalium facultatum substantiam adimit, ut ideo loco probi sanguinis pituitosus, & melancholicus succus generetur. Hinc factum est, ut antiquo hoc affectu vexati, decolores, subrumidi, vel cachectici, vel tabidi, vel exsanguis fiant. Inter continentes autem partes maximè laborant seminales, ossa, nerui, venae, & arteriae, membranosa corpora. Hinc etiam fit, ut non tantum partes naturalibus facultatibus destinatae, sed etiam vitalibus, & animalibus, iam eo affecta omnium symptomatum genera prodeant. Hoc est subiectum secundum tempora distinctum, quod Luem recipit: ex quo vnum colligitur, non omnem Luem esse contagiosam, & plerumque minus contagiosam esse vetustam, & confirmatam, quam recentem, & mediam. Lues Venerea, quae ex tophis tantum seipsam promiat, non est contagiosa. Contagium in excremento mobili, & calido est repositum: In tophis tale excrementum non continetur, etsi contineretur, ad genitalia non trāsmittitur. Idipsum dico de vlceribus, capitis, quae non facile per vsum Venereis alteri communicantur. Adest hac in re experimentum. Pateris quidam, qui vagesies ferè ligno Indico accepto, & ter intinctus hydrargyro numquam potuit tangere, etiam si cum virginibus consuetudinem haberet, eas tamen numquam infecti. Est etiam alius qui vlcere venerco in capite laborat, & topho in crure, cum crustis per totum corpus, & tamè vxorem non infecti. Hoc etiam scribit Antonius Musa quendam scilicet qui habebat vxorem laborantem Lue venerea circa mammās, numquam Luem contraxisse. Ea ratio est. Quando enim à parte affecta nihil tale exspirat, quod possit communicari: affectus non euadit contagiosus. Idèd dixi vetustum affectum esse minus contagiosum quam recentem, aut medium. Causam intelligetis facile, si quartum caput absolueris, quod est de dispositis ad suscipiendam Luem.

De dispositis ad Luem. Cap. IV.

Suscipiunt Luem promptè Veneream, qui sunt calidioris temperamenti, habitus rari, carnis mollioris, iuniores cuius, quam seniores, qui minimè sunt infecti, aut minus sunt infecti, quàm is, à quo Lues communicatur. Nam neque aequalis ab aequali, neque magis infectus à minus infecto patitur. Sexus muliebris promptius etiam affectum suscipit. Ex his verò, qui plus amantant, profusè osculantur,

aut linguis ludunt, aut difficilius semen emittunt. A promptius morbum contrahunt. Caveant autem illi potissimum, qui habent glandem præputio obiectam. Isti enim ut ego, & ante me Fallopius observavit, facillimè omnium Luem recipiunt, non quod glans sit mollior, ut voluit Fallop. sed quod sub præputio venenatam retineant substantiam, quæ postea maximas inflammationes, & vlcera excitat. Itaque cum res sic se habeat, illi etiam minùs communicant Luem Veneream, qui sunt frigidiore, minùs amantes, ad venerem minùs proclives, ut sunt, quia antiquo laborant morbo, ut idè aliqui facti sint impotentes, alij verò maxima cum difficultate venerem exerceant.

De Lue considerata in relatione ad effectus.

Cap. V.

Lue Venerea in relatione ad suos effectus considerata est principium causarum præter naturam, morbum omnium, ac symptomatum. Est principium causarum præter naturam, quia tanquam causa venefica aliam gignit in humano corpore causam veneficam: simile enim generat suum, simile. Est principium omnium morborum, & primò in intemperie, ac ea quidem tam communi, quam propria, communi calida, & frigida; calida quidem in febribus. Venereis vocatis, quæ (ut Ephemeris prætermittam) & putridæ, & Hæctica esse possunt, licet doctissimus Capiuaccus Luem hanc solidam cordis substantiam obsidere minimè concedat. Nos tamen & ratione, & experientia docti, Hæcticam Veneream dari posse profiteamur. Duos patientes hæc febre infectos curavi, quorum unus fuit Petrus Balsalù Venetus adhuc in viuis, & sanus. Altera verò fuit Nicoletta meretrix Venetijs notissima; quæ cum iam annos quattuor continuos Hæctica Venerea laborasset, ac per id tempus semper decubisset, ligni Indici decocto sanitati est restituta, ita ut hoc etiam tempore iterum artem meretriciam profiteatur. Ratio etiam id persuadet. Nam si datur febris Hæctica pestilens, potest dari, & Venerea pestilens. Si quis obijciat pestilentem Hæcticam ex Gal. 3. de prælag. 3. esse insanabilem, & id hanc quoque venerem sanari non posse, dico id verum esse, si utrumque venenum carnosam, vel seminalem cordis substantiam occuparit; sed si Lues sit tantum in torrida humiditate, poterit tandem, ut experientia docuit, expugnari. Itaque est principium & Hæcticarum, & putridarum. Duo sunt exempla similiter eorum, qui putrida Venerea laborantes solo decocto sunt sanati: Unus est, qui laborabat febre cum vlcerebus Veneris in capite, numquam sanatus nisi post lignum Indicis. Alter est Antonius Baccalaureus Barbitonfor. Venetus, qui cum pluries in anno febre laboraret, nunquam nisi epoto ligni Indici decocto, sanatur. Est principium intemperaturæ frigida totius corporis: Nam pro-

gressu temporis Lues partium principalium calorem innatum refrigerat, ut tandem cachectici, & hydropici evadant. Est principium intemperaturæ calidæ determinatæ: Sic enim datur Lues Venerea cum intemperie iccoris calida, & ea quidem inexpugnabili, ut ego experientia propria in quodam nobili Veneto sum expertus, expertique ante me, & post me sunt tres præcipue Medici Patavini: Mercurialis, Capiuaccus, & Aquapendens, & plurimi Veneti, inter quos est Massaria, qui tunc Medicinam Venetijs exercebat. Est principium intemperaturæ frigida determinatæ, cerebri præcipue, & ventriculi, ut ob eam causam fiant destillationes Venereæ, stupor, & torpor, paralyfis, epilepsia, laesa memoria, ut omittam ventriculi infirmitates, quæ omnibus ferè Venerea Lue infectis videntur esse communes. Est principium morborum in mala compositione, tumorum omnium, bubonum, phymatum, carbunculorum, acrochordonum, myrmeciorum, thymorum. Hæc frequenter fiunt circa obsecernas partes, ut alias omittam pustulas, quæ in universam erumpunt cutem, tumoresque glandularum, quæ sunt circa collum. Est principium in magnitudine imminuta, quia vel totum corpus, vel determinata partes mirum in modum gracilescent: Est principium morborum in numero deficiente: Sic enim decidunt dentes, oculi, ungues. Vitatur figura. Nam imminuuntur aures, consumitur extremitas nasi, eroduntur labra, quibusdam infelicioribus pudendum vlcere absumitur. Est principium obstructionum, luxationum. Et si mentio fiat morborum in soluta vinitate, vix dici potest, qualia, & quanta sint vlcera superficialia, & profunda, callosa, cancerosa, fistulosa, cheironia, & telephia vocata, phagedænica, omnia denique dysepulotica. Est quoque principium omnium symptomatum, non tantum quod est principium morborum, ex quibus fiunt symptomata, sed quia etiam absque morbo producit symptomata. Scio multos Medicos hanc doctrinam libenter non admittere: Certus tamen sum Gal. 3. de sympt. caus. c. 1. & primo de loc. affect. c. 7. voluisse non tantum ladi adiones ex morbo, quantum etiam ex obiecto. Itaque Lues Venerea, ut causa venefica, quæ excrementum, & alimentum coinguinat, poterit aliquando symptomata etiam sine morbo effigere, ut patet ex capillorum defluvio. Quidam enim sunt in quibus tota Lues in sudiginoso excremento reposita solum defluviu capillorum efficit, nullo apparente alterius morbi vestigio. Ex his iam satis constare puto Luem Veneream hoc tempore multò sauiorem esse, quam ab initio. Tria tantum observantur priores Medici, qui de hac Lue scripserunt; Aquilanus Leoniceus, Natalis Monthesaurus, & ceteri affectus scilicet cutaneos sub forma impetiginis, & pustularum, dolores, & tumores contingere. Paucis post annis alia quinque his tribus convexa sunt, defluviu capillorum, ynguium, dentium.

oculorum, & gonorrhœa, ex quorum omnium explicatione Brasauola potius acurate, quam vtiliter, ducentas triginta quatuor Luis Venereæ differentias collegit. Hoc tpe est omnium malorum principium, vt idem potius innumerat, quam numerabiles sint differentiarum. Sed iam receptui canamus. Lues Venerea est causa occulta, malefica, calida, humano corpori infensa per contactum agens, ex multiplici contactu producta primò, & immediatè in tenui, & vaporoso excremento reposita, subinde in ichoribus, deinde in humoribus excrementitiis præter naturam, tamen in excrementitiis naturalibus, postea vitilibus, mox in alimentalibus, denique in partibus solidis, quæ, vt dixi, est principium causarum præter naturam, morborum omnium, & symptomatum. Hæc est integra Luis Venereæ, definitio omnes partes continens, satis, superque descripta.

De differentiis Luis. Cap. VI.

EX dictis, differentia Luis Venereæ non difficili negotio colliguntur. Capiuntur autem à genere, subiecto, causis, tempore, magnitudine, motu, & more. A genere, & subiecto tot sunt differentia, quot sunt morborum, ac symptomatum species, quot ve in humano corpore similes, & dissimiles, partes. A causis tot sumuntur, quot sunt contactus modi. A tempore alia est incipiens, quædam in augmento, alia in statu, quo omnium inueteratissima. A magnitudine, quædam est magis intensa, & ratione essentia, & ratione symptomatum, quædam vero minus. A motu, alia velociter, quædam verò tardè mouetur. Denique à more, licet omnis sit mali moris, vna tamen est altera deterior. Harum omnium differentiarum signa sunt proponenda, in quibus tractandis summa est opus diligentia, ne error contingat, & affectum benignum pro maligno, vel malignum pro benigno sumamus.

De Signis. Cap. VII.

VERSABIMUR itaque primo circa signa, quæ indicant huius affectus demonstrat. Secundò agemus de adiuuentibus ad magnitudinem; Tum de demonstrantibus motum; mox de declarantibus morem. Et quia Lues Venerea aliquando symptomata habet conspicua, aliquando ita latet in corpore, vt non facillè deprehendi possit, versabimur primò in examinandis signis Luis conspicuis, postea verò latentis. Conspicuum verò diuidimus in tres partes, seu tempora, in principium, augmentum, & statum;

De signis Luis incipientis. Cap. VIII.

SIGNA principij, aut sunt ex congressu Venereis, aut aliter. Si primo modo, solent esse tria præcipuè, Gonorrhœa, Caries pudendi, & Bubo, licet

non sit abs re etiam Capillorum de fluxum inter hæc recensere.

Cognosceat autem hæc Luem hère connexam, primò si contigerint vel statim, vel paulò post vsu Venereis; præterea si patiens lassitudinem, ignauiam, torporem, & melancholiam insuetam sentiat, si caput graue, & dolens fiat. Quibusdam febricula etiam superuenit. Hec omnia his symptomatis, & morbis connexa ostendunt ea esse Venerea. Ceterum vnumquodque propriis notis à benigno est distinguendum.

Gonorrhœa igitur Venerea distinguitur sic à non Venerea, si fiat cum maximo ardore, quandoque cum priapismo, cum aliqua sanguinis eruptione, cum dolore, & inflammatione testiculi, & vasorum varici formium. Si materia, quæ excernitur sit flaua, vel viridis, & erosionem faciat in glande, si præterea illi succedat, qui neque inordinato, neque frequenti coitu vsus fuerit, denique si mitionibus & refrigerantibus remediis non cedat.

Caries pudendi quoque fit aliquando ex nimia vuluæ caliditate: Multos inuenietis, qui cum ad vos accesserint, hæc exulceratione laborantes, dicent id contigisse ex angustia locellorum, quod esset virgo, & tamen erit Caries Venerea, quæ sit triplex, vnaqueque propriis notis cognoscitur. Prima cæteris benignior amulatur in magnitudine, & eminentia grana milii, & est colore albo, est multiplex ita vt aliquando totam coronam circumdet. Disrumpitur vesicula in medio, & relinquitur punctum album, quod aliquando est duplex, simplex, & multiplex. Secunda differentia est vlceris profundioris cum labris duria. Tertia est vlceris, & profundius, & sordidi, aliquando liuidi, vel puniceo, dolorosi cum inflammatione, & glandis, & preputij.

Quoad bubonem. Bubo Venereus cognoscitur si fiat absque fonticulo in cute, absque vlcere, si sequatur Gonorrhœam. Si statim inuadat post suspectum coitum, vel paulò post. Et quia hic quoque est duplex, alter quidem sit ex materia contenta in glandulis inguinum, alter verò ex materia contenta in spacijs, in membranis, inter glandulam. Primi parui valde sunt, sine calore, colore, vel dolore, & vix suppurantur, immò ne vix quidem, alij in magnam molem excresecunt, & cito suppurantur. Quod si Lues absque venereo contrahatur congressu, nempe osculo, lactatione, dormitione, linteaminibus, & id genus alijs, incipiens cognoscitur, quia circa os ulcera, circa mammas inflammationes, rimæque exoriuntur; circa cutem vero postulæ varix erumpunt nullo, aut præexistente, aut presente humoris falsi, aut actoris argumento, sed quando hæc quoque in augefcente malo manifestari solent; idcirco de eorum omnium distinctione à benignis statim dicendum;

De Lue Venerea.

De signis Luis augescantis. Cap. IX.

Signa Luis progredientis, & augescantis multa sunt; defluuium capillorum, pustulae variae, scabies, impetigo, fissurae manuum, & pedum, dolores, tumores glandularum in collo, thymi, seu verrucae, acrochordones in pudendis, callosa, vlcera, Gonorrhoeaeque iam consumatae, & perseverantes; Quae omnia venefica esse cognoscuntur ex contumacia, deinde ex magnitudine, tertio ex modo exordij, de quo iam dictum est, praeterquam quod singula fere singulas habent notas. Nam ut defluuium capillorum praetermittam, quod cognoscitur esse veneficum, si fiat in corpore & capite alioquin sano, in cute munda, si confestim fiat, si praeter capillos, & barba, & cilia, & supercilia cadant, si praecesserit gonorrhoea, caries, bubo, quae vel confestim, vel paulo post exortum evanuerint. Pustulae venereae duorum sunt generum, quaedam crustosae, aliae sine crustis; & crustosae omnium maxime hunc affectum declarant. Habent enim talem eminentiam, ut aliquando in fronte, & capite arietis cornua emulcentur, sub quibus aliquando latet sanies, aliquando vero nihil prorsus continetur. Quaedam autem pustulae crustosae albicant in extremitate, in circumferentia mixtum habent colorem vix explicabilem ex rubro, & albo mixtum: Erumpunt quidem in facie, in capite, in barba, in toto corpore, magna tamen ex parte circa pubem, & coxas apparent. Scribit Fallop. hoc experimento distingui Venenatas à non Venenatis, si (ait) Venenatae ita confricentur, ut tollatur pellicula, post triduum immutatae apparent; benigniores vero sic confricatae augentur attractio scilicet sanguine, & eo quidem magis alimentali, quam in infectis. Rime manuum, & pedum Virginibus plerumque contingunt, ut experientia comprobavi. Distinguentur itaque benignae, à malignis hoc experimento. Quae maligniores fuerint ex assumpto allo, vel capis post triduum duplicantur, benigniores vero eodem sunt statu, praeterquam quod habenda semper est ratio personae, & praetitorum. Quo ad dolores. Maligni dolores multis modis cognoscuntur, primo licet articulos infestare possint, quidquid dixerit Fernel. magna tamen ex parte obsident spacia inter articulum, & articulum, praecipue vero afficiunt ossa furculae pectoris, quinimò uniuersum Thoracem: Accedit, quod magna ex parte noctu tantum exacerbantur. Causam vero ob quam, & spacia obsideant, & noctu magis affligant, & praecipue periostium tentent, non aliam esse puto, quam vitium iam in medulla ossis contractum. Ut enim docuit Gal. i. de usu part. medulla est ossis alimentum, impuro igitur existente alimentum primo quidem periostium veluti pars ossis mollior infectionem suscipit, ex qua dolores sunt potius noctu, quam interdiu, quia mem-

brana frigida superueniente nocte indurescit, & labem magis continet; progrediente autem morbo, etiam os corumpitur, & vitatur, ut etiam tophi, & caries succedant.

Impetigo, & scabies venerea non facile distinguitur à communi, cognoscitur tamen, si ex contactu veneris exordium sumplerit, si remediis non cedat, si alia Luis symptomata habeat connexa, inter quae, ut dixi, sunt ceruicis glandulae, quae ex eo maleficae cognoscuntur, quod diuturnae sint, & absque destillationis signis appareant. Quod pertinet ad Verrucas omnes, licet Gal. & antiquioribus cognitae, tamen cum in obscenis apparuerint paribus (obscenarum nomine omnes complector) magnam praebent Luis susceptionem. Neque enim thymi illi, et ista vulgo vocatae, aut acrochordones facile in illis locis absque impura Venere excitantur, praecipue vero tales erunt, si multum sanguinis emittent illiusque faundi, & corrupti, cuius ichor proximae partes attingens mordicat, & excoquat. Haec sunt signa augescens.

De Luis antiqua signis. Cap. X.

Signa autem Luis iam antiquatae sunt calli reliqui in pudendis post cariem, vlcera fistulosa, phagedinica, cancerosa, quae magnam carnis partem depascantur; Tophi in varijs corporis partibus, ossis caries, quae etiam si, & in tibijs, & brachijs appareat: fere tamen semper cranium, os palati, & narium exerceat; Ut idem meretrix quaedam, quam ego curabam, pro foetore narium vlcere; dum semel in mensa, ubi cum amasio sederet, nares emungeret, uulso dolore, ossis ipsius nasi frustulum exsufflauerit. Fiunt quoque melancholici, membrorum tremores, lese memoriae, destillationes, exanthemata, procidentiae columellae insanabiles, tinnitus aurium inextinguabiles, Pthisis, febres Hecticae, tabes, Cachexiae, Casus oculorum, dentium, aurium, & nasi erosiones, vno verbo totius corporis pallor, & imbecillitas. Haec satis superque antiquata iam morbum ostendunt, neque distinctiuis egent signis.

De signis Luis occulta. Cap. XI.

Sed si tam aperte non seipsum promat, quanam arte cognosci poterit occultatus hic morbus? latet aliquando mensibus, & annis. Curavi ego patientem, cui Tophi venerei in cruribus multi superuenerant annis viginti quinque ab acceptis Lue. Oportet itaque diligenter observare statum horum patientum, ut videamus, nunquid lateat anguis in herba. Primum autem videndum, nunquid praecesserint symptomata, quae tamen cito evanuerint, absque congrua curatione; Apparet bubo, & evanescit, apparet caries, aut gonorrhoea, & paulo post recedunt, videntur patientes aliam nullam noxam per id tempus sentire: consulunt tamen Medicum, rogant,

De Lue Venerea. A 3 quid

quid censendum sit in hoc casu; Interrogabitur A patientem num ita promptus ad Venerem, ut ante, vel impotentior sit redditus, an in lassitudinem spontaneam, & praecipue vlcerosam incidit, an melancholiam citra causam, an somnos perturbatos: Si enim haec contigerit, morbus latet, sed magis si sub oculis adsit circulus quidam liuidus, si facies sit insueto pallore infecta, & dolores quidam discurrentes, & vagi dumtaxat apparent, si pruritus virgae, si ardor urinae, & per quaedam intervalla superficiales quaedam erosiones in glande conspiciantur. His vel omnibus vel pluribus existentibus de tali agro non bene sentiendum est. Sed veniamus ad signa subiecti B Luem recipientis.

Signa Luis in hoc, vel illo subiecto.

Cap. XII.

DE huius, vel illius humoris abundantis signis, nihil dicam, ex alijs locis comparabitis hanc doctrinam cognoscendi vniuscuiusque humoris complexionem; quia tamen sedes, vel in humore excrementitioso, & inutili, vel in vili, & alimentali: Si in priore licet multae sint crustulae, pustulae, & vlcera, patientes neque macie conficiuntur, neque imbecillitatem sentiunt. Affectis autem humoribus alimentalibus, vel vtilibus, & maciem, & lassitudinem sentiunt. Quoad solidas partes, si fuerint externae, oculis conspiciuntur. Internae ex iam dictis symptomatibus distinguuntur: Cerebrum quidem ex tinnitu, melancholia, tremore, laesa memoria, vigilijs, excitata, vlcerebus narium, & palati: Arteria ex rauedine vocis, aut aphonia: Pulmones ex asthma, & phthisi: Musculi thoracis ex difficultate respirationis dolorosa cum maximo suffocationis periculo, ut ego semel in quodam patiente obseruavi: Cor ex febribus: Ventriculus ex laesa appetentia, & coctione: Iecur denique ab omnibus alijs affectibus, qui vel imminutam, vel depravatam consequuntur significationem.

Designis causarum. Cap. XIII.

CAusae autem facile innotescunt. Nam si cetera tracta sit Lues ex semine in utero Matris praeter suspicionem morbi in parentibus, accedit quod pueri oboriuntur emaciati, vlcerebus pleni, quandoque ceci absque cilijs, vel supercilijs, qui minimè sunt vitales, & dum lac sugunt nutrimentum statim inficiunt. Quod si causa fuerit sanguis menstruus, oriuntur infantes sine capillis, cilijs, supercilijs, valde pallidi quasi cachectici, ut expertus sum, quibusdam vlcera crustosa in capite multa oboriuntur, quae etiam totam faciem tegant cum excitatis periculo. Quod si vitium contrahant ex nutrice, cognoscitur ex vlcerebus linguae, palati, & faucium, sicuti si nutrix accipiat ex puero, papilla primum inficitur. Ceterae causae, quae per contactum agunt, siue sit dormi-

tiosculum, vsus veneris, ex relatione cognosci poterunt.

De signis magnae Luis. Cap. XIV.

Magnus cognoscitur hic affectus, si aut vnicum habeat symptoma, sed magni momenti, magnam Gonorrhoeam, magnos dolores: aut si plurima simul habuerit. Cognoscitur velocis motus, si statim a coitu symptomata appareant, si noua paulò post superueniant, si tempus, regio, & constitutio fuerit calida, aetas iuuenilis, temperamentum biliosum, vel sanguineum. Denique cognoscetur Luem mali moris, si vnumquodque symptoma in suo genere alia quoque pessima habeat connexa symptomata, v.g. si caries sit profunda, sordida, liuida, dolens, cum inflammatione, signum est Luis pessimi moris. Idè dico de Gonorrhoea, & alijs symptomatibus.

De Prognosticis. Cap. XV.

Prognostica huius Luis breuiter comprehendendi possunt. Lues recens facilius curatur, quam antiqua. Inter Lues, bubo, defluuium capillorum, pustulae scabies, lichenes, acrochordones mitiorem ostendunt morbum: Gonorrhoea, dolores fixi, & alia enarrata grauiorem. Sanatur autem facilius in mulieribus quam in viris: praecipue verò in illis, quibus menses superueniant breui post acceptam Luem. Ex virus etiam illi minus mali incurrunt, quibus vires excernendorum noxiorum per intestina, per haemorrhoides, & vesicam, & sudores ipsos sunt aperte. Propterea rustici, naueque, pistores, & alij exercitati homines absque vilo auxilio, ob vitam exercitijs debitam solum, vel ab Lue sanantur, vel saltem illius noxas minus experiuntur.

De Praeservatione. Cap. XVI.

Cum vnicuique gratius fuerit à Lue Venerea praeservari, quam citò, & integrè curari, idè de praeservatione ante curationem quaedam praemitam. Praeservatio autem, vel respicit illos, qui luctam Veneream non sunt experti, vel eos qui post luctam aliquid mali iam suspicantur. Primi eo pestis remedio breui praeservari possent, longè citò, nunquam: Qui tamen sic voluerint proprio aliquo periculo pugnam experiri, his saltem ingenijs se muniant. Primo quidem pudenda diligenter abluant vino austero, in quo ebulliant scobs ligni Indici, rosa, myrtus, balaustia, acacia, hypocistis, & post lotionem super glandem linteola exsiccata detineant, qui antea fuerint preparati decocto descripto à Gabriele Fallopi. In proprio tractatu cap. 89. quae descriptio etiam summopere mihi probeatur, fortè tamen infirmior erit hac ipsa, quam nunc proponam.

*De Gentiana**Aristolochis rotunda**longa**Calamintha**Distamni**Scordij Cretici**Tormentilla**Angelica**Imperatoria. an. ꝑnc. j.**Scabiosa**Fumaria**Betonica**Absinthij. an. m. j.**Ligni Aloes drach. ij.**Santalorum omnium**Rasura eboris**Cornu cerui vsti. an. drach. j. s.**Acacia**Hypocistidos**Balaustiorum**Rosarum an. m. s.**Ligni Indici lib. j.**Vini maluatici lib. ij.**Aqua scabiosa**Fumaria**Rosarum an lib. j.**Aqua Plantaginis. lib. ij.**Præcipitati optimi. drach. ij.*

Infundatur lignum in dictis aquis, & vino, bulliat ad consumptionem medietatis, in fine vero addantur cetera omnia, quæ ubi parum ebullierint, relinquuntur infusa per horas 24. deinde iterum bulliant ad consumptionem tertiæ partis; facta forti expressione, habeantur linteola multa præparata ad magnitudinem glandis, vel vulgæ, & infundantur in dicto decocto, exsiccantur in umbra, deinde secundo, & tertio infundantur. Ista linteola detinentur ante usum Veneris, indurant membra, exsiccant superfluas humiditates, resistunt putredini, ita ut dixerit Fallop. se ex mille, quibus hoc præbuit antidotum, neminem Lue vexatum fuisse. Poterit itaque unusquisque pro suo arbitratu linteola nova in femoralibus gerere. Neque ea sunt prætermittenda quæ post usum veneris ad præseruationem faciunt, sunt autem lotio virgæ cum propria vrina. Efficacius remedium est lotio facta cum aqua calente. Efficacius adhuc esset lixiuium calidum; vinum quoque calens erit optimum, quo non extrema tantum glandis, sed totum membrum, & testes, nec semel tantum sed pluries duorum saltem dierum spacio abluantur. Hac eadem ratione nutrices à lactu infantium venenato præseruari poterunt. Sed si iam cupiam aurardoc in vrina, vel excoctatio in pudendo statim post venerem appareant, fortioribus est agendum, extrahendum est virus, intercipiendæ sunt viæ, ne intro feratur. Interioribus alexipharmacis agendum, quibus profligetur, & superetur. Ad extractionem faciunt decoctiones in vino ex dictamno, calamintha, scordio, gentiana,

A ligno Indico; faciunt suffumigia ex Cinabari, thure, myrrha, ligno Aloes, Croco; faciunt quoque exenterata animalia, ut pulli vel columbaei, vel gallinaei, Catuli pulmones calidi pudendis ipsis impositi; faciunt frictiones ex panis asperis, levis scarificatio, Corniculi appositio. Non est improbanda, si caries adhuc non appareat, lotio ex aqua vitæ, linimentum ex Theriaca, vel Mithridatica confectio, ynguentum, seu mixtura ex caricis, nucibus, & succo rutæ; si quispiam voluerit quoque vesicatorium adhibere, erit fortius remedium ceteris ac magni usus. Ad intercipiendam vero fluxionem ad interiora, imponatis ynguentum defensionum latitudinis duorum digitorum per transuersum pudendi propè pubem, iniiciatis per syringam paucam aquam plantaginis in viagam, Saccharo, tamen mixtam, qua sæpius abluantur. Quoad interiora alexipharmaca, in frigidioribus temperamentis non improbaturs usus Theriacæ, Mithridaticæ confectio, diascordium, denique omnia alexipharmaca, quæ ad præseruationem pestis commendantur, huic quoque rei maximam operam ferunt: si tamen temperamentum fuerit calidius, ab his calidioribus abstinendum, & loco illorum vtamini bolo Armeno, terra Samiæ, Silésiaca, Cornu ceruino, margaritis præparatis,

B quibus subiungatis succum citri, vel limonuræ, aquam acetosæ, vel plantaginis. Siquis in proprium habuerit aquam meam cordialem, erit etiam ex usu. Sed si caries iam se ipsam promat, non statim arbitrandum hanc egere ligno Indico, potest caries in primo congressu in glande excitari, si statim appareat absque alia alterius partis noxa, ideo licet vniuerso corpori aliqua ex parte sit præspiciendum. Cariei tamen statim est occurrendum, ita ut interficiantur. Aqua illa fortissima, qua vniuntur aurifices ad segreganda metalla, qua vniuntur quidam Empirici mihi non probauit. Venerunt aliqui ad me post huius aquæ usum, quorum glâs in maximam excreuerat molem, & inflammatione, & magna, & difficili fuere tentati. Extrahitur enim ex

C alumine rocheæ, sale nitro, & vitriolo Romano; Hæc itaque dimittatur, neque admittendi illi sunt, qui in his casibus vtuntur frigidis, & reprimentibus aqua rosacea, plantaginis, vel simili, venenum enim intro propellunt. Vsus præcipitati maximè conuenit, estque singulare remedium, si debito modo eo vtamini. Debitus modus est, ut in moderata carie, de qua nunc; accipiat præcipitatum drac. 1. ynguenti rosati, vel butyri recentis ꝑnc. 1. miscuantur, & vtamini hoc medicamento non continuato, sed interponetis aliquando tempus alicuius lotionis calidæ, & emollientis, ne forte ex præcipitato callus inducatur. Itaque post horas 24. tolletis medicamentum, abluatis membrum decocto maluæ, sem. lini, cum portione ligni Indici, & si opus fuerit, iterum superponatis præcipitatum. Quoad providentiam totius

corporis, si fuerit plenum corpus, blandissime A est expurgandum lenientibus tantum medicamentis, ne forte purgantia venenum, quod in extrema tantum est parte, ducatur interiùs; idè nisi caries inflammationem habeat connexam, consulo in his casibus abstinere a sectione venæ. Quod si inflammatio fuerit connexa, potius secabitis venam pedis, quàm brachij. Hæc sunt agenda, ut præferrentur patientes à Lue.

De Curatione Luis Venereæ. Cap. XVII.

Luis Venereæ curationem in tres partes distinguam, quarum prima affectus recentis remedia continebit, secunda circa augescerentem, tertia denique in antiquo affectu versabitur. Cum autem prima differentia primis affectionibus innoscat bubone, carie pudendi, & gonorrhæa, idè in hac parte tractanda de his etiam tribus agemus. Quæritur itaque quid agendum circa illos ægros, qui nuperrimè in bubonem, pudendi cariem, aut gonorrhæam inciderint. Primum autem, quod pertinet ad sanguinis missionem, licet magna Medicorum pars generalia præcepta satis esse arbitretur, pro hoc puncto dirimendo, res tamen ita non habet. Dicunt isti cum Galeno 4. de tuenda val. 4. in plenitudine vel exquisita, vel notha sanguinem semper esse mittendum, in cacochymia nequaquam. Ego verò sicuti illud libenter recipio, in exquisita cacochymia sanguinem non esse mittendum; ita in plenitudine quacumque apparente bubone, carie, vel gonorrhæa in sectione venæ cautè admodum succedendum esse existimo. Prudentiores, inter quos est Fallop arbitrantur in bubone augescente sanguinem non esse mittendum, sed tantum in facto, qui per sanguinis euacuationem retrocedere non possit. Huiusmodi sententia licet videatur non improbanda, plenam tamen huius auxilij institutionem non docet. Ita enim quid agendum in Gonorrhæa, carie? Præterea bubo incipiens, & caries aliquando maximam habens inflammationem, maximosque dolores, ut non semper sit eodem modo procedendum. Itaque arbitror hac in re illud idem esse agendam, quid præceperunt Paulus, & Auic. in curatione morsus animalium venenatorum, ut scilicet si morsus maximam inferat ab initio inflammationem & dolorem, statim sanguis mittatur: si non inferat, prætermittatur, & venenum potius attrahentibus, & euacuantibus expurgetur. Sed statim dicent: Si secetur vena in principio, intro trahetur virulentia, & afficientur partes principes: facile occurrimus: nam si secetis venam infernam, nullum tale imminet periculum, imitami Gal. consilium, qui laborantibus partibus infra renes, inferiores venas secat; in bubone, carie, & gonorrhæa laborant partes infra renes; ergo inferiores venæ aperiendæ, sicque

nullum imminet periculum infectionis in affluente sanguinea, aut iecoria. Quod si neque bubo maximum inferat dolorem, neque caries, vel gonorrhæa inflammationem, & dolorem, laudo, ut in bubone non mittatis sanguinem, nisi cum iam apertus sit, in aliis duobus affectibus potest aperiri vena statim ab initio.

Quod si vires non sustineant venæ sectionem, adhibeantur hirudines, scarificatæ cucurbitulæ, infernis tamen partibus.

De lenientibus. Cap. XVIII.

De lenientibus est eadem dubitatio, utrum in propositis affectibus conveniant. videntur enim facultatem continere attrahendi virulentiam ab externis partibus ad internas; sed verè lenientia non obtinent; tunc igitur exhiberi poterunt in Gonorrhæa; cassia præcipue cum Terebinthina, in hanc formam.

℞. Floris cassiæ noviter extractæ. drach. x.

Terebintina lota in aqua mæluarum, drach. ij. misce cum saccharo f. boli.

Exhibeantur syrupi: violac. solut. manna, mel rosaceum, rorip. rosac. solut. syrup. de Polypod. pro humorum peccantium varietate. Quod ad syropos, nullus est syrupus, qui Luem Veneream possit præparare, venenum est, & omne venenum curatur vel euacuantibus vel alterantibus à tota substantia; quamquam primæ etiam qualitates non sint contentinendæ. Itaque si in alterantibus medicamentis aliqua Luis Venereæ ratio sit habenda, syropos ex ligno conficere oportebit; Poterit autem simplex sic parari.

℞. Ligni Indici raspati ex medullis. lib. ij.

Infundatur, & bulliat f. a. in aqua fontis lib. 13. v. sive ad consumptionem plane medietatis, facta expressione adde sacchari fini. q. s. misce, f. syrupus.

Huius syrupi dabitur vnc. j. addetis deinceps alios quoque syropos, & decoctiones, quæ proprium uniuscuiusque peccantem humorem respiciant. Post syropos convenit purgatio, circa quam multa occurrunt dubia. duo tamen sunt præcipua; primum, an conveniat; Secundum, si convenit, utrum conveniat per medicamenta robustissima. Cymica à Paracelsistis inventa. Quod non conveniant, ratio primùm persuadet; Retrahunt enim hæc medicamenta ab extremis ad intimas partes; ergo fugienda. Ex altera parte, certum est, Venenum hoc putrefacere, & impura corpora promptius venenum, & putredinem suscipere. Itaque ut singulis prospiciamus, si bubo appareat, laudo à purgationibus abstinendum, donec aperiatur, si autem caries, tamdiu morandum quousque cariei malignitas compescatur; quibus autem ingeniis, audietis postea; tunc verò purgantia sine periculo administrantur. Sed quænam sunt ista? debent ne administrari communia, Agaricus pro pituita, Rhabarbarum pro bile; Elleborus, Polypodium,

podium, Sena, & alia pro melancholia? An potius licet deuenire ad vsum Præcipitati, aut Turbith mineralis, vel ad oleum dulce Mercurij, quæ à Chymicis administrantur, & à probatis etiam quibusdam Medicis recipiuntur, inter quos est Lucas Ghinus vir aliquin doctissimus. Ego non puto in Lue Venerea recenti tanto opus esse auxilio. Præcipitatum, oleumq; dulce Mercurij vim habent propellendi Venenum à partibus internis, cum iam afficiantur; Idcirco cum Lue recentis morbus sit tantum superficialis, neq; penetrauerint ad interiora, tanto non est opus auxilio. Communia igitur sufficiant.

De Bubone, Carie, & Gonorrhæa. Cap. XIX.

IN recenti Lue cum tria præcipue appareant præter naturam, Gonorrhæa, Caries, & Bubo, dicam breuiter in singulis quid agendum. Quod igitur ad Gonorrhæam; hæc duplex esse potest legitima, & falsæ; legitima est fluxus seminis acris, & mordacis irritantis expultricem vasorum omnium, & testium: Acrimonia autem, & mordacitas partim ex putredine, partim ex bilis commixtione, partim deniq; ex venefica qualitate prouenit. Falsa autem gonorrhæa est fluxus materię saniosæ, quæ ex vlcere in interiore pudendi parte existente educitur, quibus occurrendum, vt dictum est secta vena in pedibus, exhibita cassia cum terebinthina sic.

R. Flor. cass. nou. extract. drach. x.
Terebinthina lota in aq. viol. vel rosa. dr. ij
misce cum saccharo fiant boli.

Syrupi sint tales.

R. Syrup. Violat. simpl.
de Nymphæa.
de Liquiritia. an. vnc. i.
decoct. Violarum.
Hordei.
Nymphæa.
Granorum Sebesten.
Maluarum.
Liquiritia.
Liqui. Sassa. vnc. jv.

misce prosyrupo.

Repetenda est Cassia, & dum assumuntur Syrupi abluendæ sunt partes genitales aqua tepida cocta cum hordeo, & malua, & nymphæa; post duos autem, vel tres dies ab hac louone misceatis vinum aque, & decoctioni propositæ lignum addatis; Interim inungendi sunt testes instigante Galeni, & rosaceo Mesuz, & in virgam hoc iniicere oportet decoctum.

R. Aquæ Plantaginis.
Rosarum. an. vnc. ij.
Ceruse lota in aqua rosarum drach. ij.
Lithargyri drach. j.

bulliant simul vsque ad consumptionem tertie partis, colaturæ adde sacchari si. parum.

Iniiciatur decocto sæpius in die, vt diligen-

Ater abluantur partes omnes internæ. Quod si caries glandem occupet, dubium est, an in curatione conueniat vltus præcipitati, quales nos laudauimus in illis, qui potius huius mali suspitione tentantur, quam vt legitimam cariem Veneream habeant. Fuerunt, qui putarunt minime hoc medicamentum conuenire, inter quos est Alexander Trallianus, qui vtitur hoc argumento. Quod præcipitatum sanet vlcera propellendo luem ad penitiora corporis, idcirco occasionem maioris mali præbet; Ratio sanè est alicuius momenti, sed tamen experientia, quæ etiam ratione non caret, est in oppositum: Neque enim vllum adhuc præcipitato nobilius excogitatum est medicamentum ad pudendi cariem.

B Quod dicit Alexander de percussione facta ab hoc medicamento, non est omnino verum, licet argentum viuum id faciat, non facit tamen præcipitatum rectè administratum, quia præcipitatum recipit vires caloris, & exsiccantes; consequenter attractorias, & expurgatorias à calchanto, & alumine, quorum aquæ præparatione præcipitati ingrediuntur. Accedit quod præcipitatum non debet administrari cum reprimentibus, sed cum butyro, vel alia pinguedine. Tertio illi tantum parti administratur, quæ crassam continet sorditiem, quam mirificè tollit, ideo neque in vlcere mundo, neque in circumferentia vlceris medicamentum est adhibendum; Denique, vt antea dixi, extrema pudendi, propè pubem pars adstrictorio muniatur medicamento. Itaque adhibeatur & bis & ter, & eo vsque, donec crassa sordities prorsus tollatur, & caro rubra appareat, tunc verò non eritis solliciti de cicatrizando vlcere, sed diu apertum est retinendum imposito in filamentis Iude vnguento vsque ad triginta, & plures dies Qui enim cito has caries sanant, aut bubones, vel testiculorum inflammationes, vel gonorrhæas vel defluuia capillorum, aut alia inferunt mala. Post congruam itaque expurgationem, sicceat deinde, & cicatrix obducatur puluere tuthiæ, vnguento ex tuthia, ex cerusa, vel simili. In Bubone autem, si facilis erit suppurationis, adhibeatur emplastrum ad suppurandum, tale.

Radicum Alibæ costarum, & per cribrum
transmissarum. vnc. ij.
Caricarum pinguium costarum, & con-
susarum. vnc. j.
Farina triticæ.
Semen lini. an. m. j.
Axungie suilla. vnc. ij.
Decoct. alibæ.
Caricarum.
Maluarum.
Sem. lini.
Passularum q. s.
Misce. f. Emplastrum ad ignem.

Quod si non modo facile suppureretur, verum etiam, ægrè intumescat, agendum primo attractantibus, deinde suppurantibus. Inter

attra-

attrahentia est exercitatio, ambulando, ludendo
pillâ, saltando, præcipue in pedem læsi inguinis,
Cerata attrahentia, vt diachylon simplex, & com-
positum, Ceratum Sacrum, appositio Cucurbitu-
lulæ non scarificatæ; Quibus non conferenti-
bus, tale creatum poterit confici.

Re. Sagapeni.

Oppoponac.

Ammoniaci.

Idellij. an. drach. ij.

Euphorbij.

Sinapis.

Piperis.

Pyrethri. an. drach. j.

Saponis nigri. vnc. s.

Dissoluantur gummi in aceto, addantur pul-
ueres, & cum pice, ac cera sufficienti fiat cera-
tum. Vbi iam locus intumuerit, tentanda est sup-
puratio, quæ si intra quattuor, vel sex dies non
successerit, non est cunctandum, licet pus nõ ap-
pareat, caustico locus est aperiendus; Caustici
materiam habetis venalem apud omnes. Aper-
to ergo loco, vlcus etiam diu apertum est conti-
nendum turunda imposita, vel in albumine oui
cum luteo (si facta fuerit incisio) vel in vnguen-
to Iside (si apertus sit locus per causticum) post
sublatam tamen crustam, vno verbo hac in par-
te sit Chirurgus prudens, qui pro qualitate, &
quantitate puris modò suppurantibus modò ab-
stergentibus & siccantibus, denique etiam con-
solidantibus utatur. Sed licet hæc in Lue recen-
ti sint administranda, non est tamen prætermi-
tenda, ratio internorum medicamentorum, qua-
lia autem debeant esse, non apud omnes vno
& eodem modo, expositum est. Dicam de his
quàm breuissimè.

De internis. Cap. XX.

Quidam existimant in hac Lue recenti sa-
tis esse vti medicamentis diaphoreticis,
sudorem excitantibus, & alexipharma-
cis communibus, idè quidam laudant trochiscos
viperinos, vt Ioannes Benedictus, alij theriacam,
vt Ioannes Almenat Hispanus, qui aquam facit
ex theriaca, & alijs sudorificis compositam ad ex-
pellendam Luem Veneream per sudorem, quem
secuti sunt inter recentiores Rondelet. & Fer-
nel. qui aquas confecerunt destillatas ex theri-
aca, dictamno, carduo benedicto, tormentilla,
ac alijs sudorificis, vt Luem incipientem per
cutem profligarent. Hæc intentio propellendi
infectionem Veneream ad extimas partes per
aquas dictas theriacales non videtur extra ra-
tionem, sed tamen intemperamentis calidio-
ribus, hæc sola non vsque adeo probatur: Non
in temperamentis calidioribus, quia feruidis-
sima est; Infunduntur enim hæc in vino, &
aqua alambicata est fortior aqua vitæ commu-
ni; Non probatur sola, quia Lues Venerea nul-

Alum habet alexipharmacum magis propriam,
quàm lignum: Idè si in quibusdam frigidiori-
bus locum habeat, misceatur vel cum decocto,
vel cum oleo, vel cum extracto ligni, de qui-
bus dicam postea. Sed quæret aliquis. Debet
ne vnusquisque, qui in bubonem, aut cariem in-
ciderit vè hoc alexipharmaco? Est ne coactus
accipere lignum? Cui respondeo, si quisplam à
congressu mulieris statim inciderit in Bubonem
vel Cariem, & statim inciderit Medicum,
curatusquè fuerit, vt dictum est, is certè non
indiget decocto ligni Indici; potest quidem illud
accipere per octo, vel decem dies; potest vti ex-
tracto, vel oleo ligni: sed non est coactus, vt sa-
nètur, accipere decoctum per dies xxx. Quod
B si Caries, vel Bubo apparuerint tantum octo,
vel pluribus diebus à congressu, suspicandum
de interna viscerum affectione. Huic itaque pro-
spiciendum fortiori decocto, de quo postea.

De augescens Lue curatione. Cap. XXI.

Augescens Lues inflammationis, ac putre-
dinis argumenta profert conspicua, ideo-
que præter bubones, gônorrhæas, & benignas
caries, vlcera, ac pustulas, pruritus, & impeti-
gines, crustas, tumores varios inflammatorios,
& capillorum defluuium, habet connexa, de
quibus nunc sigillatim agendum, initio à pur-
gationibus vniuersalibus desumpto. De venæ
sectione ambigit Fernel. Galeni testimonio mo-
tus: 4. de tuenda valet. cap. 6. qui humoribus in
cutem confluentibus venæ sectionem tamquam
retractoriam prohibet, sed non est vniuersaliter
hæc sententia accipienda. Si pustulæ iam inci-
piant erumpere, satius est scarificatis cucurbitulis
materiæ motum addiuuare; si iam eruperint,
corpusq; sit plenum, retrocessionis periculum nõ
adest; sunt enim pustulæ veneræ duræ admo-
dum, & crustosæ, & ad omnem motum diffici-
les, in quo casu si Gal. non abhorret ab his, quæ
retrahunt humores ad partes internas, vt colli-
gitur ex 3. in 6. Epid. 30. in casu Simonis, qui
latus habebat pustulas, in hoc etiam casu venæ
sectio non est verenda. Secetur autem vena ie-
coraria, nam deriuatione est opus, iecur iam in-
fectum supponimus; Post sectam verò venam
conueniunt quoque sacrificatæ cucurbitulæ, neo
semel tantum, sed vt voluit Nicol. Massa, bis
& pluries repetitæ. Alius leniatur vel hoc
bolo.

Re. Eleælenit. vnc. j.

Floris Cassia. vnc. s.

Semin. Citri. drach. s.

Misce cum saccharo f. boli.

Si voluerint patientes potionem, sit talis.

Re. Syrup. de Polypod. vnc. ij.

*Idell. vel. Syrup. rosæ. sol. (prout vide-
bitis corpus vel magis biliosum vel pi-
tuitosum) vnc. ij.*

Decoct. cardui. q. s.

misce

misce f. potio.

In syrupis etiam illa sunt semper eligenda, quæ exustionem corrigant non præternitis ijs, quæ proprium vniuscuiusque temperamentum respiciunt; Idem syrup. de fumot. simplex semper accipiat. In corpore autem biliolo huic syrupo addatis violarum simplicem, syrupos de Endiuia, de Cichorio, de Nympha cum aquis, vel decoctis accommodatis. Si abundauerit lucus melancholicus, addatis syrupum de pomis simplicem, de succo borraginis, de succo buglossæ, cum decocto lupulorum, borraginis, melissæ, buglossæ, corticem citri. Si abundauerit pituita, addatis oxymel simplex, syrupum de betonica, de stœchade, de menta, & alios pro partium varietate, cum decoctis proportionatis. Purgatio princeps instituatur, vel per bolos, vel potionem, vel pillulas; bolus sit talis.

℞. Elect. lenit. drach. vj.

Confect. Hamech. vnc. j.

misce, cum saccharof. bolus.

Si pituita abundauerit, accipietis drach. ij. confect. hamech. & drach. ij. L.aphenici. Si bilis, sumetis drach. j. confect. hamech. & eundem elect. de succo rosarum, vel elect. rosati Mesue. In portione etiam vario modo agendum, pro varietate temperamentis. In biliolo, & melancholico hæc erit conueniens.

℞. Corticum Hellebori nigri, (qui purgat utramque bilem) drach. j.

Infundantur S. A. in decoct. cord. cum drac.

ij. senf. & facta expressione add.

syrup. de Polypod.

Rosati solut. an vnc. ij.

Misce fiat potio

In pillulis similiter habenda est ratio diuersitatis humorum. Itaque vnicuique ætati iam consistenti præbere poteritis drach. x. pillularum Cochiarum præparatarum cum Helleboro, istis addentes in biliosis corporibus pillularum de Tribus cum Rhabarbato drach. i. In melancholia pillularum de fumot. drach. s. In pituitosa pillul. de Agar: Mesue, vel de Hiera cum Agar. drach. s. vel in debilibus accipietis Mastichinas. Post hanc primam purgationem succedat secunda per syrupos compositos, quorum multiplex, & varia est apud auctores descriptio. Est syrupus, qui vocatur Domini, Augustini, est de Montani Veronensis, est & Helidei Bononiensis, Lucas Ghinus etiam habet proprias descriptiones, sicuti & Andreas Matthiolus, vnicuique humori appropriatas. Ego, ne vos confundam, consulo vt utamini hoc syrupo, nam omnibus temperamentis conuenit.

℞. Syrup. de pomis compos.

de fumot. compos. an. vnc. j.

Decoct. epithymi Mesue. vnc. ij.

misce pro syrupo.

Accipiant patientes quinque vel sex ex his syrupis, Robustiores singulo quoque die; Imbecilliores alternis diebus. His absolutis, in-

A terposita vna, quietis die, iterum accipiat aliquæ ex dictis purgationibus; quibus tamen cum minimè sint curati, quaeritur, quid vterius sit agendum? Hac in parte duas esse video præcipuas Medicorum intentiones; vna, fuit eorum, qui putarunt posse Luem Veneream profligari sensibilibus per aluum, & vomitum excretionibus, Altera est eorum qui vtuntur sudorificis, & alexipharmacis. Dicam primò de prioribus, mox de secundis. Priores multa excogitarunt electuaria, pulueres, tabellas, decoctiones vel in aqua, vel in vino, quibus Veneream luem sensibilibiter expurgant. Quò ad electuaria; multa passim inueniuntur venalia potius apud Empiricos, quam apud Medicos, quæ ista retinent pro magnis secretis. Tale electuarium venale est Venetiis apud Pharmacopolam à tribus modis; Aliud administratur à quodam Empirico Venetiis ad ripam Blasij Aliud est Patauini apud Pharmacopolam à Speculo; Alia denique plura reperietis similia. Componuntur vario modo: Nam quisque ab aliquo probato scriptore descriptionem est furatus. Primò quidem est electuarium ex fructibus ebuli maturi, quod sic conficitur.

℞. Fructuum ebuli maturorum. lib. ij.

Agarici. vnc. j. s.

Vini maluatici. Cyathos ij.

C Manibus conteruntur grana ebuli, miscentur cum vino, & Agarico, ponuntur in olla vitriata per horas ad consumptionem 24. coquantur usque vini quod residuum est, transmittitur per setaceum, & pro singula Vncia additur vnc. i. syrup. de acetos. citri, & Sacchari fini vnc. i. deinde pro singula libra adduntur lapidis Armen. Helleb. nigri an. drach. ij. & sit elect. Dosis est drach. j. vel drach. j. s.

Vtuntur hoc electuario per 30. vel 40. dies, sed interposita aliqua quietis die, in qua accipiunt patientes, vel saccharum rosatum; vel conseruam borraginis, vel aliam similem ad vnc. j. Descriptionem Electuarii in Lue Venerea frequenter vtitur, hunc in modum habet.

℞. Salsæ subtiliter puluerisatæ, vnc. ij.

Tartari albi. vnc. j. s.

Sena. vnc. ij.

Corticum Helleb. nigri. vnc. ij.

misce f. elect. cuius dosis est vnc. s.

D Quamquam autem, qui præbent hæc electuaria tamquam secreta, integram polliceantur curationem, tamen potius morbum, & symptomata demulcent, ac protrahunt, quam vt funditus eruant; tamen in pauperibus, vel in illis, qui negotiis sunt implicati, non sunt improbanda: Idem ego quoque in his casibus hoc electuario vt conueni.

Ligni Indici, lib. ij.

Salsæ, lib. j.

Cortici, lib. s.

Infundantur in aqua lib. 30. deinde bulliant ad consumptionem medietatis, addendo.

Felli.

Folliculorum senae, vnc. viij.

Polypodij,

Epithymi, an. vnc. iij.

Helleb. nigri, vnc. i.

Miobalanorum omnium, an. vnc. s.

Passularum pinguium, lib. i.

Bulliant simul ad consumptionem medieta-
tis, & facta expressione.

Re. Prunorum Damasceborum, lib. ij.

Bulliant in dicto decocto donec mollescant, ita
ut extrahantur nuclei, pulpa transmittatur per se-
taceum, quæ iterum bulliat in dicto decocto vs-
que ad mediocrem consistentiam, tunc adde,

Floris Cassie, vnc. vj.

Senae puluerisate, vnc. s.

Sacchari fini, q. s.

misc. f. elect. cuius dosis erit vnc. s. vel
drach. vj. per dies 30. vel 40.

Præter electuaria exhibentur pulueres, qui
pro robustioribus valentissimi, pro infirmioribus
infirmitates concinnantur. Robustissimus pul-
uis erit talis.

Re. Hermodactyl. scrup. j.

Turbith. scrup. ij.

Senae. drach. s.

Salsæ. scrup. j.

Gingiberis. gr. vi.

misc.

Datur in iure, vel in vino 20. vel 30. & plures
dies, neque abstinendum à vino, neque à carni-
bus, sicuti neque in assumptione electuaria.
Singulis quattuor diebus semel conquiescunt
patientes, utunturque eo die vel iure pingui cum
saccharo, vel clystere, ex iure, vel lacte, saccharo,
& butyro. Infirmitas pulvis erit talis.

Re. Salsæ,

Corticis, an. drach. s.

Senae. drach. j.

Turbith. scrup. j.

Gingiberis, gr. iij.

misc.

Accipiat eodem modo. Alii pulueres pau-
cis mutatis possunt eodem ferè modo parari.
Quod pertinet ad rotulas, ipsæ quoque sicuti &
pulueres, sunt grauiiores, & leuiiores. Grauiorum
forma hæc erit.

Re. Hermodactyl. drach. ij.

Turbith. drach. j. s.

Helleb. nigri. drach. j.

Rhabar. elect. drach. s.

Gingiberis.

Cinnamomi. an. scrup. j.

sacchari fini dissoluti in aqua sumaria, q. s.

misc. f. confectio in rotulis.

Leuiiores erunt tales.

Re. Senae pulueris. drach. ij.

Turbith.

Agarici trochiscati.

Rhabar. elect. an. drach. j.

Gingiberis.

Salis Gemmae.

A

Cinnamomi, an. gr. iij.

Sacchari dissoluti in aqua sumaria, q. s.
misc. f. confectio in rotulis.

Parantur quoque solutiuæ decoctiones, & in
aqua & in vino. Cæterum de his, quæ parantur
in vino, dicam in curatione doloris antiqui.
Nunc de his, quæ parantur in aqua; Harum de-
scriptio talis erit.

Re. Senae orientalis, lib. j.

Epithymi,

Polypodij, an. vnc. viij.

Helleb. nigri, vnc. j.

Miobalanorum omnium, an. vnc. s.

Foliorum Rugosæ,

Borraginis,

Endiuicæ,

Fumaricæ,

Lupulorum, an. m. j.

Passularum enucleatarum, lib. j. s.

Granorum Sebesten, num. xx.

Prunorum lib. s.

Bulliant in sufficienti quantitate aquæ, f. a.
ut scilicet prius coquantur, ea quæ sunt durioris
coctionis, vsque ad consumptionem medicamentis,
facta expressione huius decocti, dabitur plus mi-
nus vnc. j. vel vnc. ij. pro habitu corporis, & viri
tolerantia.

De Hydrargyri usu. Cap. XXII.

Sed hic locus postulat ut quæramus quid sen-
tiendum sit de purgatione facienda per hy-
drargyrum. Maximi momenti est hæc conside-
ratio, quia ex vna parte profitentur plures Medi-
ci, inter quos est Montanus, Fallop. & alij, hydrar-
gyrum tamquam Gal. Dioscorid. experimento de-
niq; deleterium venenum in vsum medicamen-
torum internorum minimè esse accipiendum.
Contrà verò non modò Theophrastus, Paracel-
sus, & sectatores, Petrus Seuerinus, Danus, & a-
lij huius vsum extollunt, verum etiam ex dog-
maticis Medicis Brasauola, Antonius Gallus,
Lucas Ghinus, Andreas Matthiolus, & alij illius
vsum admittunt. Et cum argentum viuum in-
trifecis multis modis administrari possit, prepa-
ratum scilicet, & nō; video ab istis omnibus mo-
dis concedi, quinimò scribit Matthiolus lib. 6. q.
28. in Dioscorid. minùs noxiū esse non prepa-
ratum, & extinctum, preparato, vel salua extin-
cto; Idèò ait Gorinienses mulieres in difficili partu
illud assumere ad scrup. j. summam partus facilitate.
Brasauola etiam ad deiciendos puerorum Ver-
mes innoxie se vsum esse proficitur. Quod scribit
etiam Alex. Trallianus lib. 6. apud Corios passim
fieri pro vermibus expellendis. Quantum ad hoc
pertinet, mihi persuadere argentum viuum ne-
que preparatum, neque extinctum in mo-
dica portione acceptum ullam noxam inferre
posse.

Certum est, plures ex illis, qui hydrargyro
inunguntur, diu, argentum viuum in variis
corporis

corporis partibus absque noxa continuisse, illi lue aliquando vel vomitur, vel deiectione emisse. Quod si scribat Gal. 4. simol. 19. atque etiam Dioscorid. lib. 5. cap. 20. illud suo pondere, & qualitate interna erodere, loquuntur de nimia quantitate, præterquam quod Gal. 9. Simpl. cap. de hydrargyro fatetur se nullum de hac se fecisse experimentum. Itaque quod pertinet ad argentum viuum, non præparatum, neque extinctum in modica portione acceptum, puto illud non posse obesse, non tamen puto illud luem veneream curare. Ideo videamus, quid de præparato dicendum. Præparatum argentum viuum est duplex, commune, & proprium; Commune à Paracelsistis multis nominibus nuncupatur, ut Laudanum minerale, Corallinum, Turbith minerale, quod officinis est præcipitatum. Hoc non solum apud Paracelsistas, sed etiam, ut dixi apud Matthiolum, & alios est in usu, cum tamen non modò sit venenum, sed venenum erosione interficiens, calidum, & siccum in quarto. Nam Laudanum minerale sit ex viuo argento, aceto & sale repurgato, mixto cum Calchanto, & sale nitro, quod vocant isti sublimatum, quodque ab istis Chymicis deinde abluitur vino destillato, & iterum destillatur. Hoc ergo nullo modo probatur, sicuti neque commune præcipitatum, quod sit aqua illa forti, qua auri fabri vtuntur ad segreganda metalla, & est commune in officinis. Quare qui putant se diuinum quoddam secretum inuenisse, argentum viuum præparant cum mixtione auri, diciturque Paracelsistis aurum vitæ; Huius descriptio est duplex, vna proponitur à Ioanne Guinterio Andernaco, parte secunda Medicinæ nouæ, & veteris, in dialogo 7. quæ compositio sit ex argento viuo repurgato mixto cum folijs anisi, ita ut pro singula vnc. argenti sit drach. j. auri. Aliam elegantiorē proponit Antonius Gallus vir doctissimus in proprio opere de ligno non permiscendo, cap. 1. qui profitetur se magnò studio, ac labore descriptionem hanc à Chymico fuisse expiscatum Eandem à Gallo acceptam proponit Fallop. tractatu de Morbo Venereo c. 70. Habet autem sic.

Re. Argenti sublimati, quod sit addito sale & alumine. vnc. vj.

Teratur diligenter supra marmor, & cum farina triticea, & aqua manibus butyro inunctis fiant globuli, qui in alembico imponantur, & destillentur deinde verò pro singula aquæ vncia addatur drach. j. auri foliati, & fiat massa, & imponatur in vase vitreolato oris, quod media sua parte sepeliatur in cineribus ignisque lentus subiiciatur, paulatim in superficie apparebit crustula quædam, quæ cochleari statim colligitur, & in alio vase vitreo consimili reponitur, idque toties fit, quoties noua apparuerit placentula; Hæc mixtura deinceps in alio vase tam collecta

igne supposito tandiu coquitur, quousque inflauescat, vel rubescat, & tunc habetis præcipitatum, quod aurum vitæ dicitur. Hoc autem sit adhuc elegantius, si aqua vitæ infusa iterum igne appposito exsicceetur vsque ad aquæ consumptionem, postea vero affundatur aqua plantaginis, & iterum exsicceetur, tertio affundatur aqua borraginis, quæ etiam igne omnino consumatur. Prioris quantitas sint grana iij., vel vissecundi dosis sint grana ix. & x. Dantur in confectua Violarum, in saccharo rosaceo, in cunserua Cichorei, in expressione passularum, in pillulis, in rotulis ad libitum. Hoc puluere uti Excell. Medicum Patavinum in suis bolis asserere non vereor: Nā præterquam quod, ut audiui, aurum in illis bolis impositum viuum argentum retinet: Accedit etiam, quod quibuldam sputum copiosum excitauit, dentes mobiles reddidit, vlcera in faucibus promouit, deiectionesque alui, ac vomitus vehementissimos prouocat. Quibus autem misceat medicamentum ignoro. Hoc vnum scio, vel nihil, vel purum referte cæterorum mixtionem, quando in hoc vnico præcipitato tota curationis spes ab omnibus reponitur, qui tamen admiscere aliquando margaritas præparatas, hyacinthos, smaragdos, & alias similes gemmas accipiunt. Alij species laxificantes, Diamuscum, Diamargaritum, & cum his præcipitatum component. Sed quia post bolos vir Excellentiss. aquas præbet, difficultum certe est intelligere qualisnam sit aqua, utpote quæ nullum præferat odorem, vel saporem ingrediens medicamenti Posset itaque esse aqua refrigerans ad corrigendam præcipitati caliditatem; posset etiam esse aqua sudorifica, quæ in antiquitatis doloribus esset quasi præcipitati vehiculum, & certe cum mihi certò persuadeam omnium primum, qui publicum fecerit hoc secretum fuisse Antonium, ita etiam credo potuisse Bottonum ab eo aquam accipere, à quo etiam accepit usum præcipitati. Hic enim author loco citato egregiam aquæ subiungit in doloribus antiquitatis efficacissimā, cuius descriptio est talis.

Re. Lacce:

Aloes lata cum aqua Myri. an. vnc. s.

Enule.

Scordij.

Cardui Benedi. Ri.

Hederæ. an. m. j.

Infundantur omnia in sufficienti quantitate aquæ vitæ, deinde ponantur in vase vitreo bene obturato in fimo equino per dies 40. deinde effundatur aqua illa, cui adde.

Præcipitati præparati ut dictum est. voc. j.

Cryalli puluerisati, vnc. j.

Iterum infundantur in aqua dicta, & maneant per alios dies 40. in fimo equino, extracta aqua exstimaatur fortissima ad antiquatos dolores. Sed quia quantitas huius aquæ

De Lue Ven.

B

non

non debet excedere decem, vel duodecim guttas, ideo misceri poterit vel aquae betonicae, vel boraginis, vel alterius similis. Hæc pertinenti ad præcipitatum per os dandum. Sed quia dixi non minus esse in usu præcipitatum quam viuum argentum, volo vos scire multos esse Medicos, vnumquæ Patavij, qui pillulas præbent argentum viuum recipientes, quas vocant Mercuriales, quarum descriptio varia quidem est apud plures, tamen hæc accipi consuevit.

R. Rhabarb. elect. pulueris. vnc. iij. s.

Scammonij. scrup. iij. s.

Pulueriscentur, & cum succo limonum misceantur, deinde adde,

Argenti viui per pannum transmissi, & mortificati per eundem succum limonum. vnc. s.

Musci. gr. x.

Farina parum.

miscet. massa pillularum.

Detur drac. i. per spacium 30. dierum. Talis est ordo eorum qui curant Luem hanc argento viuo, de quibus omnibus dictis meam opinionem vobis aperiam. Vno verbo certum habeo, nullam ex istis operationibus per se Luem Veneream curare quandoque tamen curant ex accidenti, si Luem recentem inueniant, vel confirmatam in robusto corpore, cui feliciter omnes succedant operationes, quas deleterium hoc medicamentum promouere solet. Isti sanè post hanc medendi formam temperatè admodum viuentes, huius mali vim effugiunt, sed qui intemperanter vixerint, aut euacuationes idoneas non habuerint, paucis post diebus maiora iterum experiuntur mala, Vt ego paulò antè ab illis ipsis collegi, qui hac medendi ratione vsi sunt. Itaque eos tantum his bolis, aut pillulis curandos puto, qui nulla alia curatione vni volunt, qui cibum & porum copiosum amant, neque patiuntur perpetuos illos sudores, ac catceres 40. dierum; Illud tamen iterum moneo, in usu pillularum, quas Mercuriales vocant, cautè agendum, ne scilicet illis dentur corporibus qui crassa valde, & multa abundant pituita, antè aliquam lenitionem, & præparationem; ex subita enim & violenta humorum motione, suffocationis periculum imminet. Præcedat itaque aliqua corporis præparatio, & expurgatio. De usu hydragryi hæc satis.

De Diaphoreticis. Cap. XXIII.

Cum de medicamentis deiectoriis, quæ Veneream Luem expugnare creduntur, iam satis dictum sit, ad Diaphoretica veniamus. Sunt hæc medicamenta duplicia: Quædam enim valent siccatione, quædam aut existimantur alexipharmaca. Quæ siccatione valent, sunt sulphur, oleum ex sulphure, oleum ex Calchanto, Troisci Viperini, Decoctum vel infusio Viperarum, decoctum Cardui benedicti, scordii, quæ-

Acus, & similia. Alexipharmaca verò quædam sunt communia Venenis omnibus, quædam verò huius Luis propria, Et communia quidem sunt Theriaca, Mithridatium, Aquæ theriacales, quæ à Rondelet. & Fernel. opiata dicuntur, decoctum Iuniperi, Buxi, Ebeni. Propria verò sunt China, Sassa, Lignum sanctum, & Guaiacum; de quibus omnibus aliquid dicendum, pauca quidem de prioribus, plura de postremis. Et primo quo ad medicamenta Diaphoretica siccatione iuuantia, hæc à practicantibus analogismo sunt inuenta: Cum enim viderent troiscos Viperinos, sulphur, &c. in Elephantiasi, & scabie prodelle, putarunt quoque in Lue Venerea, quæ vlceribus, impetigine, & pustulis cutaneis sit resecta, hæc etiam conferre posse. Ego verò mihi persuadere quidem non ab re esse quandoque morbi huius sobolem in tumoribus, & ichoribus tantum repositam, cute rara existente, ac corpore transpirabili vniuersam in extimas deponi partes, vt integra succedat valetudo. Cæterum vbi solida iam sunt affecta, duriorque cutis, ac densius corporis status, censeo Veneream Luem ab his medicamentis minimè expurgari. Agunt enim medicamenta calidissima in humorem, & naturam, & putredine calidum, qui ob cutis densitatem intra venas ac carnes retinetur, cuius causa venenata in solidis residens non profligatur; Hinc necessariò putredo, calor, venenum, omnia denique mala redduntur calidiora. Itaque quando tumoribus agi potest, hæc dimittantur.

De Alexipharmacis communibus. Cap. XXIV.

Quo ad Alexipharmaca communia, hæc quoque sunt calidissima, vel temperata, vel minus calida. Calidissima, sunt aquæ illæ theriacales ex theriaca destillatæ, dictamno, scordio, carduo benedicto, tormentilla, & Aromatibus, quæ in affectu antiquo ligno permixtæ, non improbantur, in augesciente tanquam nimis calidæ sunt suspectæ, vt nuper dictum est. Quo ad decoctum Iuniperi, plures sunt, qui eo vtuntur tamquam Luis Alexipharmaco, cum tamè Rondelet. Dioscorid. autoritate morus, radicis vsum tamquam Veneficum improbet, & solos fructus admittat. Scaliget tamen exercitatione 180. contra Cardantm c. 19. ait Afros Medices vt huius radicis decocto ad Luem expugnandam feliciter, reddiq; causam, cur non sit venefica, licet Dioscorid. illam venenatam protulerit. Aut enim aliam esse corticis radicis facultatem, aliam verò substantiæ medullaris: Corticem, cuius virtus recipitur in decocto, ait non esse venenatum. Itaque si fortasse destitui fueritis his medicamentis, quæ præstantiora putantur, Iuniperi decoctum non improbabitur, & si radices fuerint suspectæ, sumantur folia, & fructus, vel semina fiatque infusio sic.

R. Foliorum Iuniperi, m. vj.

Seminum Iuniperi, m. iij.

Infusio.

Infundantur in aqua lib. xij. bulliant ad consumptionem medietatis, facta expressione seruetur syrupus, quantitas sit vnc. viij. cum ea viuendi ratione, quam dicam in cap. de ligno.

Quo ad buxum, licet Amat. Lusi, se quendam hoc morbo laborantem buxi decocto integre curasse profiteatur, tamen, ut dicitur, vna hirundo non facit ver, non est buxus lignum Indicum, ut ille putat. Natat enim buxus in aqua, lignum Indicum refidet in fundo, ut etiam ebenus, nec tamen est idem cum ebeno, ut ex pondere, colore, & oleositate facile quisque conicere poterit. Itaque tandem ad propria huius morbi alexipharmaca confugiendum est.

De China. Cap. XXV.

Inter alexipharmaca cum radice Chinæ primò facta sit mentio, de ea quoque primò agemus. Accepit radix ista summam auctoritatem à Carolo V. Imperatore, qui summo cum fructu primus ferè omnium radicem accepit, & à morbo Venereo, antiquisque doloribus est liberatus. Est radix, ut puto, arundinis latifolij, viuam virenti vidi Venetiis in horto Petri Boselli; Idè decipitur Costa, qui arbitratur esse plantam arboribus hærentem, ut hederam. Non disputabo, utrum, deferatur ex India occidua, utrum ex regno Chinarum, an ex aliis locis? Certum est, radicem hanc ritè administratam, Luem superare, cutem mundare, dolores profligare, macies reparare. Est enim radix in actiuis qualitibus temperatissima, quæ desiccat quidem excrementitios humores, alimentales autè vel reficit, vel saltem conseruat; Idè humiditatem habet oleosam, atque firmiter propriæ substantiæ ad hærentem, ut hac ratione, & diuturnâ, & multoties repetitam patiatur coctione. Si itaque minimè cariola fuerit, neque admodum gracilis, & sicca, sed mediocriter grauis, colore inter album, & rufum, accipiat, & exhibeatur patientibus sic præparata.

Re. Radicis Chinarum incisa in tabellas, vnc. j.

Infundantur in aqua lib. vi. S. A. deinde bulliat in vase oris angustij benè lecto, ne vapor exspiret, vsque ad consumptionem medietatis, fiat expressio, & seruetur syrupus.

Præcipit Vesalius in sua Epistola, quâ scribit de radice Chinæ, ut decoctum hoc calidum conseruetur, vel singulis diebus recens fiat, alioquin ait acidum fieri; sed experientia docuit oppositum, decoctum Chinæ seruatum 4. dies non accessit. Ex residuo sit aqua secunda facta decoctione in lib. xij. vsque ad consumptionem tertiæ partis. Non ignoro quibusdam Chinæ dosim hanc extilem, aut aquâ nimiam esse, qui tamen si multum ab his recesserint, summam experientur in patientibus caliditatem. Hæc itaque sufficiant. Iterum verò, quod residuum est coquitur in totidem aquæ libris ad eandem consumptionem, &

A in eo coquuntur carnes. Accepto syrupo per duas horas, post sudant, & quattuor asi accepto syrupo sumunt prandium. De qualitate cibi variæ sunt sententiæ. Quidam nihil magis respiciunt, quàm calidam iecoris intemperiem, & idè prohibent salsa, acris, & aromata, concedunt olea, & fructus frigidos. Ego tamen puto ab omnibus esculentis abstinendum, fructibus, & oleribus: carnes tantum optimi succi vel elixas, vel assas, & oua esse concedenda, Vinum quoque aqua illa mixtum conceditur. Omnes qui de hac radice scripserunt, religiosè admodum monent, ut qui ea vtuntur vitent Venerem: Causam attulit Vesalius, quia inquit proprium esse huius radicis, ut maximam inferat tentiginem, & idè in hoc maximo periculo, oportet etiam monere patientes, ne in hac parte delinquant. Concedit aerem liberum, sed cur ignoro: Ut ingenuè dicam, non video, cur aer his, qui assument lignum Indicum sit noxius, his autem qui Chinam, potius utilis. Sed dicunt isti, in India exeunt domo; exeunt etiam illi qui accipiunt lignum; idè vel est omnibus negandus aer externus, vel concedendus.

De Salsa. Cap. XXVI.

Fortius remedium China iam proposita ad Luem expugnandam est salsa Parilla, seu, ut alij dicunt, sparta Parilla, vel sparta Peullia. Ipsa quoque ex Indiis occidujs deuecta, & in arenosis locis passim succrescens, quæ grauissimorum auctorum testimonio præcipuè vero Matthioli, & Fallopij, nihil aliud est quàm smilax aspera, postquam & notæ, & operationes sunt virique communes. Est medicamentum siccum in secundo, expert caliditatis, tenuissimarum partium, sine vlla adstrictione diaphoreticum, & Luis alexipharmacum. Optima censetur illa, quæ crassior est, cortice duro, colore subrufo, longis capillamentis donata, & si frangatur, intus alba appareat, neque puluerem, neque cariem ostendit. Huius medicamenti vires ad dissoluendos tophos venereos, & ad siccanda vlcera, ac pustulas, existimatur aliorum omnium medicamentorum vires superare, cum tamen sit expert caliditatis, & adstrictionis, Ventriculum enim laxat, & infirmiores reddit; Et licet, ut dixi, tophos dissoluat, & pustulas melius quam lignum exsiccet, non est tamen fortius alexipharmacum ligno, sed id præstat potius insigni siccitate, & substantiæ tenuitate, quam vi alexipharmacæ. Modus administrandi varius est apud scriptores, si tamen infusio plurium dierum sit facienda, potestis accipere salz incisæ vnc. iij. ligni Indici pro conseruando ventriculi tono vnc. ij. Infundantur in aqua lib. viij. bulliant ad consumptionem medietatis, fiat expressio pro syrupo. Residuum bulliat in aqua lib. i. s. ad consumptionem tertiæ partis pro potu. Si quispiam voluerit habere decoctum quotidie recens, poterit incoquere vnc. s. salz infusæ in lib. i. aquæ vsque ad

consumptionem medietatis; vel vnc. i. in lib. ij. A pro diebus duobus. Consulo tamen, ne sola utamini salsa, sed lignum, vel corticem admisceatis, cum pro ventriculi robore seruando, nunc verò occulta Lue fortius expugnanda. Victus ratio eadem est, cum illa, quam proponemus in tractatione de modo exhibendi lignum Indici. Ad quod me couerto.

De Ligno. Cap. XXVII.

Lignum Indicum duplex est, vnum, quod Guaiacum, alterum, quod Palum Sanctum, vel Lignum Sanctum dicitur. Fuerunt plures, qui putarunt esse vnum, & idem, tamen Consalius Oueda Indicarum historiarum oculatissimus scriptor, & locis, & notis veramque arborem distinguit. Est enim Guaiacum in medietate nigrum, in circumferentia sublauum; Lignum autem Sanctum nigritie caret, totumque sublauum est; Virumque tamen in Lue Venerea vtiliter administratur. Temperatura vtriusque ligni calida est, & sicca, vltra secundum gradum, idè & prima, & secunda, & tertia huius Ligni decoctio amarescit, valenter desiccatur, est tenuium partium, pinguemque seu oleosam substantiam continet; præclarissimum est, & præ cæteris celebratissimum Luis Venereæ alexipharmacum, quo vno ritè administrato deploratissimi etiam integrè curantur; Ideo de hoc ligno multa nobis veniunt consideranda. Primum autem hoc non est prætereundum, non defuisse Medicos, qui putauerint fructus, & folia in confectis, vel electuariis parata vtiliter pro Lue expugnanda usurpari posse, sed quòd intelligant Indos quoque populos Lue vexatos sic curari. Ego verò mihi quidem persuadeo confectas, & electuarias hæc, recentem, & exiguum affectum superare posse, sed potius vi euacuatoria, quam alexipharmacæ. Fructus enim hi non minus, quam grana sebesten, vel siliqua Aegyptia, castia ipsa videlicet, aluum valenter mouent, ut sicut apud nos multi etiam recenti hoc morbo vexati solis purgationibus curentur, ita etiam Indi hac ipsa ratione liberari possunt. Alexipharmacam autem vim totam puto repositam in substantia illa oleosa, quæ in fructibus, & folijs non adest. Idè neque mihi probantur rami iuniores, ut quidam censuerunt, qui potius excrementitia abundant humiditate, quam substantifica, & oleosa; Neque probatur truncus ita antiquus, ut præ senio arefcat, neque iam diu excisus, qui propterea rimas multas contraxerit, sed eligendum est lignum graue ex trunco cum suo cortice bene adherente, quod multam habeat nigredinem, & modicam Lutei coloris circumferentiam, quod rimis careat, & superimpositis pruinis fumum copiosum redoleat, & raspatum simul adharat. Tale lignum pro Lue expugnanda erit eligendum. Usurpatur autem varijs modis, in electuarijs, in puluere, & pilulis, in totum

his, in oleo, in aquis, ac in decoctione. Quo ad electuaria, dedi iam eorum descriptiones, quare de iis nihil amplius dicam. Quo ad pulueres, & pilulas; licet à nonnullis omnino reijciantur, quia non possit ex ligno puluis fieri, quin prorsus oleosa substantia consumatur; Ego tamen sicuti ceterò habeo nec pulueres, nec pilulas ob hanc rationem esse sufficientes ad profligandam Lue, ita pro adiuuanda excrementitia humiditatis siccatione, simul cum decocto nec puluis, nec pilula improbantur. Quo ad tabellas, istæ sunt ex ligni extracto, quod quidem per multiplicem infusionem optimi ligni in aqua vitæ, coisumpta per vim ignis aqua ipsa vitæ mixtoque extracto cum saccharo. Hoc extractum integras retinet vires Guaiaci, sicuti poteritis experientia comprobare, si volueritis; Nam extrahitur diligentissime nunc à Pharmacopola Veneto ad insigne Struzziæ Cameli, & Patauij à Pharmacopola a Speculo. Hoc, vi puto, non habet vires vsque adeò validas, ut possit magnam Lue superare, sed in Lue recenti, vel post decoctum ligni, si adsit suspicio Luis relicte, extractum hoc mihi probatur ad vnc. s. singulo mane. Fortius extracto est oleum, & sanè in hoc oleo totam vim ligni alexipharmacam repositam esse puto; Neque mea me decepit opinio; Nam experientia propria comprobatur huius olei beneficium, & antiquum, & maximum morbum fuisse superatum. Exhibeo autem oleum varijs modis. In corporibus emaciatis vsus sum feliciter cum lacte; In alijs, temperamenti calidioris, præbeo cum Conserua Rosarum, Violarum, uel Cyporei, uel in Sero Caprino; In melancholicis præbeo cum Conserua Borraginis, uel Buglossæ; in pituitosis cum conserua betonicæ; in iophis uereis misceo cum oleo, & Therebinthina sic.

Re. Terebinth. pellucida. vnc. ij.

Olei ex ligno. vnc. s.

Misce pro sex diebus; Vncia enim una olei debet distribui in dies xij. Cogitavi aliquando ex residuo decoctionis, vel ligni decocti sales Guaiacanos extrahere, atque illis varijs medicamentis permiscere, de quibus tamen salibus dicam meam opinionem, dum erit sermo de Lue Venerea antiqua. Frequentior modus ligni Indici administrandi est in decoctione, quæ vnicuique, etati sexui, temperamento, & corporis habitui conuenire potest; Idè de modo conficiendi decoctum, & administrandi agendum. Decoctum ergo potest institui vel pro affectu simplici, vel pro complicato. Licet autem Antonius Gallus, vnam, & eandem existimet in omnibus esse debere ligni Indici præparationem, ego tamen Alfonso Ferri, & aliorum auctoritatem, rationemque securus, puto in affectu simplici simplicem, in complicato commixtam esse debere ligni decoctionem. Itaque quo ad simplicem pertinet, paratur ex solo ligno in scobem redacto, & in varia quantitate accepto, habita ratione

ratione ætatis, temporis anni, temporis, ac magnitudinis morbi. Nam in ætate puerili, tempore anni calido, in affectu nec magno, nec antiquo, pauca ligni quantitas accipienda est, in oppositis maior. Valida itaque erit decoctio, quæ pro singula aquæ libra vnc. j. ligni recipiat; infirma, quæ pro singula lib. vnc. s. Cæteræ suprà hanc maximæ, infra autem erunt mediæ. Fit hæc decoctio in aqua, vel fontanali, vel puteali, sed non valde eruda; Eligenda enim est aqua omnium leuissima, & ideo pluuialis, & fluuialis depurata non sunt improbandæ. Decoctio fiat vel in duplici vase, quando tempus sit æstiuum, vel corpus nimis calidum; Hæc enim minus calefacit vel in ollula noua, quando tempus sit vernum, vel corpus minus calidum, fiat decoctio ad consumptionem medietatis aquæ, præmissa infusione super cineres calidos per horas 24. fiat autem decoctio vase diligenter cooperto, ne vapor vllus transpiret, contra quam nostri nunc faciunt seplasiarii, sitq; ignis lentus, ne fortè ex vehementi ebullitione transfundantur. Quod residuum fuerit ligni, bulliat in alia noua aqua sine infusione vsque ad consumptionem tertiz partis; quæ sit pro potu, & sic tertio quoq; ebullierint ramenta illa in alia noua aqua, inferuire poterit illis, qui comedent carnes, ad eas concoquendas: Nam tam solida est ligni substantia, vt scribat Nicolaus Massa, se vnica ligni libra duodecies infusa, & decocta quandam curasse à morbo Venereo. Tempus exhibendi decoctum sumitur à præsentia indicantis; Ideo si necessitas vrgeat licebit illud præbere etiam media Hyeme, & Aestate; si autem morbus det inducias, Vere & Autumno operatio hæc instituenda erit. Quantitas Syrupi pro varietate ætatis debet esse varia: Nam pueris dux, tres, vel quatuor vnciæ satis erunt, adultis autem septem, vel octo; Neque enim consulo, vt in grandævis à quattuor vnciis incipiatis, vt consulit Fetrus, & gradatim vsque ad octo ascendatis, hæc quantitas mutatio alterari quidem potest pro patientis consuetudine. Nam quibus consuetudo multi potus non fuit, satis est vncias v. vel vj. præbere; Cæteris autem, vt dictum est, vt. viij. dentur horis 4. ante cibum, cibusque sit panis nautici vnc. ij. passularum vnc. ij. nucleorum pinus, vel pistaciorum, vel amygdalorum torrefactorum vnc. i. ex secunda aqua bibant ad libitum. Hæc validis pituitosis pauco assuetis cibo. Imbecillioribus autem, vel assuetis multo cibo concedatis duas, vel tres vncias carnis assæ, vel ouum sordibile saltem in primis diebus, post octo primos dies, si facile inediā sustineant, à carne, & ouo abstinendum; vltimis autem diebus, si imbecilliores fuerint ad pleniorē victum iterum redeundum.

De Medicamentis tempore decocti. Cap. XXVIII.

SCio hac in parte multas occurrere difficultates circa victum tenuem, circa sudorem, &

A circa medicamenta, de quibus omnibus sigillatim dicendum est. Et primò quod ad medicamentum Vnus Montanus ex his quos ego vidi, purgatum medicamentorum vsum decoctionis tempore prohibet: Ait enim neminem ad decoctum accedere, qui prius diligentissimè non fuerit purgatus, frustra ergo (ait) corpore purgato administrantur medicamenta. Hæc Montani ratio quanquam apparens, claudicat tamen. Lues Venerea, vt dictum est, tamquam venenum semper humani corporis humores paulatim corrumpit, ita vt licet corpus ante decoctum sit purgatum, a Lue tamen non sit immune, idè quotidie noua colliguntur excrementa. Hinc factum est, vt Medici ad hæc purganda, vt alexipharmacum fortius operetur, medicamenta iniunxerint, Sed hac in parte duo apud Medicos vsurpantur: Quidam singulis octo diebus medicamentum purgans exhibent, alij verò singulis diebus, vel alternis. Recentiores quidam vtrumque modum improbant, dicuntq; hanc operationem sudorem ipsum vel prohibere, vel saltem vtramque operationem tamquam per vias valdè oppositas factam ægrotanti esse molestissimam. Ego verò puto vtrumque ruidè & absque molestia fieri posse. Primò quidem, si singulis octo diebus medicamentum præbeat, nullus sit motus naturæ contrarius; Nam eo ipso die nemo sudorem excitat, neque ratio persuadet, vt morus, qui sit vñodie, vel impediatur motum alterius dici, vel faciat illum laboriosum, quinimò dum purgatur corpus, aperiuntur viæ, tolluntur crassi humores, sudor ipse facilius excitatur. Itaque purgatio singulis octo diebus facta, licet sudor diebus excitetur, non est laboriosa, neque molesta. Quod pertinet ad euacuationem singulis diebus factam, ego puto in illis fieri debere, in quibus sudor vel non pot, vel non debet excitari. Non pot in quibusdam, qui uel sūt usque adedò dura cute ut nullo ingenio possint sudare. Non potest etiam in illis, quibus quamprimum sudorifica administrantur, statim superuenit lipothymia, & syncope, in his decoctioni misceri possunt purgantia: Miscenda quoque sunt in his, qui non debent sudare. Quales sunt isti? Hi sunt, in quibus Lues Venerea non obsidet artus, neque cutem, neque denique corporis ambitum, sed potius circa viscera propria posuit sedes, in his quædam euacuanda sed mitiora singulis diebus misceri possunt. Huic medendi modum licet ex Galeno, antiquioribusque Medicis omnibus elicere, qui laborantibus Iecoris partibus, quæ ad sinuam spectant deiectionis viebantur; contra verò in affectu gibbæ, ac cæterarum supra gibbam, diureticis, ac sudorificis. Pari igitur ratione nos quoque in Venerea Lue ad Ventrículum, ac Iecoris sinuam spectante, potius deiectionis, quam diureticis viemur: quamquam in vtroque laborante loco, vtramque medendi rationem quando-

que accipi posse apud Galenum pro comperto habeo, magis tamen hanc, quam illam. Sint verò hæc, quæ decocto misceantur. Senna, Epithymus, Polypodium, quorum dosis est à drach. j. vsque ad unc. s. habita ratione ætatis, consuetudinis, &c. Præter cætera argumenta, quæ contrà purgantia, & sudorifica tempore decocti administranda proponuntur, vnum est ex Hipp. 2. Aphorif. 16. cum ait: Vbi fames, laborandum non est, tunc dicunt isti: tempore decocti instituitur inedia, quàm famis nomine authore etiam Gal. in Com. significauit. Ex Hipp. ergo in tali inedia neque medicamentum, neque sudor est imperandus. Quod apertè etiam docuit Galen. in Com. Huic obiectioni satisfaciens idem Galen. lib. de Venæ sect. contra Erasistratum, cap. vltimo, ait inediam corpora non euacuare, probat exemplo eorum animalium, vt serpentum, quæ totam hyemem sinè cibo in latribus degunt, ex quo infert exercitationem, vel calorem illum esse, qui corpora nostra extenuet, & diffilationem faciat. Itaque ex hoc sequitur eorum corpora, qui decoctum assumunt ex inedia non diffilari, aut consumi, neque ob exercitationes, quia in loco concluso morantur, ergo ob vnicum sudorem, vel purgationem per longa intervalla exhibitam, quæ vtrique operatio fit multis etiam præceptis Medicis seruatis, vt scilicet eo die, quo patientes sumunt medicamentum, accipiant oua, ius, & carnem, quæ pertinent ad victum plenum. Sudor autem in corporibus obesis, & pinguibus, cum multa etiam inedia, tantum abest, vt obsit, quin potius ad extenuationem corporis aliquin multis affectionibus subiecti, mirificè prodesse possit, vt id eo Hipp. 2. epid. 1. 14. in illis carnibus mollioribus, & humidioribus ad eas exsicccandas illū imperauerit; In siccioribus verò consulo, vt sudores, & per rariora intervalla, & breuiori temporis spaciò, & minori cum molestia excitetur; Ideò vel semel tantum in die sudent, vel etiam alternis diebus, largius bibant, neque tenui vtantur victu. Sudor excitari poterit in humidioribus sicco aliquo vapore; In siccioribus autem, vel Vesicis, aut cucurbitis multa aqua calente refertis, in qua bullierint Camomel. Anet. Melilot. Puleg. Carduus benedict. Dictam. Scordium, Calament. montan. semina lini, Iunip. Sal. uia, & Ros marinus que Vesicæ vel Cucurbitæ sub axillis intra, & extra femora imponentur. Non displicet modus sudandi sub tentorio vndique munito, dum sedet patiens in tina, seu vase ligneo eam lapidibus ignitis, quos præscripto decocto frequenter inspergite. Caueant autem, qui sudant in cubilibus, ne plus quàm semel in eodem linteamine illoto sudent, sed singulis vicibus mundum sit linteamen. In agrestibus hominibus, vt nautis, rusticis, &c. concedi potest sudor in remigando, in fodiendo, vel alijs etiam, in lusu pilæ, vel folliis, dum modo tamen hi quoque exterso sudore mutant indusi-

um. Caueant ab aere frigido at bono vtantur victu.

De victu. Cap. XXIX.

Venio ad obiectiones contra tenuem victum. Multi sunt ægris, vt puto, indulgentiores, quàm vtiliores, qui tenuem victum improbant. Habent apparentem Hipp. auctoritatem primo Aph. 4. & sequentibus. Victus tenuis exquisitus in morbis longis, &c. Tum addunt: Dieta quadragenaria conuenit morbis chronicis, ergo talis non conuenit in præsentī casu. Huic argumento multipliciter respondemus, primo, negantes quadragenariā hanc Dietam ad Chthonicos morbos pertinere: Morbi qui intra dies quadraginta iudicantur ab Hipp. acuti nuncupantur primo Prognost. xxv. Inspirationis facilitatem aut magnā habere spem ad salutem in morbis acutis, qui cum febre sunt, & intra dies 40. iudicantur. Secundo possumus dicere, hunc victum de quo ante meminī non esse tenuem. Tenuissima victus ratio apud Hippoc. vt docet Galenus primo Aph. 4. est nihil dare, tenuis victus est ille in quo concedebant patientibus semel in die melicratum, aquam hordei, vel cremorem prisanæ, sed addit Gal. loco citato, in modica quantitate: nam si detur in multa, excedit victum tenuem, sed sic est, quod nos istis concedimus unc. iij. panis biscocti, unc. ii. passularum, unc. i. vel ii. nucleorum pinus, aquam ligni ad libitum, & bis in die syropos accipiunt. Qui ex eorum omnium probatissimorum auctororum sententia, qui de facultate ligni scripserunt, insignem habent nutriendi facultatem, ideo non est tenuis victus. Tertiò illud accedit, quod docuit Gal. passim, præcipue primo Aphorif. 9. Rationem instituendi victum non tantum à morbi tempore esse instituendam, quantum à viribus, & ideo dicebat Hippoc. primo Aph. 9. Considerandum esse, an æger vsque ad statum cum tenui victu possit sufficere; si videatur itaque illum esse debilem, vel futurum debilem, vt sunt graciles, biliosi, rari texturæ, qui os ventriculi habent sensibile in tempore anni calido, hic concedas saltem ab initio & oua, & carnes, vt tempore status tenuem victum seruent; Si verò sint pingues, & obesi, frigida, & humida temperatura, qui faciliè inediam sustineant, istis cibis propositis, & etiam tenuior erit satis. Itaque sicuti omnibus tenuem illum victum instituendum minimè persuadeo, ita fere semper illum præcipio & consulo, quem & populi Indi, à quibus modum sumendi decoctum accepimus, sine noxa seruant, & ceteri omnes probati Medicinæ scriptores tamquam vtilem amplecti sunt. Quantum ad ætatem, in tempore anni frigido, vel constitutione frigida, ab externo aere abstinentum. In constitutione, & tempore anni, ac regione calida, aliquando, præcipue post præandium; externa aura concedi potest. Fugiant Venere-

Venerem per integrum etiam mensem ab ac-
cepto decocto; aluum lubricam seruent, vel cly-
steribus, vel decocto Sennæ, vel Senna imposita
ad dr. ij. cum syrupo matutino, quo in casu co-
die non sudent. In ceteris, iocis & ludis in-
cumbant. Et hæc de modo administrandi de-
coctum simplex.

De exhibendo decocto composito. Cap. XXX.

IN simplici affectu, simplex quoque conuenit
curandi ratio, in composito composita. Ha-
tenus de simplici, nunc ad compositam transi-
bo. Componitur autem hoc medicamentum
ex ligno, aut cum cortice eiusdem ligni, vel
Salsa, vel China, vel Sassafras, vel denique her-
bis, varijs partibus, & affectionibus accommo-
datis. Porro morbi, & symptomata, quæ cum
ipsa Lue copulantur, eiusdem sunt naturæ, & te-
noris, vel diuersi. Ratione eorum, quæ eiusdē
sunt naturæ, ut sunt tophi, dolores, affectusque
alij curandi, permiscere Medici cum ligno, Sal-
sam, Corticem, & Chinam: Ratione verò affe-
ctionum aliarum, Sassafras, aliasque plures ra-
dices, & herbas: nam cum hi morbi, qui cum
Lue complicantur, vel similem, vel diuersam
requirant curandi rationem, qui consimilem re-
quirunt, frigidi sunt omnes, Destillatio, Epilep-
sia, Paralysis, Stupor, Asthma, Dyspnæa Dolor
articulatis, Colicus, Cachexia, Hydrops, quæ
affectiones, ac partes quandoque illud idem a-
mant auxilij genus, quod idem requirit Lues
ipsa, calidum videlicet, & siccum, tenuium de-
nique partium, ac diaphoreticum, quandoque
verò omnino diuersum. Etenim siue in Lue
appareant tophi, siue copulentur Destillatio, Tus-
sis, Asthma, Cachexia, Ventriculi imbecillitas,
Hydrops, Articularis dolor, vel alius affectus fri-
gidus, permiscuntur, quæ tophos attenuant, pi-
tuitam siccant, intemperiem corrigant: ut Salsa,
Cortex ligni, Sassafras, Betonica, Menta, &c.
Quod si febris aliqua appareat, præcipua tabida,
vel macies sine febre, aut melancholia, in his
omnibus varia permiscuntur medicamenta pro
partis laborantis, ac affectionis varietate. Cæte-
rum, non defuere Medici, inter quos est Antoni-
us Gallus, in suo tractatu de ligno non permi-
scendo, qui Vlrici Huteni Equitis Germani, sen-
sententiam secutus, ligni Sancti commixtionem
acerrimā improbat, nec tamen aliam habet ra-
tionem, quàm quod sanctum hoc medicamentum
ecclitè datum tot alijs medicamentis obscure-
tur, & infringatur. Cuius sententiam non ac-
cipiendam puto, qui existimo, ut iam dixi, in af-
fectuum complicatione, complicatum esse dice-
re decocti administrandi modum. Dabo igitur
formulas componendarum decoctionum in sin-
gula complicatione. Si ergo sit Lues cum to-
phis, & doloribus, admiscenda est Salsa, Cortex
lue præterea, & Salvia, V.g.

*℞. Ligni Indici ꝑnc. vj.
Salse ꝑnc. iij.
Corticis ꝑnc. ij.*

Infundantur s. a. in aqua lib. xij. bulliant ad
consumptionem medietatis. In fine adde

*Lue,
Salvia, an. m. j.*

Facta expressione seruetur pro syrupo, Resi-
dua sine herbis in aqua lib. xv. bulliant ad ter-
tias pro potu. Si affectus sint Cutanei pustulæ,
scabies impetigo, & crustæ, Chinæ permixtio mi-
hi maxime placet: Licet non defuerint, qui hanc
quoque permixtionem alio ex capite improba-
runt, quod scilicet dicant Chinæ decoctum vl-
trà vnam diem statim aclescere; ideo si cum li-
gno misceatur, totam decoctionem acidam red-
dere, sed vbinam hoc inuenerint, nescio. Para-
ui decoctum Chinæ aliquando pro 4. diebus, ne-
que tamen acidum fieri intellexi. Itaque si opi-
ma habeatur China, in cutaneis affectibus mi-
sceatur sic:

*℞. Ligni Indici, ꝑnc. viij.
Radice China, ꝑnc. j.*

Infundantur in aqua lib. xij. fiat decot. ad cō-
sumptionem medietatis; In fine adde

*Fumaria,
Scabiose,
Lupulorum, an. m. j.*

Facta expressione, seruetur pro syrupo. Resi-
duum bulliat, ut dictum est. Si adsit Gonor-
rhœa, Cortex numquam est imponendus, Sal-
sa, vel China immisceri potest, ut dictum, est.
In fine decoctioni addere oportet

*Foliorum Nymphae,
Hordei, an. m. j.*

Sed si Lue Venereæ addantur, ut dixi affe-
ctus disiuncti ab huius affectionis natura, con-
siderandum primò, ut dictum est, numquid si-
milem, an dissimilem requirant curandi rationē:
si similem, decoctum eo modo est conficiendum
quantum ad Lignum, Salsam, & Chinam, ut nu-
per dictum est: sed addere oportet, & Sassafras,
& alia medicamenta, quæ singulas respiciunt af-
fectiones, & loca: Idè in affectionibus capitis in
fine decoctionis addere poteritis Betonicam, Ste-
rachadem, Maioranam, Pronium. In affectibus tho-
sacis, Botridem, Earfaram, Pulmonariam, I-
rim, Prassium, & Hyssopum. In affectibus Ven-
triculi, & Intestinatorum, Absinthium, Men-
tam, Calamum aromaticum, Squinanthum,
& tramiq̃ue Spicam, Semina odorata. In Cache-
xia addere poteritis Pulegium, Origanum,
Calamentum, Rutam. In doloribus articu-
libus,

ribus, Iuam, Saluiam, Rorem marinum, Iuniperum: Sicque iure optimo, & vera arte, affectus istos Lui complicatos sanabitis. Quod si diuersam requirant curandi rationem, difficile est his succurrere. Requiritur autem diuersam curandi rationem Febris putrida, Hectica, Phthisis Macies, Intemperies calida, & sicca iecoris, vel totius, Melancholia. Quid in singulis agendum, exponam.

Si lue Venerea affectus copuleretur, qui contrariam exposcat curandi rationem ab ea, quae per ligni Indici facultatem perficitur, considerandum primò, numquid ille affectus sit soboles Lue, an potius causam habeat à Lue seiunctam: Si causam habuerit separatam, considerandum deinceps, quisnam ex ipsis magis vrgeat: nam si B magis vrgeat Lues, huic vel primò, vel maximè incumbendum, altero non neglecto: Si magis vrgeat alter affectus, huic quoque vel primò, vel maximè incumbendum, Lue non sprete. Supponamus ergo pro exemplo aliquem putrida febre laborare, & simul Lue Venerea, habeatque febris causam à Lue seiunctam; Febri primò, & maximè incumbendum, quandoquidem & purgationes, & alterantia, & victus tenuis, qui in putridis administratur ad Lue curationem viam reddit facilem. Quod si febris sit quidem putrida, pueredo tamen ex Lue exordium sumat, talem decocto ex ligno Indico curare oportet, C præmissis tamen illis purgationibus, quæ proprium vniuscuiusque humorem respiciunt, additis præterea herbis, vel refrigerantibus, si febrilis calor sit maximus, vel deobstruentibus, si cum febre, & lue viscerum tumores, vel obstructions absint. Sudor in febre mitiori, & parua, semel saltem singulis diebus exciterur: In vehementiori intermittatur, quinimò si multum intendatur, per duos, vel tres dies intermittendus erit decocti usus. Tunc autem vel sero Caprino, vel aquis, vel decoctis refrigerantibus vtendum est. Refracto calore ad decoctum, & sudorem iterum redeundum. Reiterentur autem in his casibus sæpius medicamenta: Quando scilicet febris ex obstructione ortum duxerit. Sint autem leuiores, D vt infusio Sennæ in decocto, vel Pilule mastichinæ, & de Tribus cum Rhabarb. ad scr. ij. hora vna ante cenam exhibita, & sequenti die, quando expectatur euacuatio, sudor intermittatur. Quod si febris fuerit Hectica cum Lue tamen connexa, in hoc etiam casu considerandum, an sit cum tabe, vel sine; si cum tabe, alterum duorum agendum, vel ante usum Ligni corpus humectare, & aliquo modo renutrire oportet, vel vno eodemque tempore vtrumque præstare. Humectabitur, & renutrietur antea balneis aquæ dulcis, in unctionibus accommodatis, epithematibus & unctionibus cordi, iecori, & renibus, lacte, & optimis cibis. Simul & semel vtrumque fieri poterit; si simul cum lacte exhibeatis vel vnc. s. extracti ex ligno, vel guttas v. vel vj. olei ex ligno in eodem lacte, vel conficiatis decoctum in

A hunc modum.

℞. Ligni Indici optimi, vnc. iij.

Infundantur s. a. in aquæ lib. xij. deinde ponantur in ventre vnius optimæ pullæ addendo

Penidiarum, vnc. j;

Amygd. dulc.

Nucleorum pinus,

Seminum meloni mundatorum, an. vnc. ij;

Cochlearum, num. vj.

Carnis testudinis nemoralis incise, & lota in aqua

Farfarsæ vnc. iij.

Hordei mundi, p. s.

Bulliant simul omnia vsque ad perfectam carnis pullæ coctionem, deinde exprimantur per torcular, & huius decocti dabitur quotidie vnc. vj. vel vj. In quo casu neque sudor exciterur, neque victus tenuis instituitur, sed neque actu exsiccans; quinimò eger vtatur ouis, iusculis, panatella, & pitana, aluiusque leuibus clysteribus fluida seruetur. Et si tabes phthisi fuerit connexa, in dicto decocto addere oportet aliquid pulmonis præparati, amyllum, tragacantum, gummi Arabicum ad drach. j. pro singulo, bolum Armenum, & terram Lemniam, quæ & siccandi, & agglutinandi vim habet: & certò si in qua tabe ligni decoctum conuenit, in ea conuenitque sit expulmonis vlceri quod quidem ex tali decocto siccatur, & cicatriscatur, vt inter ceteros experientia comprobarunt Philip. Ingrass. in cons. pro Duce Terræ nouæ, & Fracastor. 3. de morbis contagiosis: Quod si simplex calida, vel iecoris, vel totius corporis intemperies Lue Venerea sit connexa, purgatio præcedens diligenter corpus ipsum præparet ad decocti qualitatem per refrigerantia sæpius reperiata, fiatque infusio in aquis stillatitijs Endiuia, Sonchi, aut Cichorei, aut etiam in aqua hordeacea, dummodo tempus anni non sit seruidum, & decoctio non transeat secundam diem, alioquin acescit, & corrumpitur decoctum. Fiant etiam iecori, & cordi epithemata: Et si calor vigeat, exhibeatis semper ante decoctum vel drach. j. succi Endiuie condensati, vel vnc. j. succi liquidi, & post singulos quatuor dies vtamini semel, vel etiam bis, si vigilia, & suis vrgeat, serum caprinum ad lib. 4. & s. neque in purgandis hisce corporibus transcendatis usum Cassia, vel syrupi rosacei, cætero sero dicto: Id ipsum de melancholia dicendum: Si lue Venerea melancholia annectatur, quæ ex Lue pendeat, Lue præcipue occurrendum, non prætermittis remediis, quæ melancholiam confert, de quibus publice laus dictum est.

*De Affectibus Luis augeſcentis. & primò
De Rimis. Cap. XXXI.*

IN Lue Venerea augeſcente multa reperiuntur ſymptomata, ac morbi, qui nec purgationibus, neque alexipharmacis dictis curantur, ſed manuaſem quæritur operationem, de quibus nunc ſigillatim dicemus, ſumpto initio à fiſſuris manuum, & pedum, deſcendentes deinceps ad totius corporis puſtulas, & cruſtoſa vlcera, dein verò ad alia quoque omnia faucium. potiſſimum, pudendi, vteri, ani, poſtq. erit ſermo de inueterata Gonorrhæa, ac Capillorum deſſuuium, quæ omnia circa hoc tempus contingunt. Quod ergò pertinet ad manuum, & pedum fiſſuras; B iſtæ ſerè ſemper cum inſigni cutis ſiccitate, ſcabritie, & duritie exiſtunt; ideò locus ante omnia eſt emolliendus. Emolliuio fit vel lotionem ex Malua, Althæa, ſem. lini, Plantagine, & Hordeo in aqua ſimplici decoctis, vel, in maiori ſiccitate, in iure capitis Caſtrati; lac quoque, & lanarum aqua in his caſibus probatur: Alij etiam per 6. vel 8. dies gerunt ſuper manus Omentum Caſtrati, vel Vituli, vel Suis. Hoc Linimentum etiam duplicem præſtabit operam, emolliendi, & moderatè ſiccandi.

*Rx. Liſbargyri ſubtiliter pulveriſati, vnc. j. C
Ceruſæ lota in aqua roſarum, vnc. s.
Mucilaginis Pſyllij, vnc. j. s.
Pinguetudinis gallinæ,
Succi Plantaginis, an. q. ſ.
miſce ſ. linimentum.*

Agitur in mortario plumbeo, cum piſtillo plumbeo per horas 4.

Cæterum, ad perfectam harum fiſſurarum curationem, aquæ fortes à ſcriptoriſus proponuntur, quarum aliqua, quæ argentum ſublimatum, & aquam Capirelli recipiunt, tamquam nimis valida, mihi non probantur, vel ſi ſublimatum in hunc uſum accipi debeat, ita præparetur.

*Rx. Argenti ſublimati, drach. ij.
Auripigmenti, drach. j.*

Coquantur ouum uſque quò dureſcat, & ſublato cortice, ac luteo, dum adhuc feruet, ſublimatum, & auripigmentum in cavitatem albuminis reponatur, tota vero hæc materia in Linteo inuoluatur, & exprimatur ſuper aquæ Plantaginis vnc. ij. & vnc. j. aquæ Roſarum. Hæc aqua, & in his, & aliis quoque vlceribus erit uulſiſſima. Vnum tamen dicam, quod expertus ſum in muliere, quæ octo annos continuos has manuum fiſſuras geſſerat, & inutiliter omnium & Venetorum, & Patauinorum Medicorum opera uſa fuerat, quò ſanè, & breui, & facile fuit curata: Eſt autem Succus illius herbar, quam

A alii Arthemifiſiam, alii Tanacetum vocant. Dum adminiſtratur hic ſuccus cauendum eſt ab omni manuum lotionem, & penna hoc ipſo illita, in ſingulas rimas ſuccus inferitur. Expertus ſum hunc ipſum ſuccum in impetigine, in vlceribus cruſtoſis, & ſuccuſſe curationem feliciter. Sic poteris pedum, & manuum rimas curare.

De Puſtulis. Cap. XXXII.

QUo ad puſtulas, iſtæ exſiccandæ ſunt, cicatrices deinde ſunt delendæ. Ad exſiccandas valet aqua iam dicta, valet etiam ſuccus. Probatum etiam ſuccus Heliotropii, Herbar Verucarar; Conuenit illiſus ex oleo per ligni extractionem factum cum ſulphure, in polinem redactum. Omnium præſtantiſſima eſt aqua ex Tartaro deſcripta ab Alphonſo Ferro lib. 3. cap. 4. quæ Patauii eſt venalis apud Pharmacopolam ab Angelo, & eſt duplex, prima fortiffima quæ fit ex ſola Tartari exſudatione, ſecunda minus valida, quæ fit per additionem aquæ ſupra Tartarum, ex quo protiam aqua deſluxerit. Valet, autem hæc aqua, & ad ſiccandas puſtulas, & ad delendas maculas. Cæterum maculas quoque miro quodam modo delet aqua Tabaci per alembicationem extracta.

De Vlceribus. Cap. XXXIII.

IN Vlceribus autem cruſtoſis, quæ magna ex parte frontem, & caput infeſtant, ante omnia cruſtam amouere oportet, tollitur autem vel butyro impoſito, vel ſæuo, vel roſacco, vel aliquo adipe. Vtrumque tamen præſtat, cruſtæ ſcilicet ablationem, & ſaniei abstractionem præcipitatum butyro mixtum, ut fit præcipitati drach. j. butyri autem vnc. j. Sublata cruſta, conſiderandum an patientes ſint in principio curationis, vel in ſine; ſi in principio, quidquid alii dicant, ego præcipitatum non laudo, nam citiſſimè cicatricem inducit: In principio autem vlcera manantia potius, quam ſtatim ſicca ſunt reddenda: Apponantur itaque ſuper filamenta digeſtiuum ex Terbinthina, oui luteo, ac melle roſaceo, ac ſuperponatur Diachylon, vel ſacrum Ceratum: Quod ſi iam vniuerſalis curationem ſit propè ſinem, ſiccantia, & cicatřiſantia probantur, præcipitatum. Inter cætera, quamquam ego in his vlceribus ſiue capitis, ſiue aliarum partium, nihil præſtantius inueni illo puluere, qui fit ex corticibus longarum chiamarum uſtis, & probè lauigatis. Hoc vnico puluere breuiſſime ſanauit vlcera & capitis, & aliarum partium agere admodum ſanabilia. Inſpergitur puluis, ſuper quo ponitur, vel unguentum palmeum, vel ex betonica, vel barbarum, vel Giſtuum, vel aliud ex ſiccantibus. Quod ſi vlcera ſint in faucibus, quæ non ſint ſordida, neque venefica, facile curantur gargarismo

ex aqua plantaginis, in qua ebullierint cortex Granatorum, Rosæ, Myrtus, & Aluminis portio. Sed sordida ulcera alia requirunt remedia fortiora: Inter hæc est aqua illa Tartari prior, quæ ulceri apponitur per gossypium extremitati vnius stili infixum, & in aqua imbutum. Idem facit, & fortius, oleum ex sulphure, aut ex Calchanto, neque periculosa hæc sunt, ut quotidie experior: Conuenit tamen in illis, qui calore sunt temperamento, post pusillum temporis fauces ablueri, vel aqua plantaginis, vel seminum emulsione, vel lacte, vel sero, sicque curantur ulcera harum partium.

De Præuis Ulceribus Cap. XXXIV.

IN augescente Venerea Lue ulcera plerumque in mulis apparent corporis partibus ægrè admodum sanabilia, quæ ideo & Telephia, & Phagedænica, & Dysepulonica, & Cancerosa, & Fistulosa nuncupari possunt; De quibus sigillatim quidem dicam, ita tamen ut prolixitatem, & confusionem prorsus effugiam. Itaque quidquid sit de tot, & tam variis ulcerum nominibus, & differentiis, mihi certò persuadeo nullum ægrè ad sanitatem perducì, nisi ob duas præcipuas causas, videlicet partis morbum, vel obiectum improporionatum. Partis autem morbus in duas subdiuiditur differentias, in intemperiem, & malam aliquam compositionem. Obiectum etiam improporionatum in duas distinguitur species in ichorem, & sorditiem; ut idè ad vlcus diuturnum curandum, vel vnum ex his, vel plura, vel quandoque omnia sunt superanda. Et quo ad intemperiem, si fuerit calida, supposita corporis prouidentia, de qua satis dictum est, abluenda est pars ulcerata, vel sero Caprino, vel aqua Hordei, Plantaginis, decocto Violarum, Rosarum, & Nymphææ, Inungenda est Rosaceo, vel Infrigidante, vel Sandalino, vel de Cersua, Camphorato. Quod si fuerit frigida, lauanda est vino, in quo Lignum, & Gentiana, Scordium, Aristolochia, & similia ebullierint. Quod si tumor ad sit, videndum qualis situmor, & si fuerit inflammatorius, ac principium sit inflammationis, reprimenda est fluxio, blandis tamen medicamentis, ne virulentia partes petat præcipuas. Idè conuenit succus Arnoglossæ cum lentibus coctis, & contusis, conuenit vinum rubrum, & subastringens, Rosæ, Plantagine, & Ligno alterarum.

Quod si iam progressa sit inflammatio, pus est mouendum superposito Emplastro ex farina hordeacea, triticea, mixta cum axungia suilla, oleo de semine lini, ac decocto maluarum, altheæ, & seminum lini. Super vlcus autem imponantur filamenta digestiua intincta, quod componitur ex Terebintina lota cum decocto ligni sancti, oleo rosaceo, ac vitellis ouorum. Excitato pure, quid sit agendum, in-

telligetis suo loco.

Quod si rumor sit durus, hic est emolliendus, & ut obiter hoc dicam, frequentes contingunt hæc durities ex imperitorum temeritate, qui statim ab initio in ulceribus Venereis aquas fortes, vel oleum ex calchanto adhibere solent; Tollatur itaque durities linimento tali.

*R. Mucilag. Psyllij, ꝛnc. ij.
Medulle cruris bonis, ꝛnc. j.
Pinged. Gallinæ, .
Anatis, an. ꝛnc. s.
Misce f. Linimentum.*

B

C

D

Cæterum super ipso ulcere nihil præstantius inuenitur ad extrahendum callum, & duritiem, præcipitato cum butyropermixto, vel pinguedine anatis: Non est tamen sapè hoc medicamentum, & continuatim repetendum, sed semel, vel bis; postea fouendus est locus decocto ex malua, althæa, & semine lini, imponendumque digestiuum ex Terebintina lota in aqua scabiosæ, cum melle rosato, & vitello oui. nam sic callosa substantiaui præcipitati extincta paulatim separatur, remanetque caro ipsa rubra. Quod si id prima, vel secunda vice non contigerit, post tres, vel quatuor dies denud poterit repeti. Neque hæc operatio prætermittenda est ob suspicionem materiæ retrocedentis, ut putant Alex. Traian. Præcipitatum enim cum butyro, & adipe tantum abest, ut reprimat quin potius omnem extrahat virtutem. Non accipio quidem hac in parte Fallopij consilium, qui etiam ad argentum viuum descendebat. Nam certè hoc medicamentum, ut intelligetis, agit reprimendo, Præcipitatum autem ob aquam illam fortem ex vitriolo, & alumine habet vim extractoriam. Placet etiam mihi ut ulcerata iam à callosa carne mundata, non statim siccetur, & cicatrice obducatur, sed adaperita conseruentur digestiuo imposito, quod paulatim pus moueat, & omne virus extrahat. Cæterum, si caro excresecens tumorem faciat calidum, & si pauca & mollis, tollitur solo puluere ex conchis, testisque, vel purpuratum, vel buccinarum: Tollit hanc ipsam, ubi frigidior sit puluis ex pumice, ex sabina, alumen vstum, Sory, Misy. Quod si maior fuerit copia, ad fortiora quoque est accedendum, ad vnguentum Aegyptiacum, & si fuerit pauci sensus, ferro etiam poterit excindi. Sic itaque tollitur impedimentum curationis ulcerum ex parte morbi. Quod si impedimentum fuerit ex sordibus crassis abstergendæ, & emundandæ sunt sordes. Absterguntur aqua mulsæ, vino mulso, lixiuio mixto cum melle rosaceo, aqua salita, præcipue marina, vel sola, vel cum melle mixta: Muria quoque in valde sordidis ulceribus pro lotionem vtiliter administratur. Super filamenta autem conuenit, vel vnguentum Aegyptiacum

cum, vel ipsummet præcipitatum cum melle A
mixtum, quod sicuti callum, ita & crassam sor-
dem mirificè ab vlceribus tollit. Sublata sorde,
siccandum est vlcus, & eò magis si ichor vel mul-
tus, vel calidus, & acris, & veneficus fluxerit:
tunc quidem primò conuenienti victu, medica-
mentis purgantibus, & reuellentibus prospici-
dum est, deinde verò munientibus partem affe-
ctam, quæ componuntur ex succo plantaginis, a-
ceto, bolo Armena, & sanguine Draconis. De-
nique siccandum est vlcus, vel Tuthia, vel pul-
uere concharum, vel buccinarum, vel rosarum,
vel alio consimili, vel etiam eo, de quo in præ-
cedenti lectione memini, confecto scilicet ex cha-
mis longis vstis, & puluerizatis. Hæc in vlcere, B
quod iam careæ intemperie, & tumore, & omni
sorde tunc & citò carnem generabunt, & cicat-
risfabunt.

De occultis vlceribus. Cap. XXXV:

P Ræterita vlcera quam ratione curentur
iam dictum est; Nunc autem de occultis
agam. Occulta sunt aliquando in glande sub
præputio, quod minimè reduci potest, quod vel
à natura, vel ex tumore constrictum fuerit. Oc-
cultasunt etiam, quæ in canali pudendi, in vte-
ro, & recto inueniuntur intestino, multi tamen
omnia negotij, & periculi. Quæ ergo sub stri- C
cto præputio continentur, dupliciter curantur,
vel iniectionibus medicamentorum per sypho-
nem inter præputium, & glandem, & imposi-
tionibus linteolorum vnguentis imbutorum, quæ
in summitate styli imposita vlceri adaptantur:
nam etsi vlcus non videatur, ex dolore tamen
innotescit: Fiant itaque & lotiones, & vnguen-
ta, pro varijs intentionibus varia, vt in præce-
denti diximus lectione. Alter modus est, vt præ-
putium naturaliter constrictum secundum lon-
gitudinem incidatur: ex tumore autem tale red-
ditum medicamentis mollientibus ad pristinum
fedeat statum. Erunt autem mollientia Empla-
stra ex lacte, farina, seminibus lini, mucilagi-
ne psyllij, vel malua, adipibus, & oleis emolli- D
entibus, fomentisque ex malua, althæa, & lini
semine, quæ si in aqua lanarum incoquantur, e-
runt efficaciora: Nam & ipsa lanarum aqua, &
vnguentum ex illarum sorditie confectum vili-
ter in hunc vsum accipitur. Sed si vlcera sint in
canali pudendi, & eaquidem magni negotij,
plerumque sunt in sanabilia. Habent enim sor-
ditiem, & carneam excrecentiam quæ vrinæ e-
missionem magna ex parte impediunt. Itaque
vt leuiora vlcera sanari possunt iniectione aquæ
plantaginis coctæ cum alumine, lithargyro,
& cerusa, ita, quæ habent sorditiem, & car-
neam excrecentiam efficaciora requirunt. Do-
cebo vos linimentum, quod pro secreto qui-
dam habent, in his casibus, & eo satis feliciter
viuntur.

*℞. Præcipitati bene præparati, vnc. j.
Argenti sublimati,
Plumbi vlli, an. drach. j.
Axungie suilla, vnc. vj.
Cera alba veteris, drach. j. s.
Camphora, scrup. ij.*

Primum quidem præcipitatum, argentum su-
blimatum, & plumbum diligentissimè sigilla-
tim supra porphyrium terunt; deinde decies si-
gillatim in aqua rosacea lauant, exsiccant in um-
bra, teruntque denuò, postea axungiam, & ce-
ram similiter in aqua rosacea decies lauant, de-
inde dissoluunt in ollula noua lento igne, ad-
dendo Camphoram, & alios pulueres semper a-
gitando, donec fiat linimentum debite formæ,
Hoc medicamentum administratur per cande-
las, quæ sic componuntur.

*℞. Cera alba, vnc. v.
Terebintina, vnc. j.
misce fiant candelæ.*

Has candelas intingunt hoc medicamento,
& in virgam immittunt: Nam & carnem ero-
dunt, & sordem tollunt. Ceterum quendam
vidi medicamentum imponentem super linte-
ola admodum subtilia extensum; Inuolebat e-
nim subtili quodam stylo prælongo, deinde im-
ponebat in virgam, & in vertendo stylo relin-
quebat linteolum, cuius portio tamen extrà ori-
ficium pèdebat, vt posset facile, & quocumque
tempore extrahi. Ego verò alium quoque exco-
gitavi modum per aptas quasdam fistulas stylū
habentes reconditum in paruo linteos, super quo
medicamentum extendatur, de quibus alibi plu-
ra. Sublata carne, quod cognosci potest ex vri-
na, quæ sine impedimento excernitur, imponen-
dum est deinceps vnguentum exsiccatum, ac do-
lorem demulcens; quale est, quod componitur
ex butyri recentis vnc. ij. cerusæ lotæ in aqua
rosarum vnc. j. Camphoræ scrup. j. & modico cere
albæ. Sed si vlcus fuerit in vtero, illudq; sordidū,
& depascens, atque penitiores obsederit vteri par-
tes, est prorsus insanabile. Quod verò mitius est,
curari solet in sessionibus, pessariis, & iniectioni-
bus. Fiunt in sessiones in aquis thermalibus, præ-
cipue verò aluminosis, & salsis, quibus lignum,
& salsa sunt coquenda: Conferunt iniectiones ex
decocto plantaginis, scabiosæ, oliuæ, ligui, & salsæ
aluminis; conueniunt pessaria ex succo planta-
ginis mixto cum puluere aluminis, nitri, bolo
Armena, & similibus siccantibus, de quibus
in hesterna lectione. Sed si sordida sint vlcera,
iniectiones fiant ex mulsa facta in aqua ther-
mali: Si maior sit sordities, fiat in aqua salsa,
fiat cum lixiuio; In maiore adhuc sorditie, ex-
pedit lotioni immiscere scrup. i. unguenti
Ægyptiaci, post quam ablutionem conue-
niunt siccantia; sint autem decocta ex miz-
tis,

tis, rosis, balauftijs, gallis, nucibus Cupressi, addito alumine, sale, & sulphure, inponantur linteola intincta vnguento ex Tuthia, cui admisceatur aliquid etiam lithargyri. Non improbo olea illa Hispanica, quae sub nomine Balsami sunt venalia; suffumigia etiam per tubulum aliquem in vtero suscepta mirifice valent. Sed de modo suffumigij aliquid docendi estis; quandoquidem aliud est libros legere, aliud operari. Ego paravi suffumigia in forma rotularum; Imponebam in ollula cum prunis accensis, super ollulam imponebam instrumentum stanneum, quod per tubulum deducebat fumum in vterum, sed ferè momento temporis accendebatur tubulus, ut non posset sustineri; si paucae essent prunae, fumus non emittebatur. Paravi deinceps candela ex cinnabari, & cera, sed cum primum candela esset sub instrumento, exstinguebatur. Itaque tandem ego excogitavi suffumigium in ea auicularum forma, quae est venalis, vocant vulgo Oseletti di Cipro sunt suffumigia communia ad dolorem excitandum facta, quae si accendantur in summitate, paulatim accenduntur usque ad imam partem, fumum emittunt, non exstinguntur, neque instrumentum exurunt. Paravi has auiculas ex Cinnabari, Styrace, & Belzuino, & aliis multis apud Pharmacopolam à tribus sideribus.

De Thymis & Verrucis. Cap. XXXVI.

Inter ceteros morbos ac Symptomata, quae angescuntur consequuntur Lucem, sunt Thymi, & Verrucae, Gonorrhoea confirmata, Capillorum, Ciliorum, Barbae ac Superciliorum defluuium, de quibus agendum est. Primo quod ad Verrucas, & thymos pertinet, siue sint in pudendo, ano, vulua, considerandum, vitrum basim habeant angustam, extermitates vero latas necne? si enim basis fuerit angusta, ligatura, vel filo serico, vel equina seta conuenit usquequò caro illa nigrescat: Nam vel spontè cadit, vel excidi potest, vel caustico medicamèto corrodì; quinimo in agrestibus hominibus statim forcipe hæc omnia sunt abscindenda; permittendus est sanguinis exitus, non tamen ultra vires; deinde vstio actualis conuenit. Quod si vel grandiores sint tumores, quàm ut semel abscindi possint, vel basim habeant latam, paulatim illos consumere oportet. Multa in his casibus proponuntur, duo tamen illa sunt, quae opus perficiunt, videlicet, vel aqua fortis, quae videntur Aurifices ad segregandum aurum ab aliis metallis, vel puluis Fallopij descriptus in cap. 88. ex Arsenico Crystallino, & Rubro, quod Auripigmentum vocant. Muniendæ sunt autem partes circumstantes vel linimentis, vel vnguentis, & si puluis adhibeatur, sit valdè modicus, ita ut summo cuspidi vnus styli, qui habeat gossypium, leuissima portio inhereat; alioqui, multum dilaturatur operatio, videntur

A quidam in miuoribus oleo ex sulphure, ex vitriolo; & in paruis, ac mollibus iuuant, sicuti etiam iuuat puluis Sabinæ, vel Auripigmentum solum; sed in grandioribus, & durioribus ad proposita confugiendum est.

De Gonorrhoea antiqua. Cap. XXXVII.

In curanda antiqua Gonorrhoea primò omnia obseruantur, quae in Gonorrhoea recenti fuere proposita, deinde insistendum in diuersionibus, atque alexipharmacis. Deriuationes, ac diuersiones sunt omnium generum. Conuenit vomitus, alui subductio per medicamentum, & Clysteres; Conueniunt sudorifica, frictiones, & inter cetera mutatio aeris, & itineratio.

Noui quosdam, qui solo aeris & loci mutatione à longis fuerunt liberati gonorrhoeis, vel quod excitatio humores aliò diuertat, vel quod & cogitatione, & opere à rebus Veneris distant, quod in Gonorrhoea summum, ac vnicum est ferè auxilium; neque enim vllus vquam à Gonorrhoea liberatur, qui veneri admodum liberaliter indulgeat, & frequenter de Veneris cogitet. Agendum etiam alexipharmacis, videlicet ex decocto ligni per os assumpto, & frequentioribus lotionibus circa pubem, ac testes administratis ex eodem decocto ligni, & corticis, quinimò ex iniectionibus eiusdem decocti in virgam, post quae si quispiam voluerit, etiam adstrictorijs, & valdè refrigerantibus viui, id sanè mihi improbat. Improbantur autem ista ante vsum alexipharmaci, sunt autem inter hæc succus limonum cum aqua rosacea, quibus promiscuè, & ante tempus quidam vtuntur, suppressa quidem aliquando Gonorrhoea, sed superuenientibus alijs grauioribus morbis. Itaque post vsum decocti 20. vel 30. dies administrati, laudo, vt tunc ante decoctum præbeat succus lanonum, aquae rosae, vel plantaginis, vel nymphæ, vel portulacæ an. xnc. ij. boli Armeni Orientalis drach. i. misce. Sciendum autem est, quod habui à quibusdam expertis Venetis; Dicunt se à Gonorrhoea statim curatos vsum Veneris cum muliere Aethiopo. Experimentum est verum, & videtur posse confirmari ex Scaligero exercitatione 180. cap. 18. qui scribit Afros à Lue Venerea curari, dum in Numidiam, & Aethiopiam succedunt, Hæc quoque scio, si tamen licetis consignem: licet ab antiqua Gonorrhoea plures fuisse liberatos qui cum vxore Virgine rem habuerunt, sed tunc mulier inficitur.

De Capillorum defluuiio. Cap. XXXVIII.

Quò ad defluuium capillorum, illud non est commune, sed aliquam habet cum Alopecia affinitatem: ex Gal. enim prius de compos. per loc. defluuium capillorum ex triplici tantum fit causa, ex nimia cutis raritate, nimia

nimia densitate, & ex materiz defectu: Alopecia A
autem sit ex prauis humoribus pilos erodenti-
bus. Itaque in Lue Venerea cum defluant ca-
pilli, potius ex erosione quam ex alijs tribus cau-
sis, consequenter hoc defluuium Luis Venereæ
maiores habet affinitatem cum communi de-
fluuiio. Huic igitur occurrendum medicamen-
tis, quæ Luem Veneream expugnent, præmissa
corporis, & capitis purgatione, de qua pluries di-
ctum est. Nunc autem circa localia tantum ver-
sabor; Et quia hic casus vel est in fieri, vel in fa-
cto esse, quæritur quid agendum, ubi est in fie-
ri. Vtuntur aliqui statim decoctis adstringenti-
bus, cum tamen non superata Lue, & nihil pro-
ficient, & quod deterius est, vlcera capitis, dolo-
res, & tophos inferant. Sed dicetis quid agen-
dum cum illis nobilibus, qui malunt mori, quam
depilari, cum Religiosis etiam, quorum morbos
occultos esse oportet? In his duplex est ratio cu-
randi; Altera, vt vsquequò vetemur casum pilo-
rum; vtamur assidue purgante medicamento a-
lexipharmacis commixto, ideo accipiant vel ele-
ctuarium aliquod solutiuum, vel pulueres, vel
decoctiones ex ligno solutiuas, quæ medicamen-
ta recipiant, & valida, & humori vniuscuius-
que accommodata, Hoc modo quosdam præser-
uauimus, quibus defluuium inceperat. Alia proponi-
tur ratio curandi per inunctionem ex Hydrar-
gyro. Afferunt quidam hac vnctione omni-
nò defluuium capillorum impediri, putoquò id
fieri posse, non tamen sum expertus; Ratio id
persuadet, ideo non abhorreo. Cum autem iam
defluuium sit factum, studendum est, vt capilli,
& barba quamprimum reuocentur, ad quod hæc
omnia sunt ordine agenda. Primò, si quid pilo-
rum superfuerit, illud rasura tollendum, deinde
caput lauandum vel vrina, vel vino maluatico,
vel decocto.

Re. Lixiuij facti ex cineribus arundinũ. lib. vj
Seminum Nasturtij.
Sinapis,
Euphorbij, an drach. iij.
Radicum Asphodelorum, vnc. ij.
Capillorum Veneris,
Fenugreci, an. m. j.
Laudani,

Bulliant in dicto lixiuio pro lotionem capitis.
Facta lotionem, fricanda est pars aspero linteo, in
quo, si humores calidi abundant, sit puluis, seu
cinis canctorum vstorum, pumicis, spongia, ossis
sepia (per spongiam intellige eam, quæ reperi-
tur in rosario siluestri) fiat, frictio hoc puluere
vsque ad rubedinem cutis, postea vngatur caput
oleo laurino, mixta cum sinapi, vel fiat linimen-
tum ex adipe Vrsino, quod Galen. 1 l. simpl. in
hoc casu maximè laudat, & felle Taurino simul
cum puluere sinapis, radices Thapsia, Euphorbij,
& Myrta, vel fiat ceratum sic.

Re. Euphorbij, vnc. s.

Sinapis,

Piperis,

Pyrethri, an. drach. j.

Batrachij pulueris.

Myrtæ,

Nasturtij, an. drach. ij.

Resina,

Picis an. q. s.

misce, f. ceratum.

Quidam vtuntur in agrestibus linimento fa-
cto ex calce puluerisata, oleo rosaceo mixta. Pri-
mas etiam partes in hoc pilorum exortu puratur
habere linimentum, vel ceratum ex Cantharidi-
bus confectum, quia & causam erosionis tollit,
& materiam pili ad locum subito attrahit.

De curatione Luis antiquæ. Cap. XXXIX.

Cum ex antiquis affectibus nemo sit, qui aut
magnitudine, vel malignitate, vel sympto-
matum numero, & vehementia Luem Veneream
anteceat, ideo si hæc aliquando antiquata fue-
rit, summam requirit exercitissimæ Medici dili-
gentiam. Quantum itaque in me erit, pauca ta-
men, huius antiqui affectus integram curationem
proponam. Et quia inter tot, ac tam multa ma-
la, quæ antiquam Luem consequuntur, præcipua
sunt tophi, ossum corruptiones, articulorum lu-
xationes, claudicationes, cæcitates, tinnitus auri-
um, & surditates, doloresq; implacabiles, dicam
primùm qua ope indiscriminatim his omnibus
prodesse possimus, sigillatim deinceps de auxilijs
verba faciam, quæ ad hunc, vel illum affectum
diriguntur. Sunt autem in usu pro antiqua Lue
superanda Hydrargyrum intrinsecus, & extrin-
secus administratum, inunctio scilicet, aut cera-
tum, suffumigium præterea ex Cinnabri, pillula
ex hydrargyro, boli ex præcipitato, ad hæc aquæ,
quas Fernel. & Rondelet. opiatas vocant, decoctum
denique ligni Indici singulari modo proponen-
do administratum. Versabor primùm circa in-
unctionem, deinde circa reliqua. Omittam illas
Diquæstiones de natura, facultatibus, & modo ope-
randi hydrargyri ab omnibus ferè institutas: ad
presentem enim curationem non competunt.
Illud satis fuerit adnotasse, hydrargyrum, quod
à quibusdam frigidum, & humidum, à nonnul-
lis calidum, & humidum, ab alijs calidum & sic-
cum censetur, inæqualem obtinere temperiem,
idecirco operationes contrarias efficere, quod ui-
deo sensisse Conciliatorem Differentia, 151. ac-
cepisse Alfonso Ferrum lib. 3. c. 9. atque ideo
medicamentum hoc & vlcetare, & congelare pòt
calorem, & inflammationes incitare ex alia par-
te torporem, paralytim, aliosq; frigidos affectus
inducere. Oriuntur hæc ex temperamenti inæqua-
litate, ed quòd mixtum sit imperfectum; ideo
si per calcinationem præparetur hydrargyrum,

De Lue Ven.

E

frigi-

frigida euolante substantia, quod relinquitur igneum est. Operatur autem hoc medicamentum potius propellendo, ut sentit Montanus, quam attrahendo, ut voluit Rondelet. Propellit hoc medicamentum, si extrinsecus adhibeatur, in penitiores, & longinquas partes, atque ideo fluxum ventris, spumumque proritat, ut experientia ostendit. Itaque his breuiter sic determinatis, illud ad praesentem rem facere videtur, ut queramus, numquid hoc medicamentum inunctione administratum conueniat nec ne? Ex vna enim parte Montanus, cui adhaeret Fernelius, est accerrimus huius medicamenti oppugnator, & vterque profiteretur nullum vnquam ab hoc medicamento curatum, sed, quod peius est, morbum fieri in sanabilem, agrosque dentium casum incidere, oris torturam, stuporem, paralyfim, tabem, omniumque partium corporis imbecillitate, ossium molliem, ita ut quasi cera flectantur. His alij quoque adhaerent, ut Fracanzanus; Fallop. quoque, & si multas huic remedio tribuat dotes, tandem videtur illud potius reprobasse, quam admisisse. Ex alia parte, si ad calculos res ipsa deferatur, innumeri ferè sunt, qui huius remedij vsum laudant. Ego neque illos accipio, qui indiscriminatim hydrargyri vtuntur inunctione, neque cum illis sentio, qui ipsum prorsus improbarunt. Sunt affectus Venerei vsque adeo contumaces, qui decocto ligni Indici vsque ad dies etiam 30. semel, bis, & ter ritè administrationumquam cessarunt, in deterius lapsi sunt. Quid tandem agendum? Recusant patientes noua decocta, illis nihil confidunt, alij pauperes, alij sudoris & inediae impatientes sunt. In his factis est medicamento veli alioquin periculoso; quàm insanabile malum relinquere. Itaque in his tantum casibus inunctionis vsum admitto, quam quidem putarunt aliqui viris tantum esse accommodatam, pueris, & mulieribus minimè. Ego in hac parte Leonardi Botalli lubens sequor consilium, qui pueros blando tamen linimento, ac mulieres inungit. Tempus optimum est Ver, & Autumnus; si tamen vrgeat necessitas, hyeme in Laconicis, æstate quoque tunc quisque poterit inungi. Hac æstate, mense Iulio mulierè inunxi, quæ integrè est curata. Quoad modum, quædam agenda sunt ante inunctionem; Purgandum est corpus medicamentis, & sanguine misso: Medicamenti quidem, ne tantopere spumum abundet, ut vel suffocet, vel paralyfim, vel Apoplexiam inferat; Sanguinis autem missione, ne fiat Agina, aut febris, aut insignis faucium, & palati inflammatio; Fallop. ante inunctionem vtiur quoque decocto ex ligno sancto, ut robotet viscera, ne hydrargyri noxiam vim suscipiant. Quod etsi mihi non extra rationem videatur, attamen ego alio tempore ligni facultate vtor. Tempore inunctionis parandum primum est linimentum, & quia potest preparari vel pro nobilibus, vel pro plebeis, ad hæc quando preparatur linimentum, vel paucis laborat to-

phus tantum, vel vlceribus tantum, vel virisque; ideo docebo vos breuem conficiendi modum, ac variam preparationem. Primum si topis sit incumbendum, ea recipienda sunt in linimento, quæ molliant, ut axungia, adipēs anatis, & anseris, vrsi, medulla cruris bouis, oleum amygdalarum dulcium, butyrum. Quod si vlceribus sit incumbendum, imponendi sunt pulueres sicantes, thus, myrrha, aloë, lithargyrum, cerusa, & si fuerint leuiora, ad Cinnabarim quoque, & Præcipitatum est confugiendum. Id ergo primum seruandum. Secundò oportet obseruare, ut argentum viuum pro vlceribus extinguatur in salua humana, pro topis in axungia suilla, aut butyro; Axungia tamen, neque liquata, si fieri potest, esse debet. Tertiã regula est, ut admisceantur medicamenta, quæ præbent penetrationem, & simul partes roborent. Inter hæc est Crocus, & oleum ex Terebinthina. Habenda quoque sunt ea, quæ partes magis læsas, & principales respiciant; ideo si articuli lædantur, Iua est imponenda; Si iecur vel ventriculus, iecoraria, & stomatica permiscenda, &c. Vnum tamen præ cæteris mihi probatur, ut scilicet inunctioni adhibeatis oleum ex ligno sancto, In hac administratione ego maximam repono curationis spem: cum enim hydrargyrum in singulas quoque & penitiores corporis partes penetret, secumque medicamentorum facultates adducat, si oleum ex ligno admisceatur, sperandum est, vno, & eodem tempore futuram noxiæ excretionem, lumenque ipsam expugnatum iri. Itaque si pro nobilibus conficiatur linimentum ad topicos, sic fiat.

℞. Argenti viui. vnc. vj.

Pingued. suilla non liquata, neque salita, lib. j.

Exstinguatur argentum viuum in prædicta axungia. s. a. deinde adde,

Medulla cruris bonis, vnc. s.

Olei ex Terebinth. vnc. j. vel Terebinthina

Olei ex ligno sancto, vnc. iij.

Croci, drach. j.

Pulueris Iuæ,

Betonice, an. vnc. s.

misce, fiat linimentum.

Quidam ponunt Theriacam & Mithridatiũ, sed ego vereor ex his nimiam caliditatem. Ad vlcera talis sit inunctio.

℞. Argenti viui exstincti in salua hominis sani. vnc. vj.

Olei ex ligno Sancto, vnc. iij.

Thuris,

Myrrhæ,

Aloes,

Lithargyri, an. drach. ij.

misce.

Si vlcera fuerint valdè sordida; poteritis addere Cinnabaris drach. ij. Propaupetibus, vbi adsunt tophi, sic torrate :

R. Unguenti Dialibæ, vnc. iij.

Argenti viui extincti in pinguedine porci. vnc. vj.

Misce f. Linimentum.

Vbi adsunt vlcera, accipite vel vnguentum ex Tutia, vel ex Cerusa, vel vnguentum Palmecum, & dissoluite in Cassia, & dissoluto addite hydrargyrum extinctum salua humana. Linimento ad inunctionem preparato, in vnctionis tempore, sic procedendum est. Calidum Conclauē eligatur, in quo sit Laconicum, sitq; aer sēper calidus, tūm præcipuè, cū inunctio adhibetur. Inungantur autem prius inferiores, deinde verò superiores articuli. Quamquam enim alij aliter senserint, ratio persuadet, vt dum hydrargyrum, quod vi califica semper superiora petit, semper principium sui motus ab inferioribus desumere, non à superioribus debeat. Hinc fit, vt magna ex parte virulentiam omnem per sputum expuetur. Non debent autem articuli multo onerari vnguento, sed quod experientia probauit, vobis etiam propono, vt digito pollice modica vnguenti portio accipiat, & ea tantum locus articuli hinc, inde confricetur, deinde verò aliqua linimenti portione integatur. Idcirco sitophus in spaciis intermediis, inter virumque articulum sit, ille etiam locus est inungendus. Vngantur autem prima die articuli tantum, absque spina; secunda autem die inungantur etiam verrebræ; & si doleant costæ, vel thoracis partes, his quoque conuenit adhibere inunctionem. Ceterum, non consulo inungendum caput, neque vquam inunxi, & vidi experimentum cuiusdam mulieris casu inunctæ, quæ obiit. Laborauerat mulier quartana, in qua multi fuerant excitati pediculi, patrona domus inunxit hydrargyro caput, & subsecutis morbis, ac symptomatibus conuenientibus post 14. dies obiit. Inunctio debet fieri vsquequò sensibilis aliqua excretio appareat per sputum, vel per alui deiectionem. Cum primū apparuerit, si benè procedat, protus desistendum, silentè succedat euacuatio, semel adhuc, vel bis inungendum. Sudorem, quidquid sentiat Rondelet. eo tempore non consulo excitandum: Vis enim hydrargyri in vnctione, vt dictum est, ea est, vt humores intro propellat, sputum proritet, vel alui deiectionem promoueat. Itaque sudorem prouocare, erit motum contrarium efficere. Quod si alui fluxus succedat, inspicienda sunt excrementa: sæpe enim non modo biliosa, sed colliquatūda, & cruenta apparent, in quo casu frigidis epizematibus, & succis Endiuiz, Cichorei, tepidis tamen adhibitis Iecori est succurrendum; leuibus etiam clysteribus ex lacte, & butyro est vt-

tendum. Confirmandus est ventriculus, & cor fomentis, & inunctionibus ad reprimendam hydrargyri venenatam qualitatem. Idèò ventriculo spongiæ adhibeantur vino generoso imbutæ, in quo bullierit Absinthium, & Menta; Cordi autem fiat inunctio ex Theriaca cum Sandalino. Si dolor circa fauces, & gingiuas grauius affligerit, collutione vtendum ex sero, ex lacte, ex emulsione seminum melonum. Ad sortitient vlcerum confert aqua chalybeata cum melle rosaceo, cui incoquere poteritis aliquid Maluæ, Hordei, Ligni sancti. Et si factor fuerit insignis, & putredo, aliquid Scordij. Si superueniat Angina, in virium robore secunda est vena humeraria, adhibendæ cucurbitulæ scarificatæ, aperiendæ venæ sub lingua. Hæc omnia etiam tempore inunctionis prodesse cōfirmavit experientia, & sumorum virorum authoritas, & inter ceteros Fallopij. Si alius sit stiptica, clysteribus præcipuè agendum: Medicamenta enim mihi minis placent. Interim vitendum, vt hydrargyrum euacuetur. Euacuabitur autem aureo nummo purissimo continuo in ore retento, qui tamen statim ac hydrargyro fuerit cooperatus, mureretur, idq; toties faciendum, quoties argentum auro adhaferit. Victus ratio hoc ipso tempore plena potius, quam tenuis esse debet. Et quoniam isti masticare non possunt, danda oua forbilia, panatellæ, contusa carniū destillata in duplici vase, vinumque neque omnino generosum, neque valdè oligophorum. Reprobanda prorsus est ratio Empiricorum, qui suis illis vinis generosis caput replent, Anginas, & Paralyfes inferunt. Vbi iam inunctio sit perfecta, sputumque vt dixi benè procedat, lauandæ sunt partes iam inunctæ; lotio fiat vino albo generoso, in quo ebullierint Salua, Rosmarinus, Iua, Calamentum montanum, Storchas, Lauri folia, & Iuniperi. Postea vt corroborentur partes, imponenda sunt cerata, quæ vim habeant, & digerendi humorum reliquias, & adstringendi vias, atque corroborandi calidum partis innatum, Vt hæc fiant, spongiola aqua ardenti imbuta confricandi sunt artus, deinde hoc cerato contegendi,

R. Ammoniæ,

Bdellij,

Sagapeni,

Oppoponacis, anc. vnc. s.

Euphorbij,

Radicum cyclam. puluerisat.

Iua puluerisatæ,

Betonica, an. drach. ij.

Piperis,

Pyrethri,

Costi, an. drach. j.

Picis,

Resinæ Terebintbinæ an. q. s.

Dissolutis gummi in vino albo generoso, f. Ceratum.

De Lue Ven.

C 2 Ab-

Absoluta purgatione, vel per sputum, vel per aluum, duobus praecipue incumbendum, vno, ut si quid hydrargyri in penitioribus fuerit partibus relictum, illud quoque euacuetur: altero ut si Luis adsint reliquiae, illae extirpentur: Hydrargyrum purgabitur dupliciter, primo quidem si aucto calore laconici iterum assumant patientes nummum aureum in ore: Hae enim est hydrargyri natura, ut quamprimum caloris vim experitur, superiora petat, idcirco si quis anulum confecerit æneum, illumque cauum, & hydrargyro impleat, secundum sui mediam partem, & igni appropinquet, videbit anulum saltantem spacio vnus diminui horae. Itaque aucto fornacis calore, corpore vniuerso sic incalente hydrargyrum ascendit, & sic in aureum nummum recipitur: Alter modus, est, ut quotide pilulam vnā præbeatis ex duobus auri folijs confectā: Hae enim ratione, si hydrargyrum fuerit in corpore, auro adhærebit. Ut autem Luēs superetur, post inunctionem, ligni facultate viuendum omnino est, sine qua omnes qui inunguntur hydrargyro, tametsi post inunctionem sani videantur, paulo post recidivas faciunt deteriores. Hydrargyrum enim non est Luis alexipharmacum copiam tantum viscidiorum humorum expurgat, quibus expurgatis, alexipharmacum prompte, & foruter operatur. Itaque in corpore sic mundato, aut decoctum ex ligno, aut oleum, aut extractum eo modo administrata, quem satis locis proposui, certam & integrā, præstabunt valetudinem. Hoc vnum est obseruandum, ut victus oratio non sit perinde tenuis, qualis fuit instituta illis, qui antea non fuerint iniuncti: plenior sit victus, bibant vinum, vel simplex, vel secunda permixtum aqua, dummodo facultatem Guaiaci recipiant, & sudorem excitari permittant tunc enim sudor est apprimè opportunus.

De Hydrargyro intrinsecus exhibendo, Cap. XXXX.

Recentiores, ne quid intactum pro Lue expugnanda relinquerent, hydrargyro vtuntur non modò pro inunctione, ut dictum est, pilulis, & bolis, verum etiam in suffimentis. Quāquam enim sunt quoque in usu suffimenta quaedam mitiora ex thure, myrrha, styrace, belzoino, laudando, croco, ligno aloes, &c. Hæc tamen mitiora sunt, quā ut possint Luem confirmatam expugnare, idcirco veneficis quibusdam suffimentis vtuntur, quorum quaedam particularia sunt, quaedam vniuersalia. Particularia in usu esse solent pro superandis pedum, & manuum fissuris, vteri, ani, & narium vlceribus: In quem usum candelæ cereæ excoctæ fuerunt, quæ præter ceram, & Cinnabrim, thus, & myrrham, &c. recipiant. De particularibus iam non loquimur, sed de vniuersalibus suffimentis ex venenosa materia præparatis, quæ pu-

Atantur antiquam Luem prorsus superare. Parantur ista ex cinnabari arte facta. ex sulphure, & argento viuo confecto, & auripigmento, & Sandaracha Græcorum, ex thure, myrrha, &c. sic.

℞. Cinnabaris, vnc. i. s.

Auri pigmenti, vnc. s.

Thuris,

Myrrha,

Ligni Aloes, an. drach. ij.

Terebinthina, q. s.

Misce, f. Formula 31.

BAdministrantur suffumigia illis præcipue, qui vlceribus antiquis, vel impetigine fœda, & confirmata tentantur. Idcirco in vlceribus nasi, faucium, & palati, & ad cohibendam capillorum defluxionem, & ad aliquam surditatem; & tinnitum primas partes habere credantur. Non sunt tamen aut consumptis, vel difficultate anhelitus laborantibus, vel lienteria, aut alui fluxione tentatis, administranda; immò, ut verius dicam, ex mea sententia nemini; si tamen alicui, sic fiant. Constituto ægro in conclauis calido summo manè purgato primùm corpore, ut iam de inunctione dictum est, sub conopæum seu tentorium inducitur, in quo sint carbonēs, accensi, ferro, vel vitro carbonibus imposito, nudo existente corpore rotula vna ex iam dictis super prunas imponitur donec fumus consumatur, deinde super additur secunda, & tertia, Interim interrogandi sunt patientes, an deliquium animi patiantur, immò oportet eos quoque per aliquod tentorii foramen inspicere: Nam quidam momento temporis suffocati sunt; idcirco, si quid periculi immineat, in eo casu apertendum est Conopæum, faciesque frigida aqua inspergenda. Placeat Fallopij consilium, ut arundinem perforatā in ore detineant, cuius extremitas sit extra tentorium, per quam virgente syncopis periculo frigidum aetem possint inspirare. Consumpto fumo, in cubili calido sunt reponendi, cibis optimi succi præbendus, & si vlcera exteriora sint admodum contumacia, primò lauanda sunt aqua rosacea mixta cum modica portione aquæ magistralis, deinde imponendum erit hoc linimentum.

℞. Axungia suille non salita,

Butyri recentis, an. vnc. ij.

Argenti viui in dicta axungia, & butyro hystinditi, vnc. s.

Thuris,

Myrrha, an. drach. j.

Cera, q. s.

Misce, f. Linimentum:

DSuffimentum autem eodem die ante conam eodem modo est repetendum; Idque bi-duo, aut triduo faciendum, donec sensibilis aliqua excretio vel sputi, vel alui succedat: Nā vtrumque fieri solet. Apparente excretionē, cessan-

cessandum à suffimentis, instituendus victus, A qualis etiam inunctis, post sputum decoctio similis Guaiaci danda est. Hi sunt modi precipui, quibus antiqua Lues solet curari, qui quidem omni sanè iure optimo ob insignem videlicet molestiam, & aliquod periculum non ab omnibus libenter admittuntur. Sed quid tandem agendum est? Puto in his casibus vires ligni Indici usque adeò esse intendendas, ut hac ratione re medijs quoque localibus non prætermisiss Lues Venerea antiqua cum suis symptomatis, & morbis superetur. Intenditur autem facultas ligni Indici multis modis. Primum si per singulam aquæ lib. vnc. j. ligni optimi capiamus, ac præte- B rea drach. ij. salsæ, & totidem corticis, v. g.

De Ligni indicis optimi, lib. j.

Salsæ,

Corticis, an. vnc. iij.

Infundantur in aquæ lib. xij. Intenditur præ- terea, si decoctio fiat usque ad consumptionem duarum partium aquæ. Erit efficacius auxiliū, si cum singulo syrupo imponatis drach. s. olei ex ligno: Efficacius erit si simul cum decocto aliquam præbeat distillatitiam aquam ex illis, quas Rondelet & Fernel opiatas vocant. Fiunt autem ex Theriaca, Carduo benedicto, Dictamno, Pulegio, Ligno sancto, maceratis in vino generoso, & distillatis per alembicum. In summa corporis frigiditate non improbat infusio, & decoctio Ligni, & Salsæ in vino generoso, quid- quid sentiat hac in parte Antonius Gallus, qui C hanc vini decoctionem improbauit. Efficax quoque erit remedium ex ligno, si, facta diligentissima corporis purgatione, præbeatur per 60. & 70. dies cum victu quidem tenui, si vires sustineant, cum moderato, si fuerint imbecilliores. Quo ad sudorem notandum, quod si tinnitus aurium, vel gravis adsit auditus, sudor in Laconico excitatus integram facit surditatem, si exquisita sit surditas, sudor Laconico curat surditatem: Hoc possum experientia testari: sutor enim habui omninò surdum, qui in publico sudans Laconico à surditate est curatus, cum tamen alij plurimi solo tinnitu laborantes ex Laconico surdi fuerint facti. Itaque excitandus est istis sudor aut in cubili per vesicas, cucurbitas decoctis sudorificis repletas, aut si extra cubile, D Caput in aere calido minimè vertetur.

De symptomatis, ac morbis Lue antiquæ.

Cap. ultimum.

Interim symptomatis, & morbis est occurrendum. Et pro surditate Venerea ego se-

liciter usus sum Vesicatorijs post aures, intrinsecus autem gossypio intento oleo ex ligno mixto cum aqua ardenti. Pro tumoribus duris, si sint minores, tolluntur hi imposita radice altheæ macerata in aqua ardenti, aut oxelæ, aut tetrapharmaco, aut medicamento Galenico, quod proponitur 10. simpl. ex caseo aliquo mixto cum decocto ex talo suillo, aut medulla eiusdem tali suilli per ignem colliquata, aut luto aliquo emolliente, aut cerato ex Ammoniaco cum aceto dissoluto, addita suffumigatione ex lapide pyritide. Quod si tumor sit maior, sensibilibus est euacuandus, vel vesicatorio, quo certè hoc ipso anno ego maximum sustuli in femore tophum Venereum, vel cauterio actuali, vel igne, vel caustico facto, ita tamen ut globulus aliquis in foramine tamdiu detineatur, donec tota materia expurgetur. Quod si tumor sit mollis, emulseturque meliceridem (in quo casu os suppositum solet esse corruptum) vel caustico, vel ignito ferro penetrandum est ad os usque, atque illud corruptum omninò separandum. Separatur autem, vel subito, vel sensim; subito, vel scalpello incisorio, & malleolo, ut faciunt statuarij, quod potest fieri ossibus, crurum, tibiærum; vel scalpello rasorio, vel facta terebratione. Quod si subitam quis non sustineat separationem, paulatim os abscedere oportet; abscedet autem, si amplius non fruatur communi vita cum reliqua ossis parte; Distitueretur autem communi alimēto, aut igne actuali, aut frigidis medicamentis in quarto gradu, aut causticis. Actualis ignis probatur in capite, neque in vertebriis, aut thorace; si quis ignem abhorreat, accipiantur potius caustica: Nam illa frigida, & sicca in quarto, ut Mandragora, & Hyoscyamus, quibus tamen vsi sunt antiquiores, non probantur, ne fortè etiam partes ultra modum refrigerentur. Magis probatur oleum ex sulphure, ex Calchanto, aqua magistralis, pulvis Ireos, Peucedani, Aristolochiæ; ita tamen, ut post calida medicamenta, locus aqua roseæ refrigeretur, ac circumstantes partes succo aliquo frigido muniantur, deinde verò quotidie pulueres propositis ex Aristolochia, &c. imponantur. Osse separato, vlcus carne implendum est, & cicatrifandum. Aliqua essent dicenda de magno palati vlcere, & nasi quia tamen à Fallopio proprio libro de Lue Venerea proposita fuerunt ab his superfedere volo.

F I N I S.

TABVLA CAPITVM;

Quæ continentur in hoc Libro.



<i>De essentia Luis Venerea, Cap. 1. pag. 1</i>		<i>De Internis, cap. 20</i>	10
<i>De essentia Luis Venerea in relatione ad suas causas efficientes, cap. 2</i>	1	<i>De Augescentis Luis curatio, c. 21.</i>	10
<i>De subiecto Luis Venerea, cap. 3</i>	2	<i>De Hydrargyri Usu, cap. 22.</i>	12
<i>De dispositis ad Lnem, cap. 4</i>	2	<i>De Diaphoreticis, cap. 23.</i>	14
<i>De Lue considerata in relatione ad effectus, cap. 5.</i>	3	<i>De Alexipharmacis cõmunib. c. 24.</i>	14
<i>De differentiis Luis, cap. 6</i>	4	<i>De China, cap. 25</i>	15
<i>De Signis, cap. 7</i>	4	<i>De Salsa, cap. 26</i>	15
<i>De signis Luis Incipientis, cap. 8</i>	4	<i>De Ligno, cap. 27</i>	16
<i>De signis Luis Augescentis, cap. 9</i>	5	<i>De Medicamentis tpe decocti, c. 28.</i>	17
<i>De signis Antiquæ Luis, cap. 10</i>	5	<i>De Victu, cap. 29</i>	18
<i>De signis Luis Occulta, cap. 11</i>	5	<i>De exhibendo decocto cõposito, c. 30.</i>	19
<i>De signis Luis in hoc, vel illo subiecto, cap. 12</i>	6	<i>De Affectibus Luis augescentis, & primo de Rimis, cap. 31.</i>	21
<i>De signis Causarum, cap. 13</i>	6	<i>De Pusulis, cap. 32</i>	ibid.
<i>De signis Magna Luis, cap. 14</i>	6	<i>De Vlceribus, cap. 33.</i>	ibid.
<i>De Prognosticis, cap. 15</i>	6	<i>De Prauis Vlceribus, cap. 34</i>	22
<i>De Præseruatione, cap. 16</i>	6	<i>De Occultis Vlceribus, cap. 35</i>	23
<i>De curatione Luis Venerea, cap. 17</i>	8	<i>De Thymis, & Verrucis, cap. 36</i>	24
<i>De Lenientibus, cap. 18</i>	8	<i>De Gonorrhæa antiqua, cap. 37</i>	ibidem
<i>De Bubone, Carie, & Gonorrhæa cap. 16</i>	9	<i>De Capillorum defluuiio, cap. 38</i>	ibidem
		<i>De Curatione Luis antiquæ, c. 39</i>	25
		<i>De Hydrargyro intrinsecus exhibendo, capit. 40</i>	28
		<i>De Symptomatis, ac morbis Luis antiquæ, cap. 41</i>	29

F I N I S.

2 1 1 1 1





OPERV M HERCVL. SAXONIAE

Professoris Medici Patauini Primarij.

LIBER V.

DE SPHYGMIS, SEV CORDIS


ET ARTERIARVM MOTIBVS, QVOS

Plinius *καταχρηστικῶς* Venarum percussus vocat.

QVID SPHYGMVS SIT, QVOD EIVS

subiectum, quis & quotuplex eiusdem finis

& utilitas. Cap. 1.



IGNORVM, quæ Medicam artem perficiunt, & de certitudine inter se pugnare videntur, duo sunt præcipua. Motus scilicet arteriarum, & Vrina: mihi tamen semper placuit pulsui palmam dare.

Etenim siue affectionum & locorum numerum spectes, siue præfagij certitudinem, sane pulsus longe vrinis est superior. De pulsibus itaque accurate est agendum.

Omittam in hac tractatione logicas omnes disputationes. Quicumque enim longa disputatione de omnibus ad pulsum attinentibus disputare voluerit, is & longam, & (vt vere dicam) inutilem instituet tractationem.

Expedita itaque pulsus definitione, enodatis breuiter quibusdam difficultatibus ex ea desumptis, in quatuor duntaxat explicandis versabor: In differentijs, in dignotione differentiarum, in causis, & in præfagijs.

Suppono inprimis nomine pulsus nos non intelligere palpitationem, nec motum in inflammatis tantum arterijs apparentem, sed *motum cordis & arteriarum a primordijs generationis vsq; ad vitæ finem perpetuum*, vt colligitur ex Galen. l. 4. de differ. puls. cap. 2. Hic habet & habuit varias definitiones à Galeno loco libri citato descriptas.

Quid nomine pulsus intelligatur.

A Legitima tamen quanquam prolixa hæc est: *Quid pulsus sit.*

Pulsus est dilatio & constrictio cordis & arteriarum a facultate pulsifica ob calidi innati tutelam, & spirituum animalium regenerationem.

Dilatatio & constrictio est loco generis: Cor & arteriæ sunt subiectum: facultas pulsifica est causa efficiens. Cetera sunt loco finis.

Quod ad genus attinet, non est quidem simplex, sed compositum ex duplici motu & quiete: nam dilatio seu diastole vnus est motus: Constrictio seu systole secundus. Post diastolen antequam incipiat systole, est vna quies, quæ vocatur Exterior: post systolen est altera, quæ vocatur Interior.

Sunt tamen omnes actiones ab aliqua facultate productæ, non autem ex duritie instrumenti aut subsidientia provenientes, vt probauit Galenus libro de vsu puls. capite sexto, *Nomine cordis & arteriarum intelligo etiam cerebri motum & membranarum: quandoquidem huiusmodi motus & meningum & cerebri ab arterijs in has partes diffusis oboritur.*

C Et quanquam dilatio & constrictio ventriculorum cerebri non fiat eodem tempore cum dilatazione & constrictione arteriarum: quin imo, dum ventriculi dilatantur, cor & arteriæ constringuntur: Ex hoc tamen non sequitur, quin motus cerebri, sit idem cum motu cordis & arteriarum. Ratio autem est, quia in cerebro duplex est dilatio & constrictio: vna quidem in propria cerebri substantia, altera vero in ven-

A triculis.

triculis. Vbi igitur cerebri substantia dilatatur, ventriculi constringuntur: constrictio cerebro ventriculi dilatatur.

Ex istis duabus dilatationibus & constrictionibus prior est ea, quae pertinet ad cerebri substantiam, & ad quam postea sequitur motus ventriculorum cerebri: sed sic est, quod dilatatio & constrictio cerebri substantiae fit eodem tempore, quo motus cordis, & aliarum arteriarum. Ergo sequitur vnum & eundem esse motum: nam motus ventriculorum est quasi accidentarius & insequitur principalem motum.

Fit autem hic motus a facultate pulsifica, quae est species facultatis vitalis. Haec facultas non est species pulsifica insita ipsismet arterijs, vt sponte sua hunc motum efficiant. Experientia hoc docet: nam ligata arteria motum amittit in ea parte, quae post ligaturam est.

Habent igitur hunc motum a corde, neque obtinent hunc motum a corde per substantiam corpoream, per spiritum influentem in cavitates: Nam si hoc esset, non possent tam breui tempore omnes arteriae etiam in cerebro distantes vno & eodem tempore moueri.

Accedit & experimentum Galeni propositum in libro, an sanguis in arterijs contineatur, cap. ult. vbi sic scribit: *Arteriam vnā e magnis & conspicuam quāpiam nudabis, primoque pelle remota ipsam ab adiacenti suppositoque corpore tamdiu separare non graueris, quoad funiculum circumdare valeas: deinde secundum longitudinem arteriam incide, calamumque & concauum & peruium in foramen intrude, vel aneam aliquam fistulam, quo & vulnus obturetur, & sanguis exsilire non possit, quoad vsque sic se arteriam habere conspicias, ipsam totam pulsare videbis: cum primum vero obductum laqueum contrahens, arteriae tunicas calamo obstrinxeris, non amplius arteriam ultra laqueum palpitare videbis. Etiam si spiritus & sanguis ad arteriam, quae est ultra laqueum, sicuti prius faciebat, per concauitatem calami feratur. Quod si propterea pulsarent arteria, pulsaret etiam tum partes, quae sunt ultra laqueum: sed non pulsant. Igitur perspicuum est, quoniam moueri posse desinunt, non per spiritum in ciuitatibus discurrentem, sed ob virtutem in tunicas transmissam arterias a corde moueri.*

Et haec sese ex corporum dissectione collegisse, ibidem affirmat. Itaque pulsifica facultas aduenit arterijs, non quasi per canales plumbeos, sed per instrumenta viuientia, non per cavitates, sed per ipsammet membranam, non spiritu & substantia corporea, sed tantum facultate & illustratione.

Spiritus autem, qui per arteriae cavitatum confluit, ad conseruandum & augendum innatum partium naturalium spiritum faciunt, vt colligitur ex Galen. lib. 1. de loc. aff. cap. vltim. Non fit autem hic motus in arterijs tempore diuerso a corde, vt olim Erasistratus est arbitratus, cuius sententiam a Galeno impugnatam iterum Auicennas excitauit, quem eundem ex recensionibus

A Ioannes Guintherus Andernatus vir eruditissimus prima parte sua Medicina suscepit.

Fiunt itaque hi motus vno & eodem tempore, & dilatato corde dilatantur arteriae, constrictio corde constringuntur etiam arteriae. Neque enim (vt docet Galenus lib. an sanguis in arteria natura contineatur, cap. 7. & lib. 6. de vsu part. cap. 21.) ideo distenduntur arteriae, quia replentur: sed ideo replentur, quia distenduntur.

Itaque etsi in cordis constrictione spiritus in arterias transmittatur, non tamen propterea distenduntur, sed quia facultatem obtinent, vt distendantur, tunc replentur, attrahentes & aerem externum & sanguinem a venis, & ab omnibus corporis partibus, vt abunde docuit Galen. lib. de vsu puls. c. 5.

Isti igitur motus ita constituti habent duos potissimum fines, primus est conseruatio calidi innati, refectio spirituum animalium.

Innatus calor conseruatur & moderata refrigeratione & euentilatione: & praeterea fuliginum expulsionem.

Sicuti igitur ad caloris cordis refrigerationem & fuliginum expulsionem facit inspiratio, & exspiratio: ita ad calorem, qui in vniuerso corporis ambitu continetur, dilatatio arteriarum maxime conducit, aerem frigidum attrahendo: earundem constrictio fuligines per insensibiles corporis meatus expurgat.

Reficiuntur autem spiritus animales ipsi quoque inspiratione potissimum, vt docuit Galen. in lib. de respir. vtil.

Ceterum huiusmodi arteriarum motus non minimam habet partem ad hos spiritus animales conseruandos, vt docuit idem Galen. lib. de vs. puls. cap. 2.

De simplicib. sphygmarum differentijs, quae solam diastolen, seu dilatationem respiciunt, Cap. II.

IN proponendis pulsuum differentijs ego breuitatem & facilitatem ceteris omnibus anteponendam existimo.

Video enim Galen. in sedecim libris, quos de pulsibus scripsit, tanta vti prolixitate, vt aliquando (ni fallor) in differentijs conscribendis sibi ipsi contradixerit.

Rediguntur omnes differentiae, quanquam videatur innumeratae, ad octo praecipue capita I. pulsus magni & parui. II. celeres & tardi. III. duri & molles. IIII. vehementes & languidi. V. frequentes & rari. VI. impulsus & impulsus. VII. equales & inaequales. VIII. ordinati & inordinati.

Primae quatuor differentiae solam respiciunt diastolen seu dilatationem.

Quinta respicit quietes, quae cadunt inter vnā & alteram diastolen.

Sexta propositionem, quae est inter Systolen & Diastolen.

Septima & octaua respiciunt paritatem & imparitatem vnius & plurimum pulsationum.

Et in

Pulsus finis duplex.

Octo capita differentiarum.

Et in imparitate queritur ordo vel inordinatio, quod est vltimum caput pulsum differentias continens.

Quod igitur ad primas quatuor differentias atinet, quæ (vt dixi) ad solam pertinent diastolen, istæ hauriuntur ex quatuor conditionibus, quæ ad omnem perficiendum motum concurrunt. *Omnis motus fit in spatio, fit in tempore, est alicuius mobilis, & fit ab aliquo mouente.*

Vt igitur diastole fit in spatio, pulsum constituit magnum & paruum, vel moderatum.

Pulsus magnus quis.

Ille enim est magnus pulsus, in quo arteria dilatata maximum occupat spatium per omnes dimensiones, nempe secundum altitudinem, latitudinem, & longitudinem.

Paruus.

Contra paruus erit ille, in quo arteria pusillum occupat spatium secundum oppositas dimensiones.

Et ideo, si quispiam magnum pulsum & paruum in alias tres differentias subdiuidere voluerit, id commode fieri potest. Alius enim est longus, alius brevis: quidam altus, quidam profundus: quidam latus, alius angustius: si omnibus istis differentiis moderatus addatur, erunt nouem pulsus magni & parui differentiar. Et si isti simul complicantur, euadunt viginti septem, quos recensere nolo, ne fiat confusio. Qui hanc diligit complicationem, inueniet illam apud Gal. lib. I. de diff. pulsum.

Celer.

Celer & tardus pulsus respiciunt tempus motionis arteriar.

Nam celer seu velox ille dicitur, qui cito diastolen perficit.

Tardus.

Tardus appellatur, qui multum requirit temporis ad perficiendam diastolen.

His si moderatus adiungatur, erunt tres differentiar, celeris, tardi, & moderati.

Corpus mobile est arteria: Arteria vero tangenti apparet vel dura, vel mollis, aut, moderata: hinc aliæ tres insurgunt differentie pulsus: duri scilicet molles & moderati. Sub duro & moli aliar sunt differentiar quoque.

Nam sub duro est vibratus, conuulsus, ferratus seu ferrinus & dicrotus.

Sub molli est vndosus & vermiculosus.

Vehemens.

Sed quia isti etiam fiunt inæquales, de his agemus infra sub titulo inæqualium. Vehemens & languidus pulsus respicit robur ac vim ipsius ictus, vel infirmitatem ac imbecillitatem. Nam qui robustum & validum continet ictum, vehemens dicitur: qui languidum & pusillum, languidus: medius inter hos est moderatus.

Languidus.

De spbygmis quietem & proportionem inter diastolen & systolen respicientibus, Cap. III.

HActenus de differentiis simplicibus, quæ solam respiciunt diastolen. Frequens & rarus pulsus respicit quietes medias inter vnam & alteram diastolen.

Nam ille dicitur frequens, qui habet breue in-

teruallum inter vnam & alteram pulsationem.

Ille dicitur rarus, qui habet interuallum seu quietes inter vnam & alteram diastolen, longas & prolixas. Hi quoque habent moderatum pulsum tanquam intermedium.

Eurythmos & arrhythmos respicit proportionem, quæ est inter systolen & diastolen: alij addunt proportionem, quæ est inter externam & internam quietem. Sed, vt ingenue dicam, existimo hæc tactui esse imperceptibilia.

Eurythmos igitur pulsus ille est, qui habet systolen æqualem diastoli.

eurythmos.

Arrhythmos autem in quo systole variat a diastole.

arrhythmos.

Et quia huiusmodi proportio potest considerari & in vehementia, & in magnitudine, & in duritie, & in celeritate (nam si systole est motus, sicut diastole, easdem obtinet differentias, quas diastole, sed differentiar pulsum diastoles, vt nuper fuit dictum, sunt quatuor, Ergo & differentiar systoles tot erunt.) Attamen, quando quarimus hanc proportionem vel impropportionem, nihil aliud quarimus, nisi, vttrum celeritas vel tarditas systoles sit proportionata vel impropportionata diastoli. Ratio est, quia motus systoles est imperceptibilis, quicquid dicat Galenus, & alij.

Si quæ tamen motus differentia in systole cognoscitur, ea est celeritas vel tarditas tantum, vt postea dicetur, quando de dignotione egerimus.

Itaque *eurythmos* pulsus erit ille, in quo systole sit æque celer ac diastole.

Arrhythmos pulsus erit ille, in quo celeritas vnus motus alteram superat.

Arrhythmos autem pulsus alias quoque differentias proponit Galen. lib. I. de differ. puls. cap. 16. vt parat rhythmum, & *teraptychmos*. Sed istæ differentiar non sunt necessariæ, nolo lectorem confundere: Qui sit illarum curiosus, legat locum citatum, & vltimum caput eiusdem libri primi, vbi de his rhythmis est sermo.

De inæqualitate spbygmarum simplici, Cap. IV.

AEQVALITAS & inæqualitas (vt dixi) respicit paritatem vel imparitatem vnus vel plurimum motionum. Et propterea duplex constituitur inæqualitas, simplex scilicet, & composita.

Et simplex dicitur inæqualitas vnus ictus, quæ concernit vnicam diastolen.

Quid simplex inæqualitas.

Inæqualitas composita vocatur collectiua seu systematica. Et concernit multas pulsationes inter se collatas.

Si igitur sermo fiat de simplici inæqualitate, hæc consideratur vel sub vnico digito, vel sub pluribus.

Si sub vnico (& in vnica diastole) hæc inæqualitas, aut est sine bina pulsatione, aut cum bina pulsatione.

A 2 Quando

Quando sit sine bina pulsatione, hæc inæqualitas tria respicit, magnitudinem, vehementiam, celeritatem.

Fieri enim potest, ut principium diastoles sub vno digito sit diuersum a suo fine, vel in magnitudine, vel in vehementia, vel in celeritate, idque pluribus contingit modis.

Nam, Exempli gratia, quandoque principium diastolæ est velocius sine: quandoque vero tardius.

Id ipsum dico de magnitudine & vehementia.

Pulsus his feriens inæqualis in vno ictu sub vno digito est duplex: caprizans, & dicrotus.

Pulsus Caprizans.

Caprizans pulsus est ille, cuius diastole interceptitur a quiete media, ita tamen, ut post illam quietem statim insurgat facultas fortior & valentior ad perficiendum suum motum. Idcirco in caprizante pulsu duo quandoque sunt ictus, vnica est tamen diastole, & secundus ictus est celerior priore, ob quam causam hic pulsus caprizans Arabibus Gazellans, dicitur, similitudine sumta ab eo animali, quod vno & eodem tempore duos saltus efficit, vltimum tamen celeriore priore. Hic pulsus non est desumptus proprie a nostris capris: non enim bis illæ terram non attingendo feriunt, quod Gazella facit, cuius caput Bizanti mihi missum est.

Dicrotus.

Dicrotus autem pulsus ipse quoque bis ferit, sed a caprizante est valde diuersus: nam caprizans (ut est dictum) habet duos ictus ex vnica diastole: dicrotus habet quandoque duos ictus, aliquando etiam tres, sed quot sunt ictus, tot sunt diastolæ.

Questio.

Et si quispiam querat, cum varij ictus in dicroto sint varix diastolæ, quamobrem hic pulsus vocatur inæqualis in vno ictu, & sub vnico digito? Dicam Galeni responsum. Inquit: Dicitur inæqualis in vno ictu & sub vnico digito, quæquam sint varix pulsationes. Quia istæ varix pulsationes sunt vna post alteram, nulla intercedente quiete media.

Est durissima apud me responsio, fieri duos vel tres motus diuersos absque quiete media: non conuenit cum philosophiæ principijs ab Aristotele explicatis lib. 8. physice. cap. 8. Non conuenit cum eodem Galen. lib. 1. de differ. puls. c. 3. Hanc tamen veritatem accepit libenter inter Recentiores Valesius lib. 3. suarum controuersiar. 8. cap. 5. (si recte recorder) Sed in veram utilitatem instituitur hæc tractatio, logicas quæstiones omittamus.

Dari hunc pulsum dicrotum, id est, qui habet & duas, & tres, & quatuor pulsationes, ita sibi ipsis continuas, ut videantur carere quiete media, experientia ipsa docet. Ego nunc habeo in cœnobio S. Bernardi monialem septuaginta annorum, quæ laborauit pleuritide notha cum hoc pulsu dicroto ter & quater ictum suum complente.

Et propterea non est accipienda hac in parte, Fernelij sententia, qui in hoc saltem caprizantem distinguit a dicroto, quod caprizans habeat secundum motum velociorem primo: dicrotus

contra habeat minorem & tardio rem. Gal. lib. 2, de causis puls. cap. 7. hos pulsus inquit esse innominatos, posse tamen caprizantes nominari.

Ab his itaque differt dicrotus, cuius causas satis erit suo loco examinare diligenter, quam hoc tempore disputare, nunquid isti motus habeant quietem necne.

Transito ad pulsus inæquales in vnico ictu sub varijs digitis.

Quo in loco obiter hoc est monendum, Nunquam vnico digito pulsum esse tangendum, alioquin differentia nunc proponenda nunquam innotescet.

Quando pulsus sit tangendus.

Differentiæ multæ sunt, sed rediguntur ad nomen præcipuas a scriptoribus nominatas: Istæ sūt pulsus serratus seu setrinus, vibratus, conuulsus, vndosus, vermiculosus, formicans, decurtatus, innuens, seu (quod idem est) eminulus & prominulus.

Pulsus inæquales sub varijs digitis.

Serratus pulsus est inæqualis in vnico ictu sub varijs digitis, cum motus interruptione, & cum arteriæ duritie. In hoc pulsu exempli gratia, sub primo & tertio digito, vel sub secundo & quarto motus arteriæ durioris percipitur, sub alijs digitis non: Emulatur propterea dentes serræ: in serræ est vnus locus vacuus, alter plenus. Hincque setrinus dicitur.

Pulsus serratus.

Vibratus est durus inæqualis sub varijs digitis secundum altitudinem & profunditatem arteriæ. Nam sub vno digito eleuatur arteria, quasi baculo compulsa, sub alio submissa apparet, dicitur pulsus vibratus.

Vibratus.

Conuulsus est inæqualis secundum latitudinem arteriæ: nam sub vno digito videtur separata secundum latitudinem a propria directione vasis. Cum hoc tamen est tensio quædam, quasi filo tensa, ita ut conuulsus duram habeat æqualiter arteriam, sed situm illius inæqualem.

Conuulsus.

Vndosus pulsus, sicuti & vermiculosus & formicans, differunt a propositis duritie. Nam præscripti sunt duri, præscribendi sunt molles.

Vndosus.

Vndosus igitur est pulsus mollis, magnus, sed inæqualis absque interruptione, cuius magnitudo appareat modo sub primo, modo sub secundo, modo sub tertio, modo sub quarto digito, excipiente secundo priorem, & tertio secundum, & quarto tertium, sicuti mutuo se excipiunt vnde maris, a quibus vndosi nomen desumitur.

Vermiculosus differt ab vndoso sola magnitudine & paruitate. Vndosus est magnus, vermiculosus vero paruus. Nomen accepit a gressu vermium, qui inflectuntur, sed lente & paulatim ad differentiam vnde maris.

Vermiculosus.

Formiculosus seu formicans est omnium minimus, tardissimus, sed creberrimus, id est, frequentissimus. Emulatur motum formicæ, qui similiter exilis est & tardus, sed ob pedum formicarum multitudinem est creber.

Formicans.

Decurtatus est idem, quod mutilus, seu mutilus, variæ sunt horum decurtatorum differentia, & habet locum tam in æqualitate vnus ictus, quam

Decurtatus eius differentia.

in inæ-

in inæqualitate systematica seu collectiua, vt docet Gal. in synops. puls. c. 14.

Isti decurtati sunt deficientes. Quidam sunt deficientes reciproci, alij non reciproci.

Mutui.

Decurtati absolute in vnico ictu dicuntur illi pulsus, quando tangentibus nobis pulsus quatuor digitis, pulsus, qui apparet sub digito magis cordi propinquo, est ceteris maior, sub secundo est minor, sub tertio adhuc minor, sub quarto minimus, vocatur decurtatus seu cauda muris, quia æmulatur caudam muris.

Si sub ultimo digito versus manuum pulsus nulla ratione percipitur, vocatur decurtatus deficiens.

Deficiens.

Et si huiusmodi pulsus paulo post iterum insurgat, dicitur deficiens reciprocus.

Reciprocus.

Si non insurgit, absolute deficiens denominandus est.

Alia est decurtatorum differentia, quam Gal. putat reperiri non posse: quando scilicet opposito modo res se habet, vt pulsus maior sit prope carpum, minor vero aut deficiens prope cor. Sed datur etiam hæc differentia. Habeo ego monialem in cænobio D. Petri annorum 14. quæ laborat febre pestilente, nunc est in 11. puro illam morituram in 14 habet hunc pulsus decurtatum, in quo sub secundo & primo digito prope carpum sentitur pulsus, sub alijs duobus cordi propinquo non sentitur.

Eminuli & prominuli.

Denique ad hos inæquales pulsus in vnico ictu pertinent eminuli & prominuli, siue innuentes & circumnuentes.

Sunt pulsus, in quibus digiti, Exempli gratia, medius sentit ictum, hinc inde vel nullus est ictus, vel admodum obscurus.

Sub istis differentijs possunt comprehendi alij complures, sed eas omitto.

De inæqualitate composita, seu systematica dictum. Cap. V.

Inæqualitatis collectiue differentie etiam si plurimæ, ad duo tamen capita rediguntur, quorum primum continet inæqualitates ad quietem spectantes: aliud vero mobilium inæqualitates respicit.

Ratione quietis seu interualli, quod inter vnâ & alteram cadit diastolen, inæquales sunt pulsus secundum crebritatem & raritatem. Quidam enim habent interuallum breue: quidam vero longum.

Imo inæqualitas secundum frequentiam & raritatem. Habent enim hæc differentie duas præcipuas species proprijs nominibus expressas, intercurrentem scil. seu intercurrentem, & interceptum, seu intermittentem: intercurrentem enim est summe creber, interceptus est summe rarus.

Intercurrentis.

Intercurrentis est pulsus frequens, in quo tamen per quædam motionum interualla fit vna pulsatio præter ordinem inter duas diastoles, quanquã frequenter: vt propterea videatur ille motus præuenire consuetum & ordinarium motum, vt pro-

Apterea dicatur intercurrere seu intercideret, quando præueniat consuetam illam motionem. Et quia fit fere momento temporis hic motus post alium, hinc data est quibusdam occasio credendi, hunc motum absque media quiete factum esse, quod tamen nos non recipimus.

Interceptus pulsus est summe rarus, quia intermittitur vna vel altera diastole, quæ nullo modo sentitur. Habeo nunc patientem monialem apud S. Petrum ann. 77. quæ habet pulsus interceptum ultra terminum trium pulsationum, illam puro hac nocte morituram.

Interceptus.

Inæqualitates collectiue ratione motus multa sunt, quandoquidem confertur vna pulsatio cum alia, & in vehementia, magnitudine, celeritate, duritie & mollitie.

BItaque sunt inæquales pulsus inæqualitate systematica, quando vna pulsatio est vehemens, altera debilis, vna magna, succedens parua, vna celeris, altera tarda, vna dura, altera minus dura, quanquam hæc differentia raro reperitur.

Pulsus inæquales inæqualitate systematica.

Possunt etiam vel omnes, vel plures complicari, & complicationem etiam vel omnium, vel quorundam vnusquisque, nemine docente, inuenire poterit.

Sunt etiam in hac classe differentie illæ pulsuum, quos mutilos, decurtatos seu myyros nuncupauimus, dum fuit sermo de vnus pulsus sub varijs digitis inæqualitate. Quandoquidem datur quidam pulsus, qui sensim ac paulatim post quinque aut sex ictus ex magnis desinunt in paruos, isti absolute dicuntur decurtati vel sorici, & murici, (vt dicunt isti) si ita imminuantur, vt amplius non sentiantur, dicuntur myuri deficientes: Et si post defectum iterum resurgant, & maiores reddantur, vocantur myuri deficientes reciproci.

De Differentijs ad ordinem, & eius perturbationem pertinentibus. Cap. VI.

Hæc sunt differentie ab inæqualitate desumptæ, quibus connectendæ sunt illæ, quæ ad ordinem, & ordinis perturbationem pertinent.

Istæ differentie ordinis vel perturbationis inæqualibus tantum pulsibus conueniunt, minime vero æqualibus.

Inæqualis enim pulsus ordinatus est, qui suæ inæqualitatis certas quasdam habet periodos.

Inæqualis pulsus ordinatus.

Ille vero inæqualis inordinatus, qui nullas seruat periodos.

Idcirco pulsus, qui, exempli gratia, post singulas sex pulsationes, vnâ intermittit, est inæqualis ordinatus.

Qui propriæ intermissionis non seruat periodum, sed intermittit modo post plures, modo post pauciores pulsationes, est inæqualis inordinatus.

Inordinatus.

His omnibus existimo, communem esse posse eam pulsus differentiam, secundum quam pulsus hæcticus dicitur. Non est credendum, pulsus hæctici nomine Galenum febris hæcticæ pulsus intelligere. Pulsus hæctici nomine omnem intelli-

Pulsus hæcticus.

git pulsum siue æqualem, siue inæqualem, qui tamen habeat aliquam permanentiam & constantiam. Propterea lib. 4. de caus. puls. c. de pulsus puratorum inquit, illum pulsum, qui inæqualis est, sed tamen cum certa quadam permanentia, modo mutatur in magnitudinem, vicissim in paritatem, & rursus in magnitudinem, hunc, inquam, pulsum ita inæqualem ob periodorum certitudinem hecticum vocat. Et ideo lib. 3. de praesag. ex puls. c. 4. proponit argumentum cognoscendi pulsum inæqualem ex inæquali cordis intemperie: Cognoscitur, inquit, quia inæqualitas est hectica. Neque enim, inquit Gal. appellare inæqualitatem hecticam est absurdum, quoniam sit constans & permanens, sicuti & appellamus & febrem & pulsum hecticum.

Præter has differentias alij excogitarunt plurimas, sed omnes mutilas, vel saltem, quæ ad prædictas rediguntur. Nam, Exempli gratia, quod dicunt de vacuo & pleno, vel nullam ponunt aliquis usus differentiam, vel saltem illam proponunt, quæ ad vehementem, aut durum, aut magnum pulsum pertinet.

Pulsus plenus.

Potest enim plenus pulsus appellari, & qui vehementer manum ferit, ut vehemens, & qui multum extendit arteriam, ut magnus; & qui resistit digitis tangentibus, ut durus.

Si quis vero putat, nomine pleni vel vacui pulsus se proponere differentiam a corporibus in arteria contentis, ridiculus est existimandus; Neque enim ex tactu potest quispiam deprehendere, numquid arteria sit plena vel sanguine, vel spiritu: & si sanguine vel spiritu, utrum tenui, vel crasso.

Crassus. Gmelis.

Pariter pulsus crassus & gracilis redigitur ad differentias magni. Nam pulsus, cuius arteria in latitudinem non extenditur, sed tantum in longitudinem, gracilis dicitur: ille vero, cuius arteria dilatatur, crassus nuncupatur.

Vno verbo, simplices omnes differentie tantum octo sunt iam explicatae: vehemens & languidus, magnus & parvus, celer & tardus, durus & mollis, frequens & rarus, æqualis & inæqualis, ordinatus & inordinatus. Ex quibus patent, ite etiam tacente, compositæ differentie, quæ quidem in actu practico semper sunt attendendæ pro illis, qui pulsus tangunt, ut ægrotorum affectiones intelligant, illasque sanent. Neque enim ullus unquam simplex reperitur pulsus, sed omnes sunt compositi, æquales quidem ex septem, inæquales vero ex octo differentiis.

Nullum reperiuntur pulsum simplicem.

Quomodo & quibus potissimum requisitis omnes spbygimorum differentia cognosci possint, Cap. VII.

Pulsuum ego dignotionem in duas distribuo partes, quarum primam exercitatoriam, secundam vero contemplatoriam apello.

Dignotione pulsum ex exercitatoria.

Exercitatoria est illa, quæ nihil aliud sibi proponit, quam facilem & breuem modum dignoscendi simplices pulsum differentias hæcenus propositas.

A Contemplatoria vero sibi proponit cognitionem pulsum ægrotantis, quoad omnes illas differentias, quæ in eo pulsum considerati & reperi possunt.

Itaque prima pars pertinet ad tyrones discipulos.

Secunda vero ad Medicos artem exercentes; & curantes.

Quia igitur prior est via ad secundam, exercitatio ad contemplationem, ideo de exercitatione prior erit sermo.

In hac parte primum scire oportet, quæ sint dignoscenda, deinde vero quibus ingenijs.

Dignoscendæ igitur veniunt, quædam differentie hæcenus explicatae.

Sed tamen consulo, ne tantum in primis illis temporibus in indaganda systole, vel distinguendis duabus illis quietibus studium tantusque labor adhibeatur. Ratio est, quia præterquàm quod systole, vel nullo modo, vel difficillime comprehendere potest, accedit, illius comprehensionem non posse esse utilem. Dicebat Galen. lib. 1. de dignoscendis pulsibus. cap. 5. systolen comprehendere non posse nisi in pulsibus vehementissimis & maximis. Pulsus vehementissimi & maximi, vel sunt in sanis tantum, vel in leuioribus morbis, in quibus tactus pulsus non est necessarius.

Si in grauioribus morbis, ubi pulsus non sunt validi, nec admodum magni, posset contractio cognosci, esset sane utilis: Cum id fieri nequeat, prætermittenda est, & totum illud tempus, quod est inter unum & alterum motum diastoles, accipiendum est pro intervallo, quod etiam consulit Gal. in lib. de puls. ad tyrones.

Aliæ igitur omnes differentie pulsum sunt cognoscendæ præter illas, quæ comparant motum diastoles cum motu systoles.

Modus cognoscendi pulsum quo, & quæ requiratur.

Modus autem, quo possunt huiusmodi differentie cognosci, est multiplex, attamen quinque potissimum requirit, studium nimirum, Memoriam, Observationem, Tactum conuenientem & iudicium.

Studium est necessarium, & pro comparandis omnium pulsum differentiis, & quod magis refert, pro intelligendis earum descriptionibus. Neque enim quispiam poterit ullam pulsum differentiam intelligere, qui prius descriptionem illius pulsum non didicerit.

1. Studium.

Huiusmodi descriptiones puto iam satis in superioribus a nobis fuisse propositas, propterea ad illas confugiendum.

Est necessaria Memoria: Parum enim refert differentias & differentiarum descriptiones semel intellexisse, nec tamen memoriam mandasse. Oportet itaque singulas differentias, & earum descriptiones memoriam habere, ut cum primū pulsum tetigeris, facta collatione illius cum notis memoriam hærentibus, dicas statim pulsum esse hunc vel illum.

2. Memoria.

Necessaria tertio est Observatio; per observationem intelligo frequentem pulsum tactum.

3. Observatio.

Hæc igitur observatio faciendæ est & in sanis & in

& in ægris.

In sanis quidem duplici modo: primo tangendo, si fieri potest, hominis omnium temperatissimi, qui quidem cum moderatis in omnibus sit existimandus, & in vehementia, & in magnitudine, & celeritate, & ceteris, erit quasi metrum omnium ceterorum. Nam in huius comparatione ceteri omnes pulsus erunt, vel vehementiores, vel imbecilliores, vel maiores, vel minores, & sic de singulis.

Secundo modo debet fieri exercitatio in sanis recedentibus ab hoc corpore *luxatio*. ut hac ratione distinguantur: pulsus omnium sanorum, quāquam intemperatorum a pulsibus ægrotorum.

Et ideo hac in parte oportet singularem exerceri in explorandis pulsibus sexus, ætatis, temperamenti & habitus corporis. Quādoquidem pulsus virorum & iuuenum sunt celeriores & maiores & vehementiores pulsibus mulierum & senum. Pulsus calidi temperamenti sunt vehementiores, maiores, & celeriores frigidis. Pulsus gracilium sunt duriore, magisque apparentes: Carnosorum vero molliores & occulti.

4. Tardus. Observandi etiam sunt pulsus ægrotantium. Nam ex frequenti contactu, quāquam non facili negotio, singulares tandem differentie illæ elucescunt, potissimum si tactus conueniens & iudicium adhibeatur.

Per tactum conuenientem intelligo tempus tangendi, locum, modum, quantitatem & qualitatem tactus.

Tempus tangendi pulsus. Quod ad tempus pertinet, tangendi sunt ægri omnino a quocunque animi aut corporis motu distantes & liberi: Propterea neque nuper expectatos, neque iratos, aut eos, qui nuper minxerunt, aut assellarunt, vel euomuerunt, statim tangere oportet, sed tam diu subsistere, donec quiescant.

Locus. Quantum ad locum, multis in locis tangi arterie possent, omnium tamen commodissimus & honestissimus est locus in carpo.

Modus. Modus tangendi est, ut manus potius moderate applicetur, quam cum valida appensione.

Nam si moderatus sit pressus, nulli pulsui sit incommodus, æq; omnes percipiunt. Vbi vero valida manus comprimit, parui & imbecilles pulsus protus obruuntur.

Sunt tamen differentie quædam, pulsuum scilicet inæqualium & paruorum, quæ requirunt manum aliquando comprimentem, nonnunquam vero suspensam. In hoc genere potissimum sunt *puerpes* illi seu decurtati pulsus, quādoquidem, si forte fiat in his compressio, non potest seruari ordo illius paulatim defectus. Pariter, si minus suspensa sit manus, illa reciprocationem percipitur.

Idcirco aliquando molliter comprimere, & vicissim in his digitos eleuare oportet.

Quantitas discreta. Quod ad quantitatem pertinet, est discreta & continua. Per discretam intelligo, utrum semel vel bis tangendus sit pulsus: per continuam, quoto tempore detinenda sit manus supra pulsus.

Quod igitur ad primum, laudo, ut semper in morbis difficilissimis saltem bis pulsus tangatur,

A quandoque etiam ter, ut singulæ inæqualitates ex mutationibus, quæ inter primam, secundam, vel tertiam manus appositionem cadunt, facilius distinguantur.

Quod autem ad secundum, si morbus sit levis, si pulsus differentia non sit cognitu difficilis, non est, ut pulsus tangatur, ultra sex vel octo pulsationes.

Cont. nua.

Vbi differentie confusæ & obscuræ sunt, oportet attendere, & duodecim & plures pulsationes.

Tangendi etiam sunt pulsus utriusque brachij; *Cur tangendum*, quia in quibusdam vitiosus solet esse situs arteriæ in vno brachio, vel a natura, vel ex morbo: tum, quia mutantur etiam pulsus vnius vel alterius partis magis, prout affectio potius dextram, vel sinistram partem obideat.

Cur tangendum da arteria utriusque brachij.

B Denique quoad qualitatem, manus tangentis debet esse calida, minime cutis dura aut aspera. Cutis enim prædura singulares pulsuum differentias adeo non distinguit.

Qualitas.

His rite se habentibus, si iudicium adhibeatur, & dignotio & distinctio facile apparebit, de qua dignotione nunc dicemus.

Iudicium.

Pro dignoscendis pulsuum differentiis iudicio potissimum est opus. Ad iudicium enim pertinet singulas differentias dignoscere, & similes inter se distinguere.

Studium vero, memoria, observatio & tactus sunt quasi instrumēta, quibus utitur iudicium ad dignoscendos & distinguendos pulsus.

Utitur autem aliquando mente tantum, quandoque vero & mente & tactu.

C Utitur mente tantum in inquirenda frequentia & raritate, atque ipsius pulsus rhythmus.

Utitur mente & sensu in ceteris omnibus differentiis, quæ ad diastolen pertinent.

Si itaque frequentia & raritas sine dignoscenda, mens & ratio ad hanc dignotionem sufficit: quandoquidem, cum frequens pulsus ille sit, cuius intervallum inter vnam & alteram diastolen breue est: rarus autem, cuius intervallum est longum: intervallum hoc sensu non percipitur, sed mens ipsa ex hac percepta rari vel frequentis pulsus definitione statim iudicat, numquid intervallum sit breue vel longum, propterea utrum pulsus sit rarus vel frequens.

Pariter pulsus *suppur* sine rhythmus, vel *suppur* cum rhythmus, sensu non deprehenduntur: quandoquidem necesse esset systoles magnitudinem & celeritatem tactu sentire, ut possit fieri comparatio celeritatis, & magnitudinis systoles ad magnitudinem & celeritatem diastoles: Ex qua comparatione confurgit pulsus *suppur* vel *suppur*.

Cum itaque systole, ut dixi, (quicquid censeat Gal. lib. 1. de puls. dignot. cap. 5.) deprehendi tactu non possit, tantum iudicio & mente est opus, ut cognoscamus, numquid systole possit esse celerior vel tardior, quam diastole.

Quomodo cognoscatur systola.

Cognoscemus autem primo quidem intelligētes ea omnia, quæ cadunt inter vnam & alteram diastolen. Non enim cadit tantum motus systoles, sed

etiam duæ quietes, altera interior, altera exterior, & principium & finis diastoles, quæ ambo sunt insensibilia.

Dum igitur mens hæc considerat, habita intervalli ratione, cum dederit illius intervalli partem duabus quietibus, & principio & fini motus diastoles occulto, tunc iudicabit, numquid systole possit esse celerior an tardior, quam diastole.

Alius modus iudicandi hanc ipsam differentiam, desumitur ex natura & tempore febris. Nā in febre putrida in principio & augmento systole semper est celerior, quam diastole. In febre Ephemera, hæctica, aut putrida, in statu & declinatione, diastole est semper celerior quam systole. Igitur potius mente, quam sensu & tactu istæ differentię dignoscuntur.

Ceteræ vero & mentem & tactum requirunt. Et ut a vehementi incipiam, vehemens & languidus, ut cognoscantur, requirunt mentem, id est, definitionis memoriam.

Est vehementer, qui resistit manui tangentis, & illi occurrit.

Est debilis, qui manui tangentis statim cedit: Huic mentis officio accedat sensus & tactus conueniens.

Nam pulsum vehementem primo tangas breuiter, tunc enim senties arteriam occurrentem; postea comprime, senties arteriam reluctantem, hunc vocabis vehementem.

Si vero leuiter tangentibus vix pulsus appareat, id est, moderate comprimantibus statim delitescat, languidus is erit.

Ad magnum & paruum similiter dignoscendum opus & mente & tactu est.

Mente, quia magnus est pulsus, qui arteriam in omnes dimensiones æqualiter dilatat.

Paruus opposito modo se habet.

Huic definitioni congruus accedat contactus: si quispiam quatuor digitis tetigerit, neque summam digitorum tantum, sed magnam prioris articuli partem arteriæ imponat: sic enim & longitudinem, & latitudinem, & altitudinem distinguet.

Iudicio tamen in hoc distinguendo atque etiam ratione est opus, utque consideres, an gracilis vel potius carnosa sit arteria: nam in gracili pulsus etiam moderati videntur magni: in carnosa pulsus magni videntur moderati.

Celer pulsus & tardus cognoscantur pariter & mente & tactu: Mente, quia celer est, qui magnum spatium velociter pertransit.

Adhuc mentem cognosces celerem, si has duas feceris consequentias. *Pulsus est vehemens: Ergo est celer. Pulsus est magnus: Ergo est celer.*

Tactu vero celeritatem cognosces, non leuiter comprimendo, sed potius moderate. Nam ex leui compressione totus motus non apparet.

Durū pulsum pariter cognosces mente & tactu.

Mente quidem, durus est, qui quasi saxum manui tangenti resistit.

Sensu vero hunc cognosces, si pariter compresseris: Nam ubi leuiter tangitur, non occurrit digi-

tis, quemadmodum vehemens: ubi fortiter comprimitur, non ita resistit, sicut vehemens. Itaque in hoc distinguitur a vehementi.

Sed quia vibratus & conuulsus pulsus videtur in hoc æmulari vehementem, quod ambo occurrant manui tangenti, distinguendi sunt ex conuenienti tactu: nam pulsum vehementem inuenies manui occurrentem secundum omnes motiones, & sub omnibus digitis æqualiter, & in morbis tantum mitioribus: vibratum vero inuenies occurrentem per quandam saltem pulsationem, neque sub omnibus digitis, & in morbis partium nervosarum, vel quæ membranis teguntur.

Idipsum dico de conuulsivo, qui potius ad latera, quam secundum arteriæ altitudinem digitis occurrit.

Denique pulsus inæquales in vno ictu & sub vnicò digito cognoscuntur, si mediocriter arteria vnicò tantum digito tangatur, & mente consideretur, numquid illa diastole intercipiatur vel non, aut finem pulsationis a principio diuersum obtrineat.

Quod si de inæqualitate vnius ictus sub variis digitis exploranda fueris sollicitus, singulis quatuor digitis arteriam tangas oportet. Et si pulsus tibi appareat tantum sub digitis prioribus versus cor, non etiam versus manum, tunc pulsum vocabis mutilum & decurtatum, caudam muris.

Quod si appareat sub medio digito, non alijs hinc inde positus, hunc vocabis Eminulum & prominulum, seu, ut dicunt Latini, inuentem & circumnuentem.

Quod si alternatim appareat sub primo & tertio digito, non sub secundo & quarto, aut sub secundo & quarto, non sub primo & tertio, erit pulsus cum duritie serratus: cum mollitie, vndosus vel vermiculosus.

Quod si inæqualitatem collectiuam volueris deprehendere, multæ pulsationes sunt attendendæ, illæque inter se comparandæ. Nam adhibita memoria definitionum vniuscuiusque inæqualitatis, non erit difficile vnamquamque differentiam dignoscere.

Sic igitur dignoscendi sunt pulsus in parte exercitoria, quæ in hoc tantum differt a contemplatoria, quod, qui exercentur in dignoscendis pulsibus, possint sibiipsis ad libitum vnicam differentiam singula die inquirendam proponere, ut omnibus singulatim exploratis, alacrius in parte contemplatoria seipsos exercere possint.

Contemplatoria enim pars est illa, quæ pertinet ad Medicum curam egrotantis iam suscipientem, ad quem, dum tangit pulsum, pertinet, omnes pulsuum differentias, & omnes illarum definitiones memoria tenere, & in tactu varia uti ratione, modo breuiter comprimendo, modo fortius, quandoque moderate, ut ex his possit non vnicam, sed plures simul pulsuum differentias dignoscere. *Neque enim in agrotantibus simplex vlla pulsuum differentia est attendenda, sed istæ omnes, utrum vehemens, vel imbecillis, utrum magnus vel parvus, celer an tardus, durus an mollis,*

frequens,

*Dignatio
pulsuum in
contempla-
toria.*

frequens, an rarus: *impudus* an *spudus*, æqualis, A
vel inæqualis. Et si inæqualis, utrum ordinatus,
vel inordinatus. Ad Medicum actu curantem om-
nia hæc pertinent, & in quocunque pulsu simpli
suis specificis differentiis sunt dignoscenda, & co-
gnoscentia.

De Causis Spbygmarum in genere, Cap. VIII.

TRactatio de causis pulsuum, quanquã phi-
losophica videatur, Medicis tamen tantam
præstat utilitatem, ut sine hac speculatione, ea quæ
ad præfagium pertinent, nunquam consequi pos-
sint: de causis igitur agendum.

*Duo genera
causarum.*

Pulsuum causæ in duo potissimum genera di-
stribuuntur: quorum primum immediatas (quas
etiam contentivas vocant) in se continet: secun- B
dum vero mediatas comprehendit.

Immediatæ seu contentivæ illæ sunt, quæ nullo
intermedio & faciunt & mutant pulsus, ut pro-
pterea ijs positis, ponantur pulsus, & ijs demtis
demantur pulsus.

Mediatæ sunt illæ, quæ ijs contentivis interme-
dijs pulsus immutant, per se autem nequaquam.

Sunt autem contentivæ tres numero. Facultas,
instrumenta & usus. Mediatæ vero plures quidẽ
sunt, ad tria tamen capita rediguntur, quorum
primum res naturales continet, secundum non na-
turales, tertium res præter naturam.

Sunt autem naturales temperamentum, sexus,
ætas & habitus corporis.

Nomine autem temperaturæ intelligo unius
cuiusque partis, vel totius corporis temperaturæ, C
corde excepto: *Nam temperies cordis est essentia
facultatis pulsificæ*, propterea pertinet ad causas
immediatas, non autem ad mediatas.

Non naturales causæ sunt omnibus conspicuæ,
aer scilicet, & quæ hunc consequuntur, tempus
anni, regio & constitutio, cibus & potus, somnus
& vigilia, motus & quies, inanitio & repletio, præ-
terea & animi affectus.

In qua parte licet, ni fallor, *Valesij* errorem cor-
rigere, qui *lib. de puls. c. 17.* existimat animi affe-
ctus inter illas causas esse reponendas, quæ perin-
de pulsus immediate mutant, ac facultas ipsa, in-
strumenta & usus.

Decipitur, ni fallor, *Valesius*. Nam animi affe-
ctus causæ sunt mediatæ, movetque pulsus, quan-
tenus, vel usum augent, vel minuunt, facultatem
validam vel invalidam reddunt, instrumenta du-
riora vel molliora efficiunt. Nam Exempli gratia,
ira magnos & celeres facit pulsus, & quia usum
auget, calorem scilicet in corde, & quia faculta-
tem roborat, dum sanguinem & spiritus in cor
ducit, ¶ Contra timor parvos & tardos efficit,
imminuto usu, corde refrigerato. Mæstitia durio-
res reddit exsiccando instrumenta. Vno verbo,
nullus effectus immediate pulsus alterat. ¶ Deniq;
causæ præter naturam sunt Morbus, morbi causa
& symptoma. ¶ Explicabimus igitur primo pul-
sus illos, qui a causis contentivis, seu immediatis
deducuntur, deinde ad mediatas descendemus.

*Cur ira ma-
gnum & ce-
lerem pulsus
faciat.*

*De causis immediatis spbygmarum propriorum
inseparabilium & separabilium, Cap. IX.*

Pulsus igitur, qui a contentivis causis sunt, fa-
cilius doctrinæ gratia in tres classes a me
distribuantur: prima classis continet pulsus pro-
prios & inseparabiles. Secunda continet proprios,
sed separabiles. Tertia communes, quos etiam fa-
miliares vocant.

Proprios & inseparabiles appellant illos, qui
ita sunt ab unica causa, ut neque a pluribus, ne-
que ab illa alia fieri possint. *Pulsus pro-
prij & inse-
parabiles.*

Proprios & separabiles illos voco, qui, ut fiant, *Proprij et se-
parabiles.*
habent quidem unicam causam, sed non in spe-
cie, sed tantum in genere. Quia scilicet etiam si
plures causas non requirant, possunt tamen quan-
doque ab una, quandoque ab alia singulatim fieri.

Familiares denique illos voco, qui, ut fiant, sem-
per requirunt, vel duas ex causis contentivis, vel
aliquando tres simul. *Familiares.*

Pulsus igitur proprii & inseparabiles conue-
niunt tantum facultate, & instrumento, usu autem
nequaquam. *Usus enim nullum habet pulsus pro-
prium, sed omnes ceteris causis contentivis com-
munes.*

*Facultatis igitur proprius & inseparabilis pul-
sus est fortis & languidus:* Fortis fit a facultate
robusta, languidus semper a debili. *Pulsus fa-
cultatū pro-
prij & inse-
parabiles.*

Neque *Valesij* hac in parte auctoritas negativa
facit negotium, qui existimat, validum pulsus
non esse solius facultatis validæ effectum, sed fa-
cultatis agentis cum arteriæ contensione.

Dico, hoc negotium non facere: nam facultas
valida cum arteriæ contensione facit quidem pul-
sum validissimum, qualem hodie habuimus in
illo patiente vitriario, non tamen sequitur, vali-
dum pulsus absque contensione fieri non posse.

Quod enim pertinet ad languidum, cum no-
mine languidi possemus intelligere & suffocatum
& exsolutum, nomine languidi exsolutum intel-
ligimus in præsentia.

Cum enim vitalis facultas, quæ est genus pul-
sificæ, ad obeundum pulsus utatur temperie &
conformatione cordis, tunc dicitur debilis, quan-
do temperatura cordis ad summum pervenit vi-
tium, siue hoc vitium sit excessus frigiditatis, siue
cuiusvis alterius temperamenti.

Dicebat enim *Gal. lib. 3. de sympt. caus. cap. 1.*
Omnes intemperantias immoderatas virtutem
destruere: in corde autem frigida citius & prom-
tius id præstat.

Itaque languida tunc est facultas, facitque pul-
sum languidum & exsolutum, quando solida cor-
dis substantia insignem obtinet intemperiem.

Quod si prava accedat conformatio, pulsus
quidem debilis evadere potest, sed potius per suf-
foctionem, quam exsolutionem, & tunc pulsus
ille non est proprius facultatis, sed communis, ut
intelligetur. *Pulsus pro-
prij & inse-
parabiles in
instrumento-
rum.*

Instrumenta quoque habent proprium & in-
separabilem pulsus: arteriæ enim duriores sem-
per

per

per durum efficiunt pulsum, molliores vero mollem.

Sed quia arteria ad efficiendum pulsum non per solam temperiem concutitur, ad quam sequitur durities vel mollities, sed per cōformationem: Hinc fit, ut dentur quidam pulsus proprii huius instrumenti præter durum & mollem, sed tamen separabiles, eo, quod quandoque ab alia etiā fiant causa: Tales sunt pulsus gracilis, humilis, altus, & turgidus, qui sequitur ipsius arteriæ ciuitatem & situm. Nam ubi arteria a natura exilem obtinet ciuitatem, facit pulsum gracilem: ubi amplam obtineat ciuitatem, facit pulsum plenum: Ubi situata est in profundioribus partibus, humilem facit pulsum: Quando autem statim sub cute est situata, altum & turgidum.

Sunt itaque hi pulsus proprii ipsius arteriæ, sed tamen quandoq; ab alijs fiunt causis, ut postea intelligitur.

Facultates proprii & inseparabilis pulsus sunt fortis & languidus. Ex languidis vero omnium maxime parui, rati, ac tardi, Galen. *aus. lib. 2. de caus. puls. c. 1.* sunt etiam parui & frequentes, qui formicantes dicuntur. Sunt & *μωροὶ* deficientes, sed non reciproci, ut docet idem Galen. *lib. 2. de caus. puls. cap. 3.* Omnes isti tamen, ut facultatis imbecillitatem significant, in omnibus appareant arterijs oportet. Nam si in quibusdam tantum fiant, illius determinatæ arteriæ imbecillitatem ostendunt, teste Gal. *lib. 4. de prasag. ex puls. cap. ultim.* ¶ Habet vero facultas languida pulsus etiam proprios, sed separabiles.

Proprios quidem, nam aliquando ex sola facultatis imbecillitate prodeunt.

Separabiles autem, quod quandoque requirant etiam instrumentorum læsiones: Tales sunt decurtati in vno pulsu sub varijs digitis, quos cum Galeno distinximus induas præcipuas differētiās: quosdā enim decurtatos seu inutiles vocauimus: alios innuentes seu circumnuentes.

Fiunt isti aliquando ex sola facultatis imbecillitate: decurtati primum eo, quod tanta nō sit facultatis vitalis vis, ut ad extremam vsque arteriæ partem possit peruenire. In tali casu sub digitis prope cubitum apparet, sub alijs prope carpum pulsus non percipitur.

Quod si aliquando oppositum contingat, ut pulsus percipiatur sub digitis prope carpum, non sub illis, qui sunt versus cor, scribit Gal. *lib. 2. de prasag. ex puls. cap. 11.* id contingere eo, quod arteria in his casibus sit minus tecta a carne, & cute prope carpum, quam prope cubitum. Quæ ratio veritatem quandoque continet: sed decurtatorum pulsum ex imbecillitate prodeuntium causam non assignat. Nam ex Galeni dictis statim inferri potest, pulsum, nisi a nimia carne tecta esset arteria, perinde sub digitis prope cubitum percipi posse, ac percipitur prope carpum, tunc autem non dicitur decurtatus. Ego plures patientes morti propinquos inueni cum his pulsibus, qui digito ad carpum situato percipiebantur, sub alijs prope cor nequaquam.

A Mihi itaque persuades, causam esse non situm arteriæ, non carnis superpositæ gracilitatem, sed magis facultatis confluentis reflexum, quasi in ea parte facultas, quæ ob offis duritiem & arteriæ angustiam non facile ulterius progredi potest, ibi omnes suas vires ostendat: In partibus autem prioribus, cum deficiat pulsus, non sentitur.

Quantum ad Eminulos & prominulos, hi quoque consuetam facultatem quandoque sequuntur, ut colligitur ex Galen. *lib. 4. de caus. puls. c. 11.* Fit enim hic pulsus ob languidam facultatem, quæ tota sub medio digito manifestatur, quando illi, qui sunt hinc inde comptimentes arteriam, nō permittunt debilem facultatem sub illis manifestari: Itaque tota, sub vnico esse dicitur, & eo quidem medio, circumstantes autem partes motu videntur deficere.

De Causis sphygmarum communium seu familiarium, Cap. X.

H Actenus causas pulsum, qui proprii vocantur facultatis & instrumenti tam separabiles, quam inseparabiles: venio iam ad familiares.

Qui pulsus familiares.

Dicuntur familiares illi, qui quanquam magis fiant a causa vna contentiua, quam alia, ab illa tamen sola non prodeunt, sed alias etiam concurrere oportet. Itaque magnus & paruus, celer & tardus, frequēs & rarus, æqualis & inæqualis pulsus familiares vocantur. Nam magnus, celer & frequens sunt familiares vsui aucto.

C Paruus, tardus & rarus sunt familiares vsui imminuto.

Augetur autem vsus, vel quando augetur caliditas in corde, vel cum spiritus animalis imminuitur ex lib. 1. de caus. puls. c. 3.

Imminuitur vsus, siue calor deficiat, siue spiritus animalis abundet.

Inutilis est quæstio, quam consulto intermitto, An vsu aucto prima pulsus mutatio sit in magnitudinem, deinde in celeritatem, tertio in frequentiam, ut sentit Gal. potius primo fiat frequens, deinde celer, tertio magnus, ut Arabes? Est, inquam inutilis. Nam parum hoc refert ad curandos morbos: Et rei veritas est pro facultatis & instrumenti conditione, aliquando vno modo, quandoque altero rem contingere.

D His itaque dimissis familiares pulsus facultatis & instrumenti sunt æquales & inæquales, & ex inæqualibus ordinati & inordinati.

Verfabimur primo, circa eos, quos vsui magis familiares diximus. Magnum scil. & paruum, celerem & tardum, frequentem & rarium. Deinde ad inæquales transibimus.

Hi pulsus, uti dicebam, non fiunt, nisi concurrente facultate etiam & instrumento. Propterea Galenus proponit differentias & causas horum pulsum consideratorum secundum triplicem complicationem. Prima enim complicatio est vsus cum instrumento. Secunda, est vsus cum facultate. Tertia vsus, cum instrumento & facultate.

Ego,

Pulsus facultatum
propter &
inseparabiles.

Ego, qui doctrinam duntaxat utilem sum pollicitus, duas primas complicationes, tanquam superuacaneas prorsus omitto. Neque enim fieri potest pulsus magnus, celer vel frequens, aut oppositi ex solo usu & facultate, aut solo usu & instrumento, sed semper tria hæc necessario concurrunt. Itaque de hac tantum complicatione agemus.

Ex hac complicatione octo oriuntur differentiæ. Prima *usus auctum instrumento duro & facultate robusta*: hæc complicatio facit pulsum magnitudine moderatum, quia arteria dura non potest extendi: facit celerem, quia facultas valida: facit frequentem, quia usus est auctus.

Secunda complicatio *usus aucti, arteria dura, facultas languida*: hæc complicatio facit pulsum paruum, quia facultas inualida duram arteriam non potest extendere: facit frequentissimum ratione usus aucti: si non sit ad summum infirma, faciet etiam moderate celerem.

Tertia complicatio *usus aucti, arteria mollis, virtus valida*, pulsus erit maximus, celerissimus, non admodum frequens: *Maximus*, quia mollis arteria a valida virtute in omnes extenditur dimensiones. *Celerissimus* propter usum auctum, & vires validas: *non admodum frequens*, quia magnitudine & celeritate motus satis fit necessitati: si tamen necessitas augeatur, etiam frequentia accedit.

Quarta *usus aucti, arteria mollis, virtus languida*: pulsus huius complicationis erit in magnitudine & celeritate moderatus, frequentissimus tamen: erit moderatus in magnitudine & celeritate: quia mollis arteria facile dilatur, usus auctus cogit facultatem ad dilatandum: propterea, quamquam infirma, moderate dilatat, & celeritatem, quam vult, adhibet; cum tamen vsui non satisfaciat, frequentia supplet: si tamen sit valde infirma, neque celerem neque moderatum efficiet, sed paruum & tardum, & illum, quem proprie vermiculosum vocant. Fit enim vermiculosus ex usu aucto, instrumento molli, facultate debili.

Ex octo complicationibus, quæ inter usum, facultatem & instrumenta cadere possunt, quatuor iam sunt explicatæ: aliæ nunc quatuor succedunt: Quarum prima est *usus imminuti cum instrumento & facultate debili*, ex qua fit pulsus parvus, tardus & rarus.

Secunda est *usus imminuti, instrumenti mollis, facultatis valida*, quæ facit pulsum magnum, moderate celerem, rarum tamen.

Tertia complicatio est *usus imminuti cum instrumento duro & facultate robusta*, quæ facit pulsum magnitudine & celeritate moderatum, attamen rarum.

Quarta & vltima est *usus instrumenti cum instrumento molli & facultate languida*, quæ facit pulsum magnitudine moderatum, tardum tamen ac rarum.

Nomine enim mollitiei non oportet intelligere mollitiem in summo, in qua arteriarum fibræ non prorsus corrumpuntur: tunc enim nullus fere prorsus fit motus.

Ex ijs ipsis complicationibus fiunt etiam pulsus alti, lati & graciles.

A Fit enim altus ex usu aucto, facultate robusta, arteria compressa ad latera, ne extendi possit.

Fit pulsus latus ex usu aucto, valida facultate, & onere corpori arteriarum superposito. Fit etiam ex nimia arteriæ mollietate.

Gracilis fit ex virium imbecillitate & arteriæ siccitate.

De Causis Sphygmorem inæqualium ex complicatione ortorum, & primum De Inæqualitate, qua fit ex instrumento & facultate.

Caput XI.

Venio modo ad aliarum differentiarum species, mutati scilicet rhythmici, inæqualitatis & inordinationis.

B Mutatur rhythmus, quando vel systole celerior est, quam diastole, vel diastole celerior, quam systole.

Causa huius varietatis rhythmici est varietas mutati usus. Cum enim usus consistat, vel in refrigerando corde, & in reparandis spiritibus animalibus, in quem usum natura diastolen instituit: consistat præterea in expurgandis fumosis excrementis, quæ cordis calorem suffocant; quando necessitas expurgationis fuliginum maior fuerit necessitate refrigerandi cor, vel reficiendi spiritus animales, tunc systole erit celerior, quam diastole: si contra res se habeat, diastole quæ systole erit celerior.

C Quantum ad inæqualitates, fiunt illæ pulsum differentiarum, aliquando ex sola facultate, quandoque ex solo instrumento, nonnunquam ex complicatione facultatis & instrumenti; facultatis & usus; usus & instrumenti; facultatis, usus, & instrumenti.

De inæqualitatibus, quæ fiunt ex sola facultate & ex solo instrumento, dictum est superius: de alijs nunc dicendum, quæ ex complicatione oriuntur.

Sed dicet quispiam, cur etiam non datur inæqualitas ex usu, sicuti datur ex instrumento & facultate? Dico cum Gal. lib. 2. de caus. puls. cap. 1. id fieri non posse, quia nunc de inæqualitate sermo est considerata inter pulsationes, quæ vno & eodem tempore fiunt, in quibus nulla est ratio, quamobrem prior pulsus sit maior secundo, vel tertius quarto. Neque enim momento temporis calor augeri & imminuti potest.

Quod si quisquam obijciat iræ pulsum, qui inæqualis est, & videtur usum tantum auctum insequi? D Respondet Galen. loco citato, pulsum iræ non vnicam sequi affectionem, sed etiam usum auctum & imminutum: auctum, quatenus ira est feruor sanguinis cordis: imminutum, quatenus timorem habet connexionem, ex qua pugna fit pulsus inæqualis.

Consideremus itaque inæquales pulsus, qui ex complicationibus oriuntur: horum quidam magis fiunt ex instrumento, quam ex facultate; quidam magis ex facultate, quam instrumento: alij magis ex facultate, quam ex usu: quidam magis ex usu, quam ex facultate: alij denique fiunt ex usu, facultate, & instrumento.

Qui fiunt magis ex instrumento quæ ex facultate, sequuntur aut arteriarum obstructions, aut repletiones, vel intemperies, aut denique compressiones.

Obstru-

Obstructiones, quando cavitates arteriarum multis & crassis humoribus est referta, & praeterea cum vitalis spiritus liberum non habeat transitum, & tamen continuo aduersus hanc copiosam & crassam materiam relucetur, ut illam ad fines vasorum deturbet, & si potest, extra vasa propellat: in hac lucta fit pulsus inaequalis, secundum magnitudinem & prauitatem, celeritatem, & tarditatem, frequentiam, & raritatem: fit quandoque intermittens & in una, & in pluribus pulsationibus: fit quoque intercurrentes, neque tantum fit inaequalis in pluribus pulsationibus, sed etiam in unico ictu, siue intermittat in media pulsatione, ut facit caprizans, siue non intermittat, ut faciunt illi, qui habent diastolen continuatam, sed disparem celeritatem vel magnitudinem ratione principij & finis motus. Omnes istae inaequalitates possunt ex hac humorum copia in cavitatibus arteriarum contenta, contra vitales spiritus pugnante fieri & conseruari.

Fit etiam inaequalitas, si repleantur arteriae non ratione cavitatis, sed ratione propriarum tumearum, quae quidem repleti possunt, & cum tumore, & citra tumorem.

Si cum tumore, possunt repleti, & a tumore inflammatorio & erysipelaceo, & oedematoso, & scirrhuso, vel legitimis, vel spurjis.

Haec ipsae quoque tunicae intemperiem patiuntur, vel aequalem, vel inaequalem.

Aequalem, ubi vel omnes sunt exsiccatae, vel omnes refrigeratae, vel omnes humectatae.

Inaequalem, ubi eadem arteria in varijs partibus siccior vel mollior, frigidior vel calidior existat.

Ex his causis sunt quidem inaequalitates iam propositae, sed aliae speciales.

Nam ubi arteria tumore afficitur, adest inaequalitas in sito, quia in eam partem ducitur arteria, in qua reperitur inflammatio.

Pariter ex inflammatione, vel tumore, fit pulsus convulsivus.

Ex inaequalitate intemperaturae fit pulsus ferratus, dictoratus, de quo tamen plura dicemus infra.

Ex molli fit vndosus & vermiculosus. Itaque sunt variae species differentiae.

Denique ex instrumento fit inaequalitas, quando instrumentum comprimitur, non est obstructum in cavitatem, non est repletum in propria substantia. Sed quia continuo dilatatur, & ut dilatetur, opus est spatio inani: si ergo illud spatium sit repletum, arteria non potest dilatari: & si nulla ratione potest dilatari, fit *crisis*, intercipitur pulsus, sequitur mors. De hac interceptione sermo est apud Hipp. lib. de viisus rat. in morb. acut. com. 4.

Quod si non sit exquisitum impedimentum, pulsus fit inaequalis, quia natura, quanquam impedita a libera motione, attamen post tres vel quattuor pulsationes vires colligit, & pulsus facit magnus: sed iterum onerata pulsus facit imbecillum, tardum vel intermittentem. Causa enim huius compressionis est vel materia in illis cavitatibus, seu spatijs inanibus contenta, aut est insignis venarum repletio, quae semper arterijs sunt sociatae.

Est denique etiam tumor parvum circumiacen-

tium, quae omnes causas arterias a propria dilatione impediunt. Ex his igitur causis ex parte instrumenti, potissimum pulsus fit inaequalis.

Subinde tamen concurrunt facultas, quae potest esse vel robusta, vel languida: & si fuerit robusta, facit omnes pulsus inaequales iam propositos, tam in uno, quam in pluribus ictibus, tam intermittentes, quam non intermittentes.

Sed ubi inaequalitas sit in uno ictu & cum virtute valida, finis pulsationis est semper maior & celerior, quam principium: si sit in pluribus ictibus, semper plures sunt ictus magni, celeres & vehementes, quam sint parvi, tardi, & imbecilles.

Contra vero imbecilla facultate contingit: nam in unico ictu finis pulsationis est minor & languidior principio, in pluribus ictibus plures sunt pulsationes parvae, debiles, & tardae, quam magnae, vehementes & celeres. Idcirco proprii huius complicationis sunt *Méopou* deficientes sed reciproci.

Huc etiam pertinent illi, qui disparem habent celeritatem ac magnitudinem, & diastolen vehementiorem, in quibus finis diastoles est imbecillior, magis parva & tarda.

Sunt deinceps omnes inaequales secundum magnitudinem & paruitatem collectivam, celeritatem & tarditatem, vehementiam & imbecillitatem, quando plures sint parvae, debiles ac tardae pulsationes, quam oppositae. Istae omnes sunt potius ex facultate imbecilla, quam ex instrumento obstructo, aut repleto aut compresso ad differentiam superiorum iam enumeratorum, quae sequuntur potius obstructiones, repletiones & compressiones, quam invalidam facultatem. Ad hoc caput pertinent etiam pulsus vndosi, vermiculosi, qui, etiam si non sine instrumenti vitio fiant, sequuntur tamen magis imbecillitatem mouentis facultatis.

De sphygmatis inaequalibus ex usu & facultate. Cap. XII.

Venio modo ad aliud caput pulsuum scil. inaequalium, qui sequuntur usum & facultatem.

Hi quoque bifariam diuiduntur. Nam vel magis sunt ex usu, quam ex facultate, vel magis ex facultate, quam ex usu.

Fiunt magis ex usu, quam facultate, quando partes cordi vicinae, siue humores, siue pericardium, siue arteriae & venae intemperiem calidam aut frigidam obtineant, cum, aut sine putredine. Quando enim intemperies hos locos obsidet, dicitur mutari usus. Quando autem intemperies ipsummet cordis corpus occupat, dicitur mutari facultas: Haec est sententia Galeni lib. 1. de praesag. puls. cap. 4.

Itaque illa pulsus fiunt magis ex usu immutato qui sequuntur intemperiem partium cordi propin quarum: quae partes cordi propinquae ex sententia eiusdem Gal. lib. 3. de praes. expuls. cap. 3. in fine, sunt pericardium, humores, vasa cordis & pulmonis.

Dum autem fiunt ex cordis intemperatura, tunc sequuntur laesam facultatem.

Pulsus igitur, qui praecipue usum imminutum consequuntur, fiunt ex inaequali vel humorum, vel aliarum vicinarum cordi partium intemperie.

Quan-

Quando enim vel humores sunt partim frigidi, partim calidi, similiter & solida propinqua, vel partim sunt putrida vel non putrida cum huiusmodi intemperantia non possit reperiri in equali gradu, necessarium est, ut modo una, modo altera qualitas prævaleat, modo calor, modo frigus. Similiter aliquando prævalet ratione putredinis vsus expurgandi fuligines: quandoque remissa putredine cessat.

Ex hac inæqualitate fiunt pulsus inæquales, & in uno & in pluribus ictibus.

In uno & sub uno digito tam intercepti, quam non intercepti, sed dispartes in magnitudine, vehementia & celeritate. Quando enim calor magis viget, pulsus fiunt maiores, celeriores, vehementiores. Interim existentibus ibidem frigidis humoribus (quia iam supponimus inæqualem intemperiem) immutatur vsus refrigerandi, augeturque necessitas calefaciendi, prævalet post alias pulsationes frigida qualitates calidis. Hinc pulsus mutatur ad parvitatem, tarditatem & imbecillitatem.

Similiter, ubi plures sunt humores putridi, quam non putridi, frequentissimi fiunt pulsus, systole erit celerior, quandoque intercipitur motus diastoles: nam propter summam expurgandi necessitatem, quandoque arteria ante finem diastoles retrahitur quandoque videtur amitti externa quies.

Quod si prævaleant humores non putridi putridis, & sint valde calidi, fiunt pulsus bis pulsantes, in quibus videtur amitti ex toto & systole, & simul quietes, quæ cadant inter unam & alteram diastolen.

Quod dico de uno ictu, dico etiam de pluribus. Nam quousque abundauerit fuliginum copia, systole erit semper celerior quam diastole, ut contingit in principio & augmento putridarum febrium. Vbi autem prævaleat refrigerationis necessitas, motus diastoles in celeritate & magnitudine systolen superabit.

Sic igitur fiunt pulsus inæquales ex vsu aucto potius, quam ex facultate. Fiunt etiam inæquales potius ex facultate, quam ex vsu, quando solida cordis substantia inæqualem habeat intemperiem.

Si quispiam querat, quomodo unica cordis substantia inæqualem habeat intemperiem? Dico id duobus præcipue contingere modis: primo ratione diuersarum partium similarium: secundo ratione vnitus & eiusdem partis similis.

Ratione diuersarum partium, quia cor constituitur ex carne, membranis, venis, arterijs & nervis. Potest autem contingere, ut docuit nos Gal. lib. 1. de inæquali intem. capit. ultim. membrum organicum propter hanc similarium partium diuersitatem inæquali intemperie laborare.

Fit etiam intemperies inæqualis, in una eadem parte similari: Et hoc dupliciter.

Primo, quando una reperitur intemperies in facto esse, altera opposita iam introducit, & est in fieri. Exemplum habetur apud Galenum, libro de inæquali intem. cap. 10. Manus refrigeretur, vel gelo, vel ex niue, appropinquet igni, dolor excitatur, & excitatur, ut inquit Galenus, ex inæquali intemperie: nam frigida est in facto esse, calida tunc est in

fieri. Hoc ipsum cordi potest contingere, ut, si est calidum vel frigidum in facto esse, a propinquis autem locis, vel refrigeretur, vel calefiat.

Secundus modus est, ut cor ipsum substantie est refrigeratum, calidum vero redditum calore extraneo: sic in febre marasmo cor est calidissimum calore extraneo, frigidissimum caloris natui defectu.

Ex hoc igitur triplici intemperie inæquali fiunt omnes inæquales pulsus tam in uno, quam in pluribus ictibus, ut docuit Gal. & libro secundo, de præfag. ex puls. capit. 8. & libro tertio, de præfag. ex puls. capite quarto. Et ratio est manifesta: Nam ratione caliditatis cordis, pulsus dicuntur fieri magni, celeres, frequentes: & si modum omnino excedat, ut corrumpat temperaturam, erunt etiam vehementes. Ex altera parte, cum adsit etiam frigiditas, pulsus dicuntur esse oppositi.

Hinc fit, ut in huiusmodi lucta & pugna caliditatis contra frigiditatem quandoque pulsus intercipiantur, in uno ictu fiant caprizantes, quandoque fiant bis pulsantes, sed non duri, dicroti fere, quandoque fiant plures, celeres, & magni, postea alij sequentes tardi & parui, pro ut, vel hæc, vel illa qualitas superet. Sic igitur fiunt inæquales pulsus magis ex facultate, quam ex vsu.

Quod si quispiam querat, quales nam pulsus fiant, quando corpus cordis habeat unam temperiem, vicinæ autem partes aliam? Hoc intelligetur in sequenti capite.

Quæstio.

C De Sphygmis inæqualibus factis ex inæqualitate inter solida ipsius cordis & partes propinquas contingente. Cap. XIII.

Explicari hæcenus quasdam contentiuas vocatas causas, quas singuli inæquales pulsus consequuntur: Docui etiam, quomodo ex Galeni sententia solidorum cordis inæqualis intemperies, aut humorum in eo contentorum, inæqualem pulsus quandoque efficiat. Succedit, ut doceam, quales nam pulsus ex inæquali intemperie fiant, quæ inter solida ipsius cordis & propinquas partes solet contingere. Quædam etiam de dicroto pulsu singulatim explicabo: postea vero ad mediatas causas descendam.

Est igitur inæqualis intemperies solidorum cordis cum propinquis partibus, quando cor est iusto calidius aut frigidius: propinquæ autem partes, siue sint humores in sinibus contenti, siue sint arteriæ, pericardium & pulmones contrariam habeant cordi intemperiem. In hac intemperaturam pugnantia pulsus fiunt perpetuo inæquales, omnium deterrimi; eo quod eruditissimos etiam Medicos possint decipere, quiplerunque egrum propediem moriturum, sine febre, sine ullo morbo iam esse pronuntiant.

Id tamen solet dupliciter contingere, quandoquidem, ut dicebat Gal. lib. 3. de præf. ex puls. cap. 3. Quando adest hæc intemperaturam pugnantia, aut pugnant inæquali gradu, ut tanta sit vnus caliditas, quanta est alterius frigiditas: aut adest aliqua

Quomodo
unica cor-
dis substan-
tia habeat
inæqualem
intemperiem.

Quomodo
fiat inæqua-
lis intempe-
ries in una
ex parte si-
milari.

aliqua diuersitas in gradu, vt sc. gratia exempli, cor sit calidius, quam sint humores contenti frigidiores: aut opposito modo.

Vbi ergo intemperies sunt contrariae & in aequali gradu, sunt pulsus, qui omnino videntur sanis similes.

Vbi autem maior sit caliditas, quam frigiditas, aut frigiditas, quam caliditas, pulsus habet. nescio quam, differentiam a sanis, vix tamen sensibilem, quam nunc explicabo.

Exempli gratia, si cor sit calidius, quam sint humores, vel arteriae frigidiores, pulsus est celerior naturalibus: & si virtus sit robusta, est etiam maior & vehementior.

Quod si vero cor sit frigidus, quam arteriae, vel humores calidiores, pulsus vel sunt moderati, vel potius aucti in magnitudine, quam in celeritate, omnino tamen languidi.

Quaestio.

Quod si quispiam petat, vtrum sit aliquis modus cognoscendi pulsus lethalem & perniciosum, quando intemperies est prorsus aequalis in gradu, & caloris & frigoris? Dico, in febrcitantibus, in quibus calor obsideat solidas partes cordis, pulsus saltem excedere pulsus naturales in celeritate: poterit esse moderatus in magnitudine & in frequentia, sed in celeritate non erit moderatus: erit celerior iusto; haec est sententia Gal. lib. 3. de praesag. ex puls. cap. 2. qui propterea scribit: *propriam febris cognitionem ex pulsibus desumptam ad celeritatem pe. tinere.* Deficiet enim magnitudo, deficiet frequentia, non deficiet celeritas.

Itaque vno verbo, ex inaequali intemperie, quam pulsus videantur similes sanis, attamen, vel sunt celeriores, vel quandoque etiam languidiores, vbi cor sit frigidum, aut maiores, vbi multi sint humores putrescentes, quod docuit etiam Galen. lib. tertio de praesag. ex puls. cap. 4.

De Sphygmocicroto. Cap. XIV.

IN dicroto explicando video sane Galenum lib. 3. de praesag. ex puls. cap. 3. esse ita varium, vt, quid tandem senserit, vix intelligam: audiat is quæso. Vult dicrotum esse triplicem, vnum mollem, duos autem duros. Ex duobus duris, vnum dicit vibratum, alterum non vibratum: Mollem inquit lib. 3. de praesag. ex puls. cap. 3. fieri ex inaequali intemperie cordis solidorum: Quando scilicet solida cordis substantia, vno & eodem tempore laborat calida & frigida intemperie.

Galenus opinio refutatur.

Si hoc verum esset, daretur pulsus dicrotus hecicus vocatus, sed consequens est falsum: Experientia est in oppositum: puto lectorem meminisse, qualis nam sit pulsus dicrotus: est pulsus bisferiens, est pulsus, qui facit duos aut tres ictus absq; systole & contractione; sed, quis quæso est, qui hecicum pulsus talem vnquam inueniet? Ego nunquam inueni, nec alium, qui inueniet, audiui. Quod autem talis deberet esse hecicus, docuit ipsemet Gal. loco iam ante citato. Itaque haec causa mihi non probatur.

Duri pulsus dicroti, sed non vibrati, aliam proponit causam lib. 2. de caus. puls. capite 6. & libro

A 2. de praesag. ex puls. capite 8. & inquit, *hanc esse molliem & duritiem simul arteriarum cum facultate imbecillam: Quando enim, inquit, media pars arteriae est mollis, partes circumstantes sunt durae, & facultas est debilis, pars mollior, inquit, citius mouetur, quam partes durae, quae sunt hinc inde, cum a facultate debili non possint moueri, retrahunt partem motam intro, postea simul iterum mouetur, & pars mollis & dura: hinc fiunt duo motus.*

Est merum figmentum, vt ingenue dicam. Primum quidem, quis potest animo concipere, vnum corpus arteriae esse in vna particula molle, in alijs duabus durum? Sed esto, tale sit, quis docet manum tangentis, vt statim medio digito tangat partem mollem, extremis autem partes duras? nonne licet Medico mutare manum in tangendo pulsus modo magis versus carpum, modo magis versus cubitum? Profecto, si igitur id fiat, vbi iam erit mollior, vbi durior?

Aliam quoque causam pari ratione improbare possum, quando inquit, pulsus dicrotus fieri ex vario arteriae situ: nam quaedam pars est situata statim sub cute, quaedam est magis profunda, quia a multitudine humorum grauatur.

Pariter dicam, quæ est causa, cur vnica arteriae particula, & ea quidem media ab humoribus non grauetur, neque opprimatur, circumstantes autem opprimantur? Propter has causas, vt ingenue dicam, opinio Galeni de causis dicroti mihi non placet.

Ego bis aut ter toto vitæ meae tempore talem obseruaui pulsus, sed anno potissimum elapso, dum huic studio incumberem, incidi in talem pulsus in virgine quadam in cenobio D. Petri, quæ erat septuagenaria, & laborabat maligna pleuritide, in quinta die incidit in talem pulsus, & in sexta & septima desijt hic pulsus in erinulum & prominulum, tandem vero in formiculosum, & obiit.

Veni ego in hanc sententiam, immediatam horum pulsuum causam esse usum valde auctum. Usus admodum augetur, quando augetur caliditas præter naturam, & tunc potissimum, quando maior est caliditas, quam sit copia fuliginum: tunc enim maior est necessitas dilatationis pulsus, quæ constrictionis: Confirmo hanc veritatem, quia pulsus dicrotus est pulsus, qui habet duas & tres diastoles absque manifesta saltem systole: Si caret pulsus systole, augetur diastole. Diastole autem fit ob necessitatem refrigerationis cordis: Ergo, vbi augetur caliditas, poterit talis pulsus fieri.

Sed dicit ingeniosus, nonne adest insignis caliditas in febre ardente, & tamen pulsus non est dicrotus? Verum est, sed hic non quiesco, quætere oportet causam, cur huiusmodi caliditas febrilis ita augeatur, vt cogat facultatem ad faciendas duas & tres, & plures pulsationes? Causa est, quando cor impediatur a recipiendo aere sibi necessario pro conuenienti refrigeratione. Impeditur autem in omnibus vel obstructionibus, vel compressionibus arteriarum & pulmonum: Et idcirco in hac muliere, quæ erat pleuritica, neque exspuebat pleuritici, factum est tale impedimentum; quod etiam impedimentum fuisse puto in eo calceolario sene,

Quæstio.

sene, quem multi viderunt apud Beatam Hellenā, qui talem aliquando pulsum habuit, ut denique pulvis bis ferientes consequantur flammam cordis caliditatem, cum obstructione tamen, vel compressione arteriarum & pulmonū, ut non possit convenienter vsui satisfieri.

De Causis Mediatas Sphygmarum.

Caput XV.

Pulsuum causas, ut alias diximus, in duplici sunt differentia, quædam immediatæ, quas etiam contentiuas vocant: aliæ vero mediatæ.

De contentiuis, quæ tres sunt, facultas scilicet, v-sus & instrumentum; iam satis dictum est.

De mediatis nunc dicendum, quæ etiam in triplici sunt differentia: quædam naturales, aliæ non naturales, quædam præter naturam, quas omnes nouisse oportet, ut postea diligentia adhibeatur in distinguendis causis præter naturam a ceteris.

Causa mediata pul-sus vehemen-tis.

Incipiemus igitur a pulsu vehementi & languido. Vehemens pulsus, cum fiat a facultate valida, tanquam a causa contentiua, fit etiam a moderatione temperamenti partium solidarum cordis, in quo vno moderato temperamento præcipua facultatis vitalis vis residet, ex Gal. lib. 1. de prælag. ex puls. cap. 4.

Sequitur præterea ætatem iuuenilem, sexum virilem, habitum corporis moderatum, tanquā causas naturales.

Sequitur deinde moderatum aeris statum, quale est tempus veris atque principium autumnus, vsque ad medium, quicquid sēserit hac in parte Valerius, qui Galenum accusare voluit. Ipse enim, eū videat Gal. lib. illo de puls. ad tyron. dicentem, æstatis pulsus esse languidos; Ergo, inquit, tales etiam erunt pulsus principij autumnus.

Sed non valet consequentia: nam pulsus æstatis languidi fiunt, non propter solidæ cordis substantiæ insignem intemperiem, sed propter spiritus & sanguinis disputationem, quæ cum statim cessante calore refici possint, hinc pulsus principij autumnus possunt esse robusti.

Fiunt vehementes post exercitationes moderatas, post excrementorum deiectiones moderatas, post moderatum somnum, post cibum & potum moderatum, ex ira & lætitia, ex moderata Venere, & balneis calidis non ultra modum adhibitis vehementes fiunt.

Dubium.

Dubium est, an possint vehementes fieri ex causis præter naturam? Nam violentia sequitur robur facultatis: Causæ autem præter naturam facultati vitali sunt infensæ? Breuiter dico, duobus modis in causis præter naturam fieri pulsus vehementes: vno modo, cum facultas valida cogitur operari, non secundum consuetudinem naturalem, sed secundum omnes suas vires: Neque enim facultas vitalis in sano corpore semper agit pro virium ratione, sed tantum pro cordis necessitate, ut si aliquando accedant causæ impellentes, vis pulsifica oportet ultra consuetudinem.

Impellitur autem in febribus, potissimum ephemeris, in doloribus non admodum vehementibus, in quibus facultas vitalis non prosternitur, sed

A duntaxat sollicitatur: hinc pulsus dolentium & febricitantium febre ephemera vehementiores fiunt.

Alio modo vehementes fiunt in rebus præter naturam, quando in febribus ipsis natura iam humores putrescentes superauit, & ad excretionem ac crisin irritauit: tunc temporis pulsus ex languidis, vel ex minus validis robustiores fiunt.

Languidus autem pulsus oppositas sequitur causas immodicam omnem solidæ cordis substantiæ intemperantiam: nam cum, ut scribit Galen. lib. 1. de prælag. ex puls. cap. 4. facultas vitalis in moderato consistat temperamento, omnis insignis excessus, omnis magna intemperies, quæ solidam cordis substantiam obsideat, pulsus reddit infirmiores: qui tales etiam fiunt ex habitu corporis admodum gracili & consumto & sexu muliebri, ex ætate senili, tanquam causis naturalibus.

Ex non naturalibus autem constitutio & tempus anni feruentissimum, & pariter frigidum infirmos procreat pulsus, quanquam hoc etiam impugnaverit Valerius, qui media hyeme pulsus infirmos fieri non arbitratur, eo quod ventres hyeme, & vere sint calidissimi. Sed reuera quanquam minime negandum sit hyeme interiora esse admodum calida, nihilominus certum etiam est, cutem & arteriæ corpus ex aere frigido ita constringi, & indurari, ut motus infirmior appareat.

Seft. 1. aph. 11.

Imbecilliores autem fiunt pulsus ex omni causa non naturali, corpus nimium digerente, siue sint balneæ calidæ, siue exercitationes & vigiliæ, siue inedia, & nimia Venus, siue denique animi perturbatio, timor & moestitia.

Ex causis præter naturam pulsus languidi sequuntur dolores vehementissimos & cōfirmatos, superpurgationes omnes aut ventris, aut vomitus, aut sudoris, aut sanguinis, per quamecunque partē exeuntis: sequuntur atrophias, syncopes, lypothymias ex defectu alimenti excitatas, ac denique omnem causam venefica qualitate donatam, siue venenum sit morsu inflictum, siue epotum, siue intrinsecus genitum, in qua classe lucem etiam Gallicam reponunt.

Magni autem pulsus, celeres & frequentes (nam de his simul dicam) ipsi quoque habent causas naturales, non naturales, & præter naturam.

Magni, celeres & frequentes.

Et quod pertinet ad naturales, magni fiunt pulsus, ex temperamento calido & cordis, & spiritus, & sanguinis, & partium omnium cordi propinquarum, atque adeo vniuersi corporis: fiunt quoque tales in habitu corporis mediocri, in sexu virili, in ætate iuuenili aut puerili.

Ex his ipsis causis possunt etiam fieri & celeres: & si necessitas urgeat, frequentes.

Pariter, si de causis non naturalibus sit sermo, omnia quæ corpus quouis modo possunt calefacere, magnitudinem, celeritatem & frequentiam augent: talia sunt aer calidus, exercitationes, ira & lætitia, excitatio a somno, cibi & potus, medicamenta calorifica, balneæ.

Ex causis præter naturam sunt febres omnes, inflammationes omnes & erysipelata, nisi tamen

B 2 aliquid

aliquid prohibeat. Dico, *nisi aliquid prohibeat*: Quia, si febres sint tabidæ, durities arteriæ, imbecillitas facultatis non permittunt pulsum fieri magnum: Pariter, si inflammatae sint arteriæ & membranosa corpora, quæ cum arterijs communicant, propter duritiem pulsus non sunt magni. Hinc scribit Gal. in illo de puls. ad tyron. pulsus phreniticorum non esse magnos, cum tamen phrenitis sit inflammatio omnium præcipua: non sunt magni propter duritiem.

Sequuntur etiam hi pulsus omnem calidorum humorum abundantiam & sanguinis & bilis: Et denique dolores ipsos.

Parui, tardi
& rari.

Parui autem, tardi ac rari sequuntur intemperiem frigidam cordis, propinquare partium & totius corporis, habitum, vel nimis carnosum, in quo arteriæ sint angustæ, & a carne ac pinguedine compressæ: aut nimis graciles, in quo arteriæ sint duriores.

Fiunt præterea tales in ætate senili, in sexu muliebri tanquam a causis naturalibus.

Ab aere autem frigido, ab otio, ab assumptione ciborum, potionum, & medicamentorum refrigerantium, a nimio somno, a mœrore ac timore, ab inedia & euacuationibus tanquam causis non naturalibus.

Fiunt præterea a redundantia succi pituitosi & melancholici, a febribus quotidianis & quartanis, ab apoplexia, & paralyti, ac denique ab omnibus frigidis affectionibus tanquam a causis præter naturam.

Duri.

Durus autem pulsus sequitur temperamentum frigidum & siccum, habitum gracilem, ætatem senilem tanquam causas naturales: tempus hyemale, constitutionemque frigidam & siccam, vsum ciborum & potionum ac medicamentorum refrigerantium ac siccantium, vigilias & motus immoderatos, superpurgationes omnes & mœstitiæ, tanquam causas non naturales. Abundantiam succi melancholici, quartanam febrem, Epilepsiam, convulsionis omnes differentias, tympanitidem, catochen, scirrhusos tumores, inflammationes omnes membranarum, nervosarum partium & arteriarum, tanquam causas præter naturam.

Mollis.

Contra vero pulsus mollities fiet in temperamento humido, habitu carnosum & pingui, sexu muliebri, ætate puerili, tanquam a causis naturalibus. In aere temperato & humido, vita otiosa ac desidiosa, somno ac crapulis dedita, post balneas, & vsum humectantium, tanquam causis non naturalibus. Denique fiet a præsentia pituitæ & humoris aquei, in peripneumonia, in lethargo, in ascite, in leucophlegmatia, in paralyti, tanquam a causis præter naturam.

Inæqualis.

Denique pulsus inæquales nullam consequuntur causam naturalem.

Ex non naturalibus consequuntur nimiam cibi & potus repletionem, timorem & amorem.

Ex causis præter naturam consequuntur inæquales intemperies iam explicatas, & instrumentorum compressiones, repletiones, extensiones, obstructions ab humorum multitudine, ab inflammationibus, erysipelatibus, scirrhis, abscessibus, crassitie

A denique & humorum lentore.

Hæ sunt causæ omnes & præcipue naturalium, non naturalium & præter naturam.

De modo distinguendi causas sp̄hyḡmorum naturales & non naturales, a causis præter naturam. Caput XVI.

Quæcunque de pulsum differentiis, dignotione, & causis a Gal. in duodecim libris scripta sunt, in vnicum diriguntur præfagium, de quo in quatuor istis postremis libris est sermo. Quandoquidem ideo differentiarum omnium ac causarum notitiam querimus, ut tandem, distinctis causis præter naturam a naturalibus, & non naturalibus, præfagire possimus, quid futurum sit circa vitam aut mortem, longitudinem aut brevitatem, ac denique patientis crises.

Itaque in hac parte, quæ de præfagio est, tria præcipua explicabo. Primum quidem compendiosum proponam modum distinguendi causas naturales & non naturales a causis præter naturam. Secundo proponam signa distinctiva omnium causarum præter naturam: Tertio & ultimo erit sermo de futuri eventus prædictione.

Quod igitur ad primum attinet, incipiam a vehementi, simulque docebo, quonam modo pulsum vehementem, magnum & celerem cognoscere possitis ex naturali, vel non naturali causa prodire.

Est itaque *vehemens* ex causa naturali, qui simul magnus est, moderate celer, mollis, rarus & æqualis. Pulsus vehemens ex causa naturali.

Est pulsus *magnus*, quia cum robore facultatis est etiam caliditas temperamenti.

Est *mollis*, alioquin non esset magnus.

Est *rarus & moderate celer*, quia ubi calor non excedit limites naturales, sola magnitudo sufficit ad eventandum calorem nativum.

Est *æqualis*: quia, qui provenit a naturali temperamento, uniformis est, & semper eodem modo incedit: Si huic pulsui adiungas moderationem temperamenti, aut temperaturam calidam & humidam, habitum plenum, ætatem iuvenilem, sexum virilem, certior fiet hunc pulsum ex naturali causa talem esse.

Cognoscetur autem vehementes ex causa non naturali, primum quidem, si aliqua nuper præcesserit ex illis, quæ innatum calorem excitare solent, ut balneum, exercitatio, somnus, cibus & potus, medicamentum calidum, ira, omnia tamen moderata. Ex causa non naturali.

Accedit, quod hic pulsus contrahit aliquam celeritatem & frequentiam, quæ tamen brevi perdurat. Quamvis enim ex cibo & potu, ac calido medicamento calor diutius perduret, non tamen tam diu persistit, quoad calor vel naturalis, vel præter naturam.

Accedit præterea, quod in calore præter naturam celeritas superat magnitudinem ac vehementiam, in calore naturali & non naturali vehementia & magnitudo celeritatem superant. Præterea ipsimet patientes referre poterunt, numquid cibum

cibum aut potum; aut medicamentum calidum. nuper acceperint: præterquam, quod ex cibo & potu ac medicamento nuper suscepto pulsus contrahit aliquam inæqualitatem ad differentiã causæ naturalis, quæ tamen brevi perdurat ad differentiam præter naturam, & ubi adsit hæc inæqualitas, patientes propter cibum aut potum, aut medicamentum anxietatem in ventriculo sentiunt, ipsique referunt.

Sic itaque distinguuntur vehementia, magnitudo ac celeritas ex causis naturalibus & non naturalibus ad differentiam causarum præter naturã.

Frequens ex causa naturali.
De frequentia singulatim dicendum est. Frequentia ergo ex causa naturali prodibit, si pulsus fuerit durus, parvus, sed validus; nam prout est validus, indicat facultatis vitalis robur & temperamēti caliditatem: Quatenus est parvus & durus, indicat instrumenti duritiem. Itaq; facultas, cum non possit magnum edere pulsus, supplet frequentia, quæ tamen erit sibi ipsi equalis & permanens ad differentiam causæ non naturalis, quæ permanentiam non continet: præterquam quod necessario præcessit, ut paulo ante dictum est, aliqua causa calorifica, vel exercitatio, vel potus, vel cibus, vel medicamentum, & pulsus etiam præter frequentiam contrahit aliquam magnitudinem.

Languidus ex naturalis.

Languidus pulsus ex causa naturali cognoscitur ex temperamento naturali frigido & siccò, ex habitu gracili, ætate senili: præterea hic pulsus est parvus, tardus, rarus, sed sine ulla inæqualitate.

Ex non naturalis.

Qui si vero languidus ex causis non naturalibus, quandoq; est cum frequentia, aliquando cum raritate.

Nam qui sequitur causas refrigerantes, usum cibi, aut potus, aut medicamenti frigidi, aerem frigidum, timorem & mortem, est parvus, tardus, & rarus.

Sed qui sequitur inanitionem aliquam, ut nimiam Venterem, aut vigilias, aut inediam, aut evacuationes, vel aerem calidum, vel immoderatas exercitationes, est ipse quoque parvus & tardus, sed frequens; uterque tamen retinet æqualitatem ad differentiam languidi præter naturam.

Durus ex causa naturali.
Durum pulsus naturaliter cognoscitur, ex habitu corporis gracili, ex temperamento siccò, ex ætate senili, ex paruitate & tarditate æquali.

Non naturalis.
Durum vero ex causa non naturali, ex causis prægressis arteriam siccantibus vel infrigidantibus, calore, timore, potu frigido, aere aquilonari & frigido ac similibus.

Mollis naturalis.
Mollis naturalis cognoscitur ex habitu corporis obeso & pingui, ex pulsu magno, celeri, moderate tamen, sed raro.

Non naturalis.
Quod si fiat ex causa non naturali, præcessit otium, constitutio australis, frequens balnei usus, cibi, potus ac medicamenta humectantia.

Parvus naturalis.
Deniq; parvus pulsus naturalis cognoscitur ex angustia venarum & arteriarum, ex abundantia carnis, & pinguedinis supra arteriarum regione, ex duntaxat naturali.

Non naturalis.
Parvus vero ex causa non naturali cognoscitur, si præcesserit aliqua ex causis refrigerantibus: nam si usus imminuatur, id est, calor, statim magnitudo

A cessat: imminuitur autem usus, siue refrigeretur corpus ab aere frigido, siue a balneo vel cibo, potu & medicamentis.

Inæqualis pulsus, a causa naturali nunquam fit: A causa non naturali fit tripliciter; ex cibo & potu, ex amore, & ex ira.

Inæqualis non naturalis.

Cognoscitur itaque pulsus esse inæqualis ex cibo & potu, si nuper sint pasti, si anxij, timidi, iactabundi, nauseabundi, vomentes ac ventriculo dolentes.

Amantium pulsus nullus est proprius, ut docuit Gal. l. de præcog. ad Posthum. cap. 6. sed sunt inæquales pulsus amantium ex varijs animi affectibus, metu, spe, cupiditate, verecundia, quibus inter se pugnantibus pulsus etiam fiunt aliquando magni, ut in spe: in timore parui: inæquales ex affectuum complicatione.

Amantes pulsum proprium non habere.

Cognoscuntur itaque hi esse pulsus amantium, si audita amantis voce, aut inspectare amata pulsus in insignem mutantur inæqualitatem, præter hoc tempus pulsus non sunt inæquales, possunt esse frequentes, sed parui ob ardorem desiderij & timorem, sed non necessario inæquales, quod docuit Gal. lib. de præcog. ad Posthum. cap. 6.

Quomodo hi cognoscantur.

Pulsus autem iratorum sunt inæquales secundum magnitudinem, vehementiam, atque oppositas qualitates & brevi perdurat inæqualitas, præterquam, quod iratum non est usque adeo difficile cognoscere.

Pulsus iratorum.

Itaque hi breuiter sunt modi distinguendi pulsum causas naturales, non naturales & præter naturam.

C De dignotione præternaturalium causarum pulsum. Caput XVII.

D Oculi hætenus, quam ratione pulsus differentiarum ex naturalibus, vel ex non naturalibus causis provenientes, dignosci & distingui possit.

Explicatio in hoc capite, quomodo, quæ ex causis præter naturam proveniunt, a ceteris distinguantur, & quod magis ad artē facit, explicabo, quam arte possint deprehendi ex vnica pulsus differentia internæ affectiones, causæ, loci affecti, ac futurum rei præsagium.

D Pulsuum igitur differentiarum tribus potissimum modis cognoscuntur esse præter naturam: primus modus respicit magnitudinem seu excessum illius differentiarum. Secundus respicit concursum multarum differentiarum simul: tertius pertinet ad durationem istarum differentiarum.

Modo, quibus cognoscitur pulsus esse præter naturam.

Quod igitur ad primū pertinet, est pulsus præter naturam, qui multum excellit, & superat naturales limites corporis contenti in latitudine sanitatis. Et ideo quādo celeritas superat magnitudinem & vehementiam, necessario constituit pulsus præter naturam, quia (ut alias dixi ex Galen. lib. 3. de præsag. ex puls. cap. 3. & 4.) Celeritas proprium est febris signum, si tamen magnitudinem superet. nam ubi pulsus est maior, quam celerior, potest esse ex causa non naturali: si sit celerior quam maior, est ex causa præter naturam.

11. Secundo cognoscitur pulsus præter naturam, A
si coniungantur simul talis celeritas cum frequentia: his si accedant magnitudo aut paruitas, vehementia aut languor, dunties aut mollietates, ac denique inæqualitas, certiore vnumquemque reddere poterunt, illum pulsus esse præter naturam.

111. Tertia cognitio pertinet ad durationem: ubi enim pulsus excellentes ex multis differentiis complicati habeant etiam diuturnam permanentiam, necessario ex causis præter naturam fiunt.

Cum itaque iam est inuentus pulsus præter naturam, oportet deinceps, ut etiam affectus præter naturam inueniatur.

Affectus præter naturam est causa, morbus, & symptoma. Morbus a. præter causam affectuam constat ex genere & subiecto: Itaque oportet, ut ex pulsu inueniatur causa, genus affectionis, locus B
affectus vel symptoma, ex quo talis pulsus proveniat. Incipiam itaque a vehementi.

Pulsus vehemens potest esse in febribus Ephemericis in tertianis exquisitis, in doloribus incipientibus, & inflammationibus atque alijs tumoribus, dummodo virtus sit valida.

Cognoscitur itaque ex pulsu vehementi febris Ephemera: si pulsus etiam sit maximus, celerissimus, frequentissimus, & æqualis atque rhythmosus.

Cognoscitur esse tertiana exquisita, si habeat propositas condiciones, sed careat rhythmo, ut scilicet in principio & incremento systole sit celerior, quam diastole: in statu & declinatione diastole sit quam systole celerior.

Cognoscitur pulsus vehemens ex dolore, si sit durus, inæqualis, frequens & celer, & dolor ad sit incipiens: nam dolores maximi confirmati pulsum reddunt languidum.

Cognoscitur inflammatio augefcens & vicens, si pulsus sit vibratus: nam vibratus pulsus (ut alias dixi) fit ex facultate vehementi, instrumento duro, & usu admodum aucto. Vfus autem maxime augetur cum instrumento duro, quando arteriæ, vel venæ inflammantur: propterea hic pulsus ostendit etiam locum affectum, nempe venam aut arteriam, non autem membranam, quia, ut docet Gal. & recte libro de puls. ad tyron. capit. 13. in inflammatione membranarum pulsus fiunt parvi: inflammatis venis & arterijs sunt maiores. Cum itaque vibratus pulsus sit magnus, est signum inflammationis non, membranæ, sed venæ vel arteriæ.

Distinguitur autem scirrhusa affectio ab inflammatione ex pulsu vibrato: Quia in inflammatione pulsus est vibratus quacunque hora, dummodo, ut dixi, augeatur vel vigeat inflammatio: In affectibus scirrhusis pulsus non est vibratus: nisi in augmento febris, circa statum & declinationem pulsus amittit vibrationem.

Ex his colligi possunt causæ, affectiones, loci, & symptomata.

De futuri eventus ex spbygmis æqualibus præfatio: quos locos affectos iidem, quas affectiones, quasque causas & symptomata indicent. Cap. XV III.

Quantum ad futuri eventus præfagium, Omnis pulsus vehemens futuram salutem significat. Nam quantumvis magnus fuerit morbus, dummodo vires consentiant, semper bene sperandum est.

Sed si huiusmodi pulsus in febre acuta circa tempus status apparuerit, futuram enim salutarem significat, ut abunde docuit Galenus lib. 4. de præfag. ex puls. cap. penult.

Quod pertinet ad languidum, languidus pulsus facultatis vitalis imbecillitatem significat, sed quia imbecillus est facultas aut dissoluta, aut suffocata, cognoscitur languidus pulsus ex dissolutione, si fuerit æqualis: languidus ex suffocatione, si inæqualis.

Sed quia languidus pulsus ex dissolutione fit, vel propter defectum spiritus vel humoris, vel propter intemperiem substantiæ solidæ: cognoscitur esse languidus propter defectum spiritus vel humoris, si pulsus fuerint parvi, & vermiculosi.

Quia vero rursus isti aut sequuntur immodicas evacuationes, aut veneficam qualitatem: cognoscuntur vermiculosi ex nimij evacuationibus, si præcesserit vel ad sit fluxus sanguinis, alui, vomitus, urinae vel sudoris, inedia, coitus aut vigiliae.

Cognoscitur autem pulsus talis ex veneno, si quandoque fuerit languidus quidem & parvus, sed neque celer, neque admodum frequens, neque inæqualis, si nulla præcesserit evacuatio, si sceler ad sit anhelitus, si extrema & exteriora frigida sint & livida.

Cognoscitur autem dissolutio virium ex intemperie solidorum, si ad sit aliquis excessus aut caliditatis, aut frigiditatis, aut siccitatis.

Et excessus quidem caliditatis cognoscitur ex pulsu languido, parvo & frequentissimo, qualis est fornicans.

Cognoscitur frigiditas ex pulsu languido, parvo, tardissimo, & rarissimo, siccitas ex his, ac præterea ex duritie & macie totius corporis.

Sed quia, ubi intemperies occupat solidas partes, quandoque obsidet cordis substantiam, aliquando arterias ipsas; cognoscitur intemperiem pertinere ad solidam cordis substantiam, si non modo omnes arteriæ pulsus habeant paruum ac liquidum, verum etiam ipsum cor, ad mota manu in regione cordis, exilem tunc obtinet pulsant.

Quod si in arterijs sit intemperies, manui regionem cordis tangenti pulsus apparent vehementiores.

Et quia, si arteriæ fuerint intemperatae, aliquando sunt intemperatae prope ipsum cor, aliquando autem in partibus a corde distantibus, hæc cognoscitur differentia: quia, si intemperies fuerit cordi propinqua, omnes arteriæ vno modo pulsant, tam dextra, quam sinistra, tam superiores, quam inferiores.

Si in-

Si intemperies fuerit in partibus distantibus, illæ tantum arteriæ habent pulsus lægidos, vel paruos, vel tardos, & raros, vel frequentes, in quibus fuerit intemperies.

Ex quo licet inuenire *locos affectos*; quandoquidem, ubi sinistra partis pulsus est imbecillior dextra, oportet in sinistra parte esse affectionem.

Vnusquisque deinceps ex symptomatis, quæ male habent ægrotantem, poteritprehendere, utrum ea pars sinistra sit in capite, an in pulmone, an in liene, an jo tene sinistro, vel alia parte simili.

Sic itaque ex pulsu languido propter dissolutionem, causæ, affectiones, loca & symptomata distinguuntur.

Languidi pulsus ex dissolutione varios indicant interiores affectus: Et primum quidem ex symptomatis indicant superfluas & excedentes omnes excretiones alui, vomitus, vrinæ & sudoris, & cuiuscunque sanguinis eruptionis.

Ex morbis, significantemarcorem senilem, seu senium Philippi vocatum, febres marasmodos cum phthisi, & sine phthisi, ardentes malignas, atque denique pestilentes, qui omnes affectus ex varijs languidi pulsus differentijs inter se distinguuntur. Omnes enim superflue excretiones ex *vermiculosis pulsibus*prehenduntur, auctore Galeno, lib. de pulsibus ad tyronem capite duodecimo, & libr. secundo de præag. ex puls. capit. 9. Marasmus senilis, vel senium Philippi, ex pulsibus languidis, parvis, tardis, raris, duris & æqualibus cognoscitur. Febres marasmodos sine phthisi ex pulsibus languidis, parvis, frequentibus ac durisprehenditur. His vero, si loco duritiei mollities accedat, phthisis erit argumentum.

Quando autem horum pulsum paruitas & crebritas fuerit in summo, ita ut euadant formicantes, febrem ardentem indicant & malignam, summum cordis incendium, quod solida cordis substantiæ temperaturam destruit. Isti vero omnes sunt æquales.

Quod si frequentia & paruitati & imbecillitati accedat aliqua inæqualitas, siue in vno, siue in pluribus ictibus (quod contingit in decurtatis seu myuriis vocatis pulsibus, atque aliquando in emiculis & prominulis, seu innuentibus & circumuolutis) tales omnes pulsus pestilentes & malignas febres ostendunt: quandoquidem ex malignitate pulsus sunt languidi & parui: ex calore febrili sunt frequentes: ex humorum putrescentium copia sunt inæquales, ut propterea in vno pulsu sub vno digito percipiantur, & sub alijs non; in pluribus pulsibus quandoque percipiantur, quandoque non, ut dehinc vocentur myuri deficientes, quandoque reciprocantes, aliquando autem non.

Isti omnes pulsus futuram mortem minantur, omnium tamen periculosissimi sunt formicantes, his succedunt vermiculosi, si passio recte non tractetur.

Hoc aduertendum, vermiculosi sunt propter nimias euacuationes, nimix euacuationi succurrendum est cibo & potu: qui intermiserit hæc, aut loco istorum nouas excretiones excitauerit, illico patientem exstinguit.

A His succedunt myuri deficientes non reciproci, post quos sunt myuri deficientes, sed reciproci. Ceteri tamen omnes, siue rari, siue frequentes, futuram mortem prænuntiant.

De languidis ex suffocatione nihil dicam hoc loco: quia languidi omnes ex suffocatione, sunt etiam inæquales. Itaque de his agemus in capite de inæqualibus. Venio itaque ad pulsus paruos.

Parui pulsus, ut alias est dictum, ex triplici sunt causa contentina: Ex facultate debili, ex vsum minuto & ex instrumento renitente.

Quatenus sunt parui ex imbecillitate facultatis, omnes morbos atque omnia prænuntiant symptomata, de quibus iam dictum est.

B Quatenus autem sequuntur vsum imminutum & instrumenta renitentia, manifestabunt omnes causas, omnes morbos, qui & quas possunt refrigerationes, congelationes, siccitates, tensiones & compressiones efficere.

Idcirco quatenus sunt ex vsum imminuto, significant abundantiam humoris pituitosi aut melancholici naturalis: Sed pituitosus habet pulsum mollem, melancholicus durum: indicant intemperiem vel arteriarum, vel pulmonum, vel cerebri, vel ventriculi, iecoris & lienis, vteri atque totius corporis omnino frigidam.

Quatenus autem sequuntur (ut dixi) instrumentorum renitentiam, varias ostendunt affectiones: nam renitentia in motione arteriæ, aut fit ex vitijs arteriæ essentialibus, aut ex vitijs per consensum.

Vitia essentialia sunt congelatio, siccitas & tensio.

C Item quatenus paruos pulsus ostendit congelationem, significat abundantiam humoris vitrei.

Quatenus ostendit siccitatem, significat vel melancholiam, vel quartanam, vel marasmodum seu febrem marasmoden.

Quatenus sequitur tensionem, quia tensio fit & ex conuulsione & ex repletionem, ut sequitur conuulsionem, ostendit spasmodum, aut epilepsiam: ut sequitur repletionem, ostendit inflammationem vel scirrhum.

Quod si arteria difficulter moneatur per consensum, ostendit aut humorum multitudinem, qui in spatijs inanibus contineantur, aut humores comprimentes arterias.

Dicer quispiam, qua ratione distinguam paruum pulsum fieri potius ex hac, quam ex illa causa? Audiat modo. Si sequatur imbecillitatem, pulsus erit semper languidissimus: si sequatur vsum imminutum, erit semper tardus, & rarus, & mollis: si sequatur congelationem, cognoscitur abundantia pituitæ vitæ ex rigoribus vehementibus cum ingenti refrigeratione ex habitu & temperatura frigida, ex vita antea acta, fructibus & potioni frigida dedita.

Cognoscetur siccitas ex marasmo, ex pulsu paruo, tardissimo, rarissimo cum macie totius corporis.

Febres marasmodos, ex paruitate cum frequentia insigni & macie.

Quartana ex pulsu paruo, frequenti, moderate celeri, duro & valido.

Melancholia ex pulsu paruo, raro, raro, duro & valido.

Tensio

Tensio ex conuulsione, quia iam patientes actu A conuelluntur.

Tensio ex inflammatione, ex pulsu vibrato.

Tensio ex scirrbo, ex pulsu paruo, tardo, raro, duro, & aequali.

Denique cognosceretur, *pulsus esse paruus propter onus corporum incumbentium*, quia in tali casu pulsus nunquam est omnibus modis paruus. Paruitas enim, (vt alias explicauimus) tres continet dimensiones, longitudinem, latitudinem, & profunditatem. Quando arteria est exsiccata, vel congelata, vel repleta & tensa, pulsus omnibus modis est paruus; vbi autem ex corporibus circumpositis euadit paruus, paruitas solet fieri vno vel duobus tantum modis, singulis nequaquam. Ratio est in promptu, nam si humores vel tumores sint ad latera arteriae, pulsus sit angustus, erit tamen altus & longus: si sint in superiori arteriae parte, pulsus erit humilis, sed longus & latus. Sic itaque arteria ex vicinis corporibus impedita pulsus omnibus modis paruum non facit.

Cognoscitur autem corpora comprimentia esse tumores, si pulsus sit paruus, inaequalis, sed aequaliter.

Erit vero paruus ex humoribus, si sit paruus inaequalis, sed inaequaliter. Ratio est, nam tumores non mutant locum: humores autem vel beneficio naturae, vel medicamentorum saepe saepius mutant locum, vt propterea arteriae motus inaequalem inaequalitatem contineat.

Isti pulsus varia possunt praedicere pro varietate causarum, a quibus fiunt. Nam parui & languidi (vt diximus) mortem significant. Parui autem sine imbecillitate longas & difficiles significant affectiones, praecipue vero parui siue aequales siue inaequales aequaliter: nam isti omnes scirrthosos, ac permanentes indicant affectiones.

De magnis pulsibus ac celeribus nihil dicā plus, quam haecenus dictum sit de vehementibus: nam isti omnes ex causis praeter naturam febres significant tam Ephemeris, quam putridas & hecticas.

Neq; quis miretur, me dixisse, pulsus magnos, celeres & vehementes etiam febres hecticas significare, cum tamen docuerit Gal. & lib. 1. de differ. febr. cap. 9. & lib. 3. de praesag. expulsi. c. 3. febres hecticas habere pulsus paruos: nam febris hectica ex propria essentia pulsus habet vehementes, magnos & celeres, vt docuit idem Galen. lib. 3. de praesag. expulsi. cap. 6. in principio: sed si habent pulsus paruos & imbecilles, id contingit non ex febre, vt febris est, sed ex tabe, quae febri connectitur: & propterea febres hecticae in principio, quae sunt sine tabe, habent pulsus vehementes & magnos, & ideo difficilime cognoscuntur. Accedente tabe, pulsus fiunt parui & languidi.

Magnus pulsus (vt dicebam) nisi impediatur, omnes febres sequitur, Ephemeris, hecticas ac putridas.

Impeditur autem, vel ex imbecillitate facultatis, vel ex usu imminuto, vel ex renitentia instrumenti, vel ex pluribus causis simul coniunctis.

Ex imbecillitate, vt in febribus malignis ac periculosis: Ex usu imminuto, vt in quotidianis: Ex

duritie instrumenti, vt in quartanis: Ex pluribus simul, vt in hecticis, quae ad tabem perueniunt. In his omnibus pulsus sunt parui, non ex natura febris, vt febris est, sed ex causis iam declaratis.

Cum autem magni sint pulsus & in Ephemeris, & in putridis benignis, quae ex bile vel sanguine producuntur, distinguuntur putridae ab Ephemeris, quod putridae habeant in principio & augmento systolen celeriores & maiorem, quam diastolē: Ephemerarum autem pulsus habent semper vno & eodem modo aequales, quorum diastole superat magnitudinem & celeritatem systoles: putridae enim in statu & declinatione a seipsis differunt & dilationem maiorem ac celeriores habent, quam contractionem, cuius oppositum in principio & augmento fuerat.

Magni omnes pulsus in febribus futuram salutem praenuntiant: Etenim nunquam est magnus, quin etiam sit & vehemens & mollis. Vbi autem est vehemens, virtus constat: vbi mollis instrumenta bene se habent: Itaque semper bene sperandum.

Quod si contingat hunc pulsus circa tempus crisis apparere, futuram crisin praenuntiat, aut per fluxum sanguinis narium, si fuerit aequalis: aut per sudores, si fuerit inaequalis, quem vndosum vocat. Venio ad celerem.

Celer pulsus ipse quoque perpetuum est cuiuscunque febris argumentum, quinimo (vt alias dixi) ex sententia Galen. lib. 3. de praesag. expulsi. cap. 3. & 4. certius febris signum est celeritas, quam magnitudo aut frequentia. Quamobrem vero haec celeritas varias febrium differentias explicare possit, ex iam declaratis patet.

Nam celeritas cum vehementia, magnitudine, frequentia & aequalitate indicabit Ephemeris: cum inaequalitate, putridas benignas: cum imbecillitate, paruitate & duritie, tabidas: cum paruitate, duritie, robore & moderata frequentia, quartanas: cum ea ipsa duritie, insigni frequentia & vehementia, febres inflammationum: denique cum robore, paruitate & moderata frequentia ac mollitie, quotidianas.

Hi quoque pulsus, si morbo ad iudicationem eunte, celeriores fiant, praecipue in diastole, signum est bonae crisis futurae: nam si systoles celeritas augeatur, est malum signum: quia indicat, arterias tunc temporis fuligine repleti, crudam adhuc esse materiam, expultricem facultatem esse minus validam, quam vt possit noxiā materiam expellere.

Sed si celeritas diastoles augeatur, iam expurgatae sunt fuligines, concoctus est morbus, bona crisis & salus est expectanda.

De tardo pulsu nihil dicam, quia nihil plus significat tardus pulsus, quam imbecillis, vel paruus, de quibus iam dictum est, aut quam significet durus, de quo nunc singulatim dicam.

Etenim frequentem quoque & rarum praetermittam, tanquam illos, qui partim ex dictis, partim ex dicendis innotescunt.

Venio igitur ad durum pulsus, quem, cum supra dixerimus, in tractatu de paruis, significare congelationem, hecilitatem, conuulsionem, repletionem & compressionem, idcirco varias significat affectio-

Quid celer.

Tardus.

Quomodo febres hecticae habeant pulsus magnos et etiam paruos.

Signum pulsi quid significet.

affectiones,caussas,locosque affectos: Nam quatenus significat congelationem, indicat abundantiā humoris vitrei replentis arterias: vt significat siccitatem, indicat febres marasmodos, marasmodum senilem, febrem quartanam ac melancholiam: vt sequitur conuulsionem, ostendit vel Epilepsiam, vel *ῥίταρον* vel *ἰσθότοιν* vel *ὑπποθότοιν*. Quæ omnia, quomodo inter se distinguantur, dictum superius est: nunc autem fufius explicandæ sunt & causæ & loca, propter quas durus sit pulsus extensione vel compressione.

Durus. Pulsus igitur durus, si de locis affectis sit sermo, necessario indicat aut nervosam, aut membranofam, aut tendinosam, aut venosam & arteriosam substantiam affectam: Idcirco ostendit affectiones membranarum cerebri, thoracis, septi transversi, ventriculi, & intestinorum, iecoris, lienis, renum, vesicæ, omniumque articularum, propter tendones, qui in articulosas partes inseruntur.

Ex affectionibus indicat inflammationes & scirrhus, vel replentes arterias, vel saltem illas comprimentes: significat etiam humores varios, qui repleant vel comprimant absque inflammatione vel scirrhus.

Quæstio. Dicit aliquis, quomodo possum distinguere, vtrum pars laborans sit arteria vel vena, an potius sit membrana, vel nervus vel tendo? Distinguitur hæc, ex pulsus duri diuersitate.

Duri pulsus quidam sunt inæquales, qui vocantur serrati, alij sunt æquales, qui semper vno modo sunt duri in omnibus arteriæ partibus, qui aliquando absolute duri nuncupantur; aliquando autem vibrati. ¶ Vbi pulsus fuerit serratus, nunquam vena vel arteria est affecta, sed afficitur per compressionem: & quia compressio non est æqualis in omnibus arteriæ partibus, hinc vna pars est magis dura, altera minus dura, vt propterea sub varijs digitis pulsus ad similitudinem serræ inæqualis appareat.

Serratus.

Cognoscitur autem, partem affectam compressam esse nervosam, si conuulsio accesserit: erit membranosa, si conuulsio non adsit.

Est quoque aliud signum: pulsus duri, qui sequuntur affectus venarum vel arteriarum, semper sunt maiores, quam affectus membranarum comprimantium: nam melius extenditur ipsum vas, si spatia, per quæ mouetur, sint inania, quam si fuerint repleta & impedita: hæc est sententia Galeni. *lib. de puls. ad tyron. c. 11.*

Quæstio.

Dicit rursus quispiam, cum tot sint membranæ, tot partes nervosæ, tot tendinosæ, quomodo potero ex duro pulsū conijcere hanc potius laborare, quā aliam? Pro hac re multa sunt consideranda: primū comparandi sunt pulsus partis dextræ cum sinistra: nam qua parte pulsus est durior, in ea ipsa affectio nem consistere suspicandum est: sed præterea actiones læsas, qualitates mutatas, excrementaque partium inspicere oportet: nam affectis membranis cerebri subsequitur delirium: affecta pleura, dolor lateris: affecto septo, difficultas respirationis, conuulsio & delirium: affecto ore ventriculi, cardiaca, syncope, & sic de singulis. Sic itaque facile distinguitur locus affectus.

A Quantum ad affectiones: distinguitur inflammatio a scirrhus affectu ratione febris: nam in scirrhus febris non adest, quātum sit ratione scirrhi; propterea pulsus erūt duri, tardi ac rari; in inflammatione celeres ac frequentes.

Distinguitur autem inflammatio a ceteris causis, quæ sunt in febre, neque tamen faciunt inflammationem, ex maiori vel minori harum differentiarum excessu.

Nam pulsus vibratus inflammationem indicat, qui est durissimus, maximus & vehemens.

Qui vero fuerit minus durus, minus celer, minus frequens, minus inæqualis, ostendit ipse quoque repletionem vel compressionem, sed absque inflammatione.

B Hic ipse durus pulsus, qui inflammationem sic indicat, habet quoque gradus quosdam: nam potest esse durus in summo, potest esse mediocriter durus: qui in summo est talis, indicat inflammationem maximam, quæ cum virium robore ad suppurationem deueniet, & maxima cum difficultate: cum virium imbecillitate patientem necabit.

Qui vero est minus durus, minorem indicat inflammationem, idcirco, quæ vel facile suppurari, vel forte etiam digeri potest: hæc est doctrina Galeni. *lib. de puls. ad tyron. cap. 11.*

Molles pulsus ipsi quoque proprios habent, quos ostendant, locos, proprias itidem affectiones & causas.

Mollis.

Ex locis indicant cerebrum, pulmones, adenes, carnosam seu musculosam substantiam, quæ a tendonibus longe distat. Per pulmones vero non intelligo omnes pulmonis arterias, sed læues tantum. Etenim auctore Galeni. *lib. 4. de præfag. ex puls. ca. 1. aspera arteria affectiones ex pulsibus non deprehenduntur, sed tantum læuium.* Ex affectionibus significat omnium viscerum, ac denique internarum partium œdemata, cachexiam, leucoplegmatiam, quotidianam febrem, ac præterea lethargum & peripneumoniam.

C Sed de lethargo & peripneumonia aliqua est dubitatio. Quamquam enim Galeni. *lib. de puls. ad tyron. cap. 5. & 6.* pulsus lethargicorum & peripneumonicorum molles esse dixerit nihilominus, cum lethargus & peripneumonia sint inflammationes, quatenus inflammationes sunt, habent pulsū durum. Idcirco Galeni etiam quasi sibi ipsi non consentiens *lib. 4. de præfag. ex puls. cap. 1.* Ex pulmonis œdemate pulsū inquit fieri mollem, ex inflammatione, & scirrhus durum: similiter eodem in *lib. cap. 8.* inflammationes cerebri inquit pulsus haberi duos.

Dubium.

Pro hac contradictione tollenda, distinctio duri pulsus ex Galeno proposita est in memoria reuocanda.

Responsio.

Durus sit pulsus, vt alias omittam causas, aut a tensione, aut a siccitate. Pulsus lethargicorum & peripneumonicorum nunquam sunt duri ex siccitate, semper autem sunt duri ex tensione: quandoquidem non tantum carnea pulmonis substantia, aut cerebri corpus repletur, sed etiam membranæ, ad quarum repletionem sequitur tensio.

Sed hoc in loco aliud quoque occurrit dubium, nunquid

Aliud dubium.

nunquid solo ex pulsu molli possimus conijcere, aut iecur, aut thoracis partes œdemate tentari?

Nam ex vna parte scribit Gal. *lib. 4. de prasag. ex puls. cap. 3. & 4.* neque thoracem, neque iecur œdemate tentari. Non thoracem, quia tunica thoracis ob densitatem pituitosum succum non admittunt: non iecur quod cum sit fons sanguinis, pituitosum hunc succum potius concoquit, quam ut efficiat.

Ex altera tamen Hipp. cui etiam Gal. *lib. 1. prognost. tex. & com. 34.* in iecore tumorem admittit pituitosum indolentem, qui pressus digitis cedit. Et *lib. de constitut. art. med. cap. 15.* inquit Gal. aliquando in membrana costas succingente contineri tumorem absque febre, si fuerit vel scirrhus, vel œdema: ex quibus locis constat & iecur, & pleuram œdemate vexari.

*Solutio.
Oedema
duplex.*

Soluitur hæc contradictio per œdematis distinctionem: aliud est œdema pituitosum, aliud sanguineum. Gal. *in lib. 4. de prasag. ex puls.* dum negat in iecinore fieri œdema, loquitur de pituitoso: & propterea ipsemet vititur his verbis, iecur, non tentari œdemate pituitoso: non tamen ex hoc sequitur, quin partes propositæ spurio œdemate affligi possint: Est autem spurium sanguinolentum. Itaque molles pulsus, ut dixi, ostendunt has affectiones & locos.

Ostendunt præterea prouentum humoris pituitosi, sed dulcis: & ex symptomatibus ostendunt paralyfin, stuporem, torporem omnesque soporiferos affectus.

Locos affectos & affectiones propositas non est usque adeo difficile inter se distinguere. Quandoquidem loci habent proprias etiam actiones læsas, quemadmodum & affectiones.

Etenim ad affectus cerebri læduntur actiones animales: in affectibus pulmonum imminet suffocatio: affectus autem musculorum & glandularum ipsius oculis patent, sicuti etiam patent cachexiæ, leucophlegmatiæ, paralyfes, sopores, & aliam dicta.

Mollis pulsus, quanquam magnus aliquando videatur, est tamen æque periculosus atque durus ex Gal. *lib. 4. de prasag. cap. 5.* Ratio est, quia magnitudo non consequitur facultatis robor, sed insignem instrumenti molliem: ubi autem insignis est mollietas, insignis quoque est partium principalium intemperantia: Si tamen mollietas non sit in summo, minus malum est, talesque pulsus tempore coctionis apparentes futuram crisin per sudores prænuntiant. Sed iam transeo ad inæquales.

Quos locos affectos quas affectiones, quasque & causas & symptomata pulsus inæquales denotent, Cap. XIX.

Inæquales pulsus ipsi quoque locos ostendunt affectos, affectiones, causas & symptomata.

Quod pertinet ad locos, illos omnes ostendunt, qui vel multas, vel magnas, vel cordi propinquas obtinent arterias.

Loci.

Idcirco ostendunt affectiones vtriusque menyn-
gis cerebri pulmonum, sed ratione arteriarum le-

Auium, non asperarum, ut antea dixi; thoracis denique, ventriculi, iecoris, lienis, renum, vteri, vesicæ, partium genitalium & intestinorum.

Ostendunt præterea affectiones arteriosi generis in vniuersum corpus distributi, præcipue vero arteriarum cordi propin quarum, atque adeo ipsius cordis.

Quantum ad affectiones pertinet, ego cogor a Galeno recedere. Est sententia Galeni *in illo lib. 2. de prasag. ex puls. cap. 7. & 8.* quam repetit *lib. 3. de prasag. ex puls. cap. 4.* inæquales pulsus fieri aut ex compressionibus, vel repletionibus, vel obstructionibus arteriarum, aut ex inæquali cordis intemperie, quam inæqualem cordis intemperiem locis citatis inquit esse triplicem: aut enim est in solida cordis substantia, aut in ipsis arterijs, aut in humoribus, qui in sinibus cordis reperiuntur.

BInæqualitatem pulsus, quæ compressiones, repletiones & obstructiones arteriarum sequitur, ego lubens accipio.

Eam, quæ sit ex inæquali, aut cordis, aut arteriarum intemperie, ut ingenue dicam, non intelligo. Quinimo nec ipsum Gal. intellexisse puto. Ratio pulsus, inquit, *bis ferientes sequuntur inæqualem intemperiem, lib. 3. de prasag. ex puls. ca. 4.* Non possunt autem fieri pulsus bis ferientes, neque cognoscei absque facultate valida, tunc facio talem consequentiam: sed pulsus qui sequuntur inæqualem cordis intemperiem, sunt omnes parui & languidi: Ergo non sunt bis ferientes.

Quod sint omnes parui & languidi, probor ex eodem Galen. *lib. 2. de prasag. ex puls. cap. 4.* pulsus, qui sequuntur intemperaturam substantiæ solidæ cordis, sunt omnes languidi: nam cordis intemperantiæ destruunt facultatem. Secundo, *lib. 3. de prasag. ex puls. cap. 4.* inquit Galen. hos pulsus inæquales ex inæquali cordis intemperie esse heceticos, quia sequuntur febrem hecticam: sed pulsus heceticæ *ex lib. 1. de differ. febr. cap. 8. & 9.* sunt parui & languidi.

CDenique si admittamus inæquales pulsus in febribus heceticis, tot iam corrui Medicina: nam ex ipsomet Gal. *lib. de inæquali intemperie*, heceticæ febres in hoc a putridis distinguuntur, quod heceticæ sint æquales intemperies, putridæ sint inæquales.

DConcedamus igitur Galeno in heceticis pulsus fieri inæqualem ex intemperie cordis inæquali, tunc oritur manifesta inter Galenum & Galenum contradictio.

Neque etiam placet, inæqualem pulsus fieri ex inæquali intemperie arteriarum: nam hæc intemperies aut calida erit, aut frigida, aut humida, aut sicca: sic enim Galen. partim in *lib. 2. de prasag. ex puls. cap. 7.* partim *lib. 3. de prasag. ex puls. cap. 4.* scribit, ex inæquali arteriarum intemperie fieri pulsus inæqualem: tunc vero, quis nam est hic pulsus inæqualis? Respondet Galenus, est inæqualis in vnicui ictu, quia sub quibusdam digitis pulsus est maior, si in ea parte arteria sit calidior aut mollior, sub alijs est paruus, si in ea parte arteria sit frigidior aut durior.

Ego certe non possum hoc animo concipere, arteriam in tam minimis partibus hanc inæqualitatem ob-

tem obtinere, ut sub vno digito sit calida vel mollis, sub alio digito sit frigida vel dura: Potest quidem hoc contingere in maximis arteriarum partibus, ut in vno brachio arteriarum sint duriores, in alio sint molliores. Sed sub vnica manu arteriam & duram & mollem, aut frigidam & calidam esse, ratio non persuadet.

Reliquum igitur est, ut videamus, quas nam affectiones ostendant illi pulsus, qui sequuntur vsu immutatum aut facultatem vitalem grauata; aut denique instrumenta impedita. Sunt quoque inæquales pulsus, qui plures ex his causis simul connexas consequuntur, de quibus etiam dicam.

Pulsus inæquales ex vsu.

Primum autem videamus; quos nam locos affectiones, quas affectiones, quas causas & symptomata consequantur pulsus *inæquales ex vsu*.

Quod pertinet ad locos, possunt ostendere loci patientem esse aut ipsummet cor, aut humores in corde contentos vel partes cordi propinquas, ut arteriam magnam, pericardium, pulmones, partes omnes thoracis: aut etiam remotas, ut sunt relique corporis partes.

Ex affectionibus indicant febres potissimum putridas, & ex putridis omnium maxime compositas, epialas, lipyrias.

Ex causis ostendunt vno & eodem tempore abundare in humano corpore humores putridos & imputridos, calidos & frigidos.

Ex symptomatibus ostendunt rigorem, horrorem ac refrigerationem febrilem: hæc omnia indicantur a pulsibus inæqualibus, quatenus sequuntur vsu immutatum, aut quatenus sequuntur mutatum.

Quatenus sequuntur *facultatem mutatam*, indicant pariter locos, affectiones, causas & symptomata.

Ex locis ostendunt semper ipsum cor essentialiter læsum, siue primario, siue secundario, sed ex parte aut cordi propinqua, quales sunt iam dictæ: aut cordi maxime consentiente, ut est os ventriculi, iecur, cerebrum, & uterus.

Ex affectionibus indicant febres omnes pestilentes, ac suppurationes inflammationum partium principalium, præcipue vero thoracis.

Ex causis indicant omnem causam veneficam occulta & deleteria qualitate agentem.

Ex symptomatibus significant palpitationem cordis, lipothymiam, syncopen tam primariam, quam eam, quæ fit vel ex ore ventriculi, vel ex utero, propterea præfocationem uteri vocatam.

Denique quatenus sequuntur *instrumenta impedita*, ostendunt pariter locos affectiones, causas & symptomata.

Ex locis ostendunt arterias vel cordi proximas, vel medias, vel remotiores essentialiter affectas.

Ex affectionibus indicant primo omnes inflammationes, idcirco phrenitis, lethargum, anginam, peripneumoniam, pleuritidem, atque alias similes: indicant scirrhus, abscessus: indicant denique obstructions ipsarum arteriarum.

Ex causis significant omnem humorum redundantiam siue sanguinis, siue alterius humoris, siue putridi, siue imputridi, siue maligni, siue benigni.

A *Ex symptomatibus* indicant apoplexiam, epilepsiam, conuulsiones, dispnæas, orthopnæas, nauseas, vomitiones, cardialgiam, anxietates ventriculi, doloresque omnes.

Quidam tamen, ut dicebam, sunt etiam inæquales pulsus, qui plura horum significant, quales sunt illi, qui ostendunt perniciosas & pestilentes inflammationes, siue suppurantes, siue non suppurantes.

De ratione distinguendi pulsus inæquales falsos ex vsu immutato ab ijs, qui ob facultatem vitalem grauata & instrumenta impedita tales existunt, Caput. XX.

Hæc omnia cum ex inæqualibus pulsibus colligantur, operæ pretium me facturum existimo, si artem aliquam tradam singula iam proposita ex ipsis inæqualibus pulsibus distinguendi.

Primum quidem distinguere oportet inæqualem pulsus, qui sequitur affectiones, causas & symptomata immutantia vsu a reliquis duabus causis.

Cognoscitur itaque, inæqualitatem fieri potius ex vsu, quam ex facultate, si pulsus sint inæquales secundum magnitudinem, celeritatem & frequentiam, non tamen secundum imbecillitatem vel vehementiam: sunt omnes vehementes, qui sequuntur vsu, sed inæqualitas est tantum in magnitudine, celeritate & frequentia.

C Præterea est alius etiam modus: qui sequuntur vsu, non autem facultatem, etiam si inæquales, habent plures pulsationes, magnas & celeres, quæ paruas & tardas.

Distinguuntur autem isti ab inæqualibus ex instrumentis, eo, quod isti nullam habeant duritiem, inæquales ex instrumentis omnes sunt duri: hac ratione distinguuntur pulsus inæquales ex vsu ab alijs duabus causis simplicibus: sed quia, ut diximus, inæquales ex vsu indicant humores peccantes quâdoque esse in corde, aliquando in partibus proximis, nonnunquam in remotis, ratio distinguendi hos locos ex pulsibus talis est.

Si materia, quæ inæqualem obtinet intemperaturam, fuerit in sinibus cordis, pulsus sunt inæquales in vnico ictu, & sub vnico digito, principium dilationis est maius aut celerius sine, vel opposito modo: nam si præualeant humores calidiores, principium diastoles est maius & celerius sine: si præualeant frigidiores, opposito modo res habet.

Quod si materia inæqualis, frigida & calida simul fuerit in partibus cordi proximis, pulmonibus, pericardio, &c. pulsus sunt inæquales in pluribus ictibus, ita tamen, ut plures sint pulsationes daræ & tardæ, quam magnæ & celeres.

Quod si materia sit in arterijs medijs, medio modo se res habet: si in arterijs distantibus & parvis, pulsus in pluribus pulsationibus seruant equalitatem, in paucis vero inæqualitatem, sic igitur distinguuntur locus materiæ peccantis ex pulsu inæqualis.

Quod pertinet ad *affectiones*, non est difficile, vnam-

vnamquamquam affectionem etiam absque pulsibus cognoscere: habeat enim hemitritæ, siue febres compositæ, habent epialæ, habent lipyriæ propria signa, quibus dignoscantur.

Idipsum dico de humoribus, & symptomatis: nam humorum varietas cognoscitur ex excrementis, ex actionibus & qualitatibus mutatis: rigor, horror & refrigeratio febrilis ipsa quoque tactu & oculis deprehenduntur: idcirco inæquales pulsus, qui sequuntur has causas, symptomata & affectiones, facile possunt ab omnibus deprehendi.

Vnum tantum dico de pulsibus inæqualibus, quatenus febres putridas demonstrant, inæquales pulsus duplici potissimum modo considerantur; aut collatione facta inter diastolen & systolen: vel collatione facta inter plures diastoles, vel in vna diastole habita ratione variarum partium.

Si conferamus systolen cum diastole, & pulsus systoles sit celerior aut maior, pulsu diastoles, est indicium febris putridæ.

Ceteræ inæqualitates, ut dixi, magnitudinis & paruitatis, celeritatis & tarditatis absque imbecillitate, & absque duritie indicant variam humorum temperiem calidam & frigidam, quæ reperitur, ut dixi, in compositis febribus, in epialis, in lipyrijs, in rigore, horrore, & refrigeratione febrili.

Cum vsus vario mutetur modo in putridis omnibus, in compositis, in epialis & lipyrijs, in varia humorum natura, & in rigore, horrore, & refrigeratione febrium, docui modum distinguendi hæc singula ex pulsibus inæqualibus: nam pulsus, qui in principio & incremento febrium habet systolen quam diastolen celeriore, in statu ac declinatione habent diastolen systole celeriore, tales febres indicant putridam.

Qui vero vno & eodem febris tempore modo mutantur ad magnitudinem, celeritatem & frequentiam, modo vicissim ad oppositas differetias, hi sunt, qui compositas, epialas lipyriasque febres, alias denique commixtas causas & febrilia symptomata iam relata demonstrant.

Contradi-
ctio.

Quibus sic explicatis, contradictio insignis occurrat. Nam Gal. lib. 2. de prasag. ex puls. cap. 7. apertissimis verbis declarat, hunc tam varium vsus ex varia humorum natura prodeuntem, & a me diligentius explicatum, inæquales pulsus iam a me propositos facere, lib. autem 2. de caus. puls. cap. 1. aperte inquit, nullam fieri pulsus inæqualitatem ex vsu immutato, eo, quod fieri non possit, ut vno & eodem tempore calor & frigus abundet. ¶ Apud me cum contradictio sit insolubilis, reliquum est, ut videamus, cui nam loco magis credendum sit: Mihi vero & ratio & experientia propria persuadet, magis credendum esse cap. 7. lib. 2. de prasag. ex puls. ubi inæqualitas ex vsu conceditur: ratio quidem id persuadet: nam datur inæqualis intemperies humorum vno & eodem tempore cor ipsum, infestatum: Ergo dabitur etiam inæqualis pulsus. Consequentia est clara: nam ex humore calido afficietur cor, pulsus erit magnus celer: ex frigido parvus tardus: Antecedens autem probatur Gale. auctoritate in libel. de inæqual. intemp. qui scribit in epialis, in lipyrijs, in rigore & horrore adesse inæ-

A qualem humorum intemperiem: febres etiam hemitritæ habet humorem biliosum & pituitosum, qui in seiunctis locis putrescunt, & varia intemperie cor ipsum afficiunt.

Idcirco quotidiana docet experientia pulsus harum febrium cum iam ex principio ad incrementum transcentes videantur fieri maiores, & celeriores, momento temporis iterum ad paruitatem & tarditatem redire, idque aliquando vnico die tertio & quarto, quasi plures fiat superexacerbationes, id quod contingit ex varia humorum natura. Idque concludendum ex vsu mutato, immutari etiam pulsus æqualitatem.

De inæqualitate pulsuum ob facultatem imbecillam, quomodo hæc sit distinguenda ab ijs, quæ ab vsu sunt & instrumento. Cap. XXI.

B Ceterum quando mutantur pulsus ad inæqualitatem ob facultatem imbecillam, sed a causis etiam noxijs oppressam, quædam sint inæqualitates ita propriæ, ut possint separari & ab illis, quæ sequuntur vsus, & ab illis quæ sequuntur instrumenta impedita: Etenim isti omnes sunt languidi; Et quatenus tales distinguuntur a pulsibus inæqualibus ex vsu, quos diximus esse validos. Sunt præterea molles vel saltem non duri, in quo distinguuntur ab inæqualibus ex instrumentis: In hac classe sunt omnes myuri sed decurtati tam in vno, quam in pluribus ictibus, sunt eminuli & prominuli, sunt intercepti, sed non in vnico ictu, quia nullus pulsus languidus, qui consequenter est parvus, potest habere inæqualitatem in vnico ictu. Ratio est in præterea: quia vel intercipitur pulsatio, vel non intercipitur. ¶ Si intercipiatur, & postea iterum redeat, est signum facultatis validæ, quæ aggravata resurgit tamen ad perficiendum motum. ¶ Si vero non sit interceptus, at saltem inæqualis pulsus in vnico ictu non interceptus, debet esse magnus. Etenim non potest deprehendi diuersitas principij diastoles a suo fine, nisi in pulsu magno: pulsus autem omnes facultatis fatiscantis, seu languidæ sunt imbecilles & parui: idcirco non possunt esse in vno ictu inæquales: sunt itaque inæquales & intercepti inæqualitate systematica seu collectiua.

Sed quia interceptio pulsuum collectiua potest esse, aut in senibus & pueris aut in adultis, quæ est in senibus & pueris, si non excedat spatium vnus vel duarum pulsationum, non pertinet ad imbecillitatem facultatis, sed potius ad instrumenta: Quæ vero excedit tempus duarum pulsationum, ostendit facultatem laborantem. In iunioribus autem, etiam si Gal. lib. 3. de caus. puls. ca. 4. arbitratus fuerit, intermissionem vnus diastoles esse lethaliissimum pulsus; & neminem vnquam fuisse seruatum, & propterea videatur hic quoque pertinere ad facultatem vitalem laborantem.

Ego tamen propria experientia me confirmasse profiteor, intermissionem vnus diastoles in iunioribus non esse vsque adeo lethalem. Neque est quod quispiam Galeni rationem contra me obiciat, illos scilicet pulsus non fuisse interceptos, sed potius raros: nam hic error facile posset cadere, quædo om-

nes pulsus essent æque rari: sed, si pulsus sint frequentissimi, & tamen aliquando non percipiuntur, hoc non pertinet ad raritatem, sed ad interceptionem.

Casum similem proxime habuimus in perillustri quodam equite, cuius pulsus intermittebat distolen, forte etiam duplicem, tamen Dei beneficio est seruatus. Hi itaque pulsus pertinent ad facultatem imbecillam, sed a causis etiam noxijs onustam.

Quia vero noxiæ causæ sunt & febris pestilens, & venenum, & palpitatio, lipothymia & syncope, sic distinguuntur hæc inter se, quod febris pestilens habebit pulsus myuros, interceptos, eminulos ac prominulos: venenum absque febre habebit pulsus tardissimos, parvissimos ac rarissimos, sed cum aliqua inæqualitate: reliqua symptomata præterquam quod habent proprias notas, cognoscuntur etiam ex pulsibus formicantibus.

Locus autem affectus in febre pestifera cognoscitur esse ipsummet cor, si pulsus sint decurtati seu myuri in vno tantum ictu: & si coniugatur vel palpitatio, vel syncope, cognoscitur esse in arterijs magnis, vel pulmonibus, vel alia parte nobili, si pulsus sint eminuli vel prominuli, deficientes in pluribus ictibus, siue myuri, siue intercepti vocati.

Distabit autem materia pestilens a corde, quando pulsus fuerint languidi, sed inæquales tantum, secundum magnitudinem vel paruitatem, celeritatem & tarditatem, sed absque intermissione & deficientia.

De pulsibus inæqualibus factis ex instrumentis impeditis, ab usu & facultate districtis.

Caput. XXXI.

Inæquales pulsus ex instrumentis ad differentiam inæqualium ex usu, ex duritie & mollitie potissimum distinguuntur: ad differentiam vero inæqualium, ex facultate languida & oppressa ex robore, quod adhuc retinet.

Habent autem isti varias differentias, ex quibus varij etiam affectus significantur. Sunt enim inæquales in vno ictu sub vnico digito, siue intercepti, quos vocant caprizantes, siue non intercepti.

Sunt inæquales in vno ictu sub varijs digitis, vt serrati, vndosi, quidam eminuli & prominuli: & inæquales ex varia arteriæ situatione.

Sunt præterea inæquales in pluribus ictibus vibrati, conuulsui, intercepti, intercurrentes.

Denique inæquales secundum vehementiam & imbecillitatem, magnitudinem & paruitatem, celeritatem & tarditatem, frequentiam & raritatem.

Cum igitur isti omnes significant arterias ipsas vel comprimari a corporibus incumbenibus, vel repleti in propria substantia, siue in proprijs tunicis, siue in cavitatibus: cum præterea corpora hæc vel incumbenibus vel tendentibus & replentibus sint aut cum tumore aut citra tumorem: & si cum tumore, vel cum calido, vel cum frigido, reliquum est, vt videatis, quam ratione ex propositis pulsibus tumores in genere & in specie a simplici arteria distinguantur.

Aur, quomodo etiam locus tumoris vel materia deprehendi possit.

Primum autem illud erit perpetuæ veritatis, *pulsus inæquales aequaliter semper tumores significare, inæquales inæqualiter materiam absque tumore*. Ratio est in promptu; nam æqualitas in inæqualitate significat causam permanentem semper eodem modo se habentem, talis est tumor. Inæqualis autem inæqualitas indicat causam mobilem & vagam, quæ huc atque illuc mouetur: idcirco talis inæqualitas est absque tumore.

Est autem inæqualis pulsus æqualiter ille, qui, gratia exempli, post singulas tres vel quatuor pulsationes vnâ intermittit, aut post quatuor magnas vnâ habet paruam, id, vbi contingerit absque alia mutatione, pulsus est quidem inæqualis, quia interceptus, sed æqualiter, quia interceptio seruat se per vnum & eundem modum.

Inæqualis autem inæqualiter opposito modo se habet, sic igitur ex pulsibus inæqualibus cognoscitur materia abundans, vel cum tumore, vel citra tumorem.

Sed si tumor sit extra corpus arteriæ, & potius illam comprimat quam vt repleat, erit inæqualis in duritie, qualis vocatur serratus; neque enim sub omnibus digitis durities æqualiter deprehenditur, sed tantum in quibusdam in modum serræ, hos etiam tumores consequuntur pulsus intercepti, sicut illos, qui replent corpus arteriæ, consequuntur pulsus vibrati & inæquales ratione sinus arteriæ: nam vt docuit Gale. lib. 2. de caus. puls. cap. 11. vbi arteria repletur, necessario in ea parte extenditur, in alijs vero contrahitur. Contrahitur autem in eam partem, ad quam tumor inclinat, hinc distrahitur quandoque a proprio loco, sit magis dextra, vel magis sinistra, propterea hic pulsus arteriæ repletionem indicat.

Conuulsus, etiam si ad nervos & nervosas partes pertinere videatur, nihilominus ipse quoque arteriarum tunicas repletas consequitur: nam his repletis nervosum genus in consensum trahitur, partim quod nervorum propaggines arterijs sint insitæ, partim etiam, quod omnium vnus sit confluxus, vna conspiratio, vt docuit Hipp. lib. de alim. Et confirmavit Gal. lib. 2. de caus. puls. cap. 12.

Tumor autem calidus cognoscitur ex pulsu vibrato: scythosus ex duro & paruo: œdematosus ex paruo & molli, cum inæqualitate tamen.

DObstructiones, si sint iam confirmatæ & indurate in præcipuis visceribus cum caliditate vehementi, faciunt pulsus intercurrentes. nam, cum propter obstructions calor naturalis per omnes arterias libere diffusi non possit, in cor retrocedit, augetur usus, aucto usu fit pulsus intercurrentis, qui est inordinate frequens: fit autem talis propter auctam caliditatem. Quod si minor sit caliditas, sunt inæquales secundum magnitudinem & paruitatem, celeritatem & tarditatem, frequentiam & raritatem, seruata tamen æqualitate. Hæc doctrina aliqua ex parte desumi potest ex Gale. lib. 1. de art. cur. ad Glanc. cap. 14.

Pulsus autem, vt dixi, inæquales inæqualiter indicant abundantiam materię. Sed quia materia abundans

Pulsus inæqualiter aequaliter.

Inæqualiter aequaliter.

Conuulsus.

C abundans

abundans ipsa quoque aut est in spacijs inanibus, A
ita ut comprimat arterias aut est in ipsamet tunica
substantia, aut continetur in cavitare, cognoscitur
materiam contineri in ipsamet tunica substantia
ex maiori duritie aut mollitie pro materiz peccan-
tis diuersitate nam ex pituitosa materia fiunt vndo-
si pulsus: ex biliosa & melancholica fiunt duriores.

Aderit praeterea aliud signum: si materia in tu-
nicis contineatur, pulsus sunt inaequales inaequali-
ter, sed ordinate.

Vbi fuerit vel extra tunicas, vel in cavitare, pul-
sus erunt inaequales inaequaliter & inordinate. Ex-
plo declaro, quid velim per hos pulsus.

Pulsus inae-
qualis inae-
qualiter or-
dinatus.
Est pulsus inaequalis inaequaliter, sed ordinatus,
qui, exempli gratia, primum post tres pulsationes
vnam intermittit, postea post quinque pulsationes
vnam intermittit, deinde post septem, tum post no-
uem, mox iterum reuertitur ad primas, & sic vi-
cissim.

Inaequales
inqualiter
inordinatus
Inaequales autem inaequaliter & inordinati illi
sunt, qui, exempli gratia, intermittunt modo post
duas, modo post vnam, modo post quinque, nullo
denique ordine: isti igitur inordinati significat ma-
teriam vel in spacijs inanibus, vel in cavitare contē-
tam. Ratio est in promptu, quia & citius & prom-
tius in omnes partes mouetur, quam faciat illa, quae
tunicis est imbibita: dum autem mouetur prope-
cor, facit pulsus inaequales vno modo, dum propel-
litur, facit inaequales alio modo. Quae vero est im-
bibita, cum non facile huc atque illuc moveatur,
inaequalitatem obtinet ordinatam.

Inter hos pulsus sunt *Eminuli & preminuli*, qui
in principijs accessionum tantum apparent, quan-
do sequuntur potius vitia instrumenti, quam im-
becillitatem facultatis: diximus enim hos pulsus
perpetuo sic se habentes consequi languidam facul-
tatem a noxijs causis oppressam: sed in principijs
accessionum, dummodo rigor, horror, refrigeratio,
denique ventriculi anxietas accedat, ex instrumen-
tis oppressis fieri solet.

Pulsus itaque inaequales, qui omnes simul con-
nexas causas consequuntur, vsum auctum, languidam
facultatem & instrumenta oppressa, sunt di-
croti & quidam hectici vocati.

Hectici pul-
sus duplex si-
gnificatio.
Dico quidam hectici vocati, quia hecticus pul-
sus in duplici accipitur significatione: Prima signi-
ficatio est illius, qui consequitur febrem ipsam hec-
ticam, talis est paruus, celer & frequens, de hoc in
praesentia non est sermo: alius est pulsus hecticus,
qui duas habet condiciones, prima, ut vel sit omni-
no languidus & paruus cum inaequalitate tamē, vel
saltem habeat plures pulsationes, languidas & par-
uas, quam magnas & validas: secunda conditio est,
ut haec inaequalitas sit stabilis, ordinata, vniformis,
quae propterea Galen. lib. 6. de praesag. ex puls. ca. 4.
hectica vocatur.

Cum igitur hi pulsus consequantur vsum auctum,
facultatem languidam, & instrumenta oppressa,
superest, ut videamus, in quibus nam morbis haec
contingant.

De pulsu dicroto & hectico, quas uterque affec-
tiones, locos affectos & causas significet.
Caput XXXIII.

E xplicabo in praesentia quales nam affectiones
dicroti pulsus & hectici demonstrent & qua-
lia ex inaequalibus pulsus desumantur praesagia.

Dicrotus igitur pulsus cum duplex sit, durus ex
lib. 2. de praesag. ex puls. cap. 8. Qui durus est, mali-
gnas ostendit partium principalium inflammatio-
nes, in quibus scilicet tres causae concurrunt: calor
insignis, qui auget vsum: facultas inualida ex ma-
lignitate: instrumentorum angustia ex inflamma-
tione: in talibus casibus facultas pulvisca vnica
integra diastole vsui non potest satisfacere, propte-
rea cogitur secundam & tertiam diastolen repe-
tere.

Si quispiam quærat, numquid possit etiam in
his casibus augeri vsum expurgandi fulgines, ut
propterea cogatur natura duas & tres systoles
absque sensibili diastole efficere? dicam sane id
posse fieri, & experientia me obseruasse, in his pul-
sibus dicrotis factum esse aliquando pulsuum in-
termiſſionem, quo tempore arbitror, naturam in-
cubuisse reiteratis motibus systoles, hic igitur pul-
sus malignas pleuritides, peripneumonias, orthop-
noas atque alias consimiles affectiones ostendit, de
quibus meminit Gal. lib. 2. de praesag. ex puls. cap. 4.

Pulsus autem dicrotus seu bis feriens non durus
ex inaequali humorum intemperie proficiscitur, id-
circo ostendit copiam humoris calidi simul & fri-
gidi abundantis, vel in ventriculis cordis, vel in par-
tibus propinquis pericardio scil. & arterijs. ¶ Di-
stinguitur autem hic pulsus a priore, ex duritie tā-
rum: quia vero ex dicrotis non duris quidam (ut
dixi) sequuntur copiam humorum in ventriculis
cordis contentorum, alij vero sequuntur humores
in partibus propinquis cognoscitur humores inter
se contrarios in sinibus cordis contineri ex pulsu bis
feriente cum palpitatione cordis.

Quod si fuerint in locis vicinis, erit bis feriens
absque palpitatione: hoc colligi potest ex Gale. lib.
3. de praesag. ex puls. cap. 4.

Hectici autem pulsus duplicem habent signifi-
cationem: nam quidam dicuntur hectici, quia sta-
biles tantum: quidam vero dicuntur, qui & stabili-
les, & parui, & languidi: inaequales pulsus hectici,
non parui, neque languidi, significant affectiones
corporis induratas, ut sunt tumores omnes: Propte-
rea dicebat Galen. lib. de puls. ad tyron. pulsum hec-
ticum consequi inflammationes suppurantes: po-
test consequi etiam scirrhus, tumores duros & pul-
monum & pericardij. Qui vero est paruus &
languidus, ostendit phthisin, suppurationem, &
denique omnes febres hecticas, quae ortum du-
cunt ex abscessu, suppuratione, aut membri solidi
putrilagine.

De futurorum ex pulsibus inaequalibus
praesagij. Cap. XXIV.Longitudo
morbi.

Inaequales pulsus praedicere solent vitam & mortem, longitudinem & breuitatem, tempus & modum salutis & mortis.

Quod pertinet ad longitudinem, omnes pulsus inaequales aequaliter & ordinati, magni, vehementes, non multum celeres, nec frequentes, longam significant affectionem. Id ipsum faciunt inaequales secundum magnitudinem ac paruitatem, secundum vehementiam & imbecillitatem, quanquam fuerint inordinati, dummodo non sint admodum celeres, nec frequentes.

Breuitas.

Contra vero pulsus inaequales, inordinati, celerissimi, frequentissimi, breuitatem affectionum pollicentur. Quod pertinet ad salutem vel mortem, omnes pulsus inaequales, in quibus plures appareant pulsationes, magnae & vehementes, quam paruae & imbecillae, sanitatem pollicentur; oppositi autem mortem.

Sanitas.

Mors.

Ceterum ex his, quae mortem significant, omnium deterrimi sunt inaequales cum insigni imbecillitate, paruitate, tarditate, & raritate, formiculosi, & vermiculosi, post illos sunt decurtati in vno pulsu, emiculi & prominuli, hos sequuntur dictoti & decurtati in pluribus pulsationibus.

Dubium de
intermissionibus.

De intermittentibus est dubitatio, num deteriores sint intermittentes in vno ictu, quos vocant caprizantes, an in pluribus, quos interceptos vocant? Est ratio pro utraque parte: nam caprizantem pulsus esse deteriorem intercepto probauit. Gale. lib. 2. de caus. puls. eo quod minus malum sit, naturam desistere a motu in pluribus pulsationibus, quam non posse vnicam perficere.

Ex alia parte certum est, pulsus caprizantem, necessario & magnum & vehementem esse: Est magnus, quia nihil paruum potest in duas sensibiles partes diuidi: Est vehemens, quia etiam si natura grauetur, est tamen ita valida, ut possit interceptum motum absolueret, & ita absolueret, ut finis motionis sit fortior principio.

Itaque in hac difficultate censeo, pulsus interceptum esse deteriorem caprizante, praecipue vero in iuuenibus, quanquam sententiam Gal. 2. de praesag. ex puls. ca. 4. non accipiam, qui vult, ex iuuenibus nullum seruari, cui pulsus fuerit interceptus: nam experientia aliter me docuit.

Salutis mor-
dus.

Quod ad salutis modum pertinet, omnes pulsus inaequales, vehementes, magni, celeres & frequentes necessario ostendunt finem morbi futurum per crisin: imbecilliores, minores, tardiores & rariores indicant finem futurum per paulatinam solutionem.

Rursum ex illis, qui crisin ostendunt, omnium celerissimi & frequentissimi, ostendunt crisin per effluxum, vel vomitum, vel deiectionem, vel sudores, vel urinas, vel fluxum sanguinis. Qui vero cum inaequalitates, minorem habent frequentiam & celeritatem, indicantur potius per abscessum seu decubitus, vel parotides, vel alios tumores.

Ostendunt praeterea & pulsus tempus crisis:

A nam ubi pulsus in principio inaequalis iam incipiat fieri aequalis, & vehementior & maior, & diastole sit quam systole celerior, argumentum est crisis proximae. Quod si iam systole post huiusmodi pulsus videatur fieri celerior, crisis non tantum est proxima, sed est in foribus, iam necessario incipit. Ratio est in promptu: ante crisin diastole sit celerior, quia concoctis humoribus iam expurgatae sunt fuligines, ideo expurgandi usus est diminutus, propterea systole non est amplius celeris: Sed ubi incipit crisis, arteriae ipsae contrahuntur, non ut expellant fuligines, sed ut expellant humores iam concoctos.

Idcirco & contractio, quae fit tempore motus critici, non sit a facultate pulsfica, sed a facultate expultrice, quae est naturalis corporis partibus insita.

Contractio autem, quae fit ante coctionem ad expurgandas tantum fuligines, illa omnino fit a facultate pulsfica.

Non ignoro quidem ea, quae modo sunt dicta, ex Galeni sententia libro quarto de praesag. ex puls. cap. ultim. aliquas continere difficultates. Nam si tempore crisis contrahitur arteria: Ergo in crisi pulsus parui & angusti fierent, cum tamen libr. 3. de cris. ultim. in sudore & fluxu sanguinis fiant magni & alti.

Praeterea, si fieret haec contractio, ideo fieret, ut expelleretur id, quod in arterijs continetur: at vero non omnis materia noxia in arterijs & venis continetur: sed quandoque in magnis cavitatibus ventriculi & instrumentorum, ut propterea, sicut dictum est, Galeni sententia non careat difficultate, nihilominus in his tempus non conterentes dicamus, contractionem hanc, siue fiat, siue non fiat, parum utilitatis adferre posse: & ideo ad id, quod est maioris momenti, & ad Medicum pertinet, tractemus.

Sunt autem pulsus quidam praeter naturam sanis admodum similes, qui etiam aequales nuncupantur, & Medicos facillime decipiunt: de his dicendum, quales sint, quomodo fiant, & quid praenuntient.

Pulsus praeter naturam
sanis admodum
similes.

Primum quidem, ut in istis exerceri possis, scito nullum expulsius, qui habeat omnes conditiones sanorum, esse praeter naturam: Itaque isti, qui sunt praeter naturam, sed similes sanis videntur, in hoc saltem a sanis differunt, quod imbecillitatem continent, quandoque etiam paruitatem, neque rhythmum seruant: nam, cum necessario sint febriles, aut systolen habent celeriore quam diastolen, aut contra: Sed quia neque sunt frequentes & moderate celeres, neque in magnitudine, celeritate & frequentia systematica seu collectiua vocata inaequales apparent, hinc sanis similes existimantur, cum tamen perniciosi existant.

Isti igitur omnes fiunt, ut docuit Galen. lib. 3. de praesag. ex puls. cap. 3. & 4. ex inaequali intemperie solidae cordis substantiae cum propinquis humoribus vel spiritibus.

Etenim ubi tantum possit vnus frigiditas, quantum alterius caliditas, medium quoddam exsurgit temperato simile, quod sanum existimatur.

I hoc autem trifariam diuiditur: quādoquidem ubi datur hæc inæqualis intemperies inter continentia & contenta, aut est æqualis in gradu, aut inæqualis: si sit æqualis in gradu, ut tanta sit vnius frigiditas, quanta alterius caliditas, pulsus resultat in omnibus moderatus: Quod si gradus caliditatis solidæ substantiæ sit superior gradu frigiditatis contentorum, pulsus magnitudine & frequentia erit moderatus, sed celerior: Quod si gradus caliditatis contentorum superet gradum frigiditatis continentium, pulsus erit maior, quam celerior aut frequentior. Quæ differentia proprias explicat affectiones.

Primum autem, ut scias, quasnam significant affectiones, diligenter est explorandum, an pulsus diastole sit celerior, quam systole, an contra: nam si fuerit celerior, & pulsus in magnitudine & frequentia sanis similis videatur, si tamen aliquanto celerior, talis pulsus febrem hecticam pestilentem significat: *hecticam* significat, quia est celerior, quam maior, & *celeritas, quæ superat magnitudinem*, ex lib. 3. de præsa. ex puls. c. 4. indicat caliditatem in solida cordis substantia: significat autem hecticam, pestilentem, quia nemo potest animo concipere febrem hecticam, in qua humores vel spiritus vicini sint frigidi, nisi hectica sit pestilens: Ratio est in promptu: nam, si non sit pestilens, temporis diuturnitate calefacit spiritus & humores propinquos: hos autem habet frigidos: Ergo oportet, ut facta sit temporis momento sine incalescentia vicinarum partium præter pestilentem. Hoc colligitur apertissimis verbis ex Gal. lib. 3. de præsa. ex puls. cap. 3. & 4.

Et hæc sunt illæ febres, quæ Medicis imponunt, quæ tardos aliquando illos apud omnes efficiunt, qui pronuntiant in ægris proxime morituros nihil mali esse.

Cognoscuntur autem istæ non tantum, quod pulsus sint celeriores, sed etiam, quod sint languidi & parui: in frequentia tamen non recedunt a naturali statu.

Quod si pulsus sint maiores quā celeriores, aut sunt languidi, aut robusti. Si sint languidi & dia-

A stole superet systolen, indicant Ephemeram pestilentem, in qua tamen solida cordis tanto sunt frigidiora, quanto spiritus sunt calidiores, id ipsum contingit in pulsu moderato, quod potest contingere, & in hectica pestilenti, & in Ephemera pestilenti, ubi languor virium sit connexus.

Vbi autem pulsus fuerit maior quam celerior, ita tamen, ut systole superet diastolen, hoc est indicium febris putridæ: cui, si coniungatur virium insignis imbecillitas, argumentum est putridæ pestilentis. Talis est natura pulsuum, qui vel sanis similes, vel moderati, vel æquales nuncupantur.

Ex quo discursu, qui Galenius est lib. 3. de præsa. *Paradoxo.*

sag. ex puls. cap. 4. & 5. duo, quæ paradoxa videntur, colligi possunt: primum est, dari febrem hecticam, quæ erit inæqualis intemperies: nam si solida sint calida, vicina sunt frigida, est inæqualis intemperies. Secundum paradoxon, dari febrem Ephemeram & putridam, in qua solida cordis substantia, neque sit in calefacto esse, neque in calefieri.

Nam si moderatus pulsus in omnibus ille est, in quo tantus est gradus frigiditatis in partibus solidis, quantus est caliditatis in humoribus, sequitur ex hoc, in putridis febribus cum pulsuum æqualitate solida non modo non esse calida, sed etiam tanto frigidiora, quanto humores sint calidiores. Si alicui hæc minus placeant, Galen. corrigat, cuius est doctrina loco citato.

Isti omnes pulsus, qui sanis similes videntur, ubi imbecillitatem & paruitatem habent connexam, semper sunt suspecti, vitæ periculum præsentaneum minantur, sicut ego ipsa experientia pluries obseruavi: Ex pestilentissimos etenim & malignissimos febribus sunt oriundi.

Itaque huic tractationi de pulsibus finem faciens, hoc tantum moneo, hoc persuadeo, ut, cum istos pulsus paruos & languidos inuenietis, etiam si faciei color sit optimus, urinae optimæ, calor febrilis nullus appareat, patientes mente consent, dicant, se non laborare, cautus tamen sis, ne decipiaris: Quādoquidem, ut dixi, mors est in propinquo. Et hæc de pulsibus dixisse sufficiat.

FINIS LIBRI QVINTI.



OPERVUM HERCVL. SAXONIÆ

Professoris Medici Patauini Primarij.

LIBER VI. DE VRINIS.

QVAE SIT VRINARVM NATVRA, QVOTV-
plex eiusdem significatio, quæ earum in genere materia,
quæque causâ efficiens. Cap. 1.



QUAMVIS sciam, doctrinam de VRINIS ex Hippocrate, Galeno, Paulo, & Actuatio (qui plura quidem, confuse tamen de hac scripsit) hauriri posse, imo non deesse recentiores plures, qui plenam, ordinariam, facilemque hanc reddiderint: attamen a quam plurimis rogatus: idque sæpe sæpius, nō potui demum non satisfacere.

Propositum
auctoris.

De vrinarum itaque natura, differentijs, causis atque prælagio acturus, plenam sane, breuem tamen ac facilem earum tradam cognitionem: Neq; disputabo longius, vtrum vrinæ, an vero pulsuum sit anteferenda cognitio. Equidem nō ignoro, partem hanc Hippocrati magis excultam fuisse, quam pulsus, atque in pluribus demonstrandis passionibus, causis & locis affectis, coctionibus & cruditatibus, crilib. quin etiam (quicquid hac in parte sentiat Christophorus a Vega, qui vrinæ existimat inter criticas signa non esse referendas.) Et quod Galenus aliquando, utpote lib. de Crisib. cap. 1. & lib. 3. de san. tuend. cap. 4. vrinæ pulsibus prætulisse videatur: nihilominus in prælagijs futuræ mortis aut salutis certius signum ex pulsibus desumi posse existimo, id quod supra etiam in tractatu de pulsibus professus sum.

Vrinæ natura
dupliciter
consideranda.

Nunc autem a natura vrinarum explicanda, exordium sumens (quoniam ea non cognita prædictio nulla haberi potest) eam dupliciter facilitatis gratia esse considerandam arbitror. Primo quidem ut factam, secundo, ut iam est in fieri.

Ut facta, iterum dupliciter post perpendi, vel

A scilicet in sanis tantum corporibus, vel in sanis & ægris.

In sanis vrina, ut iam facta, nihil aliud est, quam *Infantis iam excrementum tenue & aqueum, inutile, renum & vesicæ, ad expurgandum sanguinem, ut sit corpori sit. convenientius alimentum.*

Est *Excrementum*, quia sero nulla nutritur pars; Et si enim renes & vesica serum ad se trahât, eo tamen non nutriuntur: aquea namque & aqueæ species nullum præbent corpori alimentum, quod etiâ docuit Gal. lib. 4. de vs. part. cap. 5.

Est tenue ad differentiam stercoreis.

Aqueum, ad pituitæ tenuioris & seminis, eius postremi (seminis scilicet:) ratione est etiam inutile.

Ut vero distingueretur serū factum ab eo, quod est in fieri, dictum in definitione fuit, esse excrementum *renum & vesicæ* ad differentiam eius, quod est in iecore & venis.

Ultima particula causam finalem explicat: Nam ut Galen. docuit lib. 4. de vs. part. cap. 4. & 5. & lib. 1. de nat. facult. cap. ultim. longa oratione serum ideo a natura esse institutum, ut esset vehiculum chyli a ventriculo in iecur, & sanguinis a iecore in vniuersum corpus; atque ubi serum hoc deduxit chylum ad iecur functumque est suo officio, magna illius pars, ut expurget sanguinem, *attrahitur* a renibus & vesica, aliqua tamen illius portio transit in sudores, alia vero, si iam functa suo munere est, ad renes & vesicam tendit. Iure itaque dictum est, hoc excrementum sanguinem expurgare, ut sit corpori convenientius alimentum.

Vrinæ vniuersaliter
considerata.

Vrina aut vniuersaliter considerata, siue in sanis,

C 3 siue

sive in ægris, *vi plurimum* quidem est excrementum: sed aliquando etiam est colliquamentum.

Vocatur colliquamentum, neque est adeo tenue, aut aqueum, neque habet causam finalem. Etenim est res præter naturam: & quæ præter naturam sunt, carent fine. De huiusmodi colliquamento meminit Hipp. lib. 6. de morb. vulg. comm. 5. text. 15. quando illam scribit obscuram sententiam vario modo expositam. *Prima cibo & potui concolor, atque talis, ut consuevit, ubi humidi colliquatio.* Qua ratione sit exponenda hæc sententia, suo loco dicetur. Sed clarius Hipp. lib. 3. de morb. vulg. comm. 3. text. 61. loquens de urinis multis, quæ in pestilenti illa constitutione excernebantur, quas dicebat superasse potum, inquit illas esse secus colliquationem.

De his etiam loquitur Gal. lib. 3. de caus. sympt. cap. 2. circa finem, quando inquit, *colliquationem totius corporis aliquando inferre subitaneos hydropum status, aliquando secedere in ventrem vel in vesicam.* In quo casu multæ excernuntur urinae, crassæ admodum & variæ substantiæ, de quibus infra: Hæc igitur est definitio urinae, siue sani, siue ægri corporis considerata in facto esse.

Urina in factu considerata. Ceterum urina in fieri duo habet causarum genera; quædam enim sunt mouentes, alia vero generantes.

Eius causas mouentes. Et de mouentibus quidem maxima fuit apud veteres dubitatio, utrum scilicet urina attraheretur a renibus & vesica, an potius expelleretur, an sua gravitate inferiora peteret. Quæ quæstiones a Gal. abunde tractantur lib. 1. 2. & 3. de nat. facul. Illud vnum dicam, sanorum corporum urinas a facultate renum attrahere in renes & vesicam dilabi, nec est quod quis obijciat, id fieri non posse, eo, quod nihil trahit, nisi quod sibi est utile & alimentale; serum autem renibus & vesicæ non est alimentum: Ergo serum a renibus & vesica non attrahitur.

Nam præterquam quod id est falsum, (succinū enim trahit paleas, imagines ferrum, horum neutrum alimentum est alteri) accedit etiam, quod simul cum sero sanguinis portio trahitur, quæ in alimentum ipsorum renum secedit: serosa vero humiditas percolata in vteros & vesicam tendit. *In corporibus ægris siue criticæ, siue symptomatice serum plerumque non modo a renibus attrahitur, sed etiam a facultate expultrice iecoris & venarum in has partes expellitur.* Vbi vero serum sit per modum colliquamenti, nulla est renum attractio, sed est sola humorum colliquatorum fusio, qui non in hæc vel illam determinatam partem confluunt, sed in varias pro partium suscipientium imbecillitate. Idcirco in hac colliquatione quandoque sunt sadores illi diaphoretici vocati, nonnunquam fluxus urinae colliquatiui, nonnunquam, ut dictum fuit ex Galeno, subitanei hydropum status.

Generantes. Causæ vero generantes sunt & materiales, & effectiæ.

Quæ sit urina materia. De materia est dubitatio, & ea quidem ad prædictionem maxime faciens. Neque enim vllus unquam poterit consequi, qua ratione urina ventriculi, iecoris, atque adeo totius fere corporis affectus & causas ostendat, qui ignorat, qualis nam sit illius materia.

A Non defuerunt viri excellentissimi, qui putarēt, urinae materiam esse potulentam: Id quod etiam videtur voluisse Galen lib. 1. de nat. fac. cap. ult. lib. de atra bile, cap. 2. & lib. 10. de simpl. medic. facul. cap. 13. atque alibi pluries, dum scribit, *potulenta urinis respondere, & quæ per urinas emittuntur, proportionem respondere ipsis potulentis: & serum, quod apparet in sanguine extra venas existente, esse corruptionem potulentorum, atque alia id genus.*

Ceterum hæc sententia duas habet rationes contrarias: primo, quod infantes in vtero mingant sine re potulenta: deinde, quod multi etiam reperiantur & viri, & mulieres multos dies sine potu existētes, qui tamen mingunt, ut præteream animalia multa, ut cuniculos, qui mingunt & non potant.

B Ne vero in quæstionibus logicis diu detineamur, sciendum est, materiam urinae esse semper rem potulentam & partem cibi assumpti humidiorē, sed quandoque immediate, quandoque vero mediate.

Res potulenta est materia urinae, quandoque immediata in affectu illo, quem *διακρυσ* Græci vocant. in illis præterea, qui aquas thermales bibunt; nam talis eiicitur, qualis assumitur.

Eadem materia potulenta est materia urinae, sed mediate, quibus mixta cum chylo & vehiculum chyli existens in ipso iecore aliqua ratione alteratur, ut alium suscipiat odorem, colorem & saporem. Inquit Gal. lib. 3. de sympt. causis cap. 2. in iecore triplex fieri excrementum, *melancholicum, biliosum, serosum*; hoc serosum, ut antea fuit dictum, cum iā chylum deduxerit per venas angustissimas in gibbam iecoris partem, maiori ex parte mixtum sanguini & modicæ bili attrahitur a renibus per emulgentes, aliqua vero portio transmittitur in venas totius corporis pro vehiculo sanguinis.

C Ad hoc serum respiciens doctissimus Vales. in libro suo de urinis dicebat unicuique esse serum, quamquam Gal. quatuor constitueret, unicuique scil. humori serum proprium.

Aliter enim res se habet. Etenim unusquisque humor habet proprium serum ab hoc distinctum. Nam, ut fuit dictum, materia urinae est non modo res potulenta, sed etiam pars cibi humidior, quæ ratione & infantes in vtero & alij extra vterum non potantes, & animalia quæ cibis vescuntur humidioribus, mingunt sine potu. Ex hac substantia fiunt humores. Et quia in unoquoque humore pars est crassior, pars vero tenuior, quæ tenuior est, serosa nuncupatur: Et huiusmodi serum naturaliter non excernitur, sed tantum ex colliquatione.

D Vbi enim incipit colliquatio in venis, primo exprimitur serū illud, quod in iecore genitum, in venas est distributum pro vehiculo sanguinis: post illud colliquatur humidior pars uniuscuiusque humoris, quæ est illius serum, & huiusmodi serum est signum prauæ affectionis, de hac dicebat Hipp. lib. 6. de morb. vulg. com. 2. text. 37. 92. *sanguine ichoroide, quod in pauidis talis, aut in vigilantibus, & sine malis, siue bonus.* In comm. Gale. ostendit ichores, de quibus est sermo, venenatos esse & citat prolatam sententiam, quam ipse quoque comprobat, unicuique humori proprium inesse serum, serum scilicet sanguinis, bilis, melancholicæ, & pituitæ, generantur simul cum ipso

Unicuique humor proprium esse serum.

pio humore ex parte humidiorē seu liquidiorē ipsius cibi. Hæc igitur est materia vniuscuiusque seri.

Nam datur etiam materia, quæ auget quantitatem seri, sed non est proprie serum, quando scilicet sero immiscetur aut pituita crassa; aut colliquatio carnis, aut pinguedinis. Hæc de causa materiali.

Vrinæ causæ efficientes.

Ex ijs, quæ de vrinæ materia hæcenus exposita sunt, non est difficile causam quoque efficientem colligere. Etenim cum triplex sit materia; res potulenta impermutata, & eadem permutata in serum, ac tertio pars humidior alimenti in tenuiorem humoris partem transmutata. Idcirco, quod ad primam pertinet, hæc intra corpus nullam habet causam efficientem, talis enim eijcitur potus, qualis assumitur, nullam in partibus facta mutatione. Secundæ vero & tertiæ vrinæ materia habet pro causa effectiva iecoris ac venarum alteratricem facultatem, atque ipsum calorem pro instrumento. Ex ea enim ipsa causa fit serum in genere, vel serum secundum quatuor humores distinctum, ex qua fiunt etiam ceteri humores.

Ex quibus dictis patet interpretatio obscuræ illius Hippocraticæ sententiæ lib. 4. de morb. vulg. comment. 5. text. 15. prolatæ, dum scribit: *Vrina cibo & potui concolor, atq; talis ut consuevit, ubi humidi colliquatio &c.* Per hæc enim verba Hippocr. triplicem significat vrinæ materiam & eiusdem causas effectivas. significat primò materiam potulentam impermutatam, quando inquit, *vrina concolor cibo & potui*: deinceps significat serosam materiam in iecore genitam, ubi inquit, *& ut consuevit omnium enim magis consueta vrinæ excretio est feri in iecore geniti*: Tertio addit materiam, cum inquit, *& ubi humidi colliquatio*, per quæ verba significat excretionem illius serosæ humiditatis, quæ vnicuique humori est propria, propterea in venis continetur. Et quia videbat Hippocrat. hanc tertiam non expurgari naturaliter, sed ex calore præter naturam furdente & colliquante hoc serum, idcirco scripsit, *Et ubi humidi colliquatio*. Hæc de natura vrinæ in genere satis dicta sunt.

De Vrinarum differentijs, ijsque sumtis ex substantia calore, odore, sono & colore. Cap. II.

Circa differentias hoc breviter erit explicandū, quomodo vnaqueque differentia cognosci possit. Sumuntur vrinarum differentia a substantia, calore, odore, sono, colore & contentis: ut omittamus saporem.

Differentia a substantia.

A substantia, quicquid hac in re sentiant alij, quatuor præcipue oriuntur differentiæ, quarum duæ subdividuntur, sunt autem crassa & tenuis, turbida & clara: hæc duæ subdividuntur in quatuor: nam aut turbida fit talis & permanet: aut fit turbida & postea clarescit: aut fit clara & postea turbatur: vel fit clara & permanet clara.

Distinctio vrinæ turbidæ a crassâ.

Distinctio Distinguitur vrina turbida a crassâ, cum tamen nonnulli eandem eam censeant. Quod crassa sit adhuc diaphana, acies oculorum potest totam illius substantiam penetrare, eo quod admittat aliquid luminis: turbata autem vrina, qualis iumentorum, lumen non admittit, propterea non videtur nisi

A partes illius superficiales.

A calore oriuntur differentiæ, quia quædam min- *Differetia a calore.* gatur calens admodum, ita ut aliquando præ calore vitra scindantur: quandoque vero est tepida vel subfrigida.

Ab odore, quædam fetida est, alia vero minime *Ab odore.* fetida.

A sono, quædam, dum emittitur, nullum edit sonum, perinde atq; si esset oleum; alia sonum emittit clarum sicuti vinum vel aqua. *A sono.*

A colore variæ sumuntur differentiæ, & hac in parte diutius versari oportet, ut non modo elucescat, quales sint vrinarum colores, sed & quomodo apud varios scriptores accipiantur, & qua ratione sint dignoscendi. *A colore.*

Colorum vrinæ alij sunt apparentes, quidam autem reales.

Apparentes sunt ex refractione luminis aut corporis colorati ad vas vrinarium & vrinam ipsam, qui quidē nihil significant, sed tamen oportet Medicum esse hac in re cautum, ne vas vrinarium aut multo luminis aut corpori colorato appropinquet falsumque de vrinis iudicium fiat. **Reales** colores tametsi multi a scriptoribus proponantur, ad sex tamen possunt redigi præcipuos, ad albū scilicet, pallidum, rubeum, viridem, lividum, nigrum.

ALBI multæ constituuntur species, præcipue tamen sunt *vrina alba.* *nivæus, lacteus, aqueus, crystallinus, corneus.* Actuarius cap. 8. glaucum addit, & *χάμωρον*, Mercurialis vineum. Ego breviter censeo nivæum & lacteum vrinam significare albam cum crassitie substantiæ: aqueum albam cum substantiæ tenuitate: crystallinum seu corneum albam cum splendore vinea autem vrina, non est amplius inter vere albas, sed potius inter subalbas, amulatur, ut scribit Galenus lib. 1. de crasis capite duodecimo, vrinæ quædam alba, infirmiora tamen, & est color quasi aqueus, cui aliquid *ῥοῦ ὀχρεοῦ*, id est, coloris ruffi permixtum sit.

Glaucæ vrina & *χάμωρον* inter albas minime connumerari posse arbitror. Nam glaucus color apud Græcos est ille ipse, quem Latini clarum vocant, & mulatur corticem castanearum, quæ tamen colorē non habent admodum plenum. Propterea scribit Aristotel. lib. 5. de Generat. animal. cap. 5. Glaucum colorem, vel glaucoma fieri ex siccitate, eo quod oculi partes non possint illustrari: at vero ubi corpus lumen non admittit, non potest esse album. Accedit, quod Glaucus color, vel idem est cum cæcio, ut putat Theodorus Gaza loco supracitato, aut saltem proxime accedit ad illum, ut propterea scribat Aristotel. loc. citat. cæcios oculos facile desinere in glaucoma. Sed sic est, quod oculi cæcij ex sententia Galeni comment. 3. in lib. 3. de morb. vulg. text. 70. sunt calidi & sicci, propterea sunt ignei; idcirco non possunt reponi inter albos.

Glaucæ.

Vnde glaucus color.

Colorem glaucum non pertinere ad album.

Propter hanc causam scribit Galenus cæcium colorem esse eundem cum charopo: propterea neque *χάμωρον* potest esse albus: nam *χάμωρον* significat potius colorem immanitatem præ se ferentem.

Et ideo Homerus leonū oculos vocat *χαμῶνους*, & Catilina ac Nero, qui immanes admodum fuerunt, notantur habuisse oculos cæcios, vel *χαμῶνους*. Idcirco

Idcirco excludendi omnino sunt isti duo colores, glaucus & ~~asper~~ ab albis.

Pallidus color quoniam simplex.

PALLIDVS color est triplex, pallidus, rufus & flauus. Rursum pallidus subdividitur in pallidum & subpallidum, quem colorem, ut per quamdam similitudinem explanarent scriptores, vocant spicem vel subspicem, quia amulatur colorem spicatum maturatum, vocant paleatem vel subpaleatem, quia paleas imitatur exsiccatas.

Rufus.

Galenus pallidum quandoque vocat subruffum. *lib. 1. de crisib. cap. 12.* Rufus autem color ipse quoque alius est rufus, alius subruffus, & rufus comparatur auro purissimo nitenti, quale est aurum sechiniorum.

Subruffus.

Subruffus autem, qui dicitur subaureus, comparatur colori auri florenorum, qui est impurior, dicitur etiam hic citrinus.

Flauus.

Flauus etiam color & ipse quoque flauus est & subflauus, comparatur aquæ, in qua macerati aut incocti fuerint flores croci, propterea dicitur croceus vel subcroceus. Sed quia huiusmodi distinctiones sunt usque adeo diuersæ, hinc fit aliquando subcrocea vrina, a Gal. ruffa nuncupatur *comm. 1. in lib. prognost. text. 30.*

Rufi coloris species.

Pallido succedit **RUBER**, qui ex sententia Galeni subdividitur in tres species, ut colligitur ex *comm. 1. in 1. prorrh. text. 25.* est subrubeus, rubeus & praruber.

Subrubeus.

Subrubeus color idem est ac roseus, seu, ut dicunt vulgo, incarnatus, qualis apparet in facie puerorum & iuencularum, quæ pulciores existimantur, in quibusdam cerasis, in bolo Armena.

Rufum colorem esse minus intensum flauo.

Idcirco non accipiendam esse Mercurialis sententiam arbitror, qui hunc colorem ruffum existimaverit, cum certum sit ex *lib. 1. de cris. cap. 12.* ruffum colorem esse minus intensum flauo seu fuluo. Ergo non est medius inter pallidum & flauum. Et idcirco Antiquiores semper dixere sanguinem rubeum, nunquam dixere ruffum, sicuti contra barbam & capillos rufos, & canes rufos, quos olim Romani immo labant, ut Canicula sideris malignitatem extinguere. Nunquam tamen capilli aut barba dicitur rubra: subrubeus igitur, ut fuit dictum, est ille roseus.

Rubens.

Rubens autem dicitur purpureus, quem scarlatum nostri vocant, siue ex croceo, siue ex purpura conchilis specie resulet.

Prarubens.

Tertius est, qui *sanguinolentus* vocatur, sic scribit Gal. *comm. 1. in 1. prorrh. text. 31.* vinas prarubeas vocatas alias non esse, quam sanguinolentas: & quia sanguis non est vnus & eiusdem naturæ, qui non est admodum obscurus, ab Aetuario vocatur vineus accepto vini colore pro colore vini rubri, amulatur substantiam ipsam epatis.

Qui vero est magis crassus & niger, facit colorem in vrinis, qui vocatur passeus, quia amulatur succum passularum expressum aut sapam, mustum coctum, hunc puto esse illum colorem, quem Avicennas dicit puluerulentum.

Viridis.

VIRIDIS color duplex est; porraceus, quia amulatur porri colorem, & hic est magis clarus; & ruginosus, qui est magis obscurus.

Lividus.

LIVIDVS ipse quoque est duplex, puniceus & plumbeus. *Puniceus* potest cognosci ex colore,

A violatum, ex quibus fit syrupus violarum solutius simplex: *Plumbeus* ex colore plumbi.

NIGER denique duplex pariter est, ater & fuscus. *Ater* similis atramento: *Fuscus* amulatur colorem eorum, qui sub sole diu moram traxerint.

Que vrina oleosa, qua earundem differentia & causa. Cap. 111.

INTER ceteras vinarum differentias connumeratur & **OLEOSA**, siue **OLEACEA**, de qua nihil huc usque dictum fuit, quod dubium sit, numquid talis dicatur ratione coloris oleum amulantis, an ratione substantiæ crassioris, an vero ratione vtriusque.

B Cum autem crassa vrina tanquam distincta a scriptoribus enumeretur, credibile est, nullam ex ijs oleaceam seu oleosam vocari, sed illas tantum, quæ vel in colore, vel in substantia & colore oleum amulantur. *Gal. comm. 3. in 3. de morb. vulg. text. 74.* primam inquit oleosam vocari, quæ in colore & substantia oleum amulatur: est enim crassioris substantiæ.

Aetuar. in 1. de vrinis, cap. 9. tres constituit vrinæ oleosæ differentias, quas tamen omnes inquit esse tenues.

Itaque ut veritas hæc possit dilucidari, necessarium est transcendere hoc in loco differentiarum limites & de causis peragere, ut videatur quomodo possit vrina oleosa constitui, quæ crassa & tenuis sit.

C Quod pertinet ad crassam, Gal. *l. ca.* omnes illos improbat, qui putant oleosam vocari vrinam, eo quod pinguedo liquata illius substantiam crassiorem reddat & colorem oleo similem. Inquit Gale. nullibi visum esse, ut pinguedo liquata substantiâ vrinæ penetret aut crassiorem reddat, cum tota in superficie supernatet. Improbatur quoque ex Sabini sententia eorum omnium opiniones, qui arbitrantur fieri talem ex colliuatione neruorum & ossium, nam talis apparet in illis etiam, qui possunt esse superstites hebdomadas & menses, cum tamen colliquatis ossibus & neruis nemo possit diem vnâ superuivere.

Fernel. visus est voluisse, fieri oleosam vrinam in hecticis, phthisicis & hydropicis ex colliuatione: Quid intelligat ex colliuatione, non explicauit, si intelligit colliuationem pinguedinis, habet contra se rationem iam adductam Gal. Si colliuationem carnis, præterquam quod colliuatio carnis, ut paulo post intelligetur, facit sedimenta granis orobi & erui similia, accedit etiam, quod color vrinæ ad fuluum potius vel rubrum, quam ad viridē declinet. Sicuti enim colliquata caro ex sententia Gal. *lib. 8. de comp. med. sec. lo. c. 4.* facit excrementa alui folua & ruffa: ita eadem colliuatio vrinis permista eundem facit colorem.

Accipio igitur Sabini sententiam a Galen. *comm. 3. in 3. de morb. vulg. text. 74.* prolata, oleosam reddi vrinam, ex admistione substantiæ alimentalis, quæ in venis continetur & vnicuique membro deputatur, ex substantia, inquit Sab. dicitur oleosa: quia sicuti oleum est materia ignis in ellychnio, ita hoc alimē-

tum est materia calidi innati in partibus solidis, fa- A
cique vrinam crassam, propterea oleo non dissimi-
lem. Solet autem hæc fieri colliquatis ipsis humo-
ribus a calore febrili.

Datur quoque oleosa vrina tenuis, vt recte voluit
Actuarius, qui tamen tres constituat vrinæ oleosæ
species, quemadmodum fecit etiam auctor libri
de vrinis, atque etiam Aëtius, nihilominus differt in
hoc ab istis duobus scriptoribus, quod ipse existi-
met, omnes istas tres esse tenues; illi vero putent,
tertiam esse crassam, primam tenuem, secundam
mediam: dicunt primam oleosæ vrinæ speciem fie-
ri, quando colliquatur pinguedo in modica quan-
titate, quæ supernatat in superficie.

Secunda species est, cum plus pinguedinis colli-
quatur.

Tertia, cum tanta est colliquatio, vt pinguedo B
ipsa per totam vrinæ substantiam confundatur.

Quæ sententia cum a Galeno sit iure optimo re-
futata, Actuarius potius est accipienda, dari vrinam
crassam, sed oleosam, quæ scilicet in colore tantum
oleum æmulatur.

Nam vbi pinguedo colliquatur, siue pauca sit,
siue mediocris, siue multa & illa quidem vrinæ
supernatat, nihilominus præ se fert olei colorem,
nec modo in superficie, verum etiam in tota sub-
stantia.

Nam color ille viridis, qui representatur in su-
perficie vrinæ ex refractione luminis ad illud corpus
impingit, est in causa, vt idem color representetur
in tota vrinâ, ita vt sit color potius apparens, quam
realis: sicuti esset apparens, si appropinquaret vas
vriinarum herbis virentibus.

Datur itaque vrina in colore tantum oleosa, quæ
fit ex pinguedine colliquata supernatante.

Datur quoque oleosa in substantia crassa, quæ fit
ex colliquatione humorum, qui in venis sunt, qui
totæ substantiæ vrinæ permiscuntur.

*De Differentiis vrinarum relatiuis dictis, quæ sci-
desumuntur a quantitate, tempore &
modo exeundi. Cap. IV.*

P Ræter has differentias, quæ absolutæ vocari
possent, sunt quædam relatiuæ, quæ sumun-
tur a quantitate, tempore & modo exeundi.

Quando enim dicimus vrinam esse multam vel
paucā, id dicimus habita relatione aut ad id, quod
est moderatum, aut ad potulenta accepta. Nam si
quis multum bibat & parum mingat, dicimus vri-
nas esse paucas in relatione ad multum potū. Con-
tra, si quis vel parum, vel nihil bibat, tamen mo-
deratam vrinæ copiam mingat, dicitur tamen mul-
tum mingere.

Quod ad tempus, non potest præscribi tempus
mictionis importunum, vel opportunum, nisi ha-
bita consuetudinis vniuscuiusque ratione.

Id ipsum dico de modo, virum facile an diffi-
le, cum, an sine dolore; guttatim, an non guttatim
vrina ipsa emittatur. Et hæc de differentiis ab vri-
na desumptis dicta sufficiant.

*De natura & differentiis contentorum in vrinis
sanorum corporum. Cap. V.*

C Ontenta sunt in duplici differentia. Quædam
enim videntur esse essentialia, quædam vero
accidentalialia.

Essentialia voco illa tria; Sedimentum seu vtri-
cæ, ita vtri- siue suspensum, ita vtri- siue
nubeculam: quæ locis inter se dissident: Quatenus
sedimentum continetur in fundo, suspensum in me-
dio; Nebula in suprema vrinæ parte. Has voco es-
sentialia vrinæ partes, quia fere in omnibus sanorū
vris ac pluribus ægrorum conspiciuntur.

Fere in omnibus sanorum vris, quia fieri potest,
vt exercitatis corporibus, temperamentis calidiori-
bus, paucis cibo atque illo quidem optimi succi
deditis, nullum fiat in vris contentum, præcipue,
si cetera corporis excrementa bene per sua effluxer-
int loca.

Videntur itaque hæc essentialia ad differentiam
eorum, quæ per accidens, neque frequenter ipsi v-
rinæ permiscuntur, vt sunt arenulæ, pili, & alia id
genus, de quibus infra.

De horum contentorum natura ac causis tanta
est inter scriptores difficultas & altercatio, vt vix
illum liceat inuenire, qui cum altero conueniat; &
sane, nisi huius veritatis inuentio tantum conferret
ad præsagium, intermittendæ potius longæ de ijs
disputationes essent. Sed quia nihil est in morbis,
quod maius præstare lumen possit, quam vrinarum
contentum idcirco diligenter quidem, attamen bre-
uissime tota hæc pars percutienda erit.

Actuarius inter Græcos fuit huius sententiæ,
Contentum in vris nihil aliud esse, quam portionem
alimenti tertie colitionis, quæ sit in venis, quæ fuit
quidem a facultate venarum alterata, non tamen in
substantiam partis transmutata: hoc alimentum in-
quit ipse auctor, a quo deinde accepit Altimarus
in suo libro, de sedimento vrinæ, transmutatur in sub-
stantiam albam, quia hæc transmutatio fit a mem-
branis venarum, quæ ipse quoque sunt albæ. Cum
vero non conuertatur in alimentum, expurgatur si-
mul cum serosa humiditate per renes & vesicam.
Hanc putat Actuarius & cum eo Altimarus esse
sedimenti in sanis apparentis naturam.

Quod si quispiam interroget, qualem sit se-
dimentum in febricitantibus? Idem Altimarus se-
cutus sententiam Galeni, qui lib. 1. de differ. febr. ca.
6. & lib. 3. de præsag. ex puls. cap. 6. nihil aliud esse
hoc contentum ait, quam portionem materiæ facien-
tis febrem, quæ calido innato venarum & arteria-
rum est conuersa in substantiam puri similem. Nam
sicuti docebat idem Galenus, libro tertio, de præsag.
ex puls. capite sexto. In vnaquaque febre putrida,
dum exuruntur humores, tenuior pars humoris exu-
sti, quasi fumus in camino per anhelitum expurga-
tur: pars autem crassior est quasi cinis in foco, purga-
tur per vrinam estque vrina sedimentum. Idcirco li-
bro primo, de differentiis cap. sexto, dicebat Galenus,
illud idem fieri in venis, quod in priuatis abscessibus,
vt scilicet, sicuti in priuatis abscessibus sanguis pu-
trefcens conuertitur in substantiam, quæ pus voca-
tur, ita

*Contenta
essentialia.*

*Sententia
Actuarij de
contento &
Altimari.*

*A quanti-
tate.*

Tempore.

*Modo exe-
undi.*

tur, ita humores in venis putrescentes conuertuntur in substantiam albam puri similem, quæ sit sedimentum vrinx. Ex ideo inquit *Altimarus*, in febribus continuis siue continensibus, siue proportionatis semper sedimentum est portio humoris, qui actu putrescit: in febribus intermittentibus, inquit, aliquando est portio humoris, qui potest putrescere: quandoq; est portio alimenti, vt in sanis: nonnunquam est mixtio vtriusque. Hæc est sententia *Altimari*, quæ aliqua ex parte conuenit cum *Actuarij*.

*Refutatio
sententia
Altimari.
Sedimentum
in sanis non
esse excre-
mentum ler-
vix conco-
ctum.*

Contra hanc de vinarum sedimento sententiã tam in sanis quam in ægris multa proferri possunt. Et primo quidem, quod sedimentum in sanis non sit excrementum tertix concoctionis venarum scilicet, & arteriarum, quæ iam sibi ipsis alimentum hoc apposuerint, atque aliqua ex parte assimilauerint, facit primo hæc ratio: Si res ita haberet, ergo sequeretur omnes vrinas, aut saltem magnam ipsarum partem esse portionem illius feri, quod distribuitur in venas. Consequens probatur, quia hoc sedimentum in venis generatur: si igitur ad vesicam fertur, oportet, vt feratur cum sero venarum: sed hoc est falsum: ergo antecedens.

Quod sit falsum, vrinx magnam partem esse venarum serositatem, docuit *Galenus* vt alios locos præteream, libro quarto, de vs. part. cap. 6. vbi scribit, serum, cum produxit sanguinem a parte concaua in gibbam, statim per venas emulgentes in renes & vesicam descendere, leuem illius portionem simul cum sanguine distribui in venas.

Accedit secunda ratio. Serum quod mictitur ad venas totius corporis, non semper retrocedit ad vesicam: ergo non potest secum ferre sedimentum venarum. Quod non retrocedat, probatur: quia materia feri vrinarij & sudoris est vna & eadem: vbi itaque sudores erumpunt, serum venarum per illam euacuatur partem, non per vrinas, & tamen eo etiam tempore apparet sedimentum. Igitur sedimentum non est excrementum venarum.

Præterea, si sedimentum esset venarum & arteriarum excrementum, vt censet *Altimarus*, nulla ratione posset per vrinam expurgari. Probatur consequens, quia huiusmodi sedimentum, vt scribit *Altimarus*, iam venis ipsis est appositum & assimilatum, & propterea factum est album; sicuti etiam venæ & arteriæ sunt albæ. Excrementum hoc est iam parti assimilatum, & non conuertitur in alimentum: Quæ est ratio? vbi iam alimentum est simile. statim nutrit partem, simile enim nutritur simili.

*Materia se-
mentum.*

Neque est, quod quispiam dicat, etiam semen esse excrementum tertix concoctionis: Nam materia seminis est sanguis, neque assimilatus, neque appositus, qui dealbatur in vasis seminalibus & testibus. Hoc vero, vt ante fuit dictum ex *Altimari* sententia, iam oppositum & assimilatum est.

Possset vltro inferri, tamen istud etiam si album, necessario fieri rubrum, quia miscetur sanguini: sed hæc sufficiant.

A

De differentijs sedimenti in vrinis agrotantium, & quæ ex aliorum sententia eiusdem sit materia. Caput VI.

IN agrototum sedimentis non videtur *Altimarus* se ipsum distinguere, quale nam illud esse existimet. Cum enim videatur *Galenus* sententiam sectari, qui tamen & ipse sibi est valde contrarius; lenim 3. de pras. ex pull. cap. 6. inquit, sedimentum vinarum esse humorem, qui iam putruit conuersum in cineres, propterea exustum: libro vero primo, de differ. febr. cap. 6. sedimentum esse materiam putrescentem iam concoctam & cuiusdam a calore nativæ, propterea conuersam in substantiam albam, leuem & æqualem, ideo optimo puri similem, qui in pruatibus apparet abscessibus.

B Multum sane distant hæc duo, sedimentum exustum, & sedimentum concoctum.

Exustum subiit tantum vim colonis præter naturam:

Concoctum subiit vim caloris & præter naturam & naturalis: Caloris præter naturam, quia primo putruit: naturalis, quia iam putrescens concoctus est, & in optimam conuersus substantiam.

Si igitur *Altimarus* dicat, sedimentum vinarum in ægris esse substantiam cinerulentam, sicuti aliquando ex *Galen.* affirmat, dicendum, hanc substantiam non posse esse concoctionis signum, sed tantum exustionis, propterea apparebit hic substantia non in statu tantum, sed in principio etiam & augmento. Nam sicuti quacunque die humor putrescens exurit, ita quacunque die portio tenuior per halitum expurgatur; crassior & cinerulenta per vrinas: Idcirco minus apparebit hoc sedimentum tempore status, quam in principio & augmento.

C Quod si dicat, se intelligere de sedimento per concoctionem facto, tunc alia plura insurgunt dubia.

Nam si humor putrescens, vbi iam est concoctus, in albam conuertitur substantiam: Ergo in febribus biliosis tempore coctionis bilis excernitur, vel per vomitum, vel per secessum; alba, si febris sit sanguinea, fiatque fluxus sanguinis, sanguis ille cuius & concoctus erit albus. Id ipsum intelligit debet de alijs humoribus putrescentibus.

D Quod si dicat, totam hanc humoris portionem per vrinas purgari, tunc oporteret vrinas reddi tempore status multo crassiores, quam in principio & augmento: sed nimia crassities arguit inconcoctionem: ergo nulla erit certa regula cognoscendi humores concoctos.

Accedit, quod si ex sententia *Altimari* in febribus intermittentibus sedimentum vinarum non sit portio humoris putrescentis, & quod humor putrescit extra venas, sequeretur in istis sedimentum album & æquale nunquam apparere debere: sequeretur quin etiam in principio nunquam posse apparere vrinas concoctas, cuius tamen oppositum scribit *Gal. lib. 1. de cris. cap. 7.* Itaque ad alias sententias confugere oportet.

Non defuerunt, qui dixerunt, sedimentum esse partem sanguinis tenuioris ac subtiliorem, quæ pro-

propterea citius & promptius in albam cōuertitur substantiam. Sententia sane vsque adeo a ratione aliena, vt confutationem non promereatur.

Si enim id verum esset, supernataret potius sedimentum quam resideret in fundo: pars enim tenuior sanguinis est omnium leuissima. Præterea in calidis & siccis naturis plus esset sedimenti, quam in frigidioribus, cuius tamen oppositum docet experientia & Galen. auctoritas, qui *com. 2. in l. prog. text. 26.* in corporibus siccis & biliosis nullum scribit fieri sedimentum, excellentissimus nostræ gratiæ vir *suarum epist. med. lib. 8. epist. 6.* aliam habet sedimenti sententiam, scribit ille *vnā & eandem tam in sanis, quam egrijs maiori ex parte esse sedimenti materiam, portionem scil. ipsius chyli, quæ quidem in iecore non potuit in sanguinem conuertere: hanc chyli portionem vrinæ cōmixtam inquit esse sedimenti materiam.*

Ceteram hæc sententia multis nominibus mihi videtur improbanda: primum quidem, quod difficultissimum sit, ne dicam impossibile, substantiam chyli permeare, & tamen albam permanere: alia partes transmutantur & ista remanebit impermutata: Nec est, quod dicat esse partem crudiorē: quamquam enim concedatur, esse crudiorē partem, atramen non potest esse vsque adeo cruda, neque imbecillitas partis vsque adeo magna, vt non possit permutari.

Probaturn etiā duplici argumento. I. huiusmodi sedimentum est signum, vt ipse & alij omnes concedunt, optimæ coctionis ventriculi, iecoris & venarum: Ergo erit signū talis caloris, qui possit saltem permutare colorem album chyli in colorem alium. Confirmatur, quia si iecur potest mutare crudum in substantiam, quæ etiam est minus cocta, multo magis potest mutare substantiam crudam, saltem in minus coctam. Sed sic est, quod facit ex substantia cruda substantiam nimis coctam, nempe bilem: ergo poterit etiam chyli portionem illam aliqua ratione alterare.

Neque potest defendi, quod dicit, hanc substantiam ex propria natura esse vsque adeo frigidam, vt sit impermutabilis: etenim ipsemet concedit, aliquando portionem hanc tempore necessitatis cōuertere in sanguinem.

Accedit, quod si sedimentum esset ex tali substantia, quo minor est portio alimentī, eo minus deberet apparere hoc sedimentum: sed minor est portio alimenti in statu: nam in statu tenui victu vtendum: Ergo in statu minus deberet apparere hoc sedimentum. Cuius tamen oppositum & ipse & alij omnes profutentur.

Adde, quod tunc deberet plus apparere sedimenti, cum plus cibi assumitur, cum facultates minus concoquunt: id autem contingit in principio, in augmento morbi: ergo hoc tempore deberet apparere sedimentum, cum tamen res opposito modo se habeat.

Ita sentit ille de albo sedimentō. Nam quod pertinet ad alia sedimenta varij coloris & substantiæ, concedit hæc aliquando fieri vel ex ipso chylo corrupto & in prauos humores conuerso, vel ex reliquis humorum putrescentium,

Fernelius aliam habuit ab omnibus differentem sententiam, quæ paucis quibusdam mutatis, vt *arbitror, in bonum sensum potest redigi, hic in suo de vrinis, cap. 17. vult, vrina sedimentum esse partem feri crassiorē contractam ex mitione feri cum alimentis tempore concoctionis.* Cum enim certum sit, potulenta misceri in ventriculo simul cum cibo, dū chylus conficitur, inquit Fernel. *huiusmodi res potulenta in hac coctione aliquam recipit portionem huius substantiæ, similiter etiam dum fit concoctio in iecore, miscetur ipsi sanguini: & sicuti ius carniū, dum coquuntur carnes, contrahit, nescio quam, crassitē, quæ deinde subsidet in iure: ita, inquit, serum in his concoctionibus recipit huiusmodi crassitē substantiæ, quæ deinde, vbi vrina emittitur a calore proprio vrinæ separatur, & ad fundum propellitur & fit sedimentum.*

Hæc sententia habet quidem aliquas contra obiectiones, sed tamē sano modo intellecta & paucis mutatis, potest redigi in bonum sensum. Obiectiones sunt istæ: quod, cum serum misceatur non minus chylo, quam sanguini, & coctio sanguinis sit vltima, nulla est ratio, cur substantia sedimenti sit potius alba, quam rubra.

Præterea, si constituamus, quod ipse vult, sedimentum scilicet esse partem vrinæ essentialē: Ergo omnis vrina habet sedimentum. Cōsequens est falsum: nam siue propter obstructionem, siue inconcoctionem, vel tenuem victum vrinæ carent sedimento, ergo non erit pars essentialis.

Laboratum hæcenus fuit in refellendis Actuarij, Altimari, & aliorum sententijs, reliquum est, vt quid pro rei veritate sit sentiendum explicetur.

Duo autem hac in parte veniunt præstāda, quorum primum pertinet ad proponendas sedimentorum differentias: alterum vero ad explicandam vniuersiusque essentialiam.

Sedimenta omnia trifariam distingui posse videntur: alia enim sub naturalibus comprehenduntur: quædam sub illis, quæ sunt præter naturam: nonnulla, quæ medio modo se habent.

Naturalia voco illa, quæ quodcumque appareant, siue in sanis, siue in ægris, certam & absolutam pollicentur coctionem & sanitatem.

Præternaturalia, quæ vbiunque apparent, aut exquisitam cruditatem, aut præterea ægri perniciem declarant.

Media, quæ imperfectam significant coctionem, consequenter nec certam valetudinem, nec certum morbum,

In primo genere sedimentum potest sic definiri. Quod sit pars vrinæ crassior, alba, lauis, æqualis, matula fundum petens, pyramidalis.

Per partem enim intelligo essentialē & ab vrina inseparabilem, vt visus est voluisse Fernelius, sed est pars *superaddita*, idcirco & in pluribus sanorum atque ægrotantiū vrinis nulla *vrinæ* apparere solet.

Dicitur *crassior*, quia minus diaphana, quā ceteræ vrinæ partes, & ad differentiam cuiusdam sedimenti albi & tenuis, ex crasso statu cum pituita cōmixti, quod vitiosum est: de Hoc Hippoc. & Gale. *com. 2. in prognost. text. 28.*

Dicitur

Horatij Augu-
stini sensen-
tia refuta-
tur.

Sententia
Fernelij cor-
recta.

Obiectiones
contra sen-
tentiam Fer-
nelij.

Sedimenta-
rum diffe-
rentia.

Sedimentum
naturale
quid.

Dicitur *levis*, non diuisa, non aspera, sed omni ex parte similis.

Aequalis, ut recte Hipp. & Gale. com. 2. progn. text. 26. quia in omnibus vrinis tam matutinis quā vespertinis, tam vnius quam alterius dici vno & eodem modo se habent.

Fundum petit, non quod hereat fundo hoc enim vitiosi sedimenti proprium est, sed ad differentiam enzorematis & nebulae inferiora petit.

Habetq; figuram pyramidalem, quae ipsius ignis est propria, ut significet caloris naturalis vim omni ex parte in eius substantiam se exercuisse.

Sedimentum prater naturam. Dum igitur tale sit naturale sedimentum, non est difficile intelligere, quale nam sit sedimentum prater naturam. Nam illud peccat ratione loci, substantia, lauitatis, coloris, figurae ac praeerea etiam odoris: de quibus omnibus dicitur suo loco.

Medium. Medium autem est id, quod quidem subsidet, sed est diuisum, non album, neq; per omne tempus aquale: aut non subsidet, sed in medio haeret, & dicitur *involans*, vel supernatat, & dicitur *involans*, seu nebula. Quanquam apud Hipp. ut docet Galen. 2. progn. text. 26. nebula & enzorema pro vno & eodem accipiantur.

Quae vera sit & genuina sedimenti naturalis materia. Caput VII.

Hucusque de natura omnium sedimentorum in facto esse abunde dictum fuit nunc, ut causae illorum materiales & effectivae tam generantes quam quouis modo alterantes & mouentes explicentur, ordo requirit.

Naturalis sedimenti materia. Naturalis itaq; sedimenti materia, (de hac enim initium sumendum) ut tandem meam proferam sententiam, nulla est alia, quam succus a Galeno crudus seu crassus vocatus. Hic succus crudus & crassus Gal. auctore, lib. 4. de san. tuend. cap. 4. & lib. 2. de alim. fac. cap. 6 & lib. 3. de compos. med. sec. loc. cap. 1. est pituitae species: sed tamen in hoc a pituita differt, quod sit omnium pituitae differentiarum crassissima.

Generatur hic succus prae intertemperiem frigidam morbosque frigidos, seu ventriculi, iccoris & venarum, etiam ex ciborum quorundam proprietate, de quibus omnibus meminuit abunde Galen. lib. 3. de alim. fac. & in lib. de ciborum bonitate & vitio, in quibus locis declarauit carnes bubulas, bouinas, caseū, cochleas, castaneas, pisces, tubera, placentulas, legumina, &c. ex propria natura hunc succum crudum & crassum gignere.

Ratione sedimenti. Hunc succum ac materiam sedimenti naturalis probo triplici argumento. I. Illud est sedimentum vrinae naturale, quod subterfugit sanguinis coctionem: talis est succus crudus: ergo succus crudus est materia sedimenti naturalis.

Minor est manifestissima; & ex declaratis patet. Nam si succus crudus est omni pituita crassior & frigidior: ergo magis subterfugit coctionem & mutationem in sanguinem, quam alia omnia.

Maiores est Galeni, qui 1. progn. in postremis verbis: Quicquid, inquit, in sanguinis generatione subterfugit naturae coctionem, id est in vrinis sedimentum.

A II. Materia sedimenti est similis puri: ergo materia sedimenti est succus crassus.

Quod sedimentum sit simile puri, docuit Gale. eod. loc. cit. 1. progr. in fi.

Consequentia probatur: nam, ut sedimentum sit simile puri, oportet, ut habeat conditiones puris.

Dux autem sunt boni puris conditiones: prima, ut superatum fuerit a calore naturali, secunda, ut sit ineptum nutritioni corporis: pus enim, etiam si concoctum, non nutrit.

Easdem conditiones habet sedimentum: est superatum quidem a calore innato, & tamen non nutrit. Propterea scribit Gal. com. 2. in librum Hipp. de vi. rat. in morb. acut. text. 44. coctionem excrementorum, quae cognoscitur per hoc sedimentum, non esse coctionem ad nutritionem, sed ad expulsionem. Tunc si infero.

Si materia concoquitur quidem, sed non ita, ut nutriat: ergo est succus crudus. Probatur consequentia. Quia non potest esse alius, quam vel chylus, vel pituita: sed & chylus & pituita, dum concoquuntur, transeunt in sanguinem: oportet igitur hunc succum ceteris grassissimum a calore valido superari quidem, sed potius ad expulsionem, quam ad nutritionem.

III. Ratio fortissima & demonstrativa talis est. In morbis & in corporibus sanis, in quibus non adeest succus crudus, non reperitur hoc sedimentum: contra vero in sanis & agris corporibus, ubi adeest succus crudus, reperitur hoc sedimentum: ergo materia sedimenti est tantum succus crudus.

C Consequens est claris. Antecedens probatur testimonio Gal. lib. de tot. morb. temp. cap. 5. dum explicat conditiones vrinae, quae coctionem & sanitatem in morbis pollicentur, inquit, si morbus ortum duxerit ex humoribus biliosis, non opus est apparere sedimentum, sed sufficit nebula & enzorema. Quod si morbus ortum duxerit a crassis succis, sedimentum apparens est signum coctionis. Et ne quis credat, hanc tantum vera esse in agris corporibus, in sanis autem nequaquam, legatur Gal. com. 2. in lib. prog. text. 26. clarius lib. 1. de cris. cap. 12. qui vniuersaliter de hoc sedimento, albo, laui & equali verba faciens, inquit, in sanis quidem corporibus tenui victu videntibus & exercitatis nullum apparere tale sedimentum, sed tantum in illis, qui intemperanter viuunt, ducuntque vitam sedentariam. Postea idipsum subiungit de morbis; in morbis biliosis non est necessarium apparere sedimentum, sed tantum in illis, in quibus succus crudus abundat. Quid clarius? Itaque ex his compertum existimo, sedimentum album, laue & aequale habere pro materia crassum succum.

Sed dicere aliquis potest: si ita res habet, hoc sedimentum non demonstrabit integritatem corporis valetudinem, sed potius ventriculi iccoris & venarum infirmitatem. Deinde persuadet ratio, ut hoc sedimentum appareat potius in principio & augmento morborum, quam tempore coctionis. Tertio quaerit quispiam causam, quam obrem hoc sedimentum sit album; & producit contra me eandem illam rationem, quam ego protuli contra Trusiani opinionem de chylo, quod scilicet dum transeat per

11.

Conditiones boni puris.

111.

Objectiones I.

II.

III.

Responſio
ad primam.

per iecur & sanguini miſceatur, non poſſit eſſe album. ¶ Quod ad primam rationem, dicendum, aliud eſſe loqui de ſedimento, quod emulatur ſuccum crudum, aliud loqui de ſedimento læui, albo & æquali. Illud, quod æmulatur ſuccum crudum, reſidet in fundo inſtar farinæ craſſioris, propterea tale ſignificat imperfectiſſimam coctionem & ventriculi, & iecoris, & venarum. Sed quādo hæc ſubſtantia uſque adeo craſſa reddita eſt tenuiſſima, & quæ eſt admodum aſpera & inæqualis, reddita eſt læuis & æqualis, optimam ſignificat omnium membranarum & temperationem & conſtitutionē; quin imo ſignificat nullum committi errorem externū, vel in cibo, vel in potu, vel in alijs ſex rebus non naturalibus. Si quis enim committeretur, diſtraheretur natura ab hoc officio, & ſuccus crudus, vel impermutatus excerneretur, vel ſaltem imperfecte mutaretur.

Ad ſecundam.

Ad ſecundam rationem dupliciter reſpondetur: primo, ſi ſermo ſit de ſedimento craſſo & impermutato, hoc ſane in principio & augmento multoties apparet: de hoc dicit Gal. ſect. 4. aph. com. 69. ſcribens, in principijs morborum aliquam fieri ſubſidentiam propter materiam grauitatem.

Secunda reſponſio eſt: non neceſſario in principio & augmento morborum apparere hūc ſuccum craſſum pro ſedimento: quia natura neque concoctionem, neque expulſionem aggreditur. Propterea dicebat Gal. lib. 4. de tu. val. c. 6. *vrinas tenues ſignificare naturam adhuc non aggreſſam coctionem crudorum humorū*, addit poſtea: *quæ emittuntur craſſæ & turbata ſignificant coctionem incipientem*: Quod ſi ſint clara, ſed poſtea craſſeſcant, indicant coctionem propemodum futuram.

Itaque non eſt neceſſarium, vt ſuccus crudus & craſſus in principio & augmento excernatur, ſed tunc tantum, quando vel copioſiſſimus eſt, vt non poſſit a natura totus ſuſtineri, vel quando iam incipit a calore naturali concoqui.

Ad tertiam

Ad tertium argumentum, quod de colore albo contra poſitionem noſtram productum eſt, duplex eſt reſponſio. ¶ Prima, quod nullum ſit inconueniens, materiam uſque adeo crudam & craſſam albā in ventriculo genitā a iecore & venis non alterari. Etenim præterquā quod ratio id perſuadet, experientia quoque & Galeni teſtimonium confirmat.

Experientia quidem: Nam in illis, qui pituita abundans, ſi ſanguis mittatur, pituita albicās in ſuperficie reſidet, & tamen dum ſanguini eſſet permiſta, propriam non oſtendebat albedinem Gale. etiam l. 2. de nat. fac. c. ult. inter ceteras pituitæ ſpecies acidam commemorat uſque adeo frigidam, vt non poſſit a venis ullo modo alterari: at vero ſi non poſſit alterari pituita acida, multo minus alterabitur hic ſuccus, qui omni pituita craſſior eſt.

Confirmatur, quia, ſi pus ſanguini permiſtum, album tamē per vrinam educitur, ſuccus etiā craſſus eiſdem coloris educi poterit. Dicebat Gal. lib. 6. de loc. aff. c. 4. in fin. *abſceſſus pulmonis quandoque expurgari per renes & veſicam, cognosci autem ob pus, quod deſcendit a partibus ſuperiſ, ad differentiā illius, quod excernitur ex abſceſſu veſicæ aut renum, quia illud eſt ſanguini valde permixtum, hoc autem*

A *plerumque a ſanguine ſeparatū educitur*. Quāquam autē ſi permiſtum ſanguini, album tamē retinet colorē: ergo & ſuccus craſſus idipſum poterit facere.

Sed aliam præbeo reſponſionem, & hoc quoque meum eſt placitum: albedinem hanc in ſedimento fieri poſſe ex facultate veſicæ alteratrice: vaſa ſeminalia, quia ſunt partes ſpermatice, habent vim dealbandi ſanguinem in ſemen: nam ſi mammillæ pariter mutant ſanguinem in lac, quid erit mitum, ſi veſica quoque, proprium ſeri receptaculū, illud alterare poſſit, atque illius ſedimentum in album commutare colorem. Habet, vt ſcribit Gal. lib. 1. de criſ. cap. 12. facultatem & retentricem & alteratricem ſeri: ergo poterit illud mutare: ſi poteſt, ergo mutabit in colorem album.

Dicebat idem Gal. comm. 1. prog. text. vult. ideo pus mutari in colorem album, quia continetur inter corpora ſeminalia, qualia ſunt membranae, cartilaginee, nerui, venæ, arteriæ, oſſa. Sed ſic eſt, quod etiam tunica veſicæ ſunt partes ſeminales: ergo ex ſubſtantia albedinem ibi poterunt contrahere. Et hæc de argumentorum ſolutione ſatis.

De Cauſſa efficiente ſedimenti vrinarum.

Caput. VIII.

EXiam dictis facile poteſt colligi, quānam ſit cauſſa efficiens ſedimenti vrinarum, ſive ſit ſermo de illius tenuitate, læuitate, æqualitate, figura ac calore.

Nam cauſſa efficiens eſt robur omnium earū partium, quæ quoniam modo aut tribunt materiam, aut locum, per quem, & in quo recipiatur vrina. Cauſſa efficiens.

C Idcirco primo requiritur robur ventriculi tanquā partis, quæ generet modicam ſucci craſſi portionē; ubi multa generetur, (id quod contingit, vel ex ventriculi imbecillitate, vel ex otio & crapula) vix ac ne vix quidem fieri poterit, vt ſedimentum ſit naturale, ſed iuſto craſſius erit: idipſum dicendum de iecore & venis, quæ ſi infirmum obtinent calorem, nunquam ſuccum craſſum poterunt attenuare, neque ſingulas partes penetrare, neque ad vnguem leuigare: Idcirco relinquent in eo ſtatus & vaporis crudi portionem, quæ erit in cauſſa, vt illud diuulſum, aſpetum, circulare vel alterius figuræ atque in loco minus decenti appareat. ¶ Quod ſi ipſæ partes nō ſint debiles, ſed potius a multitudine & craſſitie humorum impediuntur, poterit quidem contingere, vt ſemel vel bis bonum appareat ſedimentum, ſed intercurrente aliqua humorum colluie & impediēte facultatem caloris innati, ceſſabit ſedimentum, aut ſaltem illud improbum euadet.

D Quod ipſum fiet, ſi in tranſitu per renes & veſicam obuiam ſiāt multi & craſſi humores, qui cum vrina rapiantur.

Nec minus, vt dictum antea fuit, relinquetur hoc ſedimentum minus coctum, ſi ipſamet veſica aut intemperata fuerit, aut inſtrumentario, aut comuni aliquo morbo affecta.

Idcirco ex his colligitur, ſedimentum hoc tranſmitti ſimul cum vrina ad veſicam propter robur facultatis expultricis, vt non minus arguat alteratricem, quam expultricem validam.

D

Ex di-

Ex dictis iam facile vnusquisque potest intelligere, quomodo materia sedimenti iam propositi in febribus etiam non sint cineres humorum exultorum. vt videtur voluisse Gale. *lib. 3. de pras. ex puls. cap. 6.* Sed esse, vt dixi, crudum succum, qui in principio & augmento morbi non apparet in hoc loco, huius figuræ, substantiæ, læuitatis & æqualitatis, quia in morborum initijs & incrementis, alteratrix facultas, vel est imbecilla ex intemperie, vel est impedita ex morbis instrumentarijs, aut ex humorum multitudine & crassitie, vt propterea, cum non possit alterare, plerunque nec possit expellere. Cum primum autem calor natiuus materiam euincit, atque imminuit plenitudo, expugnantur morbi, tunc sedimentum hoc, tanquam nunc materiæ concoctæ indicium in illis apparet morbis, qui, vt dixi, succum habet crudum commixtum, in biliosis autem nequaquam.

Et ideo, si quis etiam voluerit Galeni sententiam *lib. 1. de differ. febr. cap. 6.* prolatam in bonum redigere sensum, potest commodè id facere: Inquit Galen. *sedimentum in vrinis proportionè respondere ipsi puri, quod conficitur in priuatis abscessibus*, vt sicuti in illis sit optimum pus, quando est album, læue & æquale, ita in vrinis sedimentum hoc album & æquale apparet signum facultatis venarum alterantis materiam ad substantiam puri similem. Hoc dictum conuenit cum ijs, quæ scripserat Gale. *com. 1. in librum prognost. text. ultim.* cum dicebat, quod subsidet in vrinis, esse quid puri simile. Nam sicuti pus, vt dicebatur alias, est materia quidem concocta ad expulsionem, non ad nutritionem, ad corporum alimentum: ita & hoc sedimentum est materia concocta, non ad nutritionem, sed ad expulsionem. Hæc de sedimento naturali & sanitatem significante.

De sedimento medio, inter naturale & præter naturam, & quomodo id a naturali differat.

Cap. IX.

Differentia sedimenti medi & naturalis.

Medium sedimentum differt a naturali, aut loco, aut substantia, aut læuitate, aut æqualitate, aut figura, aut colore.

Differt loco, quia aut est suspensum, aut nebula.

Substantia, quia est vel crassius vel tenuius, & propterea aliquando propter crassitiem omnino subsidet, vt ipsi fundo matulæ inhaereat.

Læuitate, quia est dissimulare, asperum diuersarumque partium.

Figura, quia erit vel circulare vel semicirculare, vel per totam vrinæ substantiam dispersum.

Colore, quia erit vel rufum, vel flauum, vel alterius coloris.

Æqualitate, quia quandoque apparebit, quandoque non.

Si igitur sermo sit de ijs contentis, quæ variant a naturali alijs omnibus, colore excepto, dico hæc habere eandem causam materialem, quam habet etiam sedimentum naturale, sed differunt causa effectiua.

Habent causam eandem materialem, quia ipsa quoque fiunt ex crudo succo.

A Differt effectiua, quia vel calor innatus nihil egit circa hanc materiam, vel imperfecte, vel plus quam oporteat.

Nihil enim egit, vbi sedimentum est album, sed crassum, vt scribit Gale. *lib. de Multis. cap. 17. paul. post prin.* instar sabæ coctæ: hoc enim sit succo crudo impermutato. Quemadmodum contingit intemperanter viuentibus, de quibus iterum Galen. *lib. 1. de alim. fac. cap. 2.* aut illis, quibus alimentum inconfectum a iecore trahitur, vt in pueris, vt scribit Galen. *lib. 1. de cris. cap. 12.*

Est aut minus coctum, quando vel ipsa *urina* est diuisa, diuersarum partium, nimis alba: hæc omnia, vt postea intelligetur, significant multi flatus cum materia crassa admixtionem, sicuti etiam sublimamenta, & nebula.

B Indicant v. vehementiam coloris ultra quam oportuit egisse idem sublimamentum & nebula: aliquando enim hæc non fiunt ex statu cum crassa pituita permixto ipsam eleuante ad superiora, vt docuit Gal. *in com. 1. in 1. prorbet. tex. 31.* Sed aliquando in corporibus biliosis, in morbis calidis ob vim caloris attenuantis materiam, quæ deinceps illi calori permixta facile ascendit. Hinc fit, vt aliquando huiusmodi sublimamēta vel nebula in corporibus biliosis & morbis biliosis sint perinde bona, atque etiam ipsa hypostasis. Testis huius rei est Galenus *sect. 4. aphorif. com. 71. nubeculam albam*, inquit, *optima coctionis esse signum.* *Lib. de tot. morb. temp. c. 5. in morbis biliosis*, inquit, *sufficit ad significandam salutem albi sublimamentum, non autem hypostasis.*

C De contentis præter naturam, deque illorum differentijs & materia. *Cap. X.*

Halenus de sedimento naturali & medio dictū. Reliquum nunc est, vt de contentis præter naturam, & de omni permissione cū vrinis sermo fiat. Contenta igitur præter naturam alia peccant ratione loci, quantitatis, substantiæ, non autem ratione coloris, sunt enim alba: alia vero peccant & ratione harum & ratione coloris: quædam peccant ratione coloris quidem, substantiæ, æqualitatis, ac læuitatis, non tamen ratione loci.

In primo genere est sedimentum album in fundo matulæ residens & firmiter illi adhaerens, cuius materia est succus crudus in maxima portione genitus ac prorsus inalteratus, huius meminit Galen. *lib. 1. de alim. fac. cap. 6.*

DIn secundo genere possunt reponi & quadam, quæ nominantur propeie sedimenta, & nonnulla, quæ potius sunt permixta vrinæ, quam sedimenta, arenulæ seu minores calculi.

Sedimenta vero sed præter naturam teste Hippo. *com. 2. prognost. tex. 28. quem est secutus Gal. in eodem com. & lib. 1. de cris. cap. 12. & com. 5. in 6. Epid. tex. 15.* sunt in triplici differentia: quædam enim crimnoides appellantur, eo, quod æmulantur farinam crassiorem: alia dicuntur fursuracea, quod æmulentur fursures crassiores: quædam squamosa, quod squamulus.

Auctor libri de vrinis & Actius & Actuar, quatuor constituunt horum differentias, quarum primam vocant orobeam vel eruinam, eo, quod imite-

Sedimentum præter naturam triplex differentia.

imitetur grana orobi vel erui: aliam crimnoideam vel simileam, quod æmuletur illam farinæ partem mediam, quam similā vocant: In reliquis duabus sedimentis, fursuraceo, & squamoso conueniunt cum Hipp. & Galen.

Ceterum si diligenter considerantur Hippoc. & Gal. verba, poterunt hi scriptores inuicem conciliari.

Sedimentum enim, quod crassiores æmulatur farinam & vnicum proponitur ab Hipp. & Galen. potest subdiuidi, quia in illo aliquæ sūt partes crassiores, rubicundiores, quasi grana erui vel orobi: aliz sunt partes minus duræ & crassæ, quæ æmulantur simillam. Qua ratione Aetios & alij duo constituerunt diuersa sedimenta. De horum causis erit sermo suo loco.

Est quoque aliud sedimentum præter hæc, ex succo crudo quidem, sed alieno humori permixtum, productum. Fit enim quandoque, ut ipsi succo crudo vel sanguis, vel aliqua ex bilis seu fluxu seu nigra speciebus misceatur, ut propterea varios suscipiat colores. Ex quo etiam fit, ut calculi, qui ex tali producuntur materia, varij sint quandoque coloris, quæ omnia luculenter notauit Galen. *com. 1. in 6. epid. text. 6.* dum interpretatur Hippocr. locum.

Contenta, quæ non hærent fundo, aut sunt in media vrinæ substantia, vel in superficie.

Et quæ sunt in media substantia, ipsa quoque vel sunt propria vel impropria.

Contenta
propria.

Propria voco, *ἐνέσσει, ἐνέσσεια* & nebulam.

Impropria vero, quæ vrinis permiscetur, pilos scilicet atque corpuscula quædam atoma.

Contentorum
impropriorum
materia.

Propria igitur contenta præter naturam sunt, quando præter vitium substantiæ, figuræ, leuitatis & æqualitatis alienos quoque susceperunt colores, ut fiant liuida, nigra, virida, flaua vel alterius coloris. ¶ Horum omnium materia potest esse duplex: aut succus crudus, sed alijs humoribus permixtus, aut simplex etiam humor nulli crudo succo permixtus. Sic fieri potest, ut hæc contenta habeant pro materia bilem siue in ventriculo, siue in iccore & venis genitam, melancholicū sanguinem, siue probe, siue semicoctum, ichores; & hæc omnia vel putrida, vel imputrida, vel vsta vel non vsta, vel naturalia vel excrementitia. De quibus omnibus fusius dicetur in tractatu de causis & præfatio, nūc enim de causis obiter dictum est.

De contentis in vrinarum superficie existentibus: & de contentorum præternaturalium differentiis a substantia desumptis, & de earum causis. Caput XI.

Quod spectat ad contenta in superficie, hæc a scriptoribus quatuor præcipue enumerantur: Corona, bullæ, spuma, pinguedo.

Ego vero pinguedinem adhuc subdiuido in eā, quæ instar olei fusa appareat, & in eam quæ exustionem est passa & proinde exsiccata, concreta in modum fursurum supernatat, id quod experientia a me est obseruatum.

Corona.

Corona nihil aliud est, quam circulus ille circumferentia vasi vrinario inherens, bullis quibusdam

A seu vesiculis plenus, qui quandoque integer, aliquando semicirculus est.

Bullæ sunt quasi minuta quedam puncta seu vesicula in superficie vrinæ apparentes non dissimili ratione ab illa, quæ in aqua apparere solet potissimum ebulliente.

Differentia
ipsius sub-
stantiæ.

Harum omnium differentiarum causæ iam ex professo erunt recensendæ, initio sumto ab vrinis, deinde descendendo ad contenta.

Et quia in vrinis notauimus substantiam, colorem, odorem, sonum, &c. incipiemus primum a substantia.

Quatuor autem eius inueniuntur differentie, duæ quidem crassarum, ac totidem tenuium.

B Sub crassis autem alias quoque repono, turbidas scilicet, sicuti sub tenuibus perspicuas: non quod existimem, id, quod docuit *Valesius 3. controuers. 24.* veritatem continere, crassas scilicet vrinas esse easdem cum turbidis, & tenues easdem cum perspicuis. Falsa enim est hæc sententia, ut & ratio & Galeni auctoritas demonstrat, quanquam hic auctor existimet, hanc esse Galeni genuinam sententiam.

Ratione probatur esse falsam, quia crassa vrina, quæ non sit turbida, est diaphana, lumen externum admittit, & oculorum acies per ipsam penetrare potest: turbida vero opposito modo se habet.

Tenuis pariter quandoque est sine vlllo nitore, & splendore: perspicua vero cum multum luminis recipiat, splendida & nitida est, ut propterea ex albis vrinis aliquæ constituantur aqueæ, quæ non sunt pellucidæ: aliz vero corneæ vel crystallinæ, quæ vere perspicuæ ac pellucidæ sunt.

C Sed quia dixi distinctionem hanc Galeno, imo Hippocrati esse cognitam, cuius oppositum sentit *Valesius*, videantur hæc loca, duo sunt præcipua: vnus in aphorismis, alter in Epidemijs, *sect. 4. aph. 69. & 70.* est sermo de ipsis duabus vrinis, in *aph. 69.* de crassis, in *70.* de turbidis: Et propterea in *69.* Hipp. vocat istas vrinas crassas & grumosas: Galenus vero recte grumosas interpretatur propter substantiæ inæqualitatem. Nam ubi grumi adsunt, pars vrinæ ratione grumi est crassa: alia pars inter grumum & grumum non est crassa: talis autem admitti lumen externum, potest esse peruia.

Sed turbata, quarum meminit in *70. aph.* sunt quales iumentorum. Sic scribit Hippocr. *Quibus vrina perturbata, quales sunt iumentorum, ijs dolor capitis vel adest, vel aderit.* Istæ sunt omnino imperiæ, quia habent equalem crassitiem secundum omnes partes.

D Alter locus in epidemijs est, *comment. primo in tertio Epid. text. quinto*, est sermo de vrinis crassis, quales apparuerunt in casu Hermocratis, quæ non subsidebant: inquit Galen. in *comment.* clarum esse has vrinas crassas, quæ non subsidebant, esse ex genere scilicet illarum, quæ turbata sunt vel turbida.

Si igitur inquit Gale. crassas non subsidentes esse ex genere turbatarum. Ergo turbata & crassa non sunt vna species, sed sunt species variæ sub vno genere. Idem videre est apud Hipp. *com. 3. in 3. epid. text. 73. circa fin.* inquit reddidit vrinam crassam

illam quidem, ceterum turbatam: Ergo crassa & turbata non sunt eadem.

Hoc autem clarius apparebit nunc, cum causæ recensentur. Nam aliæ sunt causæ crassarum, aliæ turbidarum.

Causa im-
mediata v-
rinæ cras-
sæ. Crassa igitur urinx habent causas medias & immediatas.

Immediatæ causæ sunt duorum generum: quædam sunt causæ crassitie, ut crassæ sunt: quædam vero luciditatis seu transparentie in hac crassitie ad differentiam turbidarum.

Crassities igitur provenit ex mixtione crassæ aliquius substantiæ simul cum urina, quæ permixtio crassæ substantiæ potest esse aut crudi succi, aut cuiusvis pituitæ, siue dulcis, siue vitreæ, aut muscosæ, vel alterius speciei.

Hæ autem in materiæ aut miscentur urinx posteaquam iam est elaborata, aut dum elaboratur, vel ante omnem elaborationem.

Si misceantur urinx post illius confectionem & elaborationem, cum primum urina est reddita, crassities subsidet. Idecirco siue lotium ipsum recipiat hanc materiam ex vesica & renibus, siue etiam ex capite & pulmonibus expurgantibus seipsum per renes & vesicam, hæc crassities post redditam urinam remittitur: nam quod graue est subsidet.

Qua in parte non possum Fernelij sententiam accipere, qui *Patholog. lib. 3. de urinis cap. 16.* proficitur, *urinam, cui pituita permisceatur, non aliunde illam recipere, quam ex vesica: Cum aphorismus ille Hippocratis paulo ante citatus sexagesimus nonus, sect. 4. oppositum ostendat, dum scribit: Quibus urinae crassæ, grumosæ, pauca sunt non sine febris, iuvant, si ab ijs tenues & copiosæ prodierint: maxime vero tales exiunt, quibus ab initio, aut brevi post sedimentum inest, inquit Gale. in comment. tales urinae crassæ fieri & in febribus & sine febribus expurgante natura totum corpus ab humoribus crassis per has vias.*

Quod si permisceantur crassa cum urina in ipso tempore concoctionis, concoctio aut est in principio, aut in medio, aut fine. Si in principio, urinx red dentur crassæ, quæ non facile clarescunt: si in medio clarescunt quidem, sed longo temporis spacio: si in fine, statim fere redditæ clarescunt.

Denique si permisceatur pituita ipsi, sero ante ullam concoctionem, & ante elaborationem seri, neque vlla subsequatur concoctio, in eo etiam casu statim clarescunt, subsidet ille crassus succus.

Cum itaque crassæ urinx in hoc a turbulenti distinguantur, quod crassæ sint peruiæ, turbulenti nequaquam: Idecirco explicata iam immediatæ crassitie causa, explicanda quoque causa est claritatis in crassa, & opacitatis in turbida.

Causa im-
mediata lu-
ciditatis v-
rinæ cras-
sæ opacita-
tis. Immediatam hanc causam tetigit *Aristot. sect. 2. problem. 8.* *Quærens enim causam, propter quâ aqua maris sit lucidior, quam potabilis, cum tamen marina sit crassioris substantiæ? duplicem proponit causam, unam quidem commissionem arenosæ substantiæ simul cum aqua fluuiali propter aquæ paucitatem: secunda & verior est meatuum seu pororum redditudo. Nam ubi crassa substantia habet poros secundum redditudinem constitutos, liquor ille,*

quoniam crassus, est lucidus: ubi autem pori obliqui sunt constituti, illud corpus est opacum.

Ratio est in promptu: nam ubi pori sunt obliqui, crassities est æqualis per totam materiam: ubi sunt recti, est inæqualis: nam pars habet materiam crassam, pars vero est sine hac materia. Propterea, ut dictum in precedentibus fuit sententia *Hipp. sect. 4. aph. 69.* crassæ urinx ad differentiam turbatarum grumosæ dicuntur, quia inæqualitatem habent ad differentiam turbidarum.

Quod si quis quærat causam, propter quam pororum rectitudo aut seruetur, aut non seruetur: ea non est alia, quam permixtio flatuosi vel calidi spiritus cum ipsa urinx crassitie. Vbi enim permisceatur hic spiritus, crassam materiam attenuat & illa æqualiter per omnes urinx partes distribuit, ut nulla sit pororum rectitudo, per quos acies oculi possit transire.

Mediatæ autem causæ crassitie urinx sunt vel naturales, vel non naturales, aut præter naturam.

Causæ naturales sunt *temperata frigida humida*, non tamen in summo: nam exquisitè frigida tenuè reddit urinam, minime autem crassam.

Aetas puerilis, propterea dicebat *Hip. com. 3. in 6. de morb. vulg. tex. 15.* *Post mictû concretio pueris magis: eo, quod, ut dicit Gal. in com. pueri crassas mictûs urinas, qui propterea calculis facile subiiciuntur.*

Sexus quoque muliebris, dummodo in utero non gerat: utero enim gerentes tenuiores reddunt urinas, eo quod utero existente aperto, semper crassa aliqua materia ex eo ipsi urinx misceatur. Et (ut obiter hoc dicam) hæc unica est ratio, quoniam dubia & incerta, ex qua possunt Medici arguere mulierem utero gerere. In naturales causas est quoque *amplitudo viarum & breuitas colli vesicæ*. Quam ob causam scribit *Alex. quisquis ille fuerit sect. 2. probl. 51.* mulieres calculis minus, quam viros, esse obnoxias, quod propter cetericis vesicæ breuitatem crassam facile expurgent in materiam.

Aetas senilis quoque has ipsas urinas crassas gignere solet.

Ex causis non naturalibus est primus *tempus anni, constitutio & regio frigida & humida, australis & pluviosa, intermissio exercitij, usus veneris frequens, usus ciborum crassi succi*, ut sunt placetolæ, lac, & caseus, pisces crustati, & testacei, tubera, legumina, quæ eo sunt deteriora quo in maiore accipiuntur quantitate. Ad hanc quoque causam pertinet *alij omnes errores in tempore assumendi cibi, ordine & præparatione*; in tempore somni atque eiusdem longitudine, curæ quietiam, timores diuturni ac maiores. Præ ceteris aut omnibus consuetorum alui & sudorū excrementorum suppressio crassas reddit urinas.

Ex causis præter naturam est primo *omnis morbus ventriculi & iecoris frigidus & humidus*, dum modo, ut ante dixi, non sit in summo, tunc enim tenues redduntur urinx.

Intemperies etiam frigida & humida cerebri ac totius corporis, renibus potissimum calidioribus existentibus crassas reddit urinas, præcipue vero, si adsit Gonorrhœa.

Quandoque etiam ex *intemperie calida vniuersi corporis* tales redduntur, colligatis humoribus.

Hæ sunt

Hæ sunt causæ omnes crassarum vinarum, siue A turbidæ sint siue non turbidæ.

Quod pertinet ad tenues, cum istæ quoque sint lucidæ & non lucidæ, tenues non lucidæ sunt tales ex defectu materiæ crassæ, cuius urina substantia clara sit.

Sed quæ lucidæ sunt, aliquid plus habent ignei caloris ipsammet urina substantiam subtilem ac claram reddentis: ut propterea lumen externum minimas etiam partes penetrare possit.

Hæc vero triplex est: quædam tenuis reddita & talis permanens, alia vero, quæ postquam est reddita, turbatur: prima non modo est impermissa a quacunque substantia crassa, sed neque experta est vim alicuius status, vaporis vel caloris.

Secunda autem habet permissionem alicuius vaporis, qui deorsus sub aere frigido, est in causa, ut B tenuis urina euadat crassa. Et quia euadit talis sub aere frigido ratione huius vaporis permisti, hinc sequitur, non esse Aristotel. sententiam falsam, qui lib. 4. meteor. cap. 3. paulo post prin. scribit: *Aquam & aquæ species, ut serum a sero, non crassescere*. Loquitur enim de sero absq; ullius vaporis admistione. Cum autem, quæ tenues reddita crassescunt, id sortiantur duplici modo, aut statim reddita aut aliquo interiecto temporis spacio: primæ ostendunt maximam vaporum cum urina substantia permissionem: secunda autem minorem.

Habent istæ quoque suas causas mediatas naturales, non naturales & præter naturam.

Causa naturalis.

Quod ad naturales, sunt istæ aut in temperamentis extremæ frigidis, aut calidissimis & igneis, in ætate iuuenili, sexu virili cum vasorum angustia.

Non naturalis.

Ex causis non naturalibus sequuntur tempus anni, constitutionem & regionem calidam & siccam: aliquando tamē sunt etiam in aere frigido expressis propter cutis constipationem serosis venarum humoribus.

Fiunt quoque tales in vita exercitata, vigilijs, paucis cibo atque eo quidem tenui substantia prædito, potissimum autem si ichorosus fuerit, ut sunt olera fructusque fugaces. Porus quin etiam copiosus id ipsum efficere solet.

Præternaturalis.

Ex causis præter naturam vnus tantum meminit Galenus, *cruditatis* scilicet, nam & lib. 1. de cris. 12. & *ubique locorum*, ubi de tenuibus loquitur vrinis, semper, inquit, has esse sobolem cruditatis. Avicennas Fen. 2. li. 1. doct. 3. summa 2. ca. 3 in princ. inquit, *fieri tenues vrinas & ex cruditate & ex obstructione*, quod scil. occlusis vasis crassa vrinæ substantia permeare non possit.

Valesius tamen lib. 3. controners. 24. nititur probare nunquam fieri posse vrinam tenuem ex obstructione: Sed quia illius sententia in bonum potest sensum redigi, non proponam, illius rationes, nec contra illum disputabo, sed rei veritatem proponam.

Vrina tenuis duplex in se habetur.

Vrina tenuis potest dupliciter intelligi vel ratione propriæ substantiæ, vel ratione impermissionis alienæ substantiæ crassæ cum ipsa.

Contingit igitur quandoque, ut urina sit tenuis utroque modo, quandoque vero vnico tantum.

Est tenuis utroque modo, quando adest equifita cruditas in ventriculo, iecore & venis omnibus siue adsit obstructio, siue non adsit.

Quod si contingit, ventriculi facultatem non esse imbecillam, adsint tamen obstructiones iecoris vel renum, urina erit tenuis vno tantum modo: nam ratione propriæ substantiæ potest habere mediocritatem, concoctionem aliquam: sed propter obstructiones non admittet permissionem alienæ substantiæ, & in hoc tantum sensu dicitur tenuis.

Quod autem dico de obstructione, idem intelligendum est de omni alio viarum impedimento, siue sit scirrhus, siue inflammatio, potissimum incipiens, siue calculus in renibus.

De causis diuersorum colorum in vrinis.

Caput. XII.

P Ost causas diuersitatis substantiæ vinarum, dicendum quoque est de causis diuersitatis colorum in vrinis ab albis incipiendo.

Cum vero color albus sit triplex, lacteus scilicet C cristallinus, & aqueus; Lacteus semper ex commistione sit alienæ substantiæ, siue sit ex pituita, siue ex pure, siue seminali materia.

Causa vrinæ lactea.

Cristallinus, qui est albus lucidus, quanquā sequi possit cruditatem, sequitur tamen & defectum bilis tum præsentia caliditatis. Etenim, ubi materia biliosa urina non permiscetur, calor autem agit in serosam vrinæ materiam, in albo splendor & luciditas inducitur.

Cristallina.

Idecirco albus color aqueus veræ cruditatis soboles est, ut qui & defectum bilis & caloris ostendit.

Aquea.

Post album calorem sequuntur illi, qui substantia uis continentur.

Causa vrinæ flaua.

Fiunt vero isti omnes ex admistione alienæ substantiæ, sitque hæc admistio, vel ex causa naturali, vel ex non naturali, aut ex præternaturali.

Ex causa naturali, quia in omni urina naturaliter constituta aliqua bilis portio permiscetur, quæ illam vel pallidam, vel rufam, vel subrufam reddat, auctore Gal. lib. 1. de cris. cap. 12.

Naturalis.

Ex causa non naturali sit etiam commistio alienæ substantiæ, siue quis rhabarbarum aut cassiam, aut crocum acceperit, siue etiam diureticis sit usus calidioribus, aut corporis violenta motione, vel diu ieiunium tulerit.

Non naturalis.

Nam, ut dicebat Gale. loc. cit. ex calore omnia pingua in amaram conuertuntur bilem, & amara, qualis est ipsa bilis, ex ulteriore coctione colorem quoque accipiunt magis intensum. Ex causa præter naturam vrinæ quoque flauæ vel subflauæ redduntur, expurgante iecore & venis siue critice siue symptomatice biliosos succos in febribus, siue cum, siue citra inflammationem genitos.

Præternaturalis.

Rubicundus ipse quoque aliquando sit ex causa non naturali ex potione vini nigri, in quibusdam, qui diabete laborant: sit magna ex parte ex permissione aut sanguinis, aut ichoris sanguinis cum urina.

Causa rubicundarum.

Permiscetur vero sanguis cum urina & ex causis

non naturalibus, & ex præternaturalibus. Ex causis non naturalibus, ut vehementi corporis agitatione vel pulsu, vel luctu, vel equitatione, vel nimio coitu, aut usu acrim, aromatatum, salitorum.

Causæ vero præter naturam sunt ruptura, exulceratio, siue superficialis excoaratio, *diacrasis*, quæ omnia habent proprias causas.

Viridis.

Viridis color fit vel ex permissione bilis prælinæ seu æruginosæ, quæ fit ex calore exurente, vel sequitur colliquationem eo modo, quo fuit explicatum, quando de vrinis oleosis agebatur.

Liuida & nigra.

Liuidus & niger color habent easdem causas, differentes tantum secundum magis & minus.

Hæc causarum dicebat Galen. lib. 1. de crif. cap. 12. esse tres: admistionem scil. humoris melancholici, refrigerationem, & caliditatem insignem. Nam dicebat Gale. *sicuti extrinsecus videmus humana corpora ex calore solis & ex intensa refrigeratione nigrescere, ita, inquit, & vrina.*

Ceterum hæc sententia, nisi sano modo intelligatur, falsa est.

Quod vrina ratione propria subijta neque a calido, neque a frigido possit nigrescere.

Vrina ratione propriæ substantiæ neque a calido, neque a frigido, potest nigrescere.

Non a calido, quia quæ nigrescunt a calido, ut docuit Aristot. lib. 4. Meteor. & confirmavit Gale. lib. 8. de metab. med. cap. 5. debent esse exhalabilia, propterea aut sicca, ex quibus exhalat fumus, aut pingua, ex quibus fuligo: aut vinctuosa, ex quibus nidor. Vrina non est corpus exhalabile, sed euaporabile. Dicebat enim Aristot. eod. lib. 4. Meteor. aquam & aquæ species, inter quas est serum, esse euaporabilia: itaque a caliditate non potest nigrescere.

Sed neque a frigiditate: nam vaporabilia a frigiditate condensata albescunt, ut apparet in glacie, niue & ceteris.

Igitur oportet unicam esse nigredinis vrinarum causam, permissionem scil. humoris nigri, qui tamen tripliciter fieri potest: aut scilicet naturaliter, in quo casu vrinae sunt nigrae absque vilo vitæ periculo, absque febribus, quod ego pluries experientia obseruavi.

Aliquando præter naturam, & hoc tripliciter, aut natura expurgante in morbis nigrum humorem, siue critice, siue symptomatice; aut exuræte portionem illius bilis, quæ miscetur cum vrina, & convertendo illam in succum melancholicum: aut denique extinguendo spiritum & calorem sanguinis, quo extincto, sanguis ipse non minus in venis, quam extra venas nigrescit, qui deinde permixtus vrinæ reddit illas liuidas aut nigras, sicque omnis vrina nigra fit ex admistione nigrae substantiæ, sed ex triplici causa.

De causis vrinarum copia, paucitatis, odoris, caliditatis, frigiditatis, soni, clari & obtusi. Caput XIII.

Causa naturalis vrinæ copiosa.

Hæc de coloribus. Quod pertinet ad copiam causæ, cur vrinae reddantur copiosæ, potest esse naturalis, non naturalis & præter naturam.

Naturalis est temperies iecoris & renum calidior ac vasorum amplitudo.

A Non naturalis est potus copiosus, præcipue vero vini aut aquæ, quæ sint tenuioris substantiæ, usus diureticorum, olerum, fructuum, sudoris suppressio alicui excrementorum retentio, aeris frigiditas, quæ cutim constipat, ac corporis quies atque otium.

Non naturalis.

Causæ præter naturam sunt iecoris & renum intemperies calida vel simplex, vel cum materia acris & salsa, ut contingit in diabete: aut feri colliquatio, ut contingit in febribus: aut etiam externa caliditas capiti superueniens, quæ cerebri humiditates colliquat, ex qua plures fieri vrinas docuit Hipp. lib. 2. de morib.

Præternaturalis.

Paucæ vrinae ex oppositis fiunt causis, renum & iecoris frigida intemperie, vasorum angustia, alio admodum fluida, sudoribus copiosis, aere calido, vita exercitata, potione pauca & adstringenti, obstructione, inflammatione, abscessu, calculo, pure, carne adnata, grumo sanguinis & reliquis id genus viis vrinae impediendis. Nimia quoque corporis exercitatio per febres ardentes aut hecticas solet vrinae paucitatem efficere.

Causa vrinæ paucæ.

Odor vrinae nullus fere naturaliter esse solet.

Si foetidus euadat, id potest fieri ex causis non naturalibus & præter naturam.

Ex causa non naturali, ut corruptione ciborum in ventriculo, ex quacunque tandem fiat causa, ex usu asparagorum, atque ex diutina vrinae in vesica retentione.

Causa vrinæ foetidis.

Causæ vero præter naturam sunt admistio cuiuscunque humoris putrefacti, siue ex disrupro abscessu, siue ex humoribus per febres ipsas putrescentibus.

C Odoratae aliquando redduntur ex usu sceniculi & terebinthinæ, siue ex larice, siue alia arbore.

Odorata.

Calidae aliquando redduntur vrinae ultra naturalem modum, ut ex ingenti calore vasa vitrea scindantur, quod ego experientia vidi: & hæc fiunt ex ingenti febrili calore: alia vero sunt vel tepidae, vel frigidae: & tepidae quidem si cetera mitem ostendant morbum, fiunt ex defectu caloris præter naturam: si vero perniciosum, tepidae & frigidae ostendunt extinctionem caloris innati.

Calida.

Denique quod pertinet ad sonum, quæ dum minunguntur, clarum edunt sonum, indicant abundantiam caloris innati, facultatemque validam expellentem. Clarus fit sonus ex forti collisione vrinae cum mutula. Quæ vero obscurum habent sonum, indicant aut caloris & spiritus defectum, aut ipsiusmet substantiæ vrinae oleositatem & crassitiem. Quæ omnia quid boni vel mali significare possint, dicetur suo loco.

Sonantis.

De causis vrinae crassioris in vrina, item sursum, squamularum, arenarum, lapillorum, puris, saniei, sanguinis & caruncularum. Caput XIV.

Verfabimur iam in causis contentorum, ijs scilicet, quæ hæcenus non fuerunt declarata, & eorum etiam, quæ quouis modo vrinae permiscuntur. Cum igitur in fundo resideat crassum sedimentum materia similis farinae crassiori, sursum, squamulae, arenae, lapilli, pus, sanies, sanguis & carunculae.

nuncula: hæc omnia suas habent causas. Et sedi- A
mentum quidem crassum, ut hactenus quidem est
dictum, habet pro materia succum crudum, qui sit
vel ex imbecillitate alteratricis ventriculi & venarum, vel ex proprietate ciborum crassi succi, vel ex
copioso alimento.

Farinacei. De sedimento, quod crassorem æmulatur farinam, habetque portiones granis erui aut orobi similia, maxima est apud me difficultas. Scio equidem Gal. *com. 2. in lib. prog. text. 28.* voluisse talia fieri sedimenta ex calore colliquante, sed vario modo agente in substantiam, quæ colliquatur.

Cum enim substantia, quæ colliquatur, sit pinguedo & caro, & tam pinguedo, quam caro possit esse vel recens & mollis, vel vetusta & indurata, inquit Galen. fieri sedimenta, quæ crassiorem imitantur farinam, quando utraque hæc pinguedo, B
utraque hæc caro colliquatur & peruritur: nam mollior transit in ichorem, durior exsiccatur, ita, ut æmuletur grana orobi, quemadmodum etiam in faragine mollior pinguedo, & caro dissolvitur, durior exsiccatur.

Ceterum, utrum vivente corpore possint hæc fieri necne, disputabitur in proprio tractatu de præfatio. Præterquam quod ipsemet Gal. *lib. 3. de caus. sympt. cap. 2. in si.* non videtur sibi constare dum de carnis colliquatione verba faciens inquit, illam potius ad alvum, quàm ad urinx vias tendere, posteaquam illius crassities non permittit, ut per renes transeat. Idcirco *com. 3. in lib. 3. de morb. vulg. text. 74.* proficitur quidem se plerumque pingues vidisse urinas, colliquationem autem carnis inquit apparere in excrementis alui, perspicue in febribus pestilentibus, non autem in urinis: sed de hoc suo loco iterum disputabitur.

Furfuracei. Sedimenta *furfurea* sunt ex epidermide sublata a membranis aut vesicæ, aut venarum & arteriarum, siue pariantur scabiem vel psoram, siue ingentem ulsionem & exsiccationem.

Squamula. *Y. Hipp.* *Squamula* vero pariter portiones sunt membranarum aut vesicæ, aut venarum & arteriarum, sed profundiores. Idcirco non scabiem modo, sed vlcus significare possunt. Idipsum facit pus & casticula, siue ex renibus, siue ex alia parte prodeat, utramque enim vlcus significat.

Sanguinis. Sanguis vero ex ulcere, ex diapedesi atque anastomosi vel pudendi, vel colli vesicæ, vel ipsius vesicæ, aut renum, aut aliarum partium excerni potest.

Seminis. Semen habet pro causa illas partes, quæ alias a nobis prolata sunt: ubi de gonorrhœa fuit sermo, imbecillitatem scilicet retentricis, aut irritamentum expultricis a quacunque tandem causa.

Arenularum & calculi. De arenulis & calculis illud in præsentia dixisse sit satis, habere utrumque pro materia crassam pituitam: pro causa effectrice vel calorem exsiccantem, vel collisionem, vel compressionem corporis supra corpus, materiæ supra materiam.

Quid equalitas & inequalitas contentorum in urinis denotet: Quid bulla sint, spuma & corona seu circulus: quæ tum harum, tum pilorum in urinis & pinguedinis causa. Cap. XV.

Quod vero pertinet ad contenta in medio, hypostasin scilicet enzorema & nubeculam, pilos & atoma, hæc paucis nunc sunt expedienda.

De causis enim sedimenti suspensi & nebulae satis superque antea dictum fuit: illud tantum in præsentia addidisse sufficiat, quod ad æqualitatem & inequalitatem pertinet, videtur, æqualitatem firmam ac stabilem indicare affectionem: inequalitatem vero incertam ac variam: atque ideo, si æqualitas sit contenti naturalis, optimum est signum: si in contento præter naturam deterius est signum, quam ipsa inequalitas.

Quod ad pilos pertinet, *Hippoc. sect. 4. apb. 76.* videtur voluisse pilorum causam, ad renes esse referendam. Galen. *lib. 6. de loc. aff. cap. 3.* materiam pilorum inquit esse crassam & viscidam: locum autem in quo generantur, esse venas: motus est Gale. ad hoc credendum ex pilorum longitudine, qui aliquando videntur sesquipedales: mihi tamè probabilius videtur, longitudinem fieri in vasis veteribus, exsiccata potissimum materia in renibus, non tamen in formam arenularum, sed ita, ut dum descendit a renibus in vesicam, protrahatur & extendatur eodem modo, quo faciunt artifices vitrorum, dum materiam vitri viscidam in filamenta extendunt subtilissima, aut atoma, aut corpora, quæ per urinam volitant: præcipue vero in ima parte, sunt reliquæ humorum putrescentium, quæ in venis relictæ quotidie magis exsiccantur: Idcirco ubi materia fuerit calida, rubicundiora & flauiora sunt hæc corpora, & per totam urinx substantiam dispersa: ubi vero frigidior, obsidet locum hypostasis, suntque minus colorata.

In superficie est pinguedo, spuma, bulla, corona seu circulus.

Pinguedo semper sit ex adipe, siue circa renes, siue circa alias partes colliquato. Et si quidè adeps fuerit colliquatus ex renibus, multa apparet & cõsertim emittitur pinguedo: ubi ex alijs partibus, neque multa est, sed in guttas distincta, propterea paulatim emissa.

D Spuma & bulla unam & eandem habent causam: Etenim bullæ sunt quasi multæ vesiculæ distinctæ: spuma est aggregatum ex multis vesicis sibi inuicem coherentibus.

Spuma & Bulla.

Materia utriusque est crassa & viscida, magna ex parte pituitosa: aliquando tamen est humiditas substantifica partium corporis solidarum, quæ colliquata & pituita cõmixta potest esse materia spumæ: Hæc veritas colligi potest ex *Hipp. sect. 2. apb. 43.* quando scribit: *Ex his, qui strangulantur & submerguntur, nondum autem mortui sunt, non renalescunt, quibus spuma circa os fuerit.*

Si spuma ex sola fieret pituita, nulla est ratio, quamobrem in apoplecticis, qui iam motum & sensum amiserunt, spuma apparente deplorata sit salus.

salus. Sed quia, dum sublata est respiratio, calor cordis suffocatus agit in materiâ pulmonum substantificam: illam colliquat & ad os impellit, hinc fit spumam illam exitiale signum haberi.

Mercurialis opinio de spuma falsa

Itaque potest spumæ materia, quæ in vrinis apparet, habere pinguedinem admixtam, imo vero & alios humores, ita, vt hæc in parte deceptus sit doctissimus Mercurialis, qui putauit omnem spumam esse albam, cum lōge aliter rem ipsam vnusquisque experiri possit in spuma ictericorum, siue in sanguine, siue in vrinis appareat.

Causa spumæ efficiens

Causa vero efficiens est immediata & mediata. Immediata vnica est, status scil. vel vapor crassus crassæ materiæ commistus, qui exitum sibi parat, non tamen erumpit.

Mediatæ vero causæ tres sunt: calor, motus, & vtrumque simul.

Calor fundit materiam ac vapores generat, sicuti in lebece feruente.

Motus materiam agit, rarefacit, vt præbeat spiritui ingressum, sicuti in mari a flatibus agitato.

Calor & motus simul agunt in spuma circa equorum os excitata, cum in cursum concitantur.

Addit Mercurialis frigiditatem. Ceterum frigiditas potest quidem esse causa conseruandi diu spumam, illam vero generare non potest.

Coronæ

Denique coronæ seu circulus ille, qui ambit totâ vrinæ superficiem circa peripheriam seu circumferentiam: ita tamen, vt bullæ quædam parvæ excitatæ ad differentiam spumæ & aliarum bullarum sint potius sub superficie, quam supra vrinæ superficiem.

Coronæ causa

Opinio Montani

De causa huius coronæ magna est altercatio.

Montanus in suo de vrinis arbitratus est materiâ huius coronæ esse humiditatem substantificam ex membris colliquatam vapore, aut flatu repletam: eo, quod magna ex parte hic circulus in hecticis febribus apparere soleat: sed quia talis circulus fit quoque in corporibus pituitosis minime extenuatis per tempus autumnii aut hyemis, hæc Montani opinio locum non habet.

Argentarii

Argentarii pariter in suo de vrinis causam retulit in humorem melancholicum, qui tamen etiâ si durus vel siccus, attamē non est viscidus, vt ad bullulas generandas videatur idoneus.

Aulorii

Idcirco mihi probabilius videtur affirmare, coronam hanc ex mistis ad inuicem melancholia ac pituita fieri, quam ex sola melancholia. Nam vbi sola sit pituita flatu vel vapore repleta, faciet spumam potius aut bullas: vbi sit sola melancholia, petet fundum. Vbi vero pituitæ viscidæ & flatu repletæ aliqua succi melancholici portio misceatur, ista neque erit supra superficiem, neque inum petet, sed locum iam propositum, qui coronæ datus est, occupatus.

De vrinarum usu & præsagijs, ac primum quæ potissimum ea sint, quæ ex vrinarum differentijs possint demonstrari: Quæq; vrinæ intemperiem calidam communem & consequenter febrem ostendant.

Caput XVI

Vrinæ vniuersæ duplex

Quæcunque de vrinarum natura, differentijs & causis hæcenus dicta sunt, omnia tandē

A in vsum aliquem medicum dirigitur.

Duplicem autem præstant vrinæ vsum, vel vt causæ sanitatis, vel vt signa.

Quamquam enim non ignorem, multiplicem esse vrinarum vsum in superandis humani corporis malis, intrinsecus quidem pro dispnæ, obstructionibus varijs: extrinsecus pro alopecia alijsque cutaneis affectionibus: De quibus meminit Gale. potissimum lib. 10. de simpl. med. facul. cap. propr. hæc tamen omnia silētio obuoluemus, versabimurque in vrinis tanquam signis, non causis.

Docebo autem tria potissimum hæc in parte: Primo quidem, quæ sint ea, quæ nobis ab vrinarum differentijs indicari possunt: Secundo, per quas vrinas singula indicentur: Tertio, quis sit modus & ratio certum ferēdi iudicium ex vrinis circa omnia indicata.

B

Quod igitur ad primum pertinet, quamquam vrinæ, utpote quæ & generantur & immutantur a causis naturalibus & non naturalibus, possunt consequenter nobis manifestare attinentia ad res naturales & non naturales, nihilominus in his non versabimur, sed tantum indicium quætemus rerum, præter naturam: his enim cognitis, non est difficile consequi qualis sit status rerum naturalium & non naturalium.

Quod igitur ad res præter naturam, vrinæ ostendunt, & præsentia & futura.

Res præter naturam quas vrina ostendunt.

Cum autem ex præsentibus sint morbi, morborum causæ & symptomata: atque in morbis ipsis sint non modo genus & subiectum, quæ pertinent ad ideam, sed & magnitudo & motus, & mos, ex vrinis hæc omnia dignosci possunt, neq; solum dignosci possunt in genere, sed & in specie.

C

Demonstrant enim vrinæ morbos omnes in intemperie & cum & sine materia, morbos in mala compositione, atque in soluta vnitæte.

Ostendunt quoque varia symptomatum genera & ad actiones læsas, & ad qualitates mutatas, & excrementa spectantia, quæ omnia sigillatim spero me ostensurum.

Ex futuris prænuntiant salutem aut mortem, tempus salutis aut mortis, ac denique modum ipsum.

Cum igitur profiteamur hæc omnia ex vrinis cognosci posse, reliquum est, vt sigillatim hoc demonstremus, primo in morbis in intemperie absq; materia, deinde in alijs omnibus sigillatim & ordinate.

D

Principio igitur calida intemperies absque materia vel est communis, qualis est febris: vel est determinata, & hæc quandoque est cum febre, quandoque sine febre.

Quæ vrinæ morbos in intemperie absque materia significent.

Determinata vocatur, quæ ortum ducit ex cerebro, pulmonibus, pleura, aliaue simili parte, siue cum inflammatione, siue citra eam.

Intemperiem calidam communem ostendunt vrinæ coloris ruffi & sub ruffi, crocci, rubei & sub rubei, viridis, atque etiam quidam atrii, qui sunt exustione: præterea colliquatio in superficie natans, vrina omnis oleosa, sedimenta atomosa, surfuracea, squamosa: insuper calor insignis vrinæ nuper emissæ: aliquando etiam paucitas, quandoque nimia

mia copia: denique acrimonia inter exūdum. Hęc omnia igneam significant caliditatem per vniuersum corpus distributam, ideo sunt signa omnium febrium, quatenus sunt intemperies calida & sicca, nō quatenus fiunt ex hoc vel illo humore.

Quæ febris.

Est tamen aliquod inter hæc discrimen. Nam ephemeræ febres ex urinis tantum cognoscuntur ruffis vel subruffis, nisi fiant ex cruditate: hoc docuit Galen. *lib. 1. de art. cur. ad Glauc. cap. 2. lib. 8. de meth. med. cap. 2. & lib. 1. de cris. cap. 12.* In ephemeris febribus tales reddi urinas ob calidam intemperiem, quæ urinam bile permixtam reddit, coloratorem.

Cetera autem, quæ iā dicta sunt, ostendunt non modo febres, ut sunt intemperies calida & sicca. Sed etiam ut intemperies maxima calida & sicca: idcirco significant ardentissimas febres, quæ aliquando in marasimum transeunt. Istæ enim, ut docuit Gal. *lib. 10. de meth. med. in fin.* habent colliquationem connexam non modo pinguedinis, sed etiā carnis mollioris, ut propterea non tantum pinguedo supernatet, verum etiam humores, qui in venis sunt, colliquentur, ut propterea circa harum febrium initia urinx reddantur copiosæ humoribus ipsis in serum solutis, ut docuit Gale. *lib. 3. de caus. sympt. cap. 2. in fin.*

Fiunt quoque oleosæ colliquatis ipsismet humoribus crassioribus, ac lotio permixtis, qui quidem, si sint biliosi flauī, faciunt urinas citrini coloris, sed crassas: si sint porracei virides, urinas quoque reddunt virides, quæ omnes oleosæ dicuntur, suntque, ut dixi, insignis ardoris signa.

Exustis etiam atque exsiccatis ipsidem humoribus atoma apparent.

Quod autem scribit Gal. *com. 2. in lib. prognost. text. 28.* de illis sedimentis grana orobi æmulantibus, quæ vult fieri ex colliquatione & vitione carnis & pinguedinis, examinabitur infra suo loco, hæc enim Galeni sententiam non admitto.

Quod vero pertinet ad sedimenta furfuracea & squamosa, in his quoque aliquam habeo difficultatem: Gal. *codem loco citato, com. 2. in lib. prog. text. 28.* quod etiam repetit *com. apb. 77. sect. 4.* vult hæc duo sedimenta esse signa ardentissimæ febris, eo quia calor febris colliquatis iam humoribus consumpta carne & pinguedine molliori, venas etiā vsq; adeo exsiccet, ut in illis quasi lepram aut psoram inferat: sicut veto in lepra & psora externam cutem afficiente squamulæ & furfures decidunt, ita inquit Gal. ex venis ipsis a flammeo calore exsiccatis decidunt furfures & squamulæ.

Hæc sententia neque rationi, neque ipsimet Galeno est consentanea.

Non rationi, quia in viuente animali tunica venarum interior nusquam & nunquam erit vsque adeo sanguine vacua, ut igneus calor præ nimia siccitate possit in illis rimas inferre, scabiem aut lepram inducere.

Propterea dicebat *idem Galen. lib. 10. de meth. med. in fin.* in marasmo partes fibrosas & membranosas nunquam posse viuente animali colliquefcere, ut ex illis aliquid decidat. At vero venæ ipsæ constant ex fibris & membranis ex semine genitis: itaq;

A viuente animali ad hanc non poterunt duci affectionem.

Propterea Hippoc. *sect. 4. aphorism. 77.* loquens de hoc sedimento furfureo, inquit fieri ex vesica scabiosa, & *aphor. 81. sect. eiusdem* loquens de sedimento squamoso, inquit fieri ex vesica ulcerata.

Sed quia *idem Hippocrates lib. 2. progn. text. 28.* proponit hæc duo sedimenta, furfuraceum & squamosum tanquam pessima, non videntur eo tantum nomine mala iudicari, quod sequantur vesicæ scabiem aut vlcus. Idcirco ego puto sic interpretandā Hippocratis sententiam. Omnia sedimenta furfuracea & squamosa fieri ex vesica aut scabiosa, aut vlcerata.

Ceterum scabies & vlcus, aut sunt affectus diurni, aut acuti & breui temporis spatio inducti ex vehementia febris.

Quando sint affectus diurni, nihil aliud significant, quam ipsius vesicæ laborem.

Sed si in febribus ardentissimis hæc fiant, pessimum sunt signum, talem scilicet febris esse caliditatem, aut humorum acrimoniā, quæ possint breui etiam temporis spatio vesicā ipsam scabiosam aut vlcerosam reddere: hoc autē fieri posse docuit Galen. *lib. de cib. boni & mal. succ. in princ.* qui scribit, in ea pestilentia acres humores vesicam plerisque exulcerasse.

De his etiam urinis loquitur Hippoc. *comment. 2. in lib. 1. de morb. vulg. text. 7. 8. & 41.* quando inquit, in ea constitutione factas esse urinas stranguositas nō nephriticas, quod scilicet, propter humorum prauitatem, qui in venis abundabant, cum labore excernerentur, non autem propter antiquum aliquod vitium renum vel vesicæ.

Quod si quispiam quærat modum distinguendi furfuraceum sedimentum & squamosum factū ex primario vesicæ affectu, ab eo, qui fit ex ardore febris, non audiat Gal. (cogor libere meam sententiam proferre) *sect. 4. apb. com. 77.* qui scribit, in hoc differre urinas furfuraceas, quæ sunt ex vesica, ab illis, quæ sunt ex venis, quia primæ sunt crassæ, secundæ vero tenues. Mihi hæc sententia non probatur, quia in febribus ardentibus, cum exuruntur & colliquantur humores, ut ad vesicam tendant, & illam exulcerent, urinx sunt necessatio crassæ, virides, ruberæ, liuidæ, nigræ, ut docuit Galen. & Hipp. *comm. 2. in lib. 1. epid. text. 41.* Distinguentur itaq; potius ex ipsamet febris vehementia, aut febris carentia. Nam si sine febre aut exili sedimenta hæc appareant, diuque ab apparuerint, labor est primarius vesicæ: si vero per febres exurentes hæc fiant, secundaria est vesicæ affectio, primaria autem calor venarum flammeus.

Quæ urina calidam intemperiem in partibus determinatis, & in quibus eandem existere, & quomodo significant. Cap. XVII.

H Actenus est ostensum, quales nam urinx cōmunem calidam venarum intemperiem ostendant, id ipsum iam in partibus determinatis faciendum.

Et sane, quod pertinet ad iecur, renes & vesicam, nulla

nulla potest esse dubitatio, quamobrem ex vrinis harum partium intemperies non cognoscatur.

Cum enim, ut docuit Gale. *sect. 4. apb. comm. 77.* vrina in iecore generetur, in renibus percoletur, in vesica retineatur, idcirco harum partium temperie potest significare. Ideo Hipp. *com. 2. prognost. text. 37.* posteaquā declarauit, quidnam significant varix vrinarum differentia circa statum venarum totius corporis, inquit cauendum esse, ne vesica ipsa aliquam talem habeat affectionem, ex qua vrina iam proposita emitti possint.

Vrina caliditatem iecoris, renum & vesicae demonstrat.

Ita vero vrina, quæ iecoris, renum, & vesicæ caliditatem significant, non differunt a prioribus, sunt in colore ruffa, subruffa, rubra, & subrubra: vides, atræ, oleosæ cum pinguedine in superficie, cum sedimentis denique fursuraceis & squamosis, & (si Gale. credimus) carunculas quoque, in modum grani hordei, continenibus.

Et sane, quod pertinet ad colliquationem, hanc fieri ex renibus, docet Hipp. *sect. 7. apbor. 35.*

Sed quia pinguedo fit ex colliquatione totius differt hæc, quæ ex renibus, a priore, eo quod hæc multa & confertim excernitur ac supernatat. Sic docet Hippoc. & Galen. *loc. cit.* quæ vero fit ex toto, paulatim & sensum emittitur.

Vesicam ulceratam.

Quod etiam pertinet ad fursuracea & squamosa sedimenta, hæc fieri ex vesica exulcerata, propter calidam intemperiem, docet Hipp. *sect. 4. apb. 77. & 81.*

De illa autem colliquatione, quæ grana hordei æmulatur a Gale. proposita *comment. 5. in 6. Epid. text. 15.* magnam habeo dubitationem: scribit enim colliquefcere aliquādo carnem lienis, iecoris, renū, atque adeo ipsum adipem. *Vbi colliquantur lien, iecur vel renes,* inquit Galenus, *sedimenta in se continent materiam hordei grana æmulantem: sed hoc discrimine, ut in colliquato liene sint nigriora, in colliquatis renibus carnosiora, in colliquato iecore minus carnosia.*

Hæc sententia mihi dubia videtur: non ignoro quidem, quod experientia etiam comprobauit, per modum ulcerationis, carnes renum per vrinas purgari: per colliquationem veto id fieri, non facile assequor: quandoquidem ex carne molli colliquata tenuis humor exprimitur, qui vrina permixtus, potest quidem colorem & substantiam immutare, sed carnis formam & substantiam nunquam æmulabitur, quia duritiem contrahere non potest. Ex carne autem duriore, nisi separetur per modum ulceris, nihil potest colliquari, quod ad vrinas descendat. Docebat Galen. *lib. 10. de med. meth. cap. ult.* carnes humidæ igni appositæ multum quidem humoris emittere, qui super prunas liberaliter effunditur, exsiccatas, inquit, tandem in halitum digeri, humorem vero non effundere: propterea nullo modo inuenio, cur ex colliquatione lienis, iecoris aut renum carnosia appareant sedimenta. Idcirco cenfeo quidem ex harum partium intemperie carnem humidiorē, ut dixi, colliquari, & si quidem fuerit lienis, vrinas reddi nigriores: si iecoris & renū, fieri rubicundiores ac crassiores.

Differt autem hæc colliquatio ab ea quæ est in toto, quia neque necessario adest febris ardens, ne-

que corpus usque adeo consumptum, sicut in colliquatione totius.

Certum igitur est, ex propositis vrinis harum partium calidam intemperiem cognosci.

Sed de alia aliqua subest difficultas. Nam docebat Gal. *lib. 1. de cris. cap. 7.* vrinas venarum affectiones significare. Et *comm. 2. in 1. Epid. text. 44.* scribit, pro dignoscendis venarum affectionibus, vrinas esse inspiciendas, in affectionibus autem ventris alui excrementa: in affectionibus thoracis sputa: in affectionibus cerebri narium excrementa. Et *comment. 2. in libro prognost. text. 26.* quæcunque de vrinis scribit Hippocrates, inquit Galenus, accommodari morbis febriculosis. Idcirco in affectionibus cerebri, aut pulmonum, aut aliarum id genus partium, quæ sunt sine febre, vrinas non esse attendendas.

Ergo tamen aliter sentio, habeoque rationem & auctoritatem.

Rationem quidem: nā vrina, ut antea fuit probatum, duplex est. 1. est serum iecoris. 11. est serum humorum, quia iam in venas partium sunt distributi, quod fuit ipsorum humorum vehiculum. De hoc secundo sero loquitur Galen. *comm. 5. in lib. 6. epid. text. 14. in princ.*

Quarum partium intemperies vrina demonstrat.

Itaque hoc serum, quod accedit ad partes debilitatas, quandoque recedit & per vrinas purgatur, & tunc potissimum, quando partes calida laborant intemperie: nam ex calore colliquantur humores, ex colliquatione funditur serum & euacuitur.

Itaque hoc serum ostendit intemperiem earum partium, quarum fuit serum, propterea, quia fuit serum & pulmonum, & cerebri, & aliarum id genus partium, poterit quoque earum partium intemperiem significare.

Cognoscetur autem hoc serum venarum contra distinctum a sero iecoris, ex copia, substantia, colore.

Distinctio sero venarum & iecoris.

Ex copia, quia vbi multum fuerit serum respectu potus assumti, necessarium est humorum serositatem tunc colliquari.

Ex substantia, quia est crassius, nam diu versatū est cū humoribus: propterea, quoad colorem multo melius etiam præ se fert colores humorum, quā serum iecoris. Idcirco Gal. *sect. 1. apb. 12.* concedit in pleuritide inspiciendas vrinas: Id ipsum, inquit, faciendum in affectionibus ventris pulmonum atque aliarum partium, *comment. 2. in 3. epid. & in prognost. aperte scribit, non modo corpus per vrinam purgari, sed etiam aliquando mutari conditionem, ut ea, quæ debent per ventrem purgari, purgentur per vrinam, & quæ per vrinam, tendant ad ventrem.* Ex quo colligimus posse serosam humiditatem a partibus determinatis secedere, atque illarum intemperies declarare.

Quod si aliquando Gale. *com. 2. progn. text. 26.* scribit in affectionibus absque febre non esse inspiciendas vrinas, triplex potest dari solutio.

An in affectionibus absque febre vrinas inspicienda.

Prima Gal. tunc respicere ad serum iecoris, non ad serum venarum.

Secunda Gal. hoc tantum voluisse, vrinas non ostendere coctionem vel cruditatem humorum, quæ sunt in partibus determinatis, posse tamen intemperies ostendere.

Tertia,

Tertia, vrinas quidem non ostendere affectus partium determinatarum sine materia, nisi affectus communicetur omnibus venis. Quod est dictum, nisi fuerit visque adeo magna, ut proprium possit colliquare serum, potest autem colliquare, & ad vesicam mittere cum visque adeo magna sit, ut omnibus communicetur venis.

Qua vrina, quas partes frigida intemperie laborare offendant. Cap. XV 111.

DE frigida intemperie eodem modo pertractando, quo hactenus de calida, inquirendo scilicet quosnam locos intemperie frigida affectos demonstrant vrinæ, & quales nam earum sint differentia, ex quibus intemperies cognoscitur.

Quod igitur ad locos pertinet, cum sint venæ communes, vel determinatae partes, de venis communibus nulla est difficultas.

Cum enim vrinæ passiones ostendant venosi generis, consequenter & calidam & frigidam demonstrabunt affectionem.

Sed de partibus determinatis id ipsum occurrit dubium, quod etiam in intemperie calida. Nam cum partes determinatae sint, aut illae, in quibus vrina vel generatur, ut iecur, vel percolatur, ut renes: vel retinetur, ut vesica: de his nullum pariter est dubium, quo minus illarum frigida intemperies ex vrinis deprehendi possit. De ceteris partibus est disputatio.

Dicam primo, per quasnam vrinæ differentias venarum aut partium iam dictarum intemperies deprehendi possit: deinde ad illud, quod difficultatem habet, me convertam.

Cognoscitur itaque intemperies venarum ac propositarum partium ex vrinis albis, tenuibus. Sic scribit Gal. lib. 1. de cris. cap. 12. has venosi generis cruditatem significare. Id ipsum scribit Hipp. & idem Gal. lib. 2. de tuenda valet. cap. 4. proorbet. princ. & com. 2. in librum progn. text. 3. 2. in princ. Id ipsum faciunt vrinæ aut contentis carentes, aut habentes contenta admodum diuulsa, inaequalia, aspera, coloris albicantis.

Cognoscuntur praeterea intemperies dictae ex bullis. Sic Hippoc. scribit 7. aph. 3. 4. quibus in vrinis bullae insident, morbum renalem & longum significant. Addit Gal. in comm. bullas fieri a spiritu flatuoso, qui est signum frigidae agnitudinis venum.

Stranguria quoque signum est frigiditatis vesicae. Ex frigida enim vesicae intemperie vrina minime retineri potest, idcirco stillatim excernitur, ut docuit Gal. in com. 48. 7. part. aph. Alba autem & crassa vrinæ cum sedimentis etiam crassis frigiditatem quidem significant, sed cum materia de qua dicemus suo loco.

Ceterum, quia stranguria non modo fit ex frigiditate, verum etiam ex acrimonia vrinæ & ex spiritu flatuoso & ex inequali intemperie, distinguetis stranguriam ex intemperie frigida a ceteris omnibus, quia fit sine dolore, sine ardore, ac sine alui alia difficultate.

Ceterum, ut dicebam, sicuti de his locis clara res est, ita dubitari potest & quaeri, an propositae vrinæ

possint ostendere factam ventriculi intemperiem, aut cerebri, aut vteri, aut totius corporis: Idcirco possint nobis significare aut lethargum, aut alios cerebri soporiferos affectus, cachexiam, leucophlegmatiam, aliosque id genus frigidos affectus.

Quod pertinet ad ventriculum; licet communissima videatur omnium sententia, crudas vrinæ ventriculi affectionem significare, nihilominus hoc non videtur adeo certum: nam quod pertinet ad ventriculum, omnis vrina potest esse alba & tenuis substantiae, serum n. in ventriculo nullam recipit bilis missionem, propter quam reddatur coloratum, sed est aquosior pars alimenti, idcirco etiam in calidioribus ventriculis alba. Non itaque valet consequen. Alba est vrina. Ergo ventriculus laborat intemperie frigida.

Ad iecur pertinet, aquosam hanc substantiam & coloratam, & si tenuis fuerit, crassiorem reddere. Idcirco nullibi apud Gal. reperio crudas vrinæ ventriculi frigiditatem significare, sed semper iecoris & venarum.

Duo tamen sunt modi, quibus ex crudis vrinis facta ventriculi intemperies cognoscitur.

Vnus est in affectu diabetico, quando scilicet vrina, ut dicebat Hipp. comm. 3. in lib. 6. Epid. text. 15. est concolor cibo & potui, imo vero cum rei potulentæ odorem quoque retinet, tunc enim maxime imbecillitatis ventriculi argumentum deprimimus.

Alter modus est, cum vrina crassissimum obtineat sedimentum, ut dicebat aliquando Gal. lib. de plen. cap. 17. instar fabae elixæ, hic enim succus crudus, ut docuit idem Gale. lib. 1. de alim. facult. cap. 2. ex ventriculi inconcoctione generatur.

Quod vero pertinet ad alias partes, cum intemperies facta possit omnibus venis communicari, sicuti & calida, nemini dubium est, ea ratione, quae communicatur venis, posse etiam cognosci intemperiem illam determinatam, sic enim in cachexia & leucophlegmatia, quanquam intemperies sit in carnibus totius corporis, vrinæ hanc intemperiem ostendunt, quia venis omnibus communicatur.

Sed dubium est de intemperie, quæ venis non fuit communicata: hac in re puto, non esse abs re existimare, intemperiem quoque partium determinatarum, neque venis communibus communicatam posse ex vrinis cognosci; ratio, quæ me mouet ad hoc credendum, est ea ipsa, quæ usus sum in superioribus: serum accedit ad partes determinatas, ut sit vehiculum sanguinis: ergo recipiet qualitates ipsius partis. Itaque, si sit frigida, serum redditur aqueum, tenue, crudum.

Dicit quispiam, fateor id fieri, sed hoc serum non tendit ad vesicam, sicuti illud, quod in partibus calidis continetur, partes n. calidæ possunt illud colliquare, frigidæ a. minime.

Huic facile est responderi: serum enim partium determinatarum mitti potest ad vesicam, non tantum per modum colliquationis, quantum etiam per modum expressionis: expressio a. fit a frigido, frigidum enim densat ac densando humiditates exprimit. Idcirco dicebat Galen. lib. 4. de simpl. med. facul. capit. 1. ex frigido exprimente humiditates mordicationem quoque inferri & idcirco lacrymas in

An etiam cruditas vrinæ ex vrinis possit cognosci.

An iecoris.

An aliarum partium.

An intemperies venis non communicata possit ex vrinis cognosci.

Obiectio.

mas in oculis apparere.

Itaque laborante corpore frigida intemperie vel secundum omnes carnes, vel secundum partem determinatam, ut cerebrum serum non diffatur, non transit in sudorem, imo coactis partibus ad venas renes, & vesicam mittitur: hinc fit, ut cum primum quispiam cerebri frigidam contraxerit intemperie & destillationem, statim multum mingit illudque crudum.

Hanc eandem ob causam in principiis accessionum urinae minguntur albae & tenues, non propter viscerum aut venarum intemperiem, quae tunc temporis est calida confluenta sanguine & calore a toto corpore ad interiora, seu quia ex cutis & carnis refrigeratione fit constriction, ex constrictione expressio aquae humiditatis, quae frigidam sensit intemperiem, idcirco etiam sub aere frigido unusquisque multum mingit, illudque crudum.

An vterus frigidus possit ex urina deprehendi. Quod pertinet ad vterum, vterus frigidus ex urina cruda deprehendi potest, non quod ex vtero aliquid confluat in vesicam, sed propter contactum: vterus enim frigidus tangens vesicam intemperiem & lotio & vesicae communicat, propter quam causam praegnantem mulieres, praecipue in postremis mensibus, cum multam habent in vtero caliditate, urinam emittunt admodum rubicundam, quod diligenter notandum est, ne putentur esse periculose admodum, quamquam & crassae & rubrae sint. Haec de urinis quatenus significant intemperies & calidas & frigidas sine materia.

Cur mulieres praegnant in ultimis mensibus emittunt urinam rubicundam.

De Urinis ratione substantiae, coloris, loci figura, odoris modique exundi putridas febres, ut putridae sunt, demonstrantibus.

Caput XIX.

Quia haecenus sermo est factus de urinis in temperaturis eas declarantibus, quae sunt absque materia, nunc illas examinabimus, quae putridas possint demonstrare febres.

Duo a. praestabimus de his agentes. I. enim erit sermo de urinis, quae putredinem, ut putredo est, declarant. II. de illis, quae hanc vel illam putredinem significant.

Quantum igitur ad primum, Galen. sentent. lib. 1. de diff. febr. cap. 7. atque alibi proposita & confirmata ab Auic. sen. 2. lib. 1. doctrina 3. sum. 2. cap. 2. & 3. nisi sano modo intelligantur, minime sunt admittendae.

Qua urina putredinem significans. Voluit isti, imo cum ipsis tota Medicorum schola, crudas urinas, propterea albas, tenues sine contentis, addit Auic. multas in principio apparentes putridarum febrium esse signa, cum tamen ex solis hisce urinis nulla sit huius consequentiae certitudo, crudae enim sunt urinae & multae in crapula, ebrietate, carentia somni, cutis densitate, atque alijs id genus causis, quae sine febre sunt; idcirco possumus inductione quadam ex his urinis putridam colligere, sed non ex solis urinis.

Itaque consequentia poterit hoc modo deduci: Febris adest, & urinae sunt crudae & multae, neque praecessit recens cruditas aut febris ex bubone (nam in his quoque urinae sunt crudae) vel alia causa

A similis, & diu perseverant urinae crudae: Ergo febris est humerosa, non tamen necessario putrida.

Ceterum, quia in augmentis, statu, declinatione mutantur urinae, videamus, an in his temporibus reperiatur urina, quae putredinem ostendat.

In incrementis febrium aliae, ut ex praecedentibus constat, sunt urinae febrium perniciosarum, aliae vero salutarium.

Urinae febrium perniciosarum in incrementis putredinem ostendere possunt, ex substantia, contentis, colore, odore, & exundi modo.

Ex substantia, si fuerint crassae & conturbatae. Per conturbatas autem illas intelligo, quae tales sunt & permanent, ad differentiam illarum, quae vel clarae ineiuntur, sed conturbantur vel conturbatae red- *Qua urinae substantia putredinem significat.*

B Etenim tamen Gal. lib. 1. de cris. cap. 12. & lib. 4. de tuend. val. cap. 6. has omnes urinas aliquando significare coctionem scripserit, nihilominus de conturbatis, quae tales fiunt & permanent, non est eadem ratio, quae de alijs, quamquam istae aliquando significant coctionem, aliquando sunt signa prorsus opposita coctioni.

Significant coctionem, quatenus conturbantur a calore nativo in venis existentes superante iam causam morbosam & commiscente illam cum sero, ut iam incipiat excerni. Sed in perniciosis febribus haec confusio & conturbatio fit a calore praeter naturam confundente & permiscente bonos humores cum malis, imo ipsosmet colliquante & confundente cum sero.

C Hinc recte Sabinus, quamquam non immerito improbetur a Gale. comm. 5. in lib. 6. Epid. text. 15. volebat, turbatas urinas ex colliquatione fieri, quod etiam docet Auic. Fen. 2. lib. 4. doctr. 3. sum. 2. cap. 3. neque potuit negare Galen. qui in comm. 70. aph. sect. 4. quando scribit Hipp. Quibus urina perturbata, quales iumentorum &c. scribit Gal. has urinas conturbatas, quae futuri doloris sunt indicia, fieri a calore flammeo agitante materiam, & propterea idem Gal. lib. 3. de praesag. ex puls. cap. 3. proponens urinas febrium pestilentium omnium deterrimas, inquit illas esse conturbatas. Has etiam significavit Hipp. comm. in lib. 3. Epid. text. 15. quando proponens signa & symptomata pestilentissimae illius constitutionis, lotia inquit fuisse turbata, multa, mala. Ex his igitur locis putredo insignis elicitor.

D Quod spectat ad contenta, putredinem significant, sicut & tota urina, ex pravis coloribus. *Qua comitatur.*

Sunt autem pravi colores, croceus, viridis, rubens, ruber, & prurubus fuscus seu lividus, niger & ater, pravi colores, qui isti omnes colores insignem ostendunt putredinem, quia fiunt ex materia valde exusta, quae valde exuri non potuit absque ingenti putredine; propterea dicebat Galen. lib. 2. de nat. fac. cap. ult. omnes bilis species esse praeter naturam, flava excepta, intelligit Gal. de omnibus, quae sunt supra flavam, quia etiam pallida bilis potest esse naturalis, sed crocea & agrumosa &c. ex vehementi putredine generantur. Idcirco comm. 1. in lib. 1. prae-rebt. text. 4. Galen. atras urinas pravas esse inquit, eo, quod fiant ex bile exusta in nigrum colore conversae.

Ex con-

Qua substantia
est contenta
urinum.

Ex contentis ratione substantiæ & loci & figura A
licet etiam putredinem colligere.

Nam si substantia sit tenuior, quam par est, si loco hypostasis adsit nebula, si loco figuræ pyramidalis appareat circularis, etiam si color esset bonus, albus, ista contenta sunt pessima, putredinem indicant pestilentem. Hæc doctrina, quæ proposita est a Gal. lib. 3. de prasag. ex puls. cap. 3. & confirmatur ab eodem ex Hipp. com. 2. in lib. prog. text. 28. scilicet mihi ipsi quoque certissimis experimentis est confirmata: encephalata scilicet alba in modum lanæ congesta, ut scribit Gal. loc. cit. candida & splendida ut Hipp. l. c. magna ex parte in perniciosis febribus apparebant: ratio est, quia hæc contenta ex materia sunt crassiore, & quatenus crassa, deberent fundum petere, deberent quoque esse opaca, nihilominus ut dicit, transit in nebulam, fit alba & figuræ circularis, hæc tria fiunt a calore pernicioso excellenti, primum quidem crassam materiam & consequenter opacam usque adeo cōminuit & attenuat, ut vaporosus spiritus per minutas quasque illius partes ingredi possit, hinc euadit albifera.

Quatenus vero ab eodem calore præter naturam agitatur, ex graui fit leuius, idcirco ascendit, & quia motus rectus sursum & deorsum in corporibus est naturalis, circularis vero violentus, hinc fit, ut hæc contenta sint circularia, & hoc est, quod vult Gale. hæc contenta esse similia telis araneorum in modum lanæ congesta.

Factor.

Ex fœtore quoniam etiam putredinem licet colligere: idcirco Hippocr. 1. prog. text. 32. fœtidæ urinas tanquam putredinis soboles inter exitiales recenset.

Quis modus exiendi.

Denique ex modo exeundi licet putredinem colligere, cum absque ullo vesicæ aut renum affectu urinae emittuntur cum labore & dolore, sunt enim signa putrescentium humorum, qui per has partes purgantur. De his meminit Hipp. com. 2. in 1. Epid. text. 7. & 8. inquit, *urina stranguriose non nephritice*, de quibus etiam eodem l. text. 41. & 42. Sic igitur ex urinis in incremento perniciosarum febrium licet putredinem cognoscere.

In illis autem quæ perniciosæ non sunt, licet putredinem cognoscere ex colore, substantia, contentis ac modo exeundi, sicut de pestilentibus nunc dictum est; hoc tamen excepto, quod in istis si urina turbata apparent, turbantur propter aliquod principium victoriæ caloris natini supra causam morificam.

Colores præterea non apparēt in his usque adeo exitiales non virides, non fusci, non nigri.

Contenta quoque ipsa multo a prioribus iam relatis sunt diuersa in colore, substantia & figura: de his tamen & in augmento & magis in statu atoma in urinis apparent, quæ sunt reliquæ humorum putrescentium.

Et ex his certo quis potest affirmare febrem esse putridam, cum hæc corpuscula 4. humorum exitiorum cineres in urinis conspexerit. Hanc ob causam Gal. lib. 1. de diff. febr. cap. 6. tot esse scribit sedimentorum in urinis differentias, quot sunt formæ & colores ipsorum. Hæc de urinis, quæ putridæ, ut putridæ sunt, ostendunt,

An putridæ febres in specie ex urinis dignoscantur, & ex quibus unaquæque possit: Quæ item præter urinarum inspectionem ad certiores eandem consequendam cognitionem obseruanda sint. Cap. XX.

Non desunt, qui ex solo urinarum colore voluerint Medicos febrium species distinguere, ut propterea ad nos in præsentia pertineat hoc examinare, nunquid ex urinarum coloribus ergo non inspecto, liceat hanc vel illam febrium differentiam colligere.

Ex una parte Galen. id pluribus in locis publice testatum fecit, ut comm. 5. in 6. Epid. text. 14. Lingua, inquit Hippocr. lotium ostendit. Gale. in comm. docet ex colore non modo lingue, sed & lotij, urinarum succos dignosci: nam sicuti lingua rubra, ut eo loci docet Hippocr. fiunt a sanguine, & alba a pituita, & nigra a fuliginosa exustione, & viridis a bile, ita & lotia: propterea lib. 1. de diff. febr. cap. 6. tor, inquit, esse urinarum colores, quot sunt humorum formæ, & lib. 4. de tuend. valet. cap. 6. rubras urinas sanguinis esse indicium docebat, sicuti & alios colores aliorum humorum. Id ipsum docet Galen. comm. 1. in 6. Epid. text. 6. de colore, qui est in subsidentijs urinarum: nam alba subsidentia pituitam, rubra sanguinem, flaua bilem, nigra melancholiam significant. Idcirco etiam lib. de typis cap. 4. febribus biliosis urinas tribuit biliosas.

An ex solo urinarum colore liceat hanc vel illam febrium speciem distinguere.

Hæc tamen sententia multis non caret difficultatibus.

Galen. sententia refutata.

Prima quidem est; non valet hæc consequentia. Urina est rubra. Ergo febris est sanguinea. Neque valet: urina est biliosa: Ergo febris est biliosa. Id ipsum dico de melancholia & pituita.

Cur urina fiant rubra.

Quod non valeat consequ. de urinis rubeis, probatur multiplici argumento. I. quidem rubeus color in urinis, fit aliquando ex permixtione serosa humiditatis sanguinea, quæ augetur in iecore propter imbecillitatem facultatis alteratricis, de quibus urinis loquens Hippocr. com. 2. progn. text. 27. quod longam significat inualetudinem, rationem affert Gal. & eo in loc. & lib. 1. de cris. cap. 12. & com. 1. in 3. Epid. text. 5. quod scilicet significant sanguinem adhuc incōfectum, qui tempus requirat ad elaborationem. Id genus urinas vidimus proximo anno in Nobili Polono cachexia laborante, qui tandem Dei beneficio sanatus est.

Aliquando fiunt etiam rubra, propter dilatationem meatuum, qui deferunt serum cum sanguine a vena cava ad renes, præcipue, si sanguis fuerit tenuior: hoc docuit Galen. comm. 2. in lib. 6. Epid. text. 6.

Aliquando fit, ut aliqua erosio, vel ex arenulis asperis vel acris humoribus circa renes & vesicam, ut rubra reddatur urina absque sanguinis plethora. Addit Auic. sen. lib. 1. tract. 2. ca. 2. ex humoribus iecoris comprimentibus. Venas aut ex insigni obstructione, aut ex valida pituita putredine rubras reddi urinas.

rinās. Idcirco, ut dixi, non valet conseq. vrina est rubea. Et febris est sanguinea.

*vrinde fana
biliofa.*

Sed neque valet de biliofa. *Vrina biliofa sunt plerunque in pituitosis ex obstructione illius meatus, qui deferit bilem ad intestina.* Idcirco siue obstruatur a flatu, quod plerunque contingit in colicis; siue ex pituita, aut ex lapillis, aut comprimatur ex tumore scirrhuso, vrina fit biliofa in corpore alioquin frigido.

vrinde nigra

Idipsum dico de nigris: nigras vrinas dicebat Gal. ex sententia *Erasistrati*, quod tamen ipse admittit, *l. de atra bile, cap. 8.* nigras fieri vrinas ex vtero sanguinem menstruum non purgante, & *lib. 6. de loc. aff. ca. 1.* docet ex lienis obstructione totum corpus & vrinas reddi nigras, tametsi habitus corporis nō sit melancholicus.

alba.

Quod etiā pertinet ad pituitosas, quæ albae sunt & tenues, istæ non necessario ostendunt febrem pituitosam: possunt n. fieri in corporibus sanguineis biliosis ac melancholicis. Dicebat *Aetius. lib. de vrinar. iud. cap. 12.* albas aliquando reddi vrinas in corporibus sanguineis sanguine confluente ad alia loca. Sic enim siue sanguis per hæmorrhoidas, aut nares, aut alium purgetur locum, vrina alba & tenues emitti possunt. Idipsum contingit aliquando ex multo aut tenui potu, ex colliuatione serosæ humiditatis, ex facultate expultrice, suffocata & sopita. Sic enim Gal. *lib. 3. de prasag. expuls. cap. 3.* pestilentium vrinas sanis similes fieri docet, non a liam ob causam, nisi, quia expultrix facultas noxia retinet. In biliosis etiam vrinae albae & tenues quādoque educuntur, siue bilis & per sudores, siue per aluum aut vomitum educatur, aut petat alias partes, qua ratione Hipp. *sect. 4. aph. 71.* vrinas albas & pellucidas in pbroneis malas esse docet, eo qd vt scribit Galen. *in com.* bilis petat ipsum caput, sicque vrinae crudæ reddantur. Idipsum dico de melancholia, siue ipsa quoque per alias purgetur partes, siue alio tendat, aut in vasis & visceribus retineatur, lotia erunt cruda; propterea Galen. *lib. 2. de crisib. cap. 4.* dum proponit vrinas febrium quartanarum non scribit esse nigras, sed potius crudas, tenues & albas, præcipue circa initia.

*Contra-
quædam
ex vrinis de
vinitate co-
nati.*

Ex his iam patet rem esse satis ambiguam, neq; Medicos, vt videantur prophetæ, aut rusticis morē gerant, qui elonginquo vrinas ferunt & statim iudicium expetunt, oportere inconsulto de huiusmodi febribus pronuntiare, sed mature interrogare, qualis nam sit habitus, temperamētum, ætas, color patientis, tempus ægritudinis, excretiones alui, symptomata, & ceteræ quoque vrinatum differentia. Nam vbi hæc omnia consideratauerint, certum poterunt de febribus iudicium facere.

Exempli gratia: Habitus corporis sit gracilis temperatura calida, ætas iuuenilis, color sit naturalis, non sit mutatus, febris non sit in principio, hæc certū est cognosci posse ex vrinae colore, aut rufio, aut flauo, aut croceo, aut viridi, vel subviridi, quæ omnia varias significant bilis differentias. Quod si istæ vrinae sint quoque splendidæ & emittantur cum ardore, certius adhuc argumentum præstabunt biliosæ febris.

*Contrad-
ictoria illo.*

Quod dico in hoc exemplo, idipsum vnusquisq;

A poterit proprio Marte in ceteris inuenire, qua ratione poterit conciliare contradictionem, quæ videtur Hipp. ac plures alios confirmantes. Hippoc. *commen. 2. progn. text. 27.* rubeum colorem vrinae ac sedimenti longitudinem significare scribit, *sect. 4. aph. 71.* rubeam nubeculam in quarta apparentem inquit significare iudicium in septima. Gal. *in comm.* notat contradictionem, non tamen soluit.

Solutio autem patet ex istis: nam rubor in vrinis cum fiat ex causam multiplici, varia quoque potest significare vbi vero rubor fiat eo, quod serum ipsum sanguinis per lotium purgetur, tales vrinae breuem significabunt affectionem. Vbi autem miscetur serum sanguinis propter imbecillitatem sanguificatricis, tunc longam oportet expectare ægritudinem.

B

Vtrum vrinae partium etiam a venis communibus, longe distantium, imo & extra venas easi- stentes succos demonstrare possint.

Cap. XXI.

E X vrinarum differentiis succorum quoq; differentias cognosci, in dubium non est reuocandum, satisque iam de hac re dixi. Nūc autem illud hac in parte querendum relinquitur, an vrinae soles venarum succos demonstrent, an potius illos quoque, qui extra venas siue in toto corporis ambitu, siue in alia corporis parte consistant. Gale. *lib. 1. de cris. cap. 17.* vrinas venosi generis affectiones demonstrare proficitur, addit tamen *sect. 4. aph. 71. & lib. 2. de art. enr. ad Glau. c. 2. & l. 13. de meth. med. ca. 11.* & iccirco & renes & vesicam per vrinam purgari, propterea harum partium affectiones cognosci: *Cit. lib. 3. de cris. c. 3.* verba faciens de varijs excretionibus, quæ pro locorum & affectionum varietate, sunt; nullam aliam partem excrementa propria per vrinam purgare scripsit, quam iecoris connexā. Hipp. quoque *com. in lib. de vris. rat. in morb. acut. tex. 33.* conuulsionem inquit ex vrinis non cognosci, eo, quod vrinae non ostendant affectus musculorum. Hinc factum est, vt Alim. & alij cum eo, qui censent, materiam febrium intermittentium esse extravenas, arbitrati fuerint, illud sedimentū, quod in vrinis horum febricitantium apparet, esse portionem materiae non putrescentis, sed illius antecedentis, quæ in venis reperitur, & quæ posset putrescere, cuius sententiæ absurditatem pluribus verbis in præsentia non refutabo.

D

Quod autem pertinet ad nostrum quæsitum, tametsi Hippocrat. atque Galen. fuerint illius sententiæ quam ante proposui, nihilominus & ratione & auctoritate possumus confirmare, vrinas succos earum quoque partium demonstrare, quæ a venis communibus longe distant: ratio autem talis est. Humores, qui in quacunque corporis parte determinata reperiuntur, in venas recipi possunt, & per vesicam purgari. Ergo vrina demonstrabit affectus illius partis, a qua humor secedit.

Consequentia clara est. Antecedens probatur: totum n. corpus est vndique confluxile, vt scribit Hipp. *lib. de alim. & post illū Gal. lib. de vris. puls. c. 2.* Sed

Sed præterea sigillatim hoc potest confirmari de varijs corporis partibus, & primum quidem de toto scribit Gal. *com. 2. in lib. progn. tex. 37. per vrinas aliquando totum corpus purgari*. Id ipsum scripsit idem Gal. *com. 2. in 1. Epid. tex. 41. cum enim scribat Hipp. in eo textu, eos quibus humores ad stranguriam desinerent, in ea constitutione fuisse seruatōs, scribit Gale. hoc factum esse, purgato vniuerso corpore per vrinas.*

Sed præterea ex causa califica colliquatur vniuersum corpus, & colliquatio aliquando per vrinas purgatur: Ergo illæ vrinæ ostendent succos redundantes in vniuerso corporis ambitu; ex colliquatione enim succos totius corporis ad vesicam confluere, docuit Gal. *lib. 3. de caus. sympt. cap. 2. & in com. 28. 2. part. apb. cum scribit vniuersum corpus breui contabescere ex quacunque subita excretionē siue per aluum, siue etiam per lotium. Accedit & alia ratio, nam sudor & vrina sunt eiusdem matenę & causę efficientis: Sed sic est, quod suppressis sudoribus vrinæ succedunt copiosę: Ergo materia sudoris purgatur per vrinas. Sed materia sudoris est extra venas. Hoc docuit Galen. *lib. 4. de tuend. val. cap. 4. Ergo recepta in venas & purgata per vrinas significauit humores musculorum totius corporis.**

Confirmatur, quia sudor easdem habet coloris differentias, flauis, viridis, ac ceteras, quas habet etiam vrina, quod docuit Galen. *lib. 6. de loc. affect. cap. 4. & lib. 4. de tuend. val. ca. 4.* Confirmatur adhuc magis, quia succi, qui sunt in corporis ambitu, plerumque ex rigore, horrore, refrigeratione, timore & mæore alijsque id genus causis intro trahuntur, vt docuit idem Gal. *l. c.* Ergo per vrinas purgati ostendent carniū affectiones.

Quod est dictum de ambitu totius corporis, idē potest de alijs quoque locis demonstrari. Scribit Hippocr. *sect. 6. apb. 44. Quibus ex stillicidio vrina, ileos superuenerit: in septem diebus pereunt, nisi febre superueniente satis vrina fluxerit.* Gal. in *com. aliam non inuenit huius solutionis causam, quam humores crassos, ileum facientes a colore febrili colliquatos & per vrinam purgatos: at vero ileos est passio intestini. Ergo affectus intestinorum purgantur per vrinas.*

Idcirco idem Hipp. *sect. 4. apb. 73. murmura intestinorum vult aliquando solui effluente vrina copiosa, in quem sensum scripsit quoque idem Hipp. sect. 4. apb. ult. mictum plurimum paucam significare egestionem. Affectus etiam thoracis ex vrinis cognosci posse docuit Gal. *lib. 6. de loc. aff. cap. Qui pus in thorace contentum per vrinas purgati docuit. At si pus: Ergo, & alij humores, & eo potissimum, quod nostris temporibus vena illa dicitur sine pari inuenta est, per quam talis excretio fieri consuevit.**

Sed & aliæ partes, quæ difficiliorem habent cum venis aditum, suos succos ad vrinas transmittunt. Quis enim est difficilior transitus ad venas ipsas, quam aquę in abdominis capacitate collectę? Scribit tamen Gal. *sect. 7. apb. 54. aliquando hanc materiam per vrinas purgari, quod mihi quoq; semel felicissime contigit Venetijs in moniali hydropica,*

quæ spatio trium dierum ac noctium post longum diureticorum vsum libras aquę plus minus triginta euacuauit per lotium soluto statim morbo.

Id ipsum scribit Hipp. *sect. 7. apb. 54. contingere, si pituita reperiatur inter septum & ventriculum, non disputabo in præsentia, qualis sit hic locus, illud sufficiat intellexisse Hipp. significare locum extra venas, cuius tamen pituitosa materia per vrinas purgari possit. Idcirco etiam *com. 1. in 6. Epid. 15. nigras vrinas ex colliquato liene fieri scribit, Gal. & Auic. *sen. 2. lib. 1. summ. 2. doct. 3. cap. 6. inquit, vrinas, quæ crassam & viscidam obtinent materiam, esse indicia humoris purgati ab articulis, quando dolor ad sit articularis, vt minime a veritate alienum sit, & cerebrum & alias quascunque corporis partes per vrinam purgari, tametsi materia fuerit extra venas.***

Quod si purgetur, ex colore, ex acrimonia, ex qualitate, & ex proprietate substantiæ, & totius vrinæ & contentorum vnusquisque poterit conijcere, qualis sit materia, qualis consequenter illius partis affectio.

Ad Gal. & Hipp. qui videntur in oppositū scripsisse, vnica & facilis est responsio, *vrinas scilicet primo & per se atq; immediate ostendere succos & cistica, venum, iccoris gibba, atque omnium venarum: secundo tamen ex accidente & mediate, quatenus scilicet materia locorum determinatorum potest, vel transmitti, vel attrahi in venas & renes, possunt etiam demonstrare affectus partium determinatarū.* Idcirco, vt rectum de his fiat iudicium, non modo consideranda est ipsius vrinæ substantia, quantitas, color, contenta & alia id genus, verum etiam obseruanda sunt signa affectionis omnium partium, & apparentibus vrinis iam propositis, videndum; an fiat mutatio signorum & symptomatum illius partis determinatę: nam, si fiat, coniectari oportet, materiam illius loci per vrinas purgari.

Sicne aliquod, & quale nam illud pro cognoscenda mala partium compositione solutęque vnitatis ex vrinis præsagium. Cap. XXXI.

Quid possint vrinæ in demonstrandis interperantijs atque humorum differentijs, siue in venis, siue extra venas, hætenus est explicatum. Quantū autem in ceteris declarandis valeant morbis, in posterum dicetur.

D Est sane dubium & inconstans præsagium, quod ex vrinis depromitur pro cognoscendis affectibus, qui ad malam pertinent compositionem solutęque vnitatis. Explanare tamen conabor quicquid certi ars ipsa hæc in parte præstare valeat.

Et quando partes laborantes vel sunt ex illis, in quibus vrina aut elaboratur, aut percolatur & retinetur, aut sunt ab ipsis diuersę, dicam de vtriusque a prioribus sumpto exordio.

Fuit Auic. *sententia sen. 2. l. 1. doct. 3. ca. 3. conones vrinas venarum obstructionem demonstrare. Hęc sententia, si sano non intelligatur modo, erit falsa. Idcirco quatuor sunt notanda. 1. est vrinam rō esse vere tenuem, i. e. aqueam in colore & substantia, sed in substantia nō esse quidem crassam; in colore*

potest esse & alba & nigra.

Non est aquea, quia aquea vrina sequitur inconcoctionem auctore eodem Auic. lib. cap. & Gal. lib. 1. cris. cap. 12.

Nō potest esse exacte tenuis, quia ut optime hac in parte docuit Valles. libr. 3. controu. 15. obstructio potest quidem crassos humores prohibere, ne cum vrina misceantur, non potest autem mediocritatem substantiæ, quam a calore suscipit, ita alterare ut tenuem efficiat.

Est vero alba, si obstructiones sint ex materia pituitosa.

Est tenuis nigricans, si obstructiones sint ex melancholia.

Et quanquam auctor lib. de vrinis, profiteatur, nigram & tenuem nō dari vrinam, eo quod omnes fiant ex permissione succi melancholici, decipitur tamen: nam minima quoque humoris melancholici portio sero permixta nigritiem parit.

Secundum notandum est, has vrinas obstructionem demonstrare, dum humores obstruentes, vel naturæ expellenti, vel medicamenti resistunt: cum primum enim obstructiones aperiuntur, crassæ redduntur vrinae.

Tertium notandum easdem vrinas reddi ex renum calculis, aut alia quacunque renum densitate vel obstructione.

Idcirco pro distinguendis locis impediens transitum humorum inspicere oportet, & ad contenta in vrinis, & ad partium symptomata.

Ad contenta, quia si arenula villo vnquam tempore apparuerint, tenuitas apparens calculi est indicium.

Ad symptomata, quia si affecti sint renes, vrina non tenuior modo, sed etiam magis parca emittitur, ut quandoque ex toto supprimatur, id quod nō contingit in obstructione iecoris, præterquam quod alia quoque symptomata erunt diuersa.

Quartum & vltimum notandum est, nomine obstructionis iecoris non esse intelligendam obstructionem meatus fellei, sed venarum: meatuum autem fellei obstructio vrinam reddit crassam & biliosam.

Ceterum istæ ipsæ vrinae, crassæ inquam, ac rubæ non modo fiunt ex obstructione meatus fellei, verum etiam sequuntur tumores iecoris, siue duros, siue inflammatorios. Ex his enim non modo comprimi possunt meatus vesicæ fellei, verum etiam venæ ipsæ comprimuntur, ut sanguis necessarius simul cum sero misceatur. Hæc omnia itaque non ex vrinis tantum, sed ex proprijs signis distinguere oportet.

Vrina vesicæ exulcerata.

Quod spectat ad vlcera, si hæc fuerint in vesica, facillime cognoscuntur ex contentis squamosis, sanguini commixtis, ex pure, ex dolore circa vesicæ regionem, & eo, quod pus & sanguis vrinae non admodum est mixtus, sed post mictionem excernitur: contra, si sit in renibus, & pus & sanguis vniuersæ commisceantur vrinae atque omnia inuicem commista excernuntur.

Quod autem pertinet ad affectus aliarum partium, in quibus vrina nec generatur, nec percolatur, nec retinetur, maior adhuc est difficultas &

A incertitudo, colligam tamen, quæ apud probatos scriptores inueni & propria obseruari experientia.

Vrinae harum partium morbos demonstrare, possunt duplici ratione, vel, quando ipsæ suscipiunt nouum quendam colorem, substantiam, acrimoniam, contenta, quæ antea non aderant, vel quando crassitiem, contenta, colorem & acrimoniam, quam obtinent, amittant: primæ vrinarum differentie possunt quidem earum partium morbos demonstrare, a quibus illi humores secedunt, qui vrinae commisceantur.

Quomodo vrina per se sit demonstrare affectus aliarum partium.

Sed incertum ac dubium est hoc præsagium. I. quidem, me etiam non loquente, poterit quis colligere, ex talibus vrinis nullum ex illis morbis cognoscere, qui sint absque materia. Exempli gratia: est luxatio, fractura, numerus auctus aut deficiens, figura vitata, & id genus alia.

Neque etiam vrinae possunt ostendere illos affectus, qui etiam si fiant ex materia, habeantque eam connexam, habent tamen illam astrictam, conclusam, immotam, siue sint scirrhi, siue inflammationes recentes, vel abscessus varij.

In illis autem, qui materiam habent mobilem, non necessario possumus affectionis naturam cognoscere, tamen si excrementa illius partis ad vrinam transmittantur. Ratio est, quia plerumque affectio illius partis fit ex fluxione alterius materiæ diuersæ ab excremento naturali partis.

Datur exemplum: Laborat cerebrum phrenitide ex affectione calida, colliquatur pituita, quæ est in cerebro, & colliquata ad vrinam tendit. Vrinae fiunt multæ, crudæ & tenues, tamen capitis morbum non significant, aliquando etiam in affectu calido superueniens refrigeratio exprimit humiditates tenues & aqueas, quæ tamen non constituunt essentiam morbi: accedit, quod plerumque ille ipse humor, qui facit vnius partis determinatæ morbum, ut phrenitidem, abundat in iecore, in venis, & purgatur per vrinam, & tamen nihil certi habemus de ipso loco patiente. Itaque in hoc casu, ut certum fiat iudicium, considerandum, an vrinae, quæ nouos iam recipiunt humores excernantur cum iuuamento patientis & cum leuamine symptomatum illius partis, quam putamus esse affectam: hoc enim modo vrinae color substantia, contentum certum faciens iudicium materiæ constituentis illum affectum, ubi enim talia excernuntur, qualia oportet, confert.

Hipp. sect. 1. aph. vlt.

An, quomodo, & ex quibus vrinis affectiones capitis, ut sunt delirium, phrenitis, &c. prædicti possint. Caput XXIII.

Q Vemadmodum ex humorum quantitate & qualitate, quia partibus secedunt determinatis, & vrinae permisceantur, potest fieri iudicium de natura, aut tumoris aut obstructionis illius partis, nunquid sc. sit tumor biliosus, aut alterius speciei, si obstructio cōsimiliter, ita quando, quæ in vrinis continentur, ab illis recedunt, varia prædicti possunt, de quibus apud Hippoc. Gal. aliosque Medicinæ scriptores facta est mētio, sed tanta cum ambiguitate, ut si

ut si quis inconsulto suam proferat sententiam, ridiculus plerumque sit euasurus.

Existimant Medici ex vrinis prædici posse delirium, consequenter phrenitin, dolorem capitis, convulsiones, paralytes, apoplexias, parotidas, de quibus omnibus facta est mentio, partim apud Hipp. Gale: Actuar. partim vero apud alios. Hipp. enim *sect. 4. aph. 70.* ex vrinis turbatis dolorem capitis pronunciat; *Quibus vrina quales sunt iumentorum his capitis dolor, vel adest vel aderit, aph. 71. eiusdem partis.*

An & quomodo phrenitis.

Ex vrinis albis & perspicuis phrenitin cognosci proficitur, id quod apertius docet Gal. in *comment.* cum enim scribit Hippocr. albas & pellucidas vrinas malas esse, præcipue vero in phreniticis, inquit Galen. malas esse in phreniticis hanc potissimum ob causam, quia bilis raptum habeat ad caput, & propterea in morbo bilioso vrina sunt albæ & perspicuæ. Ex sublimamentis quoque proficitur Hippocrates, phrenitin cognosci. Nam *comment. 2. in 1. prorrh. text. 1. vrinas*, inquit, *sublime petentes occultato coxa dolore esse phreniticas.* Id ipsum scribit *commento primo, in primo prorrh. text. 4. de vrinis nigris, tenuibus, sublime petentibus, comment. tert. in prima prorrh. text. 68.* ex suspensis albis videtur prædicere futurum parotin: propterea si legemus varias eiusdem Hippocr. historias in Epid. relatas, videbimus eas prædictis respondere auctoritatibus. Nam Hermocrates, cuius sit mentio *comment. 1. in 3. epid. text. 5.* qui vrinas habuit turbatas, postea clarescentes & tenues redditas, delirio affectus est; id ipsum contigit *comm. 3. in 1. Epid. text. 2.* vxori Philini: & cum vrinis nigris & tenuibus delirauit æger, de quo facta est mentio *com. 3. in 3. Epid. text. 74.* Auicennas quoque *cap. 2. sui tract. de vrinis*, virides vrinas in pueris inquit significare convulsionem, eas vero, quæ crassum & album habent sedimentum, paralytin & apoplexiam.

Quæ omnia tamen si aliquando eueniat, non sunt tamen perpetuæ veritatis: nam si de turbatis vrinis fiat mentio, iam audiuitis Gale. *lib. 1. de cris. cap. 12. & lib. 4. tuend. val. cap. 4.* aperte docuisse omnem turbatæ vrinæ differentiam alicuius coctionis esse argumentum. Pariter si sermo sit de tenuibus ac pellucidis, ista exactam consequuntur cruditatem, frigidam intemperiem, ex eodem *lib. 1. de cris. cap. 12.* si confugiamus ad suspensa, dicebat Gale. *eod. loco, & in com. 6. in 2. prognost.* sublimamenta hæc fieri in corporibus biliosis, in his qui vtuntur tenui cibo, vt propterea nullum horum possit certo capitis affectum prædicere, & propterea idem Galen. *com. 1. in 3. epid. text. 5.* loquens de huiusmodi vrinis, quæ videntur delirium significare, inquit casu hoc contingere, vt patientes cum talibus delirent vrinis. Itaque apparet, quam dubia hæc sit doctrina.

Regula in observatione harum vrinarum tenenda. in turbatis.

Vt aliquid certi in hac parte habeamus, regulæ quædam sunt proponendæ, circa observationes harum omnium vrinarum, quæ putantur capitis affectiones prædicere. Et quia sunt 3. præcipue differentię turbatæ scil. tenues & pellucidæ, & habentes suspensiones, circa hæc omnia aliqua sunt notanda.

I. Quod pertinet ad turbatas, 3. in illis præcipua sunt considerata. 1. quidem color: nam si huiusmodi turbatæ vrinæ colorem non obtineant a naturali diuersum, non necessario futurum indicat delirium aut dolorem, id autem faciunt, quando aut flauum intensum aut rubrum, vel, vt dicit Actuarius, vineum in se continent colorem. Ratio autem est, quia tales omnes vrinæ perturbationem subeunt non ex imbecillitate colonis & flatu agitante, sed ex calore flammeo in venis ebulliente, & humores omnes confundente.

II. Regula est, vt tales vrina tenuiores fieri incipiant: nam si crassæ persistant, materia non necessario petit caput, potest etiam expurgari per vrinas, sed vbi tenues fieri incipiunt, tunc suspicandū, materiam ad caput conuerti, id quod docuit Gale. & cum eo Hippoc. exemplo *Hermocratis iam relato com. 1. in 3. epid. text. 5.*

III. Regula est, vt huiusmodi vrina siue crassa persistens, siue tenues reddita non sint copiosæ: nam vbi multæ sunt, possunt patientem a magnis vindicare malis. Dicebat Hippoc. *sect. 4. aphor. 74. in febribus lassitudinarijs vrinam multam crassam liberare patientem a futuro abscessu:* potest itaque etiam præseruare a dolore & delirio.

De crassis etiam, quæ sunt tenues & copiosæ, scribit idem Hippoc. *sect. 4. aph. 69. Quibus vrina crassa meluntur & grumosa, si ab his tenues & copiosa meiantur, profunt.*

Quod vero pertinet ad tenues, in his quoque obseruandus est color, temperatura patientis, morbi, iecoris, & renum, & alia excretiones.

Temperatura quidem: nam si fuerint insigniter frigida, tenuitas & albedo non erit signū phrenitidis: si fuerit nigra, aut viridis, aut ruffa, deliriū poterit significare: pariter si obstructio iecoris adsit, tenuitas nihil indicabit de delirio futuro, si adsint etiam in corpore quidem bilioso vrinæ tenues & albæ, sed tamen patiens laboret fluxu bilioso aut vomitu, aut alia excretionem bilis, illa non repit ad caput, propterea tales vrinæ, neque delirium, neque alium affectum significant.

Quod vero pertinet ad suspensiones, suspensa in vrinis aut sunt cum humorum caliditate & tenuitate, aut cum humorum frigiditate & crassitie.

In humoribus calidis fieri suspensiones, non est a ratione alienum: sed si in crassa vrina suspensiones appareant, ex hoc licet desumere argumentum futuri affectus capitis, præcipue vero si hæc sublimamenta prauos quoque habeant colores, propterea dicebat Hippoc. *com. 2. in lib. progn. text. 36. nubeculas in vrinis considerandas esse:* nam si ascendant cum prauis coloribus, malas esse inquit, si descendant cum bonis coloribus bonas esse.

Ceterum consulo quinetiam, vt præter regulas iam propositas diligenter obseruentur, quæ circa actiones animales ipsi ægro contingunt: nam siue vigilæ, siue aurium tinnitus, aut vertigo vel quid tale incipiat patientem affligere, & ex alia parte, aliqua ex prædictis adsit vrinis, certum fiet iudicium de futuro delirio, aut tumore vel frigido, vel calido pro natura & statu patientis: si vero nihil tale adsit, non facile hæc prædicenda Medicis sunt.

Quae vrinae febrium breuitatem, quae longitudinem, quaeque medium statum significent. Item, quibusnam affectibus & coctio & cruditas vrinarum faciat de longitudine aut breuitate praesagium.
Cap. XXIV.

Cum tria sint praecipua, quae ex vrinis praedici consueuerint, febrium scilicet breuitas aut longitudo, perniciēs aut salus, modusque salutis aut mortis; Nos signis coctionis & cruditatis exordium sumentes, duo in parte prima praestabimus: primo quidem, quales nam vrinae breuitatem, qualesue longitudinem, quales etiam medium statum significent: Item quibusnam affectibus coctio & cruditas vrinarum certum faciat de longitudine aut breuitate praesagium.

Quod igitur ad primum pertinet, vulgatissima est Hippoc. sententia *comm. 2. in 1. epid. text. 45. & 46. a Gal. accepta, ac sexcentis fere locis repetita, coctionem scilicet morbi breuitatem cruditatem vero eiusdem significare longitudinem.* Et quia inter absolutam cruditatem absolutamque coctionem medium quoddam reperitur, illud medium quoque significabit morbi statum neque fini proximum, neque a fine admodum distantem. Exacta autem coctio proposita est ab eodem Hippoc. & Galen. *comm. 2. in prog. text. 26. lib. 1. de cris. cap. 12 & 17.* est enim *vrina optime cocta moderata substantia, coloris subflaua, sedimentum habens album, laeue & per omne tempus aequale*, in corporibus potius pituitosis, pueris, mulieribus, aliisque liberaliter & otiose viuentibus. In temperamentis enim biliosis etiam biliosum sedimentum exactam ostendit coctionem.

Quinimo, si tales tenuiter etiam vixerint ac corpus exerceant, sine vllis contentis ex solo colore & substantiae mediocritate absolutam ostendent coctionem. Quod si vel non exerceantur, vel exercitati admodum tenuiter non vivant, istis pro exacta demonstranda coctione satis erit nebula aut suspensum cum bono colore ac substantia totius vrinae. Haec Galen. & locis citatis, & lib. de totius morbi temp. cap. 5. & alibi pluries.

Itaque quandocumque in morbis tales appareant vrinae, breuissimum esse ad salutem tempus certo praedici potest.

Illam tamen conditio praeter ceteris omnibus attendenda, ut scilicet *aqualis sit vrina*, hoc est, singulas, quae excernuntur mane & vespere, & per sequentes dies easdem obtinere conditiones. Nam si fiat mutatio, ut docuit Galen. *in illo comm. text. 26. 2. progn. crudus humor coctionem iam in vna parte factam intercipit, & sic quanquam ratione illius humoris concocti salus sit proxima, ratione alterius crudi, qui interponitur, sit nouum morbi principium, hinc aequalitas per singulos dies repetitur.*

Quales vrinae sint in morbi fine? Haec sententia, quae irreprehensibilis videtur multas habet difficultates, nam cum scribat Galen. *lib. 3. de cris. cap. 5. vrinas exacte coctas, quales iam descripti in statu tantum apparere, multae sunt ratio-*

A nes & auctoritates, quae oppositum ostendunt, in statu scilicet vrinas esse admodum ab his diuersas.

Primum quidem aliquando possunt esse tenues: ubi enim in principio & augmento morborum crassiores redduntur vrinae, facta concoctione attenuantur & copiose redditae tenues excernuntur critico modo absque vllis contentis. Hoc voluit Hippoc. *in illo aph. 69. 4. part. cum scripsit, in febribus si vrinae grumosa & crassa moiantur, ab his vero tenues & copiosa, profunt.* Non prodesse autem si symptomatice excernerentur.

Sed aliquando etiam in statu crassissimae excernuntur cum prauis contentis. In hunc sensum scribit Hippocrat. *sect. 4. aph. 47. in febr. non intermitentibus excretionibus limida, fetida, cruenta, biliosa omnes male, quae tamen si recte procedunt, bona.* Cum excernuntur, dicit Gale. *in comment. non quasi ichor, qui in loco inflammato non possit contineri, sed quasi materia ex disrupto abscessu purgante natura non humorem, & meminit sigillatim Hippocrat loco citato.* huius excretionis factae per vrinam (vtrum vero haec excretio sit facta cum coctione, an non, disputabitur sup loco, ego cogor accusare Galen.) *comment. etiam 2. in 1. Epid. text. 41.* mentio fit de stranguria feliciter iudicante morbos illius constitutionis, cuius stranguriae causa erant humores multi, crassi & mordaces tempore status excreti, quod etiam pertinet ad contenta dixit Gal. *lib. 1. de differ. febr. cap. 6.* sedimenta vrinarum posse portionem humorum in venis putrescentium & tot esse formas sedimentorum, quot sunt differentiae humorum: haec autem materia puri similis in statu potissimum excernitur: tunc enim feliciter excernitur, cum iam est conuersa in quid puri simile: est autem conuersa post perfectam concoctionem, quae fit in statu. Igitur in statu vrinarum contenta non possunt esse alba, sed illius coloris, cuius fuit humor putrescens.

Accedit, quod in statu fit ipsa perfecta coctio, ut docuit idem Gal. *sect. 2. aph. 29.* ac dum fit coctio, non potest esse absoluta.

Praeterea in statu omnia sunt fortiora eoque insignis est agitatio humorum, qui a natura alterantur, *sect. 2. aph. 30.* Igitur etiam contenta debent esse diuulsa, non plana propter hanc insignem corporis perturbationem.

D Cum itaque haec, quae proposuimus & antiquis partibus rationi & experimento sint consentanea, pro solutione contradictionis apparentis tria dici possunt. Prima est: *febres aut fieri in corporibus pituitosis, aut in aliis temperamentis.*

Si in pituitosis corporibus, perfecta coctio requirit contentum album, laeue, aequale, & praecipue hypostasim.

Si sint corpora alijs humoribus scatentia, contenta etiam naturalia coctionem optimam praeseferentia, eos habebunt colores, quos habent humores peccantes.

Secunda distinctio: *vrinae considerari possunt, vel ut signa coctionis tantum, vel etiam, ut causae criticae.*

Si considerentur, ut signa coctionis tantum, nunquam debet esse tenues nec crassiores iusto tempore status.

Si con-

Responsiones ad contradictionem Galeni & Hippoc.

Si considerentur ut causæ etis, quatenus scilicet natura aliquando omnem deponit per hanc partem corporis superfluitatem, sicut deponit, & per secessum, & per sudores & vomitum, nihil refert eo tempore, etiam si urines aut tenuiores, aut crassiores, aut pravi etiam coloris reddantur.

Tertius & ult. distinctio: *Status dupliciter potest considerari, vel in priori sui parte, quæ ad augmentum vergit: vel in ultima quæ ad declinationem.*

In prima parte coctio perfecta fit, in ultima coctio perfecta est facta. Et propterea post primam partem succedit excretio; ultimæ autem parti præcedit excretio.

Hanc veramque status partem nobis significavit Gal. *sect. 2. aph. 29.* declarans, cur in statu nihil sit mouendum, inquit, quia fit coctio vnica interiecta linea, inquit, quia materia est perfecte cocta, & iam natura defatigata. Si Gal. duas hasce status partes non significaret, sibi ipsi contradiceret. Itaque igitur sentiendum de urinis coctionem ac consequenter breuitatem significantibus.

Quod pertinet ad crudas, quanquam crudæ urinae principium morbi significant, attamen, quia principium a Galen. ut potuit colligere, in 3. partes distribuitur, videndum est, quæ sint proprie urinae vniuscuiusque partis principij.

Prima pars principij.

Est prima pars principij *tempus, in quo nulla prorsus adest coctionis nota*, de hac parte principij meminit Gal. *lib. 1. de cris. cap. 8. & 9. lib. de totius morbi temporibus, cap. 3. & 4.*

Quæ eius urina.

Cognoscitur huiusmodi tempus ex urinis tenuibus & albis omni contento carentibus.

Ceterum, quia tennes urinae aliquando corrumpuntur, aut breui post emissionem corrumpuntur, aut longo intercedente temporis intervallo. Vtraque sunt absque coctione: significant tamen breui incepturam coctionem, si breui tempore corrumpuntur: magis vero distantem, si longius tempus ad corruptionem exquirant. Hæc Gal. *lib. 4. de tuend. val. c. 4.* cuius sententiam accipio, quidquid in oppositum alij sentiant.

Notanda.

1. Hæc tamen in parte duo sunt notanda: Primum est, *tennes urinas in principijs morborum aliquando excerni non propter cruditatem, sed quod materia alio diuertat.*

2. Dictum est hæcenus de hac re, albas & pellucidas urinas in phreniticis fieri, idcirco ad symptomata patientis respiciendum, ne morbus pronuntietur longus, qui sit acutus & lethalis.

Alterum est in diabetica passione quam Galen. *lib. 6. de loc. aff. cap. 4.* proponit, urinas tennes & consequenter crudas excerni, neque tamen est propria passio iccoris, aut venarum, sed potius ipsorum renum, ut explicauit Galen. *loc. cit.* Idcirco pro dictione huius affectus a tenuibus urinis cruditatem significantibus, quantitatem respicere oportet & tempus exundi: nam in diabete tennes & copiosæ sunt. Et quod pertinet ad tempus, cum primum quispiam potum acceperit, tunc primum aqueas etiam emittit urinas, serosi humoris nulla facta retentione.

Secunda pars principij.

Cum secundam principij partem urinae obscuram habentes coctionem circumscribant, quinque

inuenio esse harum urinarum præcipuas differentias. Prima est *tenuum, quæ carent contentis, incipiunt tamen recedere a colore albo.*

Idcirco in hac classe reponuntur vineæ, quæ animalantur colorem vini albi, *subpallida albæ, subruffæ & ruffæ.* de quibus omnibus meminit Gale. *lib. 1. de cris. cap. 12. quinto com. 1. in 3. epid. text. 5.* cum videret Gal. *Hippoc. comm. 2. prog. rubearum* urinarum mentionem non fecisse, sed tantum subrubearum in *text. 27.* vult & subrubeas & rubeas inter obscure coctas reponi & consequenter longitudinem significare.

In hac parte duo sunt, quæ negotium faciunt: primum est, quod desumitur ex *Anicenn. sen. 2. lib. 1. in doctrina 3. cap. 3.* qui verba faciens de urinis, quæ incipiunt concoqui, scribit, illas primo substantiæ mediocritatem, deinde colorem luscipere.

Confirmatur hæc opinio philosophica ratione. Color enim cum sit accedens, est posterior substantia. Itaque primo debet introduci substantia, deinde color.

Alterâ difficultas est de urinis subrubeis, quas, ut dixi, Galenus inter obscure coctas reponit, inter eas, quæ longum significant morbum, & tamen rubeæ & subrubeæ sunt a sanguine, non modo auctore *Anicenna in cap. 2. illius doctrina 3.* verum etiam ipso *Hippoc. comm. 5. in lib. 6. epid. text. 14. lingua*, inquit, *locum ostendit: postea subdit, rubea a sanguine.*

Experientia quoque docet in Synochis febribus, quæ omnium sunt breuissimæ urinas esse rubeas.

Prima difficultas facillime soluitur: color in urina dupliciter induci solet, vel ex mixture materię coloratæ cum ipso sero aqueo, vel ex augmento caloris alterantis ipsammet feri substantiam.

Primo modo urina fit colorata quanquam sit tenuis: nam modica etiam bilis portio aqueum colorem substantiamque tenuem potest in pallidum, aut subruffum, vel ruffum transmutare. Sed color qui contrahitur ex ipsismet substantiæ feri transmutatione, is non potest comparari priusquam tenuis substantia in crassiorem vertatur.

Ad secundam instantiam, quid pro Gal. dicam, sane non habeo, putabam posse defendi Gale. si dixissemus, repositum esse illum rubeas ac subrubeas urinas, sed tennes, inter obscure coctas. Nihilominus *loc. cit. comm. 1. in 3. epid. text. 1.* est sermo de crassis rubeis, quas tamen sub eadem ponit censura.

Accedit, quod *Hippoc. auctoritas 2. ille progn. text. 27.* a Galen. proposita non fauet Galen. vult Gale. ex eo loco colligere, voluisse Hippocratem subrubeam urinam longum significare morbum, videatur locus, hoc non dicit Hippoc. sed comparative loquitur. In *26. text.* proposuerat urinam exquisitè coctam, in sequ. statim textu hanc proponit subrubeam, quam inquit morbum significare longiorem habito respectu ad eam, quam prius descripserat, propterea subdit *salutarem.* At vero ubi urinae longitudinem significant, non necessario ostendunt salutem: nam in progressum morbi varia fit circa ærotantem mutatio.

Sed detur, subrubeam longitudinem significare obscuro.

Objectiones 1.

Responsio ad primam.

Ad secundam.

obscuramque coctionem, eo, quia ostēdit, ut inquit Gal. terosiores esse sanguinē, ac consequenter crudiores, quam conueniat. De rubea quid dicemus? cur debet rubea cruditatem significare, si est argumentū sanguinis bene confecti? propter hanc causam ego rubeam vrinam inter signa longitudinis non puto reponendam.

2. *Tenuis cum nebula alba.*
Secunda vrina est tenuis, sed cum nebula alba. Hæc obscuram sane significat coctionem. Meminit huius vrinæ Hipp. com. 2. progn. text. 28. cū inquit, Cādidæ vrinæ & tenues vitiosas esse: de his verba faciens com. 3. in 1. porrbet. text. 68. quærit, an possint esse signa putredinis, eo quod obscuram habeant coctionem.

3. *Crassa, inter-
bata.*
Tertiz sunt crassæ seu turbatæ, quæ non subsident: harum meminit Gale. tanquam obscuram significantium coctionem, lib. 1. de cris. cap. 12. & lib. 4. de tuend. val. cap. 4. qui tamē, com. 1. in 3. epid. text. 5. videtur sibi ipsi contrarius, dum scribit, has nō minus crudas esse, quam ipsas tenues albas. A tenues nullam habent coctionem: Igitur neque turbatæ, quæ non subsident: potest tamen conciliari hæc controuersia. Nam turbatarum vrinarum, ut alias dixi, duplex est differentia: quædam sunt a calore naturali aggrediente concoctionem humorum, de quibus meminit Gale. lib. 1. de cris. cap. 12. & lib. 4. de tuend. val. cap. 4. aliæ sunt a calore flammeo præter naturam agitante humores venarum. Istæ sunt omnino inconcoctæ, imo coctioni oppositæ, de quibus meminit Gale. & loc. cit. com. 1. in 3. epid. text. 5. & sect. 4. aphor. 70.

4. *Crassæ subsi-
dentes pro-
pter materiam
grauitatem*
In quarto loco sunt vrinæ crassæ, quæ subsident quidem, sed subsidentiam habent propter solam materiam grauitatem: Idcirco deponunt materiam infundo matulæ instar farinæ crassioris. Harum meminit Gale. sect. 4. aph. 69. cum inquit, circa initia morborum, vel augmenta has crassas vrinas subsidentiam habere non propter concoctionem, sed ob solam materiam grauitatem de his quoque verba fecit Hipp. sect. 7. aphor. 31. cum inquit, vrinas, quæ habent sedimentum instar farinæ crassioris, longitudinem significare.

5. *Crassæ cum
suspensionibus
albis.*
Vltimo inter vrinas obscuræ coctionis connumerantur crassæ, quæ suspensiones habent crassas, inæquales, diuulsas, figuræ circularis. Harum meminit Gal. lib. 3. de prasag. ex puls. cap. 3. qui comparabat hæc contenta telis araneorum in modum lanæ congestæ.

Hæc omnes vrinæ significant obscuram coctionem & quousque perdurant, secundam principij partem.

Reliquæ vero, quas nunc recensemus, manifestā quidem habent coctionem, non tamen absolutam, & quanquam Gal. in lib. illo 1. de cris. cap. 12. ac 17. videatur voluisse has determinare postremā principij partem, mihi tamen verius videtur, illas ostēdere tempus augmenti.

Nam a manifesta coctione ad absolutam intercedit quidem aliquod temporis spatium, sed illud admodum breue, quale non consuevit esse tempus augmenti, præterquam, quod cum ego per totum Hipp. totumque Galen. quæserim, nunquam potuerim inuenire, quales nam vrinas tribuant incre-

mento. Oportet igitur, ut sint mediæ inter perfectæ coctas, & inter obscure coctas.

Mediæ autem sunt istæ, quas, ut dixi, Galenus tribuit vltimæ parti principij.

Prima est turbata seu crassa, quæ clarescit, cuius meminit 1. illo de cris. cap. 12. & lib. 4. de tuend. val. cap. 4. Sed hac in parte opus est iudicio, alioquin Galen. sibi ipsi contradicet in duobus com. sibi ipsis propinquis: sect. enim 4. aphor. 69. in principio, inquit, crassam vrinam, quæ habet subsidentiam, non esse signum coctionis. In seq. aphor. crassam subsidentem, inquit, esse signum coctionis, ut vindicetur Gal. a contradictione, ipsam oportet respicere subsidentiam. Nam si admodum crassa fuerit, sit ex sola grauitate absque coctione manifesta; Si aliquam habeat aut leuitatem aut figuram pyramidalem, est signum coctionis manifestæ.

Secunda est vrina moderata substantiæ & boni coloris absque contentis, cuius meminit lib. 1. de cris. cap. 17. In hac quoque oportet respicere ad temperamentum, victum, & naturam morbi.

Nam si temperamentum sit biliosum, sicuti & morbus, victosque sit tenuis, talis substantia & color absque vlllo contento absolutam significat coctionem. Hoc docuit Galen. lib. 1. de cris. cap. 12. & com. 2. in lib. progn. text. 26. In alijs autem morbis ac temperamenti cum variant contenta, vrina dicitur non manifeste, sed perfecte cocta.

Tertia differentia est vrina moderata substantiæ ac coloris, quæ habeat suspensionem aut nebulam loco hypostasis, quanquam morbus non sit biliosus.

Quarta differentia illius, quæ habet suspensum ac nebulam albam quidem, sed diuulsam, non plenam, sed dissimilariū partium.

Quinta differentia est earum vrinarum, quæ habent contenta alba, lenta, sed non equalia, imo vno die apparentia, alia autem non. Hæc omnia manifestam significant coctionem, non tamen perfectam.

Atque ideo applicantes iam vrinas ad præfagiū, vbi vrinæ sint omnino crudæ in primo quaternario longissimam significant febrem. Si obscuram habeant coctionem, longum pariter significant morbum, sed priori non æqualem. Si in primo quaternario manifesta sit coctio, morbus inter longos non est recensendus. Idcirco Hipp. in illa sect. 4. aph. 77. ex rubea nubecula in quarta apparente, quæ est signum coctionis manifestæ, sed non perfectæ, salutem prædicit in septima.

An etiam ex vrinis salus egrotanti aut interitus, & ex quibus earundem, & quomodo prædici possit. Cap. XXV.

Sicuti certa est lōgitudinis ac brēuitatis morborum præcognitio, quæ ex vrinarum cruditate vel coctione colligitur: ita dubia admodum & inuida ea est, quæ ad futuræ salutis vel mortis præfagiū spectare videtur. Idcirco nostrum erit in præsentia diligenter hac in parte versari, & quid certū, quidve in ea dubium sit, accurate rimari.

Primum quidem non est, quod quis existimet, ex inculpatis vrinis certo se alieni sanitatem promissurum. Cum enim, ut in superioribus dictum fuit, plures

plures sint lethales morbi, præcipue vero capitis, A thoracisque inflammatione, quæ nullam plerumque habent cum urinis communicationem, sit etiam, ut vel phrenitici, vel lethargici, vel peripneumonici, ac pleuritici diem suum obeant, urina sanis existente simillima. In pestilentibus etiam hæcticis non modo quotidiana docet experientia, sed & Galen. ipse lib. 3. de præfag. ex puls. cap. 3. urinas usque adeo sanis similes factas ait, ut etiam Medicos deciperint. In hunc sensum puto scripsisse auctorem libri præfag. comm. 2. in lib. 1. tex. 24. cætas urinas esse malas. Scio equidem Zeuxidem referente Galeno in comment. Galenumque ipsum aliter hunc locum exposuisse, mihi tamen præsens expositio rationi magis consentanea videtur. Hanc ob causam Galenus noster, alioquin oculatissimus, hac in parte (pace illius dictum sit) iusto audacior mihi videtur, qui com. 6. in 6. epid. text. 6. cum videat Hippocratem ibi prauorum quorundam symptomatum syadromen proponere, neque tamen urinarum mentionem facere, inquit, se ex urinis de euentu statim iudicium facturum, ut scilicet si prauæ fuissent, hic certo esset moriturus: si concoctæ, conualiturus, sed ægre, quod in alijs quoque morbis faciendum esse putat, contra quam nos iam ex eiusdem sententia & ex ratione docuerimus.

Urinas sanis oppositas non indicat certo futuram mortem.

Sed neque ex urinis, quæ sanis opponuntur, certum post fieri iudicium futuræ mortis.

Cum enim urinae sanis oppositæ sint vel crudæ, vel prauæ, neutrae certi aliquid obtinent: non crudæ, nam scribit Gal. com. apb. 12. sect. 1. & com. 1. in 3. epid. text. 4. urinas crudas tempus quidem requirere ad coctionem, non tamen necessario mortem significare. Idcirco etiam Hipp. com. 2. in 1. epid. text. 46. inquit, crudam non solum mortem significare, sed etiam iudicii difficultatem & longitudinem. Propterea idem comm. 2. in lib. prog. text. 34. eos, qui diu tenues & crudas mingunt urinas, non dicit morituros, sed abscessum aliquem habituros.

Quod si aliquando idem Gale. & Hipp. crudas urinas ac tenues inter exitiales reposuerint, ut com. 2. in lib. progn. text. 32. & com. 2. in 1. epid. text. 75. atque alibi. id non ex propria urinarum natura factum esse censendum est, sed ex collatione cum viribus, cum ætate, cum natura morbi, cum alijs symptomatibus.

Cum viribus quidem: nam quando in cruditate vires sunt infirmæ, certo mors prædici potest: nam in longo statu vires præsentis debiles non erunt idoneæ ferendo morbo.

Ratione ætatis. Cum ætate: nam si in pueris tenues fiant urinae (de febribus est sermo) exitiales sunt: Etenim & facultatis concoquentis & expellentis summam significant imbecillitatem. Idcirco Hipp. com. 2. progn. text. 33. in adultis nigras, in pueris tenues urinas lethales scribit.

Cum morbo: nam si morbus ex propria natura biliosissimus, ut phrenitis, casus ex bile, &c. Et tamen urinae sint crudæ, signum lethale est.

Id ipsum dicendum de symptomatibus; quando quidem ubi ad sint vigiliæ, delirium satis ingens, atque alia id genus praua cum crudis urinis, male cum ægro agitur.

Memoriae tamen mandare oportet, quod alias in hac tractatione monui, ne scilicet tenues ac multas urinas, quæ post crassas emittuntur in diebus iudicatorijs cum virium subleuamento ac morbi declinatione, putetis tanquam crudas esse malas.

Dicit quispiam, si crudæ urinae certo mortem non indicant, indicabunt saltem prauæ, in quibus scilicet signa apparent coctioni opposita: harum meminit Hipp. com. 2. progn. text. 32. Exitiosior vero, inquit, urina est, si aquosa, fetida, nigra crassaque: Et text. 28. eiusdem com. præponit quatuor urinarum sedimenta (de quibus alias memini) tanquam exitialia: Et in text. 35. urinas cum pinguedine supernatante consumptionem significare. Gal. partim in lib. 1. de cris. cap. 12. partim in lib. de tot. morb. temp. cap. 5. omnes connumeravit urinas exitiales, turbidas, oleosas, fetidas, quæ habeant contenta farinae crassiori simillima, squamosa, furfuracea, grana omni æmulatione.

Ad hæc colores liuidos, virides, nigros in his tanquam lethales connumeravit: quæ tamen omnia, nisi legibus distinguantur, ridiculos aliquando in prædictionibus faciunt Medicos.

Nam primum, quod ad turbatas pertinet, tamen si idem Gal. lib. 3. de præfag. ex puls. cap. 3. illas referat tanquam pestilentium febrium urinas, & ideo scribat Hipp. com. 3. in 3. epid. text. 15. ubi proponitur constitutio pestilentissima, lotia turbata, multa, mala: nihilominus quia huiusmodi urinae sunt etiam quandoque indicia coctionis inchoantis, ut docuit idem Gal. lib. 1. de cris. cap. 12. & lib. 4. de san. tu. cap. 4. Idcirco oportet ad pullas, ad calorem, ad alia denique symptomata, quæ pernitiosum docent morbum, animum conuertere: & si illa quoque ad prædicendam necem conspiciant, turbata lotia inter pessima erunt numeranda: si secus res habeat, arbitrandum agitari & confundi crassos humores potius ab innato calore, quam extraneo.

Quod est dictum de turbatis, idem intelligendum de crassis inæqualibus, quæ aliquando periculum, aliquando solam significant longitudinem.

De periculosis meminit Hipp. sect. 7. apb. 33. vocat autem ibi Hipp. has urinas dispartitas, diuisas, seu distractas propter insignem partium inæqualitatem, quæ si cum virtute fuerint debili, lethaliissima sunt: Etenim non cruditatem modo, sed & insignem humorum diuersitatem significant: si tamē consent vires, isti quoque, quanquam multi & diuersi, & concoqui possunt, ut morbus quidem longior reddatur, lethalis tamen nequaquam, ut docuit idem Hipp. comm. 4. de vi. rat. in morb. acut. text. 51.

Oleosa similiter variam habent prædictionem. Quæ enim oleosa dicuntur ob substantiæ crassitiem, colliguatis scilicet humoribus, qui in venis sunt, si cum viribus fuerint fortibus, longitudinem tantum significant, ut potest colligi ex comm. 3. in 3. epid. text. 61. in viribus lauguidis sunt lethales. Idcirco comm. 3. in 1. epid. text. 29. ægri fit mentio, qui cum urinis oleosis existentibus esset debilis, in undecima defunctus est.

Quia vero datur etiam oleosa tenues ex pinguedine supernatante, ista quoque variam habent prædictionem: sagium:

Prædictiones ex turbatis.

Ex crassis.

Ex oleosis.

Ex oleosis tenuibus.

sagium: nam aliquando colliquatio fit ex renibus & nihil habet periculi: nonnunquam fit in suspitione futuræ hæcticæ, & longitudinem pronuntiat.

Lethales itaque erunt, quæ in ardentibus aut malignis fiunt febribus cum pulsum imbecillitate, atque alijs pravis symptomatis, ad quæ oportet semper animum conuerrere.

Quando ex vrinæ substantia nullum fit certum futuri euentus præsagium, multo minus ex colore illud haberi poterit. Colores enim ex quacunque etiam minima humoris cum vrina commistione ita permutantur, ut incertum admodum sit præsagium. Hipp. tamen *com. 2. prog. text. 29. nigras nubeculas malas esse* scribit, quod etiam de alijs contentis intelligi debet. Exitiales inquit esse totas vrinas nigras *tex. 32. præcipue vero in adultis*, ut scribit *tex. 33. cui in hærens Gal. lib. 1. de cris. cap. 12. neminem se vidisse inquit seruatum ex illis, qui nigras emitterent vrinas*. Idcirco *com. 2. in 1. prorrh. casum* proponit cuiusdam ægri, qui in septima obiit cum vrinis nigris. Multa quoque habentur apud Hippo. huius rei exempla defunctorum cum nigris vrinis, ut *com. 3. in 3. epid. tex. 86. in casu Apollonij, & tex. 87. & seq.* Virides etiam vrinas & liuidas inter exitiales reponit *Gal. lib. 1. de cris. c. 12. auctor lib. prorrh. comm. 1. in 1. prorrh. tex. 31. prærubas quoque* reponit inter malas.

Hæc tamen, ut dixi, nullam habent certitudinē. Cum enim colores tales sint, quales humores permisti, Hipp. & Gal. auctore *com. 5. in 6. epid. tex. 14. & comm. 1. in 6. Epid. text. 6. non raro* contingit, ut natura citrice prauos cum vrina deponat humores, qui salubritatem efficiant, id quod docuit Hipp. & cum eo Gal. non modo *com. 2. in 1. epid. tex. 41 sed etiam sect. 4. aph. 47.* dum scribit Hipp. *excretiones in febribus non intermittentibus nigrae, liuida, factidæ omnes mala: si tamen recte procedunt, bona. Et Gal. in comm.* Excretionis nomine vrinas quoque comprehendit. Idcirco in quartanis febribus, atque alijs affectibus melancholicis non semel ego nigras excerni vrinas obseruavi maximo egrotantis leuamine.

*Propter an sit
signum per-
nitiosum.*

Neque vero fœtor in vrinis signum est vsq; adeo pernitiosum, ut necessario mortem significet: quam Hipp. *com. 2. in progn. tex. 32. fœtiditas* posuerit inter exitiales. Fœtor enim aliquando aut renū, aut vesicæ, aut vteri vlcus consequitur, aut proprietatem ciborum assumptorum, aliquando etiam natura citrice deponit humorem.

*Multi-
tudo
& paucitas*

Neq; ex multis aut paucis certi aliquid pronuntiabimus: cum multæ aliquando quidem prauæ sint, ubi fiunt ex colliquatione, aliquando autē bonæ, cum totum corpus purgant, ut supra ostensum est Hippocr. auctore *sect. 4. aph. 69. & 74.* ¶ Dicit quispiam, sedimenta saltem illa praua, de quibus meminit Hipp. *comm. 2. prog. text. 28. & Gal. lib. 1. de cris. cap. 12. fursuraceum* scilicet, squamosum, farinam crassiorem æmulans inter pernitiosa signa esse reponenda, cum & carnis & vteri colliquationem ac scabiem ac fursurationem significant.

Ceterum ostendimus hæc quoq; ex renibus tantum & vesicæ prodire: sic scribit Gal. *comm. 5. in 6. epid. text. 15. sedimenta instar farinæ crassioris, & quæ grana etui æmulantur, ex colliquato fieri ieci-*

A nore. Hipp. *vero sect. 4. aph. 77. & 81. fursuræ & squamas vesicæ scabiem aut vlcus vteri significare* docuit.

Idcirco posteaquam omnia connumerauit exitialia signa ex vrinis desumpta, in illo *com. 2. prog. tandem in tex. 37. monet nos, ne huiusmodi præsa-*gijs decipiamur, & patientem periclitaturum prædicemus, cum tamen vrinæ illæ ex vesicæ affectu possint prodire.

Accedit, quod sedimentum instar farinæ crassioris, si album fuerit, potius longitudinem quam periculum significat, ut docet Hippoc. *sect. 7. aph. 31.* atque ideo potest etiam fieri in sanis corporibus, dum liberaliter bibunt, cibisque crassioris succi vtuntur quod docet Gal. *lib. 1. de alim. fac. cap. 2.*

B Neque vero carentiam contentorum exitia lem esse putandum est, cum calidiores affectus in his potissimum, qui singuliter viuunt, vel careant contentis, vel saltem loco hypostasis nebulam habeant, vel suspensum: Id quod docuit Gal. *com. 2. progn. text. 26. & lib. 1. de cris. cap. 12.*

Circularis figura contentorum aliquod quidem habet momentum illudque effatu dignum ad perniciem, ut docuit Gal. *lib. 3. de præsa. expul. cap. 3.* Ego quoque pluries obseruavi experientia: nihilominus nonnulli quoque cum talibus seruantur contentis.

Colliquatio quin etiam, quæ in superficie vrinæ in modum telæ araneæ supermat, quamquam significet consumationem, ut docet Hipp. *comm. 2. prog. text. 35. nihilominus hæc consumptio non necessario* perducit ad necem. Plurimas ego quotidie in ardentibus & malignis febribus expeior hac ratione colliquari, non necessario periclitari.

C Accedit, quod ut scribit Hipp. *sect. 7. aph. 35. ex renibus etiam hæc colliquatio fieri potest.*

Cum itaque res ita se habeat, ut aliquid certi in hac parte, quod ad præsagium pertinet, haberi possit, hæc omnia sunt obseruanda.

Primum igitur non vnicum oportet signum in vrinis inspicere, sed plura simul, & quædò vel plura vel potiora saltem pernitie significare videntur, quantum ad hæc pertinet, futura mors est prædicenda; si plura aut potiora in bonum conspirent, salus. Potiora autem sunt, quæ ad perniciem tendunt, insignis tenuitas, aut insignis perturbatio, liuidus ac niger color, insignis fœtor, prauitas contentorum, ratione substantiæ orobæ, fursuracæ, squamosæ atque inæquales rubro vel liuido colore affectæ: Circularis figura in suspensis & substantia oleosa ac quantitas imminuta, nisi tamen ea imminuatur, vel propter sudores aut alui deiectionem aliamue excretionē.

D Secundo inspicenda est natura, magnitudo ac motus febris. Nam si fuerit febris ex humoribus calidis & magna ac ardens, velocisque motus, in hac renues vrinæ & admodum turbatæ, squamosæ ac fursuracæ, crassum habentes sedimentum, pauca, omnes sunt lethales. Si colliquatio & oleosa substantia accedat, adhuc periculosiores sunt.

Tertio obseruandus est mos februm, si febres sint benignæ, neque liuidus color neque niger, neque fœtor, neque substantiæ crassities vel alia id genus verenda sunt. In febre mali moris vnicum ex per-

*Quæ obser-
uanda ut
præsa-
gium
certum ha-
beri possit.*
1.

2.

3.

nictosis signis relatis perniciem quoque ægrotantis A
significat.

Quarto observandum est *tempus*, in quo sunt excretiones & tolerantia. Nam si prænæ urinx in principio & augmento magnæ ac malignæ febris excernantur, nihil profunt, & patiens ab his nil iuvatur. Quod si morbo iam progresso in die critica ac cum ægri tolerantia emittantur, salutare sunt existimandæ. ¶ Denique considerandæ diligenter erunt omnes causæ naturales, non naturales, ac præter naturam a febribus distinctæ, ut sunt morbi penis, vesicæ, vteri, renum, ex quibus urinx pravas acquirunt qualitates, ægroti tamen lethaliter non laborante. His diligenter animaduersis, quântum humanæ patiuntur vires, nullus in prædicendo error committetur.

Quæ urina, a quo eadem, quæ quantitate, tempore, loco ac modo sint inspicienda. Cap. XXVI.

VT certum fieri possit iudicium circa præfagia ex urinis desumpta: necessarium est, certum quendam habere modum inspiciendi urinas, circa quem nunc versabimur.

Dicemus autem, quæ urinx, a quo, quæ quantitate, tempore, loco ac modo sint inspiciendæ.

Quæ urina sint inspicienda. Et quod ad primum pertinet, urina quæ inspiciatur, neque debet esse turbata, neque alio modo confusa aut agitata, vel a motu vel a calore, igni aut aqua vel a flatu aut aere extrinseco.

Quod si alia non adsint, quam talis turbata & confusa, igne restituenda est imposito vaso super prunas ardentes sine ulla agitatione: sic enim substantia saltem & color restituantur: contenta autem, vel nonquam vel ægre admodum servantur.

Debet quoque conservari urina cooperta, ne pulvis ingrediatur, qui nonnullis infert colliquationis suspensionem, neque debet servari exposita igni, sic enim rubeum contrahit colorem aut fuscum & liquidum, sed potius detineatur intra surfures in loco tamen calido.

Quando sit inspicienda Inspicienda est & nuper emissæ & diu servatæ: nuper emissæ, ut odor percipi possit; diu servatæ, ut inspiciantur contenta. Avicenna non admittit urinx inspectionem transacta hora ab emissionem, cum tamen potior Medicorum pars censeat ad horam usque sextam, usque adeo servari integram, ut cuncta ea fideliter inspicere possint.

Matutina, quæ statim a somno sit, omnibus præfertur, utpote, quæ coctionis notas præ ceteris melius contineat; non sunt tamen alix quoque prætermittendæ, utpote, quæ in febribus ex cruditate quibusdam horis præter morbi naturam apparente, accessionum initia deprehenduntur.

A quo. Debet hæc urina ab exercitato inspicere Medico, cauto, ne decipiatur, & qui oculorum acie multum valeat: in visu enim hebeti & color & substantia

& contenta ægre admodum distinguuntur.

Tempus videndi urinam est, ut paulo ante dixi, & cum nuper est emissæ, & quatuor etiam, vel sex horis post emissionem.

Quantitas debet esse tota urina ab ægrotante excreta, & simul unica vice, acque etiam pluribus collecta. Nam ex ea, quæ tota simul emittitur, facilius contenta omnia deprehenduntur, quæ ubi mediata tantum pars Medico profertur, obscurantur.

Ratione vero quantitatis discretæ Medicus confert urinam excretam cum potu accepto. Nam si superet potum, aut symptomatice est, aut critica: si multo minor sit potu, ex ea coniecit Medicus vel insignem febris ardorem, vel materiam alio delatâ.

Quod spectat ad locum, debet primo servari urina in vase vitro, crystallino, mundo, in quo antea non fuerit oleum, satis amplum, ut totam urinam semel eiectionem contineat, rotundum, ut hypostasis melius appareat.

Debet autem inspicere, neque in multo lumine, neque in umbra, sed in medio quodam lumine.

Quod pertinet ad modum, si Medicus cupiat videre urinx colorem, opponat brachium lumini, ex opposito matulæ: si cupiat videre hypostasin, imponat brachium, vel corpus opacum suo fundo: si cupiat videre nebulam vel suspensum, opponat corpus opacum lumini in parte vasis superiore.

Debet autem & approximare vas oculis, & deinde etiam longinquius removere: Nam quo propinquior est urina oculis, eo crassior videtur, quo remotior, eo tenuior evadit.

His sic enim aduersis, antequam Medicus ferat iudicium, debet etiam diligenter considerare, quales sint illi, qui offerunt matulam, an sint homines subdoli, & qui delectentur Medicos decipere, an potius sint ingenui & fideles: nam ubi aliqua adest suspicio, attente omnia sunt consideranda, color, odor, substantia, contenta, ne pro urina succum aliquem urina similem offerant.

Præterea, cum dictum sit, urinas immutari quodque ex causis extrinsecis, ex cassia, sena, rhabarbato, terebinthina, asparagis, &c. quandoque etiam pravas apparere ex affectione pudendi, vesicæ, renum, nullo modo in ceteris laborante corpore.

Cum denique variæ sint urinx pro variâ aetate, sexu, temperamento, vitæque ratione tam in potibus quam in cibis, exercitatione corporis, somno, venere atque ipso aere, antequam de morbis venarum, de quibus præcipue urinx iudicium faciunt, Medicus suam proferat sententiam, diligenter sciscitati debet, quæcunque pertinent ad huiusmodi proprietates ciborum & potionum urinas immutantium, ac res non naturales, ad res naturales & ad affectus præter naturam renum, vesicæ & pudendi. Hac lege & conditione tuto accedat ad præfagium & iudicium ferendum, ex quo & gloriam & emolumentum sit accepturus.

INDEX CAPITVM.

DE PVL S I B V S.

- Quid spbygmus sit, quod eius subiectum, quis & quod duplex eius vsus & finis. Cap. 1.
- De simplicibus spbygmorum differentiis, qua solam diastolen seu dilatationem respiciunt. Cap. 2.
- De spbygmis quietem & proportionem inter diastolen & systolen respicientibus. Cap. 3.
- De inequalitate spbygmorum simplici. Cap. 4.
- De inequalitate composita, seu systematica dicta. C. 5.
- De differentiis ad ordinem & eius perturbationem pertinentibus. Cap. 6.
- Quomodo et quibus potissimum requisitis omnes spbygmorum differentia dignosci possint. Cap. 7.
- De causis spbygmorum in genere. Cap. 8.
- De causis immediatis spbygmorum propriorum inseparabilem & separabilem. Cap. 9.
- De causis spbygmorum communium seu familiarium. Cap. 10.
- De causis spbygmorum inequalium ex complicatione oriturum, & primum de inequalitate, qua sit ex instrumento & facultate. Cap. 11.
- De spbygmis inequalibus ex vsu & facultate. Ca. 12.
- De spbygmis inequalibus factis ex inequalitate inter solida ipsius cordis & partes propinquas contingente. Cap. 13.
- De spbygmocicroto. Cap. 14.
- De causis mediatis spbygmorum. Cap. 15.
- De modo distinguendi causas spbygmorum naturales & non naturales, a causis prater naturam. Cap. 16.
- De dignatione prater naturalium causarum pulsuum. Cap. 17.
- De futuri euentus ex spbygmis equalibus presagio: quos locos affectos idem, quas affectiones, quasque causas, & symptomata indicent. Cap. 18.
- Quos locos affectos, quas affectiones, quasque causas & symptomata pulsus inaequales denotent. Cap. 19.
- De ratione distinguendi pulsus inaequales factos ex vsu immutato ab ijs, qui ob facultatem vitale grauata & instrumen. impedita tales existunt. Cap. 20.
- De inequalitate pulsuum ob facultatem imbecilem, quomodo hac sit distinguenda ab ijs, qua ab vsu fiunt & instrumento. Cap. 21.
- De pulsibus inaequalibus factis ex instrumentis impediis, ab vsu & facultate distinctis. Cap. 22.
- De pulsu dicoto & helico, quas uterque affectiones, locos affectos & causas significet. Cap. 23.
- De futurorum ex pulsibus inaequalibus presagijs. Cap. 24.

DE VRINIS.

- Qua sit urinarum natura, quotuplex eiusdem significatio, qua earum in genere materia, quaue causa efficiens. Cap. 1.
- De urinarum differentiis ijsque sumptis ex substantia, calore, odore, sono & colore. Cap. 2.
- Qua urine oleosa, qua earundem differentie & causas. Cap. 3.

De differen. urinar. relativis dictis, qua scilicet desumuntur a quantitate, tempore & modo exeundi.

Cap. 4.

De natura & differentiis contentorum in urinis sanorum corporum. Cap. 5.

De differ. sedimenti in urinis egrotantium, & qua ex aliorum sententia eiusdem sit materia. Cap. 6.

Qua vera sit & genuina sedimenti naturalis materia. Cap. 7.

De causa efficiente sedimenti urinarum. Cap. 8.

De sedimento medio, inter naturale & prater naturam, & quomodo id a naturali differat. Cap. 9.

De contentis prater naturam, deque illorum differentiis & materia. Cap. 10.

De contentis in urinarum superficie existentibus, & de contentorum praternaturalium differentiis a substantia desumptis, & de earum causis. Cap. 11.

De causis diuersorum colorum in urinis. Cap. 12.

De causis urinarum copia, paucitatis, odoris, caliditatis, frigiditatis, soni, clari & obtusi. Cap. 13.

De causis farinae crassioris in urina, item furfurata, squamularum, arenarum, lapillorum, puris, saniei, sanguinis & caruncularum. Cap. 14.

Quid aequalitas & inequalitas contentorum in urinis denotet: quid bulla sint, spuma & corona seu circulus, qua tum harum, tum pilorum in urinis et pinguedinis cause. Cap. 15.

De urinarum vsu & presagijs, ac primum, qua potissimum ea sint, qua ex urinarum differentiis possint demonstrari: quaque urine intemperiem calidam communem & consequenter febre ostendant. Ca. 16.

Qua urine calidam intemperiem in partibus determinatis, & in quibus eandem existere, & quomodo significent. Cap. 17.

Qua urine, quas partes frigida intemperie laborare ostendant. Cap. 18.

De urinis ratione substantiae, coloris, loci, figurae, odoris, modisque exeundi putridas febres, & putridae sunt demonstrantibus. Cap. 19.

An putridae febres, in specie ex urinis dignosci, & ex quibus unaqueque possit: Quae item prater urinarum inspectionem ad certiore earundem consequendam cognitionem observanda sint. Cap. 20.

Utrum urine partium etiam a venis communibus, longe distantium, imo & extra venas existentes succos demonstrare possint. Cap. 21.

Sitne aliquod, & quale nam illud pro cognoscenda mala partium compositione solutaque unitate ex urinis presagium. Cap. 22.

An, quomodo & ex quibus urinis affectiones capitis, ut sunt delirium, phrenitis praedici possint. Cap. 23.

Qua urine febrium breuitatem, qua longitudinem, quaeque medium statum significet: Item quibusnam affectibus & coctio, & cruditudo urinarum faciat de longitudine aut breuitate presagium. Cap. 24.

An etiam ex urinis salus egrotanti aut interitus, & ex quibus earundem, & quomodo praedici possit. Cap. 25.

Quae urine, a quo eadem, qua quantitate, tempore, loco ac modo sint inspicienda. Cap. 26.

